

醫法明鑑

五

X
i 39

F
1-123

卷之五
目錄

490.9
Ih-10
2

No. 2107
19 / 39



帶下

三八附無子

婦人 上
月經 一 三

胎前 中

惡阻 二 三

胎動 三 四

腹痛 四 二

丁

六

年

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

午

丁

病名目錄
一葉誤脫
續葉出於
五之卷初

乍寒乍熱	五三丁	蓐勞	六三丁	瀉痢	七三丁
浮腫	八三辛	腹脹	九四	乳汁	十三附乳癰
乍見鬼神	十一尾	中風	十二三六	不語	十三四
身疼	十四四丁	脚氣	十五四	腰痛	十六四
血崩	十七日	淋閉	十八附尿	大便秘	十九四丁
口鼻黑衄血	二十四	喘急	二十附尿	大便秘	二十二四
頭痛	二十三四	虛汗	二十四四	咳嗽	二十五四
陰脫	二四	玉門瘡腫	二十七	斷產	二十八四丁
反魂丹	二九四	產後	三十	渴	三十一四
小兒	四四	三証	三十四九丁		
拭穢	四四				
二便不通	四四				
不飲乳	七二丁	洗浴	八四		
胎驚	十四	月裏生赤	十一四	護養	九三丁
視手紋	十三四	診脉	十四四	觀形	十五章
審外証	十六四	變蒸	十七四	吐瀉	十八五辛
腹脹	十九五辛	腹痛	二十四	痞癧	二十一五辛
夜啼	二十二五辛	客忤	二十三五辛	口瘡	二十四四
重舌	二十五五辛	弄舌	二十六五辛	吃泥	二十七四
滯頤	二十八四	語遲	二十九四	行遲	三十
鶴節	三十一四	腳拳	三十二四	手拳	三十三四
顛陷	三十四四	顛填	三十五四	解顱	三十六四
龜胸	三十七六辛	龜背	三十八四	項軟	三十九四
丁奚哺露	四十	脫囊	四十一	脫肛	四十二

髓病

四十三卷

盤腸內吊

四十四

齒不生

四十五六八丁

斷乳

四十六日

誤吞諸物

四十七

諸熱証

四十八日

驚風

四十九附慢脾風

天癆丸

癥証

五十九丁

痘疹

五十一八六丁

醫務法明鑑卷之五

婦人 上 月經 一

○傳婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而燔若

夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以

歸肝而出納之用已竭云云

又曰因食少肺金失所養而

氣滯不行則無以滋腎陰况月經全藉腎水既乏則經血日

以乾涸以致或先或後淋瀝無時漸而至閉塞不通甚則為

癥瘕血脯勞極之証又如崩漏不止之証先因心火亢甚於

是血脉泛溢以致肝實而不納血出納之道遂廢月水錯經

妄行無時而泛溢漸而至崩中不息甚則化為白濁白滯血

枯發熱勞極之証舟溪曰經不通或墮胎多產傷血或久

患潮熱銷血或久盜汗耗血或脾胃不和飲食少進而不生

血或癆疾失血治宜生益補益除熱調胃之劑或七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行

四物湯 乃婦人衆疾之總司也

歸

芍

白芍

熟地

右等分

經水常不及期而行者血熱也用生地加連 荸 香附

過期而來者瘦人多是血少倍歸地加茵甘少佐以桃 紅

肥人大槩是氣虛挾痰阻升降去地加參 茲 甘 荸

香附 半 陳

過期而來紫黑成塊者熱也多作腹痛用生地加香附連

延 乳 没 五靈

血淡色者瘀多血少也用生地合二陳

經候將來腹中痛者血實也一日瘀血鬱滯也用生地加香附

桃 紅 延 牡 木 菟

經候過而腹中痛綿綿無休息屬血虛倍歸

地兼氣虛者加

參 茲 术 挾寒者加干姜

肥盛婦人或二三箇月一行者痰盛而軀脂閉塞經脉去

地 芍 合道痰湯 加連

香附 二术

經水適來適斷往來寒熱如瘧者合小柴胡

○調經散 經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩

來皆可服

歸酒洗一門

二吳茱

擇去閉自者沸

半湯泡七次焙乾

七次

白芍 芍 牡 各一

膠 甘 各一

分半右作一服

加姜三片

七次

○月經先期而來者宜服歸身

半 芍 膠 艾葉 甘 柘

知各半 生地 條芩 香附各一右

○月經過期而不行者宜服歸身

半 芍 桂 各半熟地 白芍

香附 蘚朮 蒼各一 桃二十紅三分甘五通分右

○柴胡調經湯 治經水不止其色鮮紅項筋急腰痛杳弱

炙甘

歸身

葛各三

獨

藁升

各半

柴七

卷

蒼各一

紅少許右煎服取微汗立止

升陽舉經湯 治經水不止右尺脉按之空虛是氣血俱脫太

寒之証輕者數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之証陰火亦亡

見熱証於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之

外之此法乃升浮血氣補命門之下脫桂夏月不用白芍分紅

半細分

三參

熟地

芎各半

獨

附炮炙甘各七

卷

藁

分半

生地

風各半

木

歸

葛

紫各一

水桃少許右

膠艾湯

治勞傷氣血衝任虛損用

水過多淋澀不止

膠

芎各半

白芍各半

熟地

白芍各半

獨

附炮炙甘各七

卷

藁

分半

生地

升陽除濕湯

治月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆因

飲食勞倦或因心氣不足致

歸酒獨各半

蔓分風

甘炙

升藁各一

柴

葛

蒼各一

右煎空心溫服

小時以

升早飯

壓之可一下服而已

如灸足太陰

經血海三七壯亦已此

藥乃從權之法

為胃氣下陷而氣迫於下

以救其血之暴崩

也住後必服參

葛炙甘

歸之類數服以補之

當歸芍藥湯

治婦人經水漏下不止其色鮮紅時值炎月先

因勞役

脾腃虛弱氣短氣逆自汗身熱

榮分炎甘生地

香附一物九

治經候不調血氣刺痛腹脇脹頭眩惡心

香附各三

葛陳去熟地各五

蒼白木

白芍歸各半

右

十九淡醋湯下

艾附丸治証同前又崩漏帶下並宜治之

莎一斤

醋煮艾四

歸二右為末醋糊丸

林目數箇胎由氣不升降不固宜服此

○林四製醋附丸

莎一升分入廿四分醋酒鹽水童便每一分各浸七日白燒乾入

右為末醋糊丸如桐子大

每服七十丸空心酒下

瘦人加沵蘭赤苓各三

溫經湯

治血海虛寒月水不調

芍 芍 芍 牡桂

莪各半

參 膜各三甘炙一右

加味烏沈湯

治經水欲來臍腹疼痛

莎炒去毛烏宿

一方歸米醋延紅

沒各等分

右為末每服二至空心下

桂枝桃仁湯

治月候前先腹痛不可忍

枝 芍 生地

桃各等分右每服七錢姜棗煎服

八物湯

治經事欲行腹脹疗痛血澁也

四物湯加木 桂 延 練子

逍遙散

治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

歸炒白芩 白芍 木 柴

各一升炙半兩

右每服八錢生姜

三片薄荷少許煎服

更加知

地骨尤妙或加芩

渴加桔心煩加門

羚角研喉加烏梅

數五味

牛膝散

治婦人室女血閉不通平心煩熱

紅水膝飯尾

各一升

桃另研右為末

每服二錢溫酒調下

萬病丸

治月經癥瘕繞脅痛

乾漆碎炒一時膝一兩酒

焙乾右為末用生地黃汁入二味末銀石器內慢火熬丸如桐

子大每服三丸空心酒下

滋血湯

治血熱氣虛經候後滯不通肢脉麻木生瘡

鞭荆牡

赤芍

枳桂

白芍

烏梅

各二個去核

右分二貼煎服至半月或一月經行病除

○傳
通經丸

治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

桂青大酒浸低

椒莪姜川烏炮乾漆炒煙

歸桃去皮尖赴

右等分為末將四分之一以米醋熬為膏

和藥末杵丸如梧子大每服二十丸空心淡醋湯下漸加

至三四十丸溫酒亦可惟畏漆者入雞子清和藥

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲左右臨經先腰脅痛

生地五分

丁香四分白身風炭一名一柴二分

竭枝

桂

莪

白芍

熟地

烏藥湯

治婦人血海疼痛歸一甘木各五分

半

增味四物湯

治婦人血積血瘕歸芎白芍熟地

稜乾漆另研桂

莪莪白芍熟地

林琥珀丸

治婦人血瘕小腹腰背相引而痛

琥

白芍

甘名紅少許右

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節勿

得覺

脇下如冰冷白帶及白滑之物間有如屋漏水

熟地白芍各三分

丁香各四分膠六分生艾葉一兩

歸一

右芍地

丁香別為細末歸芍

艾各細功連煎共分

味入水五大盞煎至一盞半去粗入膠再煎空心熱服

治血崩不止

蒼甘草燒存性好酒調服立止或入四物湯

中亦可

老婦崩血久不止

諸藥不效橡斗蒼耳根二物燒存性用

四物湯加芷

茺花干姜煎湯調服効

林加味四物湯

治血崩

芎白洗酒生地

白芍膠蛤粉

艾葉各二分

一方用熟地加姜

一方 治崩中不正

棕櫚

絲瓜 各燒存性等分

右為末每服二錢

鹽酒或鹽湯食前調下

又 塩梅燒存性為末空心米飲下

五倍子散

治血崩帶下

艾葉

一兩

五倍子

二兩炒

烏梅

去核

芎右為末米湯下

伏龍肝散

治氣血勞傷衝任脉虛經血崩下或如豆汁或五

色相雜脇腹冷痛久不正虛煩

敬馬懷上伏龍

赤石

各一

熟地酒浸

艾葉

微炒一宿二兩

甘草桂枝各五

歸炮各七

芎

三門兩

半

右每服

七錢

棗三枚去核

前服

當歸地黃丸

治產後所下過多及崩中傷損虛弱少氣

芷續姜

歸膠各三附一兩

地炮

兩

右為末

煉蜜丸

如桐子大

每服四十九

空心溫酒下

白芷湯

以白芷煎湯調百草霜甚者棕灰後四物加乾姜

調理因寒用乾姜因熱用芩因勞參茲

二、帶下 附無子

帶下

林帶下風寒熱所傷入胞門或中經脈流轉藏府而發

○傳帶下是濕熱白屬氣赤屬血

○陳加蒼朮為主氣虛入參

木血虛入芎

歸

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之

○陳加二术升柴仍用瓦龍子以燥其溫痰

肥人帶下多是濕痰瘦人少有此病有者是熱

當歸附子湯

治赤白帶下脣下冷痛歸身炒鹽分蝎梢

升各五

甘草六

柴七

附炮一

少許為姜炮

良各八

引用分

或酒麴糊丸亦可

升各五

水分

柴分附炮一

少許為姜炮

良各八

引用分

或酒麴糊丸亦可

延胡苦練湯 治脣下痛、陰冷太寒、白帶下、柏分延、練子

各二分 附炮桂 炙廿五分熟地一右

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂太寒証

柏為引知各五桂

五分附炮二右

如少食常飽腹中滿悶加白芍半分不思

飲食加五味二十个

如煩惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加

芪一冬參七分炙甘

升各半

益母丸

治赤白帶惡露時下不止又治久無孕常服驗

益母草

五月採根乾為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用熟酒加

童便化下兼氣者木香湯化下

苦練丸

治赤白帶下最妙練碎酒

茴炒歸各等分為末酒糊

丸如梧子大

每服五十丸空心溫酒送下

○林芍藥湯

治赤白帶下脇腹痛神妙

白芍二千克姜一

右為末

微炒黃色每服二錢空心臨卧米飲下半月效

天竺焰丸

治久冷赤白帶下腹痛面色痿四肢無力久無子息

芩

艾葉各八兩

莎歸各四兩

吳茱萸三兩

芍

白芍各二兩

右用醋五升沙鍋煮乾為末

醋糊丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

空心醋湯下日三服

當歸丸

治帶下不止腹痛四肢煩不食羸瘦

歸酒浸赤芍

白芍

蛎粉

熟地

膠粉續酒浸各一兩

地榆五克

右為末

糊丸如桐子大每服五十丸空心米湯下

如聖再治赤白帶下月經不來

柏凡

蛇床

右等分爲末

婦寶歸芎丸

治赤白帶下子宮虛冷

四物湯加芷

胡黃

柴蠅

燬各二兩沙半斤醋浸宿煮焙乾

右為末醋糊丸如桐子大每服

瘦性婦人子宮乾澀宜滋陰養血，四物加莎苓之類。

肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰，星半芎

酒風卷（一本有蒼朮或導痰湯之類）

墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳一婦有胎即墮其脉左大無力重取則濶乃血少也白木濃煎湯調黃

芩末至三四兩得保全而生

固胎飲熟地歸參白芍木芎陳甘桑寄生

少加連柏入糯米五七十粒煎服血虛不安者加膠珠

胎氣痛者加宿

安胎飲治氣不安或腹微痛或腰疼或飲食不羨宜服至

五六箇月常服數貼甚好

木朮各半甘縮蘇各三右作二服加半

姜二斤

安胎丸木條芩曲燃右等分為末每服五十丸清

米湯下

條芩

木乃安胎之聖藥俗以芩為寒而不用

殊不知胎孕宜清熱養益用細挺沈實者縮砂安胎以止

痛行氣但縮砂非八九箇月內不宜多用懷妊嗜酸物乃

肝藏止能養胎而虛也

一、恩阻

○恩阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用二陳

之類又以芩丸服

一曰肥人瘦人熱

半夏於芩湯治恩阻不食吐逆頭眩怠惰煩疼惡寒自汗

半湯泡水次透過心

生姜各一分

熟地陳桔參

全復花無嗽

不用

芩各半

甘草各半

右一方有蘇細各半

參橘散

治姪娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘紅 芩 各一錢

木朴

半錢右作一服加生姜三

斤竹茹一錢或加參一錢

○加味二陳湯

治受胎二十至箇月嘔吐擇食因中脫宿有痰

陳

白芩

各四分半

洗三升

水二升

甘草一升

右分二貼

加姜五分半

片烏梅二分

有妊雖忌半夏

然即用

姜制衣其毒服之利

痰逐飲心見功效

胎動

○胎動者因火逼動胎遂上依喘急

用條芩

香附之類

○小膠艾湯

治姪婦因頓仆胎動不安或胎捨上逼心腹痛下

血

膠珠

艾葉

二兩

右

○膠艾湯

不問月數安胎

熟地

艾

飯

甘草

膠

各

右

○葱白

右

因跌損傷胎氣不安或子死腹中

芎一錢

為末每服一七連

進三服死胎即下

○聖散

治姪娠腹痛

胎動不安

或血下

鯉魚皮

歸芎

各

右

熟地

白芍

膠珠

續酒

甘草

各

右

每服四錢

姜三分

芩

半錢

右

○杜仲丸

妊娠

三月胎動

不安若下

血腹痛

蓋由子宮久虛

致令胎墜

宜服此以養胎

仲去皮姜科

續酒

各

右

○煮棗肉丸

如梧子大

每服三十五丸空心

米飲下

一方

芩

木

歸身

宿炒

各

右

煎服

加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏下或胎上刺心短氣姪婦氣血弱者宜服此免有損墮之患 參 茵 苓 芎 繼

熟地

側柏

膠 蛤粉 甘灸飯

右等分每貼七錢姜三片

漏下不止 加艾葉

一、胎動腹痛

胎動腹痛皆因飲食冷熱或因交合傷犯其側多嘔氣不調和變成漏胎則難安矣

當歸芍藥散 治姪娠腹痛疔痛心下急滿 归苓
木各一两 次各二两 白芍四两右煎服為末酒調服亦可
如胎動口噤唇青下痢加減安胎飲加熟艾酒煎
火龍散 治姪娠心氣痛 艾五两半茴炒練肉炒各
右煎服

通氣散 治姪娠腰痛不能忍 補骨丸上方為末嚼胡桃仁一个空心溫酒調下二錢

○當歸地黃湯 治胎痛

歸一两熟地二两

姪娠偶有所傷腹痛不安或從高墜姪胎痛及下血者宿砂和皮略炒勿令十分焦黑去皮為末熱酒調服或米飲或艾湯鹽湯皆可如覺胎中熱其胎即安此方即驗凡常服安胎易產

姪娠二三箇月忽心腹疼痛不安用 归三膠炒甘灸各一兩葱白一撮許酒調服立愈

治姪娠心腹大痛氣欲絕

芎

歸苓

朴各一两

一、胎漏

○傳胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱 四物加膠 木

條芩 宿炒莎 炒糯米 煎服

治胎漏下血 术一 剥芩 五縮炒膠珠各右為末每服二錢

煎艾湯調服水煎亦可

又方 枳炒芩各半 木一水煎食前溫服

治姪娠下血不止 胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死 膜炒艾一
兩如拳自砂蜜分右用永二升至一升入慾出更煎一二

沸 大麥茶 分二服

治姪娠下血如月信來若胞乾非時損字亦能損姪熟地

姜炮各右為末每服三錢一日夜三四服

加味四物湯

治姪娠下血不止

本方加艾葉片

膠珠一

烏梅肉

調水煎熟服

桑寄生散

治姪娠下血不止 胎動不安 桑寄歸酒

續酒芩

莎 膠 神

术各一

參 甘各半

右作一服加

膠珠一

生姜三片

桔梗根湯

治胎無故下血腹痛或下黃汁如漆或如豆汁

野芩根四兩金銀五兩

右分二貼酒水各一盞煎服

黃芩湯

治胎漏不安 芩 术

歸酒縮

各等分煎服

治胎動漏血產門痛 黃連為末每服一錢溫酒空心下

桑寄生

治漏胎下血不止 胎乾子母俱死 生地黃汁一

酒五分

煎分三服如無生者用乾者為末酒調二三錢食前服

保氣散

治頓作傷胎漏血安胎寬氣進食瘦胎

腹 甘 蘇 緩

枳炒桔 莎炒右等分煎服

○傳胎腫謂有胎或手足或頭面遍身浮腫者是也屬濕多或用梔子丁合炒為末米湯調下丸服亦可

○治姪辰腰脚腫痛

白芩 术 姜

甘

炙各杏

三水去皮尖研

右水煎

木通散 治姪娠身躰浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫
通 薏 粟 蘇葉各一升 枳 桔 條芩 各半升 木 詞子皮
各三分 右作一服加生姜三片

全生白术散 治姪娠面白虛浮肢躰腫脹

木

二

生姜皮

腹

陳

芩

各半

右

為

末

每服二錢

米飲

調下

丁方

用芩皮

鯉魚湯

治姪娠脹滿或遍身浮腫小便不利

歸

白芍

各

白芩

一升

木

二

橘紅

半

鯉魚

一尾

不

斯

右

作

一

服

將

鯉魚去

鱗腸

白水煮熟去

魚肉

汁

一盞半

生姜

七片

煎至一盞半

服如水未盡再

合

劑

服之

澤瀉散

治姪娠氣壅身躰腹脹浮腫喘急小便滯謂之

子滿

沵

桑

枳

換

通

赤芩

各等

右

每服四錢

姜五片

○林防已湯

治姪娠脾胃虛遍身浮腫心腹脹滿喘促尿不利

已

二分

桑

赤芩

蘇

各三

升

木

九

分

右

分

二貼

加姜

三片

姪娠止兩脚浮腫名曰皺脚遍身腫滿心胸氣脹名曰胎水

鯉魚湯

皆治之

平胃散

治皺脚

加姜

東

蘇

各

等

煎服

赤小豆湯

治手脚腫

小豆

商陸

各等

煎服

忌食鹽

八正散

治姪娠心氣雍

手足浮腫

車

瞿

蓄

滑

各等

煎服

甘 梶 通 大 麴 裏 煙 入 苗 一 摄

一△子煩

○傳子煩謂姪娘苦煩悶不安門芩風知各一右水煎入竹瀝一二匙服一方去知加芩

犀角散 治子煩犀地骨條芩門赤芩各一甘半右水煎入竹瀝一合溫服

當歸飲

治子煩

甘半

芎膠

桑寄

各半

葱七莖 右

○林麥門冬湯 治子煩門風白芩各四參二右

加姜半葉

知母飲 治姪婦心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤芩芩甘

各二半知門甘炙各一分桑半

右入竹瀝一方去芩加

地骨犀

葛各半

芎芍門飯木各二半糯米半炙甘右煎服

一△子淋

○林姪娘酒色過度或飲食積熱致水道閉澁名曰子淋

安榮散門

通草滑各一飯酒浸火心

甘炙細洗參各五

右為末每服二三錢麥門冬湯煎湯調空心服

檳榔散

姪娘淋澁小便不通作轉脬治不効此方屢効

枳

赤芍等右煎服

一應男女血淋水道澁痛皆効

○傳地膚子湯

治子淋小便澁數

膚車

各一分知炒芩枳

赤芩

白芍各七升

甘

通草各三右

又方

地膚草四升

以水四升煮取二升分三服或新取地膚草

分

發搐不省人事名曰子癇

羚羊角散

治姪娠中風子癇

羚

鑄

獨

酸炒

五加

各半
薏

風

白
酒
浸
芎

神

杏

各一
分

木香

甘

各七
分

右分

二貼入

姜三片

獨活防風湯

治姪娠角弓反張口噤謂之風癇又曰子癇

麻

去
節

風

獨

各六
分

桂

羚
鎊

升

甘草
酸
炒

芍

各八
分

分

歸

杏

各六
分

右每服七錢姜四片竹瀝丁合水煎

防風葛根湯

治姪娠中風腰背強直時反張

風

葛

芎

生地

各二
分

杏

麻

去
節

各一
分

桂

獨

己

甘草

各半
分

桂

甘草

各半
分

○葛根湯

治姪娠臨月發風瘡暈悶不省人事吐逆醒

後復發

謂之子癇

貝

葛

牡

己

○桂枝湯

治姪娠臨月發風瘡暈悶不省人事吐逆醒

後復發

謂之子癇

貝

葛

牡

己

○防已湯

治姪娠中風口噤四肢強直角弓反張

防

己

酒

葛

牡

己

○天門冬飲

治姪娠中風口噤四肢強直角弓反張

天門

冬

葛

牡

己

酒

○右水煎

治姪娠感風寒咳嗽不已謂之子嗽

右

水

煎

己

水

煎

○夏合散

治姪娠咳嗽心煩不欲飲食

夏

合

散

己

水

煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

○桔

桑各一
半
右水煎

桔

桑

各一
半
右水煎

桔

桑

○林百合散

治風寒咳嗽癥多心胸滿悶

百合薰花貝

白芍

前赤芩

桔炒各半炙一右入姜

一方

麥門

苑各

桑炙杏

去皮甘炙各半

桔炒三茹塊

一、傷寒

○傳芎蘇散

治姪娠感風寒壯熱頭目眩暈

蘇芎

白芍木

門陳葛

各六分

右入姜五片葱三寸

升麻六物湯

治姪六七箇月傷寒壯熱或發赤斑變異濁

血外二施杏

大青草少草

甘各一右加葱三寸

姪娠傷寒百節痛壯熱不急治落胎柴葛知膏

各六分大青升各八施

大青草少草

甘各一右加葱三寸

傷寒安胎木芩

等分生姜炒令香

右每服三錢加姜三片水煎

荷葉焙乾一兩

右為末每服二錢蜜少許水調服

○林草胎散治姪妊娠太熱闊舌煩渴恐傷胎蛤粉五嫩捲

右作二服加生姜三片葱白三莖

等分生姜兩右煎連服取汗愈

姪娠寒熱小柴胡去半夏最効

一方搗家園生葛汁服

熱病護胎方乾浮萍朴硝研尖炒蛤粉炒藍根

右等分

為末水調三錢貼脐上安胎解煩極効

一方伏龍肝末水調塗脐下乾則換用井中泥塗心下又可

一、赤白痢并泄瀉

○當歸芍藥湯

治姪娠下痢赤白腹痛

白芍一枚

連木

桃仁各三分

右

白芩木絲芩各半分

甘連木

桃仁各三分

右

澤

如白痢腹痛甚者恐有寒去芩連加乾姜三分分

芎木香連丸

治証同前

膠珠木

縮炒芎

各五乳

木各二枳

姜炮各連一兩茱萸同炒右為茱醋糊丸

如梧子大每

服三十丸白湯下

治姪娠泄瀉兩腋虛鳴脇下冷痛由食生冷及當風取涼

証子煨木各一

陳良炒木

白芍酒炙甘

各半錢

麴裏煨

右加生姜五斤

傳一兒在腹中叫哭脣帶上疙瘩乃兒口中含署因姪婦登高取物脫兒口以此作聲念姪婦曲腰向地拾物使兒復得含入口中即止用多年空屋下鼠穴中土一塊念姪婦含之即止

又方用黃連三十五錢濃煎汁時呷下自止

○胎肥身居言昌貴口厭甘肥聚樂不常食物無度日飽便卧致令胞胎肥厚根蒂堅牢行動氣急蓋緣不曾預服瘦胎之藥致於臨產必難產八月可服無憂散無憂散歸酒浸芎芍木甘各一枳炒乳另研各

血餘頭髮灰一兩半右為末每服三錢水煎服

滑胎易產救生散

安胎益氣易產

金子緊小金母無病

參証子炮木炒麥蘖炒曲炒陳炒等

右為末每服二錢

煎服

枳殼散

瘦胎易產抑氣

枳麸炒粉草炙二兩

湯調食前服

孕七月便宜服

大便闊濶加防風身弱加白朮

軟膀方

甘炙生姜

烏梅等分每服五錢水煎食前服

便驗腰膀軟易為養生

○傳丹溪東胎丸

七八箇月內服之

芩炒夏二兩秋八兩

木二兩

芩七條陳三兩不見火

右為末粥丸如梧子大每服三四十九煮湯下

丹溪達生散孕八九箇月內服十數貼易產腹少痛

腹原本三糸恐太多今用一糸先酒參陳蘇連葉草各半冬木

洗酒乾再用葛豆汁洗方可用

白芍歸各一升炙二右作一服外入黃楊腦七箇食少胎

頭葱五莖夏加芩連五味春加甘風秋加沵

冬加縮氣上逼心加蘇地性急加柴多怒加參

食少加門芩能食加黃楊腦此物能癒有痰加半芩

丹溪臨月用以養胎方飯芎芩陳木莎各一

芷半升分右水煎調益元散一錢服虛者加參七

仲景當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服歸芎

局方枳殼散姪娠八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑

船易產枳殼五升一炒一兩半炒一兩右為末每服二錢空

心沸湯點服一方加糯米炒如姪婦稍弱者單衣胎寒腹

痛者胎弱多驚者加歸一升半

一方大黑豆二合以酒煮熟去皮空心頓服

○傳姪娠腰痛如折不能轉側鹿角右火燒令赤酒淬再燒

再淬以碎為度細末酒調服

通氣散治姪娠腰痛不可忍

補骨香為末嚼胡桃仁

一箇空心溫酒調下一錢

青娥不老丸 治腎氣虛弱風冷乘之腰痛

胡桃仁去皮二枚 蒜研膏破故酒浸炒仲去皮姜汁浸炒一斤右為末

蒜膏丸如梧子大每服五十丸空心醋湯下

半產

○林藏府虛弱或氣血衰敗或先因婚嫁失時或醉酒飽食觸熱冒寒疲極勞傷月數未周便墮胎

芎芍補中湯 養新血去瘀血神虛扶危 膠蛤粉炒

姜炒芎 五味各一錢

二分

芪蜜水

白飯酒

木

參

仲

炒去甘

炙各六分

右

奪命丸 治小產下血子死憎寒手指唇口爪甲青黑面

色黃黑或胎上搶心悶欲死冷汗出或食毒物傷動胎氣下血胎未貞服之可安已死服之可下

○傳安榮湯 治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎元

四物加膠珠 莎木縮條芩糯米桑寄

一

治小產後心腹疼痛

歸芎

熟地

白芍

酒炒各

延年

分

七

桃紅各三錢

莎

青炒

黑澤蘭

牡

各半

右水一盞半童便

酒各半盞煎至一盞溫服

治小產後下血不正 茂歸木白芍芎艾葉

甘炙膠炒青莎縮

右等分

煎服

安胎散 治胎腹痛胎熱多發馬腰痛腹滿胞急卒有血下或因頓仆或食毒物或感冒時致胎傷枳芎各

熟地糯米一兩右作二服生姜三片木棗丁枚更加金銀三

熟地糯米一兩右作二服生姜三片木棗丁枚更加金銀三

五錢同煎

附錄五

○林孕而服毒藥攻胎牙關緊急強直自汗身微熱與中風相似宜服白扁豆一味為末新水汲調灌之清米飲亦可

一胎死

○林母因患熱病府藏極熱薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷不能自出醫家以黑神散治之恐本方內有姜附桂之太熱豈肯熱病之人宜以草麻子朴硝散清陰丹

佛手散之劑主對

下死胎草麻子搗碎敷脚心即下如子腸隨下急去脚心却敷頸心即收

朴硝散

食之即下

服之

一方

推腹

影

七枚水

升去

粗取

十個

水

升去

粗取

十個

水

升去

粗取

十個

水

○婦損胎不特病薰所致或因預作或驚恐因或入胃觸壞胎最多其候舌青知子死

一方

治熱病胎死

是即黑神散也

桂

歸

生地

姜各一

黑豆

炒去皮

附炮

去

二右

為末

空心酒

分

分

分

分

分

甘

生地

姜各一

黑豆

炒去皮

附炮

去

二右

為末

空心酒

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

一方

下熱病胎死

紅

一味酒水

煎飲

二三盞

傳催生散

治熱病胎死

身冷

唇青

不能自出

荳蔻

半橘紅

三分

芷

桂

甘

炙各一

飯酒

姜炮朴

芍

半

枳

炒各二

木

杏

炒各

一分

右作

二服

姜三片

棗一枚

芎歸湯

一名佛手散

研

治妊娠

因事

跌仆

子死

腹中惡露

妄下疼痛不已口噤欲絕用此藥押之若子死腹中立便下若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生胞衣墮下及產後危急並皆治之歸酒洗一兩芎七錢右作四服用水一盞煎水將乾投酒一盞半煎五七沸溫服如口噤灌之約入行五里許再灌盡四服督

治橫逆不順子死腹中伏龍肝為末溫酒調下二十錢其兒頭戴坐而出甚驗

治產難數日子死腹中不出母氣欲絕瞿六通草三桂三錢四兩榆白四兩丁方無榆白有天花粉四兩能墮胎

右水九升煎取二升去粗分三服頓飲即下治孕死腹中不出用黃牡牛屎塗母腹上立出

立下

一難產

○傳多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有因八九箇月內不能謹慾者

又曰臨事倉惶用力失宜遂有難產之危

催生散 白芷炒百草霜 白滑石各等分爲末芎歸湯調下

二三錢

○林神應散 治難產及橫逆皆因坐草太早努力過多兒轉未達或以破水先下其血必乾若先露手謂之橫或先露足謂之逆此藥再固其血服之如魚得水

白芷 百草霜右等分爲末童便米醋各半盞調藥二三錢沸湯泡溫服分二次服畢又用蜀葵子四十九

粒滑石末三錢順流水煎湯調服約入行五里即生

加味芎歸湯 治產難三十五日垂死

芎歸各一兩

乾龜殼一小婦人髮丁搘燒右為末每服三錢水一盞煎七分服約行五里生胎死胎皆可下

○傳催生鉛丹

治橫生逆產黑鉛一兩以小鍊子火上鎔化投入水銀二錢急攬結成砂子傾出用熟絹紐作丸子如菉豆大鹽裹以朱白水送下立產

如神丹 治難產

巴豆草麻

去壳研入麝香許捏作

餅子貼臍須臾子母便分張

無憂散

治難產及胞衣不下臨月預服之則子易生

歸酒洗芎

白芍各七

木

甘草各五

枳殼

麸乳各一

血餘灰

四分

來甦散

治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事

木

麥曲燃

陳皮

白芍各半

分

茱萸炒

生姜切碎

膠珠炒黑

半

米糯半

合芋根

一升分

右爲末分煎水一盞

灌下未醒

再服

灸法 治難產及胞衣不下急於產母右脚小指尖頭上

灸三壯炷如小麥大立產

又灸至陰二穴在足小指外側去爪甲如韭葉灸三壯

又灸太衝二穴在足太指本節後二寸骨罅間灸三壯肝

經俞也

○婦胞將水先破下多胎乾先與四物湯養血氣次濃煎葛

湯放冷洗產戶令氣上升通暢仍滑石末蜜調塗產

戶裏次服催生藥乳香末蜜丸溫湯下佳

○傳若未足先露者用細鍼刺兒手足心一寸分深三四刺之以鹽塗其上輕輕送入兒得痛敬驚轉下縮即順生或兒脚先下急以鹽塗兒腳底又可急擦之併以鹽摩母腹上則正生

休令易產以椿杵頭細糠燒末服方寸匕

又龜甲燒朱酒服方寸匕又方用沙魚甲

又羚羊角一刮尖為末酒調服方寸匕

又赤小豆生吞七枚即生

治橫倒梁上塵酒服方寸匕

治難產及胞衣不下身重熱寒面黑舌青及舌上冷子母俱

治死面赤舌青子死面青舌赤口沫出者子母俱死子活唇口俱青吐沫子母俱死婦曰舌下脉青黑而反

乘熱飲便下

○治倒產子死腹中艾葉半升酒四升煮取三升服

○難產惡証身重熱寒面黑舌青及舌上冷子母俱死面赤舌青子死面青舌赤口沫出者子母俱死子活唇口俱青吐沫子母俱死婦曰舌下脉青黑而反

卷水冷者子母俱死

○婦一胎衣不下母生子訖流血入衣中為血脹故不下但服

奪命丹

附炮

半

壯

两

干漆

二

水半

炒烟尽右為末

釀醋

升

熬末

共

黃末一兩成膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒吞下

衣爛下 林倉卒無此藥宜朴硝散 方見胎死

一方 紅花一兩酒煮濃汁服之

一方 皇角棘燒末每服一錢溫酒調下

○傳治胞衣不下 膝二隻一灸通三清四灸右水煎連進三四服立下

○林如聖膏 治胎衣不下又下死胎 草麻仁兩研成膏塗母右足心纏下即洗去

○治胞衣不出 婦人視覆井口立下本婦人者佳 又燒鐵杵令赤投酒飲之 又牛膝八葵子一兩水九升煎取三升分三服

一方 治血道閉溢胎衣不下 黑豆丁合炒熱入醋丁盞煎

五次 丁方 米 麥 赤小豆同煮濃汁服立出

○治產後惡血沖心胎衣不下腹中血塊 錦文太黃為末米

三十五沸去粗分十二次服乃取桂枝丸火熱敷小腹上一下三

醋熬成膏丸如彈子大每服一丸湯化開服溫童便調

金丹 沙鍋內慢火熬至一升入百草霜末

更少 一方酸米醋外沙鍋內慢火熬至一升入百草霜末

丁兩太黃末二兩熬成膏丸如彈子大每服一丸溫童便

化開服 治胎衣不下惡露不行腹中血塊

名黑神丸可代蛇退全者方蟬退四十個

○傳三退飲 治胞衣不下 蛇退全者方蟬退四十個

右甕瓶盛燒存性細研順流水調服立下

△婦人科 下 產後

○傳丹溪曰產前當清熱養益為主產後宜大補氣血為要

雖有難証未治之此萬世不易之論也

新產不可用芳藥以其酸寒能伐發生之氣十月之久

茲易芍，如腹痛者，非芍藥不可。雖新產亦用，但以酒炒
不妨。

產後之諸疾或乍寒乍熱似瘧，或太熱頭疼，或太熱頭疼，或
卒中口噤如痙，如癇，或角弓反張，或妄言見鬼，心神惶惑，或
耳目口鼻忽覺黑氣，如烟薰之狀，或腹中作痛，綿綿不
絕。已上諸証，若非惡露不盡，即是勞傷，血氣太虛之証。

產後補虛用參术 茂陳 歸身尾 苓 炙甘
如發熱輕則加茯苓，淡滲之其熱自除。重則加乾姜。
或云太熱用乾姜何也？曰：此熱非有餘之邪熱，乃陰虛生內
熱耳。蓋乾姜能入肺，分利肺氣，又能入肝，分引衆藥，生血。
然必與補陰藥同用，此造化之妙。

○林婦隨氣血加減，安神丸亦可服。以麥門冬湯下。
○血暈者，因產時下血過多，血氣虛極，致暈悶甚，則昏不知人。
知人氣息欲絕，若作暗風治之，誠為謬。

○其因有二，一有用心使力過多而暈者，二有下血多而暈
者，三有下血少而暈者。

生子了燒硬炭，或紅中黃石令通赤，置器於床前，以醋沃之，
得醋氣，除血暈，產後一兩時時作妙。一萬者謂，
一法燒乾漆，冷烟濃薰母面。

一方 治產後血暈危困，歸丁分赤芍二分，生地汁一

右水煎數沸，溫服。如煩熱去，吸入童便妙。

清魂散 治產後氣虛不安，血隨氣上迷，亂心神，故眼

前生花甚不^ス知入^{シテ}口噤氣冷

澤蘭葉

參^{イハラ}谷^{タケ}分^ス

菊^一
兩^二

芎^一
兩^二右細末溫酒熱湯調灌即醒

傳下一方有甘

草每服一錢溫酒入童便調下

○傳產後血暈用韭菜細切盛於有嘴瓶中以淡醋浸之急封瓶口以瓶嘴納立產婦鼻中即甦

○又方用鹿角一段燒存性出火毒為末酒調灌下即甦

○林一方紅花一兩為末分二貼酒二盞煎一盞溫服

○芎藶湯治產後去盃過多及傷胎去盃多昏暈

歸身 芎 右等分每服五錢水二盞煎八分服

一方 治產後血暈冲心悶絕五靈脂米半為末作

服酒調下口噤者灌之湯調亦可 下方加荆穗燒末

醋調灌下立活

牡丹皮散

治產後血隨熱上充心氏自血軍悶絕

牡 大蒸芒 各二冬瓜子 桃去皮尖右分二貼水盞半

煎至一盞入苦再煎工下沸去粗服口噤灌之

奇効方 治產後血上忘已死真欒金燒存性為末溫米

醋調灌下立活

蒲黃散

治產後惡露不快血上搶心煩悶昏迷或狂言

乾荷葉 炙牡 生地 甘

各二水半

蒲 杯生六右水煎入

蜜少許

凡產婦皆血敗血上冲者牡丹散 蒲黃散

奇効方 五靈脂 紅花為主對若血虛者

清魂湯

芎藶湯為主對其餘韭菜薰洗等及返魂丹可通

用也

一、產後惡露不盡腹痛。

○婦雖惡露方盡或感邪或喜怒慟然而止餘血停滯故

腹痛

一方 治惡露不盡腹痛。往來胸滿少氣。澤蘭熬

生乾地

歸各三芍

生姜各十甘

六分

棗子十四

右水煎溫

服欲死塗身得瘥。

一方 治產後下血不盡腹內堅痛。不可忍。歸芍

桂各三桃百二十

右煎服未瘥加大黃三兩

一方 治產後惡物不盡腹內疼痛。生乾地

歸炒各

一方 生姜切如鰐頭大

瓦炒金蕉子

右細末姜酒調下

傳因積血而刺痛者宜桃紅

歸之類

惡血不去發寒熱成癥瘕者

四物加鳥藥

桂良陳

四物湯調香附五灵

涉桃紅五灵乾棗之類

立產後腹痛不息

四物加鳥藥

桂良乳

四物湯調香附五靈

童便和醋煎服甚効。

當歸養血丸

治產惡血不散發熱腹痛及經候不調

赤白帶下腹痛

歸赤芍各四

牡桂炒延炒各

右為末

煉蜜丸如梧子大每服三十丸或酒或米湯任下

定痛散 治產後惡血不盡腹中作痛

歸芍各二

桂木右作三服酒水合一盞半姜五片煎服

黑神散 治惡露不盡血氣攻心腹痛及血暈等証

桂木半升熟地酒

浸桂洗

黑豆去皮熟地酒

浸桂

姜炮甘炙白芍

蒲各四

兩方無右為末，每服二錢，童便和酒調服。

○治產後血不盡，心中疼痛，荷葉熬香末煎水下，上方才止。

○治產後腹中絞痛，末桂溫酒方寸匕，日二服。

○傳治腹痛非芳藥不可，雖新立產亦可用，但酒炒。

○傳治腹痛者，立產安胎中宿有血塊，立產時其血破散，與婦產後惡寒發熱腹痛者當去惡血，若腹不滿者非惡血。

○名曰兒枕。

一方 治兒枕腹痛，延歸各一錢。

蒲炒各半分。

桂兩。

紅右為末，童便和酒調下。

○失禁散 治產後心腹絞痛，欲死及兒枕痛。

一方 桃仁肉四兩。

丹參桂枝。

芍藥二兩。

水煎。

桂兩。

○傳三聖散 治兒枕痛，歸桂延分，各等份。右為末，每服二錢。

热酒或童便調下。

四物一黃散 治產後腹中血塊作痛，歸炮芍炒。

赤芍右等分。

桂兩。

溫酒調下。

熟地白芍炒各半兩，蒲炒二右為末，每服二錢。

心溫酒調下。

調下。

四神散 治產後留血不消，作塊疼痛，下痢不止。

歸姜炮芍赤芍右等分。

桂兩。

溫酒調下。

○林治兒枕痛，伏龍肝為末，溫酒調一錢服。

妙。

○治產後消血塊，滑石沒二血竭二如無，右為末，醋丸如梧子大，每服三十九醋湯吞下。

目錄五

一、產後乍寒乍熱 附癰

○林因產勞傷血氣陰陽互相乘為乍寒乍熱亦有惡露下少留滯經絡亦令人寒熱心小腹急痛陰陽不和

增損四物湯 治血停留 奪命丹

增損四物湯

治產後陰陽不和乍寒乍熱

芎

歸

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱

參 姜炮甘炙自芍各等右煎服

奪命丹 在胎衣下如無奪命丹可用五積散和醋煎服

或黑神散

大調經散

治產後血虛惡露未消染衛不調陰陽相乘

增寒發熱或自汗腫滿皆血氣未平所致

大豆 炒去皮

神一魂一右為末每服三錢濃煎

紫蘇黑豆湯

空心調服

端急須同小便不可動亦可

知母湯 治產後乍寒乍熱遍身溫熱心胸煩悶

知四赤芍 芎 三分桂 六分芍

右煎服或四物湯加

柴芩亦可

小柴胡湯 加生地黃 治產後惡露方乍忽然斷絕寒熱往來晝夜暮劇狂言此乃熱入血室

傳增損四物湯 治產後陰虛發熱或日間明了暮發寒熱

歸 芎 生地 柴各等右水煎

當歸散 治產後氣血俱虛恐增寒熱宜服此以去惡露

歸白芍 芎 芎 各一右為末每服二錢童便入溫酒調下

○草果飲子 治產後瘧寒熱相半或多熟者

半 赤苓 荸皮煨去甘炙陳 芎 苎 各一分

良青

各六葛四分右分二貼水二盞姜五片棗二枚煎至八分當

發日早連進三服無不効者

○婦治產後瘧疾熱多寒少清脾湯 養胃湯佳也

一△產後蓐勞

○婦產理不順疲極筋力憊勞心慮令虛羸客忤食不消邪
感肺咳嗽口乾痰逆喘乏頭昏節痛腹中絞痛刺榮衛
受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊腿脰重着床名蓐勞
傳產後發熱自汗肢脉疼痛日久不愈名蓐勞可用

當歸羊肉湯 归身 參各七 茯苓一 生姜半右用羊肉一
竹煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮取四盞分六服徐徐
飲之

人參當歸散 治產後盞過多陰虛生內熱心煩短氣自汗

頭痛熟地

參

歸身

桂

白芍

白芩

木

各一

續

茯

○婦治蓐勞熟地 參 归身 白芍 白芩 木 各一 繼 茯

桂

五味

歸門

芎

各三

右入生姜

水煎

一方 治產後羸瘦煩熱自汗欲變蓐勞寒熱羸瘦用之

白芍

歸

地骨

參

各半

沒

桂

各二

牡

右水煎

一方 治血虛勞倦盜汗多困少力咳痰 归 茯 莩 各

兩

柴

前各一

右入桃柳枝

三寸

大棗

烏梅各一枚

生姜三

片水煎

若有痰不用烏梅

一方 治產後虛乏不食四肢倦怠心腹痛補虛治氣

參

芍

桂

甘

姜

各一

歸

一兩

生地

二右入大棗前服

○林三分散 治產後日久虛勞針灸俱不効 莩 归 茯

熟地

木

芩

芪

各一分

柴

參各二

芩

半

甘

多各

七分半

右分二貼水二盞姜三片棗一枚煎八分服

犀角飲子

治產後血津滾虛損自汗發熱困倦口乾

犀門

木各八分柴六分枳地骨生地甘炙歸參

芩

芩各一分半右分二貼水二盞姜三片浮麥七十粒

同煎八分溫服

人參散

黑甲散治蓐燃勞由產內味滿百日或動作勞傷成蓐

勞其狀虛羸衣起

卧飲食不消時咳頭目昏痛發渴無

常盜汗寒熱如瘧

背膊拘急服之立効參桂桑寄

歸白芩

白芍桃熟地門甘炙各續二分腰七

半分

鱉炙各一右為末猪腎對去脂膜水二丁木盞生姜

一片棗三枚去核煮下盞去粗入藥末二錢葱三寸烏梅半

八珍散

治崩水不調腸腹病痛全不思食藏府怯弱泄濁小

腹堅痛

時寒熱四君四物合為一劑各等右姜棗煎服

一方

產後補虛參术芩甘各一分

二方

陳右分二貼水二盞姜三斤煎八分溫服

林一

產後瀉痢腹痛者未滿月飲冷當風邪毒留分肉

之間布腸胃之內致腹痛洞泄又有食肉太早強食過多停

積不化腹痛而成泄痢者

調中湯

傳治產後瀉痢腹痛大脉沉細無參加姜五分

良炒歸浸桂

林產後因飲冷當風腹痛腸鳴泄痢者用之

胃風湯

治產後當風致瀉泄腹痛者參芩各

歸桂

木白芍各等右入粟米一小撮

治中湯

加砂仁治因停食而腹痛泄痢者

○傳產後漏痢用陳木芩芍芍酒滑芩大黃

煎服立効一丁方有干姜

○林一產後面目四肢浮腫皆因敗血乘虛停積於五臟循經流入四肢日深腐爛如水令浮腫醫者不審作水治之未枉者多但服調經散血行腫消

調經散沒

瑰各一桂

赤芍

歸酒

浸各

麝

半細

甘

水

炙二右為末每服半錢姜汁溫酒各少許調勻穴心服

大調經散

治產後惡露不消敗濁成腫滿方在下寒

加味四物湯

治產後浮腫氣急腹大喉鳴一本方加生

木 荆 桑 小豆 腹 杏 半 馬兜入葱姜苛

脚腫又加苓皮 生姜皮 陳桑

錢水煎溫服

○傳正脾散 治產後通身浮腫及治婦人太病後脾氣虛弱

腹脹 炙炮香附米童便茴

甘炙陳右等分為末每服二

錢灯草木通湯調下

丹溪活套云產後通身浮腫

四物

加乳

沒

桂

通

腹 良 桔 血竭

○林

一產後腹脹滿悶嘔吐者因惡露下少敗血散脾胃受之為脹滿胃受之為嘔逆宜用抵聖湯亦有惡露過

多氣無所主聚脾胃而脹滿嘔逆者抵聖湯去澤蘭

芍倍陳姜

抵聖湯赤芍半澤蘭葉

陳參各一

甘

水

生

姜

切片焙右每服七錢水二十盞煎八分食遠溫服

乾二

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

水

火

土

金

</

桔梗半夏湯 調和陰陽，治腹脹吐逆

桔 半 陳 各

各五

冬丁方加枳右分二貼水二十盞姜三片煎八分服

一方 治產後嘔逆不正

陳三冬甘煖冬藿八分半右分二

貼水二十盞姜五片煎八分服

○傳拒勝湯 治產後腹脹滿悶嘔吐

赤芍 半 澤蘭葉

參 陳去白各一兩甘煖三分一右加姜三片

八味理中丸

治新產血氣俱傷體弱多汗一百日內常

服壯氣補虛止嘔吐

參 姜炮縮 白芍 麥蘖麪

炒麵 炒各一兩

甘煖一兩半木二兩右為末米糊丸如梧子大每服三十

丸姜湯下有痰者加半夏

婦乳汁不行有二種

漏芦 士瓜根佳也 血少氣弱乳汁絶少者 猪蹄

鯉魚 鍾乳佳也

年少初產乳雖脹汁不行有風熱服清利藥則乳行累

產而無乳亡津液故也服滋溢之藥以動之

雖有乳不多者服通經之藥以動之以美臚引之

婦人素衝任之經有痰乳汁少而其色黃生子怯弱多疾也

產前乳汁自出多者生子多不育

乳子忽睡乳不時泄結痛亦有不痒不痛腫硬如石目微

微不急治則癰腫急與括樓散以手擦之則散

括樓散 乳香一分研 括樓根末兩右酒調下

兒不飲乳脹結捏其汁不盡皆蓄留輕為吹微妬乳重

為癰一方 治吹微作癰

葵莖及子右末酒服方寸匕

○治乳汁不通
通草 分瞿 柴 天花粉 各一
桔 青 芍各二
芷

通志

七
瞿
此

柴天花粉

桔
二
青

卷之三

木通 赤芍 納 甘各半 右為一貼水煎食後細細飲之
更摩乳房タラス 或無子タケス 食乳者要消乳ヨクス 麥芽二兩炒作
四服白湯調下トス

漏蘆湯 治婦人肥盛氣滯壅滯乳汁不通或留結欲
成膿。漏蘆二兩，蛇退半錢，土瓜根十根，切片炒焦，
元林無火按半錢當作半錢，其實條半錢有括樓實十個。
如當歸枝色黃藤蔓葉圓無缺者是本。右為末，每服二錢酒調。

下仍吃熱羹湯耳之
鍾乳散 治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少
方名 鍾乳粉
細末

每服一錢濃煎，漏芦湯調下。

母猪蹄湯 治乳汁不通
母猪蹄 一隻 通草四錢 用水一斗半煎取四五升飲之。未下更入

○林玉露散 治產後乳脈不行，身熱頭目昏痛，大便癥滯。
作二斗料服之。

參白芩甘桔葛芷歸芍分半
水煎

奇効方 麥門
去心，焙末 酒磨犀角約一錢右門冬末二錢用犀

角酒服

一方下乳汁一
糰米

釀乳方

各一条右分二貼水煎半飢時服

消毒犀角飲 治產後吹乳 荆穗セイブ 水風スイフウ 甘草カンゾウ 鼬糞スミヨウ
子ネコ 八右水煎ハシマツシヤン 食後頻服ヒヤウル 以掌擦之モミ 乃用タテマツ 茉莉膏マリヤク 喜參キサン 搗爛井タラソウ

水調稀塗之，加蜜少許，調丸妙。

鍼法 乳癰腫痛，諸藥不能止痛。鍼足三里，入五分痛止。

○婦乳癰，足陽明經滯不通，血氣不散，結聚成癰。四十歲以下治，之愈五十歲以上，難差。又妊娠乳癰無害。

連翹湯 治產後乳汁內結而腫硬疼痛。翹升芷

各十克，參芍白欵巴射干各八克，大黃三分，甘六分，杏小製右剉水煎下，芒硝服之。

○產後乍見鬼神。

○林因產走耗其血敗血，奔冲滯於心，所以乍見鬼神。言語顛

倒非風邪，但服調散。方在面白四口，加生龍膽一捻，煎服得

睡，安。又有因血虛，心氣不足，驚悸恐怖者，宜用蘇合香丸溫服，量便，調服。或良妙。

煎湯調服。又有熱入血室，而顛狂者，上小柴胡，加生地、

傳琥珀散 治產後瘀血攻心，迷悶妄言，見鬼。琥珀

鐵粉各一克，參神生地膠珠各七克，砂石斛半錢，麝香各

右為末，每服一錢，用金銀前湯調下。

交感地黃煎丸 治產後舌強不語，眼見黑花，或發狂，見鬼，及胞衣不下，心腹脹滿等証。生地者，新掘者佳，生姜各二錢，

細以布瀝去汁，留歸。延炒琥珀各一克，蒲炒四錢，右為末，煉蜜丸

如彈子大，每服一丸，煎當歸湯化下。

林炒地黃，粗以地黃汁炒，生姜粗各至乾，搗為末，為度。

柏子仁散 治產後譖妄，背心血虧，心神不寧所致。

柏子遠參，桑寄風，琥珀，熟地，甘草。

右等分細切，每服五錢，先用白羊心一枚，煮汁二盞，煎藥。

至二盞去羊心及粗溫服

茯苓散 治產後心虛怔忡言語錯亂

參甘山

歸各一遠苓桂門各半右作二服加生姜三片木棗一枚水二盞半煎至二盞去粗溫服

婦一方 治產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉三分延分地黃汁二升細切水二升煮沸下延胡空心三

服忌肉一日

△產後中風附產

○林產後風邪乘虛而入或身軀緩急或不仁或口目不正或

忽悶亂乃中風候宜小續命

又有產後五七日強力下

床或月裏房室或懷憂發怒動擾冲和得病之初眼口噤

口噤肌肉攣縮致腰背筋骨僵直者不可治此乃非

婦邪乘虛入諸陽經則腰背反折如角弓

血虛肉理不密故多汗風搏之則變痉口噤背強搖頭身反

折灌小續命稍緩若汗出手拭不及者不治

○據產後中風小續命最為要藥但手足搐搦者當去附子

舉鄉古方散 治產後中風口噤手足瘛瘲荆芥穗等

每服二錢豆淋酒調服

婦童便亦可口噤者灌之口噤甚咬鼻中

一方 治產後中風不省人事口涎搐搦歸荆穗等

右每服五錢水酒各一盞煎七分溫服如牙關緊急幹

開灌之

大豆子湯 治產後中風如角弓反張口噤涎潮

黑豆半斤炒焦黑候烟起以無灰酒二升沃之入磁器中

每用此酒一盞入獨活五錢同煎至六七分去滓溫服

○婦治產後中風四肢攣痛背頸強急 風一芍桂各

水羚羊角屑芎卷歸酸棗仁半苦杏子炒各三分

右水煎溫服

○篡產後中風口眼喎斜等証不可作風治必大補氣血然後治痰

○傳產後中風口眼喎斜 八物加附荆少加風羌前服

○林一產後不語者敗血停蓄上干心心氣閉塞則舌強不語宜服 八珍散參菖生地酒蒸芎各一

朱砂

風各五

細各半

甘

炙半

右為末

每服三錢薄荷湯調

服地黃

戀膈脾胃不快者

以當歸代之

尤妙

○滯闊筋脉引急是以遍身疼痛甚則腰背強不能俛仰手足不能屈伸或身熱頭痛不可作他病治之但服

○趁痛散循流血氣使筋脉舒暢痛自止

趁痛散

膝酒歸酒桂

木

茲

獨

生姜各半

薤白一

半

朴半

如神湯

治產後餘血不盡流入腰脚疼痛

加桑寄生尤妙

半

甘炙一

右水煎

加桑寄生尤妙

半

朴半

芍枳木桂陳

白姜各六

大薑三桔

甘炙芍炒

半

甘炒參芩芍歸芷桃皮大黃各六

右分二貼水

半

二盞姜三厚煎六分食前溫服

○林一產後腳氣者產後熱悶氣上轉為腳氣亦有產婦平日感風寒暑濕之氣蒸龍裹足經乘虛而發其狀穿

○一產後腳氣者產後熱悶氣上轉為腳氣亦有產婦平日感風寒暑濕之氣蒸龍裹足經乘虛而發其狀穿

○起脚弱熱悶心煩兩足痛痺嘔吐氣上背其候也服小續命兩三劑必愈惡附子者宜服獨活寄生湯若嘔者去地黃倍加生姜，

○婦一產後腰痛婦人腎繫胞產則勞腎損胞諸虛未復感風乘腰故腰痛。

一方治產後風冷腰痛不可轉側獨芎芍桂

續

生姜

桑寄

各六分

歸

風

右水煎

○傳當歸黃芪湯

治產後失血過多腰痛身熱自汗

○傳歸身紅芪二芍一炙半炒右加生姜三斤

林

一產後血崩者因產血氣暴虛未得平復因勞役或

○傳因敬專怒致血暴崩又有氣寒血弱亦變山崩中若小

腹痛此為內有瘀血未可止之且服芎芍湯

○固經丸治產後血氣未復而有房事及勞役損傷致

○傳血暴崩或淋瀝不止

沒赤石

補骨木賊

各半

○附丁雙炮右為末米糊丸如梧子大每服二十九溫酒下

○或陳米飲下林無沒藥有艾葉半兩

○熟乾地黃散治証同前亦治一切崩中下血不止頭目

○沉重熟地一炙甘一分蒲

炒黑

爪

微炒

白芩

半

桂

二分

膠

一炙炒得鹿

白芍

半

伏龍肝

七分

男子視暗燒存

○朱歸右作一服入竹茹一錢水二盞煎至一盞溫服

○婦一方治產後七八日惡露不止

歸芍

六分

續

各八

○傳芎茹各四生地炒乾十分水煎空心頓服

○傳丹溪活套曰產後月餘經血淋瀝不止四物加芷升

調血餘灰

目錄五

四十一

○^林烏金散 治產後血迷敗血不正淋瀝不斷腹脅疼痛頭目昏眩多汗又治崩漏中下血不止

血竭 男子刮髮灰

百草霜 松墨 醋淬鯉鱗燒歸

延桂 赤芍 等分

右為末每服二錢空心溫酒調服

牡蛎散

治產後淋瀝不絕心悶短氣不食面黃瘦

蛎粉

芎熟地

白芍

龍骨各二續

歸炒艾葉酒

參五味

地榆各一甘

炙半右分一貼水二盞姜三片棗

一枚煎服

△產後淋

附尿不通

△尿數遺尿

○^林傳產婦不謹損破尿脬而致淋瀝不禁其脉虛甚與峻補

猪

羊脬煎湯

藥汁

極創飲之

一月而安

○^林茅根湯 治產後諸淋無間冷熱膏石氣血參之

白茅根五

瞿穂

白芍各二葵子

麥各一

蒲黃二分半

渭

桃膠

各七

甘半

紫貝燒

一个

石首魚腦沙

二个

右分二貼水二

盞姜三片

灯心二十莖

煎八分

溫服為末

每服二錢

木通煎

陽下亦可如氣壅木通橘皮煎湯下

木通散

治產後小便不通

通麻仁 葵子 滑石

枳

各二

甘半

水右水煎

灸法

治產後小便不通腹脹悶亂用鹽於產婦脣中填與

脣平却用葱白剥去鹿皮作一束

切作一指厚安鹽上用艾

炷於上以火灸之覺熱氣入腹內即時便通効難具述

桑螵蛸散

治產後小便數及遺尿

桑螵蛸十五

鹿茸 酥 茜 各一
蛎 煎 參 赤石 朴 各六
空心米湯調下 右為末每服二錢
不禁忌者加龍骨一

一方無石脂 厚朴 有甘草 生姜

治產後小便不禁 尿禁燒灰空心酒服方寸七

婦一方 治証同前 雞尾毛燒末溫酒調下

一方

治產後尿數 并遺尿

益智仁為末米飲下

林 一方 產後太便秘澁因產津液暴竭且進橘杏丸以潤之

渭之若尚不通服麻仁丸以通利之一

橘杏丸 治弱人氣秘太腑不通

橘

杏去皮尖各等分

右為末

煉蜜丸如梧子大每服五十丸米飲送下

傳麻仁丸

治產後太便秘結

麻仁去壳

枳參大歸

滋腸五仁丸

治產後血生氣虛損太腸閉滯傳道子難

杏 桃各去皮尖各等分為末陳橘紅丸如梧子大每服二十丸白湯下未通者

四兩 右五仁研為膏合橘皮末和勻

煉蜜丸如梧子大每

服三十丸加至五六十九清米飲下

一方有歸梢五丸

一產後口鼻黑起鼻衄者陽明者經脉之海起鼻交
頰中俠口交入中左之右右之左產後氣消血敗入於諸經
却還不得故口鼻黑起及變鼻衄此產後虛熱亦生
此候不可治名胃絕肺敗急取絆線兩條並產婦項心鑿
二條繫兩中指上節止無藥可療亦厭根之一端也
若口鼻無黑起止鼻衄則黑神丹犀角地黃湯皆可

一產後喘急者因產後所下過多勞血暴竭氣無所

主獨聚於肺故令喘名孤陽絕陰難治若惡露不快敗血
停凝上潮於肺亦令喘急但服奪命丹血去喘止

○婦一方 治產後血入肺面黑喘欲死 參二兩蘇木二
右蘇木一味煎去滓隨時加減入參末服之

奪命丹 治惡露不快敗血薰肺喘急若感風寒者因暴
怒者食鹹冷者並不可服此況孤陽絕陰者乎有見胎衣不下之內

一、產後咳嗽

○林二母散 治產後惡露上攻流入肺經咳嗽 知貝

參白芍 桃杏皮去等分水煎

旋覆散

治產後血風感寒暑溫喘滿咳嗽坐卧不安

旋 赤芍 前半 杏 荆穗 五味 苓 麻 甘

各半

生麥門冬 生地各十克白芷右水煎

一方 治產後咳嗽痰唾稠粘氣急 前五味苑

生姜二片

見各六分

芩各八分竹葉二十片

若產後喫鹽太早而咳者難治

一、產後頭痛

○林加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱痰癥寒厥背
冷頭痛 川芎 芍藥 風藤炒熟地各二錢 芍藥六錢
桂枝各二錢

半

甘草多分各半

膏二分右水煎

如汗者是氣弱頭痛也加芍藥三錢桂枝半生姜三片
如痰癥頭痛加半分芩一分生姜二片

如熱厥頭痛加芷三分

膏三分知半

如寒厥頭痛加天雄二附一朱半姜三斤

一產後虛汗

○林麻黃根散 彌 茵 麻黃根 脼 粉參 甘炙小麥
等分右煎服

當歸黃芪湯

治產後自汗壯熱氣短腰脚痛

○芪 芍 各四兩 右分二貼入生姜三片

○傳黃芪湯

治產後虛汗不止

○芪 二兩

風

熟地

○虯 水白芩

門

甘炙各半

右入大棗一枚

一產後渴

○林熟地黃湯

治產後虛渴口乾少氣腳弱眼昏飲食無

○味 熟地酒浸焙乾參

四兩

門

甘炙

一拮

大

右分二貼水

○過飽所致 良炒姜黃 薑澄茄 陳

參

大炮綃

等分

○右為末用蘿蔔煮爛研汁煮麥糊丸蘿蔔湯下

○人參白朮散 治產後勞傷虛羸怒氣上逆口乾煩悶

○參 术 茯 緩 生地

芩

甘炙

芩

渭

藿

各等分

○右水煎

○婦門冬飲

治產後血虛煩渴不正

○芦根切一拮

參

○甘 芩 各三兩

右水煎頓服四劑而瘥

忌菘菜

一產後陰脫

○婦治產時勞力太過陰脫如脫肛狀逼迫腫痛以鐵精粉上

○推內之又灸臍下橫艾二七壯

又用枳殼煎湯浸良也

即入

又用五倍

白礬煎湯浸良也

又草麻子

十四救去冠研塗頑心如入即去

傳當歸黃芪飲 治產後陰脫謂陰戶中宮脫下也

歸白芍

芍參各二升半右水煎

當歸散 治婦人陰脫

飯

芩

白芍

各一

蟬皮

半兩
燒存

性蛎殼

右為末

溫酒或米湯調下

忌登高舉重

丹溪治套曰產後子腸不收

八物加升

風以酒炒

君為

桃仁膏

治產後陰疼煩悶

桃

五味

枯丸

為末研

桃仁膏拌付

硫黃湯

治產後玉門不斂

硫黃

四兩

吳茱萸

兜絲

各一

兩半

蛇床一方右水煎頻洗之

自礬為末乾摻立効

林治產後陰脫

硫

烏賊骨

各五

味

二兩

右為末

摻

鳥

頭骨

各半

半

治子宮不收痛不可忍

以淡竹葉根煎湯洗仍用五倍

白礬為末乾摻立効

一△五門瘡腫此乃雖非產後之証

次產後陰脫述之

○林治婦人陰瘡先以荆芥

蛇床子煎湯薰洗軟帛搘乾次

以枯凡黃丹扁蓄

藁本各一兩

半

荆芥

蛇床

各五

白蛇蛻一條右為末脂麻油調塗濕則乾摻

一方治陰中生瘡如虫咬痛生搗桃葉綿裹內陰中日三

四易之

黃芩散

治陰虛生瘡

芩

飯

芎

白礬

連

右等分煮湯薰洗

右等分煮湯薰洗

治陰門腫

甘菊苗研爛百沸湯泡先薰後洗

治陰腫不收

麻黃

荆

茄種皮

蛇床

真杉木

蝦皮

右為末敷或煎湯薰洗

一方 小麥 朴硝 白凡 五倍 葱白 右煎湯淋洗尤妙

治瘡瘍 硫黃末敷

治婦人陰痒不可忍

麝

先

杏

燒存

右為末如瘡口深用

輕綃包藥線劄口火灸熱內陰中

又方 柏子根煎湯淋洗蒜煮湯亦可

大黃散 治陰痒

大黃 炒芩

芩

炙各

赤芍

玄參

丹參

山茱

蛇床

各半
右為末

每服二錢食前溫酒調服

治婦人陰中生瘡

凡人九竅中有

肉突岀者多痔

草烏

七個燒

右用

小瓦罐

盛米醋淬乘熱薰候通手洗之

錢空心溫酒調服

一方 連
子 膝
甘 各 四

右為末作

貼水四升煎二升洗之

日三度

治婦人交接陽道違理及他物傷犯

血出淋瀝

髮灰并

青布灰摻之

一方

刺雞冠血塗之

治陰門腫堅痛

枳實半斤研炒令熟故帛裹熨冷即易之

△斷產

○四物湯 加芸薹子

撮經行後空心煎服斷產

外麻葛根湯

三加瞿穂

膝 括

豉 炮各

右八貼水二盞

煎八分空心午前一服二粗并煎晚食前服

通作四日服

盡亦每月經行後便服亦加芸薹子一根炒

一方 白麪麵

升無灰酒

升打作糊煮至

二升半綃帛瀝去粗

分作三服。候月經來日，晚喫一服，次早五更一服，天明一服，經便行終，身無孕。

下胎不動聲色，三四日後，如月水通為驗。

五積散二貼

蘇木 二冬半

桂 紫金牛 稜 菰 乾漆

炒黑色各三冬芷半

二紅 二冬半

右酒水各二盞煎，一盞服

返魂丹 一名益母丸

益母草一味

此草生二種，於端午

小暑或六月六日花正開時，連根取

採透風處陰乾用時以

石臼搗羅為細末，煉蜜丸如蟬子大

每服一丸

專治橫生倒產難產，產後諸証及孕婦胎氣不安，或跌磕

觸動下血胎漏等証。若量加木香 全當歸 赤芍藥

尤妙。不限丸數，以病愈為度。日服三丸，或丸桐子大服五

熬高湯法 益母草 依前法採連根葉蒸洗淨，在臼搗爛

七十丸散，每服九粒

以麻布擦取濃汁，入砂鍋內文火熬成膏，如黑沙糖色為度。

八石罐內收貯，每服用二十飯匙極妙。

子死腹中，脹悶冷痛，小便淋血，沫出，腹脹四肢冰冷，指甲青者，是也。或臨產時服此藥一丸，血氣調順，諸病不生，破血止

痛，補虛養脈，童便潤，各七分化下。或只生取一握連根搗爛，絞汁入蜜少許服立下。

產難者，或產後惡物不盡，脅腹刺痛，惡露上衝心胸煩悶，童便好消化下。

胎衣不下者，發寒熱時，有冷汗，但出敗血，其衣自出，如帶斷

了，服此藥自下。或橫生不順，心悶，欲死者，童便好消化下。

薄荷炒鹽湯亦可。

産後三月起卧不得眼前黑化俗呼為暗風或血熱口乾渴心悶亂如見鬼神狂言童便好酒各七分化下

産後四肢浮腫多寒熱者或氣喘或小便澀滯喘嗽胸膈不利兩脇疼痛溫酒化下

膈不利兩脇疼痛溫酒化下

産後寒熱往來如瘧或脣痛溫米湯化下桂枝湯亦可

産後中風牙關緊急半身不遂童便好酒各七分化下

産後大便閉結口苦煩渴童便好酒下薄荳湯亦可

産後痢疾東棗湯化下

産後身痛腹脹痛溫米湯化下

産後崩中漏下不止者糯米秦艽湯化下當歸桂枝湯亦可

産後鼻齶口乾舌黑童便好酒化下

産後吐逆不止溫酒化下

産後瀉血東棗湯化下

月水不調溫酒化下或四物湯送下

婦人久無子息溫酒化下至十九二十有九大有効四物化下亦可

急用時連根莖生搗汁入水飲可治喉閉吐即愈冬用銀產後一切血病并傷損用石膏一匙酒化服內損亦可

一、産後不治之三証

○林産後氣急喉中作猫兒聲者敗血入心肺萬無一生二不治也
産後中風者蓋因七月未滿勞動百日之中傷房事中風其狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關緊急如此者非外邪自傷死者二不治也

産後面色黑青遍身黑膩萬無一生三不治也

小兒科

一 拭穢之法 一

○林生下急用軟帛拭淨或綿裹手指蘸連甘汁拭口
惡汁稍定更以蜜少許調朱砂一字抹入口中鎮心安
神解毒丁生免瘡豆之患

○惠灸甘草細切水煎去滓綿裹指蘸灌兒口中令嚥吐痰
涎及瘀血方與乳汁智處無病

一 脇帶斷法 二 附回氣法 脇腫

婦子
○斷脇帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留之異病或線
札定然後洗之不然濕氣入腹生脇風兒生三白烙脇帶三
壯別處勿加火艾恐成驚癇

○急以綿絮包裹腹上可斷脇帶且將胞衣置炭火上燒之仍
用大紙撲醣油點火燒脇帶得火氣由脇入腹須臾氣回

方可斷脇帶

断脇之後為水濕所傷或棚袍濕氣傷脇中脇腫多哭不乳

黃柏 釜下墨 鬆髮灰 等分為末傳之

○蓼脰中汁出并痛 用枯礬傳之 或柏末傳之

一 脇風撮口 三

傳因脇斷傷風或屎在胞中遂成脇風發熱面赤啼聲不出

赤足金頭蜈蚣一條 捣酒浸去糞後瞿麥半錢梢子蠅子頭七個右赤鵝

管吹入鼻中如嘆噴叫聲不治後用薄苦汁調服之

面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎熱流心脾故含舌強唇青撮口飲乳有妨 真姜茶炒去核為末蜜調塗口

又牛黃研竹瀝調一字抹口中。

蝎梢散 治脣風及百日內撮口脣風 蝎梢四十九个每
定以線札放砂錠中滾姜蚕四十九个生姜
轉炒令薄苛乾為度汁炒乾去皮嘴右二味為末更
以腦麝各少許研勻雄雞肝一片煎湯調服一字

灸法 脣風撮口諸治不効 灸然谷三壯

穴在內踝前起大骨下陷中

二便不通 四

○初生二便不通腹脹欲絕急令婦人熱湯漱口吸唾小兒前
後心井脣下手足心共七處三五次漱口吸唾紅赤為度額
吏自通

林生下不大便先用葱尖徑入肛門次用牛黃散送下硃砂丸

牛黃散見日裏生赤之內

○若入喉不可活

婦每日晚於無風處看小兒上脣頰內有白泡起以指甲刮破
拭淨之

貼顫 六

○林出胎時被風鼻塞

南星末姜汁調成膏貼顫上病去除之

○初生鼻塞乳食不下用牙皂草烏取葱涎杵成膏貼顫會穴甚効

不飲乳 七

○林治初生不飲乳及未便用葱白丁寸四破之以乳汁銀石器
煎灌之立効

○治初生口噤不開不飲乳 赤脚蜈蚣一條去足細研如粉每
用半錢以豬乳汁二合和勻灌之

茯苓丸

治拭口不淨穢惡入腹腹滿短氣不能飲乳

赤苓

去皮連

枳

燒各

右為末煉蜜丸乳汁調灌下

白姜散

治產婦胎中受寒

兒腹痛不飲乳

桂

半分

右剉水煎

綿蘸與之

梅

各一分

白姜

甘

燒各

半分

右剉水煎

綿蘸與之

嘔加木瓜

丁香

一洗浴

八

婦

兒生洛身

寅卯酉日吉

壬申

丁巳

癸巳日凶

用益母草

金銀草煎汁浴則不生諸瘡

小兒新生洛身之用

五根湯終身不生瘡疥

柳

桃

棟

膀帶未脫不可頻浴

頻浴則水入膀胱致膀風撮口

一護養之法

九

○常令着地氣使筋骨壯若厚衣過煖傷皮膚損血脉

○發瘡瘍汗出腠理開風邪易入腸胃尚脆而窄

○化魚肉果麪燒炙稠粘等物皆宜禁絕苟務姑息隨所

欲積成痼疾

○婦天寒用父母常著舊衣忌新綿太煖則筋骨軟弱

勿令兒枕乳母臂作豆袋枕之

○乳母與兒同睡口鼻氣吹

○兒齶門兒必鼻塞

○祫衣火烘兒必丹毒熱疾

○兒衣服

○晒月下被惡鳥羽屎落遂成無革之疾

○將惡柏異物嬉戲急見遂成驚忤

一胎驚

十

○惠有胎中受驚故未滿月而發驚目上視腹硬手足抽掣

○有胎中受驚故未滿月而發驚目上視腹硬手足抽掣

角弓反張、痰涎壅盛、名胎散。宜用辰砂研牛黃少許，乳汁調抹入口中。太妙母服防風通聖散。

○至聖保命丹 治胎驚及急散驚風。

蝎子十四

白附子

蚕炒

南星炮辰 麝麝各一錢

天麻 風各二錢

金箔片

蟬蛻

右為細

末粳米飯丸每兩作四十九

初生兒半九乳汁化下。周歲兒

一丸金銀薄苛湯化下。十歲左右有急候者二丸薄苛湯化下。

一月裏生赤十一

○林初生兒月裏生赤肌膚如丹塗者先用

牛黃散托裏次

用藍葉散塗外乳母服

清涼飲子三服

牛黃散 鐘金 甘桔 天花粉 葛根

各等分

右為末薄苛

湯入蜜調服

川烏皮膚膝浸散魚腥草根皮

知母

柏子仁

桂枝

桂皮

桂樹

桂圓

酒米湯下

無極散

一名通經甘露散。治經血不通崩漏腸風帶下血風。

丹

錦文木黃丁香淨分四處

淋產後積血

大黃一錢淨分四處

四兩

大黃

淋產後積血

一名四順丹

錦文木黃丁香淨分四處

四兩

大黃

四兩

大黃

四兩

大黃

四兩

大黃

四兩

大黃

大黃

傳經不通用

馬鞭草汁熬膏

為丸或燒存性為丸歸紅煎

湯下

祖傳桃奴飲子 治婦人室女月經不通漸成脹滿

桃奴

棗樹上嫩桃乾核不落者冬月及正月取

延

桂

莎

靈脂

已上宿各研末

桃

去皮尖右等分細末

每服三錢

空溫酒調下

治月經不通

鼠糞丁合畧炒研細溫酒調下立効

△崩漏

○崩中者由藏府傷損衝任二脉血氣俱虛二脉為經脉之海若勞勤過極藏府俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮心藥

○崩中者由藏府傷損衝任二脉為經脉之海

若勞勤過極藏府俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故

忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥舉養脾胃

微加鎮心藥

一△視手紋

十三△附頭面腹上

俱服之

○傳一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三關脉為驗

病輕重死生之訣名曰虎口

○傳一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三關脉為驗

病輕重死生之訣名曰虎口

○傳一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三關脉為驗

病輕重死生之訣名曰虎口

頭指 第一節名風關無脉則無病有脉

禿口

則病輕



第二節名氣關脉見則病重

第三節名命關脉見則病劇九死

一生惡候也

三關通度脉候是極重之証必死

○林傳三關通度斜入指甲者不治

○林傳凡頭面或肚腹有太脉併青筋見者并是食毒物及驚積難治

○惠傳胸背百會穴下有二條青脈下對耳尖久而愈青不治

△診脉 十四

○惠傳凡診小兒木指按三部一息六七至平和八九至發熱五至

內寒弦脉風癟沈緩傷食

傳七八歲曰亂九十歲曰翳始可以一指探掌得後三部之脉行下息七八至為無病十一歲至二十歲曰童壯以一息五至

為常脉

△觀形 十五

○林樹兩眼無精光黑睛不運轉目瞳無鋒銳如魚眼貓眼者不治

○傳鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋惡候更

○嫩腹有直身紋

○顙門腫起定為風此候應知最是凶忽

○陷成坑如盤是未過七日命須終

△審外証 十六

○林咬牙甚者發敬馬口吐涎沫而叫者重痛昏睡善噫者將

○發瘡疹也吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也吐稠涎咯血者肺熱

也瀉青白穀不化者胃冷也吐瀉乳不化者傷食宜止之身

熱飲水熱在內也瀉赤黃者胃熱毒也呵欠面白赤風熱也呵

久面青、敬驚風。呵久面黃、脾虛驚。呵久而多睡者內熱也。
呵次氣熱者傷風也。

一△變蒸 十七

サカシホトヨリ

○惠變蒸有十變五蒸者乃生精神意智俗謂之牙生骨長。

○丹溪曰是胎毒散也。

○傳自生之日始每三十二日一變其治不汗而熱者發其汗大吐者微下不可別治。

○林瀛蒸之時切不得艾灸即宜少與乳食亦不可妄投藥餌。

惺芎散

治兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞頭重。

芩 木 參 甘 桔 細 莩 各等

右水煎去芎加括

紫霜丸 杏 五十枚

赤石 一巴

三十粒

代赭石

煅醋淬

右各別

○研和勻湯浸米餅丸如杏米大三下歲以下兒一二十九小歲

以上十數丸食前米飲或乳汁送下。

人參散 治變蒸骨熱心煩啼叫 參 甘 門 北紫胡

苓 二 膽 風 右煎服

調氣散

治變蒸吐瀉不乳多啼

木 蘗 朴 參 陳

藿 甘 各等 右水煎

神仙黑子散 治變蒸與傷寒相似者當詳其証若上唇

中心有白點子者為變蒸宜服此

麻 去殼 大

杏 連皮

右燒存性為末每服丁字水煎服抱兒於溫煖處有微汗身涼効

一△吐瀉 十八

○傳小兒初生吐蓋拭口中穢惡不盡嚥入喉中故可用

木瓜丸

瓜 木

麝 脣粉

粉也

各一字右研勻

糊丸シロウ如黍米大每服三二十丸甘草湯送下スー

初生三日内吐瀉壯熱不乳大便乳食不消或白色傷食當下

足而後和胃下白餅子シロウ和胃益黃散

白餅子シロウ治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

渭輕

半南各一凹アカ計十四粒去皮膜用テ水一升右研均巴豆後

八衆藥糯米飯丸シロウ如菉豆大三歲已上三十五餅已下一二餅

薄苛湯下シノコ

益黃散

治小兒脾胃虛寒

陳一青

詞子皮

甘タク炙各半水

丁香二分右水煎シテ加參术各一丁水尤効アリ

吐瀉泄黃傷熱乳也

漏告日傷冷乳也皆當下白餅子主之

傷熱

乳者玉露散傷冷乳者益黃散溫中丸並於下後服之亦

玉露散タマヌ一名甘露散

膏タマヌ寒水各半生甘半水右為蜜每

服一字或半錢溫水調下ス

溫中丸

參甘多术各一

兩

右為蜜姜汁麪糊丸シロウ如菉豆大每

服二三十丸粳米飲下ス

吐瀉調脾

平胃散入熟蜜和蘇合香丸米飲調服

林兒生月裏生嘔先用朱砂丸下之後用朱沈煎惡物而止

硃砂丸

辰南

巴霜各半右為蜜麵糊丸シロウ如黍米大每服

二丸薄苛湯下シノコ

朱沈煎

硃砂飛

藿

滑五水

沈二丁香

十四粒

右為蜜每服

半錢用新汲水一盞

香油滴成花

抄藥

在上須臾墜下

去水別用承空心送下ス

紫金核治男女一切嘔吐タキ小兒尤効アリ半湯泡七參木

木丁香 薤各二右為末麪糊丸如李核大姜汁糊丸効

沈香 碳砂各一細研為衣陰乾每一丸用棗一枚去核內

藥在內濕帛裏煨熟嚼服米飲壓之

掌中散 治吐乳

白豆蔻

砂仁各十

甘半兩半

生半炙右為末

安掌中乾吃兒摻口中

白木散 治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉不止津液枯竭煩渴飲

水乳食不進羸瘦困劣

參木木芩藿

甘灸

各

一葛兩右水煎

傳 一腹脹十九

○由脾胃虛氣攻作也亦實者必悶亂喘滿可下之用

紫霜丸白餅子不喘滿者虛也不可下

搊氣丸

半兩右為末

小兒虛張如腰大者

羅荀子胡椒各一搊尾

米飲下一方有木香一錢

治小兒虛脹先服搊氣丸不愈腹中有食積結糞糞少便黃微喘脉伏而實時欲飲水能食者可下之宜消積丸紫霜丸蓋肺而後下之後又補脾則愈也

一方 治腹脹 蘿荀子 紫蘇梗 葛陳各等甘少許

右水煎 食少者加木

消積丸

丁香九粒

砂仁十二

巴二个

去皮心膜及去油

右為末麪糊丸如

黍米大三歲已上三五丸已下三丸溫水下

傳 一腹痛二十

多是飲食所傷

木一冬陳吉青各七

分查去曲炒宿

芽各

炒

一有寒加薑桂吳茱萸

有熱加芩右為末米飲或白湯下

腹痛口中氣溫面黃目無精采或白睛多及多睡畏食或大便酸息者當磨積宜消積丸甚者用白餅子下之後和胃用白术散

心腹痛面白口沃沫及清水出發痛有時當作蛇蟲沫自出小兒本怯胃冷故虫動而心頭痛與癇相似但目不斜手不擗耳安虫散主之

安虫散 牢鑑用米糊丸名安虫丸 黄粉炒黃色 胡粉也 川練子去皮各二
祐凡 半二兩 右為末每服一字大者半錢或一錢溫米飲臨痛時服

集効丸

治串痛木虱炒梅訶煨去蕪炒附炮去各

一方有芩連

治蛇蟲作痛 一方陳湯加苦練根煎服或只以苦練根向東南生不出土者去鹿皮取白皮細切濃煎汁一盞徐飲之不可多飲先以糖蜜或炒肉食之引蟲頭向上然後服之看兒大小斟酒與之

一方治小兒腹痛甘炙姜各二伏龍肝一參苓百草霜木各五右為末粥丸梧子大每服三十九陳皮湯下

一△痞癧二十一

○林小兒寒溫不調乳哺失節或啖糯米食生冷瓜菓脾胃微弱不能消化致五歲不利二焦壅滯腹內堅硬或發寒熱如瘧漸致弱羸

紅丸子治血膜包水腸傍時痛發寒熱日久結癖亦効

稜炮^{アラマサ} 药^{ヤク} 煥^{スル} 荒花^{アラハ} 醋^{スル} 桃^{モモ}

杏^{エド} 各去皮^{アヒ} 鳴^{ウニ} 梅^{メイ} 炎^{スル} 谷^{タケシマ} 巴豆^{バドウ} 二十粒^{二十粒}

硃砂^{スルガ} 五冬^{ゴトウ} 右為末^{トコトコ} 酒^{スル} 醋糊丸^{エチクムツル} 如篆豆^{スルガ} 大硃砂^{スルガ} 為衣米湯^{スルガ} 下^ス 三五丸^{三十丸}

巴豆^{バドウ} 取皮霜^{スルガ} 二十粒^{二十粒}

大黃膏^{ダウイエイ} 治^{スル} 痘^{スル} 瘤^{スル} 小兒大人俱用之^{スル}

大黃^{ダウイ} 朴硝等分為末^{スル}

蒜泥成膏^{スルガ} 用^{スル} 艸帛^{スルガ} 攤^{スル} 成膏藥^{スルガ} 貼^{スル} 自軟消^{スル}

本別膏^{ボンベツガ} 治^{スル} 痘^{スル} 瘤^{スル} 木別^{スルガ} 多用^{スル} 獨蒜^{スルガ} 半雄^{ハーフ} 半^{スルガ} 搗^{スル} 炮入醋少許^{スルガ}

蠟紙貼患處^{スル} 取積後^{スル} 宜^{スル} 調理^{スル}

異香散^{イクセイサン} 治^{スル} 腎氣不和^{スル} 腹脇脹悶^{スル} 噌^{スル} 喘塞^{スル} 喘滿飲食難化^{スル}

噫氣刺痛能破癥瘕^{スル} 和胃進食^{スル} 蓮皮^{スルガ} 药^{スル} 煥^{スル} 稜炮^{スル} 益^{スル}

甘^{スルガ} 六兩^{ロウ} 靑^{スルガ} 陳^{スルガ} 三兩^{ロウ} 朴^{スルガ} 姜製^{スルガ} 右為末^{スル} 每服二錢水一盞^{スルガ}

姜三片束^{スルガ} 救鹽一捻煎^{スルガ} 分^{スルガ} 通口服^{スルガ}

灸法^{スルガ} 乳下一寸灸^{スルガ} 三壯^{スルガ}

小兒夜啼氣久不瘥^{スルガ} 灸中院^{スルガ} 一穴^{スルガ} 章門^{スルガ} 二穴^{スルガ} 各七壯^{スルガ}

一夜啼 二十三

○傳^{スル} 夜啼者心經有熱有虛^{スル} 參連^{スルガ} 姜汁炒各^{スルガ} 甘^{スルガ} 五竹葉^{スルガ}

連一禾半^{スルガ} 甘^{スルガ} 分^{スルガ} 竹葉^{スルガ}

右作二貼加姜一片^{スルガ}

錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也宜益黃散^{スルガ} 方見^{スルガ} 吐瀉^{スルガ} 之内^{スルガ}

益黃散^{スルガ} 方見^{スルガ} 吐瀉^{スルガ} 之内^{スルガ}

花火膏^{スルガ} 燈花^{スルガ} 顆^{スルガ} 乳汁調抹兒^{スルガ} 口或抹母乳^{スルガ} 含兒吃之^{スルガ}

治驚啼邪熱乘心也安神丸主之^{スルガ}

錢氏安神丸^{スルガ} 治^{スル} 邪熱驚啼^{スルガ} 門^{スルガ} 白芩^{スルガ} 馬牙硝^{スルガ} 山藥^{スルガ}

門^{スルガ} 白芩^{スルガ} 馬牙硝^{スルガ} 山藥^{スルガ}

寒水^{スルガ} 甘^{スルガ} 炙各^{スルガ} 一臍^{スルガ} 右為末^{スルガ} 煉蜜丸^{スルガ} 如芡實^{スルガ} 大每服半^{スルガ}

臍^{スルガ} 煉蜜丸^{スルガ} 如芡實^{スルガ} 大每服半^{スルガ}

丸白水下^{スルガ}

○導赤散^{スルガ} 治^{スル} 心燥號啼小便赤中^{スルガ} 中熱腹熱或有汗仰身而^{スルガ}

汗^{スルガ} 仰身而^{スルガ}

林道赤散^{スルガ} 治^{スル} 心燥號啼小便赤中^{スルガ} 中熱腹熱或有汗仰身而^{スルガ}

汗^{スルガ} 仰身而^{スルガ}

啼至曉方息 生乾地黃 通 甘(各等分)右每服二三錢入竹葉煎 右証加芩用之 未效用通心飲加門 車燈心薄苛

通心飲 通 堯 瞿 梶 申 芩 各等分 水煎

一方治夜啼 蟬蛻十四個全為末入硃砂一字蜜丸吃之

龍齒散

治夜啼不住 龍齒

蟬蛻去足趙鈎鈎藤

芩 參

右等分為末每服一錢水煎

六神散

治腹痛夜啼面白青口中冷氣四肢冷或泄瀉青白不吮乳

不吮乳

參 山炒木各五

甘(炙二

自芩 扁(炒各一兩)

右姜棗

木各五

神 陳 桂 甘(炙各二

右水煎

五味子散

治夜啼及腹痛似有鬼祟 五味

歸

赤芍

木各五

神 陳 桂 甘(炙各二

右水煎

蒜丸

治冷証腹痛夜啼面白青手冷 大蒜

研慢火燶或大

研乾

乳香(半)右研勻

丸如芥子大每服十粒乳空時服

治夜啼

乾牛糞 如手大安臥席下勿令知子母俱吉

黃土散

治客忤夜啼 竈中黃土

蚯蚓屎等右為末

和塗頸

五心良

凡小兒口到乳上便啼身額心微熱急者口內或瘡或重苦於

各類治之

一 客忤

二十三

附中風

小兒神微弱外邪客氣卒暴觸忤口吐青黃白沫面色變易喘腹痛反側癱瘓狀如畜馬瘡疽眼不上竇視其口中上脣左右如有小泡以竹針刺之或以指甲摘破宜服蘇合香丸

姜湯化開，頻與之，仍以皂角燒黃身，次用淡豆三合水，濕搘。
丸，如雞子大，摩手兒顙上及足心各五六十遍，次摩脣心良。
犀角散，治客忤，散鷦鷯啼壯熱，天麻，犀門，釣藤。
硃砂各一，鐵粉，雄各半，麝少，右為末，每服半錢，金銀煎湯調服。

安神丸，治証同前，方在前。

黃土散亦可，方在前。

○小兒中惡卒死，以葱白內下部及鼻中立活。

△口瘡 二十四 △附鵝口

○如聖散，治小兒口瘡不能吮乳者，巴豆 三十粒研爛入硃砂或黃丹赤土。

○小兒白屑滿舌及兩脣，名鵝口，用髮纏指頭蘸井花水拭口，許剃開顫門，占上如四面起粟米泡，便用溫水洗去，恐成瘡。

○治口瘡，黃連為末，蜜水調服。

又方 黃柏 細辛 等分為末，付之。
小兒白屑滿舌及兩脣，名鵝口，用髮纏指頭蘸井花水拭口，令淨，又用濃煮粟米汁，以綿纏筋頭拭之，更以綢過黃丹，摻之即愈。

林治鵝口，桑白皮汁和胡粉傳之。

○治小兒口瘡，端午蝦蟆灰杵末傳，瘡上即瘥。

△重舌 二十五 △附車脣

○重舌乃心脾熱也，心候於舌，脾之脉絡出於舌下，心脾熱則

血氣俱盛，附之根而重生，丁物形如舌而短小，有著頰及上脣者曰重脣，著牙齦者曰重齦，皆當刺去其血也，真蒲黃敷之，或髮灰或升硝或燈硝或竹瀝浸黃柏點敷之，皆効。

治小兒重舌黃丹如豆大內管中安舌下
又方 金下土苦酒和塗舌下 又蜂房燒灰研酒和傳舌下
三四次用之 又蛇蛻炙焦末丁豆許傳舌下月三日

治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底

二十七 即愈

傳重舌木舌用三稜針於舌下紫脉刺之出惡血即愈

○又用竹瀝調蒲黃末付舌下神効

治小兒木舌塞口欲滿者 紫雪一錢竹瀝半合研匀頻行服

紫雪 治內外煩熱不解口中生瘡顛狂驚癲等証

黃金百兩寒水石

磁石 石膏

滑石各二升上用冰一

石煮至四斗去粗入下頭藥

甘草八兩青木

犀角一升

羚角一升

項藥各五分石硝

硝亦可柏硝淨者已上入前藥汁

入下項藥

煎柳枝不往手攬候有七分投放水盆中半日入下項藥

攬令勻硃砂三當門子即麝香一右煎成霜雪紫色

沈各五分杏仁一升

每服一錢或二錢涼水調下並食後服

二十八 二十六

○林脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌舐之治之勿用冷藥及
下之當少與瀉黃散漸服之或飲水醫疑為熱非也飲
水者脾胃虛津液少也又如面黃肌瘦五心煩熱弄舌為

疳黃宜胡黃連丸太病後舌弄者凶

○傳瀉黃散 荘藿七分梔子半膏半甘草七分風分右細切作二服
用蜜酒炒香熟以水一盞煎至半盞去粗與之

二十九 二十七

○傳吃泥胃氣熱也用軟石膏 芩 陳 荸 木煎服

一 滯頤 二十八

林滯頤乃口涎常流而漬於頤額也宜分冷熱而治
溫脾丸 治脾胃虛冷故流涎不能取約半 丁香 木各
冬姜蚕 木 青 陳各半右為末糊丸麻子大每一歲十
丸米湯下

通心飲 方在夜通心氣分水穀退熱利尿 口瘡加

一語遲 二十九

○葛蒲丸 治小兒在胎其母卒有驚怖邪乘舌本不通
長四五歲猶不能言 參 葛門 速 沙炒 味姜 茄 归各
半 乳 碗各一右為末煉蜜丸麻子大每服十九丸米飲下

一 行遲 三十

○行遲乃血氣不充內骨髓不滿軟弱不能行或肝腎相
虛蓋肝主筋筋弱不能束臂主骨骨弱不能載故也宜
地黃丸 熟地四兩 山茱萸 二兩 潭牡 白苓 各一
右為末煉蜜丸如棗豆大空心鹽湯下三十九丸

虎骨丸 虎胫骨酒炙白芍 桂 酸棗肉酒浸生地 白苓
風 腰各等右為末煉蜜丸如麻子大每服十九丸酒或水
湯下

羚羊角丸 治小兒五六歲骨氣虛弱脚弱不能行 羚

白芩

酸

虎胫骨

醋

生地

各

五

芪

桂

風

歸

各

二

右為末

煉蜜丸

如小豆大

食前溫酒化下

三五丸服之

一月

漸漸即可行也

五加皮散 治三歲不能行 五加一膝

各五

右為末

散

一

膝

各五

右為末

散

每

五加皮散 治三歲不能行 五加一膝

各五

右為末

散

一

膝

各五

右為末

散

每

五加皮散 治三歲不能行 五加一膝

各五

右為末

散

服一錢半，粥調次入好酒兩滴，調日二服。

一、鶴節 三十一

目錄五

○林鶴節乃，羸受不足，血氣不充，故肌肉瘦薄，骨節呈露，乃得之，腎虛，精髓內枯，膚革不舉，易為邪氣所襲，日就枯悴，其形如鶴腳之節，宜地黃丸。

一、△脚拳 三十二

○林脚拳不展，乃，羸受腎氣不足，血氣未榮，脚指拳縮無力，不能伸屈，宜。

海桐皮散 海桐 牡 雜 熟地 膝 各一 山茱 補 各五

右粗末，每服二錢，葱白一根，水一盞煎半盞服。

一、△手拳 三十三

○林手拳不展，蓋，羸受肝氣，致兩脉，縮兩手伸展，無力，宜。

薏苡九

歸 嵌 薏 酸 風 羔 各一

右為末，煉蜜丸

雞頭大，每服一粒，麝香荊芥湯化下。

一、△鰓陷 三十四

○林鰓陷乃，因藏府有熱，渴引水，致泄痢，久則氣虛弱，不能上充腦髓，故鰓陷如坑，用黃狗頭骨炙黃為末，雞子清調敷之。

一、△鰓項 三十五

林

鰓項乃，鰓門腫起也，蓋脾主肌肉，乳食不常，飢飽無度，或寒或熱，致使藏府不調，其氣上衝，為項脹，鰓突而高，毛髮短，黃如寒氣上沖，則柔軟寒若，溫之熱者涼，肝盛風熱交攻，亦然。

袖防風 桔子 白及各末乳汁調塗顱上二十日愈
○傳顱門腫起定作風此候癰窠最是凶忽陷成坑如鑿是末
過七日命須終

一、解顱 三十六

傳解顱 頭縫不答 因母氣與熱多也錢氏曰生下而顱不答腎氣未減也雖長必少笑更有目白睛多面㿠白多愁少喜也丹溪用物有熱加酒炒連並服更以帛緊束以白飲末付之

林地黃丸 方在疔治年長頭縫開解不答服此丸仍用炮南星末米醋調攢紺帛上烘熱貼之

三辛散 治頭骨不答 細桂各五錢半右為末乳汁調敷之面赤局効

○龜胸乃肺熱脹滿攻胸膈胸高如龜蓋乳母多食酒麪熱物五辛炙婢而得之

林百合丹 治龜胸 大焰七天門去心杏去皮百合桑蜜水拌炒地骨一升炙半加芩一右水煎

○通 甜葶苈 帘輒石膏各五錢右為末煉蜜丸姜豆大每服五丸食後臨卧熟水下

一、龜背 三十八

○傳龜背小兒生下客風入背逐背髓即成龜背以龜尿點背脊骨節即平

取龜尿法 用蓮葉置龜於上尿自出或令向龜於明鏡

則必尿出

灸肺俞三五壯

一項軟筋軟 三十九

林五加皮散

治項軟頭不得正 五加皮末酒調塗項骨上

健骨散

治久患病疾，體虛不食及諸病後天柱骨倒

白姜末

三歲兒半錢薄荷酒調下服後用生筋散貼

生筋散

木敝魚交州草麻

去殼六十一粒右為末手摩頸項上

令熱津唾調貼之

涼肝丸

昆蟲鳴音丸方見急驚內

治風熱項軟

貼項方

治肝膽風熱致令筋軟

附

生支

星等

為末姜汁

調貼項軟處次服防風丸

涼肝丸

小茴丸

治胎中受熱遍身筋軟

鹿茸

蕤草

膝瓜

茺絲

熟地

歸

天麻

仲

青鹽

谷等為末

煉蜜丸如

皂角子

大每服十九

燭湯溫酒化下

羚羊角散

治面紅唇白

腸熱項軟

羚

白芩

熟地

酸炒

虎胫骨酒

桂

甘

谷各等分

右為末每服半錢或一錢

溫酒或

燭湯調服

一丁奚哺露

四十

林小兒

手足極細項小

膚瘡脣突號哭胸陷或

生穀癥是名丁奚

虛熱往來頭骨分開

反食吐衄渴

嘔噦是名哺露

二者皆無古種類之疾最為難治宜

十全丹救之

十全丹

青

陳白

莪

煨白豆蔻

芍

五灵

梅

荅

曾

各

糸木

使君子肉

焙

蝦

蟆

糞灰

各三

右為

末

猪膽汁

浸蒸

糞

丸

麻子

大每服二十

丸米飲下

有熱薄

苛湯下

一 脱囊囊 四十一

脫囊囊陰囊腫大墜下而不取也亦有囊皮脫爛者

歸

連

芩

通

甘

煎服

囊爛者

野紫蘇葉

面青背

紅者是

為末

香油

調付

濕則

摻之皮

脫兩丸露者

以青荷葉

包之

付藥

後自生皮

一 脱肛 四十二

傳

脫肛

用東壁土

泡湯

先薰

後洗

又五倍子

未付而類

托入

之

又敝魚頭

燒存性

香油

調付

云燒烟

薰

又淨萍

杵末乾貼患處

又草麻子

四十九粒

研爛水

調作餅子

貼頂上

即收入洗去

小兒漏病

後肛門不收

赤石

伏龍肝

等

為末

每用半

錢傳

腸頭

上

一 瘰病 四十三

○林

聖慧方

治小兒生

十餘月

後母又有

痃

病

精神不爽

身熱萎痺

為

瘕病

上

用伏翼

燒灰

細研

粥飲

調下

半錢

日四五服

効

龍膽湯

治婦人

被惡祟

導腹中

致令

病

其証

下利寒

熱

來

又治婦人

有兒飲乳

後有

娠孕兒

喫此乳

亦作此

病

北柴

膽

芩

桔

鈎藤皮

芍

甘

炙苓

各二

蟬

枝

大紙裹

煨

右水煎

得利則止

量大小多少與服

一

盤腸內吊

四十四

○林鈎藤膏

治小兒盤腸內吊，腹中極痛，乾啼。

乳

沒

木

姜黃

四分半

木別

十二分

去殼

右以

木鱉膏

各另研

木別

研

爛成膏

膏

和四味更入煉蜜少許，丸櫻桃大煎，鈎藤湯化下。次服魏香散，蓬木五分，真阿魏一分，先以溫湯化開，阿魏浸蓬木二分，日夜焙乾為末，每服半錢，煎蘿米飲空心調服。

一方

乳

沒

各少許

木

丁

礮石

水

調一味

煎數沸

服之

立効

川練子

七分

去皮核

巴豆三十五粒

使君肉

木

研細末

茴炒木

炮附炮

金龜子

志

接

茴香散

治盤腸氣痛

茴炒木

炮附炮

金龜子

接

蘿蔔子炒補

炒白豆蔻

燶

右入鹽水煎

木香散

治小兒盤腸氣痛

不已

面青

手冷

啼叫

尿如米泔

川練子

同炒金豆黃

去巴豆

三十五粒

使君肉

木

延

茴

各二分

右為末

清米飲

空心調下

量兒大小

與之

○齒不生蓋齒者，骨之餘體之所養，氣不足則齦不能充於骨，故齒久不生，宜

芎黃散

芎歸

白芍

地

內各

一沈

五分

甘草

三分

右為末

濕鹽湯

調服半錢

仍用少許

擦牙根

一方

雄鼠糞

頭尖者

是每首用

一粒揩

齒根上

至二十一

日當生

一△斷乳

四十六

畫眉膏

施存性燒雌黃

砂

許

右為末

入香消輕粉

少許調勻候兒睡著

濃抹兩眉

覺來自不喫

乳末

効再用

即驗仍以墨調塗

乳頭

一△誤吞諸物

四十七

○林治小兒誤吞錢

燒火炭末

自湯調方寸

七服即出

又服蜜一升即出

又濃煎艾汁服之効

治小兒誤吞銅鉄物在咽喉內不下 南燭根燒細研白湯調

一丁錢服之

一諸熱証 四十八

林潮熱者胃熱也時間發熱過時即退來日依時發熱此欲發散也

地骨皮散主之

壯熱者心熱也一尚熱而不已甚則發散猶道赤散主之

風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有風証

人參生犀散主之

濕熱者脾熱也但溫而不熱

瀉黃散主之

心熱者視其睡口中氣溫或含面睡及上竄咬牙脣冒者心熱

也導赤散主之

肺熱者手足熱目鼻口舌結陽主之

地骨皮散

治虛熱潮亦治傷寒壯熱知柴甘參

地骨

赤芩 半各等

右每服二錢姜一片水煎

導赤散 在夜啼之內

生犀散

治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱及病後

餘熱不除

大鱠魚醃門

芍

桔梗

桑葉

參

芩

地骨

赤芍

柴

枳

各等分

丁方有知母

有痰加半夏

右入青蒿少許煎

瀉黃散

治脾熱目黃肚大口唇生瘡眼生渝針等証

生

大黃

酒微炒

甘草

各等分蜜

右為末溫湯調服

加減瀉黃散

治濕熱胸膈煩悶皮色如橘子黃白睛亦黃

右水煎

茵連

各五柏

芩

梔

各三

右前服

甘桔湯

治肺熱手揩眉毛

桔梗

各五

甘草

兩右水煎

甘露飲子

治胃熱口臭齒齦腫痛。咽喉有瘡赤眼及癆。

疹熱盛者

杷去毛熟地

門枳

茵

生地

天門

芩石斛

甘菊右等分水煎

一方加連

驚風

馬脾風

噤風

癇証

四十九附慢脾風

天瘤

發搐

傳

一驚風有二証急驚屬痰熱慢驚屬脾熱。

夫急驚之候因聞不常之聲或驢馬禽獸之噃以致面青口噤或聲嘶而厥發過則面白色如故良久復乍其身熱面赤引飲口鼻中氣熱太小便黃赤惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜錢氏利驚丸

瀉青丸抱龍丸宣風散五福化毒丹等

慢驚之証多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘓癰筋脈拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此疾也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸丹溪參木湯送下砂安神丸之類

急驚者十生一死慢驚十死一生

玉有合病者身涼精神倦怠不吐不瀉又能乳食而發搐者是半陰半陽合病如傷寒半表半裡也有急驚涼瀉不愈或與吐下藥太過變為慢驚有慢驚溫補不愈或與溫補劑太過變為急驚

利驚丸

治急驚風神妙

天竺黃

二輕

薰各一

黑丑頭未半右研匀

煉蜜丸如梧桐子大一歲兒一丸三歲

兒一丸五歲三丸溫薄苛水ヨウス下食後ス

鴉青丸又名鴉肝丸治肝熱急驚搐搦等証ア林号涼肝丸

羌大湿布裹根芩梔膽歸風各等右為末煉蜜

丸如葵實大每服半丸至一丸竹葉湯ヨウス下

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣鹿風熱痰實壅嗽又
治驚風潮搐及蠱毒中暑壯實小兒宜時與服之則免

痰熱敬馬悸之証

雄二冬半

辰五竺

牛

膽南星

四兩燒

乾百味聚研

麝半另研恐太

右為末

牛

膽草膏丸

如皂

予大溫水化下百白兒每丸分作三服

一歲兒半丸五歲二

丸童亦三五丸臘雪水煮甘草和丸尤佳

老方

一方漿水或新水浸南星

三百

者火三五沸去皮取白肉切焙

宣風散治急驚風搐搦不定

桔陳甘各五黑丑

四兩

半生半炒一本

右為末蜜湯調下

二三歲兒半錢四五歲

一丁錢

食前服

五福化毒丹治急驚風痰热搐搦等証

桔

微

玄參

燒

各六黛燃开硝枯各參二苓五甘炙一兩

半生半炒一本

銀鉢八片麝半

右為末

煉蜜丸每兩分作十二丸

一歲兒每服分四服薄

苛水化下

奪命丹

治急驚不省人事自定直視牙關不開唇白或

黑者

星半

各四兩

為末以姜

珍珠新白者

巴

吉油

石砂

金鉢

銀鉢

各十片

輕

麝末

各半右為末麪糊丸如黍米

大每歲兒一丸燈心湯ヨウス下

鎮驚丸

鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止嗽珍一塊

各三

竺雄各三

金鉢疔膽星

牛二

麝半辰三水右為朱麥麴

半

糊丸如梧子大每服五六丸薄荷姜蜜湯化下

錢氏安神丸

治邪熱驚馬啼心痛面黃頰赤壯熱門山

牙硝白芩寒甘各半兩唇一脣

兩脣字右為末煉蜜丸如

芥實大每服半丸砂糖水磨化下

慢驚參木煎濃汁

化下

金鉢丸

治急慢驚風痰涎雍盛

半星裂白附炮

風各半雄

硃各二犀牛

腦

麝各半金鉢疔

二十

右為末姜汁麴糊丸如麻子大每服三五丸至一二十九丸

參湯下慢驚去胸

參湯下慢驚去胸

慢驚去胸

慢驚去胸

慢驚去胸

慢驚去胸

慢驚去胸

人參湯

最能利驚

小柴胡加風枳

枳

蟬蛻散

治驚風天釣心熱夜啼驚瘡

蟬六十介

去足翅荆穗

高

一付甘蜜大煨芩

各五錢

蝎梢五十介右入

白茅根少許水煎

去毒

高

神効萬金丹

治急慢驚風十無一失

硃輕各等分

高

右研勻用青蒿內虫兒取於淨磁盞內以硃輕魚汁和丸

黃米大一歲兒一丸二歲二丸乳汁送下取蟲時七月初五

日最靈

傳

子金龍膽湯

治嬰兒出腹血脉實盛寒熱交作四肢

散驚制爭併諸疳散驚等証

膽金鈎藤柴芩枝

高

芍神甘各三

蠅蛆七五

右水煎徐徐服

高

一方治急慢散驚風

苛寒各半

薰蚕

硃各一

高

高

二枚丹皂角 槐角各半右為末燈草湯和乳汁調持待灌之

黃芪湯 治慢散驚風之神藥也 慢散驚風者皆由久渴脾胃虛而成也 茵炒

參一炙甘半加白芍一水右水煎

益黃散 治胃中風熱 茵二陳去參各一白芍七分生甘

炙甘各五連少許右為末水煎食前服

錢氏白朮散 治積痛和胃生津止渴頻瀉利將成慢散風

者服之効 參木白芩甘炙木藿各一乾葛二

右水煎 丹溪加山扁肉蔻煨各入姜一片煎

如慢驚已作加細

天麻各一 蝎三枚去白附八分麴同煎服

一方 治慢散驚風子母俱服 參木各一芩陳各半

釣藤飲

治吐利脾胃氣弱虛風慢散風

釣鈎藤半蟬

風參

麻蕕炒蝎尾天麻各二甘炙芍各一

右水煎

虛寒者加附半分

溫白丸

治脾氣虛弱泄瀉瘦怯令痔洞泄及吐瀉久病轉

成慢散驚風身冷癆癰等

天半蚕炒白附生蝎去毒星湯

七次焙各

右為末麥九如豆大每服五七丸至二三十九

二水五分

空心姜米湯下

○灸法

治急散驚風灸前頂一穴在百會前一寸如不愈須灸兩眉頭及人中一穴各三壯

慢散驚風陰證也

因吐瀉病久脾胃虛困似搐不搐眉心

顙會一穴

際二寸在入髮

百會一穴各三壯

又 治慢敬馬風 炙尺澤，一穴各七壯

一、慢脾風

○林小兒慢脾風証蓋為吐渴損脾病傳已極。總歸虛處惟脾所受故曰慢脾。若逐風則無風可逐。若鎮敬馬則無敬馬可鎮。但脾間痰涎虛熱往來其眼合着脾困氣乏神志沈迷痰涎凝滯而然冷。

一小兒頭雖熱眼珠青白而足冷。

足冷三頭雖熱或渴而足冷。

五頭雖熱或渴而足冷。

日慢脾風速與補脾益真湯，每服三錢更加薑一枚。

如因敬馬而搐者與前朴散每服二錢更加附子一枚。

且慢脾十救三抵當生胃回陽如大衝脉在則取百會穴多

救之。

補脾益真湯 治小兒胎裏怯弱外實裏虛因嘔吐乳

妹糞便青色而成慢敬馬風氣逆涎潮眼珠直視四肢

抽掣子或因變蒸客忤而作或因特拘驚嚇而作或

因悞服鎮心寒涼藥而作

木

歸參芪

丁香

訶肉 陳朴

姜制蔻

甘果

苓木桂半

湯泡七次附炮各七分全蝎去毒微炒

右每服三錢姜二片枣

一枚水一盡半煎六分去滓肚飢稍熱服服訶心腹揉動

以助藥力候一時又喫乳食

渴者去附子

蔻加

參芩瀉者加丁訶一
嘔吐者加陳丁半

腹痛者加朴 良

腹脹者加朴 丁 前 枳

咳嗽加前

五味 去附

桂 果

蔻 足冷加附

丁 朴

枳 赤苓 去附

丁 前

枳 去附

桂 果

蔻 足冷加附

丁 朴

氣逆不下 加前 枳 去附

附 蔻

惡風自汗

桂 足冷加附

丁 朴

前朴散

治心腹結氣或嘔噦泄瀉腹脹時痛

或發驚

悸

前 木 參 陳 良藿 甘炙朴

制衣各等分

右水煎肚飢時服

異方銀白散

治或吐或瀉

涎鳴微喘露睛

驚跳

石蓮

白扁

芩 各一參

天 白附炮全蝎毒

朱 甘炙

藿 各半

陳米 炒香

右每服二錢冬瓜仁七粒姜一片水半

盞同煎服

此藥助胃怯風慢驚通用

熱毒旋即乳兒兼挾風邪所致但解利風熱則應掌而愈

九龍控涎

治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰各爲不吊

滴乳

一水竺

一水雄

另研

茶 柑

桔

各一

甘炙

荆穗

炒

葛

一百粒米

赤脚蜈蚣

一條酒浸

右為末每服半錢至一錢入

參薄苛湯調下

鈎藤飲

治木吊潮熱 鈎藤 參 各半

蠍 天 分

各一犀 甘

炙各半分

右為末每服一錢水煎

一△發搐

傳男發搐

赤茶

右視無聲右視有聲

女發搐

目右視無聲左

視有聲

寅卯辰時發搐潮熱目上視手足動搖口流熱涎顎前急
此肝木太旺當補腎抑肝 補腎地黃丸 括肝瀉青丸
巳午未時發搐潮熱散驚慄目上視白睛赤牙關緊急口
流涎手足動搖此心火太旺當補肝瀉心 補肝地黃丸
瀉心道寸赤散 凉敬馬丸主之

申酉戌時發搐潮熱搐而喘目微斜視睡則露睛手足冷
大便下淡黃水此肺病當補脾而抑心肝 補脾益黃散
抑心道寸赤散 抑肝瀉青丸

亥子丑時發搐潮熱不堪搐而卧不穩身躰溫無壯熱目睛
緊斜視喉中有痰太便銀褐色乳食不消多睡不醒當補
脾抑心 補脾益黃散 抑心道寸赤散 凉敬馬丸

傷風發搐口中氣熱呵欠煩悶手足動搖當然散入 大青
搐退用白餅子後服安神丸

百日內發有真假一證真者不過三二次必死 假者發

搐不為重真者內生散驚瘡假者外傷風冷蓋血氣未
實不能勝邪乃發搐也奚知假者中氣出熱也治之宜
發散 大青膏主之及用塗顱法與浴體法

地黃丸 在 行運 之内

涼敬馬丸 膽 風 熏 各三鉤

鈎藤二連一兩 腸 一牛

麝各一

字右為未麥麪糊丸如黍米大每服三五丸至一二十九

金銀湯送下

益黃散 在肚瀉之內

大青膏

治小兒傷風吐瀉心溫下涼止熱

天黛各一

白附

一冬半 蝎尾去毒烏蛇肉

酒浸乾研砂

竺

麝各一

丁字

右為

未生密和成膏

每服半皂子大或一丁皂子大月

中兒粳米大同牛黃膏溫薄苛水化

一處服之五歲已上

同膏露飲

服錢本有禾麻無木青

牛黃膏

治熱及傷風壯熱引飲

雄

甘

甜硝

寒

生各

二分半 蘇金

一茶末豆粉五

腦

右為未密和成膏薄苛

水化下半

皂子大食後服

甘露飲

在吐瀉內白餅子在吐瀉安神丸

之內

夜啼

塗顱法

麝 蟠蚣末 牛 熏

各一 蝎尾去毒薄苛葉

半右為未熟束束肉為膏新綿上塗勻貼顱上四方可出

天

二冬半 蝎尾去毒各半

麝

右為末每用三錢水三碗帶筆

桃枝

一握同前至十數佛溫熱浴之勿浴背

一馬脾風

謂暴喘也

牛黃奪命散

白丑 黑丑 各半 生半熟大

取頭末五十粒 檀各一

右為未三歲兒一錢冷漿水調下涎多加輕粉如無加

無價散

治風熱喘促悶亂不安俗呼馬脾風

珠蜜少許半水輕半

甘遂

一冬半麯

包煮焙乾

右為末每服一字用溫漿水少許滴香油

一點抄藥

在油上沈下去却漿水灌之

丁方加滑石二錢名油蔭膏。暴喘俗呼馬脾風。大便石冷急下之用牛黃奪命散。下之次用白虎湯平之。

一、噤風

○林眼閉口噤啼聲慟少舌上聚肉如粟米狀。吮乳不得口吐白沫。二便不通。蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾。故見於喉舌或為風邪所搏致之宜。

辰砂膏

辰砂

牙硝各一

不半玄明粉

紅

蟬

真珠各一

水

一

麝
麝字右為末。油紙包自然成膏。每用一豆許。乳汁調敷乳頭上。吮金銀薄荷湯下亦可。有潮熱青草湯下。

單方

治初生七日口噤

牛黃

一錢細研以竹瀝調一等灌之。

一、癪證

五十

○凡治小兒五癧皆當用龍膽草治之。並五色丸治之。五癧重者死病後甚者亦死。

○惠風癇廢手足如癱或口喎

食癇

傷肉

食肢

搐角弓反

○張太醫聲吐食方定驚癇廢頭目吊口目或昏或邪視。

痰癇似狂耳不聞目不視如夢如醉或月發或經年發。

飲癇手足搐動食不知飽或數日不食寐中發飽亦發。

○林風熱驚駭不時旋運潮搐吐痰沫忽然倒地不省人事。

名曰癇。

先身熱掣痰驚啼而後發癇脉浮者為陽癇易治。

先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沈者為陰癇難治。

○治風癇之法大率行痰為主。

星半萎連尋痰

星半萎連尋痰

尋火分多少治之。

傳五色丸

硃 琥珀

各五分

水銀二分

兩雄

三分

黑鉛二分

兩同

水銀熟右火

分

丸如麻子大每服三四丸金銀薄苛湯下

林硃砂滾涎丸

治五癇一硃

白礬生赤石

硝石各等

右為末研蒜膏丸如豆大每服三十丸食後荆芥湯下

參朱丸 治癇大神妙

參蛤

朱砂

右為末猪心血丸

如梧子大每服三十丸金銀湯下

灸法 神庭丁穴

在天柱骨

際五分

治角弓反張

羊瘧

吐舌灸三壯

少衝二穴 在手小指端內廉

治驚癇

吐舌沫

出灸三壯

長強一穴 在脊

離端

治驚癇

灸五壯

惠治急慢驚風危証及諸癇症病

絳帛縛兩手足太指

甲角縫半甲半肉之間灸三壯先足後手或髮際或顙會

△

痖證

五十一

舟蛾

同小兒嬌嫩飽則

陽傷飲食不調

腹脹

腰疼

肌肉光紫最難治

傳一五疳併雜疳

惠

林

加三十六

搖頭

揉鼻咬甲

寒熱

利口鼻

而卧筋生

青黃

高臘瘦

當補肝

宜地黃丸

或生熟地黃湯

髮立肉色青黃高臘瘦當補肝宜地黃丸或生熟地黃湯

心痛面黃臉赤煩滿壯熱口瘡虛散當補心宜安神丸或

黃連丸

脾疳躄黃肚大吮泥土脹滿氣羸利口酸臭當補脾宜

益黃散

肺痛欬嗽氣迷多喘揉鼻咬甲寒熱口鼻生瘡當補脾

此虛者補母也宜益黃散或清肺湯主之

○

腎疳躄瘦身有瘡疥寒熱時作頭極熱足冷如冰當補

腎宜地黃丸

一

卷之三

三十七

筋痛、漏血而瘦、當補肝地黃丸

骨病、喜外冷地當補腎地黃丸

內病、目腫、腹脹、利色無常、或沫青白漸而瘦弱此冷

証也、宜木香丸

外病、鼻下赤爛、自操鼻頭有瘡不結痂遠耳而生瘡、治瘡爛宜蘭香散

白粉散

熟病、潮熱如火、大便乾澀、肌肉黃瘦、雀目宜胡黃連丸、冷病、時時泄瀉、虛汗如雨、不止宜至聖丸

脊痛、虫食脊骨、身熱下痢、羸瘦頻咬指甲、大蘆薈丸、蛇病、食肉太早、或腸胃停蓄肥贓、其証多啼嘔吐、清水

腹痛、腹滿、唇紫黑、腸頭及齒痒、宜下魚丸

臘麻上焦壅熱帶、瘡由上熱、鼻中赤痒、辨熱、啼叫、皮毛

走馬牙病、牙齦潰爛、由藏府虛熱、乳食不調致成病

病內有瘡、虫上蝕、齒牙腫、爛消黑口多臭氣

尿白、乳哺失節、脾傷便濁白色久而成病、宜茯苓散

地黃丸 在行遲之內

○林生熟地黃湯 生地 熟地 茯 赤苓 枳 杏 連

半 天 甘炙地骨 歸各等

右每服二錢水一盞姜三分

片黑豆十五粒煎半盞服

傳安神丸 在敵驚風之内

治邪熱驚叫心病、面黃頰赤壯熱

益黃散 在吐瀉、治脾胃虛寒、脾病、躄黃腹大食生口

鼻生瘡

○林清肺湯 治肺病咳嗽、搃鼻咬甲寒熱

桑桑蘇

前芩 飯 天門 竿 風 赤苓 桔 生地 甘

各

二丸右每服二錢水丁盞煎服

○傳木香丸 治瘦消

木青 桔 蔴

各二

鹿麝一續隨

一兩蝦蟆

大者三丸右為末燒存性

蜜丸如豆大每服三

丸至二十丸薄苛湯送下

胡黃連丸 治肥熱消

胡連 川連

各半

硃砂二丸

右為末和勻入猪膽內用淡漿煮以杖子置銚子上用

練鈎之勿著底候一炊時取出研入蘆薈 鹿麝香各

飯丸如麻子大每服五七丸至二十丸米飲下

林有青

熏木蝦蟆

去足燒

蘭香散

治外疳鼻下赤爛

蘭香

葉莖各二

半

輕粉各半

右為末乾付之

粉一七

右和勻先用清將水洗瘡拭乾付之

○林至聖丸

治冷病時時泄瀉虛汗不止

木丁皮

丁香朴 史君肉焙陳

蔻

濕帶累煨右為末麪糊丸如

大蘆薈丸

治脊疳

荳

蕪木木

連各

分蟬退二十個胡連五個麝少許右為末

猪膽二个取汁浸半丸

麻子大每服二十九米飲下

下禹丸

治蛇疳

新白苦練根皮

酒浸綠色貫衆木

桃

蕪

焙谷雞心換掉三亂炒一輕半乾蝦蟆

炙燒取肉右為末

史五十介

右為末麪糊丸如

菉豆大每服二十丸天明用

清肉汁

下加歸連各二

半治脊疳及疳勞

麝麝香散 治鼻竇瘍鼻下連唇生瘡赤爛 麝麝半

雄 升 各二枯礬粉五分右為末人乳調敷

茯苓散

治尿白久而成瘍亦心膈伏熱兼而得之

稜 煙莪 縮 赤苓各五分

青陳 滉 甘 炙各二分右為末

每服二錢麥門冬、灯心煎湯調下

○傳如聖丸 治冷熱病瀉 使

大根胡連 川連 白芷去皮

炒乾蝦蟆粉酒半斤成膏鹿射半分右為末

蝦蟆膏菖蒲和丸如

麻子大二三歲兒五七丸已上至十五丸入參湯下

香蟾丸 治疳消食積虫積肉積及治腹脹大

稜 菴 青 陳 曲炒麥蘖曲炒膽 按各五分川練子去核使

胡連 川連各四分一乾蟾五分乾蟾用醋煮熟

或菖蒲加藥如乾蟾丸如麻子大每服十五丸清米飲

蘆薈丸 治疳氣腹脹骨熱 薈木 楊各二分蝦蟆

炙去皮連各二分蕷去青 陳各五分凹三七粒去蕊同上四味炒去殼右為末

膽汁丸如小豆大三歲兒三十九米湯下

又方 治疳積腹大 胡連 魏醋浸各分麌四粒當門子川連

炒曲炒各分右為末猪膽汁和丸如麻子大每服三十九白朮

湯送下 一方有芦薈半分

祖傳 桑榔丸 治疳疾積塊腹大有虫等証 楊一

稜 煙莪 醋炒各半分青芙蓉去白各半分蕷二分雷去殼

三冬漆五分炒木三分不見火良二分壁縮一麥蘖麪五分甘

畧炒漆無煙木見火土同炒縮分麥蘖麪五分甘

多胡連各三分炒黃山楂肉各五分右為末醋糊丸如棗豆大

每服三十九空心淡姜湯下

○林五疳保童丸 治五疳五藏之蓋 小兒骨肉輕軟 腸胃微細

如乳哺有節則藏府相調或乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及小兒百辟以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥膩甘酸之物即成五疳並皆治之連 草龍膽

白鱠 青皮 五倍 蟬頭 棍根 夜明砂 炒雄 廉麝

薰 天漿子 熊膽 蒼 胡連各一右為朱糯米糊丸

麻子大一歲兒 每服一丸米飲下日三服一方有乾蟾牛微炒十分

化虫丸 治因疳生蟲五心煩熱曲炒芽茶分各

右為朱麪糊丸參米大空心米飲下煉蜜丸名蕪荑丸

菉豆大每服十丸至十五丸米湯下

肥兒丸 治諸疳多因闌乳嚥食太早因患泄瀉胃虛

動月漸羸瘦腹大不能行髮堅發熱無精神

右為朱麪糊丸蘿蔔子大每服二三十九量兒歲數加

減熟水下

一方 治諸疳便桶中蛆河水浸三百新瓦上頻放外以

火燭乾為末與兒亦治走馬疳貼患處良

蝦蟆丸 治五疳腹脹面黃身瘦寒熱嘔泥搽鼻竇咬甲頭

翳不長肌肉瘡癬吐乳食利色不定日漸黃瘦上

蝦 史炒取皂角燒各十
二兩 黑半
兩 雄水飛石為末

水糊丸粟米大一歲七丸乳米飲下

一方 治疳病 楊史肉陳 蒼各二輕貼右為末每

服一錢飯湯空心調服同肉食亦可次日有虫從糞而出

灸法 痘瘍灸翠尾骨上三壯

脇滿瀉利積取外腹痛痰涎寒熱瘦黃 炙脾俞二穴

各七壯

一△無草辛府毒

○惠_婦腦後項邊有核如彈按之轉動而不痛其間有虫如米粉不速破之則隨氣流散滯食藏府以肢身作瘡便利膿血壯熱羸瘦頭額露骨高者由氣血虛憊所致用三元鍼刺破膏藥貼而愈

○林_{小兒}衣服勿晒月下被惡鳥羽屎落遂成無草辛之疾
蛔蟲丸 治無草辛府毒項邊結核如瘰癧按之不疼兼治諸病一服虛熱退二服渴止三服瀉利止

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大右取糞蟲一杓置桶中以尿浸之桶要乾不令虫走却將桶口封了叔投桶中任虫自食一日夜必死布袋盡包繩系定置桶水浸一宿取出

丸米飲下

一方

白蘿蔔連

胡連

熏各五

蛔蟲去足用

丸如粟米大每服二十丸食後米飲下

一△府瘡

附丹毒

癰瘍

耳瘡

婦癰

鼻瘡

○惠_{自孩提至成童}潮熱發瘡乃府氣使然府虫蝕其肌膚

遍身熱瘡發渴無已

林

○小兒一二歲頭及遍身生瘡皆因在胎中父母交合所致名曰胎瘡先用化毒丹消毒飲却用父小便以鵝翎刷洗

青黛細末乾擦之效二方並見痘部

平血飲 治諸般瘡毒

敗毒散 加生姜 生地

門冬

薄苛煎服 一方有葛芍升 天麻

瘡瘍多生面部耳前陰乳母嚼白米成膏臨卧塗之五次

効忌鷦鷯魚動風物

丹遊走不定燃赤腫痛 寒水膏連 相右為末水調

刷患處

一方 青黛 土朱右為末井水入蜜調敷

一方 黃丹 用麻刀水調刷

丹毒腫痛如火 大黃 朴硝等為末水調塗立效

藍青散

一名藍葉散 方見治丹毒赤腫身熱如火

○小兒赤瘤熱毒鬱結肉間發皮膚赤如瘤宜生地通

荆芍桃苦帶表之劑

外芩翹連之煎湯入

防已散 巴朴硝犀芩茂升

各二分半右入竹葉五斤

水煎與之

治自禿瘡及髮中生瘡取熊脂付之

又搗榆白皮醋和涂之出即生髮即生

又白禿髮不生

濃煮陳香薷汁少許和胡粉傅上

又小兒頭無髮

鯛魚燒末將膏汁和傅之

金線錠子 治走馬牙瘡凡貼疳無如此藥最効

人言一雄二女乾胭脂拌飛羅麪右為末水和用米泔洗貼患處

銅青散

治口內瘡瘍并齦潰爛

芷五分研

銅青

各一麝字右為末擦之仍服

蟾酥丸 治諸瘡穀魚止腹痛退虛熱

蟾蜍 一粒去油

胡連 川連 膽 練珠 史君 殼 蘭各一 麋射 半

粒去肉 陳各一 右為末猪膽汁丸或糊丸青黛為衣紫

椒油 薑 炒陳各兩 蘇湯下

一捻金散 治走牙疳

黃丹 飛白礬 飛青鹽 飛草綿

麋射 託右等分為末先溫水洗淨乾貼

蟾酥散

治走馬牙疳及鼻下連唇生瘡赤爛

麋射

雄 升麻各二枯凡五右為末入乳調付

一方 熊膽 湯化塗鼻中

小兒丹煩 柳葉竹水煮去滓洗日七八度

小兒癬瘡

蛇床末和豬脂塗之

小兒頭面身上諸瘡

蛇蛻末和豬脂傅之

又黃連未傳之

又燒蚯蚓屎豬脂調傅之

又黃連枯凡未傳之

洗瘡立癬

芷 苦參 腹等煎湯淋洗尤妙

又柏 甘 馬鞭草

連鬚葱 荆等水煎洗

赤芍 連 蛇床

等輕分輕許右為末香油調敷

△痘疹

五十二

○傳小兒瘡疹大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭昏

乍寒乍熱嘔噴呵欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得者有時氣傳染而得者有因傷寒發熱嘔吐而得者或目

竄敬驚搐如風之狀或口舌咽喉肚腹疼痛或自汗或下利

或發熱或不發熱證候多端卒未易辨必須以耳冷尾冷驗

之蓋瘡疹屬陽取目藏無証其耳與尾俱屬目故目之所部

獨冷又不如視其耳後有紅脉赤縷為之真

○傷寒男賊重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵欠頭悶項

急也

痘疹腮赤多嘔噴慄勤昏倦四肢冷尻冷

傷寒太便酸臭腹堅不消化畏食寢下之

索舌曰傷風皮薄拘急鼻塞癰疹睡中驚喎欠喫

一、辨内外因併疑似

○傳凡瘡欲出未出因發搐者是外感風寒之邪而內發心熱

也宜惺惺散或外麻葛根湯參蘇飲

○傳瘡疹覺身熱似傷寒疑似未創先與惺惺散或參蘇飲

熱者升麻葛根湯人參敗毒散若見紅點者便忌葛

根湯恐得表虛也

○林古方以升麻葛根湯治瘡疹已發未發世習以為常蓋

葛根升麻性皆寒損胃氣凝血脉不能發起

○傳凡熱不可驟去道輕解之蓋痘瘡無熱則不能發起此之

種豆植天時暄煖則易生

○凡瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷呵欠嗽面赤必是出痘之

候宜升麻葛根湯加大力子山楂痘必稀而易愈

一、治法

○傳痘未出已出之時辰砂細末看兒大小或一錢或半錢蜜

水調服多者可少少者可無

目錄五

八十七

又絲瓜近帶三寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃入硃砂左妙

痘瘡發熱之時以惡實子為末蜜調貼額門止免眼障痘初出頭有胸前若稠密急宜服消毒飲加查芩洗紫草減食者加參

痘初出之時色白者便當大補氣血參木芍甘葛升

葛甘木丁

歸酒白芍

如太便泄瀉加阿魏

芍甘葛升

初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參芍等

實表之藥防其難癧也

初起發時煩躁譫語狂渴引飲水則後來厭面不脅急以涼藥

解其標如益元散之類或去桂五苓散

紫草飲子紫草木香湯快斑湯絲瓜湯之類

瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黃湯

凡痘瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒芩連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

治痘太法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑兼而

治之此平治之法也

溫如芍歸木輩

涼如前葛

升葷仇之以白芍芍枳桔羌通紫草之屬

顏色正者以前法平治則安將成就脚色淡者宜助血藥

色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒芩連

歸芍酒芍之類甚者必用犀角蓋犀角大解痕毒

消息大小便如小便赤瀉者大連翹湯 甘露飲 大便
秘結內煩外熱者小柴加枳殼或少服四順清涼飲子
太便黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但少用化毒湯
可也若二便一有秘結則腸胃雍遏脉結氣滯毒氣無
從發泄目閉聲啞肌肉黧黑不緩踵而變矣

太熱當利小便宜五苓散 道赤散

小熱當解毒宜消毒

飲 四聖散

按陳氏木香散

異功散乃從治之法又

謂之熱因熱用也蓋痘瘡熱毒怫鬱于內而不得起發
故用丁附木蔻桂等辛散劫鬱之劑一二服劫

而開之使鬱鬱于內者盡因藥氣而發越于外故陷伏灰白
色者皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過剝如一二
服後初不起者亦不可多與多則反其毒轉增黑爛咽喉

聲沉而死

凡痘瘡瘍灰色自淨者作寒紫黑色者齊湧者煩躁者作
熟 黑屬血熱涼血為主 白屬氣虛補氣為主 中黑陷

而外白起得遲者則相兼而治

凡痘瘡氣虛者參木加解毒藥 連各解毒
解毒藥酒炒芩 連各解毒藥

血虛者四物湯加

凡痘瘡雖分氣血虛實大抵多屬氣血不足有挾外邪而
實者少加防風等藥

瘡乾者宜退火止用輕清之劑荆苦升葛之類

瘡濕者肌表間有濕也宜瀉濕芷 風之類蓋風藥能

勝濕也

咽喉痛者如聖散 鼠粘子湯

喘滿氣壅者

アサガホ

麻黃黃芩湯

煩渴者

甘草散

烏梅湯

下利嘔逆者

木香理中湯

凡痘瘡當分表裏實，吐瀉少食為裏虛。

不吐瀉能食為裏實，裏實而補則結雍，毒留伏角。

壓灰白色者為表虛。

紅活凸綻者為表實。

其表則潰爛而不能結痂也。

表虛不起發者或用燒人屎。

寶驗其表則潰爛而不結痂也。

表虛不起發者或用燒人屎。

黑陷甚者用燒人屎別用無病小兒糞燒存性蜜水。

調服一丁方用入猫猪犬四糞於臘月燒灰名萬金散。

黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒茲紫草各

參等藥陷入者加味四聖散更以胡荽酒薄付其身。

散入木香煎服若其瘡已黑可用宣風湯加青皮。

錢氏云黑陷青紫者百样九下之不黑者慎勿下。

又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者為逕又云百祥九恐太峻當以宣風散代之瀉後溫脾用參

苓木等朴甘半減為妙。

瘡瘍者實則脉有力氣壯虛則脉無力氣怯。

虛症實表之劑加涼血藥實症如大便不通者以大黃等藥少與之下其結審異氣怯輕者用淡蜜水調滑石末鵝翎刷瘡上潤之。

將厭面時金白色如豆殼者蓋因初起時飲水多其厭不齊名曰倒厭不好宜服實表之藥及消憇二便瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲變者氣病。

也宜補肺散加生芪，瘡出而聲不出者形氣俱病也。

身溫者宜解毒防風湯。太便閉者宜當歸丸。

形氣俱病，稟賦素弱者宜預服十奇散。信歸少加木香煎服。

陽証足腔熱，腮紅太便秘，小便澀渴不止，氣急脈洪數已上，証

不可服熱藥。瘡一發便密如蚕鍾，布藥宜清表連翹升

麻湯。瘡出不快，清便自調，和其在氣升麻葛根湯。若瘡

乾黑陷身不快，熱太小便滯滯，是熱蓋於內，宜煎大黃湯。

下宣風散。如表太熱者不可下。黑陷甚者百祥丸。

若瘡已發，稠密微喘，渴欲飲水，宜微下之。當歸丸及龐氏

地黃膏，外以黃柏真臘塗面佳。

陰証足腔冷，腹虛脹糞，青面皓白，嘔乳食，目睛青脈沉微

已上，証不可服寒藥。痘出四肢逆冷，或自利，宜急溫。

附子理中湯

調中丸

痘瘡平塌灰白色不澤

興功散。

附子理中湯

調中丸

痘瘡平塌灰白色不澤

比正氣不足，宜十補托裏散倍芪，加附或四肢厥逆時，搐

搦宜溫之興功散加青風，或和中散去葛藿，加附桂

附桂

附桂

痘瘡平塌灰白色不澤

肺氣不足之証，自汗聲不出，瘡頭陷塌，不綻胞，並宜十奇散。

附桂

附桂

痘瘡平塌灰白色不澤

自汗倍芪，聲不出倍桔。

附桂

附桂

痘瘡平塌灰白色不澤

心血不足之証，灰白色，根窠不紅，不光澤，並宜芍藥湯加

芍藥，紅草。

附桂

附桂

痘瘡平塌灰白色不澤

△痘瘡日數輕重

○痘瘡二三日始見，微微欲出，如粟米，或如

豆蔻

豆蔻

痘瘡平塌灰白色不澤

水珠，光澤明淨者佳。

豆蔻

豆蔻

痘瘡平塌灰白色不澤

四目晝大小不等，根窠紅光澤者，輕稠密陷頂，灰曰色渴而
渴者重。

豆蔻

豆蔻

痘瘡平塌灰白色不澤

六月七日瘡形肥紅光澤者輕身熱氣喘口乾腹脹足指冷

者重

八月九日長足紅滿瘡蠟色者輕寒戰慄亂腹脹煩渴氣急咬牙者重之至也

十日十一日瘡當結盤加欲落之時將愈

十二日十三日當厭面而不厭面者為逆身熱稍利之以防其餘毒身不壯熱或腹脹或渴渴用十二味異功散救之

一痘出不快者有五證

一証天時嚴寒為寒所折不能起毀宜散寒溫裏紅斑初見

宜用五積散 正氣散 參蘇飲 調解散 木香散

一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生

者白虎加水參湯一輕者入參竹葉湯加生地煎服

一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯

吐利甚者加附子或異功散 木香散 豆蔻丸

一証或成血庖一半尚是紅點此毒氣發越不透必不能食大便如常者宜半溫表半助養之劑用四聖散加減及紫草木香湯 絲瓜湯 阮氏萬全散 陽氏安斑湯

一証外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲 透肌散 如大使秘於消毒飲內加大黃 拖子

煎服瘡出太稠宜犀角地黃湯 解毒防風湯 血氣不足十奇散 咽嗌不利如聖湯加枳 茯苓口中氣熱咽痛口苦生瘡宜甘露飲子

一解肌清熱之劑

用金五

ナニ

○傳王氏惺惺散林治風熱瘡疹癰癩蒸吐熱疑似之間皆宜服
木炒桔細參芩甘炙括各三錢右入薄荷三錢煎
升麻葛根湯林傷風身熱未萌痘與不痘宜服如旣出不可服

葛升芍甘分右等分水煎

木香曰矣多蘇飲
參分蘇
桔葛前各四陳
芩各半枳

炒三分半木一分半右作三

參三分蘇 桔葛前各
一右作三服加生姜三片

卷之二

新種

醫學半身

右水煎或為末湯調下

已出熱未解者

卷之三

半水半風右水生甘

傳十奇散即托裏十補散芩參歸各二朴桔桂各一桂分
又芩參歸各一朴桔桂各一桂分
芎風甘芷水名各右為末每服一錢或二錢溫酒調下

水煎亦可

補肺散膠一兩半牛炒成珠半分、馬兜半分甘杏三分去皮糯米一兩

加生半茶匙右水煎食後與之

芎歸湯

一△散寒溫表之劑

○傳五穀散芷

陳去極炒麻
白卜

別卷第十一

仁三用示一
正氣散

右作二服加姜三片大棗一枚水煎

調解散

或治食傷
痘瘻陷

青陳枳桔炒參半芍通

葛各四甘

分

蘇各一右作二服加姜三片棗丁枚

一方有紫

葛根糯米

補中溫養之劑

四君子湯

參木芩各一甘半右加縮

陳名六君子湯

木香散木腹參桂青赤芩前

詞根去半

附炮各右加姜三片棗一枚水煎

和中散

朴

姜制衣炒木半姜炮甘炙各

右加姜丁片水煎

附炮各右加姜三片水煎

附炮各右加姜三片水煎

附炮各右加姜三片水煎

附炮各右加姜三片水煎

理中湯

參甘炙木

姜炮各右作二服加炮附

附炮各右作二服加炮附

附炮各右作二服加炮附

附炮各右作二服加炮附

附炮各右作二服加炮附

附炮各右作二服加炮附

木香散

木腹參桂青赤芩前

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

異功散

木歸酒桂

木炒芩陳朴參蔻

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

丁香

甘分三

右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

附炮各右作二服加姜三片棗一枚水煎

調中丸

木炒參

甘半兩姜炮各半兩

右為末炒糊丸如黍米大每服三十丸異功散送下

右為末煉蜜丸如豆大

右為末煉蜜丸如豆大

右為末煉蜜丸如豆大

右為末煉蜜丸如豆大

肉豆蔻散

木縮白龍骨

肉桂赤石柏子仁半

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

蔻

半兩麪裹煨入

右為末麪糊丸如黍米大每服三十丸異功散送下

犀角地黃湯

生地熟地並酒

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

連翹升麻湯

升麻葛根湯

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

甘露飲子

生地熟地並酒

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

芩斛

茵甘分

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

紫草湯

一名紫草木香湯

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

四聖散

林治痘出不快及倒廝

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

附炮各半兩

麸炒甘半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

附炮各半水煎

透肌散
〔一名化毒湯〕每服三
錢米五十粒
紫草芽
綠升麻
甘草一
錢

右水煎或與消毒飲同煎尤妙

右水煎或與清毒飲同煎尤妙
○如聖湯 治身熱如火頭痛頰赤痘瘡已出未出並宜服
川芍十 蒜各二寸 紫草 通去節各一每服二三

白芍
升葛
甘草
紫草
连一两
不生附子
麦姜三等葱当二根同水煎服
壮热心烦加参
赤苓

金華子

紫草木通湯 治痘出不快 紫參通筋芩 糜米

各等甘酒右水煎

快透散

右水前

連翹散

右水

一和

○小紫胡

卷之二

人參白鹿

卷之三

金匱要略

米飲調

一通

傳此系雷相

當歸丸

卷之二

歸半兩連一冬二余半甘

卷之三

一、右先以當歸、芍藥、川芎入三味末為末。如胡蘿大三歲已下，兒十九食前清米飲下漸加以利為度。

宣風散

換效陳

甘各半

黑丑

四兩

頭

右為末

蜜湯調

服林氣怯者加木香

各半

先下

黑糞

次下

褐糞

後以四君

子湯加朴木

陳米湯

服和胃良久糞黃

瘡自出

透

百祥丸

紅升大戟

陰乾水

煮軟去魯

日乾復

右

一味蒸餅丸

如粟米大每服三十丸赤芝麻湯下

一、痘毒攻口舌

○林加味犀角消毒飲

治毒氣壅遏壯熱心煩痘瘍雖出

未能勻透口舌生瘍不能吮乳

牛

炒研荆穗

門

桔

各半

升各一

風

升各七

犀

右水煎

牛

炒一兩

甘

射干

各半

右水煎

五福化毒丹

治瘡瘍餘毒上致口齒參玄參黛

甘牙硝枯過各苓

桔各一

鹿角

腦各半

一方無腦子有

金銀箔右為末煉蜜丸每兩作十二丸一歲兒一丸分作

四服用薄苛湯化下

口舌生瘍者蜜漬黃柏汁飲之

一、痘疹入眼

忌藏鹽

鰣溫麪炙婢炒

清調下

撥雲散

羌

風

紫

甘

各等分

為末水煎服或薄苛汁

茶清或菊花苗煎湯調服

林蟬菊散

治癰瘡入眼或病後生翳障

蟬白菊花

治

癰瘡

入眼

或病後生

翳障

蟬白菊花

治

癰瘡

入眼

或病後生

翳障

蟬白菊花

治

癰瘡

入眼

或病後生

翳障

蟬白菊花

各等右每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後眼之屢驗
 決明丸 治痘瘡入眼雖赤白障翳遮睛但瞳子不瞯者
 可治 石決明 蝦草 柏各一莖五加黃連右為末用兎
 肝燭搜和丸如菉豆大每服二三十丸食後臨卧米泔下
 主蟬花無比散 治瘡疹入眼 苓 甘風各四石決鹽水
 務 蝦草 差 歸各三赤芍十三蕎藜炒去皮兩
 炒十蛇蛻各一右為末食後米泔調服茶清亦可
 林洗方 黃連剉白滑石研銅青研右綃包湯候溫洗眼
 治出疹眼內有翳輕粉 黃丹各等右研勻左眼翳吹入右
 耳內右吹左

一△痘後餘毒

惠痘癰者毒氣當出而不得出流於脾經則癆發四肢手
 腕膝腫脹或頭項胸腹赤腫宜消毒飲或五香連翹散
解之未咸膿者小柴胡加減用之重者或面赤便祕或渴嗽
 睡驚尿赤澁十六味流氣飲加附或加大黃
如禦受性弱虛後面青不能飲食身躄倦怠無熱証與調
 平藥安養之不可一於解利也虛則十補湯加枳桔
○傳痘後癰毒不問發於何經初起紅腫時可用黑棗赤三
 豆以嚴醋浸研漿以鵝翎刷之効

必勝膏 馬齒莧汁猪脂石蜜右共熬為膏塗腫處
 蛤子水 蛤子滋者以水養五日取水
 毒氣入太腸則便膿血或下腸垢或大便秘結宜用屋角地
 黃湯 身煩熱渴宜黃連解毒湯熱盛者小承氣湯
 下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐車丸

痘後一旬不^ス太便其糞燥作痛用大芒

巴等

及蜜導及服香油一盃不通令一婢以真麻油含口內用小竹筒內^ヲ穀道中吹入腸內須臾即通

消毒飲

前前在

五香連翹湯

乳木沉丁

翹射干升

通

桑寄獨

大

麝各等水煎

小柴胡湯

方在前

愈後瘀已落其瘢黑或凹或凸瓦粉輕右研豬脂調金

十六味流氣飲參芪

飯各一

芎桂朴芷甘

風鳥梔芍枳

木各半桔

三蘇一水右水煎

氣血虛而自利者加熟附木便實加大黃

十補湯

一名十奇散方見前

黃連解毒湯

連芩柏梔

各三右

小承氣湯大朴實

各半右

○小黃連阿膠丸白豆蔻苓

各一兩

連微炒右為末

阿膠一兩醋煎和丸如粟米大一歲兒十粒米湯下

駐車丸連

兩膠

辰各一

姜一炮右為末

○若又痘疹後再作瘡疹者此餘毒未盡也宜解利之氣

虛者未可解利

一中地風

○惠痘疹愈後忽遍身青或黑手足厥冷口噤涎喘如鋸者

此名中地風蓋瘡疹方愈燐衛尚弱而暴感時令寒暑

風雨地氣毒氣襲虛而入致之宜消風散入蟬蛻各分

三服酒生姜薄荷汁數點湯調二三服立醒或少汗而

解或再出癰疹而愈

消風散

荆

甘

炒各二兩

陳半兩

參

芩

桑

炒風

芎

蟬蛻

炒藿各二兩

朴

羌

一兩右為末

一斑癰水痘

附溫毒發斑

○林小兒斑駭癰毒之病俗言癰子是肺胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時氣所作薰發於膚狀如蚊蚤所咬故赤斑遍身也凡發赤斑者十生一死發黑斑者十死一生又小兒時氣咳嗽聲重涕唾稠粘目眶焮赤煩熱渴躁此則肺胃蘊積熱毒發則易出一出遍於肌皮之上如泡子見而漸沒病在表受毒之淺此名癰子亦名膚瘡俗曰麻子或時行溫毒熱氣薰蒸而在裏受毒之深發皮膚遍躰狀似錦紋或如虫咬痕類小豆大或赤或黑是曰斑也不爲害但不能結痂則爛成瘡

葛根麥門冬散

治小兒熱毒發斑或赤或黑頭痛壯熱

心神煩悶

葛

門各三錢

參升

甘

炙二錢

芩

赤芍各二

冬高半兩

右水煎

生地黃散

治小兒癰子身熱口乾咳嗽心煩

生地半

門七杏炒去核

皮尖數

陳各三錢

甘炙二

右水煎

麥湯散

治小兒水痘

麻節大

濕紙裹

知

羌

甜夢

蘆

蘭紙參各一

滑

地骨

甘炙各半分

右為末

每服半錢水一

小盞入小麥七粒同煎溫服

○傳傷寒溫熱病而發斑如錦文名曰發斑皆熱毒之所致也是皆冬應寒而反溫人受不正氣故至春夏而發為斑爛

陽脈浮數而陰脈實大者名為溫毒治法用升斑湯

升麻葛根湯 玄參升麻湯 黑奴丸 黑膏之類

丹溪曰發斑屬氣熱挾痰而作通聖散中消息

戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑

內傷發斑者胃氣極虛一身之火遊行於外宜補以降之
疹屬痰與熱在肺戴曰浮者有顆粒者是也隨

化斑湯 即白虎加入參湯

升麻葛根湯 方見前

玄參升麻湯 治溫毒發斑咽痛煩躁譫語 玄參

升 甘 各半 右水煎

黑奴丸

治溫毒發斑煩躁太渴 荸 蓼底煤 梁土塵

苦

麻 炙突墨

小麥奴各一

大黃 一兩

右為

木

燥

蜜丸

三

分

生地

半

分

香豉

一

黑膏

如彈子大新汲水化服

如不渴不可與此藥

脉浮散屬陽沉伏屬陰用此消疫毒

生地

半

分

香豉

一

右細切以豬膏研合煎之取濃汁如膏用雄黃麝香如

豆大內中攢和勻每服用彈子大白湯化下

防風通聖散

風 苟 鄭 白芍 大 芒 魁 苛

麻各四

膏

桔

芩各八

木

梔

荆各三

滑

二

分

甘草

四

分

甘草

四

分

甘草

四

分

右加姜水煎

犀角消毒飲

治發斑癰瘍等証

牛

四

分

荆穗

二

分

風

各

二

分

風

冬甘一犀一

冬甘

一

犀

一

分

另

鑄

右

水煎

調犀末服

不入湯煎

一

錢

右

水煎

方見前

治發斑及癰瘍

瘍瘍

痛

如

前

解毒

防風

湯

方見前

治發斑及癰瘍

瘍瘍

痛

如

前

陰毒升麻葛根湯

治陰斑

升

水

歸

甘

各一

分

蜀

根

二

分

蜀

根

十

粒散魚炙一雄四分右水煎調雄末服入

加味羌活散 治感四時不正之氣發癰疹 入另研右水煎調雄末服入

參 桔 甘草枳椇天麻 茄 苓 各半蟬 茄各三右作

一服加姜三斤

調中湯

治內傷外感所發陰斑

蒼 一茶半 陳 一茶半 緩 蒼

芍 焙甘草桔

芷 半

羨

枳 各七分

芍 五分

麻去枝 各三分

右作十服加生姜三斤

加味敗毒散 治瘧疾及癰瘍等証

羨 獨 前

芍

枳 桔

參

芩 各五分

甘

苟 各二分

半加木

風

荆

蒼 身熱甚宜木香參蘇飲 或瘡瘍密密宜十奇散倍芍

歸 減桂加莎 乌 如胎已五月則桂心半夏之屬俱不

虛而感風溫致發斑者服之良

一孕婦痘瘡

○凡孕婦發痘宜草胎散胎動不安宜獨聖王散安胎飲身熱甚宜木香參蘇飲或瘡瘍密密宜十奇散倍芍歸減桂加莎烏如胎已五月則桂心半夏之屬俱不虛而感風溫致發斑者服之良

必禁

草胎散 赤苓 木 歸 白芍 赤芍 葛 北柴 參

桔 條芩 風 陳 荆 枳 紫草 膠 糯 芝

芍 縮 太熱加鬱金

各三分

右作十服水

一盡半煎至一盡

乾柿蒂七箇野芍根七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎 論葉解定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服 獨聖王散 用連殼縮砂慢火炒去殼為末每服半匙熱酒

調下胎動則服後覺胎熱則安

安胎飲 腹

酒洗淨焙乾再與豆汁混

參 陳 李 白芍 歸 芍 縮

香附米童便蘇芩甘

各半右涼一服水一盞半斤中

水

七莖糯米一撮煎一盞食前溫服

一痘瘡膿汁不乾

○蓋瘡出太盛表虛難壓以致膿水粘衣着席溫痛不可

能轉側宜白龍散敗草散附之

白龍散黃牛糞日乾火煅成灰取心中白者為末帛裹擗之或又併於牛糞用

敗草散

用蓋屋及牆北上遠年府肉草洗淨焙乾為末帛裹擗之及鋪床席上佳或以麥麸摻席簾上可

一△惡證

痒塌寒戰咬牙渴不止痘紫黑色喘喝不寧灰色陷頂腹脹頭溫足冷悶亂飲水氣促泄瀉渴

○瘡正而出而吐利者困出而詛言不止者惡候

便益而出而詛言不止者惡候

便益而

乳食不化者脾虛已死

瀉血而瘡爛無膿不治

太小

便祕目閉聲啞肌黑者死遍身黑陷目閉無魂者死

面色青者死瘡後發散馬者危

面黑或鼻有黑氣

不治燥渴尿澀泄瀉不食者危

頭面腫瘡盡抓破

臭爛不可近或足冷至膝不治

面腫鼻陷目閉咬牙不治

痘瘡黑焦風攻頤額唇頃腫硬或胸膈高突不治

一△室中禁事并禳法

避風寒常和暖

忌生冷

忌聞諸穢氣

忌見外人

忌犯房色忌近月水婦人腋臭者

宜燒大黃艾灸以

辟惡氣燒木香亦佳勿燒沉檀

降真

乳香腦麝

幃帳之內宜懸胡荽或以胡荽漬酒噴床帳痘瘡最怕

百病之源

痘瘡最怕

穢惡之氣觸犯

痘不出方

○傳凡值天時不正，鄉隣痘瘡盛發，宜服禁方不出方。

三豆湯 油飲子 鳳龍膏

三豆湯 赤小豆 大黑豆 菜豆 各一升
水八升 煮豆為度 逐日空心任意食豆飲汁 七日永不出
油飲子 真麻油一升 逐日飲盡永不出

已上二方出扁鵲倉公

龍鳳膏 乌雞卵一隻 地龍一條 活者右以雞卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飯鍋上蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食二十枚亦好

一△雜方

傳

龐氏地黃膏 瘡已發稠密微喘渴欲飲水以此下之

生地四兩 雄牛膝一錢 右以豬膏一斤和勻露一宿煎五

六沸全分去丁絞去粗下雄黃射香攬勻稍稍飲之毒

從皮膚中出即愈

黃柏膏 瘡已發稠密用此塗面佳

柏

一兩去粗皮酒拌炒

菉豆一兩甘草四兩右為末以生芝麻油調從耳前至眼眶厚塗之日三丁次如用早能全瘡不至面繼有亦稀少

一方

有紅花二兩又云或只用乾胭脂塗眼四畔亦可

○林周天散 治痘黑陷腹脹直視喘急發搐

蟬退

五

地龍一兩右為末每服半錢太兒一錢研乳香湯調下連

進二服愈

奇方

治痘出不透腹痛甚或黑癰者

蟬蛻五十枚洗去足

乾

翹晒

右為末

每服一錢

白湯調下腹痛立止乳母亦可服一錢

又人齒散

治痘初出光壯忽然黑陷心煩性躁氣喘妄語

或見鬼神不速治毒氣入竈必死

人齒燒存

右為末每

齒作三服酒下

○傳活血散

治痘未出已出煩躁及瘡發身痛者

白芍一

味

為末

每服一錢

溫水調下

止痛酒

調方驗

痘四肢出不

快加防風

一方用赤芍一

阮氏萬金散

林氏萬全

治痘出不紅潤

風參

蟬等

分

右每服四錢水一盞薄荷三葉煎六分溫服

熱而

實者加升麻

絲瓜湯

絲瓜連皮子燒存性為末

每服一抄時時用米湯調

服此物發

痘瘡最妙

或紫草甘草煎湯調服尤可

寛永十三丙子仲春吉旦

雕用

二條玉屋町村上平樂寺



