

X

-128

F

1

-124

文日手札書の國の度



富士川文庫
1308

44

490.9
Ih-9

1938年7月3日
128

○こびシング
有

人風子本氣子確

一斤

丁子

四爻

生童連

三爻

右ニ味刻合メスリバテニテスリ絹二重ニ
包マクヲ成モシテ入具蓋ニ陽ニワカヌ
不トニメルソワカニハ湯ノイキニテキヌ
上二行ノコトクニ出其取束テ四ニシホリ
入丁自ルニサノ同ニカタニルシ其佐荷
ヒノ角ノアズヘテニ消心下湯ノ
強ク佛メハ藥汁モシシヅカラニ火シ
文ヘ半

○參茶白木散

葛花仁 蓮肉 粥梗合 所仁 竹錢
人參 白苓 山藥 皮皮 神曲
白扁豆 香附子 用草 黃連
當歸 黃芩 遠志 合二兩 白木二兩

○保童丹

一芥末 五兩 一三稜 三兩 一青皮 三兩
一丁香 一兩 一乾漆二兩或 一黃連 二方
一胡黃連 二方 一使君子 二方

右八味細末メ百草少加丸
用心病是類可用之

後學艸全重校

延壽醫院東井先

寃永戊辰孟春吉日

生類編醫方明鑑

命柱一字無訛

醫法明鑑卷第一 目錄

子 中風

一附癟婢

瘻麻

七 傷寒

二附中寒傷風瘧疫大頭病

感冒

中暑

三

中濕

四 七十三

癰疾

五

霍亂

六 七十六

內傷

七

生

八 十七

痢病

九

大

十 十九

痰飲

十一

巨

十二 附肺痿

喘急

十三

百五

十六 腺癰

十四

○ 著藥之方

一蓮肉

百六拾目

一芡實

百二拾目

一白扁豆

四拾目

一茯苓

百三拾目

一薏苡仁

四拾目

一麥芽

八拾目

一山藥

四拾目

一葛根

四拾目

一三年米

三升

右末メ用ルす。ク強目計シ藥
端ミ入レ加テ沙糖ノ度テシタ
啜ヌ。疾アラム見メリサ加フ

醫學廣明鑑卷之一



附

痛脾

瘧癱

一三賢風因

○傳河間曰將息失宜心火暴甚腎水虛
寒不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱
心神瞀亂筋骨不用而卒倒無所知
地天五志過極皆爲熱甚俗云風者
疫木而忘其本也

○東垣曰中風者非外來風邪及本氣
為病也凡人年踰四旬氣衰之際或
因憂思忿怒傷其氣者多有此証壯
歲之時無有也若肥盛者間而在之
亦是形盛氣衰故如此耳

○丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛西北
二方俱爲風所作者在之東南之人
既是濕土生痰痰生熱熱生風也

真風類風之辨

慧有真中風邪者有類于中風者不可

槩治

○因風者真中風也從昔人而治之因

火因氣因濕者類中風非中風從三

賢而治之

一真風經臟腑之辨

心慧面加王色有表證脉浮惡風寒拘急

不仁中腑也加減小續命發表調以

通聖辛涼之劑

○唇緩失音鼻塞眼瞀耳聾便秘中臟

地難治三化湯通其滯調以十全四

物之劑

○外無六經之見証內無便溺之阻膈

肢不能舉口不能言中經也當從中

治附桂枝湯補血以養筋

一真風類風不可爲二途

○傳中風蓋因先傷內而後感於外之候

也但有標本輕重之不同耳

○古人論中風者言其訣二賢論中風

者言其因真中風邪者未必不由氣

脉虛弱然後感於外邪經日和之所

處其氣必虛是也因火因氣因濕者

亦未必絕無外邪侵侮而作也若無

外邪侵侮則因火因氣因濕各自爲

他証豈有渴僻癱瘓暴仆暴瘡之候

乎豈可以一中風之證爲二途哉治

法外感重先驅外邪而後補中氣內

傷重先補中氣而後驅外邪或以散

風藥爲君以補損藥爲臣使或以滋補

劑爲君以散邪藥爲佐使

一似中風之數証

傷熱証卒暴僵化者，類中風。

氣激瘀碍，心竅類中風，宜吐後調理。

痰証諸痿諸痺皆類中風。

乃厥瘻厥氣厥血厥酒厥各似中風。

○林氣中者暴怒傷陰，暴喜傷陽，憤怒不似中風灌。蘿合香丸，醒後隨寒熱。

虛實而調之中風脈浮身溫多痰氣

中者脉沉身冷無痰。

○酒蒸之病作，婢証口眼喎斜半身不遂舌瘻不正似中風當瀉濕毒。

○口眼喎斜半身不遂之病，豈止風之一端而已？况六氣皆能中人，有縱急

橫緩不知人等証，不可不以脉証分別也。

○口噤筋急或由風熱甚，勝濕或因津

液滯胸爲痰，則筋大燥或筋反緩者，乃燥之甚，血液衰少也。故經曰：諸筋

挛易愈，燥証微也。筋痿難復，燥証甚也。

○林風病外感苦行數變其病，多實發表，行帶瘻証，內傷起肺熱四肢不舉，舌本強足痿，不收，痰涎有聲，皆是虛証無寒可散，無實可瀉。

○後世編集以外中風邪立名，而與內傷瘻証奚同，出治此千古之弊也。

○心理氣者，氣帶氣鬱肩膊麻痛之類，此七情也。宜烏藥順氣，八味順氣之類，理血者，無表裏之急証，唯血弱舉發不時者，用大泰丸，羌活愈

風之類，以上皆不可用風藥者，越

一緩治之治法

丹溪曰大率主血虛有痰或火與濕治法以痰爲先補養次之

○傳初得之即當順氣及日夕則當活血

初病暴作昏悶不省人事或痰涎壅盛舌強不語兩寸脈浮大而實急用

吐法令逆脉緊盛或脈俱浮強者

急小續命表之看所挾兒証與時

令裏溫加減施治病勢稍退精神稍復當改用補氣補血清痰之劑調養

其正氣而安此急則治其標標而本

之治也

○凡人或手足漸覺不遂或臂膊及髀股指節麻木不仁或口眼喎斜言語蹇澀或胸膈迷悶止咳相續或心肺弦濶而虛軟無力雖未致倒仆爲中

風量痰之候宜當從丹溪之法而調治

左脉不足及左半身不遂以四物補血之劑爲主治

右脉不足及右半身不遂以四君補氣之劑爲主治

痰盛者二陳道痰等湯兼用

氣血兩虛而挾痰人物加半星

實竹瀝姜汁之類

若真元虧復痰飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風防風通聖之類出入加減調治而安此緩則治其本本而標之之治也

一卒風治法

○急中卒風氣絕不語至寶丹丸之

連進生姜汁

○選初中風卒倒牙關緊急不省人事

○薑香圓

○灌之候其甦便可用辨脰

○証從法治之

○慧痰雍盛者口眼喎斜者不能言者皆用吐法 凡蒂散 稀涎散 口噤

者灌入龜內虛甚者不可吐

○王年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可

○吐

一肥瘦之辨

○傳肥人中風口喎肢麻不分左右皆屬

○痰用貝 萎守 星 陳木

連

百

芩

云 卷荆 咸

○薄桂

甘 天花粉

因痰者加附子

竹瀝姜汁入酒一匙行經隆火

○又曰肥人多濕 烏附行經

童佳煮食入瘞下行尤捷

○瘦人中風屬陰虛火熱 四物 加

膝 芍 柘

○有痰加治痰藥

○肥人中風者以實氣盛於外故于內也肺爲氣出入之道肥者氣必急痰

○延壅盛所以急之必先理氣

○半身不遂左右之辨

○在左屬死血少血宜四物 桃仁

○紅花 竹瀝 姜汁

○在右屬痰與氣虛 宜一陳四君竹

瀝姜汁

○辨治

○鳴

聲

○醒後小便少不可私之汗液亡榮衛枯竭無以制火熱退汙止小便自

○行

○中風遺尿氣虛 參芪補之
○飲食坐卧如常但失音 小續命
去附 加菖

○中風証內外邪已盡當服愈風湯以
導諸經久服太風悉去縱有微和加
減用之然治病之法不可失其通塞
或一氣之微汗一旬之通利如此爲
常治之法

一脉辨

○傳太法中風脉浮遲者吉急疾者凶
○士口脉浮而緊緩而遲皆曰中風脉
經曰浮而大者風
○被風不仁痿蹙其脈虛者生堅急疾
者死也

一不治之証

○口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿

○林髮疊吐沫搖頭上竄直視口開手撒
眼合遺尿不知人或面赤如斑或頭
面青黑汙綴如珠聲如鼾睡皆不可
治

一灸治

○風中血脈口眼喎斜瞤會頸車地瘡
左喉灸右喉灸左
在右灸左

○風中臟性命危百會風池太推眉非

間使曲泄足三里中臟氣塞涎止不

語心憤肢麻灸之各至年壯
凡中風治法莫如發表攻裏調氣養

血治瘡若要收全功宜艾灸

○凡五藏中風各灸其本藏之俞百壯皆服續命湯一枚之治風之法太段宜灸亢心中憒亂神思不怡或手足麻痺此將中藏之候不問風與氣可速灸之

○中風眼戴不能上視者灸二椎第五椎上各五壯或七壯臂下火立愈

○失音不言灸天窓治例

目反口噤腹痛灸囊丁第一橫文十四壯

○中風口噤灸養榮巨闕

一通門竅今治劑

○搐風法治卒中風不省人事牙關緊急藥不下咽者細土葉去
皂角等分各右爲細末以紙捲置藥入鼻或用竹管輕吹入得隨後進

通項散

○治中風中氣昏不知人急用吹入鼻藜蘆甘生芎細

參各一膏伍

○右爲末吹入鼻中一字就提頭廈髮立甦石蓮者可治

○治大人小兒禁口風

○皂角皮去

○右以皂角研末用蘿蔔

或子同米醋研雞翎拂築塗牙根即

瘥

皂角散

○蘿蔔子借牙皂角各等

右爲細末每服二三錢水煎服服半盞即吐

麝香散

○治卒中風瘡倒地癱瘓口渴諸藥未服者服之

○真麝香仁

○開口灌之自甦蓋麝香自通關節可以

真香油二兩

○右麝香研細入油攪勻

○開口灌之自甦

○蓋麝香自通關節可以

行至病所也

○稀涎散 治風涎不可喉中作聲如

牽錫半夏大者十個甘草角一箇

右水煎入姜汁少許服不能嚥者徐

人灌之

○稀涎散

治中風痰涎壅盛口眼喎斜脣塞不通明礬一兩半生猪牙

皂角四枚去皮石爲末每服一錢

溫水調下以吐爲度

○獨聖散

治諸風痰盛及諸癰瘍飲壅溢等証甜瓜蒂一兩炒黃色凡

右爲細末每服半錢或一錢量入虛

實用之以酸蜜汁調下以吐爲度凡

行吐法宜於天氣清朗之日行之晦

日難得吐病暴急者不拘先令病者

啞宿不食如服藥不吐再用熱蜜水

投之如吐風癇者加全蝎微炒如有
虫者加猪油五七點雄黃末各甚者
加芫花末半錢立吐其虫
一導痰之劑

○林三生飲 治卒中不知人口眼喎斜

半身不遂痰壅喉鳴及氣厥痰厥眩
暎 南木香半 杜南星六分川烏
附子洛各右煎服

○宣風湯 治中風痰涎壅塞口眼喎

斜半身不遂不知人半風

甘草白附川烏生木星生各
一錢右加姜

○貝母瓜萎湯 治肥人中風口渴麻

木左右俱作癥治貝葵星炮

荆風羌柏芩連木

陳皮半薄桂甘草威天花

粉各等 右加姜煎至夜服

眼咽斜 瘰涎壅盛 喘急咳嗽 胸膈痛
閼及小兒驚風 婦人血風

大半夏湯 泡白附洗 星泡 川

烏皮尖

天蝎炮去木

枳 起妙名

右爲細末

姜汁糊丸

如梧桐子大每

服二三十丸

臨時茶清下熟水亦可

小兒驚風

生姜薄荷湯

全解毒雄黃丸

治中風牙關緊急及
瘧涎咽喉腫閉 如牙關緊閉開口灌

下

薺 雄飛各二巴十四箇

右爲末醋煮麯糊丸 蓉豆大每服七

丸熟茶清下

吐出 穎涎立甦

夫風解表之劑

林小續命湯

治暴中風不省人事漸

覺半身不遂口眼喎斜 語舌蹇澀肢
躰麻痺神情昏亂頭目眩暈 瘰涎多
傳東垣曰 中風自汗者不可重發其
汗故此藥亦不可輕用 王仲景謂汗

出則止藥

巴桂芩杏

白芍甘草 麻酸參各一分

風

仁附炮分右分一貼每服水二盞

姜紅棗去核煎八分服

精神恍惚加茯神 遠志 骨節疼痛方熟

者 巴附倍方 心煩多驚 加犀角

骨節疼痛 倍加桂附 嘔逆腹脹

如半僵參藏寒下利 去巴

益倍附加木香 自汗去麻杏加

腰痛加桃仁 失音加杏 濡汗惡

寒倍麻風杏 有汗惡風倍桂芍杏

○身熱無汗不惡寒加知膏去附

身熱有汗惡風加葛桂芩○無汗身
涼倍附加姜○有汗無熱倍桂附其

○肢節壅痛个仁大加羌翹少

○消風散治諸風上攻頭目昏眩項
背拘急頭顱聲重耳鳴皮膚癢癰癰

瘡婦人血風頭皮腫脹荆穗甘

妙卷蟬蛻去秘藿少風蚕

妙苓少參芍二陳妙橘朴姜制各半兩右

爲細末每服二錢○感風頭疼鼻涕

用荆芥湯茶清調下○遍身瘡癰溫

酒下

○八風散治風氣上攻頭目昏眩肢

躬拘急瘡癰瘍鼻塞聲重藿辟

桂芷少前芍一錢甘參芍二卷

風膈三右爲末每服二錢薄荷

○卷活散

治風氣不調頭目昏眩瘡

涎壅滯遍身拘急及風邪塞壅頭痛

項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨

預覽不安前卷麻白芩

芎甘灸芩蔓枳絨紺風

○清氣宣風散

治上焦風熱膈痰

目赤耳鳴芎羌半生地

荳炒各分木白芍各一風枳

甘菊陳荆外連梔五分

蟬退妙苓各六分甘分右分干貼水

二盡姜三分棗一枚食遠溫服入

一去風順氣之劑

烏藥順氣散

治風氣攻注四肢骨

節疼痛，遍身頑麻，凡卒中半足癱瘓。

言語蹇澁者，先宜服此藥以躁氣道。

然後隨証投風藥。去根陳白

烏各二錢炒
兩各二錢炒
兩各二錢炒

水一盞姜三片棗子一枚煎七分溫服。

憎寒壯熱頭痛倦怠加葱白三寸。

身熱不能屈伸，溫酒調服，瘀暍搘之，成瘡用薄苛煎常服。

○人參順氣散 治感風頭疼，鼻塞，聲

重及一應中風，服此藥疏通氣道，然

後進風藥。去根陳白各一錢，各四

葛半右每服三錢姜三片棗子一枚薑煎五葉煎七分溫服。

○八味順氣散 中風先宜服，此次進

治風藥。去根木白苓青芩芷陳

桂烏參各二錢，各一錢，各四

天參各一錢，芷青，各一錢。

蘿凡各半，烏賊二錢，各一錢，右分二貼。

水二盞姜三片煎八分食遠溫服，或

風濕腰腿痠痛亦宜服之。

○匀氣散 方見心痛門 治心脾疼，

術半甘芩各三錢參陳

青台烏芷各二錢木羌

藜凡各一錢入姜，各一錢。

○防風天麻散 治麻痺走注肢節疼

痺風天芎芷川烏白

附荆飯甘羌活半滑仁

右爲末熟酒化蜜調服，覺氣力運行
微麻爲度。或審丸熟酒化下，白湯化
下亦得。

一去風養血之劑

傳大秦艽湯

中風外無六經之形証，
內無便溺之阻隔，知血弱不能養筋，
故手足不能運動，舌強不能言，宜養
血而筋自榮。此方主之。艽、芍、芎、
歸、白芍、葛根、獨活、白芍各一錢，
羌活、風芩、芷、生地、熟地各五分，
細枳、枳壳各一分，右作一服水煎。

○如遇太陰加生姜三片。○心下痞滿，加枳實一錢。

○卷活愈風湯

治腎肝虛，筋骨弱，語

言蹇，神精神昏，憤安，心養神，調理陰陽，使無偏勝。治中風內外無和服，此

以行中道。 卷、芍、風、蔓、

芎、細、枳、熟地、參、麻、芍

共、菊、歸、知、芪、地骨、狗子

獨、芷、仲、羌、柴、守、西

巴、絡、三、白、芩、芩、芍、各四、膏、蒼

生、地、絡、六、枝、半、分、○天、陰、雨、加、姜、三

片、右、作、半、服、空、心、一、服、蘊、下、二、參、丹、

臨、附、一、眼、蘊、下、四、白、丹、○望、春、太、寒、

之、後、加、柴、半、參、絡、三、迎、而、棄、少、陽、之、

氣、○望、夏、之、月、加、膏、芩、知、絡、三、迎、而、

棄、陽、明、之、氣、○季、夏、之、月、加、巴、木、芩、

絡、二、勝、脾、土、之、濕、○初、秋、太、寒、之、後、

加、杜、蔻、絡、三、桂、半、分、迎、而、棄、太、陰、之、

氣、○望、冬、之、月、加、附、桂、絡、半、飯、旺、勝、

少、陰、之、氣、

○大防風湯

去風順氣，治血壯筋，又

治癆後脚弱緩痛不能行名曰癆風
或兩脚腫痛足腔祐膜名曰鶴膝風
一切麻痺痿軟風濕夾虛之候服之
如神 風 熟地 飯譜茵白
芍 仲姜汁揉炒半 术半 茯苓 参
膝酒 共半 糯各半 荸 芎 附炮各七
右作一服水二盞姜五片棗丁牧煎
至一盞空心溫服

○林天麻丸 治風因熱而生熱勝則動
以靜勝其燥是養血也此藥行榮衛
壯筋骨 生地十 差十四 飯耐
仲七 天 膝酒浸三乾 草薢 玄
參各六 附兩 炮 一方有獨活五
右細末煉蜜丸

○續命煮散 治風氣留滯心中昏憒
四肢無力口眼瞓動或時搐搦及

產後中風自汗宜服之 風獨
飯 參 細 葛 芍 芎 茯
熟地 远 荆 半絡桂 牡丹
右加服二兩生姜汗不止加蝎子
半

○金八寶回春湯

治諸虛不足風痰腰
絡拘急痰壅盛飲食不進 白芍
附七 木二 半半兩 生地 熟
地 芪 桂 烏 姜 附炮參
麻七 芪 已 荘 杏 風 芎
飯 神 陳七 一沉 川烏炮各
右加姜更多

○林防風通聖散

治諸風潮搐手足癇
癇小兒急慢發風大便結閉邪熱暴
甚陽暑乾燥寢汗咬牙上竅睡語節
甚陽暑乾燥寢汗咬牙上竅睡語節

轉筋掣肌肉蠕動 風 烏飯

芍 大 川 趴 苦 麻絡半

膏 梓 桔 芩 术 荆絡半

一滑絡半 右加姜

○上清散

治因風頭痛眉骨眼眶俱

癰 脂忍草 莪 蘭 芍 乳 荆

穗 没絡一 腦瓣苛 芒各半右爲

細末每用一字龜內橘

○獨活散

消風化痰治頭目眩暈

細 風 藁 旋 蔓 莩 獨各

兩膏 芥 酒 半右爲末每服二錢姜

三片水一大盞煎七分食後熱服

一攻裏通滯之劑

○三化湯

中風外有八經之形証先

以加減小續命治之若內有便溺之

阻隔以此湯導之

朴 大 實

炒

本

○製慧濟方

治中風亦七日太使松

右分二服每貼水
二盞煎八分去粗食煎溫服微利則

已

○製慧濟方

治中風亦七日太使松

結頸剝轉壩 外 柴 芩 枳

棘 赤芍 大半生 桃去皮 尖

麻仁去 將桃仁以下三味並生大

黃一升研細貯碗右將升麻巴豆五

味并太黃剝水煎數沸攪匀用水冷

服

○參冊

治健忘養精神定志和血

丹參 熟地 天門

各一兩半 人參

丹砂 遠首絡五 神 条芩

麥門

各一兩半 右爲細末燒蜜丸如梧

子大每服五十丸空心以愈風湯下

○四白丹

清肺氣養魄中風昏冒氣

不淸和者宜服之並一檀參差獨藿各一兩

白苓木縮參

風耳莎芽各半知細格二

甜竹葉二芍三不麝別研

牛黃腦絡研右爲細末煉蜜丸每兩

作十九臨卽嚼一丸分五七次嚼以

愈風湯送下

○林至寶丹

治卒中急風不語中惡氣絕及心肺積熱小兒諸癇急驚心熱

並皆治之大生烏犀屑硃砂飛雄飛玳脣瓊各一麝腦各一

牛黃半安息酒攪澄雅過濾去沙土得淨丁兩

慢火熬成膏金箔一半入華上銀箔各五

右將玳瑁爲細末研勻

安息香膏重湯煮凝成後入諸藥中

和成丸如梧子大入參湯化下二十九

○牛黃清心丸

治諸風緩急不隨語

言蹇四肢雍盛心怔健忘或發癲狂

羚一兩風木白芍門芩各一犀二兩半

麝腦各一參麌炒蒲黃炒各二兩半

桔杏各二兩半牛黃二兩雄仁甘

酸五兩酒浸大豆黃卷桂膠各一兩

大棗一百箇蒸熟金箔一千二百

研爲右除棗杏金箔二角未及牛

麝腦雄四味爲末入餘藥和勻煉蜜同蜜肉膏爲丸每兩作十九以金箔

爲衣每服一丸食後溫水化下

○珍珠丸

治肝虛爲風邪所干則

目失神六

塊散而不守狀如驚悸

珍珠母

三分 研分 饯熟地各半 参酸棗

柏子各一 犀神沉龍齒各兩

右爲末煉蜜丸如梧子大辰砂爲衣每服四五十丸金銀薄苛湯食後吞下

○大辰砂丸

清頭目化痰延及感冒風寒頭目昏眩皆治之 天芎
甘草正葛一 風二 細苛葛
鱗辰一 為大 右七味爲末煉蜜丸如彈子大硃砂爲衣每服一丸細嚼食後姜湯下茶清亦可

一雜方

○林貞母见萎湯

治肥人中風口喎麻木左右俱作瘀治背具萎星炮荆風差柏芩連

陳氏木半薄桂甘灸歲天花粉各等右每服七錢水二盞姜三片煎八分至夜服

○資壽解語湯

治中風心脾舌強不語半身不遂附炮風酸

天略二分羚桂各二分甘

羌活一分右分二貼每貼水二盞

煎八分去粗入竹瀝二匙再沸服

○稀薑丸

治偏風口喎時吐涎沫語塞澁筋脈拘牽緩弱之服耳目聰明髮鬚烏筋力壯健稀發丁味

五月五日六月六日採洗去土摘取葉九蒸九曝每次蒸用少酒蜜水酒

之蒸一餸入曝乾如此九次爲末煉蜜丸如桐子大每服一百丸空心溫酒或米飲送下

【養活丸】

治風氣不調頭目昏眩

痰涎壅滯遍身拘急及風邪壅塞頭痛天陰先覺不安

卷 甘菊

麻 莩 風 前 膏 苓 甘 無

細 枳 白 苓 蔓 去皮各 珠 砂

一兩半
爲衣

右爲末水糊丸如桐子大每服四十丸姜湯下臨卧食後服

一易簡

○林治中風口眼喎斜桔梗紋取汁和大麥麵作餅免令熱尉正便已勿令太過

○又巴豆七枚去皮爛研咽左塗右手心咽右塗左手心仍以燮水一盞安向手心須臾便正洗去藥并頻抽掣中指用草麻子亦可

○一方皂角丁兩去皮弦子炒爲末醋後臨卧湯點一錢服

○一方五月午時取蒼耳葉曝乾爲末酒或漿水服方寸七日三服作散若吐逆蜜丸準計一方七風輕易治者每服一丸身躰有風處皆作粟肌

治者每服一丸身躰有風處皆作粟肌或如麻豆此風毒出也以針刺潰

去之黃汁出乃止五月五日多取陰乾着大瓮中稱取用之若時氣不知

舉家服之并殺三虫腹癆一周年服

乏佳七月七日九月九日採用之

一痛風并廻証

傳

○夫古之所謂偏頭者卽今之痛風也
諸方謂之白虎歷節風丹溪曰大率
因血虛受熱又曰濕痰濁血流注爲
病大法用荎星亨。並取
酒芩在上加羌枝桔歲在下加膝已
通柏○因痰者二陳加酒洗芩卷蒼
○因濕者用二木佐以竹瀝姜汁及
行氣之藥

○加味四物湯

治白虎歷節風

本方加桃膝陳荎耳芷膽。在上者
加羌枝歲。在下者加膝已通柏○
氣虛加參木枝。右痰加星半生姜。
○血虛倍取芩佐以桃紅

○一方

治上中下痛風

連炒酒蒼米泔浸星各二錢炒芩各一
兩

桃芷

已絡五歲

酒枝泔撒行各三

○大羌活湯

治風濕相搏肢節疼痛

羌外絡獨壯蒼歲已衣
飯芩沵絡五右作一服水一

盞半煎至一盞去粗空腹溫服

○四妙散

治走注喉痹

歲酒泔浸楮羊角灰三蒼耳子半

白芥子炒右爲末每服一錢七
姜湯調下

○一方

治飲酒濕痰偏風

柏酒

歲酒泔浸楮各蒼米泔浸羌耳絡陳

姑芍絡一右爲末每服一錢七姜
湯調下

○肢節腫痛濕熱流注於肢節之間調

絡之氣

麻節根赤芍絡一風

湯

荆 巷 獨 正 蒼 嵩 實

片芩酒桔 葛 茯苓半 甘 飯梢

外格三 下焦加酒柏○婦人加酒

紅○腫多加枳腹沲更加沒一錢定

偏方妙○脉滙數有瘀血用桃紅亨
飯大

○妙散 治脚膝濕熱成痛

柏酒浸醋蒼蠅頭長春頭二宿各三

右爲細末沸湯入姜汁調服或爲丸

姜塗湯送下氣實者加少酒佐之

○瀉行散

柏一味酒浸曝乾爲末每

服方寸匕四物湯調下治血虛陰火

痛風多服效

○手臂痛是上焦濕寒橫行經絡中作
痛也 半酒芩 水星莎各

朱貴 苓絡五蒼半歲三甘三分

○加味二陳湯 治臂痛

本方加酒芩 差歲 入姜水煎

食後溫服

○一方 治痛風神效 赤芍 青

歲 木 1鱉絡半紫歲 茯 風絡

粉甘硝 右酒煎服

○治婦人胸背脇走痛 赤芍 薏

柏絡一枝 蒼絡半歲批濕紗半酒甘

右加生姜五片水煎入童便竹瀝各

半盞再煎熟服

○舒筋湯 治臂痛不能舉是氣血凝

滯經絡不行所致一名五痔湯效如
神 斧子姜黃行耳炙差絡半海桐
皮去外板 赤苟 木絡一右作二

服生姜三片水一盞半煎至一盞

去粗沉香磨水少許入內溫服

○加味二妙丸

治兩足濕禪疼痛或
從足跗熱起 蒼頭 柏酒 麴 腿
飯尾 醬 草 已 板酥 醬 各右爲
末酒煮麴糊丸如梧子大每服一百
丸空心姜塩湯下

○羌活湯

治右虎歷節風毒注骨髓
疼發不定 卷四分附炮丸 桂
木 亨 飯 腸酒 桃炫 嫩 骨
碎補 風絡一升 糊六 右分二貼
姜伍

○加減地仙丹

治風冷邪濕留滯下

焦足膝拘急腫痛 地龍炒去

灵脂 破烏藥 白膠香

酒 椒紅炒去

蕨 凡 小豆炒黑豆炒去

天仙藤

川烏頭去五加 蒼頭

木別去穀各

擇

仙酒方

治諸風疾手足拘牽半身
不遂 腰 少 桔 風 卷 晚

蚕沙洗淨酒炒牛蒼朮炒牛蒡根去

大麻子炒一牛蒡子拌 右爲末，糯
米酒一半磁器內浸藥封口七日開

匙勿令面近瓶內恐藥氣犯眼日進
三服每丁盞

○秘傳桑酒方

治男婦風濕相搏腰

膝痛及風濕脚氣

芷 桔 半

巴 莩 苓 桂 苟 麻 甘 根
兩 朴 飯 凡 陳 枝 獨

枳殼半
肢

烏酪二
蒼四兩米酒

仲妙
酒

右剉布袋貯用無灰酒

三斗壩蒸封口煮一時夕過三日後取酒飲盡祖晒乾爲末酒糊丸如梧子大七八十九酒下

○**茯苓湯**

治皮膚浮腫

赤苓 桑酪二芍 風桂 芍

麻酪半
右入姜棗水煎溫服以姜粥投之汗泄爲度着婢留注加飯其

○**防風湯**

治血婢皮膚不仁 風

獨飯 芎 赤苓 赤芍 芪各桂

全芎附散 治婢偏自腿臂發作不定

者 小芎 附桂 衣柴 風

熟地 飯桂 甘石等分入姜棗

○**續斷圓**

治風濕流注四肢浮腫肌

肉麻婢飯炒續 薛芎絡丸

乳風 附沒酪半天而右爲

未煉蜜丸溫酒米飲任下

○**生料五積散**

治寒溫麻婢

方見傷寒門

臘沉重在臍煩疼 此經 風各

糲卷 赤芍 姜黃 飯酒浸各

甘酸半

右加姜

○**心子八物湯**

治歷節身偏不可忍

附炮姜炮芍 苓 甘桂 參各

兩木附

右一方去桂用乾地二

兩

○**杏子三婢湯**

治男婦血氣凝滯手足拘

華風脾氣通等 繼仲 風桂

細參苓芍飯酒甘芍尤

生地芎獨絡一膝酒芒絡二

右每服七錢姜五片棗一枚水一盞

煎至八分溫服

薏苡仁湯 治手足流注疼痛麻痺

不仁難忍伸薏飯芍麻

桂芍灸酌蒼附

右每七錢半生

姜七片煎食前服。自汗減麻○熱

減桂

通氣防風湯

肩背痛不可回顧及

腰似折項似拔此太陽經氣鬱不行

也此湯治之名卷肺濕湯

羌獨絡二風芍灸藁絡

芎桂

蔓荆右如身重腰沉沉經中有糞

濕更加酒洗漢防已半錢附

豐丁皮麻風芎飯芍

葛絡右咬咀研黃布服七錢水一

盞煎八分去粗入乳沒各少許無煎

熱服出汎

如意通聖散

治風濕走注疼痛

瘧瞿麥大腹皮陳鼓柏虎脣骨

蠶乳沒甘草根絡二右爲末每服

三錢煎連相熱服

如神救苦散 治風濕脾腫走注癰

瘧葛根白芍絡三階砲半芎風

木絡半桂仁芩熟地酒洗焙各

右金一貼姜八片裹覆食後臨肚

服

活絡湯

治風濕臂痛頭寒不效者

木飯羌獨絡半芍桂

右分二貼姜三片

○爲沉木香四物湯 治濕溫脾經有

臂手足疼 薏 烏 莩 飯 茄

熟地 蒜絡 二甘草木絡一右

○加味二陳湯 治臂痛

本方加翹 風 莩 皂刺 酒芩

葛

○芎活湯 治水飲留滯背痛 莩

獨半 苓 陳 桔絡二末 甘

炙絡

右加姜

○羚羊角散 治筋痺肢節束痛 羚

薄桂 附 獨絡一兩

白芍 風

芎絡一

右加姜

○五加皮浸酒方 治風濕相搏腰腿

疼痛四肢急皮膚癰痒 添精補髓

五加五加木

右㕮咀生、翁袋盛以好

酒一壘 將藥袋入酒中用竹葉密封
壘口入滾鍋內煮一時取出後浸十七日
開壘空心臨卧飲一二盞多服

一癥証并麻木

傳

丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂
治療獨取陽明之經蓋嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得
火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管一身脾傷則四肢不能爲用而諸痿作矣渴南
方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何
肺熱之有又曰內經論風論痿各有篇目治法迥異局方以治風藥通治

諸瘧何其謬哉

○東垣治瘧無一定之方，黃柏爲君藥，葛等補藥爲佐，視所便之証制其方。

○濕熱用健步丸加柏芩蒼之類。

○濕痰一陳加二末芩柏竹瀝姜丸之類。

○血虛四物加蒼柏下補墮丸，勸、觀、虛

○虎潛丸

○補腎丸，勸、觀、虛皆可治瘧。

○板

○板醣白芍、陳、膝醣、虎脰、兩

○瑣醣飯醣半

○右爲末酒煮鵝羊內爲丸，鹽湯下，各加乾姜半兩。

○氣虛四君加蒼芩柏丸，柏蒼治瘧之要藥也。

○加味四物湯

○治諸瘧四皮軟弱不能舉軌，飯身，柏、蒼各一錢，地

○健步丸

○治膝中無力屈伸不便，腳沉重，行步艱難，羌、柴、滑、炒

○杜白芍、芎、仲裕七門仁五味丸參、連絡半知，膝三分促，不屈右前服，又酒糊丸服亦可。

○健步丸

○治膝中無力屈伸不便，腳沉重，行步艱難，羌、柴、滑、炒

○甘炙桔酒桂絡五風

○澤絡三苦參酒川烏、炮絡已酒醣，右爲末，麴糊丸如梧子大，每服七十丸，愈風湯下。

○云荆芥湯，下按荆芥湯又號愈風湯也。

○大防風湯

○治兩足痿弱，或麻痺，或

○兩膝虛腫，名曰鶴膝風。方見右

○祖傳經驗

○治兩足痿弱，或麻痺，或

○火焙

○蒼米泔水浸柏酒浸日，克膝飯尾酪二枚，糊虎脰骨，糊已酪一

○右爲末，麴糊丸如梧子大，每服七十

丸姜塗湯長丁方加炮附五分

○鹿角膠丸

治血氣虛弱兩足痿軟

不能行動

鹿角膠斤鹿角霜熟

地絡半膝

白芍 兔絲 參 木

仲略二般身廻虎脛骨鱗板

酥煑各
右爲末別將鹿角膠用無灰酒二盞

煉化丸如梧子大每服一百丸空心

姜塗湯下

○除風濕羶活湯

治諸痿濕氣勝風

証不退眩暈麻木不已

羌風

蒼 茜絡一升分甘獨

柴絡五

芎 柏 陳 藁絡三錢

猪茯各

分連分

右

○清燥湯

治濕熱成痿腰以下痺

軟不能行 茜半不蒼不木

陳

沵絡半五味九白芍 參 升絡三

米飲下

門 仁身 生地 麵 猪 酒柏

絡 柴 甘炙連絡一右穀無連

加味四物丸

治督肝虛筋骨痿弱

蕤蓉酒膝酒天 凡 鹿茸酥毛熟

地 兔酒浸五味酒煑各

右爲末

煉蜜丸如梧子大每服五十丸食前

米飲下

丹溪曰十指麻木胃甲有濕痰死血

三陳加二末桃紅少加附

右分

粉白芍分

右分

道氣湯一治兩腿麻木沉重

芍半青竹升 柴飯梢 沢絡

半陳半分紅渺五味三十

右

天麻黃芪湯

治素有風証因醉飲

其証復來右口角偏眼牽引側視及

左手腿脚麻木疼痛 天 芍 麴

外差如支瞼不令絡三參 連絡四

飯粒芪 芪 升 蒡 柏 蒿絡

分次壯柴枳或加猪肚 右

神効黃芪湯

治麻木不仁或兩目

蓋睛昏花暗痛 蔓分陳桂參升桑

芍 白芍各一錢 石水煎去粗

臨卧熱服。如麻木不仁雖石熱不

加黃柏只加黃芪行通經。如麻不

仁者加芍藥行通經。如有太熱証

加酒柏三分

祖傳經驗二妙丸

治濕熱下流兩

腳麻木或如火焙

柏柂兩脚膚、蕎

六兩米泔浸宿細切焙

一膝二

右爲末麪糊

丸如梧子大每服五七十丸空心姜
鹽湯下忌魚腥薑麥熟麪煎炒等物

卷之二十一



傷寒門

附 中寒

陽風

陽溫

瘧冒

一 傷寒溫病熱病之異

林中而卽病名傷寒寒毒藏肌膚至春變爲溫病至夏變爲熱病醫均謂之

傷寒

一 傷寒中寒之異

林寒邪傷腎急痛拘掣戰慄強直昏迷

一 疣冷口噤失音此中寒也

無汗惡寒頭痛面慘發熱拘急手足

微寒此傷寒也

一 傷寒中寒爲之說

其說則大

傳有至人傳云傷寒太法有四曰傳經專經而病鬱痼久即病者多爲專經鬱病者多爲傳經云云或但中於太陽未及鬱熱而即發首尾只在本經而不傳變者宜下麻黃桂枝等湯

驅散表邪而愈或有從太陽未及營
熱不從陽明小陽而入於三陰之經
者亦有極不入者於陽經而直傷於
三陰之經而即病者因其未曾鬱熱
是以一切爲寒証故多自霜降後至
春分前發者是也爲其無頭疼無大
熱脉沉遲而微故古方又出中寒之
條實此証也

一傷寒傷風之異

林以日傳變與傷寒無異但寒注血故無汗惡寒風散氣故有汗惡風爲不

同

一傷寒傷冒之異

傳傷寒溫病熱病之死有四時感冒新
受風寒之輕証而見頭痛肺痛惡寒
發熱等証非督變傳經重病之

一六經之脈証

○一十二日太陽脈浮惡風寒頭項脣痛
腰脊強

○二三百陽明脈長不惡寒反惡熱目
疼鼻乾不得眠

○三四日少陽脈沉細口苦脇下堅滿
往來寒熱耳聾

○四五日太陰脈沉細腹滿呴乾
五六日少陰脈沉欲寐而渴

○六七日厥陰脈緩氣上衝胸飢不食
食吐蛔煩滿脣縮

○一兩感

掌一日太陽少陰頭痛口乾渴

○二百陽明太陰身熱譸言腹

○滿不食

○三日少陽厥陰耳聾脣縮而

厥內外兩感足於藏俱病表裏不能一治故難治脉從陽可治從陰難治傳經曰兩感於寒者死是內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有裏表裏既不能一治故死然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治治之而不愈者有矣未有不治而復生者予嘗用此間有生者十得二三故立此方名解利兩感神方大羌活湯方有

一表證

脉浮緊表實無汗麻黃湯

脉浮緩表虛自汗桂枝湯

脉浮緩反無汗脉浮緊反煩躁各

半湯麻黃桂枝爲二一劑

一半表一半裏

百

嘔氣發熱邪在外若小便黃非在死蒸蒸發熱邪在內若小便清非在內

○脉浮大是表証尿赤煩渴是裏証是表裏俱見也

五苓散

○心下滿不食太便堅脈沉細是裏証頭汗出微惡寒手足冷是表証此在半表半裏

小柴胡湯

○不大便頭痛有熱是裏証小便清不在裏此表裏俱見也

桂枝湯

○裏証已急或脉浮或頭痛表証仍有者用大柴胡謂之雙解

一裏証

○裏証者內熱是也宜下之

○不惡寒反惡熱腋下汗出呻吟糞結潮熱腹滿喘或譫妄脉沉滑是裏証也

小便少于足心并腋下不滋润者不可攻

一表裏寒熱

○脉發熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓
○脉沉遲手足或微厥下利清穀此陰証發熱表未解四逆湯或通脈四逆湯

逆湯

○活人曰表熱裏寒先與陰旦湯

芍甘二味姜炮芩附三桂枝四兩

十五右剉煎寒已次小柴胡加桂

○身寒反不欲近衣熱在骨髓寒在肌表先用白虎加人參湯熱除次各

半湯

○脉滑而厥口燥舌乾惡寒而踴時以煩不欲厚衣大柴胡

一陽毒

○初受病時邪毒深重當汗失汗當失下或吐下後邪熱乘虛而入或誤服熱藥反爲陽毒必發狂登高歌棄衣走箕面錦斑鼻瘻舌卷焦黑脉洪大五日可治六七日不可治若熱甚時昏口噤咬牙藥不可下者用瀉法候牙寬在定用藥

一陰毒

○掌初受病時寒邪深重犯陰氣獨盛或汗吐下之後變成陰毒唇青面黑厥冷身疼如被杖腹中絞痛或自利咽不利腹汗嘔吐脉沉微三日可治五日不可治或真武湯或飯桂升耳雄鱉椒水煎溫服蓋覆取汗或用葱熨法溫臍下漸醒

肢溫有汗即瘥續用四逆湯之類如
慰而肢不溫不可治

林葱尉法 治中寒氣虛氣息欲絕及

傷寒陰厥葱一握以絲纏如餅去根
葉惟存白長二寸計以火煅令通熱
以熱處著臍上下尉一餅壞即易手

足溫有汗更服姜湯一盞良

○又法葱一握取白三寸燒成餅先用
麝香半分填胸內上放葱餅以火尉
之連換二三餅稍醒灌姜汁如不醒
灸關元氣海二三十壯手足溫即醒
者生手足不溫汗不出不省人事者
死

○選手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷急於
丹田穴灸之或二五十壯或百壯祖
輕重手足煖爲度

○陰毒傷寒四肢逆冷宜尉之以吳茱
萸一升酒和匀溫絳袋二雙蒸令極
熱尉兩脚心候氣通暢勻暖即停尉
累用極驗

一陰證

○陰毒傷寒人事言語亂妄神思昏迷面青齒
黑爲必死之証脉沉細先用小柴胡
等不愈急用四君加附子數片煎以
碗盛放水盆中少時殺其熱性稍溫
脉之脈與神思即回然後可用別藥
謂之陰証之傷寒

○正後三五日後妄言不休此神不守
心懊惱勿復下脉多沉細足冷氣促面
青黑口乾 補中益氣湯倍參加附
子葉

一陰證似陽，陽證似陰。

○煩躁面赤，微熱，脈沉微。此則陰證也。

○陽以脈爲據，不必守症。

○小便赤，大便結，脈沉滑，四肢逆冷，休熟深也。此則陽證似陰，輕者白虎重者，兼氣。

一溫家之五証

春月傷寒，溫病。

○溫病冬傷於寒，春必病。溫脈浮數，發熱頭痛，亦惡寒，輕於冬夏。升麻湯，鮮肌湯，桂枝湯。

○溫氣來行，變成溫疫，作天行，少長皆同。陽脈濡弱，陰脈弦緊者，熱溫寒清，順時宜以平為期。

○溫毒，陽脈洪數，陰脈實大，更遇溫熱，變爲溫毒。發班疹，咳嗽，心下痞悶，玄參升麻湯。

○風溫頭痛，身熱自汗，四肢不收，多眠，鼾息，陽脈浮滑，陰脈濡弱。黃芪防已湯，切忌汗。方見中溫門。

○溫瘧脉陰陽俱盛，重感寒者，變成溫

豌、小柴、白虎之類。

○溫家之三證

○溫溫暑濕相搏，成濕溫，胸間多汗，頭如劈，脣吟，妄言，陽脈濡弱，而弱陰脈小，而急疾。芩白木湯，芩木姜耳枝。

○中溫，一身盡癉，發黃，大便快，尿濁，脈沉而緩。方五苓散。

○風濕肢痺，重難轉側，額上汗出，欲去被，身腫，日晡劇，其脈浮，發汗微，人出則風濕俱去也。

一瘡證

掌林

太陽經中風，又感寒，溫，又大發溫家。

卷之二

汗則成症發熱惡寒似傷寒反張汗
無汗惡寒癰瘡 葛根湯

噤如癇

有汗不惡寒癰瘡 桂枝加葛根湯
無汗惡寒癰瘡 葛根湯

一惡寒林

太陽發熱無汗惡寒 麻黃湯

陽明雖有汗証但惡寒表未解也

麻黃湯

太陽發熱無汗惡風

桂枝湯

陽明脉遲汗多微惡寒表未解也

桂枝湯

少陽頭痛發汗惡寒 小柴胡

少陽發熱微惡寒

柴胡桂枝湯

少陰惡寒脉沉細

四逆

理中湯

汗後惡寒虛也

芍藥甘草附子湯

下後惡寒而踴股溫脉微惡寒表裏

芍 甘 酥 三 附 一 右

虛小建中湯

吐下後不解熱渴時以惡寒表裏俱
熱白虎湯

一潮熱林

少陽主於寅卯太陽主於巳午於此
時發熱邪未入胃應於未申發者謂
之潮熱邪在胃

懶寒潮熱或溏咳逆

小柴胡

脈浮潮熱兼寒

小柴胡加桂

脈浮弦小便難眠腹滿腸痙無汗嗜
卧小柴胡加茯苓

汗後不惡寒腹滿喘潮熱 大小柴
氣

一脉實潮熱 大承氣

下後潮熱大使復硬

大柴胡

汗下後不解日晡潮熱煩衣摸床喘

汗

急直視 六 乘氣湯 脉弦生瀇死八

日晡潮熱脈虛微汗七 桂枝湯

一 煩熱林

爲煩而熱無時而渴者是也

心煩喜嘔共 小柴胡

汗後煩熱而渴 展砂五苓散

汗後胃乾煩不眠欲飲水少與之傳
子豆豉湯

煩躁林

煩爲內不安躁爲外不安邪氣在表者在裏者因火劫者陽虛者陰盛者煩躁者謠之常也非逆也結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不得卧者吐利煩躁四逆者自利煩躁不得卧者皆死

惡寒而躁時自煩欲去衣大柴胡

煩躁消渴 展砂五苓散

汗後煩躁不得眠欲飲水少與之

自汗心煩小便多 茯苓甘草湯二等

五六日不大便經膈竈虛煩躁發作有時此有燥屎 小乘氣

吐利厥冷煩躁欲死 六 吳茱萸湯

陰盛而煩躁名喚躁 三 四逆湯

下利咳嘔煩躁不得卧 猪苓湯

傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁

厥陰背第四推兩傍各一寸半名厥陰俞但是厥陰經九候

自汗盜汗肢汗頭汗林

發熱惡風自汗太陽中風

桂枝湯

自汗小便數 茯苓甘草湯

柴胡

加桂

多發汗，汗漏不止，名漏風亡陽。桂枝附子湯

附子湯

陰證四肢厥冷，自汗。四逆湯

陽明証汗多渴不大便。

調胃散氣

汗多不止。

木

藁

芍

芷

各一兩

米粉半兩爲細末，周身撲之。

見溫粉門

○汗多亡陽，煩躁惡風，不得眠，先與防風白木牡蛎湯三味等分爲末，米飲調常時酒，調極佳。汗止後，用小建中湯。

○肢汗太便難諳語，四肢汗出熱聚於眉也可下。

不食小便澁，四肢汗出中寒，也可溫不可下。

盜汗睡而汗出覺，則方止，非如雜病。

之虛邪在半表半裏也。

○汗出而微惡寒。

小柴胡加桂

木加桂

本

脉浮潮熱，或盜汗。

黃芩湯

本

芳草分等

棗

吳茱萸

○頭汗汗下後，胸脇滿結，小便不利，往來寒熱，心煩，而頭汗出。柴胡桂姜湯。

○頭汗出惡寒，小柴加桂，

汗不止者，難治。喘亦然，心下滿頭汗出，木結胸。

小半夏痰苓湯

本

一無汗本。

桂附子湯

本

脉浮而遲，不能作汗，身必癰。

桂麻

各半湯

○陽明主汗，汗今反無汗，身癰，皮中久虛故也。

末附湯 黃芪建中湯

桂枝湯

一頭痛太陽証多頭項痛屬厥陰頭角
痛屬少陽額痛及鼻陽明

無汗發熱惡寒頭痛 麻黃湯

太七日不大便頭痛有熱屎清不在

裏仍在表須汗痛甚者必衄 葛根

葱白湯 刑防散 川芎石膏湯方見前

頭

木絲頭

小半夏升桂散

汗出發熱惡風頭痛 桂枝湯

輕者 柴胡桂枝湯

柴表半裏往來寒熱頭痛脈弦細

小柴胡湯

而頭汗出

柴助半表

發熱頭痛似瘧爲欲愈 各半湯

厥陰少陰頭痛嘔吐涎沫 吳茱萸

湯方見前

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓
散

自汗頭痛風暑及雜病俱宜白虎或
少加蔓荆芍藥 或竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脉沉滑而長頭
痛可下
熱不惡寒或不太便小便赤者胃實
也調胃承氣湯

汗後不解頭痛不止 止辛烏
擗膏貼額上或用不卧散吹入鼻內
一胸膈滿

胸滿多帶表証 腸滿多便半表半
裏半表半裏脇下痞鞕 沖和湯
去棗加芩小柴胡湯別名也

汗下後胸膈滿微結小便不利渴而
不嘔但頭汗出或往來寒熱柴胡姜

桂湯下利身熱，腸痛。大柴胡

寒中誤下之愈，不快腹脹或吐，或利。

理中湯 枳 陳輩

心下滿而不痛 半夏瀉心湯

嘔滿而發熱者 小柴胡

飲水多心下滿脹 牡蠣沬瀉湯

一結胸

結胸有下之旱而成者，脈浮緊心下硬痛，未可下之，按之則痛，爲小結胸，不按而痛，爲大結胸。

結胸証悉具，而加之煩躁者，不治。

結胸有熱或煩渴先冲和加枳實次

下太藥，

飲水不散而結 小半夏茯苓湯或

小柴胡東加苓、芍或五苓合枳木湯

枳木湯 實兩 末二
右

枳木湯

結胸喘促狂亂大躁用地龍水一服，未解再服自然汗出愈。

邪熱在上，胸膈痞結，未辨虛實，先與

理中加枳實，太妙或桔梗枳穀湯味

等

結胸手不可近，用陷胸藥不効，枳

實 理中丸 苓 參 木 姜 炮

湯下

渴者加桔萎，

汗後未全解，誤下之爲小結胸，煩渴，

脉實宜二黃瀉心湯，大芩連表

未全解亦不可用

熱實，脈沉緊心下痛，大陷胸湯

寒實脉浮滑心下按之痛無熱証，三物小陷胸湯 白散亦可

項強如痙或從心下至臍上手不可

近大陷胸湯

條 黃連二十許爲末巴豆七粒去殼研細入黃連末捻作餅子按臍中以

艾炷如指頭大灸之輕者一炷重者不過二三壯熱氣入腹作聲取下惡物而食

慧心下會悶未經下者非結胸及表和傳至胸中未入腹小柴加根桔未

效本方合小陷

箭加根桔即愈

一痞

痞心下滿而不硬按之不痛曰痞硬水停濡氣聚不滿不硬但妨悶者非痞謂之支飲 小柴胡加桂 胸滿而濡者半夏瀉心湯 旋覆代赭湯

旋

甘各一 参六兩 薑三字生姜

六分半八束箇二右 輕者 桔梗

根實湯 桔 半 枣一 實半 陳仁右或加苓甘又用苓白朮甘草主姜湯

胸滿硬按之不痛關脈沉緊 大柴胡痞滿小便不利 五苓散

一 腹脹滿

腹中滿痛

小柴胡 去參

六七日不大便腹滿痛急下之小承氣

大實痛者 桂枝大黃湯

譖妄脉沉數煩渴不拘日數調胃養氣

太陽病反下之因而腹滿脹痛 桂枝芍藥湯

小腹滿硬小便自利如狂者血証也

小腹急結者 桃仁兼氣

小腹硬，尿不利爲無血當滲利之。

一腹痛 按之不痛爲虛，尺脉弦，腸鳴泄利。

小建中湯

按之痛者爲實，關脈實，腹滿而大使秘。
桂枝加大黃湯

少陰腹痛或泄利，通脈四逆加芍藥湯。

陽脈濇，陰脉弦，泄利。
桂枝芍藥湯

厥陰証小腹痛，當取四逆湯。

飯浸枝 芍 細各三 甘各三 連草各二
兩

味子干姜湯

少陰腹痛泄而厥冷，脈微，不惡寒，面赤，裏寒外熱。
通脈四逆湯加芍

關脈實，便秘，腹滿，急躁，發作用時燥屎，大兼氣。

腹滿時痛。
桂枝加大黃湯

一咳嗽 掌林

在表之邪于肺，氣則咳嗽，當發散而愈。

太陽發熱，而咳。
小青龍

表未解，心下有水，乾嘔發熱，而咳。

小柴胡

少陽寒熱往來，而咳，胸脇滿，或泄利。

逆散 加五味 姜

有痰而咳。
大半夏湯

春冬傷寒，秋夏傷冷濕之咳嗽喉鳴。

上氣

橘皮湯 方見 咳嗽門

小陰或咳或慄，小便不利。四肢重疼，自利而

咳。真武 加五味 細辛 牛蒡子

一喘急

和氣外盛，而喘。雖汗喘不已，雖經汗下，亦可發之。麻黃杏子石膏湯

麻一兩 杏五十個 胡二兩 芎大 右

脉盛，自汗喘。大柴胡

一枝陽王之微喘者，表未解也。桂枝加厚朴杏子湯

水停心下，小便不利，腹滿而喘。小青龍去麻，加苓

汗後飲水多，咳喘。小青龍去麻，加杏

陰毒喘促，或陰証脈伏，喘促。理中四

逆腹滿，而喘。潮熱，若外欲解。大柴胡

汗後潮熱不惡寒，腹滿太便實。喘。

葛根黃連黃芩湯。葛、芩、甘各

各連右

桂枝証反，下之利不止，脉促，喘汗出。直視譁語，喘滿者死。汗出，髮潤，喘不休。肺絕，身汗如油，喘不休。命絕。

一嘔吐

林嘔吐先嘔，後渴爲欲解，先渴後嘔爲

水傷心正

赤茯苓湯

嘔發熱，柴胡証具，心下急，躁，微煩。

大柴胡。胃腸滿，吐則潮熱。小柴胡加芒。

吐逆，二便不通，厥逆無脉。大承氣

半表半裏証多嘔下 小柴胡

胸熱腹囉嘔吐共 黃連湯 連甘

姜枝各二參 半絡半棗二 右

嘔吐手足冷 小橘皮湯

寒多而嘔共 理中湯 不飲水而吐共

理中去木加生姜

經汗下關脉遲冒虛冷而吐于姜

黃芩黃連人參湯各等分

發汗後水藥不下及諸嘔吐穀不下

少半夏湯

煩渴欲飲水水入即吐共 五苓散

嘔而思水者急與共 猪苓湯

有虛熱少氣氣逆欲吐共 竹葉石膏

湯

瘧後餘熱在胃而嘔者共 竹葉加生

姜汁湯

胡加桔

消渴氣上衝心中疼熱共 桂苓白

朮甘草湯

桂三苓四朮二甘兩右

汗下後胸膈滿微結尿滯渴不嘔頭

汗出往來寒熱心煩共 柴胡桂枝子

姜湯

汗多而渴共 小柴去半夏加參子桔

脈浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓

湯

下利咳嘔煩渴不眠共 猪苓湯

汗後脉洪大而渴陽明脉長有汗發
熱而渴並共 白虎湯

多者不用

汗後脉洪大而渴陽明脉長有汗發

熱而渴並共 白虎湯

吐汗下後七八日不能表裏俱熱
風大渴舌乾欲飲水太陽服桂枝
太汗出煩渴中暎四肢冷汗出少渴
並白虎加人參湯

夏至前後煩渴發熱不惡寒竹葉

石膏湯自利而渴尿白下焦虛寒甘草干姜

湯甘四兩姜炮右

心煩欲眠自利而渴理中湯

汗後脈浮煩渴五苓散甘陳五苓散

小便不利而渴必發黃茵陳五苓散

茵一兩五苓散右末米飲下

陽明脈長而實有汗而渴調胃承

氣

脈沉滑熱實煩躁而渴大陷胸湯

陽毒發狂煩躁而大渴潮熱喉痛

黑奴丸汗下之後煩渴飲水涼膈散及減桂五苓甘露益元選而用之

益元散方見辨門又名六十散

一衄血

○意傷寒衄久不止梔子黑爲藥吹入鼻

中脈浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者是欲衄也

發煩目瞑劇者必衄乃解

太陽脈浮緊發熱無汗衄者愈桂枝湯

脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯

脈浮自汗而衄桂枝湯

六七日不太便頭痛熱衄小承氣或涼膈散加生地

散次竹葉湯

當汗而失之，熱瀉爲衄及吐血。犀

角地黃湯

黃芩芍藥湯

黃芩三

芍甘各半

兩

少陰病，而無汗強發之，必動血，或從口鼻出血，或從目中出，名曰厥上竭難治。姜附湯治本。

衄者頭汗出，身無汗，汗出不足者死。

汗後熱退，衄不止，新米濕紙貼於鼻上及頸項，數易之。

傷寒七八日不解，自胸上至頭面，色黑紫壅腫，寸脈浮大，而數是欲衄，而不能出刺，鼻中出血數升，而安，或兩尺汎穴出血，如射即安。

一譖語

譖語身微熱，脉浮大者，生逆冷，脉沉細者，日內死。

直視譖語，喘滿者死，下利者死，謂正氣脫絕也。

汗多亡陽，反身和譖語，此津液不和，也不可下。柴胡桂枝湯。

傷寒發熱，經水適來盡，明了暮譖言，熱入血室。小柴胡。

發熱四五日，大便秘，小便赤，譖言熱，厥急用大柴胡。

譖言不惡寒，反惡熱。白虎。

煩，不眠，譖言。白虎加梔子。

腹滿，身重，面赤，譖言，遺尿，脉滑實，不渴，下白虎湯。

喘滿，口乾，咽爛，或不大便，久則，譖言。

是被火劫所致

白虎湯

正之緩熱病久神不清狂言脈虛而長微弦滑

大承氣 柴胡飲

汗出譖言爲風正之下利譖言利燥

小承氣

潮熱反不食有燥屎太熱入胃水竭煩躁必譖言又身熱汗出大便硬譖言冒實並調胃承氣

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譖言身重柴胡加龍骨牡蠣湯斂鎮神氣

發狂

發狂邪熱至極也新汲水濕布搭於

胷上頻易之

熱病六七日未得汗脈洪數面赤目

脹煩躁狂走大渴 大柴胡

熱極脈大渴而發狂 黃連解毒湯不已 承氣湯

血上逆則喜忘下畜則內爭其人如

狂犀角地黃湯 重抵當湯

喜忘如狂身黃太便黑血証也抵當

湯

膏滿唇瘻舌青口燥漱水不欲嚥無

熱有瘀血必發狂下血 犀角地黃

湯加芍

傳汗吐下後熱甚脉洪數喘身黃狂走三黃石膏湯連進三四服而愈

益血者如狂熱在下焦小腹硬小便自利抵當湯下血脉弦而長調胃承

氣沉實有表証大柴胡小腹急

右承氣

陽毒狂躁發狂

桔梗大黃湯 桔

梔子大承氣

右

升麻梔子湯

升半

柴三兩
桔梗一兩
旋覆十

膏半 生地汁半 右

吐下後及虛人未解發狂人參白虎
辰砂之類清浮火或寒水石指通
水調下又龍膽草一物湯治陽狂

水狂者周身用火迫奴出汗其人亡
陽煩躁驚狂 梧枝甘草龍骨牡蛎

湯

在言直視爲腎絕汗出復熱年言不
食爲失志皆死

一發黃

發黃寸口近掌無脉鼻氣冷不治形
駁黃如炬薰直視搖頭心絕環口黧
黑潔汗發黃肝絕

發熱身痛身目俱黃太陽中濕 麻

黃連翹赤豆湯

麻葛根甘草各一錢

蘇小豆畔杏枝一束妙生姜而生梓
白皮得右

發黃脈浮堅不可下 各半湯

往來寒熱身痛身目黃小柴胡加梔子
湯

脈浮弦咳嗽短氣腹滿心胸痛鼻乾
無汗身目黃小便難潮熱少陽中風

也小柴胡

身熱頭汗尿泄渴飲水此瘀熱在裏
而身黃茵陳湯

身黃脉沉結小腹硬尿利狂畜血在
下焦桃仁羌活

發熱頭汗渴飲水便利太便小柴胡
芩加茵陳

小便不利四肢沉重似癟不欲飲茵
陳五苓得湯小便利如早夜汗則黃

從小便自也

食後發黃用枳木內治皆也不治者病

掌一癥

赤癰五死一生黑癰十死一

生有上之太陽熱氣乘虛入味發
癰有下之太陽熱留於胃中亦發癰
有陽証熱藥多用胃熱焦爛發癰陽
毒發癰紫黑熱毒陷於內也不治

陽毒已深舌卷焦黑鳴燥狂言面赤
癰如錦陽毒升麻湯五日可治六七
日不可治

○傳

陽毒生癰涼膈散加板

赤癰熱証且咽痛玄參升麻湯

溫毒嘔者葛根橘皮湯葛根橘

杏芩麻甘絡一右半服

吐水眼赤口瘡下部生瘡咳而下利

黃連橘皮湯連仁陳杏實

冬溫受不正之氣至春發癰瘍

謂之溫毒化毒丹

溫毒無大熱煩渴大便實或腹痛

痛生赤癰謂胃寒氣

發疽而赤譙証脉大而無力或絕而

不見用參生地絡五炮附大黃仁

半右

正利至甚厥不止者死

直視譙言下利者死

下利煩躁不得寐者死

正利手足厥冷無脈者死之不溫脈

一有利

林

自利謂不經攻下爲自溏泄

身涼脉小順身熱脉大逆

正利至甚厥不止者死

直視譙言下利者死

下利煩躁不得寐者死

正利手足厥冷無脈者死之不溫脈

不還者死

下利身熱，腸滿，乾嘔，寒熱往來，脈長。

大承氣

發熱後重，泄色黃赤，此爲石熱，承連而滑，仍實數，而滑宿食，小承氣。

自利清水，心下痛，口燥，宜下。

自利不渴

理中湯

咳而嘔，渴，下利，心煩，不眠，猪苓湯。

腸垢熱也，協熱而利，必膾下熱黃芩

湯。大芍，甘桔等，以通利而

鴨溏寒也，協寒而利，必膾下寒理中

湯

自利十餘日，不止，手足微冷，無熱証

理中湯

陽病自利便，膿血者，協熱，以後脉

數，不解，自利不正，必協熱而便，膿血俱，犀角地黃湯。

一太便不利

大便不利，脈數，能食，名陽結，調胃承

氣大柴胡

脈遲不能食，名陰結，金液丹，硫一昧，
附法見

林厚朴湯，木，硫朴，陳，甘，葛，
三

枳，半，葛，二，右，姜，棗。

太便不亂，尿難有津液可作，汗

尿數不可汙，症似煩，卧不著席，施子

湯

太便堅，小便數，不可下，既陽，脉浮濶，
麻仁丸

枳實丸

三下不通，不可攻，當吐，提之。

一小便不利

小便不利，熱蓄於內，津液不下，行

故不利

汗後小便不利。微熱消渴。五苓散渴甚。猪苓湯。

汗下後尿不利。心煩桂枝湯。渴。小柴胡。

小便不利。太便白難。易微熱胃中。有燥屎。兼氣湯。

傷寒七八日。身黃尿不利。腹滿。因陳湯。

頭汗出尿不利。渴飲水發黃。茵陳湯。

傷寒八九日下之。曾瀦煩驚。小便不利。譖言身重不轉側。柴胡龍骨牡蠣湯。柴兩。芩一。生姜。鉢丹。參枝。苓。大。紅。東。枚。半。合。龍。骨。

蛎分二右

一四逆林掌百

用之

諸四逆不可下。人病毒。

吐利煩躁四逆者死。吳茱萸湯主之。

前見。林掌百。用之。

發熱七八日身冷。名藏厥。難治。惡寒。踴時厥逆。陰氣極。不治。

得病後四肢逆冷。脈沉細足攣。吐惡寒。不飲水。下利清穀。陰厥也。四逆湯。

手足梢頭微冷。理中湯。

無熱証而厥當飯。四逆加吳茱萸生姜湯。虛者宜附子湯。

陰病下利。清穀裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反不惡寒而赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止。脉不出者。吐陰盛於內。不相通也。與通脉四逆湯。

寒熱而厥，面色不溫，冒暎兩手忽無
脉，或一手無脉，必口在正汗也。與各
半湯厥，而心下悸，先治其水，如茯苓
草湯，苓一枝，芍一半，其冬十
生姜三，右。

初身熱頭痛已後太便秘，小便赤或
畏熱，或飲水煩躁，不眠譫昏，而厥，渴
厥也。大柴胡，厥而渴，白虎。

○傳
脉沉滑頭面有汗，汎溫二便秘赤，四肢
逆冷，厥深也。承氣湯。
裡熱內盛，陽厥極深，皆因失下以致
身冷，脈微昏，將死，切不得以寒藥下
之，誤下即死。又爲陰厥與溫藥必死。
但進涼膈解毒，養陰退陽，如未愈解
毒合承氣少下之，次解毒，涼膈。
天水合而爲一用之。

舌胎

舌胎傷寒二三四白，後舌上有膜，白滑，
如胎，甚者或濛或黃或黑，皆熱氣之
淺深也。表邪無舌胎，邪氣傳裏，津液
結樞，則舌胎仲景曰舌上有胎不可

攻與小柴胡，

腸下鞭滿，不大便而嘔，舌胎少，朱胡

熱聚於胃，則舌黃，熱深也。未下者，下
之。

死

一咳逆林掌

胃有寒，又飲水而咳逆，先與理中湯，
次用旋覆代赭湯，旋一升，芍一參。

六分，赭紅半升，生姜一兩，棗子二枚，
或小青龍去麻加升麻，微細橘皮子

姜半夏生姜湯

姜桂附子湯

卷

附 荷裕半木行于生姜 右

脉浮洪或有熱而咬逆者火熱奔急

上行肺不得納故也 甘草鴟牛湯

甘二芩 姜各一連 參附半半一
兩

分劑六 右

少陰因失下所致大便硬大承氣大
便軟瀉心湯脉散者死

藥不效硫黃乳香等分末酒煎急令
服之

灸期門婦人屈乳頭向下盡處骨間
丈支及乳小者以一指爲率

頭汗譫語腹滿微喘而見咳逆此危
証

一悸動

悸動有氣虛有停水有汗多榮虛補

桂枝甘草湯桂枝一兩甘草四錢

弱汗後臍下悸欲奔豚 茯苓桂

耳太囊湯苓附桂一兩甘附囊四錢

右甘附囊四錢

發汗過多心下悸按桂枝甘草湯

桂枝甘草右桂枝一兩甘草四錢

發汗陽汗則譫語而動悸 小柴胡

飲水多而心悸雖有他邪先治水
茯苓甘草湯苓桂枝芍二甘草生

姜仁

一戰慄

○林 戰慄先振誰戰慄心戰爲病欲
解也正與邪爭則爲敵慄而戰振但
虛而不至爭故戰慄動而振也與桂
虛而不至爭故戰慄動而振也與桂

往來多心悸尿澁煩渴 小柴胡

脈代結心悸 炙甘草湯

四逆而悸 四逆散加桂

一戰慄

苓白朮甘草湯溫經 在行苓細木

甘草二右

汗下後戰與 救逆湯

發汗後不解仍發熱悸眩頭痛

湯

吐下後裏虛氣上逆陽不足起則眩
脈沉緊發汗則動經振機桂參衣甘

草湯或小建中湯

卒口噤

背反張搖頭瘡病也風主動故也形如廻直視搖頭心絕

一身痛

太陽無汗脈浮身痛拘急

麻黃湯

中濕身痛難轉側尿不利五苓散尿

利者木附湯

陰毒體勢沉篤身痛如被杖咽利唇

青面黑陰毒

甘草四逆湯 真武

湯

汗後脈沉身痛血不足 桂枝加芍

藥半夏生姜湯傳桂枝加參治汗後

身痛脉沉者

一咽痛不可汗不可下

少陰腹痛猶有熱咽痛 黃連龍骨

湯 連兩芩 芎芍一龍斛 右

脈緊主無汗反有汗日亡陽當咽痛

甘桔湯

陽毒脈浮數而大嘔衄血 烏扇身

咽痛次必下利腎傷寒也先半夏桂

甘湯 三味各等分

之次四逆湯

一蛔厥

林
蛔厥元有蛔爲藏寒，蛔上人臟時煩。
得食而嘔自吐，或因發汗，胃中冷。
故長虫出，或因胃氣困之，不能食，食到

巨蟲聞食氣而上以理中丸烏梅丸。
妨門溫胃消渴吐蛔理中加大黃入
蜜以利之。

惠
吐蛔者，雖有大熱忌涼藥，蓋胃中寒。
蛔上理中加干姜炒烏梅丸煎服。蛔
定後以水柴胡退熱。

汗後不解林

發汗病不解，反惡寒，臥亦考桑耳草

附子湯

汗後仍發熱，心下悸動振振，真武

湯

汗後身痛，脈沉，桂枝加芍藥人參

新加湯

大汗出，熱不去內，拘急四肢疼，下利
惡寒，四逆湯。

發汗過多，心悸欲按，桂枝甘草湯

搏桂枝去芍藥

汗後腹脹滿

厚朴生姜人參湯

大汗出，胃乾，不眠，欲水少與之。

發熱，汗出，不解，心中痞硬，嘔吐下利。

太柴胡湯

服桂枝後，煩渴不解，脉洪大，白虎加

人參湯。

汗後不惡寒，但惡熱，及蒸熱發熱者。

調胃承氣

傳

發汗之後，熱不解，脉尚滿者，白虎加

人參湯。

一下後不解林

大下後，身熱不去，心中結，腹堅，煩，旋

蒼。

傳

大下後不解林

大下後，身熱不去，心中結，腹堅，煩，旋

蒼。

子貢湯

下後腹滿，卧起不安，梔子厚桂湯有燥屎者，大承氣湯。

下後脉促，胃滿，桂枝去芍藥湯，桂枝証誤，之利不止，脉促者，表末解，喘而汗出者，葛根黃芩黃連湯。

過經十餘日，二三下之，嘔不止，心煩，大柴胡湯。

汎下後，未能除，用梔子豆豉湯，或東垣加減涼膈散。

一勞復然

病瘳後勿早起，搬頭洗面，方體多虛

用心令勞復。

病後忌酒肉，莫難消之物，又勿過飽，更結熱，難救，謂之食復。

瘥後未滿百日，氣力未平，復而犯房，則陰陽易林掌。

室者死，謂之女勞復。

勞復生熟，尿浮，以汗解之，枳實梔子

湯。

瘥後渴，竹葉石膏湯。

業。

食復尿沉實，腹滿譁語，枳實大黃湯，大柴胡湯。

男病新瘥，婦與之交，陰陽易，婦病寒，寒，男與之交，即陰病，婦則寒急，腰脇

連腹痛，男則陰腫，小腹紋痛。

男女俱或熱上衝，冒頭重，不舉眼，生

花，離經脈見者，死。一呼一至，指脈離經一呼二至，至脉離經二脉，易病石，用燒視散，竹皮湯，小便不利，五苓

散

一狐惑之証

子厚桂湯方

齒燥惡飲食面目白赤口白舌

脣黑有瘡四肢重喜眠食喉爲喉
食下部聲喎爲狐甚者食藏而死上
脣瘡血食其藏不唇瘡血食其肚以
雄黃銳散膏納穀道中

唇瘡聲喎桃仁湯或黃連犀角湯
連犀兩烏梅七木朮右

一掌藏結其狀如結胸飲食如故時久下
利舌上白胎膍竊引陰筋不寒熱云
塞而其人反靜此藏結也死云
不熱

一不治脈証

林

陽病見陰脈者死代脈者死

龍言身熱脈洪大生身冷脈沉細死
發斑陰脉死

○傳

咳逆上氣脈散耳聾脈浮濁難瘥
下利脈反實逆

吐衄血脈浮大凶下不至關陽氣絕
上不至關陰氣絕

少陰厥逆無脈服藥通脈漸續生
脈暴出死

少陰四肢厥逆下利惡寒而拳發躁
無脈不治

脉陰陽俱虛熱不止脉乍踴乍數者
死

休脈必是正平服麻黃甘草附子
湯多衣摸床熱內結脉弦者生滿者死

赤癰出五死一生黑癰出五死赤癰
發動氣汗者死陰毒二脉易病有

日者不治西感傷寒利五苓

大發溫家汗則爲寒熱而寒
結冒証見煩躁者死
發少陰汗則動血丸竅出血者

之下厥上竭

發少陽汗則譖言汗只在頭面不至
遍身衄血逆

發濕溫汗身清面愛耳聾不語不治
發風溫汗者死亦主譖言咳逆不止
者死 瞳結者死 發厥至七八日
膚冷而躁無時曹安者名藏厥死
厥陰舌卷囊縮者死 少陰吐利煩
躁四逆者死 刮申青陽襄敗也
口乾舌黑不治 汗出如貫珠絕汗
也喘不休衛氣敗也 發黃變黑不
治 發汗不至足者逆

汗後嘔吐水兼不入逆

腹大滿下泄不治 目張目陷不治
舌本爛熱不止逆 發斑自利不治
陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹
絞痛手足攣者死
厥而下利當不能食反能食者不治
傷寒七八日以上大發熱者難治
氣惑咽乾聲啞唇瘡不治
諸逆發汗劇者言亂目眩不治
張口出氣乾嘔骨熱痛逆
譖言直視或喘滿下利並不治
下利發熱或汗不止或厥不止並不
治

汗後不爲汗表發汗而不得汗發
脉躁疾狂言不能食者謂之三汗冬
猫頭直視如煙薰心絕五
唇吻反青四肢多汗肝絕

反首直視、往言遺尿、腎絕

環口齶黑涕、汗發黃脾絕

汗出如油喘促無已肺絕

太漿不入形跡不仁命門絕

絕及三西藏則死

一禁戒

掌林

服藥中病即停後服

瘥後百日犯房者死

瘥後必食糜粥常令稍飴勿飽

若食諸肉肥血油膾等物必太瀉難治又莫勞筋不可多言不可使意皆勞復取汗但脉微弱遲細動氣瘡淋亡血虛煩必不可用之夏時用桂麻宜加涼劑其性熱故有癥變之患也

食燒肉消渴

食魚鮓發黃

食濕麴潮熱

食黃瓜必無病

食茄子成瘡

食生菜顏色不復

食葵菜失明

汗後飲冷水損心包

早梳頭潮熱

早灌足必癆

早洗浴熱悶

躁怒成瘡

思慮重則氣消遠行脚風

不得早起

不得勞心費力

一發表解肌之劑

○麻黃湯

治太陽脈浮頭身痛惡寒

發熱無汗而喘

麻根節枝三分

甘松杏仁右先煎麻黃一沸掠去

土沫下餘藥煎去粗溫服覆取汗冬

及春初宜用蓋性熱夏至後服發班

黃狂悶

○桂枝湯 治太陽中風

桂枝半
芍藥半
甘草半
右加

生姜三片 太棗二枚 前冬及春初宜
用夏至前加芩一錢 夏至後加知母

石膏一錢

○葛根湯 治太陽陽明合病無汗惡

風身熱痛 葛根一錢 麻仁一錢 芍藥一錢

芍藥半
右加姜棗

○小青龍湯 治表寒解心上有水氣

嘔咳發熱 麻仁一錢 半
細辛一錢 姜半
枝條半
右渴去半
桔梗半
後飲水多咳嗽去麻加杏仁
咳嗽心下有水氣而小便不利去麻
加苓一錢

○大青龍湯 治傷寒見風或傷風見

寒脉弱汗出勿服 麻仁枝條各錢

○東方聖飲 治刪瘞一症 握頭口噤身

反張搖擺面赤項強 中風一亨

正柴胡芍藥甘草白朮烏藥半

芩根右加姜煎入竹瀝姜汁口噤咬

牙大便實者加大黃○無汗刪瘞加

麻蕎○右汗柔痉加枝木一錢

○六神通解散 治發熱頭痛發渴身

疼脈洪無汗 麻仁甘草白朮石膏

桂枝四錢右入姜葱
和解之劑

○小柴胡湯 治傷寒四五日往來寒

熱晝滿腸痛心煩喜嘔風濕身熱邪
在少陽經 柴胡半
芩根半
半
右加姜棗

○大柴胡湯 治傷寒加柴胡

桂枝半
芍藥半
甘草半
右加姜棗

惡寒反惡熱者，
半大絡二實半外方加姜棗茱萸以利，

歸度

○柴胡姜桂湯 柴配枝 茜絡三括

一姜炮甘 脐瓣略 右

○半夏鴻心湯 半一術芩 參 甘

炙姜炮略連醉 右加姜棗，

○小半夏茯苓湯 半兩右芩 三兩右鹿

去滓入生姜自然汁，熟服。

○小陷胸湯 治下之太早，緣多爲結，胃

胸中作痛，痞滿，大黃連一分半六分

萎連，橘子右以水一盞，先煮，凡萎去

粗納諸藥，再熬。

○黃連湯 治傷寒胃中有熱，胃中有

和氣腹痛，欲嘔吐者，連、甘、炙

姜、枝格二參半絡半大棗二枚

○全柴胡飲子 治內實便難不惡寒，反

惡熱，柴參芩甘大棗，白芍，右等分加姜，

○防風當歸飲子 治身熱便穢不惡

寒，而煩渴，柴參芩甘，白芍，右等分加姜，

○解利兩感神方大恙活湯 風 慘

獨、巴、芩、連、蒼、白朮、甘，其，炙細格三知，芩生地絡一升口，

○惠沖和靈寶飲 治兩感頭疼惡寒發

熱，口燥舌乾，風 慥、芩 甘，其，愈視表裏証多少用汗正。

○柴胡雙解飲 治寒熱互

細 生地 莩 柴 葛 芷 膏
豆一撮，右入姜棗取微汗爲度，如未

愈視表裏証多少用汗正。

○柴胡雙解飲 治寒熱互

口，

草薢弦數方 小柴胡加芍陳入姜棗

魚入生艾汁溫服○嘔者入姜汁竹

蓆○腸痛加青皮○尿不利加苓

痰多加薑貞

○桂枝麻黃各半湯方 桂枝伍芍甘

麻各三去根節杏二辛四箇炒生姜大棗

○柴胡桂枝湯方 柴三箇桂參

芍各半半四各甘三分姜棗

一文裏之劑傳

○小承氣湯方 治六七日不大便腹脹

滿悶汙後不惡寒潮熱在言而喘者，

大紺朴

實略三右煎服以利爲度

○大承氣湯方 治胃實譖言五六日不

大便腹脹滿煩渴舌乾口燥日晡發熱

豚沉實者

大半分朴實略一芒

合半右先煎枳朴去粗內大黃并煎

右煎法同前

○調胃承氣湯方 治太便秘結譖言而

嘔目脣潮熱者

大半分甘三分芒合

右煎法同前

○大陷胸湯方 治大結胞高起手不可

捫

大半分甘遂一分二厘

右先煮大黃去粗納芒一二沸納遂

未服以利爲度

○京臘散方 治表未解半入裏下証未

全懊憹不眠煩渴口舌生瘡譖妄便

瀉閉結發斑黑暗

蕤附梔大

奇芬絡五甘半兩朴硝半分右

○黑奴丸傳 治溫毒發斑煩渴及熱病

大七日未得汗脈洪大而數面赤狂

走渴甚若微利不渴不可用芩

金底煤灶 突墨 芒 麻 條上

塵 小麥一奴酪一大三兩右爲細
志棗蜜丸新汲水調之

桔梗大黃湯 大一兩柴 一 杯 挑

桔酪二甘仁 右以通瀉爲度

一清熱生津之劑

傳

○白虎湯 治陽明証汗後脈洪大而

渴及虛煩中暘等証 知甘仁膏
一兩粳五 右水煎待米熟去粗溫
服。口燥煩渴不止或發赤斑參仁
名化斑湯又名人參白虎湯○陽明
下後大便不固熱不退者或濕溫便
溏熱不退者加蒼朮

○林竹葉石膏湯 去石膏名竹葉湯

膏二兩八門一兩半 参 甘各三錢半
四分竹葉二右每服五錢內粳米三

十粒煎服

傳

○黃石膏湯 治瘡變發在太便泄

者 膏仁芩 連 柘絡一枝合麻
不施極 右

○黃連解毒湯

治太熱不止乾嘔煩渴錯語呻吟不得安寐

連仁芩 柘絡二右

○林苔陳湯 苓畔大粒肥施半枝右生

煎首減水一半內二味煎服

○施子宣豉湯 治汗下後虛煩不眠

心中懊憹或大便後熱不去心下結

痛肥施四香豉半枝同煮去粗溫服得吐止
後服

○東垣加減涼膈散 退六經熱及傷

寒餘熱膚煩

葛根一施

奇 竹葉

芩 桔絡 半其生半右

○耳露飲

治汗下之後煩渴而欲飲

水 甘 膏 寒 苓 汝絡 二木

枝 猪 各半 滑細

右爲末每服三

錢白湯

治傷寒瘥後不得眠

梔 苞 甘 酈 半柴一兩烏梅十四箇去核

右加生姜竹葉豆豉

○逍遙散

治病新瘥患勞復或陰陽

易 參 知 連 甘 生地 渭

薤根 柴 扉 竹青

伊繩腹痛倍加苦

姜棗木煎

臨服入燒褪襍未半竹調

粘汗出爲妙

○分陽散火湯

治根空尋衣摸床譖

言沉昏如小便不利者不可治 參

飯 柴 芍 門 苓 木 甘

神

右加姜棗木太便燥結詰

語發渴加大黃泄漏者加升木炒

○道赤各半湯

治病後神昏不語目

瘡唇焦舌乾

連梔爪芩滑

心姜棗

左加升木炒

○酸棗湯

治吐下後心煩之氣不眠

酸升門行其氣

兩知附苓正芎 姜

各三

右

○金石木散

治病後氣脈不和食復勞

復 桔 苓 芍 陳桂青甘薄

甘 山各二木四

姜炮兩右加姜棗

○增損白木散

病後服之生津止渴

順氣止咳

木葛苓藿參木硝一陳

乾生姜芍右麻子

溫膽湯

治病後虛煩不眠，先心膽

虛怯一切病後用橘紅半兩實

半各一苓生甘硝

右加姜棗行施

寒益元湯

治身燒頭疼不煩而赤飲水不得入口此元氣虛弱無根虛火

泛上非熱証不用涼劑熟附甘草

參姜門連知五味葱

艾葉囊右

當飯治血湯治頭不疼不惡寒只身熱滑小水利太便黑口無倫語此

內傳心脾二經令昏迷沉重不可作

熱証白

赤芍生地甘姜參柴枳桃紅二服後去

姜桂桃紅加苓木右姜一片水煎

入酒三匙調服

枳實梔子湯

治太病後勞復者

實故梔十四

豉升右

一涼血逐瘀之劑

梔尾角地黃湯

治大便黑衄血脈微發在發黃當汙不行內有瘀血

芍生地壯犀之各二升半

右

東生地芩連湯

治熱毒入深吐衄不

止生地芩連梔桔甘

柴芎芍犀之各二升前臨服入茅根汁如無藥汁亦

可

傳桃仁承氣湯

外証已解小腹急太便黑小便不利爲瘀血証此藥主之大行告桂格半甘冬桃十箇去皮尖研

右水煎去粗納生火沸溫服血盡爲度

○抵當湯 治血結胞譚語因瘀血結於胞中狂言小腹亦滿漱水不欲嚥者
水蛭炒畜蟲各十五枚去桃十箇去桃皮尖研右熊服血下止後服一治癰瘍之劑

○陽毒升麻湯 治陽毒亦斑出在言吐膿血升麻犀屑射干大參甘草各右

○陽毒梔子湯 治傷寒壯熱身癟發斑爛梔升芩芍柴葛一
膏仁知半升芍細杏半分右入姜豉屬角消毒飲 治發斑癰瘍牛四
荆穗風絳二升芍不入湯煎右煎調犀末服

○梔子仁湯 治發斑煩燥面赤咽痛潮熱梔赤芍大青知各

升芩膏杏去皮尖柴甘草各等分

○升麻湯 治發斑喉痛玄參升甘草右加姜豉

○大青四物湯 治癰腫發斑大青四膠珠子甘草各等分

○解毒防風湯 治發斑及癰瘍疼痛風半地骨玄芍荆枳

牛分半七右
○加味羌活散 治感不正之氣發瘍

○加味羌活散 治感不正之氣發瘍
疹羌前絡一參桔甘草枳
芎天芩各半蟬苛各三右加

○祖傳經驗加味敗毒散 治癰腫之
妻

癘疹等証 ノ 敗毒加飯 芍 ニ 衣
風 荆 蒼 生地 各分 等入 姜棗此

因虛而感風濕而發斑者佳

○調中湯

治內傷外感所發陰斑

蒼半 名陳仁宿 霽 芍 根甘 桔
半 芍 姜 杞 條 七 芎 五 麻 枝
各二 右加姜 芍

○陰毒升麻葛甲湯

治陰斑 ノ 升仁

飯 甘各一 名 椒二十粒 益一雄鴨
另 右煎調雄未瓶

一分利之劑

○五苓散

治傷寒中暎煩躁小便不利而渴或霍亂吐利 ノ 沢半 兩 苓

术 猪各一桂半 兩 右爲細末每服

三錢白湯或清米飲調正或細切加

姜棗煎服熱甚去桂加芩

○猪苓湯

猪苓 膠 沢 液

右各等分水煎去滓下膠候消服

○赤茯苓湯

赤苓 陳 參各二木

芎 半 兩 右

一道疾之劑

○惠加味道痰湯

治內傷七情致痰迷

心竅神不守舍如鬼祟情寒壯熱頭痛

上氣喘息口出涎沫爲傷寒治

芩 半 陳 實 星 甘 木

桔 参 萊 芩 連 右剉姜棗

水煎臨服入竹瀝姜汁

○小橘皮湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

錢加生姜炮

○陳兩生姜

右

○大橘皮湯

治傷寒嘔噦胸滿虛煩

不安 陳 參各一 甘 半兩 右每服五

錢加生姜炮

右

林 大半夏湯 半 白苓 生姜各一

右加棗箇

○ 小半夏湯 半 酸赤苓 附右加棗箇

一溫經溫中之劑

林 四逆湯 治即病太陰自利不渴及
陰証脈沉細而遲身痛 附皮一枚去
片生 茯苓六錢桂枝三錢芍藥三錢
用生 茯苓六錢桂枝三錢芍藥三錢取少汎而
愈

林 通脈四逆湯 姜附芩二兩附箇生大者一枚

右傳無甘有參

○ 茯苓四逆湯 茯苓二兩參三錢附生去皮
八分 甘六分二姜半

右

○ 傳理中湯 治即病太陰自利不渴寒

嘔腹痛鴨溏蛔厥霍亂等証 惑曰 吐
蛔者雖有大熱忌涼藥蓋胃中寒蛔

上加干姜炒烏梅各一錢煎服蛔定後以

○ 貞武湯 治即病陰証脈沉細身痛

或發少陰汗筋腸肉瞞等証 茯苓
芍 生姜 附炮桂皮木仁右如咳

者加五味姜細絲一小便利者去芩
子利者去芍加姜紅 嘔者去附
角生姜

○ 姜附湯 治下後復發汗不得眠無

表証而脉微者 姜伍附生陳右如
下利厥逆脈不至者加耳倍姜而赤

者加葱九莖 嘔者加生姜 利止

脉不出加參三錢名通脈四逆湯

咽痛加桔少陰証腹痛或泄利加芍

咽痛加桔少陰証腹痛或泄利加芍

二錢半

附子散

治陰証唇青面黑身癰四肢厥冷熟附桂飯木祿二

姜炮半祿右加姜黃

○全生料五積散

治感寒頭身痛惡寒嘔吐或感寒濕腰脚酸疼芷芎

甘草芩飯桂芍半祿三朴四陳枳麻各六桔各十二蒼十四兩

右加姜葱

○白木散治陰毒傷寒心煩四肢逆冷川烏炮去皮膚桔术附炮去皮膚細各一姜炮半右

○海藏肉桂散治傷寒服冷藥過度

心腹脹滿四肢逆冷眼昏不知入變爲陰毒証桂术木朴

炒良祿三白芍陳前飯

附炮參各一茱萸右人參

○每造飲治無陽証頭疼發熱惡寒

項脊強無汗用表劑汗不出是陽虛不能作汗冬月用之夏加芩膏也

茯苓參枝甘熟附細羌

風芎生姜炮右剉棗一枚水煎

熟加炒芍一撮再煎三沸溫服

○林木附湯治中寒中氣四肢厥冷牙

關緊急瘻壅腫脉弱木三分附炮甘羊角右分二貼每貼姜十片煎

化蘿合香丸併進

○慧調榮養胃湯治勞力感寒証即補氣之參芪飯柴陳甘

术芎生地細卷風右

入姜棗葱白

○全人參養胃湯治外感風寒內傷生

氣之加減參芪飯柴陳甘

冷憎寒壯熱頭目昏眩及夾食停咳俱能治之 蒼妙半 朴各一 橘紅

七分藿 莪 大參各半 耳後一半

右加生姜烏梅寒多加附子

一瘧疫

○傳經日冬不藏精者春必疫是以多感房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病醫書曰疫癥皆觸冒四時不正之氣而爲病龐安常曰疫氣之發大則流行天下次則一方次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發所致也仲景無治法後人用敗毒散治甚得理切不可作傷寒正治而大汗大下也但當從乎中治而用少陽陽明藥所中看陰陽脈証一方加減和治之

田溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有二法宣補宜散宜降用大黃芩連參桔蒼風滑莎人中黃神麌糊丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下

○敗毒散 治瘧疫四時通用 卷

獨 前 柴 莩 枳 桔 白芍參硝等甘草右爲末每服二錢加姜三分煎服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘧疫風濕風眩肢痛增寒壯熱項強睛夜或多風痰或更卑濕之也脚氣痿弱此藥不可缺一方加薄荷少許

○九味卷活湯 治瘧疫初感二日間服之取汗而愈其効如神 卷

○風 蒼各二分半 莩 芍 茅 生地 甘

絡二分半 細絲 右

○**大無神木散**

治四時瘟疫頭痛項
強，身癟增寒壯熱專主山嵐瘴氣之
妙劑也。陳仁蒼 朴絡一 甘 薑
菖各一分半 右作一服加姜三片棗一
枚煎服。一方無菖右香附一

○**十神湯**

治時令不正瘟疫妄行或
四時感冒，風熱頭疼身癟寒熱無汗
陰陽兩感並宜服之。麻 莩 甘
薺 葛 升 芝 赤芍 陳 莎
各等 右加姜葱。如中滿氣實者
加枳殼行。

○**升麻葛根湯**

治瘧疫頭痛發熱，

升 白芍 甘 薑各二分半 葛根十五石

○**柴胡升麻湯**

治時行瘟疫並行熱惡

升 柴 前 赤芍 膏 葛各二分半

桑各六分半 肋去梗 升五石
葛根兩半 升五石

姜三片煎十餘粒。

○**神木散**

治四時瘟疫頭痛發熱及

傷風鼻塞聲重。 蒼五毫 芍 茅

林

辟一枝 瘴病，赤小豆新布囊盛之，置井中

三百出舉家服。男二十枚女二十枚

○又法熬豉和白木浸酒常服之。

○又法用狐狸鼻尖及糞燒之以薰除此病，狐糞槐有竹木石間頭尖堅者

是也。

○又雄黃研早晨水塗入鼻孔中及瞼

毗亦可塗同床不傳。

○天行疫癘者東行桃枝剉煮湯合蒙

澡浴音ヨウリ

○溫病勞役及食復燒人屎存性爲未酒調方寸七服

太行瘟疫及小兒熱癟狂啼大人酒後暴熱用臘月八日雪磁器盛之遇此病服効

○屠鮑酒方

大 椒 桔 桂 風

各半木

川烏

蕤葵絡

一右八味

剉以絳囊貯之歲除日懸掛井中令沉至泥正旦出之將囊浸酒中略煎

傳

東垣曰太頭病乃陽明和熱太甚資

實少陽相火而爲之也濕熱爲腫木盛爲痛此和見于頭多在兩耳前後治法不宜藥速速則過其病上熱求陰中寒復生當視其腫勢在何知頭

○丹溪曰濕熱在高巔之上用卷及酒炒芩酒蒸大黃隨病加減切不可用降藥

○二黃湯

治太頭太行疫病

芩酒

炒連翹生甘絡等

右水煎徐徐呷

之○如未退用鼠粘子炒薑水煎入芒硝等分亦時以少與毋令飲食在後○如未已只服前藥取大便邪氣已則止

前方宜名少加引經藥○陽明渴加膏○少陽渴加桔○陽明行經升麻葛芍甘○太陽行經荆風甘並與上藥相合用之或云頭疼酒芩口渴葛身痛卷枝風芍俱宜加之

一 蝶慕溫

傳丹溪曰蝶慕癰屬風熱防風通聖散

加減用之或用小柴胡加風差荆芍桔煎服。外以柳柏葉搗汁調火蠍蛇蠍糞付之或用香尖附子尖南星醋調付之或五葉藤車前草皆可鳩矢之効。

○萎蕤散

治冬瘡頭面腫 萎蕤不半膏 菊絡半麻 白薇 卷杏

甘 青木香 哥絡半

右水煎

○大頭天行病從頭領腫執者又名鷺鵠瘡○用老酒芩酒太黃加減十五太白眼小柴胡湯不愈者仍用陳蘿發散而愈。又法酒炒芩連爲君多其爲佐水煎細人呷之再加鼠粘子酒蒸大黃煎入芒硝亦頻與之。

○桔湯

治冬溫呴喉腫痛 甘桔絡等右水煎時以頻呷之

一 感冒

○不換金正氣散

治四時感冒傷寒

瘧疾寒熱霍亂牛瀉及出遠方不伏

水土並皆治之

朴姜 陳鼓 蕤

半 蒼米泔浸各一升

甘

右加姜棗

○藿香正氣散

治四時感冒頭痛腹痛

寒壯熱或風濕霍亂吐瀉

腹瀉洗

梅榔子 烹熟煮蘇葉藿

甘

朴姜 末 陳白桔 半絡

四 甘

分 右加姜棗

○清風百解散

治四時感冒頭痛發

熱鼻塞聲重咳嗽喘急等証

蒼

麻蘇

荆穗陳芷絡 甘

右加

姜葱咳甚者加烏梅一箇

右加

姜葱咳甚者加烏梅一箇

六九

八鮮散 治四時傷寒頭疼體熱惡

風多汗惡心嘔逆 參木苓

甘草陳守瓘 朴硝等 右加

姜棗

○和解散

治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐利

蒼去皮藁桔甘

各半 陳朴硝四右加姜棗

○香蘇散

治四時傷寒頭痛發熱惡寒

莎蘇各二陳一甘硝半右加

姜葱頭疼加芎芷

○參蘇飲

治感風頭痛發熱咳嗽聲重涕唾稠粘大解肌熱寬中快膈或

勞瘵潮熱往來並能治之 參蘿

葛木半荊芩各分三枳桔

甘炙陳桂附各右加姜棗氣盛者去

桂枝

○味芎蘿散

治四時傷寒發熱頭

偏芎社蘿葛各半柴芩各半

桔半生甘炙不半枳椇三分陳半炙

右加姜棗 惠頭疼甚加芷

○冲和散

治感冒風濕頭目不清

塞聲重肢脉倦怠久伸此淚 蒼芩

荆穗各一兩一右煎服

○中暑門

三

○一中暑中熱之異

傳內經曰靜而得之爲中暑動而得之

爲中熱

○暑熱之時無病之人或避暑於深掌

太廈得之者名日中暑其病必頭痛

惡寒身形拘急肢節咬癟而煩心肌

肉

十眉大熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身之陽氣不得伸越。大順散桂等分等熟藥主之。

○若行人或農夫於日中勞役得之客曰中熱其病必苦頭痛發躁熱渴肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎等涼劑主之。

愚按傷寒論中一證曰中暍即中暑也脈虛而微弱煩渴引飲財熱自汗此蓋得勞役熱虛而暑邪于衛之候是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑一証曰熱病即中熱也脈洪而緊盛頭疼鼻熱口燥心煩此蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發乃挾暑而成火熱之候宜黃連白虎解毒等清涼

一方法

人所出

○中暍而死切不用冷宜溫養以湯屬臍中疊生姜或大蒜送下不能嚼水研灌之或生薑末湯點下亦佳也

傳清暑益氣湯 治感長夏濕熱四肢困倦精神短少口渴氣促身熱而煩小便黃而數大便滯而頻或渴或不渴自汗身重脉洪緩 方 茯苓少蒼朮半升
生參 木陳 麵炒沙洛五
甘炙柏酒浸瓶 青門葛絡三
五味丸 右

○百虎湯 治暑熱發渴 方見傷寒

玉脉虛加參

○益元散 一名天水散 治中暑煩渴小便不利 方見傷寒

桂等分等熟藥主之。

○香薷飲 治暑熱腹痛霍亂吐利煩
心等証 蕃朴姜製扁絲半右水三
煎慧氣虛者不可過多

○黃連香薷散 治証同前前方去扁
加連半分

○十味香薷飲 金清暑氣和脾良 蕃

竹參 陳木苓 扁荳 泽凡

朴耳絳半右

○桂苓甘露飲 至治伏暑發渴 脾虛

桂參 蔡苓 木苓 扁荳 菖

沵膏 寒水酪一滑兩衣行右爲

末白湯下無荳有薷

○生脈散 参五味 門絡等

右水煎夏月時人伏熟水飲之量日

一加後甘令人氣力湧出

○解暑毒止霍亂 蕃二兩

○縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止
鹽一捻水煎

○吐鴻霍亂 缩果烏梅肉 甘

沵各扁荳葛略二右水煎

○五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍

亂吐鴻尿赤步如心神恍惚共加辰砂

名辰砂五苓散方見傷寒門

○枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲

嘔噦惡心頭目昏眩斯杷炙丁 陳

桂白升半制各藿半荳門 甘炙

鬼酪一右入姜水煎煩躁躁冷水調下

○番荔枝子 治伏熱吐鴻霍亂煩渴

蓼芩甘炙蘇瓜 泽薷

半扁炒陳烏梔朴絡等右入

姜棗

著夏月傷暑發熱，汙大泄無氣力，脉虛細而遲，此暑傷元氣也。參 茵密

門 白芍 陳白苓絡一連步甘五分，各相分末二分，知薷絡七分加姜煎。

○夏暑如在途中，常服壯元氣，驅暑，免中暑霍亂泄痢等証。參二分門白芍炒白苓絡一五味子半粒末五分甘絡五知炒陳薑各七分炒三右加姜。

○夏秋暑熱因過飲食冷物傷內，又取涼風傷外，以致惡寒發熱，胸膈飽悶，飲食不進，或嘔吐泄瀉，此內外俱傷寒冷也。參 姜炒紫朴姜水陳

卷 實 白一苓絡一末半分甘絡五分，右入姜水煎。

中濕門

四

○傳居卑濕之地，或衛作風，或辛苦汗治衣，皆外感之濕也。

○恣飲酒漿，多食肥羶之類，皆內傷之濕也。

○外感多癰，腹脹，腫疼，內因多中溼，痞膈瀉利。

○脉沉而緩，汎而細微，皆中濕。

○太便濁，身疼，自汗，濕寒，太便自利，一身盡腫，或無汗，是濕流閨範邪。

氣在表，五苓加羌荳，微汗之。

○自汗多者，宜白衣甘草湯。

○小便自利清白，太便泄瀉，身疼，自汗爲寒濕，五苓散加生附蒼朮。

○二陳湯加酒芩，卷 蒼 通散。

卷之三

目錄

○防已黃荳湯

治風濕脉浮身重汗出惡風或周身疼痛

半夏二錢半右作一服加姜三片

棗一枚

○加味五苓散

治濕勝氣偏小便不利

桂枝重發渴者本方中加羌活一倍利水重發渴者本方中加羌活一倍

○除風濕羌活湯

治風濕相薄一身盡痛

羌活風升柴各五

葛根芩芍一右

○羌活勝濕湯

治肩背偏不可離此手太陽氣鬱而不行以風藥散之

痛項強腰似折項似拔足太虛經不通行此藥主之

羌活獨活一毫

風甘草芍藥各五分葛根三分

右如食鹽

鹽痛沉然經中有寒溫加酒洗漢

附已猶輕者附子猶重者分

○家傳白朮湯

治中濕身偏難轉側

及皮肉痛難著席木朮細切酒下

盡半煎至一盞去粗服

○劉金飲子

治脾胃受濕腹脹不食

身重皮膚微浮肢節酸痛平胃散

一桑白皮一右爲末入姜煎服

○瘧疾門

五

○傳經曰夏傷暑秋爲痎瘧云云瘧得於

暑當以汗解或因取涼大過汙鬱成瘧其初感也弱者即病胃氣強者伏

而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其難瘥夫暑與風皆外犯也故非汗多不解今之遇此疾者已經再

三叔誠胃氣重傷寒，何時得愈？欲治此証，必先與參末等補劑爲君，加柴葛等發散藥，漸而取汗，得汗而虛又行。

補養下躬，屬陰最難。得汗，補藥力到，汗出至定，乃是佳兆。

○當以汗之難易較輕重。

○大忌飽食，遇發日食飽病愈重。

○陰虛証，午後惡寒發熱至晚亦微汗，而解，脉必虛濡而數，且瘧脉弦而虛。

○暑瘧宜人參白虎湯之類。

○在瘧者，一一陳湯加葛、莫、柴、芩。

○不能食者，必於飲食上得之，當從食治。虛者必用參末一二貼托住其氣，不可使下陷。後用他藥，有汗要無汗，正。

氣爲主帶，散無汗，要有汗，散邪爲主，帶補。

○渴者，生地、門、天花、膝、知、連、柏、葛、甘、生。

○大渴大熱，小柴胡去半，加知、門、連、柏、葛、梔、天花。

○久瘧不得汗，以一陳湯倍加二末，太、柴胡利之。

○癆滯胸滿，多寒少火，太復燥實，太、柴胡加枳。

○小兒瘧疾者，有瘧塊，苟生地絡米陳、芎、半、芩，妙絡其分，入生姜煎調。

○瘧母，用丸藥，消道之，醋鹽爲君，稜、醋、父、鱉甲、末。

○瘧母，用丸藥，消道之，醋鹽爲君，稜、

涉海粉 青桃紅麴芽

隨証加減爲丸醋湯送下

○老癰風暑人在陰分宜用血藥引出

陽分而散 川芎 機芎 飯紅

荳木 茜柏 芒硝煎露丁宿

服之

著日久虛癰寒熱不多或無寒但微熱者邪氣既無之外物加柴芩芍陳滋

補氣血

陽癰多汗用參芪木飲之無汗柴木

芩葛根之

陰癰多汗用飯芍地黃柏飲之無汗

柴木芍升紅發之

傳截癰常山飲

常草梔知

甘草烏梅

穿慢火右等分

每服五

錢水酒各半盞煎至八分露星月丁

仁眉清晨冷服飲吐則順之忌熱湯自然常山性暴脾喜逐瘀飲太傷真氣虛弱者勿輕用

○截癰七寶飲

常行草梔知

朴青

陳絡半

右作一服酒水

各半盞寒多加酒熱多加水煎八分露星月一宿空心冷服忌熱茶湯一日至午食溫粥

○百虎加桂枝湯 治溫癰膏腫知

四味草梔桂枝仁梗分右

○祖傳截癰神方 通丸常穿

醋炙黃辰半研梅箇大棗箇右水煎

先以蜜和辰砂末食後服昔一

盞浸一日臨發日早服

○治久癰不愈一服便止空不發其効

○如神常半
右作一服用好酒一盞浸一宿臨發
且清晨飲之

○心
○截瘧
穿木鱗絡等爲末二錢空
心酒調下

○桂枝卷活湯
治處暑以前發頭項
癟脰浮惡風有汗枝卷風
芎絡等水煎迎發而服之如吐加
半夏

○麻黃羌活湯
治証如前惡風無汗
麻鹹羌風芎絡等右
○清脾湯
治脈弦數熱多寒少口苦
咽乾大小便赤澀青朴未
萸柴芩半芩芎絡各右
加姜

○鱉甲飲子
治瘧久不愈腹中結塊

○白瘧母肝之積也
鱉久未芪
荳梔芩陳白芍甘朴
絡等右入姜七片棗箇烏梅一箇

○林
○清脾湯
治脾瘧食瘧
朴青
守梅肉良絡二萸仁芎絡五右

姜三片棗一枚煎

○人參養胃湯
治外感風寒內傷生

冷發爲瘧瘧蒼妙朴制半制各參

芩荳霍絡半橘紅三分芎絡一千

方加桂右每服八錢姜煖烏梅半錢

治諸瘧辰魏等分爲末細研

如皂子大每服一丸空心人參湯化
下以諸藥不損脾胃最爲穩當

○百草霜黃丹等爲末每服二錢發
日空心米飲調下不

卷六

月四

○痰瘡 小柴胡加蠍

○小柴胡湯 方見傷寒門

治熱多

寒少頭痛冒溼咽乾如渴甚而喝去半加天花石膏下痞滿加蠍

○瘦瘡發於子午卯酉且寒熱嘔吐舌乾口燥少陰經瘡也二陳加飯芎芍

連柴之類發於辰戌丑未日寒寒嘔吐不食或腹滿自利太陰經瘡也

二陳加二木柴芍之類發於寅申巳亥且寒多熱少或腹痛引陰如淋

狀厥陰經瘡也二陳加桂枝附姜之類

○老癩飲

治久瘡成癖在肓腸諸瘻

不効者

蒼蘋葉 桔青陳

良

各半 杞 茯半 甘桂

○林方

治瘡用雄黃 凤蒂

赤小

豆爲末每服半錢溫水調下以吐爲度

○方

治勞瘡 鱉甲二兩酥炙質

爲末臨發時溫酒調下二錢七分

傳

陳無擇曰霍亂者心腹卒头痛嘔吐亦

便便寒壯熱頭痛眩暈

○河間曰因渴而大飲飲而過量或因

飢而始食食而過飽以致濕熱內甚故陰陽交錯而不得止是爲吐瀉

○揮霍撩亂而不得止瀉者此名乾霍

亂多死不因用極酸不吐

○熟多欲飲水五苓散寒多不飲水理

中丸

○河間曰凡覺此証急用五苓
桂苓甘露丸及吐瀉之聖藥也慎勿
與米粥湯吐瀉止過半日飢甚方
可食稀粥少食以漸將息

○轉筋屬血熱 四物加酒芩紅荳星
男子以手撓其陰女子以手牽乳近
兩邊

○林甚則轉筋入腹即死霍亂惡証無越
於斯

○內經曰脈伏者霍亂脈訣曰霍亂脉
微絀者生微遲氣少不言者死傳脉大者生微弱漸遲者死脉結促代

皆不可斷以死

○委中穴出血或舌指頭出益皆良法
再要言有宜吐者雖自吐利還須以

吐法提其氣用二陳湯探吐或薑湯

皆可吐之

○半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止
再要言有宜吐者雖自吐利還須以

吐法提其氣用二陳湯探吐或薑湯

皆可吐之

○理中丸 木參姜甘絡等分

○六和湯 治霍亂吐瀉不止 木
苓 薏苡各一
半人參 甘絡赤芩
右加姜三片棗一枚

○柴水散 治暴泄如水周身汗出益

冷脈窮吐不

○**甘桂附湯** 治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗亦見傷寒門

○**姜附湯** 治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗亦見傷寒門

○**理中湯** 治過食生冷成霍亂吐瀉心腹滿痛亦見傷寒門 加陳皮青皮名治中湯更加干附名丁香治中湯

丹溪曰凡霍亂不渴用生姜理中湯五苓散加五味門消又曰冬用理湯五苓夏用黃連杏薷湯

○**一方** 治吐瀉 薑 蒼 杏 陳

縮 芝 甘 半 苓 参 麴炒等水煎偶寒加乾姜寒甚加附

○**王通脈四逆湯** 治霍亂多寒身冷脈絕

茱二兩 附炮一兩 桂 通草 細

白芍 甘 糜各三兩 右水酒各半加

生姜

○**扶苓沵瀉湯** 治吐利後煩渴飲水五苓去猪加牛

○**木汎湯** 治霍亂吐下舉躰轉筋入腹悶絕凡一茱半茴仁甘祿一右入人生姜蘿葉

○**調子散** 治心脾冷痛霍亂吐利如神同 訶 甘 炙 杏 製 姜 果苓

陳良 麴物各右入鹽些少煎

○**七氣湯** 治七氣鬱結五臟之間陰陽不和霍亂吐利半兩 白芍

芩各四兩 桂 朴製各三兩 蘿 陳各二兩 右加姜棗

○**止渴湯** 治霍亂煩渴 甘炙 參

門 苓 茯 括 萍 沢略等右爲末每服一錢蜜水調下

○**麥門冬湯** 治霍亂已愈煩熱不解

○**大承氣湯** 治霍亂吐利

○**大柴胡湯** 治霍亂吐利

多渴小便不

未拂絡二

甘炙參各一

分半小麥一

石分二貼末一

盞姜五斤烏梅一箇

前分分服

袖不換金正氣散

治霍亂轉筋吐瀉

在此方見傷寒門

第香正氣散

治濕氣霍亂吐瀉

同此方見傷寒門

姜鹽飲

治乾霍亂

鹽一生姜半

切同炒令色變以水一

旋煎熟溫服

甚者加童便一盞

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠

參甘炙竹葉各四兩附炮半

兩

右入姜五片梗米百餘粒

半

粒

吐藥汗無法可治用井泉水半碗百

粒

大

淋浦湯半碗相合服之妙方

七壯傳灸天樞氣海

治霍亂已死腹中尚有暖氣

用鹽內膚中灸二七壯仍灸氣海二

七壯又灸霍亂吐瀉上管中管各二

七壯傳灸天樞氣海

除水穀不分而泄瀉灸水分七壯

又轉筋入腹欲死者使四人捉手足

灸腰左腰十四壯

又轉筋十指癱急不得屈伸灸脚外

踝骨上七壯

一辨內傷外傷

傳外傷風寒有餘之証，熱惡寒寒熱係作甚，熱發皮毛之上，氣塞不通。心中煩悶不安，一時一旦增加愈甚。○內傷飲食勞役不足之証，寒熱間作，素熟蒸人，燥熱發肌肉之間，日鳶不氣短，不足以息，腹中不和，口不知味，大小便或閉，或溏，或心下痞，腹或脹中痛。

○內証頭痛，有時而作，有時止。

外証頭痛，常以有之須傳裏方罷。

一治法

○傳惡寒發熱，頭目沉重之証，世醫不察，內外虛實，便作傷寒用汗下之法，故東垣先生著内外傷辨，愚論。

集皆以扶陽冒氣爲本。

○或內傷，扶寒與食清氣，歸于正濁，氣塞，膏中之候，驟用補中益氣等藥，則氣滿痞塞，遂謂補藥不宜此証，改用

汗下，而死。故王安道著內傷不足，中

有有餘

玉勞倦傷，誠不足，飲食傷，當於不足，中

分有餘，不足

○酒者太熱，有毒氣，味俱陽，乃無形之
熱也，若傷之，此當發散，汗出，則愈矣。

次小便二，者分消其濕。

慧傷食，陰氣食氣，氣口脉緊，盛胸膈痞塞，亦有頭暉發熱者，但身不痛，二陳加

縮青。

傳有挾瘀者，在表，殊非本病，故不列于內

而發者皆補元氣爲主

以御寒

用藥扶發者補中益氣加半夏氣虛甚者必加附子以行參芪之氣

○脈緩怠惰嗜睡四肢不收或便濁微平散

○脉弦氣弱自汗四肢發熱或便濁或皮毛枯槁從黃芪連中桂

○脈虛而血弱從四物湯而加歲

○真氣虛弱及氣短脈弱從四君子湯

○或渴或小便閉澀赤黃從五苓散去桂

傳

○補中益氣湯○芪甘葛五參病甚未飯分七陳伍升柴六三右

脾胃一虛肺氣先絕故用芪益皮毛開腠理不令自汗○上喘氣短損其

元氣用參補之○心火乘脾用柴升胃中之清氣又引芪甘上升能

補衛氣之散用飯和血脉擗紅理胸中之氣又助陽氣上升散滯氣或少加柏以救腎水鴻陰中之伏火也表

熟者丁二貼氣和微汗而愈○呴乾者加葛○心刺痛乃血虛不足加葛

夢寐甚甚漏加菖○頸瘤脣痛加藁細○有寒加半生姜○咳嗽夏加五味門秋冬加連節麻春加佛耳欵冬

○久咳肺中伏火去參○食不下及胸中有寒或氣虛滯加木陳青寒月

更加益智草豆蔻夏日頭痛勿連秋

更加枳緇

○腹痛

張加實木朴緇

天寒加生姜桂

○腹痛

加白芍耳有寒加桂

夏加芩葛芍

冬加益智草豆蔻半夏

○腸痛或總急加柴草

○臍下痛加熟地

不已是寒

加桂

○太便閉滯加大飯

○脚軟多方或痛加柏不已更加已

○氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固之

硃砂安神丸

連半

硃砂酒生地

酒飯身

甘

五分

右爲末湯浸蒸

餅丸津嘴吞下食後服

一方無散地

用生其

主之

補中益氣湯去飯加木丁分或二分
如陰火蒸熱加生地三分柏三分
大便屢坐或子而不了腹中通迫血虛血濾加飯身三分身熱沉重雖小便多亦加苓分柏三分加生地二分
和加半分生姜三分有嗽加生地二分以制半夏之毒○癰厥頭痛非半夏不能除○腹痛春夏加白芍冬月腹痛不可用芍只加乾姜或加半夏

不足脾氣下陷氣短無力不能寒熱

早飯後昏悶倦怠五心煩熱

朴三分

製升菴獨自芍風甘

汎各五分

柴一分生地七分右加姜棗

○腹脹乃霍亂便相腹化硬加縮

○木香化滯湯 治食滯食溫麴結中脘

心痞不食或胃脘痛 半半

草蔻溫麴裹

甘姜各七分半

柴六分

木橘

紅洛四分實炒飯洛三酒紅分右加生

姜

○門冬清肺飲 治肺胃虛弱氣喘

神短少或吐衄

花萼仁茲白

芍廿七分參門飯身絡五

五味拗右

○百末和胃丸 治久不食太便或

或溏此胃氣虛弱也

木一兩半

朴絡一陳去紹

參伍甘絡二實

梔各二木一

乾生姜石爲末湯浸

蒸餅九米飲送下

○枳木丸

治痞滿消食強胃

木二

實炒

右爲末用沸湯泡青荷葉

乾者亦可研

間去葉

用湯浸晚梗米

杵粉以原湯煮糊丸白湯送下加橘

紅一名橘皮枳本丸治元氣虛弱飲

食不消心下痞悶○加炒麴一炒麋

麴二名，麴蘖枳木丸治飲食太過心

腹滿悶○加木一名木香枳木丸破

滯氣消飲食○加半二名半夏枳木

丸治傷冷食○加酒炒黃連酒蒸未

黃炒神麴橘紅絡二黃分四名三黃

枳木丸治傷肉食濕麴辛辣味厚之

物填塞閼亂

○備急大黃丸 治心腹卒漏

大巴去膜乾姜絡等右爲末煉

蜜丸

小豆大每服二十丸

丹溪保和丸 治宿食心腹飽悶脾

月五二

胃虛者勿服

查五麴炒半酪三

苓陳去白各一兩薦服子炒翹略一麥

茱麴炒一兩右爲末別用生神麴水一兩

入姜汁打糊丸白湯米飯水一兩有木

入姜汁打糊丸白湯米飯水一兩有木

或傷寒後食復以厚食之物燒存性

一兩爲末用生韭根葉搗汁調服過

一二時以東垣枳實導滯丸下之

○枳實導滯丸治傷濕熱之物痞滿

閼亂大兩實燒麴半兩茶荅苓

連末絡水一兩右蒸餅丸以利

爲度加木棋絡二名木香道滯丸

○參苓白朮散治脾胃虛弱飲食不

進或嘔瀉太病後補助脾胃極妙方

參术苓山扁姜汁浸炒一兩半

○平胃散治脾胃不和蒼術朴姜

陳法伯絡水一兩右加姜棗氣

不舒狀中脘痞塞加莎縮欲進食

加曲芽吳茱洗蜀椒升

○益胃湯治頭悶動勞則微羸不喜

飲食口不知味躁熱氣短腸鳴便滯

口乾不善食冷苔飯貴升

絡升守絡二芩衣參柴

益絡升蒼苔升右

○林疑神散收斂胃氣清涼肌表

參木苓山絡升梗扁知

生地甘絡竹葉地骨門各

絲右加姜

○感應丸 治發令物不能消化或馳

臭加抱塊雞子 百草霜 銅底者

杏一百四十粒 姜炮一巴皮七十粒 去

蔻箇煨

木半兩 丁一兩 右姜蔻木

丁四味爲末同篩三味用蠟六兩鎔化入好酒一升煮數沸候酒冷其蠟

自凝上取蠟秤用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半煎熟下酒煮

蠟四兩同化乘熱拌和藥末丸姜湯

下

○黑圓子

治宿食不消吞酸或腹痛狼泄如刺

烏梅肉敵百草霜分杏二十箇巴豆油去皮尖去皮去皮尖巴豆油去半九枚縮二十箇右爲末麴糊丸姜湯下

○阿魏圓

治脾胃虛弱食肉麴莫不消化

魏酒浸桂

莪炒芽炒麴炒

○著人遇勞倦辛苦用力過多服之免生內傷發熱之病此方主於補氣 茗蜜炙一參 門陳木各一株五分味粒右入姜棗勞倦甚加熟附四五分

○養胃湯

治脾虛胃寒嘔逆惡心腹

腸脹癟腸鳴泄瀉或有外感寒熱如癰骨節煩疼此皆治之 蔷朴

半 杞子 附 甘 陳 參

各三木斛 右姜瓶棗一烏梅半

○補血湯

遇勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱並治

飯 白芍 栝神 酸棗

門各

右

世鴻門

八

東

刺

○小便尿病或曰鴻白爲寒鴻青黃赤黑爲熱

○太抵鴻利小便清白不澁爲寒赤澁爲熱

爲熟

○又太便完穀不化色不變利不腥穢水液澄徹清冷尿清不澁身冷不渴脈遲細而微寒証也

○穀肉消化無問色及他証便斷爲熱穀不化亦有熱証凡火性急速傳化失常完穀不化而爲飧泄者亦有之久泄穀道不合或脫肛此元氣下陷

及大腸不行收令而然 术 苓

魏 陳 詞

五倍 蔥

烏梅爲

丸四君子加升風前湯送下

白朮

○飲食入胃不住完穀不化氣虛

參术芍加芩升柴風提之

○鴻木脅腸鳴腹一陣漏一陣火四苓散加滑芩通梔伐火利尿

○或鴻或不鴻或多或少聚海石

黛芩 趵爲丸

○腹痛甚而鴻鴻後痛減食積以大實曲消滌之

汪鴻調須積滯已消後用斷下藥便固

止之多成痢先無中焦次分利水穀

治中不効然後斷下

○考泄本屬濕多因飲食不節治法消食
燥濕利尿補脾亦有升提下陷之氣
有用風寒勝濕亦有久泄腸胃虛滑
不禁者收止之

○主方 术行苓 芍名芍不半陳行耳五
傷食泄黃或食積加連朴實○尿赤
濁止加汎猪通施○口渴引食加葛
參門升梅○夏秋濕熱大行暴泄加
連薯汎升通○積酒熱瀉加連肉麴
葛○寒月冷泄加麴姜縮木益○久
泄胃氣下陷服利尿藥不効加參芩
升柴○久瀉中虛食少難化加耆參
麵木姜○久瀉腸胃虛滑不禁加荊
蔻不姜膈

○傳正瀉方 蔻伍白滑春冬一兩二分
夏二兩半秋半右爲未姜江調神麴作糊丸服

○扶苓湯 治傷冷飲泄瀉變作白痢
或赤白相交腹痛食減熱躁四肢沉
困無力 苓桂半錢仁桂 甘草各
猪苓各三錢桔梗芍七分芩 生芍
丹 柴絡一右耳不訛右耳不

○黃芩補胃湯 治太便一日三四次
溏而不多腹鳴尿黃 苓一錢 脾
身 益 糯紅絡半升紅甘草半錢
訛右耳不

○治癥泄 茶炒白芍炒各陳一兩風
樹右水煎或丸服茶瀉加升祐

○白朮散 治濕瀉及食積濕熱作瀉
朮苓 芍各等 水煎或爲末米
飲調下

○神木散 治春傷於風夏心猿泄步
蒼半不蔓根各六分甘草三

細分 右加姜

○胃風湯

治証如前及治風冷乘虛

入腸胃泄濁完穀及濕毒下如豆汁
或下瘀血或姦魚膾參苓芍

飯桂水白芍各等右入粟米
一小撮水煎如腹痛加木香

○生薑五苓散

治泄注如水寒門傷

加荳蔻車倍杏爲末米湯調服○濕熱
甚下泄如熱湯者去桂加滑芩梔通
之類○腹痛下泄清冷不渴寒泄也

倍桂加蔻

前大半

○胃苓湯

治脾胃不和及夏秋之間

脾胃傷冷水穀不分平胃五苓

合和姜棗煎服

如卦其效

○漿木散

治暴濁身冷汙出脉微

方見元確

○理中湯

治藏府停寒泄濁不已

寒門傷

○升陽除濕防風湯

治大便閉塞或

裏急後重數至圊而不能便或有白
膿或血慎勿利之 蒼四兩風仁术

白苓 白芍各一右

○林實腸散

治泄濁不止

葛根 蔡 莪 苓 朴各二木

甘八錢各右加姜棗○手足冷加干姜
炮

○赤石脂散

治腸胃虛泄注完穀腹

鳴竅 脍 煙 甘 一兩 雞子殼 砂

八右

爲末米飲調下

○六和湯

治暑月泄濁此方見

亂門

朴各二 甘 大 一

守 杏 紹各五 右加姜棗

參

各

林 薑 各

各

薑各

○調中散 治腸虛泄瀉不止嘔吐不食

○ 奢炒麵炒桔酪一芽炒益

○ 糯紅粉三藿縮義炮姜炮桂

○ 茄炒果酪半苡粉三右入姜棗并少

○ 塩煎

○ 袖止瀉秘方 參木苓苡炙姜

○ 炮胡枝木藿葛根石等分煎服

○ 全粟蔻圓

○ 治暴瀉不止 鑿蜜炙蔻

○ 炮右爲末醋糊丸米飲下

○ 林木香散

○ 治脾腎俱虛瀉瀉 蔴麴

○ 糜砂炒木白苓各半木

○ 甘草各半分煎服

○ 右加姜棗

○ 神丸

○ 治脾腎虛寒泄瀉不食

○ 砂炒四蔻粉二右爲末以棗四十九

○ 箍生姜四兩切同煮糜爛去姜研末

○ 肉爲膏丸桐子大鹽湯下加木半茴

○ 五味子散

○ 治腎泄味兩茱細粒

○ 綠色右一味炒香爲末陳米飲下

○ 丹溪傳

○ 治腹痛泄瀉艾葉車前

○ 葉絡丁握右細功用水二盞煎至一

○ 盞去粗入姜汁再煎一沸稍熱服立

○ 焱法

○ 治吐瀉不止灸天樞氣海立

○ 腰閔元 腎俞 大腸俞 長強

○ 王氏早年小兒麻風原方

○ 痘病門

九

○ 傳丹溪曰瘡疾乃外感兼內傷之候也

李

須分表裏。表之在表者，惡寒發熱，身首俱痛。小柴胡去參棗加蒼芍生芍陳王積，早宜以大小承氣酒煎大黃湯之類止之。餘邪未盡更以芍藥湯香連丸之類，穢積已盡而更寒未息者，此太陽不行收令故也。以固腸丸參香散之類止瀉之。

○腹痛、白芍甘草爲君，防木爲佐，惡寒加桂，恐熱加柏。

○腹痛因肺氣鬱在太陽之間，以苦梗，發之後用刺葉，一云實則可下虛，則以苦梗發之。

○初下劑腹痛用溫藥，姜桂之屬勿用，參木縱氣虛胃虛不可用。

○後重者，積與氣墜下故兼升，兼消水

香枳橘丸方見腹痛門保和丸之類

附
門

○發熱不止者，屬陰虛用寒冷，兼溫藥升藥。

○孔痛因熱流於下，木 桀 芎

附
門

連加炒姜，又云久病身冷，自汗，脉沉小，而孔痛，宜溫，暴病身熱，脉洪大，宜清之。

附
門

○下血者，宜涼血活血，飯芩地之類，邪下陷升提之。

附
門

○溫熱下痢，小便澁，口煩渴，能食，脈洪大，而緩，腹痛後重，桂芩甘露飲，方見暑門送下保和丸。

○濕多熱少，食少，腹痛後重，夜多利，下胃苓湯，平胃五苓散送下保和丸。

○氣虛面色萎黃，或面白色疲倦，刺頻

○傷後重不食，脉細弱，或微汙出，黃

芪達中湯下保和丸

○濕熱爲病，不渴者，達中湯加蒼朮令下

保和丸

○脾胃不和，食少，腹脹，痛後重，脉弦緊

平胃散加芍桂葛木苓下保和丸

○血氣大虛，腹瀉煩，後重不食，或產後得此，証四君湯門加飯陳仁保

和丸

○下痢白積者，芍藥湯加木陳芍滑桃，

○下痢赤積身熱，益元散加通芍炒陳

木湯下保和丸

○下痢日久而不能起於床，不食，疲弱之甚者用

參 茯

地榆 縮

沢絡五木 芍 陳各一錢

加桂枝瞿麥 酢

甘草木 升 白蔻絡三

右煎服

著治痢主方

芩 芍 栝 二連

木

枳 柱絡 一耳少 ○初後重加滑石，
加枳椇生芍，無加條芩。○日久後重不去，此大腸墜也，去枳椇，用條芩，
加升麻根之。○白芍加木苓陳滑，初
欲下之，加大黃。○紅白相交，加飯芍，
芩以理血，加滑陳木以理氣，有食積
加枳實。

〔傳〕安葵湯

行血，則便濃自愈，和氣則後重自除，此葵是也。

白芍仁飯尾

連 芩絡 一大升

柱 木 桂

絡 五 初後重窘迫甚者，倍大黃，加芒

硝。○痞滿不宜通加實。○藏毒下

血加柏仁。

○黃芩芍藥湯

治瀉痢，腹痛或後重

身熱久不愈，脉洪數及膿血稠粘者，
芩 芍药子 其右煎服，腹痛加桂
分二服。

○黃連湯 治大便後下血，腹中不痛，
謂之濕毒下血。連 叔药二两

○芍藥苗連湯 治便後下血，腹痛，謂之
之熱毒下血。芍 飴 連药一两，大
桂半分，甘三分，右分桂半分甘三分。

○大黃湯 治病久不愈，膿血稠粘，裏
急後重，日夜無度，脈沉實者。或初腹
痛甚，若窘迫不安者。大黃一味，好
酒浸半日，煎去粗頸，服後以芍藥湯
和之，又再服。苟參芍藥湯，徹其邪，此
乃蕩滌邪熱之劑。

○香連丸 治下痢，膿血相交，裏急後
重，連 二十兩用柴葛十兩同 以酒拌濕同炒去茶。

○木心丸 右爲末，醋麪糊丸米飲下。
加石蓮瓣治禁口痢，尤佳。

○益元散 治痢之聖藥也。白滑散

芩 一条 右爲末，白水調下，裏急。

○神効參香散 治痢日久，穢積已停，
腹不病或微，腹不後重，窘迫，只滑利。

不止，乃收功之後藥也。瞿 去梗蒂
術 二兩 陳 一兩 蔡 四錢 芩 一錢 築 四錢

木 參药一右爲末，每服一錢，匕清
米飲調下，食遠。

○祖傳和中飲 治荆疾，不分赤白久
近服之，但發熱，禁口不可服。陳

木 芩 芍药一葉分甘三分，陳倉米
紅砂糖三粟殼 醋炙 一烏梅箇，右作
一服，加姜三片，東一枚，水煎。

○防飲 治痢後感寒，濕脚膝腫痛。

名鶴膝風 參 术 茵 飯 荚

熟 地 草 仲 姜 沙 薛 藥 芦 半

冬 風 已 羌 膝 股 附 董 尿 三 日 去

皮 脣 七 分 右 作 一 服 入 姜 三 片 藜 二

枚

○禁口痢。冒口熱甚，故也。用連參煎湯。終日呻之，如吐則毋強飲，但得一呻不咽便好。

○又用田螺搗盒，臍中以引下其熱。又禁口不食者，參苓白朮散。方見內傷門

加菖蒲、陳倉米飲下。或參苓蓮入些少菖蒲爲末，與之同煮，開自然思食。

食蓮陳壁土一味細末，桑姜煎湯調

下

慧丹溪主方

治熱痢血痢，即古方四黃散

連 苓 柏 枝 白朮 飯 滑

甘 桃 木 格 等爲末，麴糊丸，加大茴米飲下。

○一方 治虛弱患痢，參苓白朮仁木 茯苓各一两，麴糊七升五分

右水煎，下重加風酒飯格一枚，批連炒泥各六两，滑炒格木三分。

○治痢後脚細弱，蒼白苓 板各半兩，柏伍右爲末，粥糊丸，四物湯加陳耳煎湯下。

○黑丸子 治宿食腹痛發泄赤白痢，方見內傷門。

○駐車丸 治冷熱不調，下痢赤白日，夜無度腹痛甚，連酢膠 飯酪半

姜炮兩右爲末，醋糊丸，米飲下。

○木聖散子 治漏痢久不瘥，芷婦人產後痢，飯 慰 緇 榴皮

訶 姜炮陳 木 茄 芍 分水煎

入乳香末空心服

○加減平胃散

久下利

則脾胃虛損

而血不流於四肢。却入日中爲血刺。

宜服此滋養脾胃。

木 桂 格 三

木 杏 陳 酥 一 茄 紗 參 連 白

芩 膠 姓 格 五

右爲末每服五

錢姜三片棗一枚水煎去粗服。血多加杏。

氣不下後重加枳木。

腹痛加桂芍。

其熟泄加連。

脈洪大加大黃。

尿澀加芩沲。

○加減木香煮散

治一切痢。神妙。

不 茄 飯 蔽 參 桂 芍

訶

烏梅核膠

蛤

白芩

格

五

鑿

兩

半蜜
加
右每服四錢姜三片棗一枚

煎去粗服。

○加味四君子湯

服藥已多痢不愈

蓋攻擊藏有之藥轉覺難安。宜用和

氣之藥。

參 材 白芩 茄

芩

等分

每服二錢姜三

片棗一枚

○百中散

治一切痢。一日去五六十

行。只一服便疎。

豐

蜜

炒

赤

朴

製四

右爲末。米湯調下。忌生冷油膾魚鮮

等。

○獨神丸

治癰疾。豐蜜炒爲末。煉

蜜丸如桐子大。每服五十丸。赤痢

甘草湯下。

白痢

干姜湯下。

○倉廩湯

治癰痢俱作寒熱。腹痛煩

渴。及禁口者。柴朴肺二毫。獨

枳

桔

參苓

芎各一

半

甘草一

○六苗半加芩半右分一貼姜五片參一枚
米糊水煎服之三五貼之後後重脹痛寒熱煩渴脈沉實以太柴胡湯寫下之

○葛根湯治酒痢葛根半芩生地杏略二分芩二分甘草半

冬右分一貼黑豆百粒姜五片自梅丁箇水煎

○真人養湯治下痢腹痛及酒毒便血桂枝八訶皮一兩木通四錢桂皮起煨

白芍六錢甘草八錢右水煎藏寒者加附子

○調和飲治下痢久者白芍三芎芩連絡二錢桃仁升麻右水煎

○氣門傳內經曰百病皆生於氣也若不養其志之火無時不起五味之偏無所不傷是以釀成膠癆固積而滯於太腑鬱火和氣充塞乎三焦使氣血失其常機臟腑不能傳導是故外邪得以乘虛而湊襲

○脈經曰脈消者多血少氣濁者少血多氣大者血氣俱多脉來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少細而緩者血氣俱虛代者氣壅細者氣少心氣結則生痰瘀盛則氣愈結故謂氣必先豁瘀如七氣湯半夏爲主官桂佐之調氣雖用豁瘀亦不可無溫中之劑

○傳二陳湯方曉氣結于肺臟之間而

爲痞滿刺痛伏梁等証者。加連實桔
梗木之類。○在中焦而爲痞滿脹急
者。加米朴換枳或用平胃散。○在下
焦而爲奔豚七疝等証者。加桃楂施

枳核茴梗荔枝核之類。○在兩關攻築
作扁者。加青柴芍膽之類。

○婦人胎前產後一切氣疾作楚者。四
物爲主。加氣之藥。

○林七氣湯。治五藏不調。三焦不和。心
腹痞悶。腸肋腹脹。面肢浮腫。太便秘

難。○參桂半絡。二其後。一
右作一貼。入姜三片。靈半兩。桂一
錢。參

○四七湯。治証同前。方見癆門。

○三和散。治証同前。又治背膈竊。妨
食及脚氣攻督。腹滿悶太便不通。

○其格五。

卷蘿沉此腹絡一芎六分
甘炙陳木換米絡九丁方加
生姜縮燈心絡一右

○木香飲。名流氣飲子。木香流氣飲。治氣壅
腳浮腫無不効。蘿青飯酒芍

烏苓桔半甘炙芎芪炙

實炒風枳枳頭腰子姜汁浸。宿分
絡八陳二分木硝右分二貼。姜三片

棗二枚水煎。

○木香流氣飲。治氣痞冒膈脹腹面
目四肢浮腫二便秘。半兩。桂一
錢。去莎甘炙絡陳去白桂換

義煅下皮火見腹蘿木果絡
兩通火節門。正木赤苓丸

○參菖各四右每服四錢姜三片枣
一枚。

一方去藿草加沉六枳兩大黃二兩

快氣湯

治氣積心腹脹滿口塞吞酸痰逆嘔吐宿酒

香附炒一繩

四甘酸二兩

右爲末塗湯點服或入姜煎

煎

○抑氣散

治七情所傷中脘不快氣不升降腸脹

茘四兩陳三兩甘五兩

右爲末每服二錢食遠白湯點服

妙女人尤宜服

○分心氣飲

治因憂思氣留滯胸膈痞悶嘔吐頭眩口舌乾食減漸羸瘦

蘿四莖半桂青陳腹

桑炒通芍甘炙赤苓各一

右每貼七錢姜片棗枝燈心十莖○氣秘

加枳炒菜炒皂角子各一

○分心氣飲治証同前桔炒門

莫腹皮絳一木桑多腹子朴

木參絡半莎炒蘿陳蘿各一

丁皮甘炙絡右入姜棗灯心十莖

○蘿合香丸

車能順氣化痰并治傳

屍骨薰卒心竊鬼魅赤白五痢小兒

驚搐等証

沉麝研細用丁

木安別研用無灰

升熬膏

莎炒櫟木

檀各二薰別

研

蘿合香油入安息

腦研各碌飛烏犀各

研

一右爲末和乞

用安息膏井煉蜜和劑丸如梧桐子

大空心溫水化下四丸酒服亦可

○聚沉通氣湯

治三焦氣逆不能宣通腹脹便秘

蘿枳炒陳鼓赤

苓甘炙根各一沉木門味

桑芪姜苛荆實麸炒各

右

○木香枳榔丸

疎三焦利育膈破瘀

逐飲快氣消食

木 梨 青

陳 蒜 煙連 枳 柚各兩相

大 酪 三

莎 呻牽味各兩右爲末

水丸如桐子大

每服三十丸食後姜湯下

人頭宣

○傳正氣天香湯

治婦人氣竇或育膈

腹中結塊刺痛因受日水不調或眩

嘔寒熱及胎前產後一切氣症

烏半
莎六陳 橘子
姜各半
右水煎

○沉香降氣湯

治氣不升降胸膈痞

悶吞酸

沉四縮伍甘草一兩

莎宿四兩童便浸一右爲末

每服二錢入鹽少許白湯調下

○異香散

治胃氣不和腹脹脹脹

食難化一切冷氣結聚

荳蔻 茴 藥 穖

益 甘橘各青陳 朴各二蓮

右入姜棗

○金和氣散

治脾胃不和中脘氣滯脹

蒲 嘔吐

青 苦少蒼

牛各一兩

陳桂 良 莎 桔各三

右爲末鹽

湯點服

○順氣木香散

治氣不升降冒痞引

瘤及酒食過傷噫酸

蒼 桔

茴炒各姜炮陳桂朴

縮 丁皮

甘炙良 桂 木各一

右姜棗煎服

或入鹽少許沸湯點下亦可

○紫蘿子湯

治憂思過度心腹脹脹

喘促煩悶腸鳴一便不利脉虛緊而滿

蘿子一腹 莪 半 朴

木 陳 通 术 實
兩 右加姜棗

林鍼灸法

憂死肢冷心腹口鼻溫日神不轉口無延舌也不縮鍼合谷三分徐以出

刮肺復活

驚死心下溫刺兌骨用鍼口中溫人三分徐出捫穴

悲哭欲死肢冷身口溫鍼人中三分灸百會三壯

又法 神道五推下針三

徐氏奔豚氣堵心不得息灸中極五十壯

○灸心氣法男左女右掌內五指與一寸之稗心一條結一卮正坐種心分開加頸上以指按定在於天突骨上兩邊垂向背後兩稗心齊垂下脊中盡處是穴可灸五七壯神効

全消氣散治血氣凝滯心脾不和腰

急中滿四肢浮腫飲食無味小便不清沉木參半青桔絡兩陳白苓草炒腹燒蘿通各三兩右姜棗

痰飲門

原丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰

○痰脉皆弦微沉滑雙弦者寒飲偏弦者飲也沉而弦緊飲內痛肺飲不弦但苦喘短氣四肢歷節走竇脈沉者有酒飲兩關浮弦大而實者膈上有稠痰病人自乘不効關脉伏而大者瘻眼胞及眼下如炭煙熏黑者亦瘻也

○濕痰身多軟而重用一木又曰用芩

莎半具

○酒啜用蓼子黑蜜丸喻化

○食積痰用麴芽楂或化痰丸消積藥攻之

○風痰 用星 茄白附

○寒痰 用半夏

○老痰 用海石莎半萎五倍一云五倍子佐他藥大治頑痰

○痰結核在咽喉嗽而不能出化痰藥加鹹能軟堅之味，葵杏海石桔翹少佐以朴硝姜汁蜜丸喻化

○痰在腋下非白芥子不能達在四肢非芥瀝不行在腸胃間可下而愈

○脈浮當吐痰在肺上必用吐膠固稠

濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之儀

○凡吐法宜先升提其氣用風 梭

芎 桔 芫茶 生姜等類或就此

藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於

不通風處行之又服此帶薺葛虧等藥不用探吐自吐

○油炒苦夏大治濕痰又治喘心竅痰

先生姜湯下

○二陳湯 治痰之要藥也

○欲下行加柏通已之類

欲上行加升柴 風之類

又曰加升提之藥能便大便潤而小

便長

陳去柏半湯加七苓一个半右作十服加姜三片

○風痰壅盛喘咳加風羌星枳壳之類
者白附 天麻 蟾

○熱痰腹脹喘滿加芩連梔藜滑膏瀝
之類

○濕痰身重倦怠加一二木星之類

○酒痰六加葛根宿曲芽之類

○寒痰六加姜附益草豆蔻之類

○氣痰六加木棖宿枳烏莎之類

○燥痰六加葵杏貝味之類

○陰虛咯血痰六加二門知柏貝母慈

兜之類

○如痰在中焦作酸氣吞酸胃脘當憲而痛或嘔清水恶心等証多加二木

曲芽芎宿草葛根猪汎實連茱梔木棖

之類作九服之

○氣虛有痰者加參术

脾虛者宜神中氣以運痰降下加木白芍麴芽兼用升麻提起

血虛有痰者加天門知夢沙瀝姜汁

帶血者無加芩白芍桑

○傳痰在胃腹脹或痞滿加木曲芽宿之

類作在脇下癟或漉六有聲加柴青芩芍

之類

○在經絡中或胸背手足臂膊癟者在正加羌風六在下加巴通膝冬日加烏附行經

○在腰股膝下腫六加倉已通柏薢膝之類

○如偏頭痛六加芩芷風荆苦升之在左合四物湯又加風荆苦細菖朶

類

○在左合四物湯又加風荆苦細菖朶

酒片芩之類

原偏者加芎藁升柴葛細奇等

丹溪加味二陳湯

道養補脾消食

氣 橘紅 苓 趕炒各莎

半絡一甘橘二芍 苍

白术絡八

查半縮 芽麯五分

右趨芽別

研餘細切加姜棗水煎調曲芽末服

半

導痰湯

治風濕痰等証

半

星 煙

橘紅 枳

大黃芩絡一

右作一服加姜五片

如冬嗽肺燥

熟者去半加味

桔杏分

千繒湯

治風痰雍盛

半箇

皂炒黃

去皮甘寸

右作一服入姜

三片

利膈化痰丸

星 煙

蛤 半

貝 菓

莎童便皂

杏尖炒

薰絡等 右以前八味研爲末以皂角杆碎煎濃汁搗杏仁如泥再以姜汁和蒸餅丸，菉豆大青薰爲衣，每服五十丸，姜湯送下，在溫湯下。

○神木丸

治痰飲

蒼汗 游米

生芝麻

五分不用水一小

大棗十五枚

盞研細取殼

煮研細

右以蒼木焙乾爲末，以芝麻殼及棗肉和均丸，如梧桐子大，每服五七十

○辰砂化痰丸

治風化痰安神定志

止嗽除煩

桔梗研辰砂各星砂一

品

半兩右爲末，姜汁糊丸如菉豆大，

砂爲衣，每服三十丸，食後姜湯下。

○破瘀丸

治五飲

機丁 緒

胡椒 木 蝶梢 烏茡 青 巴

鞋散各

右以青皮同巴豆入藥水

○內浸一宿次日同形青皮焦去豆，爲
末，滌烏梅肉蒸研爲膏，入藥末和丸。
如蒙豆大，每服十九至十五丸，姜湯
下，婦人頭風服愈。蓋頭風是痰飲所
致也。

○芎辛散

治熱痰壅塞頭目不清語，
言不出。芎、細風、桔、芷。

卷其炎各桑妙

苛絡

一右入姜

○五飲湯

留飲心脾飲下，痰飲帽溢
飲，脯流飲腸此五飲酒後及傷寒飲

冷過多故，有此痰。

參旋

陳

姑實

木

苓

朴

半

澤

猪

前桂

芍

甘

絡

右入姜因

酒有飲加葛根葛花

縮

全

蘿子

降氣湯

治虛陽上攻，上盛下

虛陰涎壅

飯

甘

炙

前

朴

各

兩桂

陳法

蘿子

半

各

五

右入

姜棗

○四七湯

治氣鬱痰逆，如破絮或如

梅核在咽，喘滿。

蘿子

二

朴

三

芩

兩

半

五

加姜棗。

○桔梗湯

治胸脇脹滿，短氣痰逆。

桔

梗

桂

半

附炮

細木硝

一

實

桂

半

附炮

赤苓

半

神桂

陳

姑

門

硝

二

沉

芩

炒

桔

硝

半

右入姜

○咳嗽門

十二

附肺痿

肺癰

○風寒者鼻塞聲重，惡寒，二陳加

麻杏

桔之類。

○風寒鬱熱于肺，夜嗽者。三拗湯。

○加知，肺大而浮者，有熱加芩生姜。

○寒嗽以生姜切薄焙乾爲末，糯米糊丸，如芥子大，空心清米飲下二十丸。

○火咳者，石膏研末，面赤，芩、蔓海、石、黛、桔、莎半訶。

○青、蜜丸、噙化。

○勞咳者，盜汗出，聚多裏熱，四物加竹瀝姜汁。

○陰虛火動而嗽，四物合一陳加炒柏知。

○陰虛喝嗽或土紅者，四物加知柏五味參，桑地骨。

○好色之人元氣虛弱，咳嗽不愈，瓊玉膏最捷。

○咳嗽聲嘶者，乃血虛受熱，用黛蛤粉。

○喉瘡，以竹瀝紫蘆煎入韭汁，黃連爲末，以竹瀝紫蘆煎入韭汁丸服，又用黛蛤粉噙化。

○痰嗽氣急，蒼朮莎半兩，蘿蔴、杏。

○黃連爲末，以竹瀝紫蘆煎入韭汁丸服，又用黛蛤粉噙化。

○痰嗽因酒傷肺，萎、半鵝一芩、苓各五分，仁石丸服。

○喉瘡氣急，蒼朮莎半兩，蘿蔴、杏。

○黃連爲末，以竹瀝紫蘆煎入韭汁丸服，又用黛蛤粉噙化。

○喉瘡主方，杏、桔梗、白苓各一分，半鵝一門，炒芩知各五分。

○春多上升之氣宜潤肺，柳肝加芩方。

○夏多火熱，炎上最重，宜清金降火，加散，加風苛蘿州芩門各一分。

○夏多火熱，炎上最重，宜清金降火，加散，加風苛蘿州芩門各一分。

桑知炒芩門膏各一

○秋多濕熱傷肺宜清熱潤濕加蒼朮
絡一風芩施炒各

○冬多風寒外感宜解表行痰加麻枝
半風生干姜絡一師經素有熱者再
加酒炒芩知絡五○若發熱頭痛鼻

塞聲重再加藁芎前柴絡○若有

痰加半枳風痰再加星姜汁○濕痰
脾困止食加二木○有痰口燥咽乾

勿用半星宜加知蜜水貝蘿芩炒

○若夏月熱痰或素熱有痰加芩連知

膏

○上半日咳者胃中有火加胃連五
更咳者全上

○黃昏咳者火淫於肺不可正用寒涼
藥宜加五味五倍子皮斂而降之

○牛後咳者屬陰虛即勞嗽也宜補
陰降火加芎歸芍熟地柏知澤姜汀
天門棗貞補陰血也

○若咳嗽久肺虛滋氣補血加參芪膠
飯數天門馬糴酒芍生姜之類

也

○若勞嗽見血加膠飯芍天門知身柔
亦於前肺虛陰虛一條擇用太抵咳
嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變
爲火火盛而陰血不得安竄從火上升
故治宜瀉火滋陰忌用人參等其
溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者
則宜用參芪數等藥但此等証不多
耳

○火鬱嗽謂吸鬱火邪在中宜開竅消

痰用訶皮便香附薑半海石黛芩爲
末蜜丸噙化仍服前補陰降火湯藥
失治則成勞

○痰積食積作咳嗽者用莎薑海石貝
黛半軟石膏杏實姜薤連爲末蜜
丸噙化

○久嗽有積痰留肺如膠氣不升降或
挾濕與酒而作用茜根童便海粉杏
薑蜜加杏 蕤 麵 蜂房爲末姜
汁竹瀝調噙化

○嗽而心煩不安

六一散

一名益元散方見前

門加辰砂

○痰嗽寒熱交作者

小柴加知

一方加白芍五味桑

○夏月嗽而發熱

小柴加膏知

冬月嗽而寒熱

小青龍加杏

○夏月嗽而失聲

小青龍加杏

○陳湯治咳去痰伐病根陰虛血
虛火盛乾咳者勿用
○端嗽遇冬則發此寒包熱地解表熱
自除枳桔各一麻風甘陳
蘿通芩絡等如嚴寒去芩加杏
半

○潤肺散

治嗽而失聲

訶五

倍五味芩甘絡等蜜丸噙化

○三拗湯治風寒咳嗽喘急

麻不去根甘生杏不去皮尖右加姜棗

○溫肺湯治冬感寒而咳嗽吐痰外

嗽齧熱者勿用半陳去五味

姜桂杏洛五細膠甘絡

半右姜棗一方有

○華蓋散治感寒而嗽胸滿聲重

蘿子陳赤苓桑麻各二甘

兩半

右入姜

○林金沸草散

治感寒鼻塞聲重咳嗽

不已寒熱無汗

荆芥麻節前裕三

甘草赤芍

半各一旋去萼右加姜

棗

○橘皮湯

治感寒咳嗽頭痛上氣不

得下

陳苑麻節飯酒

杏

炒枝

甘草芩各二右

○杏蘿飲

治上氣喘嗽而目浮腫

○橘分杏

五味腹烏梅各五陳

法桔

麻節根桑蠶

膠各半花甘

半分

甘草二

右入姜

○東垣加減二奇湯

治咳嗽上氣喘

促胸膈不利

桔陳甘青

參蘿桑各五

半分杏仁味四右

入姜減桔青參加木貝名橘蘿散

○東垣加減瀉白散

治陰氣在下陽

氣在上咳喘嘔吐

桑兩地骨七陳

青味參各五白苓仁右入粳米

二十煎

○寶鑑加減瀉白散

治咳而口乾煩

熱胸膈不利喘促

桑兩地骨知

陳桔絡五細

青芩甘五分

右

○大橘皮湯

治面腫上喘

滑丸甘

炙木

枳絡半陳仁

右

○平氣散

治諸嗽免吐痰惡風不食

參木芩白桂味甘

分右入姜

○平肺散

治肺氣上壅喘嗽痰實寒

凡蘿子神杏炒烏藥芷絡

分右入姜

熱往來，呴乾口燥，陳一兩桔炒半

苛 蘭 烏梅去核花 五味 知

桑蜜炒杏炒鹽蜜炒各半 甘硝半

大降氣湯 治上盛下虛，痰實喘嗽。

呴乾 蘭子微炒 亨 細前研 飪桔

朴 桔 半 白苓 陳白桂 甘

欒各分右加姜五分 蘭五葉

半夏丸 治肺熱痰嗽，胸膈塞滿，

薑壳去半倍各分右爲末，姜汁麯糊丸食

後姜湯

參木調中湯 濕熱補氣，止嗽定喘，

和中進食 茂四分桑分五參 甘炙

白苓 木硝二味，斷二十地骨門

陳硝二青分水煎，早飯後服

續絡二茄仁小豆根生地 桑硝半

○傳祖傳潤肺除嗽飲 治遠年咳嗽，如

神 參 杏 生甘 苛硝三味九粒

欒 花草 陳白桂 麻 桔 膏

半 桑蜜 枳 烏梅 錦蜜各

右加姜三片細茶一撮

○傳九仙散 治一切咳嗽，乃擊其脅

歸之藥也 參 欒 桑 桔 膏

味硝一烏梅箇貝半 錦蜜後右入

姜，

○本貝母湯 治久嗽，貝半日浸味

芩 姜熱減陳硝一桑炒半 桂各

冬柴熟者木 芮硝各杏炒四十粒右入

姜，

○傳神功散 治久嗽，欒 甘炙各

雄半水飛桂一右爲末吸喉中

○人參散 治遠年嗽 麻齶杏一炒各

其各四陳味桑 硬礫各門三
苑一 參四膠叱右

○寧肺湯

治虛勞發熱自汗咳喘痰

鴨木 萸芍 飯浸地

甘炙味門 桑炙苓各一分膠二分右

加姜

○黃芪散

治咳血成劣能解肌熱

芪蜜

地門桔白芍各三甘

後一右加姜

○神効寧嗽散

治勞嗽諸嗽通用

味芩桑炒蘿細陳

杏炒膠其炙璽蜜炒各半半五

枳

亨仁右入姜棗烏梅

○人參芩飯湯

治勞嗽寒熱咯血

飯亨白芍各二參半

陳

赤苓膠味細其炙各右入

姜棗化

○柴花膏

治肺熱久嗽身如炙將成

肺勞杷通欬

杏炒花

桑炙各大伍右爲末煉蜜丸夜間噙

化

○王紫死散

治咳益肺痿參苑知貝杏炒桔炒實炒各一柔仁柴四

右加姜棗

○林人參養肺湯

治肺痿咳嗽午後熱聲嘶者參其炙各一苓味

貝杏炒桔炒實炒各一柔仁柴四

右加姜棗

○知母茯苓湯

治肺痿喘嗽不已寒熱自汗苓甘炙各一知味參

芍 半 柴 木 敖 桔 門
芩 酥 半 荸 膜 酥 三 右 入 生 姜 煎 食
後 通 口 肺

○保和湯

治勞嗽肺燥成痰者

知 夏 天門 麥門 敖 薦

桔 盛 茄 格 膜 飯 生 地 各

半 互 入 姜 滋 盛 加 星 半 橘 紅 荸

枳 热 盛 加 梔 大 連 芎 柏 懈 咳 盛

加 条 陳 腹 蕎 子 蘿 子 風 盛 加 風 荆

旋 菊 細 莎

○傳 肺 癰 先 須 發 表 千 金 曰 咳 嗽 肺 血 脉
數 實 或 口 中 咳 胸 中 隱 隱 痛 脉 滑 數
者 爲 肺 癰 要 罷 先 以 小 青 龍 一 貼 解
表 之 風 寒 邪 然 後 以 草 蓼 大 藜 鴻 肺
湯 桔 棱 湧 汤 草 蓼 湧 汤 隨 証 用 之 此 治 肺

○草 蓼 大 藜 鴻 肺 湧 汤

治 肺 癰 肺 腫 咳

促 不 得 吐

草

一 両 炒 黃 爲 紅 末
燒 蜜 丸 如 彈 子 大

大 藜

右 以 水 二 盞 前 大 藜 至 一

盞 去 藜 入 草 一 九 盞 煎 至 一 盞 攪 令

服 之

○桔 梗 湧 汤

治 咳 有 微 热 煩 暑 肺 心 甲

錯

草 蓼 二 葵 伴

桃 五 十 凡 伴

升

右 以 水 一 斗 者 草 蓼 空 五 升 去

粗 入 葵 伴 煮 取 一 升 每 服 當 吐 痰 如

粥 而 愈

○桔 梗 湧 汤

治 肺 癰 心 胃 氣 犀 咳 嗽 腫

血 心 神 煩 憎 呃 乾 多 渴 或 兩 脚 肿 蒼

小 便 赤 黃 大 便 多 滴

桔 具 各

升

蔓 蔷 蕃 八 枳 大 已

桑

茲分_五 耳節 杏核及百合_{各三}

右作一服加姜五片大便秘加大黃
小便澁加木通一方有味骨知

○又方

治前証

麥飯 柑橘

貝芷 甘絡一右水煎食後服一
方無其世有草

○黃昏湯

治胸中用錯隱漏知爲

肺癰合歡皮大

掌以水二盞煮取一

盞半分二服

○吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者
消風散入無病男子髮灰清米飲調
下二服而愈方見中風門

○鴉白散

治喘咳脇痛溌氣促肺

經蘊熱等証

桑梔桔 萎升

半杏尖去皮骨各一并研右入姜

炒骨各一并研右入姜

○升麻湯

治肺癰臍乳間痛吐膿血

○四順湯

治肺癰吐膿五心煩熱壅

○排膿散

肺癰吐膿後服此排膿補

師_少 芡 芝 芷 味必參各等右爲末

蜜湯調食後服

○理肺膏

治肺癰咳嗽不利音膚迫

塞_少 詞搘 百藥煎 味微厚參

去芦數葉

杏 知貝 蜜

草 茄 百合 甘絡_{各五} 右爲

朱白茅根研取自然汁砂器蒸成
膏更入蜜二兩再熬和前藥丸溫水

○治肺癰

薏米糯米飲調下或入粥

內煮喫亦可。一方水煎服當下膿血，便愈。

○咳嗽久法

○灸兩乳下黑白際各數十壯即瘥。

○又以菖蒲當乳頭周匝圍身令前後

正中當腋骨灸十壯。

○又上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯。九節中存

○上氣咳嗽短氣風勞多有井一百壯。

○上氣咳嗽短氣胸滿多嘔冷痰多肺俞五十壯。

○從大椎下第五節下六節上灸一百壯。

○咳嗽响冷聲破喉鳴猶待灸天突五年壯。

○勞嗽膏肓年壯二里七壯肺俞二十七

○喘急門十三

壯

傳凡喘者由痰火內鬱風寒外束而致之又有陰虛發喘氣從脣下起宜衝清道而上又有氣虛發喘短氣不能以接續。

○戴氏曰凡喘則有痰聲者痰也乍進乍退得食則減食已則喘者火炎也。凡喘未發時以扶正氣爲主已發以攻邪爲主。

○火急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫之。

○刦藥用椒目五七錢研爲細末生姜湯調服喘止之後仍以火治。

千緒湯 治癰、喘。不得貼人，扶而坐。數日一服。而安。一方用導痰湯合子。
緒湯服。

緒湯服。

一方並見。

一方 用蘿菔子蒸熟 二兩 皂角存性 五個燒
萎 海粉各一星細末 白礬水浸 一宿研
硫右爲末 煉蜜丸噙化

一方 治喘而嗽。用星 萎 半
莎 榴 紅 蘿 薤 皂角 為
末。神龜丸姜湯送下。一方有杏仁。
氣實人因服苦杏過多而喘者宜用。
二拗湯。

二拗湯 治肺感風寒喘急不已。

門咳嗽

草薢大棗鴻肺湯 治肺壅脹胸膈
蒲潤上氣喘急。身熱面白浮腫等証。

嗽門

濟生葶藶散 治過食煎燭或飲酒

過度致肺壅喘。不得卧。及肺壅咽燥，
不渴濁唾腥臭。

甜葶藶子炒桔

萎升 蕃桑蜜葛各八錢

炒桔各半

右作二服。加生姜五片。

瀉白散

治大人小兒風寒傷肺，喘

急咳嗽。

桑 骨絡一錢。蚌壳石加

姜。一方有風荆絳。

又方加麻杏各半。其効尤捷。

祖傳秘方

治遠年喘急。

桑木內蠹蟲糞一升。蘿半 杏去皮尖

耳右爲細末 湯浸蕎餅丸。梧子大。

每服五七十丸。淡姜湯送下。

又治哮喘。用苧麻根和砂糖燭煮。時時嚼嚥。下末絕病根。神效。

時嚼嚥。

末絕病根。

神效。

○又用猫兒頭骨燒灰酒調二三錢，服便止。

王液散

治久近喘嗽口乾渴

括貝炒知各四參仁甘後一右

半
胡桃五十箇湯浸

右作一貼

加姜片

杏仁煎

治喘嗽

杏去皮胡桃

肉桂皮各右研膏煉蜜丸彈子大每

服十九細嚼臨肺姜湯下

又胡桃肉三分姜片臨肺嚼吃飲湯二十

兩口無嚼無飲就貼

人參定喘湯

治肺氣上喘喉中有聲

胸膈緊滿

參麻蘇半膠

炒甘條各一

桑炙味各二分半

蜜炒右分二貼入姜三片

人參散

治喘嗽

枯萎一斤分

參不右爲末每服一錢臨肺乾嚥之白湯調服亦可

方

古文錢七箇洗淨

白梅甌石

水浸三宿空心一呷良久得吐丸

杏仁飲

治身熱咳嗽喘急

柴前枳桔蘿陳去半甘矣

芩參杏各等

右入姜

又一方參蘿飲去甘木加柴杏

治証同前

清氣散

定喘止嗽

瞿味炙

來炙蘿甘青陳去枳數各

分右慢火炒焦水煎加生姜半夏尤

甘青陳去枳數各

分右慢火炒焦水煎加生姜半夏尤

妙方

寧肺湯

治喘嗽

醫鑒

卷

桔星炮半

桑炒姜參各等分

右入姜

神秘湯

治上氣喘急不得卧者

橘桔蘿味各等分

右

分氣紫穎飲

治脾胃不和氣逆喘

促味桑芩陳橘甘草

腹多桔橘

右入柴蘿生姜薑少許

五味子湯

治喘促脉伏而厥者

味醉參門杏橘白生姜各二

棗三

右

林灸法

肺俞三七

天突七

醫法明鑑卷第一終

醫鑒

卷

和中散

頭痛腰痛腰下

胸悶食傷

香附子白朮陳皮各

葛金茴香各研末

右自湯一用

