

醫法明鑑

甲

X


i 40

F  
イ-126

490.9  
Th-12  
1

108.40  
No. 2 18

4冊



## 醫法明鑑卷之一

### 一 中風門

附癩痺瘡麻

### 三賢風因

傳河間曰將息失宜必大暴甚腎水虛裏不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也夫五志過極皆為熱甚俗云風者言末而忘其本也。

○東垣曰中風者非外來風邪乃本氣自病也尤人年踰四旬氣裏之陰或因憂思忿怒傷其氣者多有此証壯歲之時無有也若肥盛者間而有之亦是形盛氣裏故如此耳。

○丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛西北二方真為風所中者有之東南之人皆是湿土生痰生熱生風也一真風類風之辨

傳有真中風邪者有類于中風者不可槩治

傳

○因風者真中風也從昔人而治之因太因氣因湿者

490.9  
16-12  
1

108  
118

No.

4冊



高士川文庫  
1318



# 醫法明鑑卷之一

## 一中風門

附癥瘕瘡麻

## 三賢風因

傳

河間曰。將息失宜。必大暴甚。腎水虛裏不能制之。則陰虛陽實。熱氣怫鬱。心神昏冒。筋骨不用。而卒倒無所知也。夫五志過極。皆為熱甚。俗云風者。言末而忘其本也。


東垣曰。中風者。非外來风邪。乃本氣自病也。凡人年踰四旬。氣裏之陰或因憂思忿怒傷其氣者。多有此証。壯歲之時。無有也。若肥盛者。間而有之。亦是秋盛氣裏故如此耳。

丹溪曰。有氣虛有血虛。有疾盛。西北二方真為風所中者。有之。東南之人。皆是湿土生疾。生熱。生風也。一真風類風之辨。

惠。有真中風邪者。有類于中風者。不可槩治。  
傳。因風者真中風也。從昔人而治之。因大因氣因湿者。

108  
40  
2  
18

No.



富士川文庫  
1318

四十号館  
富士川文庫  
1318

Kitasato Memorial Medical Library

# 目法明鑑卷之一

## 中風門

附癲痺瘡麻

## 賢風因

間曰將息失宜必大暴是腎水虛裏不能制之則虛陽實熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無知也五志過極皆為熱甚俗云風者言未而忘其也

垣曰中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰氣裏之際或因憂思忿怒傷其氣者多有此狂歲之時無有也若肥盛者間而有之亦是形盛裏故如此耳

真中風邪者有類于中風者不可既治有真之東南之人皆是湿土生疾之生熱之生風也

## 吳風類風之辨

真中風邪者有類于中風者不可既治有真之東南之人皆是湿土生疾之生熱之生風也

類中風而非中風從三賢而治之

### 一真風經臟腑之辨

口面加五色有表證脉浮惡風寒拘急不仁中腑也加減

小續金匱表調以通聖辛涼之劑

唇緩失音鼻塞眼聾耳聾使秘中臟也難治

三化陽通其滯調以十全四物之劑

外無六經之見證內無便溺之但障股不能舉

口不能言中經也當從中治大秦艽湯補血以養筋

一真風類風不可考二途

傳中風蓋因先傷內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳

古人論中風者言其證三賢論中風者言其因真中風邪者未必不由氣體虛弱然後感於外邪經曰邪之所湊其氣必虛是也因大因氣因溫者亦未必絕無外邪侵侮而作也若無外邪侵侮則因大因氣因溫各自為他證豈有喘僻癱瘓暴仆暴瘡之候乎豈

可以一中風之證為二途哉

治法外感重先駁外邪而後補中氣內傷重先補中氣而後駁外邪或以散風藥為君以補損藥為臣使或以滋補劑為君以散邪藥為佐使

一似中風之數證

惠傷熱證卒暴僵仆者類中風

氣微痰碍心竅類中風宜吐後調理

瘧證諸毒諸癥皆類中風

尸厥疾厥氣厥血厥固厥各似中風

林氣中者暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆便延潮昏塞牙閏緊急似中風確穰合香丸醒後隨寒熱虛實而調之中風脉浮身溫多痰氣中者脉沉身冷無疾

口眼喎斜半身不遂之病宜止風之一端而已沉六

似中風當得濕毒

玉口眼喎斜半身不遂之病宜止風之一端而已沉六

氣皆能中人。有縱急搐搦不知人事證不可不以  
脉證分別也。

口噤筋急或由風熱甚，勝溫或因寒涼勞胸為病，  
則筋大燥或筋反緩者乃燥之甚，血瘀裏分也。故註曰：  
諸筋挛易愈，燥證微也。筋痿難復，燥證甚也。

林。風病外感善行，教變其病多實發表行陽，疫證內  
傷起肺熱四肢不舉，舌本強定，痿不收，瘓延有声，皆是  
虛證無寒可散，無寒可浮。

後世編集以外中風邪立名而与內傷疫證哀同出治此  
千古之弊也。

○理氣者，氣滯氣鬱，肩膊麻痛之類。此七情也。宜烏  
茱萸氣八味順氣之類。

理血者，無表裏之急證，唯血弱，舉發不時者用大  
秦艽，急活愈風之類。

已上皆不可用風藥者也。

一緩急之治法。

纂。丹溪是大率主血虛有病，或挾火，或虛治法以疾為  
先補養次之。

傳。初得之即當順氣及日久則當治血。

初病暴仆昏悶不省人事，或痰涎壅盛，舌強，  
不語，兩寸脉浮大而寒急，用吐法。

人迎脈堅盛或六脉俱浮弦者急小續命表之。  
看時按見證與時令寒溫加減施治，病勢稍退，  
精神稍復，當改用補氣補血清痰之劑調養，其  
本氣而安此急則治其標，而本之急治也。

凡人或手足漸寢不遂，或臂膊及髀股指節麻木  
不仁，或口眼喎斜，言語蹇澀，或胸膈迷悶，吐痰相續  
或六脉弦滑而虛軟無力，並未致倒仆為中風暈  
厥之候，草當從丹溪之法而調治。

左脉不足及左半身不遂，以四物補血之劑為主治。  
右脉不足及右半身不遂，以四君補氣之劑為主治。  
疾盛者，二陳導痰等陽藥用。

氣血兩虛而挾痰。八物加夏星、寶竹、庭薑子之類。  
若真元慟傷，痰飲漸消，或見風邪未退者，仍以  
卷活愈風方，風通聖之類出入加減調治而安。此緩則  
治其本，而標之治也。

### 一卒風治法

急中卒風，氣絕不歸，至寶丹主之。速進生姜汁  
匙，初中風卒倒，牙關緊，無人真模香圓灌之，候其  
甦便不用針，脉證從法而治。

惠疾壅盛者，口眼喎斜者不能言者皆用吐法，並帶散  
稀涎散口噤者，灌入鼻內，虛甚者不可吐。

年老虛弱之中風及氣虛卒倒，不可吐。

### 一肥瘦之弁

傳肥人中風口喎肢麻，不分左右，皆屬疾，用貝囊、夏  
星、陳木連、柏苓、鳳翹、荊蕡、薄桂、行經降火。  
又見肥白人多風，附行經，童便煮浸入鹽下行，尤  
捷瘦人中風屬陰虛火熱，四物加勝杏核，有疾者治。

惠肥人中風者，以其氣盛於外，而歛於內也。肺為氣出  
入之道，肥者氣必急，疾延壅盛，所以急之必先理氣。  
一半身不遂，左右之弁。

傳半身不遂大率多疾。

在左屬痰，死血，血宜四物桃仁紅花竹瀝姜汁  
在右屬痰與氣虛，宜二陳四君加竹瀝姜汁。

### 一辨治

惠醒後小便不利，不可利之，汗外亡榮衛，枯竭無以  
制太熱，退汗止小便，自汗。

○中風遺尿，氣虛，參、耆、補之。

○飲食坐卧如常，但失音，小續，余去附加葛  
根。中風證內外邪已盡，當服愈風湯以導諸經，久服大  
風，去經有微邪，加減用之，然治病之法不可失。  
其通塞或一氣之微，一旬之通利，如此為常治之法。

### 一脉辨

傳大法中風，脉浮遲者，吉；急疾者凶。

林

寸口脉浮而緊緩而遲皆曰中風脉經曰浮而大者風

○被風不仁痺歷其脉虛者生堅急疾者死

一不治之證

○口閉心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕戶軒肺絕

林

髮直吐沫搖頭上竄直視口閉手撒眼合遺尿不知

人或面赤如粧或頭面青黑汗絰如珠聲如鼾睡

皆不可治

一灸治

○爪中血脈口眼鳴針聽會、頰車地倉、龍喚灸左右

噙灸尤

○風中腑手足不遂百會肩頸曲池、風市足三里、絕骨

四肢麻痛在尤灸右在右灸尤

○風中臟性全危百會風池大椎肩井、間使曲池、足三里、

中藏氣塞延上不語心憤肢麻灸之各至年壯

凡中風治法莫如發表攻裏調氣養血治痰若要

取全功宜艾灸

林

○允五臟中爪各灸其本臟之俞百壯皆服續命湯  
一枚之治風之法大段宜灸心中憤亂神思不怡或手

足麻痺此將中風与臟之候不向風與氣可速灸

○中爪眼戴不能上視者灸三椎第五椎上各五壯或七

壯脊下太主愈

林

○失音不言灸天窓

○目及口噤腹痛灸裏下第一橫文十四壯

○中風口噤灸裏下第一橫文十四壯

○中風口噤灸裏下第一橫文十四壯

# 一通閑敷之劑

○搐鼻散 治卒中風木首人事牙閑緊急毒不下咽者

細土黃 猪牙皂角去子各等分 右為細末以紙搘蘸茅入鼻或

用竹管輕吹入得速後進茅

○通頂散 治中風中氣昏不知人急用吹鼻

藜芷甘生苦 細參各不一錢 炙甘立不 為末吹入鼻中

一字就提頭頂髮立甦有速者可治

○治大人小兒禁口風

皂角去皮子 薑蘿蔔如無用子 右以皂角研末用蘿蔔或子同

米醋研雞翎拂茅塞牙根即甦

○皂角散 蘿蔔子、猪牙皂角各等分 右為細末每服

二三錢水煎熱服半盞即吐

○麝香散 治卒中風瘡倒地癱瘓口喎諸藥未服者  
服之、真麝香二分 真香油二兩 右麝香研細入油  
攪勻開口灌之自甦蓋麝香通閑節可以行

至病所也

○稀涎散 治瓜涎不下喉中作聲如牽鉛

半夏大者十個 猪牙皂角一个 右水煎入姜汁方許服不能嚥者徐灌之

○稀涎散 治中風瘡延壅盛口眼歪斜膈塞不通

明礬一兩半生 猪牙皂角四錢去皮 右為末每服二分

溫水調下以吐為度

○獨聖散 治諸風疾盛及諸癆瘻飲壅溢等證

甜瓜蒂一兩炒黃色 右為細末每服半錢或一钱

量人虛實用之以酸荳蔻調下以吐為度凡行吐法宜

於天氣晴明日行日晦日難得吐病暴急者不拘先

令病者隔宿不食如服某不吐再用熱薑水投之始吐

風瘻者加全蝎半錢微炒如有虫者加猪油五七點雄

黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其虫

一道子疾之劑

林。三生飲 治卒中不知人口眼喎斜岸身不遂瘻壅  
唯鳴及氣厥瘻厥眩暈。

南木香一升 南星六分 川烏附子各三分 各生各右煎服

○首風湯 治中風痰癰壅塞口眼喘斜半身不遂不知  
羊風甘、參白附、川烏生、木、星生各一錢 蟬一个 右加姜

○貝母似薯禹 治肥人中風口喎麻木尤右俱作疾治  
貝 薑星 炮荆風寒柏芩連木陳去白半載

薄桂 甘參 天花粉各等 右加姜煎至夜服

○秘方 白丸子治卒風半身不遂口眼喎斜痰壅盛喘急咳嗽胸膈滿悶及小兒驚風婦人血風

大半夏陽泡白附洗泡星川烏炮去皮去天、蝎炒去

木枳楚故各一兩右為細末姜汁糊丸如梧桐子大每服二

三十九臨卧茶清下熟水亦可小兒驚風生姜薄荷陽合解毒雄黃丸治中風牙關緊急及痰癰喉痙攣如

○解毒雄黃丸治中風牙關緊急及痰癰喉痙攣如

太每服七丸熱茶清下吐出頓除立甦

牙關緊閉開口確下

鈔 雄毛各二巴十四分右為米醋煮麸糊丸菉豆

太每服七丸熱茶清下吐出頓除立甦

### 一去風解表之劑

林

○小續金湯 治暑中風不人事漸覺半身不遂口眼

喝斜語言蹇滯肢體麻痺神精昏亂頭目眩暈痰癰多

傳東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用

五仲景謂汗出則止

已桂苓杏白芍甘參麻去苦參各一錢鳳二錢

附炮七分右分二貼每貼水二盞姜五斤束一枚去核煎

八分服精神恍惚加茯神遠志。骨節煩疼有熱者去附倍芍心煩多驚加犀角骨節疼痛倍加桂附

附倍連肢脹加半倍參久臍寒下利去己芩倍附加木自汗去麻杏加木脚膝弱加膝斛

身疼加芍腰痛加桃仁失音加杏無汗惡寒倍麻風者有汗惡風倍桂芍杏身熱無汗不惡寒

加知膏去附身熱有汗惡風加葛桂苓無汗身涼倍附加姜去附身熱有汗惡風加葛桂苓無汗身涼倍附加姜去附身熱有汗惡風桂附甘肢節痺痛不仁加慈杞梢風散治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重耳鳴皮膚瘡癰疹婦人血風頭皮腫痒

荊穗甘妙羌蟬蛻去砂土藿芍芩風蚕妙苓參

各二陳去根半兩朴姜製各

右為細末每服二升感風頭疼鼻癆用荊莎湯茶清調下遍身瘡癩溫酒下

○散治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急癰癧癰疹

鼻塞聲重

藿半升芷前各一芍甘參各二羌各三去土

右為末每服二升薄荷湯調下食後服茶清亦可

○散治風氣不調頭目昏眩痰壅喘遍身拘急

及爪邪塞壅頭痛項強鼻塞声重肢節煩疼天悞汎

雨頹竟不安

前羌麻白苓芍芩大甘炙蔓枳細風膏別研

菊去梗葉各一兩右咬咀每服一兩姜四斤薄苛三葉水

二盞煎至一盞去滓溫服去麻細膏菊加參天桔梗名參葛散

○清氣宣風散治上焦風熱膈疾目赤耳鳴

芩去根半生地各二桑各二歸木白芍各一風甘菊

枳去核陳荆升連梔

蠅去頭蝉退各六芩各二甘三分

右分二貼水二盞姜三斤東一枚食遠溫服

一去風順氣之劑

○烏藥順氣散治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身

麻丸辛中手足癱瘓言語蹇澁者先宜服此藥以

踈氣道然後隨證投風藥

麻去根節陳去白烏各二桑各二芩去根芍甘桔各二

枳去核各一兩姜炮半

右為末每服三升水一盞姜三斤東

一枚煎七分溫服憎寒壯熱頭痛倦怠加葱白三寸

身體不正屈伸溫酒調服癰癧抓之成瘍用薄

荷煎常服

○人參順氣散治感風頭疼鼻塞声重及中風服此

兼疏通氣道然後進風藥

參姜各一芍甘桔朴木陳去白麻去節芷各五葛三兩右每服三升姜三片東一枚薄荷五葉

煎七分溫服

○八味順氣散中風先宜服此次進治風藥

○八味順氣散中風先宜服此次進治風藥

本白苓、青去白芷、陳、烏參各二  
芍、桂各一右

順風勻氣散 中風中氣半身不遂口眼喎斜光宣服此  
本天參各一沉芷青甘、秦艽、瓜各半、烏、三冬、  
右分二貼水二盞姜三斤煎八方食遠溫服或風濕腰腿  
疼痛亦宜服

○白氣散 見心痛門治心脾疼

本半冬甘各三沉參陳青台烏芷各二天、

木、姜、秦艽各一右入姜

惠防風天麻散 治麻痺走注肢節疼痛

風天、芷、芷川烏、白附、荆、歸、甘、姜、各半兩

滑二兩右為半熱酒化蜜調服、健、調服覺、革力運行微麻、為

度或蜜丸、熟酒化下、白湯化下亦得

一去風養血之劑

傳大秦艽屬中風外無六經之形證內無便關、阻隔、  
知血弱、不見養筋故手足不見運動舌強不見言

如遇天陽加生姜一二片心下痞滿枳實一冬

○慈活愈風散 治腎肝虛筋骨弱、語言蹇澁精神  
昏憊安神養神調理張陽使無偏勝治中風內外無邪  
服此以行中道

羌、甘、風、藁、芎、細枳、熟地參、麻、芍、甘菊  
帰、知、耆、地、骨、枸、子、芍、芷、仲、尤、柴、半  
朴、前、己、各三分、白、苓、芩、芍各四  
枝、各一分、天、蔴、雨、加、姜、三、斤、右、作、一、服、空、心、一、服、嚥、下  
千、參、母、臨、卧、一、服、嚥、下、四、白、丹、望、春、大、寒、人、後、加  
紫、半、參、各、三、分、迎、而、奪、陽、明、氣、望、夏、之、月  
加、膏、芩、知、各、三、分、迎、而、奪、陽、明、氣、望、

加、朴、藿、各、三、分、桂、一、分、半、迎、而、奪、太、陰、氣、望、  
加、己、本、大、令、各、三、分、勝、脾、土、之、風、初、秋、大、暑、之、後  
加、朴、藿、各、三、分、桂、一、分、半、迎、而、奪、太、陰、氣、望、

冬之月加附桂各半歸三分勝少陰之氣

。大防風湯去風順氣活血壯筋文清潤後脚弱緩痛

不足行名曰荆風或兩脚腫痛足脛枯腊名曰鶴膝風

一切麻痺痿軟風濕挾虛之候服之如神

風熟地歸酒浸奇白芍仲姜汁拌炒藥木一升

卷參膝酒浸甘草各半芩附炮各七右作一服水

二盞姜五斤枣一枚煎至一盞空心溫服

林天麻丸治爪因熱而生熱勝則動以靜勝其燥是

養血也此茱萸衛壯筋骨

生地一斤卷十四酒浸三兩歸十兩仲七兩天勝酒浸三

玄參各六兩附炮一方有獨活五兩右細辛煉蜜丸

續余煮散治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼

瞓動或時搐搦及產後中風自汗宜服之

風惱歸參細葛芍甘熟地遠荆半各五桂半右每服一兩生姜三片、

汗不止加芍半、

合八寶回春屬治諸虛不足風疾脉絡拘急疾延壅盛飲食不進

白芍五兩耆三兩木兩半兩生地熟地甘桂半

烏姜附炮參麻去節芩已芍杏風

芩歸神陳各一沉川烏炮各半兩右加姜枣

一去風情抵之劑

林防風通聖散治諸風潮搐手足癰癤小兒急慢驚風大便結閉邪熱暑甚腸胃乾燥寢汗咬

牙上竄睡語筋轉驚慄肌肉蠕動

風芩歸芍大芒翹芍麻各七分半膏

梔桔芩木荊各半甘滑各一半

右加姜

○上清散治因風頭痛者脣眼眶俱痛不可忍

芩芍乳荊穗沒各一錢半分半芍芒

各半右為細末每用一字鼻內噙

獨活散消風化痰治頭目眩暈

細風黃旋蔓苦獨各一膏甘失者半兩右  
為末每服二至三斤水一大盞煎七分食後服

一攻裏通滯之劑

林

三化湯 中風外有六經之形證先以加減小續金治  
若內有便閉之阻隔以此湯導之

朴太實麸炒羌半兩右分二貼每貼水二盞煎

八分去粗食煎溫服微利則已

惠

製惠清方 治中風六七日大便秘結煩劇轉增  
升柴芩赤芍枳麸炒大半生桃去皮麻仁去殼  
芒硝棗仁以下三味并生大黃一半研細貯碗右將升  
麻四味并大黃剉水煎敷佛枕勻用冷水冷服

一鎮神之劑

傳

二參丹 治健忘養精神定志和血

丹參熟地天門各半兩人參丹砂遠菖各五分  
神曲各半兩麥門各一兩右為細末煉蜜丸如梧子大  
每服五十丸空心以愈風湯下

○四白丹 淸肺氣養魄中風昏冒氣不清利者宜  
服葛根芷一兩檀慈獨蘿各一兩白苓木縮參  
風甘芍各半兩知細木各二兩胡竹葉二兩芍三兩  
麝一字牛黃各半兩右為細末煉蜜丸每兩  
另研作十丸臨卧嚼一丸分五七次嚼以愈風湯送下

林

小兒諸痛急驚心熱並皆治之

生烏犀屑硃砂青雄毛玳屑各一兩鹿角膠各一  
牛黃半兩安息兩半為末以無灰酒浸七日過慮去渣  
金箔一兩入茱銀箔各五右將玳瑁為細末研勻安  
息香膏重陽煮凝成後入諸藥中和成丸如梧子  
大入參湯化下二丸

○牛黃清心丸 治諸風緩縱不隨語言蹇瘓瘲延壅  
盛心怔健忘或發癲狂

羚風木白芍門芩犀各一兩麝一兩脾各一兩  
參一兩麴一兩蒲黃一兩白芩一兩紫桔杏各一兩  
失者半兩

牛黃一兩、雄、二分、甘、三分、苦五分、山七分、姜、白欵各七分半、犀一兩半、圓浸。

大豆黃卷、桂膠各一兩七

金匱一千二百序內

金橘四百斤為衣不附皮者全用之皮生處勿用  
味為末入餘藥和勻煉蜜同蜜肉膏為丸每两作十九

以金箇為衣每服一丸食後溫水化下

下中陳珠丸 治肝虛為風邪所干卧則愈散而不守狀如驚

桂枝、珠母研、歸、熟地各一錢、酸棗、柏子各二錢、白芍、龍骨各半錢、石鷗、玄參各一錢、甘草、大棗少許。

每服四十丸金銀薄荷湯食後吞下

大辰砂丸清頭目化瘀延及感冒風寒頭目昏眩皆治之

天英、甘草、芷、兩、鳳、雨、細、苛、兩、辰、有衣、右七味丸

生姜湯下茶清亦可

雜志

○見母仙藥酒治肥人中醫嘴麻木方作病片

卷之三

2

卷之三

半、薄桂甘、或天花粉各等分、右每服七冬水二盞姜三片煎八分至夜服

○資專解語屬治中心脾舌強不語半身不遂  
附炮風拔天各二兩、鈴桂各二兩、甘草各一兩、白芍各一兩

分二貼，每貼水二盞煎八分去粗入竹瀝二匙，再沸服。

口微瘻也。偏風口喎特吐涎沫。語言蹇慢。筋脉拘牽。緩弱久服耳目聰明。鬚髮烏黑力壯健。

稀茶一味五月五日六月六日採洗去土摘取葉九蕊九曜每次蒸用少酒蜜水酒入蒸一飯久曬乾如此九次為佳

煉蜜丸如桐子大每服一百丸空心溫酒或米飯送下

及凡邪壅塞頭痛天瘡先覺不安

卷、甘菊、麻夢、防、膏、前、芩、甘、卷、細、枳、白苓、  
蔓、去皮各、硃砂、一兩半、為衣。右為末、水糊丸如桐子大、每  
服四十丸、姜湯下、臨卧食後。

一易簡

林。治中风舌眼喝斜、枯棲紋取汁和大麥麴作餅矣令熱

慰正便已勿令太過。

○又巴豆七枚去皮研研，噙丸塞右手心，噙右塞左手心，仍以煖水一盞，安向手心湏更便正洗去，革并頻抽掣手中指用草麻子亦可。

○一方皂角一兩去皮弦子炒為末，醋調敷。

○又桂心酒煮取汁，故布蘸，搗病上正即止。左噙右塞，嚼搗尤常用大効。

○治風瘡疾延噬多咽膈不利，牛蒡子微炒荆穗各兩共為末，食後臨卧，搗點二不服。

○一方五月午時取蒼耳葉曝乾為末，酒或漿水服方寸匕日三服，作散，若吐，逐蜜丸準計一方匕。

○風輕易治者，每服君身，有風處皆作粟肌，或如麻豆，此風毒出也。以針刺潰去之，黃汁出乃止。五月五日多取陳乾暑大糴，中稍取用之，若時氣不和，舉家服之，并殺三虫。腸痔一周年服之，佳七月七日九月桔梗，在下加勝己通柏。

○因瘡者，二陳加酒洗芩、卷蒼。

○固濕者，用二木佑以竹匯，姜汁及行氣之藥。  
○加味四物湯，治白虎歷節風。本方加桃、勝、陳、芩、甘芷、膾。在上者加羌枝、威。在下者加勝己通柏。氣虛加參、木朮。有疾加星、半、生姜。血虛倍歸芍。佐以桃、紅。

○一方治上中下痛風。

○連酒炒、蒼米泔浸星各二、麵炒、芍各一、蕤芷各五、威酒炒、枝橫行、慈手臂各三、膽一、酒紅五分。

○右為末，神龜糊丸，如梧子大，每服一百丸，空腹服。

。大恙舌渴 治風濕相搏肢節疼痛

恙升各一獨七分大倉己戚木帰苓澤各五  
右作一服水一盞半煎至一盞去相空腹溫服

。四妙散 治走注疼痛

感酒浸燒桂酒炒各一  
乾五分 韶羊角灰三分 蒼耳子半  
右為末每服一錢匕姜湯調下

。一方 治飲酒濕疾痛風

柏酒炒感酒炒各一  
乾五分 蒼米泔浸卷甘三分 陳去白  
芍各一右為末每服一錢匕姜湯下

。肢節腫痛濕熱流注於肢節之間也

麻去根莖赤芍各一  
升荆恙獨芷蒼感實  
斤芩酒浸燒桔葛芍各半  
甘帰梢升各三分

下焦加酒柏婦人加酒紅腫多加枳股澤更加沒  
不定痛尤妙。脉候數有瘀血用桃紅芍歸大  
仁妙散 治脚膝濕熱成痛

柏酒浸燒蒼半泔浸春秋二宿冬乾二兩右為細末佛歸入姜  
甘三宿夏一宿四兩 右為細末佛歸入姜

。二妙散 治脚膝濕熱成痛

柏酒浸燒蒼半泔浸春秋二宿冬乾二兩右為細末佛歸入姜

。汗調服或為丸姜塩湯送下氣寒者加芍酒佑之

。潛行散 柏一味酒浸曝乾為末每服方寸匕

四物湯 調下治血虛張大痛風多服效

。手臂痛是上焦濕疾橫行經絡中作痛也

半斤芩木星芍各一陳苓各五分 蒼一分 感三分

甘三分右為一服生姜五斤水二盞煎至一盞食後服

。加味二陳湯 治臂痛

赤芍青感木鱉各一紫感芍各一  
甘土分右酒煎服

。治婦人胸背肢走痛

赤芍芍柏各一枝蒼各半 感桂惺炒甘五分右  
加生姜五斤水煎入童便竹匯各半盞再煎熱服

感蒼枝帰鹿去皮尖生桃七个甘二分芍一  
分右

加生姜五斤水煎入童便竹匯各半盞再煎熱服

。治走注疼痛

感蒼枝帰鹿去皮尖生桃七个甘二分芍一  
分右

加生姜五斤水煎入童便竹匯各半盞再煎熱服

○舒筋湯 治脣痛不<sub>可</sub>舉是氣血凝滯經絡不行所致一名立癥湯効如神

片子姜黃 二半  
茶匙 各半  
海桐皮 去外皮  
歸 赤芍

本 <sub>各一</sub>右作一服生姜三斤水一盞半煎至一盞去粗沉香

磨水少許入內溫服

○加味二妙丸 治兩足濕痺疼痛或從足跗熱起

蒼四兩 柄二兩  
雨後藤 扁尾藤 <sub>梗</sub>草已板 <sub>一兩</sub>右為末

酒煮麪糊丸如梧子大每服一百丸空心姜鹽湯下

林慈舌屬 治白虎歷節風毒注骨髓疼痛不定

慈 <sub>二分</sub>附炮花桂木苦扁尾藤 <sub>梗</sub>桃去皮 <sub>去核</sub>鳳

骨碎補 <sub>各一</sub>甘草六分右分二貼姜五斤

○加減地仙丹 治風冷邪濕留帶下焦症膝拘急腫痛

地龍 <sub>炒去皮</sub> 羌脂 <sub>去石</sub> 烏白膠香 <sub>另研</sub> 椒紅 <sub>炒去汗</sub> 威

瓜小豆 <sub>炒黑豆炒去皮</sub> 天仙藤 川烏 <sub>炮去皮</sub> 蒼 <sub>甘厚</sub>

五加 <sub>木別去壳油</sub> 右為末酒糊丸空心鹽酒湯下

惠仙酒方 治諸風疾手足拘挛半身不遂

膝花桔風慈晚蚕沙 <sub>洗淨炒</sub> 各二兩 枸二分 蒼 <sub>二升</sub>  
牛蒡根 <sub>去粗皮</sub> 大麻子 <sub>各一</sub> 牛蒡子 <sub>半升</sub> 右為末糯米

酒二斗磁器內浸某封口七日開封勿令面近瓶口恐革

氣犯眼日進三服每一盞

○秘傳萬國方 治男婦風濕相搏腰膝痛及風濕脚氣芷桔半夏芍苓桂芍麻甘 <sub>各一</sub> 朴歸瓜陳枳獨枳 <sub>各一</sub> 藤烏 <sub>各二</sub> 蒼 <sub>四兩未削</sub> 仲 <sub>二兩通身</sub>

右剉布袋貯用無灰酒三斗慢火煮封口煮一時久過

三日後取酒飲尽粗晒乾為末酒糊丸如梧子大七八十丸酒下

○茯苓湯 治痛痺四肢浮腫

赤苓 <sub>桑各二</sub> 茯苓桂芍麻 <sub>各一</sub> 右入枣水煎溫服以姜湯投之汗出為度若痺留住加歸甘

○防風湯 治血痺皮膚不仁

風鴟歸赤苓芍赤芍芩 <sub>各一</sub> 桂芍甘 <sub>各半</sub> 右入姜  
芩附散 治痺痛自腿脣發作不定者

小苦附子木柴風熱地歸桂甘右寺分入來

續斷圓治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

帰火續薢各半乳風附沒各半天一兩右

為末棟蜜丸溫酒末飲仕下

生科立積散治寒濕麻痺 方見傷寒門

鷄癆湯治風濕相搏手足冷痺腰腿沉重身體煩疼

奇蜜各二兩半姜赤芍姜黃歸酒浸各二兩甘右加

烏革順氣散治歷節走注骨節疼痛加似皮種本

附子八物湯治歷節身痛不可忍 附炮姜炮芍苓桂各三兩

甘桂參各三兩木四兩右一方去桂用乾地二兩

三輝圓治男婦血氣凝滯手足拘牽風痺氣痺等

續仲風桂細參芩歸酒浸芍甘姜芍藥各二兩

生地鷄各一兩膝酒浸奇各二右每服七錢半姜五斤

東一枚水二盞煎至八分溫服

薏苡仁湯治手足流注疼痛麻痺不仁難屈伸

薏歸芍麻桂各一兩蒼四兩右每七錢半生姜

水二盞煎至半服

七斤煎食前自汗減麻熱減桂通氣防風湯肩背痛不可回顧及腰似折項似拔

此太陽經氣鬱不行也此湯治之

慈鷄各一兩甘草蔓各一兩五蔓三兩右如身重

腰沉絃中右寒濕更加酒洗漢方已半冬附少許

如意通聖散治風濕走注疼

瞿止丁皮麻風苦歸甘姜各二兩右咀嚼炒黃每服

七錢水二盞煎八分去粗入乳浸各少許再煎熱服出汗

如神妙若散治風濕痺痛走注癱瘓

瞿止去頭穰蜜各一兩陳去白虎骨酥乳浸甘姜各二

右為細末每服三錢煎連粗熱服

十味剉散治中風血弱臂痛

帰耆矢白芍各二附炮各半芍桂木各一半桂一斤苓熟地酒洗培各七錢半右分二貼姜八斤東一枚食後臨卧服

活絡湯治風濕臂痛諸藥不効者

木帰耆鷄甘苦各二右分二貼姜五斤

○烏沉木香四物湯 治風帶脾經肩臂手足疼

赤鳥、苦、歸芍、熟地、黃各二錢、甘草、木各一錢、右

○加味二陳湯 治臂痛本方加翹風、苦皂刺酒芩、蒼朮

○夢佑湯 治水飲留滯背痛

芍、獨半芩陳枳各二錢、甘草一錢、右加姜

○羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚、薄桂附獨一錢、白芍、風、苦各一錢、右加姜

○五加皮浸酒方 治風濕相搏腰腿疼痛四肢牽急皮膚

膚瘡痒兼精補髓

立加五兩木一兩右㕮咀生絹袋盛以好酒一壇將革袋入酒中用竹葉、蜜封壇口入密鍋內煮一時取出後浸

三十七日開壇空心臨卧飲一二盞多服效

### 一 痘證 并 麻木

傳

丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋嗜慾無節則水失所養大寡于畏而侮所勝肺得大邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于

畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不畏嘗一身脾傷則四肢不見為用而諸痿作矣得南方則肺金清而東方不寒何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有又曰內經論風論痿各有篇目治法迥異局方以治風通治諸痿何其謬哉

○東垣治痿無一定之方黃柏為君黃耆等補藥為佐視所挾之證制其方

○濕熱用健步丸加柏芩、蒼朮之類

○湿痰二陳加二本芩、柏竹歷姜汁之類

○血虛四物湯加蒼柏下補陰丸虎賁丸補腎丸皆可

○氣虛四君子加蒼柏芩、柏蒼治痿之要藥也

○加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不見舉動

帰身、柏、蒼、各一錢地三錢白芍、苦、仲各七分半、門各一

五味九枚參連各半知三分、膝三分足不

軟者不用

右煎

服又酒糊丸服亦可

○捷步丸 治膝中無力屈伸不便腿脚沉重行步難難

一

卷之三 晴妙月、冬、枯酒洗桂各五、風澤各三、苦參分

簡川鳥林不炮各三、己一兩、右為末、麪糊丸如梧子大、每服

七十九丸、愈風湯下

荆芥湯又名愈風湯也

○大防風湯 治兩足痿弱或麻痺或兩膝虛腫名曰

鶴膝風 方見右

○祖傳經驗 治兩足痿弱軟痛或如大焙

蒼米泔浸一二宿柏酒浸日乾各四兩、膝、尾各二板酥、虎脣骨酥已

失、兩

右為末、麪糊丸如梧子大、每服七十丸、姜鹽湯下一方加炮附

○鹿角膠丸 治血氣虛弱兩足痿軟不已、行動

鹿角膠一斤、鹿角霜熟地各半、膝白、臭苓鬼箭

參本仲各二、歸身四兩、虎脣骨酥卷板一兩、為末

別將鹿角膠用無灰酒二盞烊化丸如梧子大、每服一百

丸空心姜鹽湯下

○林陳風濕慈舌湯 治諸瘡濕氣勝風證不退、眩暈

麻木不已、慈一兩、風、蒼各一升、耆七分、甘三分、櫟紫各一分

苦各三、柏陳、黃耆各三分、澤、猪苓各二分、連一方、右

○清燿湯 治濕熱成瘻腰以下痿軟不已、行

耆半、蒼半、木各半、陳澤各半、五味九個、參一、臭苓各半

升各三、門、歸身、生地、地、猪酒柏焰各二、柴甘各半

連各一、右、惠、無連、有芩一

○加味四君子丸 治腎肝虛筋骨痿弱

蓬荳酒浸膠酒浸天、瓜、鹿茸去毛酥炙熟地

兔酒浸五味酒浸各一分、右為末、煉蜜丸如梧子大、每服五十丸食前

○導氣湯 治兩腿麻木沉重

耆二分、甘一、青一、升、紫、歸、澤、柏各半、陳

紅少許、五味三十、右

○天麻黃芩湯 治表有風證因醉飲其証復來右口角併眼牽引側視及左手腳麻木疼痛、

上

天芍藥  
炒葛根如火節不  
芩各三  
參連各四  
歸五  
分

葛甘升葛柏蒼朮各六  
澤七分此紫九分或加猪六分右

神効黃葛湯治麻木不仁或兩目羞明昏花睛痛

蔓荆三分陳半冬參八分炙甘白芍一升  
香二分右

水煎去相臨卧熱服如麻木不仁有熱不加黃柏只加香  
一至通三至如麻木甚者加芍一升通二升如有大熱證

加酒柏三分

祖傳經驗三妙丸治濕熱下流兩脚麻木或如火燎  
柏四兩切片  
酒拌白各炒蒼朮六兩米泔浸一膝  
二宿細切焙右為末  
麵糊丸如梧子大每服五十丸空心姜鹽湯下忘魚腥蒿麥煮熟  
煎炒等物

二傷寒門附中寒傷風瘟疫大頭  
蠶蠅溫感冒

一傷寒溫病換病之異

林中而即病名傷寒

寒毒藏肌膚至春變為溫病至夏變為熱病醫  
均謂之傷寒

一傷寒中寒之異

林寒邪傷腎急痛拘掣戰掉強直昏迷厥冷舌禁  
失音此中寒也

無汗惡寒頭痛面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也  
一傷寒中寒為一說

傳有至人傳云傷寒太法有四曰傳經專經即病鬱病

夫即病者多為專經鬱病者多為傳經云或但中  
於大陽未及鬱熱而即發首尾只在本經而不傳變者  
宜麻桂枝等開驅散表邪而愈或有從太陽未及

鬱熱不從陽明少陽過而入於三陰之經者亦有初不曾  
入於陽經而直傷於三陰之經而即病者因其未曾鬱熱  
上

是以一切為寒證故多自霜降後至春分前發者是也。為其無頭疼無大熱脉沉遲而微故古方又出中寒一條實此證也。

### 一傷寒傷風之異

林以背傳麥與傷寒無異但寒注血故無汗惡寒風散氣故有汗惡風為不同。

### 一傷寒感冒之異

傳。傷寒溫病熱病之外有四時感冒新受風寒之輕證而見頭痛體痛惡寒發熱等證非前麥傳經重病之比。

### 一六經之脉證

日一二日太陽脉浮惡風寒頭項強痛腰脊強。

二三日陽明脈長不惡寒反惡熱目疼鼻乾不得眠。

三四日少陽脉弦細口苦腹下堅滿往來寒熱耳聾。

四五日太陰脉沉細腹滿咽乾。

五六日少陰脉沉欲寐而渴。

六七日厥陰脉緩氣上衝胸飢不食吐蛔煩滿囊縮

### 一兩感

一日太陽少陰頭痛口乾渴掌五

二日陽明太陰身熱譖言腹滿不食

三日少陽厥陰耳聾囊縮而厥

內外兩感府藏俱病表裡不能一治故難治

脉從陽可治從陰難治

傳。經曰兩感於寒者死是內外兩感藏府俱病欲表之則有裡欲下之則有裏之裡既不能一治故死然所稟有虛實所感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治之而不愈者有矣未有不治而復生者予膏用此間有生者十得二三故立此方名解利兩感神方大毫舌湯方在後

### 一表證

林。脉浮緊表實無汗 麻黃湯

。脉浮緩表虛自汗 桂枝湯

。脉浮緩反無汗脉浮緊反煩躁各半湯

一半表一半裏

翕發熱邪在外，若小便黃非在外。

○薰々發熱邪在內若小便清非在內

五  
苓  
散

心下滿不食大便堅脉沉細是裏證頭汗出微惡寒手足冷是表證此在半表半裡 小柴胡

不大便頭痛，有熱是裏證小便清，在

裏證已急，或脈浮或頭痛，表證仍在者，用大柴胡

謂之双解

一  
言  
論

寒裏證者內熱是也宜下之

○不惡寒反惡熱腋下汗出便乾糞結廁排腹滿喘  
或譖妄脉沉滑是裡證也

○小便少手足心并腋下不<sup>汗</sup>者不可攻。

○發熱反欲得衣，熱在肌表。寒在骨髓。  
○脉沉遲，手足或微厥，下利清穀。此陰證，發熱表  
未解，四逆湯或通脈四逆湯。

○治从里表热裡寒先与陰旦陽寒已次小柴加桂

身寒反不善近衣也在胃  
加人參漏熱除次各半漏

卷之三

一陽毒

。初受病時邪毒深重當汗失汗當下失下或吐下後  
邪熱乘虛而入或誤服热藥變為陽毒必發狂、登

高歌平衣起身面

若热甚時，皆口噤咬牙，某不可下者，用水瀆法候牙，寬狂定用某。

一陰毒

。初受病時寒邪深重致陰氣獨盛或汗吐下之後要成陰毒瘡青面黑厥冷身疼如被杖腹中絞痛或自利咽不利虛汗吐肺沉微三日可治五日不可治或真武湯或歸桂升甘雄鱉椒水煎溫服蓋覆取汗或用葱熨法溫肺下劑醒肢溫有汗即瘥續用四逆之類如熨而肢不溫不可治

林。葱熨法治中寒氣虛氣息欲絕及傷寒、陰厥、葱一握以糸綫如餅去根葉惟存白長二十許以大燭令通熱以熱處著肺上下熨一餅壞即易手足溫有汗更服姜湯一盞良。

惠。又法葱一握取白三寸捻成餅先用麝香半分填臍內上放葱餅以大熨之連換三餅稍醒灌姜汁如不醒灸陽充氣海三十壯手足溫即醒若生手足不溫汗不出不省人事者死。

運。手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷急於丹田穴灸之或三十五壯或百壯視輕重手足煖為度。

○陰毒傷寒四肢逆冷宜熨。以吳茱萸一升酒和勻溫袋二隻薰令極熱熨兩脚心候氣通暢勻暖即停熨累用極驗。

### 一陰證

傳。怯弱人感寒濕發熱不食數日後不省人事言語妄神思昏迷面青齒黑為必死之證脉沉細先用小柴胡等不愈急用四君加附子數斤煎以碗盛於水盆中少時殺其熱性稍溫服之脉与神思即回然後可用別藥謂之陰證傷寒。

○下後三五日後妄言不休此神不守舍慎勿復下脉多沉細定冷氣促面青黑口乾補中益氣湯信參加竹葉一陰證似陽之證似陰。

○煩躁面赤微熱脉沉微此則陰證似陽以脉為於○小便赤大便結脉沉滑四肢逆冷伏熱深也此則陽證似陽輕者白虎重者兼風。

### 一溫象之五證

春月傷寒名溫病

○溫病冬傷於寒春必病溫脉浮數發熱頭痛亦惡寒  
輕於冬夏升麻湯解肌湯

百  
○溫氣溫氣來行變成溫疫作天行サ長皆同陽脉

濡弱陰脉弦緊者熱溫寒清順時宜以平為期  
溫毒陽脉洪數陰脉實太更遇溫熱變為溫毒  
發班生疹咳嗽心下痞悶玄參升麻湯

○風溫頭痛身熱自汗四肢不收多眠軒息陽脉浮濶  
陰脉濡弱黃苔而已渴切忌汗

○溫瘧脉弦陽俱盛重感寒者變成溫瘧小柴白虎  
之類

一濕家之三證

○濕溫暑溫相搏成濕溫胸間多汗頭如劈腫冷妄  
言陽脉濡而弱陰脉小而急疾苓白木湯苓木姜桂枝

○中濕一身尽痛散黃大便快尿微脉沉而緩並苓散

○風濕肢體痛重難轉側額上汗出不欲去被身腫  
目睭劇脉浮濶汗微出則風濕俱去也

一症證 寶林

大陽經中風又感寒濕又大發溫家汗則成痘發熱

惡寒微傷寒反張口噤如癟

有汗不惡寒柔症桂枝加葛根湯

無汗惡寒剛症葛根湯

一惡寒 林

太陽發熱無汗惡寒麻黃湯

陽明風有下證但惡寒表未解也 麻黃湯

太陽發熱有汗惡風桂枝湯

陽明脉壅汗多微惡寒表未解也 桂枝湯

少陽發熱微惡寒柴胡桂枝湯

汗後惡寒虛也芍藥甘草附子湯芍甘附子湯

下後惡寒而躁肢溫脉微惡寒表裡虛小建中湯  
吐下後不解熱渴時惡寒表裡俱熱白虎湯

一潮熱 林

少陽王於寅卯太陽王於巳午於此時發熱邪未入  
胃非潮熱應於未申發者謂之潮熱邪在胃  
惡寒潮熱或溏欬逆小柴胡

脉浮潮熱兼寒小柴胡加桂

脉浮弦小便難喘腹滿脹痛無汗身卧小柴胡加桂等  
汗後不惡寒腹滿喘潮熱太小氣脈寒潮熱大氣氣

下後潮熱大便復硬大柴胡

汗下後不解日肺潮熱循衣摸床喘急直視裏氣屬  
脉弦生瘡死

日肺潮熱脉虛微汗桂枝屬

一煩熱 林

為煩而熱無時而渴者是也

心煩喜呴小柴胡汗後煩熱而渴辰砂五苓散

汗後胃乾煩不眠欲飲水傳心煩不得卧梔子豉湯

一煩躁 林

煩為內不安躁為外不安

邪氣在表者在裏者因火劫者陽虛者陰盛者煩躁  
者證之常也非逆也

結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不得卧者吐利煩

躁逆者自利煩躁不得卧者皆死

惡寒而躁時自煩欲去衣大柴胡

煩躁消渴辰砂五苓散

汗後煩躁不得眠欲飲水桂枝湯

自汗心煩小便多芍藥甘草屬二味等分

五六日不大便繞腳痛煩躁發作有時此有燥屎小氣氣  
吐利厥逆煩躁欲死吳茱萸屬茱生姜各一參三分東二分右

陰盛而煩躁名陰躁四逆湯

下利嘔吐煩躁不得卧猪苓湯

傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁多厥瘈瘈一自汗盜汗頭汗桂枝湯

一

發熱惡風自汗太陽中風桂枝湯

自汗小便數芍藥甘草湯自行身熱不渴紫胡加桂  
多發汗漏不止名漏瓜亡陽桂枝附子湯

張證四肢厥冷自汗四逆湯

陽明證汗多渴不大便調胃兼氣

汗多不止木蓼苦芷各一兩米粉一兩半為細末周身撲之  
汗多亡陽煩躁惡風不得卧先与防風白朮牡蠣湯止後用小建中湯

等分末米飲調而調極佳

○敗汗大便難譖語而敗汗出熱聚於胃也可下不食小便瀉四肢汗出中寒也可溫不可下

○盜汗惡而汗出寃則方止非如雜病之虛邪在半表半裡也汗出而微惡寒小紫胡加桂脉浮廟熱或盜汗桂枝湯

○頭汗汗下後胸腹滿結小便不利性來寒熱心煩而頭汗出紫胡桂姜湯

頭汗出惡寒小紫加桂汗不止者難治喘亦然心下滿頭汗出水結胸小半夜茯苓湯

一無汗 林

脈浮而遲不能作汗身必痒桂麻各半屬

陽明主有汗今反無汗身痒皮中久虛故也木附湯

苗裔建中湯

一頭痛太陽證多頭項痛屬厥張頭角痛屬少陽額痛及鼻陽明

無汗發熱惡寒頭痛麻黃湯

六七日不大便頭痛有熱屎清不在裡仍在表須汗

痛甚者必衄葛根葱白湯荆防散川芎石膏湯

汗出發熱惡風頭痛桂枝湯輕者紫胡桂枝湯

半表半裏往來寒熱頭痛脉弦細小紫胡

發熱頭痛似癇為欲愈各半湯

夏月頭痛身冷自汗中暑者湿也木附湯

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓散

自汗頭痛瓜暑及雜病俱宜白虎或加葛根荆芍湯或竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脉沉滑而長頭痛可下

熱不惡寒或不大便小便赤者胃實也調胃姜氣  
汗後不解頭痛不止芷辛烏搗膏貼額上或用  
不卧散吹入鼻內

一胸脹滿胸滿多帶表證服滿多挾半表半裡  
腹下痞鞕冲和湯去東加蛎

汗後後胸脹滿微結小便不利渴而不呕但頭汗出  
或往來寒熱桂胡姜桂湯下利身熱脹痛大柴胡  
寒中誤下愈不快腹脹或吐或利理中湯加枳陳葦  
心下滿而不痛半夏厚心湯吧而發熱者小柴胡

飲水多心下滿脹牡蛎澤瀉湯

一結胸有下氣早而成者脉浮緊心下硬痛未可下  
按之則痛為小結胸不按而痛為大結胸

結胸證志具而加之煩躁者不治

結胸有熱或煩渴先沖和加枳實次下本藥

飲水不散而結小半夏茯苓湯或小柴胡去東加苓蛎

或伍苓合枳木湯枳木湯一實二兩木二兩右

結胸喘促狂亂大燥用地龍水一服未効再服自然汗  
出愈邪熱在上胸膈病結未弁虛寒先予理中加枳實

石妙或桔梗枳殼湯二味等分

參本草集甘二兩寒十六味右燒蜜丸酒煎或白湯下

結胸手不可近用陷胸葦不効枳實理中丸渴者加桔梗

汗後未全解誤下為小結胸煩渴脉實宜三黃厚朴湯  
表未全解亦不可用

熱寒脉沉緊心下痛大陷胸湯

寒實脉浮滑心下按之痛無熱證三物小陷胸湯白散  
項強如痙或從心下至膈上手不可近大陷胸湯

作餅子按膈中以艾炷如指頭太炎輕者一炷重者  
不過二三壯熱氣入腹作聲取下惡物而愈

一痞心下滿而不硬按之不痛曰痞硬水停滯氣聚不  
滿不硬但妨胸者非痞謂之支飲小柴胡加桂

胸滿而滯者半支浮心溫旋覆代赭湯輕者桔梗枳實湯  
胸滿而滯者半支浮心溫旋覆代赭湯輕者桔梗枳實湯

惠下飽望經  
下者非結胸  
乃表邪傷至  
胸未入肺  
朴壁加枳桔  
本方合  
根歸愈

或加苓甘又用茯苓甘草白朮生姜湯

胸滿硬按不痛。脈沉緊大柴胡

痞滿小便不利五苓散

一腹脹滿。腹中滿痛。小柴胡去苓。

六七日不大便。腹滿痛急下。小承氣

大寒痛者桂枝大黃湯

證。妄脉沉數煩渴。不拘日數。調胃姜氣

太陽病反下。因而腹滿時痛。桂枝芍薦湯

小腹滿硬小便自利。如狂者血証也。小腹急結者桃仁姜氣

小腹硬屎不利為無血當除利。

一腹痛按不痛為虛。脈弦腸鳴泄利。小建中湯

按之痛者為寒。闌脈寒腹滿而大使秘。桂枝加大黃湯

少陰腹痛或泄利通脈。四逆加芍薦湯

陽脉濶陰脉弦泄利桂枝芍薦湯

厥張證小腹痛當歸四逆湯

歸兩兩  
葛芍細各三  
甘、柴  
通半各二  
東二十五分右

少陰病利而嗽。厥逆腹痛。四逆五味子干姜湯

少陰版痛泄而厥冷。脉微不應。寒面赤。裡寒外熱。通脈四逆加芍薦脉寒使秘。腹滿繞膈痛煩躁。發作有時。燥屎大便氣脹腹滿時痛。桂枝加大黃湯。

十咳嗽 嘴林

在表之邪。手於肺氣則咳嗽當發散而愈。

太陽發熱而咳。小青龍表未解。心下有水。乾呕發熱而咳。

小青龍發熱呕而咳。小柴胡

少陽寒熱往來而咳。胸脹滿或泄利。小柴胡去參。東加五味姜

少陰四肢厥逆腹痛或泄而咳。四逆散加五味姜

有痰而咳。大半夏湯

春冬傷寒。秋夜傷冷濕之咳嗽喉鳴上氣橘皮湯

少陰腹痛屎不利。四肢重疼自利而咳。真武加五味細辛干姜

邪氣外盛而喘。汗喘不已。經汗下亦可發。麻黃杏子

石膏湯。脉盛自汗。喘。大柴胡

一喘急

麻二兩半  
杏五十個  
石膏二兩半  
大半  
右

太陽下、微喘者表未解也。桂枝加厚朴杏子湯水停心下小便不利腹滿而喘小青龍去麻加苓。

汗後飲水多，咳喘，小青龍去麻加杏。

陰毒喘促或陰證肺伏喘促理中四逆

腹滿而喘潮熱者外欹解大柴胡

汗後潮熱不惡寒，腹滿大便堅，喘小氣，氣  
短，登級不下，則不上，承足端而升出。萬根黃連  
葛西苓甘草各二錢

桂枝證及下利不止脉促喘而汗出萬根黃連黃芩湯  
直視譖詰喘滿者死汗出髮間端不休肺絕身干如油

直視謹詰喘瀉者死汗出髮倒喘不休肺絕身亡如神

嘔吐先嘔後渴為欲解先渴後嘔為水停心下非在  
苓屬

吧，發熱紫舌，證具心下急痛，微煩。大柴胡

胸膈滿吧潮熱小柴胡加芒硝

嘔逆二便不通厥逆無脉大氣氣半表半裡證

**胸熱脹痛吐黃連湯** 吐利手足冷小便後渴  
寒多而嘔哩中渴不飲水而吐。哩中去木加生姜。

寒多而呕。睡中渴不欲水而吐。理中去术加生姜。

經汗下利勝還曾虛冷而吐而善黃芩甘草大參湯

16

穀汗後水革不下及諸吧吐穀不下小半夜屬

煩渴欲飲水，入即吐。五苓散，而思承者急。予桂

有虛熱者氣逆欲吐竹葉石膏湯

治熱嘔不可無烏梅

渴邪傳裏熱氣薰蒸魚腥

消渴氣上衝心火中疼熱桂苓白朮甘草湯  
三兩、白朮二兩、桂枝一兩、甘草一兩

汗下後胸膈滿微結尿陰渴不呴頭汗出性寒恐心煩  
紫胡桂枝子姜湯汗多而渴小柴胡去半夏加參人指

脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯

下利嘔吐煩渴不眠猪苓湯汗多者不用  
汗後脉洪大而渴陽明脈長有汗發熱而渴並白虎湯  
吐汗後七八日不解表裡俱熱惡風大渴舌乾欲水大陽  
服桂枝大汗出煩渴中喝四肢冷汗出煩渴並白虎加人參湯  
夏至前後煩渴發熱不惡寒竹葉石膏湯

自利而渴屎白下焦虛寒甘草干姜湯

四兩半兩半兩

心煩欲眠自利而渴理中丸汗後脉浮煩渴五苓散

小便不利而渴必發黃芩陳立苓散

茵一兩半錢半兩右半身飲下

陽明脉長而寒有汗而渴調胃姜氣

脉沉滑熱實煩躁而渴大陷胸湯

陽毒發狂煩躁大渴潮熱咽痛黑奴丸

傳

汗下之後煩渴飲水摩膈散及減桂立苓甘露益元

選而用之

一衄血

惠傷寒衄久不止施子炒黑為末吹入鼻中

脉浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者是欲衄也

發煩目瞑劇者必衄乃解

太陽脉浮堅發熱無汗衄者愈

脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯

脉浮自汗而衄桂枝湯

六七日不大便頭痛抵臍小柴氣或涼膈散加生地  
衄而渴心煩飲水入即吐先立苓散次竹葉湯

李三余古今卷半兩

當汗而失之熱蘊為衄及吐無犀角地黃芩芍姜湯  
女陰病但厥而無汗強發之必動血或從口鼻出或從  
目中出名下厥上竭難治裏附渴治本

衄者頭汗出身無汗不出不至足者死

汗後熱退衄不止新水濕紙貼於鼻上及頂項敷易之  
傷寒七八日不解自胸上至頭面色黑紫壅腫寸脉浮  
而數是欲衄而不能出刺鼻中出血敷升而安或兩尺  
澤元出血如射即安

一譙語身微熱脉浮大者生逆苓脉沉細者日内死  
直視譙語喘滿者死下利者死謂正氣脫絕也

汗多亡陽反身知譙言此津液不和也不可下紫胡桂枝湯  
傷寒發熱經水適來疊明了魯譙言熱入血室小柴胡  
發熱四五日大便祕小便赤譙言熱厥急用大柴胡

陽虛陰盛而譙言脉沉細弱者當溫經助陽

譙言不惡寒反惡熱白虎煩不厭譙言白虎加施子  
腸滿身重面垢譙言遺尿脉滑實不可下白虎湯

喘滿口乾咽燥或不大便久則譖語是被大劫所致白虎湯下之緩熱病久神不清狂言脉虛而長微弦謂大義氣紫胡飲汗出譖言為風下之下利譖言有燥屎小承氣湯熱反不食有燥屎大熱入胃水竭煩躁必譖言又身熱汗出大便硬譖言冒寒並調胃兼氣

傷寒八九日下之胸滿煩躁不便不利譖言身重紫胡加龍骨牡蛎湯欽鎮神氣

一發狂邪熱至極也新汲水濕布搭於胸上頻易汗熱病六七日未得汗脉洪數面赤目脹煩躁狂走大渴大齒頭抵極脉大渴而發狂黃連解毒不已裏氣湯

血上逆則喜忘下畜則內爭其人如狂犀角地黃湯重

抵當湯喜忘如狂身黃大便黑血證也抵當湯

胸滿唇瘡舌青口燥渴水不欲嘔無熱有瘀血必發狂下血犀角地黃湯加芍傳汗吐下後熱是麻洪數喘酸身黃狂走三黃石膏連進三四服而愈

畜血者如狂熱在下焦小腹硬小便自利抵當湯下血脈弦而長調胃兼氣沉實有表證大紫胡

桂枝甘草龍骨牡蛎湯

### 小腹急結庵仁兼氣

陽毒狂躁發班桔梗大黃湯

桔梗杏紫甘太白甘芍

升麻梔子湯

升麻梔子甘芍

吐下後及虛人走解發狂人參白虎辰砂之類清涼大或

寒水石黃連半水調下又龍膽草一物湯治陽狂

大劫者周身用大迫切出行其人亡陽煩躁驚狂

桂枝甘草龍骨牡蛎湯

狂言直視為腎絕汗出復燃狂言不食為失志皆死

一發黃寸口近掌無脉鼻氣冷不治形體黃如燭薰直視搖頭心絶裸口秘黑屎汙汗發黃脾絶

發熱身痛身目俱黃太陽中濕麻黃連翹赤小豆湯

發黃脈浮緊不可下各半湯

麻甘翹赤小豆半赤杏十二枚

桂枝半生姜二兩生梓白皮右桂枝末寒熱身痛發黃小柴胡加梔子湯

脉浮弦咳嗽短氣肢滿心腹痛鼻乾無汗身目黃小便難廟熱亦陽中風也小柴胡

身熱頭汗尿微渴飲水此疾熱在裡而身黃茵陳湯身黃脉沉結小腹硬尿利狂高血在下焦庵仁兼氣

桂枝甘草白皮右

發熱頭汗渴飲水小便利大便快五苓加茵陳  
小便不利四肢沉重似癱不欲飲茵陳五苓得陽小便  
利如皂莢計則黃從小便出也

食復發黃用枳朴內消也

一斑 赤斑五死一生黑斑十死一生

有下之太早熱氣未虛入胃故發斑有下之太遲熱留  
於胃中亦發斑有陽證根莖多用胃熱焦煽發斑  
陽毒發斑紫黑熱毒陷於內也不治

陽毒已深舌萎焦黑鼻燥狂言面赤斑如錦陽毒  
升麻湯五日可治六日不可治傳陽毒生斑涼膈散加帰  
赤斑熱證臭咽痛玄參升麻湯溫毒呕連二陳杏甘桔皮湯  
吐水眼赤口瘡下部生瘡咳而下利黃連橘皮湯  
斧瘡受不正之氣至春發斑爛瘍瘻疔謂之溫毒化毒丹  
溫毒身無大熱煩渴大便寒或腹滿痛生赤斑調胃藥氣  
連二陳杏甘桔皮湯  
玄參升麻葛根白芷  
朴甘桔皮  
傳發斑面赤譖語脈大而無力或絕而不見用參人生地各五不  
炮附一炙大黃二不

炮附一炙大黃二不

株

一自利謂不經攻下為自居世

身涼脉小項身熱脉大逆下利至甚厥不止者死  
下利日十餘行脉反實者死直視譖言下利者死

不利煩躁不得寐者死

下利手足厥冷無脉者死不溫麻不還者死

下利身熱腹滿乾呕寒熱往來脉長大兼氣

發熱夜重色黃赤此為有熱脉遲而滑內寒不  
散而滑宿食小兼氣自利清水掌下痛口燥宜下

自利而渴白虎湯或黃連阿膠散自利不渴理中丸  
咳而渴下利心煩不眠猪苓湯

腸垢熱也喉熱而利必腑下熱黃芩湯芩芍甘木令

鵝瘡寒也喉寒而利必腑下寒理中湯

自利十餘日不止手足微冷無熱證理中湯

陽病自利便膿血者喉熱也下後脉數不解自利  
不止必喉熱而便膿血俱犀角地黃湯

一大便不利脉數能食名陽結調胃藥大柴胡

株掌

脉遲不能食名陰結全依丹厚朴湯

本五兩朴陳甘各三兩枳半各三兩右姜東二兩

大便不利尿難有津液可作汗

尿敷不可汗似煩卧不著席施子湯

大便堅小便敷不可下趺陽脉浮濶麻仁丸枳實丸

三下不通不可攻當吐提之

一小便不利邪熱高於內津液不行故小便不利

汗後小便不利微熱消渴立苓散渴甚猪苓屬

汗下後尿不利心煩桂枝半姜屬湯小柴胡

小便不利大便乍難乍易微熱胃中有燥屎姜氣屬

傷寒七八日身黃尿不利腹滿茵陳湯

頭汗出尿不利渴飲水發黃茵陳湯

傷寒八九日之胸滿煩驚小便不利譖言身重而不

轉側紫胡龍骨牡蛎湯

柴二兩芩一兩生姜鉢母參枝苓各三

株草百

一四逆滿四逆不可下吐利煩躁四逆者死吳茱萸屬主之見前

發熱七八日身冷名臟厥雖治惡寒躁卧厥逆張氣

極不得病後四肢逆冷脈沉細足辛卧惡寒不飲

水下利清穀張厥也四逆屬手足指頭微冷理中湯無根證而厥當歸四逆加吳茱萸生姜屬虛者宜附子湯

陰病下利清穀裡寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛或乾呕或咽痛或利止脉不出

者此陰盛於內不相通也與通脈四逆湯

寒熱而厥面色不澤冒時两手忽無脉或一手無脉必是有正汗也与各半湯厥而心下悸先治其水

茯苓甘草湯

太乙散

古二末

生姜三升

大棗三枚

半令龍骨

牡蛎各二分

傳裡熱內盛陽厥極深皆因失下以致身冷脉微昏將死切不得以寒苦下之誤下即死又為張厥手溫革必死但進

涼膈解毒養陰退陽如未愈解毒合集氣下之次

解毒涼膈天水合而為一用之

一舌胎傷寒三四日後舌上有膜白滑如胎甚者或淡或黃或黑皆熱氣之淺深也表邪無舌胎邪氣傳裡津液結

株

搏則舌胎仲景曰舌上白胎不可攻与小柴胡  
服下鞭滿不大便而呕舌胎小柴胡

熱聚於胃則舌黃熱深也未下者下之黑滑亦下之  
經曰熱病口乾舌黑者死

林掌

一欬逆

胃有寒又飲水而咳逆先子理中湯次用旋覆代赭湯  
或小青龍去麻加附脉微細橘皮乾姜半夏生姜湯 差  
治附子湯汗下後喘噫咳逆橘皮半夏湯

脉浮洪或有熱而咳逆者大棗奔急上行肺不得細故也

甘草厚朴湯

甘二兩 杏一錢 姜一錢

各半兩

二兩一錢 束一錢

本不飴生姜

六錢

十二錢

方張因失下所致大便硬大氣氣大使軟厚心屬脉散者死  
茱不効硫黃乳香等末酒煎急令飲之

一条期門婦人屈乳頭向下尽处脣間太支及乳小者以  
一指為率頭汗譙語腹滿微喘而見咳逆此危證

一悸動有氣虛有停水有汗多采虛神弱

汗後膈下悸欲為奔豚 茯苓桂枝甘東湯

苓一兩 枝一兩

東三錢

甘半兩 束四錢

本不飴生姜

六錢

汗後膈下悸欲為奔豚 茯苓桂枝甘東湯

苓一兩 枝一兩

東三錢

甘半兩 束四錢

本不飴生姜

六錢

發汗過多心下悸欲按桂枝甘草湯

發汗陽汗則譙語而動悸小柴胡

太枝各二錢 生姜三錢

飲水多厥而悸無有他邪先治水 茯苓甘草湯

甘一錢 生姜三錢

性來多心悸尿後煩吧 小柴胡

脉代結心悸矣甘草湯四逆而悸四逆散加桂

發汗後不解仍發熱悸眩脈振真武湯

吐下後裡虛氣上逆陽不足起則眩脉沉緊發汗則

動經振搖桂苓白朮甘草湯或小建中湯

桂振桂苓白朮甘草湯或小建中湯

卒口噤背反張搖頭症病也凡主動故也

形體如烟直視搖頭心絕

一身痛

太陽無汗脈浮身痛拘急麻黃湯

中風身痛難轉側尿不利五苓散尿利者本附湯

陰毒體勢沉鬱身痛如被杖吧利唇青面黑直武陽

陰毒甘草四逆湯

汗後脉沉身痛不足桂枝加芍藥半夏生姜湯

後身痛  
脉沉者

一咽痛不可行不可下

少陰腹痛猶有熱咽痛黃連龍骨屬

連四兩芍各一分  
龍半兩

脈緊主無汗反有汗亡陽當咽痛甘桔屬

陽毒脉浮數而大喘膿血烏扇膏

咽痛下利四肢冷無熱證理中湯加甘一倍

非時暑寒伏於少陰之經脉微弱而咽痛次必下利腎

傷寒也先半夏桂甘湯次四逆湯

三味各分前冬令加呻也

一蛔厥元有蛇為臟寒蛇上入膈時煩得食而呕自吐蛇

或因發汗冒中冷故長虫出或因胃氣困乏不能食之

到口蛇聞食氣而上以理中丸烏梅丸溫胃消渴吐蛔

理中加大黃入蜜以利之

吐蛔者金有大热忌涼葦蓋胃中寒蛔上理中加乾姜

烏梅丸煎服蛔定後以小柴胡退熱

林一汗後不解

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子屬

汗後仍發熱心下悸動振々真武屬

汗後身痛脉沉桂枝加芍藥人參新加湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利惡寒四逆湯

發汗過多心悸欲按桂枝甘草湯

傳桂枝去芍藥參煎服

汗後腹脹滿厚朴生姜人參屬

大汗出胃乾不眠欲水少少之

發熱汗出不解心中痞硬呴吐下利大柴胡屬

服桂枝後煩渴不解脉洪太白虎加人參屬

汗後不惡寒但惡熱及兼發熱者調胃承氣

傳桂枝後熱不解脉尚浮者白虎加倉

林一下後不解

大下後身熱不去心中結痛而煩施子散屬

下後腹滿卧起不安施子厚桂圓有燥屎者大承氣

下後脉促胸滿桂枝去芍藥湯

桂枝證誤下利不止脉促者表未解喘而汗出者。

葛根黃連黃芩湯過經十餘日二三下吧不止心煩

大柴胡湯

傳 行下後熱未能除用施子豆豉湯或東垣加減涼膈散

林一勞後

病癆後勿早起梳頭洗面勞體多言用心令勞復

病後忌酒肉葷雜消之物又勿過飽更結搊雜叔謂之食後

癆後未滿百日氣力未平復而犯房室者死謂之女勞後

曾後生熱脉浮以汗解汗解枳殼施子屬枳一錢半或三分

癆後渴竹葉石膏湯

門禁分梗寒竹葉

渴後渴竹葉石膏湯

門禁分梗寒竹葉

食後脉沉寒腹滿譖語枳實大黃湯 大柴胡湯

林掌一張陽易

男病新癆婦女文白陽易婦病新癆男之文白

陰易婦則裡急腰脅連股痛男則陰腫小腹絞痛

男女俱或熱上衝胸頭重不舉眼生花離經脈見者死

一呼一至摸脈離經一呼三至至脈離經二脉易病有之

用燒銀散竹皮湯小便不利五苓散

林掌

一狐惑之證齒燥惡飲食面目乍赤乍白舌上白苔黑有瘡四肢重喜眠虫食喉為惑食下部声咬為

狐甚者食臟而死上唇瘡虫食其臟下唇瘡虫食其肛以雄黃銑散膏細穀道中

唇瘡声咬牽牛湯 或黃連犀角湯

連犀角湯一兩烏梅七錢木七錢

一藏結其狀如結胸飲食如故時下利舌上白胎膚

痛引腹筋不寒熱一云寒而不熱其人反靜此藏結也死

一不治脉證陽病見陰脉者死代脉者死

譖言身熱脉洪大身冷脉沉細死發班瘧脉死

咳逆上氣脉散耳聾脉浮濁難療不利脉反實逆

吐衄血脉浮大不下不至陽氣絕上不至陰氣絕

女瘧厥逆無脉服茱通脉漸續生脉暴出死

女瘧厥逆下利惡寒而拳發躁無脉不治

脉弦陽俱虛熱不止脉下躁乍數者死

伏脉必是有正行服麻黃甘桔附子湯多衣無汗者

脉不至者死。指衣摸床热內結脉弦者生僵者死。  
赤斑出立死。一生黑斑出十死一生。發動氣汗者死。

陰毒陽毒過六七日者不治。兩感傷寒者死。

大發溫家汗則為症熱而症者死。結胸證臭煩躁者死。

發汗陰汗則譖言汗只在頭面不至遍身。血汗。

發汗溫汗身青面變耳聾聾不詰不治。

發汗溫汗者死亦主譖言。嘆逆不正者死。藏結者死。

發汗至七八日膚冷而躁無時暫安者名藏厥死。

厥張舌卷裹縮者死。汗張吐利煩躁而汗者死。

爪甲青陽裏敗也。呂乾舌黑不治。汗出如貫珠絕汗也。

喘不休衛氣敗也。發黃變黑不治。發汗不至足者逆。

汗後吐水甚不入逆。腋大滿下泄不治。目張目陷不治。

舌本爛熱不正逆。發班自利不治。

張陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足寒者死。

厥而下利當不忘食反能食者不治。

傷寒七八日以上大發熱者難治。孤感咽乾聲啞唇瘡不治。  
諸逆發汗劇者言亂目眩不治。張口出氣乾呴骨熱痛逆。  
譖言直視或喘滿或下利並不治。

下利發熱或汗不止或厥不止並不治。

汗後不為汗裏發汗而不得汗發熱脉躁疾狂言不能食者謂之三死。

搖頭直視如煙薰心絕唇吻反青四肢多汗汗絕。反目直視狂言遺尿腎絕。環口黧黑棄汗發黃脾絕。汗出如油喘促無已肺絕。水漿不入形體不仁金門絕。絕及三四臘則死。

### 掌林

#### 禁戒

服藥中病即停後服。瘥後百日犯房者死。

病後少食糜粥常令稍飢勿飽。若食諸肉肥血油膩等物必大厚難治。又莫勞體不可多言。不可使意皆勞復取汗但脉微弱遲細動氣瘡林七血虛煩不可用。夏時用桂麻宜加涼劑其性熱故有癥瘕之患也。

○食燒肉消渴 食魚鱗發黃 食渥麴潮熱

○食黃似必耳病 食茄子成瘡 食生菜顏色不復

○食葵菜失明 飲酒太早狂罔

○飲白酒浮腫

○汗後飲冷水損色 早梳頭潮熱

○早洗浴熱胸 踵急成瘡

○思慮重則氣消

○遠行脚風 不得早起 不得勞心費力

### 一發表解肌之劑

傳

○麻黃湯 治太陽脉浮頭身痛惡寒發熱無汗而喘

○麻去根子枝二分甘六分杏十分右先煎

○麻黃一沸掠去上沫

下餘藥煎去粗溫服覆取汗

冬及春初宜用蓋性熱夏至後服發班黃狂罔

○桂枝湯 治太陽中風發熱自汗鼻鳴乾呕

○桂枝半二分芍二分甘二分右加生姜三片大枣二枚煎

冬及春初宜用夏至前加芩一禾夏至後加知一禾膏一禾

○葛根湯 治太陽六明合病無汗惡風身體痛

○葛根一禾麻一禾枝甘芍各七分右加姜枣

○小青龍湯 治表未解必下有水氣呑咳發熱

○麻芍五味半合二分細姜甘枝各一分右

○渴去半加桔一禾汗後飲水多咳嗽去麻加杏一禾

○咳嗽心下有水氣而小便不利去麻加苓一禾半

○大青龍湯 治傷寒見風或傷風見寒脉弱汗出而脈

○麻五分枝二分甘三分杏七分膏三分右加姜枣

○麻五分枝二分甘三分杏七分膏三分右加姜枣

惠。如聖飲治風二症搖頭口噤及張擣觸面赤項強  
急。鳳苦芷紫芍甘歸烏半芩右加姜煎入竹  
瀝姜汁。口噤咬牙大便實者加大黃無汗則症加麻  
蒼。有汗則症加枝木。

○六神通解散。治發熱頭痛發渴身疼脉洪無汗  
麻二分甘三分膏滑芩一分蒼八分右入姜葱  
一和解之劑。

傳。小柴胡湯。治傷寒四五日。往來寒熱胸悶腹痛心煩喜  
嘔。瓜濕身熱邪在少陽經。

柴二分芩一錢參一分甘半兩右加姜東

○大柴胡湯。治傷寒內實。大便難不惡寒反惡熱者。

柴四分芩芍各二分半大半二分半右加姜東以利為度

林。紫胡姜桂湯

柴二分枝芩各三錢一兩姜炮各庫半兩右加姜東

○半夏泻心湯

半兩芩一錢參甘姜炮各庫半兩右加姜東

○小半夏茯苓湯

半兩白苓三兩右煎去滓入生姜自然汗熱服

傳。小陷胸湯。治下之太早。表為結胸。中作痛痞滿。

連一分半二分姜三分。右先煮似葷去粗細諸事再熬

連甘姜枝各二分半各一大棗二枚右

○黃連湯。治傷寒胸中。有熱胃中有邪氣肢痛欲吐者。

○紫胡飲子。治內寒便難不惡寒反惡熱。

柴參芩甘大歸芍右等分加姜

○防風當歸飲子。治身熱便秘不惡寒而煩渴。

柴參芩甘大歸芍風滑右等分加姜

○解利兩感神方。大恙治渴。

傳。風寒芩甘細地生芩柴葛芷石膏。右加黑豆一撮。右入姜

東取微汗為度。如未愈視表裡證多。右用汗下。

○紫胡双解飲。治寒熱渴而口苦耳聾脈弦數。

風寒芩甘細地生芩柴葛芷石膏。右加黑豆一撮。右入姜

東取微汗為度。如未愈視表裡證多。右用汗下。

○紫胡双解飲。治寒熱渴而口苦耳聾脈弦數。

小柴胡加芍陳入姜枣煎。入生艾叶温胀。呕者入姜汁。  
竹茹。腹痛加青皮。尿不利加苓。痰多加姜贝。

桂枝麻黃各半湯

枝立芍甘麻去根莖各三冬杏二十四個去皮去核生姜大棗

紫胡桂枝湯

第一枝芩參芍各半  
甘草四錢  
甘草三錢  
姜皮

三才木林水火之類。非一字、古、今、姜東

小乘氣屬治之

小氣氣滯。六七日不大便。腹脹滿。口渴不惡寒。

尚有而死者

大氣屬肺，治胃寒，譴詬五日不大便，拔

舌乾口燥日晡微熱脈沉實者

朴實七言各一  
大朴實七言各一  
芳若羌前枳上

大半木实而芒合在芳蕙木木去木内大薰互煎  
去坦纳艺硝更煎二沸，服又利痔瘻。

去粗糲芒硝更煎二沸服以利通度

謂胃氣氣滯大便秘結譴諱而

大半。甘。三行。芒。右前。法同前。

卷之三

大陷胸湯 治大結胸高起手不可擗

大三采芒二采甘遂一分二厘半另采

三拂納遂未服以利為度

渴口舌生瘡讐。妄便閑困結發班黑陷。

翹一兩、施太奇芩各五錢、甘草半錢、朴硝二錢、右

**而設面赤在走渴其** 善微利不渴不可用

斧、釜底燶、灶突墨、芒麻裹上塵、小麥奴

一兩  
三冬

大一兩、華、芥、施、桔、各二錢、二不、右以通脬為度。

一清熱生津之劑

白虎湯治陽明證汗後脉洪大而渴及虛煩中暉等證

口燥煩渴不止或發赤班加參二至名化斑傷又名白虎陽陽明下後

大便不固热不退者或溫便溏热不退者加蒼朮六分

林口竹葉石膏湯 去石膏名竹葉湯

膏 三兩八  
門 一兩  
參 三兩  
甘 各三兩  
半 四兩  
竹葉 二  
根 右每張

五絃內梗朱三十之貞娘

三黃石膏湯

下看并行不作目

黃連解毒湯 治大熱不退 烘巴頭渴者 帝嘆曰 不得已

黃庭解卦  
一九六五上草口方以鍼吉口口不往卧

通鑑

卷之三

西大名財相半右衛門煎薑荷水一升內二味煎脂

○梅子莖頭  
○以下後虛境不取心中惶惶或大下後

**撫不去心下結痛**

肥梅  
右老者梅子水減半內  
致同者去

相溫勝得吐止後服

興一矣。荷竹葉、斧、若各半。甫生一古。

葉木苦竹華茶木冬甘木半木

100

甘露飲 治汗下之後煩渴而欲飲水  
麥門冬各二錢，生地黃、甘草各半錢，四味共爲

末每服三钱，白湯下。

**補**。梔子烏梅湯 治傷寒瘥後不得眠

施芩甘各半兩紫一烏梅十四個去核右加生姜竹葉豆豉

道遙瀉治癒新療患方復或陰陽易  
參知連甘生地滑蘿根紫犀竹青  
印端腋 痛苦加

姜束水煎臨服入燒棍榦末一升半調粘汗出為効

升陽散太漏 治撮空 摸床 謂言小便不利者不

大便燥結、詎語發渴、加大黃。泄瀉者、加升木、炒

尊赤各半屬。治病後神昏不語。自赤唇焦舌乾。

**連施**、**苓滑甘知犀神參門右**

酸四升、門一升、甘、薑、知、各二兩、苓、芍、姜、各三兩、右

全

○白木散 治病後氣脈不和食復勞復

桔梗一枝 陳去白青去白前甘山各三本四  
兩 姜二兩 炮

右加姜枣似穰煎 如吐泻入白梅

○增損白木散 病後服 生津止渴順氣下痰

本葛蒼、藿、參、木各一陳二乾生姜一、右

○溫膽湯 治病後虛煩不眠并心膽虛怯

橘紅一兩 實半各一芩三分甘四分右加姜枣竹茹

惠益元屬治身熱頭疼不煩面赤飲水不得入此元氣虛弱無根虛火逐上非熱證不用涼劑

熟附、甘、參、姜、門連知五味葱、艾、枣、右

○當歸活血湯 治頭不疼不惡寒只身熱渴小水利大便黑口無倫語此內傳心脾二經令昏迷不可作熱證

歸、芍、生地、姜、甘、桂、參、紫、枳、桃紅三服後去姜桂桃紅加苓木右姜一斤水煎酒三匙調服

○枳實施子湯 治大病後勞復者

實三枚施子一升右

○枳實施子湯 治大病後勞復者

實三枚施子一升右

### 一涼血逐瘀之劑

○犀角地黃湯 治大便黑衄血脈微發狂發黃當

汗不汗內有瘀血

芍、生地、杜、犀

如無以升麻代右各二分半

右

○生地芩連湯 治熱毒入深吐衄不止

生地芩連施桔甘、柴、芍、犀、生地芩連如無以升麻

右入芩二枚前臨脈入茅根汁如無藕汁亦可

○桃仁姜黃湯 外證已解小腹急大便黑小便不利為瘀血證此葷主之

大、芒、桂、杏一、甘一、桃十個去皮尖研右水煎去粗納芒

○抵當湯 治血結胸譁語因瘀血結於胸中狂言小腹亦滿廝水不欲嚥者

水蛭如黃、金虫各十五枚去翅足炒薑桃十個去皮尖研右煎服血下止後服

### 一治病之劑

○陽毒升麻湯 治陽毒赤班出狂言吐膿血

傳

○陽毒升麻湯 治陽毒赤班出狂言吐膿血

升<sup>二至</sup>犀、眉、射干、芩、參、甘<sup>生各</sup>右

○陽毒施子湯 治傷寒壯熱身痛發班煩

○施升芩芍柴<sup>各一</sup>膏<sup>二</sup>知<sup>一</sup>甘<sup>五</sup>方吉<sup>七</sup>右入姜豉

○犀角消毒飲 治發班瘡疹

牛<sup>四</sup>荆穗風<sup>各二</sup>甘<sup>一</sup>犀<sup>一</sup>半<sup>半</sup>鑄<sup>右</sup>煎調犀末服

○施子仁屬 治發班煩躁面赤咽喉痛潮熱

施赤芍、大青<sup>知</sup><sup>各一</sup>升芩<sup>膏杏</sup><sup>去皮壳</sup>柴<sup>各二</sup>甘<sup>各半</sup>右加姜豉

○玄參升麻湯 治發班咽痛

玄參、升甘、右等分

○大青四物湯 治瘟疫發班

大青<sup>四</sup>膠<sup>炒成珠子</sup>甘<sup>一</sup>升各香豉一分右

○解毒防風湯 治發班及癰瘍疔瘡

風<sup>半</sup>地骨春<sup>一</sup>芍<sup>一</sup>荆枳牛<sup>炒各七分半</sup>右

○加味葛根散 治感不正之氣發癰瘍

葛前<sup>各一</sup>參<sup>一</sup>桔甘<sup>一</sup>枳<sup>一</sup>天芩<sup>各半</sup>蟬奇<sup>各三</sup>右加姜

○調中湯 治內傷外感所發陰班

蒼<sup>一</sup>陳<sup>一</sup>縮藿<sup>一</sup>根<sup>一</sup>桔<sup>半</sup>芷<sup>一</sup>羌<sup>一</sup>桂<sup>半</sup>芷<sup>一</sup>羌<sup>一</sup>桂<sup>半</sup>

枳<sup>各七</sup>芍<sup>五</sup>麻枝<sup>各三</sup>右加姜

○陰毒升麻蠶甲湯 治陰班

升<sup>二</sup>歸甘<sup>各一</sup>椒<sup>二</sup>粒<sup>一</sup>蠶<sup>一</sup>雄<sup>四</sup>右煎<sup>調雄去膜</sup>

一方利之劑

○立冬散 治傷寒中暍煩燥小便不利而渴或霍亂吐利

澤<sup>一</sup>芩木猪<sup>各一</sup>桂<sup>半</sup>右為細末每服三錢白湯或清

未飲調下或細切加姜末煎服甚去桂加芩

○猪苓湯

桔梗、膠澤、渭、右等分水煎去滓下膠候消服

○赤苓、陳參<sup>各二</sup>木萸<sup>半</sup>右

赤苓、陳參<sup>各二</sup>木萸<sup>半</sup>右

# 一導痰之劑

惠。加味道導痰湯治內傷七情致痰迷心竅神不守舍如鬼祟憎寒壯熱頭上氣喘急口出涎沫為傷寒治誤。

苓半陳實、星半木桔參、姜芩、連右剉。

姜半水煎臨服入竹瀝姜汁。

金。大橘皮湯治傷寒呴噦胸滿虛煩不安。

陳參各一  
半兩右每服五分加生姜七片。

○小橘皮湯治傷寒呴噦手足逆冷。

陳一兩生姜二兩右。

丹。大半夏湯。

半白芩、生姜各一分右加薑一斤。

○小半夏湯。

半五两赤苓三兩右加薑一斤。

# 一溫經溫中之劑

林

○四逆湯 治即病太陰自利不渴及陰證脉沉細而遲身痛附一枚去皮作甘炙六分姜五分右煎服取少汗而愈。

八片生用

附一枚去皮作甘炙六分姜五分右煎服取少汗而愈。

# 林。通脈四逆湯

姜三兩甘二兩附大者一斤右傳无甘有參。

# ○茯苓四逆湯

苓二兩參三兩附一枚生去甘六分姜半兩右。

傳

○理中湯治即病太陰自利不渴寒呴版痛鴨溏蛇厥霍亂等證。惠曰：吐蛔者必有大熱忌涼葷蓋胃中寒蛇上加乾姜炒烏梅二枚煎服蛔定後以小柴退熱。

參甘姜各二分右。如腎氣動者去本加桂。吐多者去本加生姜。版痛下利脉沉遲而微者加炮附。

○真武湯 治即病陰證脈沉細身痛或發少陰汗筋惕肉瞤等證。

苓芍生姜附炮去皮各三兩木三分右如咳者加五味姜細各一分。

○小便利者去苓。下利者去芍加姜二分。呴者去附倍生姜。

○姜附禹洽下後復發汗不得眠無表證而脉微者。

姜五分附一枚右如利厥逆脈不至者加甘倍姜面赤者加

葱九茎。呴者加生姜利止脉不出加參三兩。通脈四逆湯。

咽痛加桔子張證。肢痛或泄利加芍二至半。

附子散 治陰證。唇青面黑。身痛四肢厥冷。

熟附三分桂歸木各二分。炮半分。右加姜枣。

生料五積散 治感寒頭身痛。寒呕吐或感寒。

濕脾脚酸疼。

芷草甘条芩歸桂芍半各三分。朴姜各四分。陳枳

麻各六分。桔十二分。蒼二十分。右加姜葱。

白朮散 治陰毒傷寒心煩四肢逆冷。

川烏皮附桂木附炮細各一錢。炮半分。右

海蔵肉桂散 治傷寒脹冷。革過度心肢脹滿四肢。

逆冷眼昏不知人。麥為陰毒惡證。

桂木木朴炒良各三分。白芍陳前歸附炮參各一

茱半兩。右入東。

惠再造飲 治無陽證。頭疼發惡寒項脊強無汗。用表劑汗不出是陽虛。不忌作汗。冬月用之。夏加芩膏。耆參枝甘熟附。細毫鳳。芍生地。炮右剉東三分。

枚水煎熟加炒芍一撮。再前三沸溫服。

林木附湯 治中寒中氣四肢厥冷。牙閏緊急疾壅。

脉弱木七分附炮甘三分半。右分二貼。每貼姜十片。

煎化疊合喬丸併進。

惠調榮養胃湯 治勞力感寒證。即補中益氣。加減參耆歸紫陳甘木芍。生地。細毫鳳。右入姜。東葱白。

金人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼及夾食停痰俱已。治之。

蒼芍半朴各一分。橘紅七分。藿草芩參各半。甘一。右加生姜。烏梅。痰癰寒多加附。

一瘟疫。

傳經足冬不藏精者春必病瘟。是以多感房勞辛苦之人。女樂者志之有也。俗名瘟病。醫書曰。疫病一皆觸冒。四時不正之氣而為病。龐安常曰。疫氣之發大則流行。天下次則一方。次則一鄉。次則偏着一家。悉由。

氣運，首發所致也。仲景無治法，後人用敗毒散治甚得理，切不可作傷寒正治而大汗大下也。但當從乎中治而用少陽之明義所中看，陰陽脉證二方加減和治之。

丹溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有三法宜補宜散宜降用大黃芩連參桔蒼風滑石香附人中黃神曲糊丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下

敗毒散 治瘟疫四時通用

右為末每服三錢加姜三片煎服拂湯點服亦可。  
此藥治傷寒瘟疫風溫風眩股痛憎寒壯熱項  
強睛疼或多風瘡或處卑濕之地脚氣痿弱此  
藥不可缺。一方加薄荷少許。

九味愈活湯 治瘟疫初感二日間服之取汗而  
愈其効如神

卷之二  
各二  
大無神本散 治四時瘟疫頭痛項強身痛憎寒  
風、蒼朮、芷、生地、芩、甘、細辛、右

杜根專主山風癬氣之妙劑也

右作一服加姜三斤枣一枚煎服一方無薑有香附一冬

十神漏 治時令不正瘟疫妄行或四時感冒風熱頭身痛寒熱無汗陰陽兩感並宜服之

麻子甘草葛根芷赤芍陳氏  
右加姜薄加中蒲氯東南加枳一錢

外麻葛根屬治瘟疫頭痛發

升、白芍、甘  
紫胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛体疼鼻塞  
咽乾痰嗽涕唾稠粘

柴前赤芍、葛根、谷十  
升、立右入姜三斤、豉十餘粒。

唯草痺嘯噉噉相半

响乾痰嗽涕唾稠粘  
柴前赤芍、石膏、葛根各十  
两、杏仁、桑白皮各六  
两半、荆芥去梗、甘草  
一两半

。神木散 治四時瘟疫頭痛發熱及傷風自鼻塞色重

蒼五兩葉、芷、細羌、芍各一兩、右加姜葱。

林。辟瘟病。赤小草新布囊盛置井中三日出，举家

服男十枚女二十枚。

○又法熬豆和白木浸酒常服。

○又法用狐狸鼻尖及糞燒以薰除此病狐糞施在竹木石間，頭大堅者是也。

○又雄黃研早晨水灌入鼻孔中及臨卧亦可壅同床不傳染。

○天行疫病者東行桃枝剗煮陽合家渾浴佳。

○溫病勞役及食滯燒人屎存性為末酒調方寸匕服。

○天行瘟疫及小兒熱癆狂啼大人酒後暴熱用臘月八日雪磁器盛遇此病服効。

○屠蘇酒方 大椒、桔桂、風各半、木、川烏、

菝葜各一右八味剗以絳囊貯歲除日懸掛井中令沉至泥正旦出，將囊浸酒中畧煎向東從

小至大飲垂囊于井中。

### 一大頭天行病

傳

○東垣曰大頭病乃陽明邪熱太甚，陽相火為之也。

○濕熱為腫，木盛為痛，此邪見于頭，多在兩耳前後，侵

治法不宜速，則過其病，上熱未除，中寒後，其

腫勢在何部，隨經處治，陽明為邪首，大腫陽，為邪出於耳前後。

○丹溪曰湿熱在高巔之上，用羌及西炒，芩、桑蒸，大

黃隨病加減，切不可用降藥。

○二黃湯 治大頭天行疫病

芩酒製連日上生甘各等分右水煎徐呷。

如未退用鼠粘子不拘水煎，芒硝等分，亦時々，ナフ

子母令飲食在後，如未已，只服前藥，取大便邪氣已，則止。前方宜各々加引經藥，陽明渴加石膏，少陽渴加

括陽明，行經升葛芍甘，太陽行經荆風甘芷，上茱相合用，或頭痛，口渴，葛身痛，羌枝風，芍俱加。

芍俱加。

# 一 蝦蠅溫

傳。丹溪曰。蝦蠅瘧屬風熱。防風通聖散加減用之。  
或用小柴胡加風裏荆芍桔煎服外以側柏葉搗  
汁調大蝦蟇蚯蚓糞付之。或用丁香尖附子尖南星醋  
調付之。或五葉藤車前草皆可搗付之。効。

○ 姜桂散 治冬瘟頭面腫。

姜桂半、膏菊各一、麻白微、羌、杏、甘、

青木香、芍各半、右水煎。

○ 大頭天行病從頤領腫熱者。又名鷗鵝瘧。用羌活、牛  
膝大黃加減十五六日服。小柴胡湯不愈者。仍用陳稊  
發散而愈。又法酒炒芩連為君。矣甘為佐。水煎細分  
呷之。并加鼠粘子酒蒸大黃煎入芒硝亦頻分呷之。

○ 甘桔湯 治冬瘟咽喉腫痛。

甘桔各等、右水煎時分頻呷之。

## 一 感冒

傳。不換金正氣散 治四時感冒頭痛憎寒。瘟疫寒熱霍亂。

吐泻及出遠方不伏水土並皆治之。

朴姜炒陳去白、藿半、蒼半、桂枝、甘草、右加姜枣。

○ 蕃香正氣散 治四時感冒頭痛憎寒。壯熱或風

濕霍亂吐泻。

腹瀉酒洗曝乾再用豆煮汁洗淨、蘋、連莖、藿芷、苓、各六  
分、朴姜。

木陳、去白桔半、各四分、甘草二分、右加姜枣。

○ 逍風百解散 治四時感冒頭疼發熱鼻塞聲重  
咳嗽喘急等證。

蒼麻去節、荆穗、陳芷各一、甘草半、右加姜葱  
啖甚者加烏梅一箇。

○ 八解散 治四時傷寒頭疼体熱惡風多汗惡心嘔逆、  
參、木苓、甘、陳、半、藿、朴各半、右加姜枣。

○ 和解散 治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐利、  
荳去皮、蒼朮、桔甘各半、陳、朴各四分、右加姜枣。

○ 呂稹散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒、  
香附、蘆根各二、陳一兩、甘草半、右加姜葱、頭疼加芍藥、

香附、蘆根各二、陳一兩、甘草半、右加姜葱、頭疼加芍藥。

○參蘿飲 治感風頭痛發熱咳嗽聲重喘噦稠  
粘大解肌極寬中快膈或勞瘵潮熱性未並能  
治之、參蘿葛木半、前芩令各三枳麸炒桔

甘參陳去白各半兩

右加姜枣

氣盛者去木香

○十味葛蘿散 治四時傷寒發熱頭痛

葛七蘿葛柴芩桔各半兩生甘三枳麸炒桔

枳三陳三右加姜枣、惠頭疼甚加芷

○冲和散 治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重肢  
體倦怠欠伸出尻

蒼六荆穗二甘一右煎服

### 三中暑門

一中暑熱之異

傳

○內經曰靜而得之為中暑動而得之為中熱、

○暑熱之時無病之人或避暑於深堂大廈得之  
者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛  
而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遇使周  
身之陽氣不得伸越、大順散等、熱藥主之

○若行人或農夫於日中勞役得之名曰中熱其病必苦  
頭痛發躁熱渴、肌膚大熱必大渴引飲汙大便  
無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼木白虎辛涼劑  
主之

愚按傷寒論中一證曰中暘即中暑也脉虛而微  
弱煩渴引飲体熱自汗此蓋得勞役体虛而暑邪  
于衛之候是宜東垣清暑益氣湯等補益之  
劑一證曰熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身  
熱口燥心煩比蓋得之於冬感寒邪鬱積至

夏而發乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等清涼之劑

### 一方法

中渴而死切不用冷宜溫養以屬厥脈中

嚼生姜或大蒜送下不能嚼水研灌或生乾姜末湯旦下亦佳也

傳

○清暑益氣湯 治感長夏湿熱四肢困倦精神短少胸滿氣促身熱而煩小便黃而數大便溏而頻或渴或不渴自汗体重脉洪緩

香甘草各一升芩各半升升一升參木各半升陳曲炒澤各五甘米各半升

柏酒浸歸青門葛各三分五味九粒右

○白虎湯 治暑熱發渴

方在傷寒門五脉虛加參

○益元散

一名天水散一名六一散治中暑煩渴小便不利方見刺門

○香薷飲 治暑熱肢痛霍亂吐利煩心芋證

薷三冬朴姜制扁炒各一半右水煎

惠氣虛者不下過多

○黃連香薷飲 治證同前上方去扁加黃連七分半

○生脉散 參五味門 等分右水煎夏日時代熱

水飲加僵加蕎甘令人氣力湧出

○香薷剉散 解暑止霍亂

藿二兩朴製表一苓陳甘各半兩良三冬右入鹽一捻

水煎

○縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐泻霍亂

縮果烏梅肉甘各四兩扁炒葛各二兩右水煎

○立冬散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐泻尿赤

如心神恍惚加辰砂名辰砂五苓散

方見傷寒門

○批杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲吧噦惡心頭目昏眩

杷去白丁陳各半兩朴製各半兩需七分茅門甘各八分右

右入姜水煎煩躁冷水調下

○香朴散子 治伏热吐泻霍乱煩悶

參苓甘、米穉、白澤薷半、扁炒陳烏梅

朴令右入姜水煎

暑

○夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也 參耆蜜炙門白芍、陳、白苓各一

連炒甘各一分柏三分木一分知薷各七分右加姜煎

○夏暑如在途中常服壯元氣驅暑免中暑者霍亂

泄痢等證

參一不門白芍炒白苓各一五味十粒木一不碎木五分

甘分五知炒陳蒿各七分杏炒三分右加姜

○夏秋暑熱因過飲食冷物傷內又取涼風傷外以致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或吐泄浮此内外俱傷寒冷也

參姜炒紫朴姜水陳蔻實白苓各一

木一不甘分五右入姜水煎

#### 四中濕門

傳

○居卑濕之地或衝汎風雨或辛苦汗沾衣皆外感之

○恣飲酒慳水多食瓜果之類皆內傷之濕也

○外感多癥痺附腫疼痛內因多中溼痞膈溼痢

○脉沉而緩沉而細微皆中濕

脉滑數屎赤淡引飲濕熱小便自利大便滯身疼自汗湿

○一身尽痛或無汗是濕流閨節邪氣在表五苓加葛

蒼微汗

○自汗多者宜白木甘草湯

○二陳湯加酒芩、慈、蒼、通、散風行濕最妙

○小便自利清白大便泄身痛自汗為寒濕五苓散

加生附苓、

○防己黃芪湯 治風濕脉浮身重汗出頭風或周身疼痛

已三不甘一不木二不茯苓三不右作一服加姜三片東二枚

○加味五苓散 治濕勝身痛小便不利体重發渴者本方

中加慈活一倍

○陳氏湿寒活渴 治風濕相搏一身尽痛

七方 風升柴各五分 葱葉、蒼朮各一兩

○葛活勝湿漏治背痛不可觀此手太陽氣弱而不行以風寒散之脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不通行此莫主之

羌獨各一兩、風甘草各五分、蔓荳三分、右

如身重腰痛沉々然經中有寒濕加酒洗僅防已

輕者附子立分量者川烏五分

○家傳白木酒 治中濕身痛難轉側及皮肉痛難著

蓆本一兩細切酒一盞半煎至一盞去粗服

○對金飲子 治脾胃受濕腹脹不食身重皮膚微浮

肢節酸痛 平胃散 一兩桑白皮一兩為末入姜煎服

### 立癰疾門

傳

○經曰夏傷於暑秋為癰癧之癰得於暑當以汗解或因取涼太過汗許成疾其初感也弱者即病胃氣強者伏而未動至於再感後因內傷其病乃作宜其難差夫暑与風皆外邪也故非汗多不解今之遘此疾者已經再三劫試冒氣重傷何由得愈欲治此證必先与參木等補劑為君加柴葛等發散辛散而取汗得汗而虛又行補養下體屬陰最难得汗補藥力汗出至足方是佳兆

○當以汗之難易較輕重

○大忌飽食遇發日食飽病愈重

○張虛證午後惡寒發熱至晚亦微汗而解脉必虛濡而數且癰脉弦而虛脉不大弦為辨耳

○暑癰宜人參白虎湯之類

○有疾者二陳湯加常草柴芩  
○不能食者必於飲食上得當從食治

○虛者必用參木二貼托住其氣不使下陷後用他藥  
有汗要無汗正氣為主帶散無汗要有汗散邪為主  
帶補

○渴者生地門天花藤知母柏葛甘生

○大渴大熱小柴胡去半加知門連柏梔天花

○瘧帶胸滿枳多寒少大便燥實大柴胡利

○久瘧不得汗以二陳湯倍加二木少加檳榔

○小兒瘧疾者有痞塊生地芍各一陳苦少半

芩炒各半三分入生姜煎調醋炙鱉甲末

○瘧母用丸姜消導之醋散為君稜莪赤青海粉桃紅麴芽隨證加減考九醋湯送下

○老瘧風暑入在陰分宜用血羌引出陽分而散川芎撫芎歸紅蒼芷柏甘煎露一病服

○日久虛瘧寒熱不多或無寒但微熱者邪氣既

無少加柴芩知陳滋補氣血

○陽瘧多汗用參耆木飲之無汗柴木芍葛芩

陰瘧多汗用歸芍地黃柏飲之無汗柴木芍升紅散之

○截瘧常山飲常草櫟知甘美烏梅赤芽慢火煨時

右等分每服五錢水酒各半盞前至八分露星月

一宿清晨冷服欲吐則順之忘熱湯一百然常山

性暴悍善逐瘀飲大傷真氣虛弱者勿輕用

○截瘧七寶飲常一草櫟甘朴青陳各半右

作一服酒水各半盞寒多加酒熱多加水煎八分露

星月一宿空心冷服忌根芩陽一日至午食溫粥  
梗一合右

○祖傳截瘧神方通草常穿醋炙黃辰各半

梅七个大枣三七个水煎先以枣和辰砂末食後服茱萸

一方常草果知楂各一酒一盞浸一日臨發日早服

○治久瘧不愈一服便止永不發其効如神

常半桔一个丁香半个烏梅一个右作一服用好酒

一盞浸一宿臨發日清晨飲

○截癰 穿山木散薰 等分為末二錢空心酒調下

○桂枝尾活湯 治外暑以前發頭項痛 脉浮惡風

有汗 桂枝尾風甘等分水煎迎發而服之如吐加半夏

○麻黃葛根湯 治證如前惡風無汗

麻去節、葛根各一錢、右

○清脾湯 治脈弦數熱多寒少口苦咽乾大便赤濁

青朴木、果柴、苓、半芩各一錢、右加姜

○鱗甲飲子 治癰久不愈腋中結塊名曰癰母肝之積

鱗暗參木香、果枳各一錢、橘紅、白芍、甘草

朴等分、右入姜七斤東一千烏梅一斤

林清脾湯 治癰瘍食癰

朴青、半梅肉良、梅肉各二錢、一升甘半升、右姜三、東

○參養胃湯 治外感風寒內傷生冷發為癰瘍

五年  
傷寒

蒼朮炒朴製、半製各參、苓、黑荳蔻各半、橘紅三分

門甘半、一方加桂右每服八錢姜五斤烏梅半升水煎

○治諸瘍 辰魏等分為末糊丸如皂子大每服一丸空心人參湯化下以諸藥不損脾胃最為穩當

○百草霜黃丹等分為末每服二錢發日空心未飲

調下不遇西服愈發時再服

○瘧瘍 小柴胡加蛎

○小柴胡湯方見傷寒門 柔治熱多寒少頭痛胸滿咽乾

如渴甚而呕去半加天花、胸下痞滿加蠶

傳○瘧瘍發於子午卯酉日寒熱吧吐舌乾口燥少

陰經瘍也 二陳加歸、芩、柏、連、柴之類

發於辰戌丑未日寒熱吧吐不食或腹滿自利太

陰經瘍也 二陳加二木、柴芍之類

○先癰飲 治久癰成瘍在胸腹諸藥不効者

蒼甘浸、葛青、陳良各半、苓、芷枳各一錢、右入鹽少許煎

半甘水浸、桂、姜炮各、芩、甘各二、右入鹽少許煎

林

。一方治癓用雄黃、仙芝蒂、赤小豆為末每服半錢、溫水調下以吐為度。

。一方治疔瘍、鱉甲三兩酥炙黃為末臨發時、溫酒調下三錢七。

### 六霍亂門

傳

○陳無擇曰霍亂者心腹辛痛呕吐利憎寒壯熱、頭痛眩暈。

○何簡曰因渴而大飲之而過量、或因飢而始食之而過飽以致湿熱內甚故陰陽交錯而不和是為吐泻。

○揮霍擗亂而不得吐泻者此名乾霍亂多死。

昌用極鹹鹽湯令吐不吐更服三吐乃止吐定用理中丸、抵多少飲水五苓散、寒多少不飲水理中丸。

○何簡曰凡覺此證急用五苓益元桂苓甘露乃吐泻之聖藥也慎勿与粟米粥湯吐泻止過半日飢甚方、可予稀粥少食以漸將息。

○轉筋屬血熱四物加酒芩、紅荳、星。

○男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊

林

。甚則轉筋入腹即死霍亂惡證無越於斯。

○內經云脉伏者霍亂脉訣霍乱脉微細者生微遲、氣少不言者死。

傳

脉大者生微弱漸遲者死

脈結促代皆不可斷以死

丹溪曰有宜吐者血自吐利還須以吐法提其氣用  
二陳湯探吐或鹽湯皆可吐之

委中穴出血或十指頭出血皆良法

半夏湯治霍亂轉筋吐泻不止

半夏麴苓本各五分 陈桂二分 甘一分 右為半每服

二錢渴者涼水調下不渴者溫水調下

理中丸本參姜甘寺方為末煉蜜丸涼水化下  
六和湯治霍亂吐泻不止

本半縮吉參各一錢 赤苓一分 茯桂扁姜汁

附各一錢 薑朴製炒各二錢 右加姜三斤枣一枚

漿水散治寒泄如水周身汗出尽冷脉弱吐不止  
半二兩 附乾生姜甘各半錢 桂二分 良二分 右漿水煎

姜附湯治霍亂吐泻轉筋手足厥冷多汗方見傷寒門

理中湯治過食生冷成霍亂吐泻心腹滿方見傷寒門

加青陳名治中湯更加丁附名丁香治中湯

丹溪曰霍亂不渴用生姜理中湯治用五苓散加立味門滑又冬用理中湯夏用黃連香薷湯

一方治吐得藿蒼朴陳縮芷甘半冬参麴炒各等分水煎遇寒加乾姜寒甚加附

通脈四逆湯治霍亂多寒身冷脉絕

茱二兩 附一兩 桂通草細白芍甘各二兩帰三分

右水酒各半加生姜

茯苓澤泻湯治吐利後煩渴飲水五苓去桂加甘

木瓜湯治霍亂吐下挾体轉筋入腹悶絕

瓜一兩 茄半兩 茴一兩 甘三分 右入生姜蘋葉

調子散治心脾冷痛霍亂吐利如神

訶甘吳朴製姜黑陳良苓曲炒各二兩 右入

鹽些少煎

株

七氣湯治七氣鬪結五臟之間陰陽不和而霍亂吐利  
半五兩 白芍苓各四兩 朴製桂各三兩 藥陳各二兩 參二兩

下

上

中

外

內

裏

外

右加姜枣

○止渴屬 治霍亂煩渴 甘參門冬桔括葛  
澤 分 右為末每服二錢水調下

○麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱不解多渴小便不利  
門陳去白半、白苓、本炒各二 甘、朱參各一不  
右分二點水二盞姜五斤烏梅一个煎八分服

○不換金正氣散 治霍亂轉筋吐泻不止 方同前

○藿香正氣散 治湿氣霍亂吐泻

方見傷寒門

○姜鹽飲 治乾霍亂 塩一兩生姜半兩同炒令色  
麥以水一椀煎熟溫服甚者加童便一盞

○阮翁湯 治霍亂後虛煩不得眠

參甘、炙竹葉各四兩 附炮半兩半五钱右入姜

五斤粳米百飼粒

○吐苦汁無法可治用井泉水半椀百沸湯半椀  
相合服之妙

○洗法 治霍亂轉筋用蓼一把去兩頭水煎薰

相合服之妙

○洗一方用陳大蓼人

○瀆法 治霍亂轉筋入腹塗多用煎湯瀆之

○冬法 治霍亂已死腹中尚有暖氣用鹽內臍中  
灸二七壯仍灸氣海二七壯

又灸霍亂吐泻上管中管各二七壯 傳 条天枢氣海

又水穀不分而泄泻 合 水分七壯

又轉筋入腹欲死者使四人提手足灸臍左边三十四壯

又轉筋十指牽急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

七內傷門

一辨內傷外傷

傳。外傷風寒有餘之證，發熱惡寒，外極併作其極，發皮毛之上，鼻氣塞不通，心中煩悶不安，一時一日增加愈甚。  
○內傷飲食勞役不足之證，寒熱間作，其極蒸々燥，  
擦發肌肉之間，口鼻中氣短不足，以息腹中不和，不知味，大小便或閉或溏或心下痞，胸或胸中痛。  
○內證頭痛，有時而作，有時而止，外證頭痛，常有之，須傳裏方罷。

一治法

傳。惡寒發熱頭目沉重之證，世醫木案内外虛寒，便作傷寒用汗下之法，故東垣先生著内外傷辨惑論，脾胃論等皆以扶植胃氣為本。

○或內傷挾疾，與食清氣，於下濁氣塞胸中之候，驟用補中益氣等藥，則氣滿痞塞，遂謂補藥不宜此證，改用汗下而死，故王安道著內傷不足，中有一餘。

玉  
○勞倦傷誠不足，飲食傷當於不足，中分有餘不足。  
○酒者大熱，有毒氣味俱陽，乃無形之物也，若傷之，止當發散汗出，則愈，其次利小便二者分消其濕。  
惠  
○傷食必惡食氣，口脈堅盛，胸膈痞塞亦有頭痛，發熱者，但身不痛，二陳加木查等，大倉如聞食氣即止。  
林  
○有挾疾者，有挾外邪者，有熱，於內而發者，皆補元氣為主，看所挾而兼用藥，挾疾者，補中益氣加半夏，氣虛甚者，又加附子以行參耆之氣。

○脉緩怠惰，嗜卧，四肢不收，或便浮，從平胃散。

建中

○脉虛而血弱，從四物湯而加減。

○真氣虛弱及氣短，脉弱從四君子湯。

○或渴或小便闭，從赤黃，從五苓散去桂。

傳。補中益氣湯。

耆一  
甘  
芍五  
參一  
病甚  
木歸各七  
升柴各三  
方

脾胃一虛肺氣先絕故用耆益皮毛固腠理不令汗

○上喘氣短損其元氣用參補之心大乘脾用矣甘

浮火熱補胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜

多用之此三味除湿熱之聖藥也木除胃中熱利脾

胸間血升柴升胃中之清氣又引耆甘上升能

補衛氣之散用歸和血脉橘紅理胸中之氣又助陽氣

上升散滯氣或加柏以救腎水浮腫中之伏火也表熱者

一二服氣和微汗而愈咽乾者加葛根刺痛方血脈不足

加歸精神短少者加參五味頭痛加蔓荆子癟甚

加芩項痛脳痛加藁細有疾加半生姜欬嗽夏

加五味門秋冬加連節麻春加佛耳欬久欬肺中伏

火去參人食不下乃胸中有寒或氣陰滯加木陳青寒

月更加益智草豆蔻夏月更加芩連秋更加枳橘

心下痞滿加芍連腹脹加實木朴縮天寒加生

姜桂腰痛加白芍甘有寒加桂夏加芩葛芍冬

○加益智草豆蔻半夏。眼痛或縮急加柴甘  
睛下痛加熟地不已是寒也加桂。大便閉滯加太  
帰脚軟乏力或痛加柏不已更加己氣浮心亂以  
硃安神丸鎮固之

○硃砂安神丸連一  
硃一  
生地酒歸身甘  
為末湯浸蒸餅丸津唾吞下食後服一方無歸身  
用生甘

○調中益氣湯脉弦洪緩而沉時後四肢倦怠煩心腋難  
舒伸二便清利而效或大便後夏月飧滯完穀或  
便後見血或白膿胸膈膈噎咳嗽此某主之

補中益氣去帰加木一分或二分如陰大蒸熱加生地  
三分。大便虛坐或了而不了腹中逼迫血虛血  
滯加歸身三分。身體沉重。小便多亦加大苓二分  
蒼一  
澤立  
柏三分。胃氣不和加半五分生姜三斤

有嗽加生地二分以制半夏之毒

○瘧厥頭痛非半夏不能除。腹痛春夏加白芍  
冬月腹痛不可用芍只加乾姜或加半夏

○瘧厥頭痛非半夏不能除。腹痛春夏加白芍

冬月腹痛不可用芍只加乾姜或加半夏

升陽補氣湯 治因飲食勞役，胃氣不足，脾氣下溜，氣短無力，不能寒熱。早飯後昏悶，倦怠，五心煩熱。

朴三分、製升、卷、獨風、白芍、甘、矣澤各五分、柴一两半、生地七分半、

右加姜枣。腹脹及窄，較倍朴，肢似硬，加縮三分。

木香化帶湯 治憂食，濕麴結中，脘心痞不食或

胃脘痛。

半斤草蔻混麴裹、半斤炙碎、甘各七分、柴六分、木、橘紅各四分半、

實麴炒歸各三分、酒紅一分、右加生姜。

門冬清肺飲 治脾胃虛弱，氣喘，精神短少，或吐衄、苑草一两半、杏仁去皮膜、甘各二分半、柴六分、木、橘紅各四分半、

白朮和胃丸 治久不食，大便或閉或溏，此胃氣虛弱也。

木一两半、半、朴各一两、陳去白、參五分、甘各二分半、木、宋、枳各二分半、

木半、乾生姜、右為本陽浸蒸餅丸，米飲送下。

枳木丸 治痞滿，消食強胃。

木一两半、宋麸炒、右為末用沸湯泡青荷葉，乾者亦可。

頃間去葉用陽浸晚粳米杵粉以原湯煮糊丸，白

湯送下，加橘紅一两、名橘皮枳木丸，治元氣虛弱。

飲食不消，心下痞悶，加炒麴一两、炒蘇子麴一两、名

麴蘇枳木丸，治飲食太過，心腹滿悶，加木香一两、名

木香枳木丸，破滯氣，消飲食，加半夏一两、名

半夏枳木丸，治傷冷食，加酒炒黃連、酒蒸大黃、

炒神曲橘紅各二分、黃芩四分、名三黃枳木丸，治傷

肉食濕麴辛辣味厚，物填塞，悶亂。

備急大黃丸 治心腹卒痛。

太巴去皮膜、乾姜各等分、右為末，煉蜜丸，小豆大，每

服二丸。

丹溪保和丸 治宿食心腹飽悶，脾胃虛者勿服。

杏五分、麴炒半各三分、苓陳去白各一两、蘿子炒、麴各一两、

麥蘖麴炒各二分、右為末，別用生神曲五分，水入姜汁，糊丸，白湯米飲下，一方無蘖，有木二分，脾胃虛四君子湯送下。

祖傳逍遙散 先傷食寒，熱久不已，或傷寒後食復。

Kitasato Memorial Medical Library

以烹食之物燒存性一兩為末用生韭根葉杵汁調  
服過二時以東垣枳實導滯丸下。

○枳實導滯丸 治傷濕熱之物痞滿阿亂

太一兩、寒麸炒麵炒各半兩苓大芩連木各三錢澤二錢右

蒸餅丸以利為度品木枳各二錢名木香導滯丸  
○參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進或吧渴失病

後補助脾胃極妙

參木苓大山扁姜汁浸炒甘桔意蓮各一兩右為末

每服二錢東湯調下一方有縮二兩禁口劑用梗米湯下

○平胃散 治脾胃不和

蒼立朴姜製陳去白各三錢半甘半右加姜枣、氣不舒

快中晚痞塞加少縮欲進食加曲蘖吳茱洗蜀椒

○益胃湯 治頭暉動勞則微痛不喜飲食口不知味躁

熱氣短腸鳴便溏口乾不喜食冷

參歸陳升各五分甘、半、芩各二分芩、木、參、柴

益各三分蒼一兩右

林金凝神散 欽飲胃氣清涼肺表

參木苓大山各二錢扁炒知生地 甘各一兩

竹葉、地骨門各一兩半右加姜枣、

○感應丸 治傷寒物不能消化或得臭如抱壞雞子

百草霜鍋底壳杏二百四十粒去皮去核姜炮一巴心脾油研蔻二十粒

木二兩丁一兩右姜蔻木丁四味為末同餘三味用蠅

六兩銘化入好酒一升煮數沸候酒冷其蠅自浮於上

取蠅秤用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半煎

熟下酒煮蠅四兩同化乘熱拌和末丸姜湯下

○阿魏圓 治脾胃虛弱食肉麩草不消化

魏酒浸化桂大艾炒蘇炒曲炒青蘿炒木姜炮各半兩

百草霜三分巴三十一个右為末糊丸姜湯下麩傷用

麩陽下生果傷用麝香湯下

屬

人遇勞倦辛苦若用力過多服之免內傷發熱  
病。香蜜參門陳本各一錢甘草五分五味子半  
兩入姜枣勞倦甚加熟附。

○腹痛甚而得之後痛減食積以太實曲消除之  
○浮證須積滯已消後用新下革便固止多成痢  
先理中焦次分利水穀治中不効然後斷下

○泄屬湿多因飲食不節治法消食燥濕利尿補脾  
亦有升提下陷之氣有用鳳茅勝湿有久泄腸胃  
亦有升提下陷之氣有用鳳茅勝湿有久泄腸胃

虛滑不禁取止

主方本二冬苓芍各一陳一冬甘五分傷食泄黃或

食積加連朴實皮赤白加澤猪通施

口渴引飲加葛參門升梅夏秋湿太行暑泄  
加連蒼澤升通積酒熱渴加連因曲葛  
寒月令泄加曲姜縮木益久泄胃氣下陷服利  
屎黃不効加參耆升柴久泄中虛食少難  
化稻耆參曲木姜久泄腸胃虛滑加調蔻本赤石脂  
傳止泻方蔻五分白滑春冬二兩二冬半  
交二兩半秋二兩右為末姜汁調  
神麌作糊丸服

○茯苓湯治傷冷飲泄注變作白痢或赤白相交

膀胱痛食減熱躁四肢沉困無力

芩

生一兩桂甘各二分桂枝在芩各三分澤五分

芍

七分芩生甘升柴各一分右

○黃耆補胃漏治大便一日三四次溏而不多腹鳴

屎黃

耆柴歸身益橘紅各一分

甘、炙甘紅各許右

○治痛泄本芩白芍炒各二兩陳一兩風一兩右水煎

或丸服久泻加升六分

○白朮散治濕泄及食積濕熱作泄

本苓芍等分水煎或為末未飲調下

○神木散治春傷於風裏必瘧泄

芩半葉芩各六分桂四分甘三分細三分右加姜

○胃風陽治證如前及治風冷乘虛入腸胃泄完  
穀及湿毒下如豆汁或下瘀血或如魚膾

參苓芩歸桂木白芍等分右入粟米一小撮水煎  
如腹痛加木香

生科立苓散 治泄注如水  
方見傷寒門 加蒼車倍本

方易保  
寒門如蒼車倍木

為末。未渴調服。渴甚下世。如熱湯者去桂加  
增令施通之類。後痛下世。清令不渴寒世也。若桂加

胃苓湯 治脾胃不和及夏秋之間、脾胃傷冷、水穀

不令平胃五苓合和姜枣煎服

水散寒氣，止腹痛。  
○理中湯 治臟腑停寒泄不已。  
方見傷寒門

理中湯治臟腑停寒也浮不已

○升陽降火治大便閉塞或裡急後重數次而不能便或有白膿或血慎勿利

蒼、四兩、風、二錢、木、白參、白芍、各一兩

**寒腸散** 治泄泻不止  
蔻去梗 訶 緩 陳蒼苓 朴各二錢 木甘各一錢

加姜東、手足冷加乾姜炮

**赤石脂散** 治腸胃虛泄。宜完穀。腹鳴痛。

○六和渴 治暑月泄渴 此方見霍乱门

卷之三

卷之三

薑朴各二錢、甘草一錢、赤苓、扁柏、白蔻各一錢、參、半

調中散 治腸虛泄泻不止 呃吐不食

蒼  
妙曲妙桔  
各一  
芽  
妙益橘紅  
各三  
蘿  
蘿、縮  
兩  
火炮  
桂  
葡萄枝果  
各半  
月  
矣三  
右入姜棗

少鹽并煎

止泻秘方 参木苓  
葛根 右等分煎服

栗毅圓治暴世不止

蟹螯去蒂  
蜜冬蔻、炮、右為末、醋糊

葛根散治頭冒停瘧也。葛根一錢，白芍、甘草各半錢，右加姜枣兩枚。

二神丸 治脾腎虛寒泄泻不食

石  
兩  
共  
西右左半以東四十步築生草而  
東櫈去姜研東肉為膏尤桐子太鹽渴下

加木半西苗西名四神丸治脾腎虛賜鳴世厚肢

脹虛脹胸膈不快飲食不化

五味子散 治腎泄

五味子 二兩 茄 半兩 細粒 綠色者 右二味炒香為末陳末飲下

傳

祖傳 治腹痛泄泻

艾葉 車前草各一握 陰乾 右細切用米二盞煎至一盞

去粗入姜汁再煎一沸稍熱服立愈

○灸法 治吐泻不止灸天枢氣海立止

○同陷下則灸之百會脾俞中脘閏元腎俞

大腸俞長強

九痢病門

傳丹溪曰痢疾乃外感裏內傷之候也須分表裡治之  
在表者惡寒發熱身首俱痛小柴去參之東加之  
芍藥生芍陳微汗以散之

在裏者後重窘迫腹痛下積早宜以大小承氣  
圓煎大黃陽之類下之餘邪未盡更以芍藥湯香連丸之  
類穢積已盡而更衣未息者此大腸不行收令故也  
以固腸丸參香散之類止之

○腹痛白芍甘草為君歸本為佐惡寒加桂惡泄  
加柏

○腹痛因肺氣滯在大腸之間以苦梗散之後用痢藥  
一云實則可下虛則以苦梗散之

○初下痢腹痛用溫姜姜桂之屬勿用參木縱氣  
虛胃虛不可用

○後重者積滯氣墜下故兼升姜消木香枳橘丸  
保和丸之類

○發熱不正者屬陰虛用寒涼更溫苦升藥

○孔痛因熱流於下木極芩連加炒姜又云久病身冷

○自汗脉沉小而孔痛宜溫暴病身熱脉洪大宜清之

○下血者宜涼血活血歸芩桃之類凡邪下陷升提之

○濕熱下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛後

重桂苓甘露飲送下保和丸

○濕多熱少食少腹痛後重夜多利下胃苓湯送下

保和丸

○氣虛面色痿黃或枯白色疲倦刺頻併痛後重不食脉細弱或微汗出黃耆建中湯下保和丸

○湿熱為病不渴者建中湯加蒼苓下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加

芍桂葛木苓下保和丸

○血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此證四君加歸陳下保和丸

○下痢白積者芍藥湯加木陳甘瀉桃

○下痢赤積身熱一元散加通芍甘草陳桔梗木陽下保和丸

○下痢日久而不能起於床不食疲弱甚者用參、芍地榆縮澤各五分木芍陳各二分歸七聖各一分甘木升白蔻各三分右煎服

○治痢主方芩芍各二分連木枳梅各一分甘芍一分初後重加歸尾加枳壳生芍各一分再加條芩

○日久後重不去此太陽墜下去梅枳用條芩加升麻提之

○白痢加木苓陳瀉初散下加大黃

○紅痢加歸芍一分桃一分初散下加大黃

○紅白相交加歸芍一分桃一分以理血加瀉陳木以理氣

○有食積加枳實

傳

○芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此某

是也白芍二分歸尾連芩各一分大黃一分甘草木桂各五分

○初後重窘迫甚者倍大黃一分

○痞滿不宣通加寒一分藏毒下血加柏一分

○黃芩芍藥湯 治浮痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪數及膿血稠粘者

芩 芍各二分 甘一升右煎服 腹痛甚加桂二分熱服

○黃連屬 治大便後下血腹中不痛謂之湿毒下血

連、歸各二分右

○芍藥黃連屬 治便後下血腹中痛謂之極毒下血

芍歸連 各一分 太三分桂一分甘三分右

○大黃湯 治痢久不愈膿血稠粘裡急後重日夜無度麻沉實者或初腹痛甚者窘迫不安者大黃一味

好酒浸半日前去粗頭服後以芍藥屬和之

又再服黃芩芍藥湯微其邪此乃萬能抑熱之劑

○番連丸 治下痢膿血相交裏急後重

連 二十兩用茱萸十四兩同木

以酒拌濕同炒去茱萸八分右為末酸麴糊丸米飲下

加石連半斤治禁口痢尤佳

○益元散 治痢之聖藥也

白滑六分甘一升右為末白水調下

○神効參香散 治痢日久穢積已少腹不痛或微痛不後重窘迫只滑溜不止乃收功之後藥也

銀星去穰茎醋炙陳一兩  
一兩二分蔻三四分  
苓扁炒各木

參各一右為末每服一錢匕清米飲調下食速

○祖傳和中飲 治痢疾不分赤白久近服之但發熱

禁不可服陳木苓芍各一  
草七分甘三分陳倉米二分

砂糖三  
不栗殼醋各烏梅七个右作一服加姜三片枣一枚水煎

○二防飲 治痢後感寒濕脚膝腫痛名鶴膝風

參木芍歸芍熟地仲姜竹  
拌炒薑各半分

風已羌膝各七分附童尿浸三日去皮右作一服

入姜三分枣二枚

○禁口痢胃口燥甚故也用連參煎湯終日呷之如吐則再強飲但得一呷下咽便好

又用田螺搗盦鹽中以引下其燥

又禁口不食者參苓白朮散加葛朮陳倉未飲調下或參苓蓮入此芍藥蒲為末子胸次一服自然

思食

蓮陳壁土二味細末，姜煎湯調下。

炒丹溪主方治熱病血痢即古方四黃散

連芩柏枳白芍歸滑甘桃木等分為末，  
炒糊丸加大黃末飲下。

一方治虛弱患病參三冬白苓二冬木芍炒各一  
升五分右水煎下重加風酒服各一不

使七分連炒澤各六甘姜滑炒各立令木三分

○治痢後脚細弱蒼二兩白芍板各二半柏五分  
右為末弱糊丸四物湯加陳甘煎湯下

林黑丸子治宿食腹痛瘰也赤白痢方見內傷門

○駐車丸治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛甚，  
連三兩膠歸各一姜炮一右為末醋糊丸未飲下

○白木聖散子治泻痢久不瘥，婦人產後痢，  
歸芍縮榆皮訶姜炮陳木甘芍等分

水煎入乳香末空心服

○加減平胃散久下利則脾胃虛損而血不流於四肢，  
却入胃中為血痢宜服此滋養脾胃

木枳各三木朴陳各一甘、七分參、連、白苓、膠炒  
桃各五右為末每服五錢姜三斤東一枚水煎去粗服

血多加桃氣不下後重加枳木腹多加膠濕多加  
木腹痛加桂芍甘熱泄加連脉洪大加大黃  
尿後加苓澤。

○加減木香煮散治一切痢神妙

木甘歸芍參桂芍訶烏梅去核膠蚌蛤炒  
白苓各五蜜鈞一兩半右每服四錢姜三斤東二枚煎去粗服  
○加味四君子湯服甚已多利不愈蓋攻擊臟腑之  
素轉覓見雞矢宜用和氣之藥

參木白苓甘、耆、芍、蜜、等分每服三錢姜三斤東二  
百中散治一切痢一日去立六十行只一服便止

眼望蜜炒赤色朴製右為末米湯調下忘生冷油臘魚鮮等  
四五分

○獨神丸治痢疾蜜去蒂為末煉蜜丸如桐子大每

蜜蜜炒赤色朴製右為末米湯調下忘生冷油臘魚鮮等  
四五分

○獨神丸治痢疾蜜去蒂為末煉蜜丸如桐子大每

服五十丸赤劑甘草湯下白劑乾姜湯下

○倉廩湯治癰瘍俱作寒熱腹痛煩渴及禁口者

紫三升前羌獨枳桔芩參芍各一  
芍半升加芩一升右分二貼姜五斤煎一升

三五貼之後重服痛寒熱煩渴脈沉實以

大柴胡湯宜下之

○葛根湯治酒痢葛根半芩生地杏各二升

芩一升甘半升右分二貼黑豆百粒姜五斤白梅一斤水煎

○真人養藏湯治下痢腹痛及酒毒便血

蜜三升參六升歸木倍各六升桂八升芍枝皮一两木一两

蔻

蔻梗半升

白芍一两

甘一两八升

右水煎臘寒者如附

## 十氣門

傳

○內經冒病皆生於氣也若不善摄生者五志之火無時不起五味之偏無日不傷是以釀成膠疾回積留滯於六府而火氣充塞乎三焦使氣血失其常候府藏不能傳道是故外邪得以乘虛而侵襲。脉經曰脉滑者多血少氣濁者少血多氣大者血氣俱多脉未大而堅者血氣俱寒小者血氣俱少細而緩者血氣俱虛代者氣裏細者氣少

○氣結則生痰少盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯半夏為主官桂佐之調氣雖用豁痰亦不可無湿润之劑

傳

○二陳湯 方見痰門

○氣結于胸臆之間而為痞滿刺痛伏梁等証者加連、突桔、姜木之類

○在中焦而為痞滿脹急者加木朴枳桔或用平胃散在下焦而為痞滿脹急者加桃楂施枳核面練

荔枝之類

在而服攻築作痛者加青、柴芍、勝之類

婦人胎前產後一切氣疾作楚者四物為主加行氣之藥。  
七氣湯治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋腹脹面

股浮腫大便秘難

參桂半各二  
朱甘各一右作一貼入姜三斤  
惠丰立西圭二兩  
多日各五斤

周易

疾門

日行者口詒曰：「人不眠，君如火，人眠，君乃用。」

本分。一方加生姜、縮煙心各一  
兩，水煎服。

○木香飲 一名疏氣飲子 一名木香疏氣飲 治氣壅塞脚浮腫無不効

種青歸酒漫芍藥  
桔半甘冬芍去  
只堪莎蔓一箇  
便無二事

宜  
同  
桂  
枝  
湯  
服  
各  
八  
錢  
右  
分  
二  
貼  
姜  
三  
斤  
枣  
二  
枚  
水  
煎

口木香疏氣飲 治氣痞胸膈膨脹面目四肢浮腫二便秘

半三分、朴青、稊、去梗、赤芍、姜各二分五厘、陳五味桂枝、去白皮、大黃根、丁皮、不見太、腰、蘿木、果各九分、通去葛節、一分、右每服四錢、姜三斤、枣一枚、芷赤苓、本、伏參、葛、各六分、一至二分五厘、門

快氣湯 治氣積心腹脹滿胸塞吞酸痰逆嘔吐宿  
酒 香附炒一斤縮四兩 甘半錢 右為末鹽湯熱服或入姜煎  
柳氣散 治七情所傷中脘不快氣不升降脹脹  
香附炒四兩 陳皮三兩 甘半錢 右為末每服二錢食遠白  
湯點服煎服尤妙女人尤宜服

口心氣飲治因憂思  
口舌乾食減漸羸瘦

穢、四不、恙、半、桂、青、陳、朕、桑、妙、通、芍、甘、矣、

赤苓右每貼七錢姜三片束  
氣秘加枳壳 菜菔 皂角子各二  
錢

**桔梗** 炒 **門冬** **果腹皮** 各一錢 **木桑** 桑葉子 **朴本參** 各半錢

步竹 穗陳 蕁藿 各一 丁皮 甘一  
右入姜東

○ 穗合香丸 專能順氣化痰并治傳屍骨蒸卒心痛鬼魅赤白下痢小兒驚搐等證

沉麝 研 丁本安 別研用無灰酒一分熬膏

本檀 各二

薰 另研

穗合香油 內膏

腦 研各硃

烏犀 各三

右為末和勻用安息膏并煉蜜和劑丸

如梧桐子太空心溫水化下四丸酒服亦可

○ 紫沉通氣湯 治三焦氣閉不能宣通腹脹便秘

穢枳 麝步 陳去白 赤苓 甘 杏梅 各一

沉木門味 奉奇 姜竒 荆寒

麝步各半兩

右

○ 木香枳橘丸 跡三焦利胸膈破瘀逐飲快氣消食

木枳青 陳荳

枳連 枳各一兩 柚大 各三

步亭

末各四兩

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

○ 正氣天香湯 治婦人氣痛或胸腹腰中結塊刺痛

因久月水不調或眩吐寒熱及胎前產後一切

氣証

烏 一兩 陈 穗 姜 各六分 右水煎

沉香降氣漏 治氣不升降胸膈痞悶吞酸

沉 四分 細 五分 甘、姜各一兩

步 去白 童便 一宿、四兩

右為末每服二錢

入鹽少許白湯調下

○ 黑香散 治胃氣不和腹股膨脹飲食難化一切冷氣結聚

莪 穀 益 甘 各六分 青 陳朴 各二

蓮 一兩 右入姜東

金 和氣散 治脾胃不和中晚氣滯腹滿呴吐

青茴 麝 蒼 甘 各一兩

陳去白 桂 良 步 桔 各二兩

右為末鹽湯點服

○ 順氣木香散 治氣不升降胸痞引痛及酒食過

傷噫酸

蒼桔茴 麝各三兩 姜 陳去白 朴縮

丁皮 甘各一兩

良桂 木 各一兩

○ 紫穗子湯 治憂思過度心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

二便不利脉虛緊而癟

種子一兩、腰果半、朴木、陳通木、實炒甘、矣

參各半、右加姜東、

丙

鍼灸法

憂死肢冷心版口鼻溫目神不轉口無涎舌仰不縮  
鍼合谷三分徐出針押定復活

驚死心下溫刺允骨用針口中溫入三分徐出押定悲  
哭欲死肢冷身口溫針人中三分、灸百會三壯

又法神道

五椎針三分

灸三壯

奔豚氣搶心不得息灸中極五十壯

舊灸心氣法、男左女右掌內五指與一寸之禪心三條結一  
磊正坐、禪心令開、加頸上以指按定磊於天突骨上、兩  
邊垂向背後、兩禪心齊垂下脊中、尽头是穴可灸  
五十壯神効

十一疾飲門

傳

丹溪曰有熱疾有湿疾有酒疾有食積疾有風疾  
有寒疾有老疾

○疾脈皆弦微沉滑、双弦者寒飲、偏弦者飲也、沉而  
弦懸飲內痛、肺飲不弦但苦喘短氣、短氣四肢歷  
節走痛、脉沉者有留飲、兩關浮弦大而實者膈上  
有稠疾、病人百革不効、閏脉伏而大者疾、眼胞及眼  
下如炭煙薰黑者亦疾也

○熱疾用黛連、

○濕疾身多軟而重用二本文曰用芩、芍、半、貝、

○酒疾用姜岱、蜜丸噙化

○食積疾用麴芽、查或化疾丸消積革攻之、

○風痰用星、白附

○寒疾用半夏、

○老疾用海石、芍、半、姜、五倍、

一云五倍、佑他  
茱大治頑疾

○疾結核在咽喉嗽而不能出化疾革加鹹能軟堅之

味妻吉海石桔翹ナ佐以朴硝姜汁蜜丸噙化

○痰在腋下非白芩子不能達在四肢非竹瀝不行在腸胃間可下而愈

○脉浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中孰有發散之義

○允吐法宜先升提其氣用風施芍桔芽荎生姜之類成就以此革探吐時須先以布勒腰腹而於不通

風處行ハハ又服瓜蒂莉蘆等革不用探法自吐油炒半夏大治湿痰又治喘心痛粥丸生姜湯下

○二陳湯治痰之要革也欲下行加柏通己之類欲上行加升柴風之類又可加升提之革能使大便圓而小便長陳去白一錢半陽泡七次二錢苓一錢甘半錢右作一服加姜三斤

瓜痰壅盛喘咳加風卷星枳壳之類着白附天麻桑

熱痰脹喘加芩連梔姜滑膏壓之類

湿痰身重倦急加二木星之類

酒痰加葛枳橘麴芽之類

