

殺菌法明鑑

丁
止

⊗

i 40

F 4
1-126

4909
Ih-12
+

No. 2111
18. 40



富士川文庫
1321

○婦人上月經一

帶下三 附無子

○中胎前

惡阻二

腹痛四

胎腫六

子淋八

子懸十

子嗽十二

痢泄十四

胎肥十六

半產十八

難產廿

○下產後一

血暈二

兒枕痛四

崩漏二

胎動三

胎漏五

子煩七

轉胞九

子癇十一

傷寒十三

兒哭十五

腰痛十七

胎死十九

胎衣不下廿一

惡露不盡三

乍寒乍熱五

薄骨^六 浮腫^八 乳汁^十 附乳癖
 中風^{十一} 附瘰 身疼^{十四} 腰痛^{十六} 附尿教遺尿
 口鼻黑血^廿 咳嗽^{廿二} 虛汗^{廿四} 陰脫^{廿六} 斷產^{廿八} 產後不化之三證^卅
 瀉利^七 腹脹^九 乍見鬼神^{十一} 不語^{十三} 脚氣^{十五} 血崩^{十七} 大便秘^{十九} 喘急^{廿一} 頭痛^{廿三} 渴^{廿五} 玉門瘡腫^{廿七} 返魂丹^{廿九}

○小兒

一 拭穢 二 胸帶 三 胸風
 四 二便不通 五 破泡 六 貼額
 七 不飲乳 八 洗浴 九 護養
 十 胎驚 十一 自裏集香 十二 生黃
 十三 視手紋 十四 診脈 十五 觀形
 十六 審外證 十七 變蒸 十八 吐得
 十九 腹脹 二十 腹痛 廿一 痞癖
 廿二 夜啼 廿三 客忤 廿四 口瘡
 廿五 重舌 廿六 弄舌 廿七 吃泥
 廿八 滯頤 廿九 語遲 三十 行遲
 卅一 鶴節 卅二 脚拳 卅三 手拳
 卅四 顛陷 卅五 顛填 卅六 解顛
 卅七 龜胸 卅八 龜背 卅九 項軟
 四十 丁奚哺露 四十一 脫囊 四十二 脫肛
 四十三 駝病 四十四 盤腸內疝 四十五 齒不生

斷乳

誤吞諸物

諸熱證

驚風

附慢脾風 天動 發搐
馬脾風 喉風 癩證

疳證

痘疹

醫法明鑑卷之四

婦人科 月經一



傳。婦人百病皆自心生。如五志之火一起則心火亦從而燔。若夫經閉不通之證。先因心事不足。由是心血虧耗。故之血以歸肝。而血納之用已竭。又因因食少。肺金失所養。而氣滯不行。則無以滋腎。陰况月經全藉腎水。旋化腎水既乏。則經血日以乾涸。以致或先或後。淋漓無時。漸而至閉。塞不通。甚則為癥瘕。血膈勞極之證。

又如崩漏不止之證。先因心火亢甚。於是血脉泛溢。以致肝實而不納。血出納之道遂廢。厚水錯經妄行。無時而逆。溢漸而至崩中。不息甚則化為白濁白淫。血枯發熱勞極之証。

丹溪曰。經不通。或隨胎多產。傷血。或久患潮熱。銷血。或久盜汗。耗血。或脾胃不和。飲食少進。而不生血。或痢疾失血。治宜生血補血。除熱調胃。八劑。

或七情傷心，氣停結故血閉而不行，宜調心氣通。

心經使血生而經自行。

四物湯乃婦人眾疾之拯司也。

歸身 芎 白芍 熟地 右等分

經水常不及期而行者，血熱也，用生地加連、芩、香附。過期而來者，瘦人多，是血少，信歸地加香、甘、少佐以。

赤紅

人太驟是氣虛，挾痰阻升降，去地加參、香、甘、香附。

半陳

過期而紫黑成塊者，血熱也，多佐腹痛用生地加香附。

連延乳沒五錢 血淡色者，痰多血少也，用生地。

合二陳

經後將寒腹中痛者，血實也，一曰瘀血，許滯也，用生地。

加香附、赤紅、延、牡、連、木、菘。

經後過而腹中痛，綿綿無休息者，屬血虛，信歸地。

氣虛者加香、參、木、菘、寒者加乾姜。

胞盛，婦人或三二個月一行者，痰盛而脂閉，塞經。

脈去地芍，合導痰湯加連、香附二木。

經水適來適斷，往來寒熱如瘧者，合小柴胡。

調經散 經水或前或後或多或少或踰月不至或。

一月兩來皆可服。

歸身酒洗一門 吳茱擇法閉自者沸 桂各半

中湯泡參白芍 芎各一 膠各七 右作一服。

加薑三片。

月經先期而來者宜服。

歸身一 芎 膠 艾葉 甘 栝 知各半

連薑汁 白芍各八 生地 條芩 香附各一 右。

月經過期而不行者宜服。

歸身一 芎 桂各半 熟地 白芍 香附 蘓木

我各一 菘二十 紅三 甘五分 通八分 右。

柴胡調經湯 治經水不止其色鮮紅項痛身腫痛。

脊強

炙甘草 歸身 薑 各三 獨 薑 升 各半 柴 七

蒼 蒼 各一 紅 少許 右煎服取微汗立止

升陽舉經湯 治經水不止右尺脈按之空虛是氣血俱脫大寒之證輕者數疾舉指陰寒或淡皆陽脫之證陰火亦七見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之奉之升之此法乃升浮血氣補命門之下脫

桂 夏月不用 白芍 二分 紅 半分 細 三分 參 熟地

芎 各半 獨 黑附 炮 炙甘 各七 薑 葉

風 各一 木 歸 莖 柴 各一 桃 少許 右

膠艾湯 治勞傷氣血衝任虛損目水過多淋瀝不止

膠 芎 甘 炙 各 歸 艾 各 熟 地 白 芍 各

右一方加地榆者

升陽除濕湯 治月事不調或暴崩不止多下水漿

之物皆回飲食勞倦或回心氣不足致

歸 酒洗 獨 各半 蔓 七合 風 甘 升 葉

各一 柴 薑 蒼 莖 各一 右煎空心溫服少時以

早飯醒之可一服而已如灸足太陰經血海三七壯已

此藥乃從權之法為胃氣下陷而氣迫於下以救其

血之暴崩也住後必服參莖炙甘歸之類數服以補

當歸芍藥湯 治婦人經水漏下不止其色鮮紅特

值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆有汗身熱

柴 二分 甘 炙 生 地 各 三 春 一 不 陳 云 白 熟 地 各 五 蒼

香附一物丸 治經候不調血氣刺通脈脈膨脹頭

眩惡心

香附 去毛末醋浸一日夜 右為末醋糊丸如梧子每

服五十丸淡醋湯下

艾附丸 治證同前又崩漏帶下並宜治之

艾 醋 煎 艾 四 西 歸 二 兩 右 為 末 醋 糊 丸

林 曰 救 墮 胎 由 氣 不 升 降 胎 氣 不 固 宜 服 此

四製醋附丸

可一斤分四合醋酒塩水童便每一分各浸七日培氣右為末醋糊丸如桐子每服七十九空心酒下瘦人加澤蘭赤苓各三兩

溫經湯 治血海虛寒月水不調

歸芍芎芍桂枝各一參朮各三甘草各一右

加味烏沉湯 治經水欲來胸膈疼痛

芍炒去毛烏縮延各一炙二兩右加姜

一方歸末醋炒延紅沒各等右為末每服二合

空心酒下

桂枝桃仁湯 治月信前腹痛不可忍

枚芍生地各等右每服七合姜末煎服

八物湯 治經水欲行腹痛血淡也

四物湯加木槿延練子

逍遙散 治血虛煩熱月水不調胸膈脹痛痰嗽潮熱

歸炒白芍白芍木柴各一甘草各半右每服八合

生薑三片薄荷許煎服更加知地骨丸炒或加

苓湯加粉心煩加門鈴角嗽加烏梅欬五味

丹勝散 治婦人室女血閉不通五心煩熱

紅五赤勝歸尾各一赤五別研右為末每服二合溫

酒調下

萬病丸 治月經瘀閉繞臍痛

乾漆碎炒一時膝一兩酒浸右為末用生地黃汁入

二味末銀石器內慢火熬丸如桐子太每服三丸空

心酒下

滋血湯 治血熱氣虛經候澁滯不通肢體麻木

馬鞭荊牡赤芍枳桂歸芍各二烏梅一去核

右分二貼煎服至半月或一月經行病除

通經丸 治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

桂青太酒浸紙椒莪姜川烏炮去乾漆炒桐

歸去皮薤去根右等分為末將四分之二以末

醋熬成膏和餘藥末杵丸如梧子太每服二十九

空心淡醋湯下漸加至三四十丸溫酒亦可性畏漆

者入雞子清和藥

柴胡丁香湯 治婦人年三十歲左右臨經先腰痛
生地五分 丁香四分 歸身風 各一分 柴一分
蜈一枚 右

烏菜湯 治婦人血海疼痛

歸一各 甘木 各五香 烏一各半 芩二各 右

增味四物湯 治婦人血積血痕

歸芎 白芍 熟地 棧 乾漆 炒烟尽 另研 桂枝 右等

琥珀丸 治婦人血痕小腹腰背相引而痛

琥珀 川烏 炮去 皮 膠 酒浸 鱉 醋炙 莪 煨

朴製歸 酒浸各 木桂 澤蘭葉 麝 各半 右等

承酒糊丸 如桐子大每服七十九丸空心溫酒米湯下

無極散一名通經甘露散一名四頂丹治經血不通

崩漏腸風帶下血風五淋產後積血

錦文大黃一斤淨分四處

四兩 用紅花四兩入水取汁浸 四兩 用童便入搗三不浸大黃
四兩 大黃一日不用紅花晒乾 四兩 一日取出晒乾不用便

四兩 用好酒浸一日令軟切如杏核太晒半乾

四兩 同者用四兩入酒醋內
浸一日不用當用晒乾

右四分同為一處入南木香一兩百草霜五各為末

每服三不酒空心調下又煉蜜丸如桐子大每服

三四十九丸空心溫酒下即四頂丹也允修合用六參

傳 擇一日

經不通馬鞭草杆汁熬膏為丸或燒存性為丸歸紅

煎湯下

祖傳批奴飲子 治婦人室女月經不通漸成脹滿

批奴 批樹上嫩批氣打不 批鼠糞 即雄鼠糞也
落者冬月及正月收 兩頭尖者是

延桂 芩 芩仁 去皮尖 另研 右等分

細末每服三不空心溫酒調下

一崩漏

崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛二脈為經

脈之海若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約

制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣

血之藥參養脾胃微加鎮心藥

傳

掠血地黄湯 血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相

火故血走而崩也此陽主之

芩 荊穗 蔓 各一分 栝 知葉 細芎 各二分

連 薑 柴 升 風 各三分 生地 芎 各半 冬 甘 一不

紅 許 右

丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲

食不節所得覺暗下如水冷白芎及白滑之物間有

如屋漏水

熟地 白芎 各三分 芎 丁香 各四分 膠珠 生艾葉 一湯不

右芎地丁香別為細末歸芎艾各細切連前共六味

入水五大盞煎至一盞半去粗入膠再煎空心熱服

治血崩不止蒼耳中燒存性好酒調服立止或入四

物湯中亦可

老婦崩血久不止諸藥不効橡牙蒼耳根二物燒存

性用四物湯加白芷茅花乾薑煎湯調服効

林 加味四物湯 治血崩

芎 歸 生地 白芎 膠 艾葉 右

一方用熟地加薑

一方治崩中不止棕櫚 絲瓜 右為末每服

二不塩酒或塩湯食前調下 又塩梅燒存性為末

空心米飲下

五倍子散 治血崩帶下

艾葉 一兩 五倍 二兩炒 烏梅 五枚 芎 五不 右為

末湯下

伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛經血崩下或如

豆汁或五色相雜肝脈冷痛久不止虛煩驚悸

伏龍 赤石 各一兩 熟地 一宿 艾葉 二兩 甘草 各

桂 各五不 歸 炒 薑 炮 各七 芎 三兩 門 一兩半

右每服七不末三枚去核煎服

當歸地黄丸 治產後所下過多及崩中傷損虛弱

艾 續 薑 歸 膠 各三 附 地 五兩 右為

手煉蜜丸如桐子大每服四五十九空心溫酒下

白芷湯 以白芷煎湯調百中霜甚者棕灰

後四物加干姜調理因寒用干姜因熱用苓因勞參苓

三 帶下

傳 科

帶下風氣寒熱所傷入胞門或中經脈流轉臟腑而發

帶下是濕熱白屬氣赤屬血二陳加蒼木為主氣

虛入參木血虛入苦楝

帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之二陳加二

木升柴仍用瓦礫子以燥其濕痰

肥人帶下多是濕痰瘦人少有此病有者是熱

當歸附子湯 治赤白帶下臍下冷痛

歸四合 炒鹽三合 蛭梢 升 各五 甘 各七 附炮 各

右煎服或酒麩糊丸亦可

延胡若練湯 治臍下痛陰冷大寒白帶下

栝一分 延練子 各二分 附炮 桂 各三 炙甘 五分

熟地 一不 右

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒證

栝用引 知 各五 桂 五合 附炮 三 右如少食常飽脹

中滿悶加白芍 半不 不思飲食加五味 二十箇如煩

惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加蒼一不 參 七分

炙甘 升 各半 系

益母丸 治赤白帶惡露時下不止又治久無子常服

益母草五月採陰乾為末煉蜜丸如彈子太每服一

丸用熱酒加童便化下兼氣者木香湯化下

苦練丸 治赤白帶下最妙

練碎酒浸 茴炒 歸 各等 青末酒糊丸如梧子太每

服五十九丸空心溫酒送下

芍藥散 治赤白帶下臍腹痛神效

白芍 二兩 乾姜 一兩 右為末微炒黃色每服二不

空心臨卧未飲下半月效

替灸丸 治久冷赤白帶下腹痛面色痿黃四肢無

力久無子息

苓艾葉各八 莎歸各四 吳茱炒三 芎白芎
右用醋五升沙鍋煮乾為末醋糊丸如梧子太每服
五十九空心醋湯下自三服

當歸丸 治帶下不止腹痛四肢煩不食羸瘦

歸酒浸 赤芍 白芍 蛎粉 熟地膠蛤粉炒 續酒浸
地榆五升

右為末醋糊丸如桐子太每服五十九空心米湯下
如聖母 治赤白帶下月經不來

枯瓦 蛇床 右等分為末醋糊丸如彈子太乾臙脂
為衣綿果內陰中熱極再換

婦寶歸脾丸 治赤白帶下子宮虛冷
四物湯加苾 胡連 柴胡煨各 莎牛行醋浸一
右為末醋糊丸如桐子太每服五十九空心醋湯下

琥珀丸 治婦人血風虛帶上熱下冷月水不調肌肉
黃瘦腹痛或有氣塊攻冲

琥珀 木 甘 風 樛 各四 棧 炮 薑 炮 桂各五 木

柴參各二 青 吳茱炒 蝟炒 附 炮 苾 草 葱 煨
赤芍 栝葉各三 朮去皮 板醋炙 鱉醋炙 天三升

右為末煉蜜丸如桐子太每服二十九空心酒下午
前至晚更進服如覺熱晚不須服如腹內積塊攻築

驚 飛 樛 棧 各加一倍

加味四七湯 治婦人小便不頻甚者陰戶疼痛
半一兩 朴 赤苓各五 蘊 二 升 甘 二 升 莎炒五升

右分四貼 薑 五片 煎去粗加琥珀末一升調服
墮胎 烏金散 治婦人久無子息及數墮胎皆因衝任之脉

宿挾痰經水不時暴下月內再行或崩漏帶下胸下
冷痛

敗棕 烏梅 乾薑三味並燒存性 右為末烏梅湯調下
訖丸 治衝任虛寒胎孕不成或損胎去

澤蘭葉 木各一 桂 薑炮各 熟地歸酒浸各
芎 解酒洗 白芍 牡 延各二 右為末醋煮麩

糊丸如桐子太每服五十九空心酒下

無子。秦桂丸 治婦人無子

芫桂 仲炒風朴 各七末 附地 白朮 各一 滕白微

生乾姜 沙參 各五 參 西 細 二兩 右為末煉蜜

丸如桐子太每服五十九丸空心醋湯下米飲亦可未効

加丸數已覺有娠便不可服

婦人科 胎前

傳

婦人無子者多由血少俗醫悉謂子宮虛冷以辛

熱之藥煎熬散貯血氣沸騰福不旋踵

瘦怯婦人子宮乾宜滋陰養血四物加芍苓之類

肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰星半

芎 滑風 卷 一平有蒼不 或導痰湯之類

。隨胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳

一婦有胎即墮其脈尤大無力重取則濡乃血少也

。固胎飲

熟地 歸參 白芍 木芍 陳甘 桑寄生 少加連柏

入糯米五七十粒煎服血虛不安者加膠珠胎氣痛者加

。母胎飲 胎氣不安或脈微痛或腰疼或飲食不美

宜服至五六箇月常服數貼其好

本師 白芍 熟地 各一 參 芍 條 苓 陳 各半 甘 縮

蘊 各三 右作一服加生薑三片

安胎丸

本條芩麩抄右等分為末粥丸每服五十九清米湯下條芩白朮乃安胎之聖藥俗以芩為寒不用殊不知胎孕宜清熱養血芩用細粒沉實者縮砂安胎以止痛行氣但縮砂性八九個月內不宜多用懷妊嗜酸物乃肝藏止能養胎而虛也

二傳

一惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用二陳之類以木九服一日肥人痰瘦人熱

白行

湯泡七次透過心

生薑各一 苓七分

熟地陳桔

參全覆花不用

芍甘芎各半

右方有蕪細各半

疾橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘紅苓各一 門木朴甘各半

右作一服加生薑

林

加味二陳湯治受胎二三月月吐擇食因中脘宿

有痰飲

陳白苓各四 半洗三 朮二不四 甘各一 右分二貼加

姜五片烏梅一筒有娠動忌辛夏熱則用姜製其毒

服之利痰逐飲必見功效

三傳

一胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類

小膠艾湯治妊婦因願小胎動不安或胎搶上逼心

腹痛下血 膠珠一西 艾葉二西 右

膠艾湯 不同月數安胎 熟地艾芎甘芎膠各半 眷二分 右

胎動沖心煩悶欲死安胎止痛

歸酒洗芎參膠抄甘各一西 葱白切一分 右

因仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

芎一西 為末每服一匕連進三服死胎即下

如聖散治妊娠腹痛胎動不安

鯉魚皮 歸熟地 膠珠 白芎 芎 續酒浸

甘各一分 右每服四分每三片芎麻根半不煎服

一方有乾薑竹茹无續斷

杜仲丸 妊娠三月胎動不安者下血腹痛蓋由子宮

久虛致冷胎墮宜服此以養胎

仲去皮薑汁炒去系

續酒浸各一兩

右為末煮東肉丸如梧子大

每服三五十九空心米飲下

一方苓朮歸身縮炒各二斤右煎服

加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏下或胎上刺心短

氣妊婦氣血弱者宜服此免有損墮之患

參 菖 芎 芎 熟地 續 側柏 膠蛤粉炒 甘 芩 歸

右等分每貼七名薑三片漏下不止加艾葉

四 桂

一胎動腹痛皆因飲食冷熱或因交合傷犯其位多吐

氣不調和變成漏胎則難安矣

當歸芍藥散 治妊娠腹中疝痛心下急滿

歸 苓 朮 各一斤 芎 澤 各二斤 白芍 四斤 右煎服為

末酒調服亦可如胎動口噤唇青下痢加減安胎飲加

熟艾酒煎

大龍散 治妊娠心氣痛

艾五斤不 苗炒 練肉炒各五斤 右煎服

通氣散 治妊娠腰痛不可忍

補骨瓦上炒香 右為末罇胡荽仁一个空心溫酒調下二

當歸地黃湯 治胎痛

歸 一 斤 熟地 一 斤 右

妊婦偶有所傷腹痛不安或後高墮下胎痛及下血者

縮砂和皮略炒分令十合焦黑去皮為末熱酒調服或

米飲或艾湯溫湯皆可如覺胎中熱其胎即安此方

即驗凡常服安胎易產

妊娠四五个月忽心腹疝痛

大棗十四枚 鹽一斤炒 右為末一搥許酒調服立愈

妊娠二三月目忽心腹疝痛不安用

歸 三 斤 膠 炒 甘 芩 各 二 斤 葱 四 斤 右

治妊娠心腹大痛氣欲絕

芎 歸 苓 朮 各 一 斤 右

五倍

一胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱四物加膠木縮炒條芩炒香附炒糯米煎服

治胎漏下血木二兩條芩三錢縮炒膠珠各

右為末每服二錢煎艾湯調服水煎亦可

又方枳炒芩各半木一兩水煎食前溫服

治妊娠下血不止胎上冲心四肢厥冷同前飲死

膠炒艾各一茹如芩白砂蜜二合右用水二升煎

至一升入蜜更煎二三沸分二服

治妊娠下血如月信來者胞乾非特損子亦已損母

熟地二兩姜炮各右為末每服三錢一日夜三四服

加味四物湯 治妊娠下血不止

本方加艾葉三十片膠珠一兩身梅肉少許水煎熱服

產寄生散 治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生 歸酒洗芎酒洗芍酒洗膠炒神木各一

參各半右作一服加生薑三片

芎麻湯報治胎無故下血腹痛或下黃汁如漆或如豆汁

野苧根四兩金五兩銀五兩右分二貼酒水各一盞煎服

黃芩湯 治胎漏不安 芩木歸酒洗縮各等分煎服

治胎動漏血產門痛 黃連為末每服一錢溫酒空心下

急救方 治漏胎下血不止胎乾子母俱死

生地黃汁一升酒五合 煎分三服如無生者用乾者為末

酒調二三合食前服

保氣散 治頗小傷胎漏血安胎寬氣進食瘦胎

版甘一穗 縮炒枳炒桔炒莎炒右等分煎服

一胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕

多或因梳子合炒為末末湯調下丸服亦可

治妊娠脚腫痛 白朮木各一薑甘各一右水煎

木通散 治妊娠身浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫

通薔各一桑各一蘊各一枳炒條芩各半

木訶皮各三右作一服加生薑三片

全生白朮散 治妊娠面目虛浮肢體腫脹

木二兩生薑皮 版陳各半芩各半右為末每服二錢末

飲調下二市用苓皮赤白連水

鯉魚湯 治妊娠脹滿或通身浮腫不便不利

歸白芍各一 白苓一不 木二不 橘紅半不 鯉魚一尾不

右作一服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞

半生姜七片煎至一盞空心服如水未盡再合劑服之

澤溲散 治妊娠氣壅身體肢浮腫喘急小便澀澀子

澤桑根 梓通 赤苓各等分 右每服四不加 姜五片

防已湯 治妊娠脾胃虛弱身浮腫心脈脹滿喘促利

已二不 桑 赤苓 蕪各三不 木九分 右分二貼加 姜三片

妊娠止兩脚浮腫為白皺脚遍身腫滿心胸氣脹為白

胎水鯉魚湯皆治之

平胃散 治皺脚加姜棗三 蘊葉煎服

赤小豆湯 治手脚腫 小豆 高陸各等 煎服 忌食鹽

八正散 治妊娠心氣壅手足浮

車瞿 薑 滑 甘 枳 通 太 麩 粳 粳 各 等 分 入 苗 一 撮

七傳 一子煩謂妊娠苦煩悶不安

門苓風 知各一 右水煎入竹瀝三匙服一 方去知

犀角散 治子煩 犀地骨 條苓 門赤苓各一

寸半不 右水煎入竹瀝一合溫服

當歸飲 治子煩 歸一不 芎 膠 豉 桑 寄各七

葱七葉 右

麥門冬湯 治子煩 門風 白苓各四 參二不 右加

姜竹葉

知母飲 治妊娠心脾壅熱口熱渴苦煩悶

赤苓 苓 葛各二 知 門 甘各一 桑半不

右入竹瀝

一方去葛 知加地骨 犀 葛各一不

歸涼即命散 治妊娠面赤舌苦舌乾心煩肢脹或二便

閉澀皆因醉酒或食生菜雜魚煎燒熱毒物所致

芎 苳 根 芎 門 歸 木各二 糯 粳 甘半不 右煎

八林 一子淋 妊娠酒色過度或飲食積熱致水道閉澀名曰子淋

安樂散 門 通 中 滑各一 歸兩得 燈 心 甘 參各五

右為末每服三三不麥門冬煎湯空心服

。橫柳散 妊娠淋瀝小便不通作轉胎治不如此方屢效

。換赤芍 等分 右煎服應男女血淋水道澀痛皆效

傳 地膚子湯 治子淋小便澀數

。膚車 各一 知炒 苓 赤苓 白芍 枳 各七 升 甘 通 各三 右

。又方地膚子 以水四升煮取二升分三服或新取地膚

。中搗自然汁服亦可不掬治子淋凡淋閉皆效

。冬麥子散 治子淋服疼胎動不安

。麥炒 柴 桑 赤苓 赤芍 歸 等分 每服四不入芍白芍

。車前散 治子淋或尿不通下焦有熱

。換通陳 去白 赤苓 車 赤芍 歸 滑 石 等 右等分煎服

。藥 蠅 蛸 散 治妊娠小便不禁

。蠅 蛸 各 為末每服二不空心用米飲下

。白微散 治妊娠遺尿不知出

。白微 白芍 等分 為末每服三不食前酒調服

。大腹皮散 治妊娠大小便赤澀

。枳炒 腹 甘 各 赤苓 二兩 右為末每服三不葱白湯下

九 傳 一轉胞之證方用滑利鮮有效丹漢曰胞不自轉為胎

。所歷轉在一邊系了度不通耳回物加參木陳半甘

。加姜煎服

十 母 一子懸 胎氣不和凌志眩脹滿疼痛謂之子懸

。紫 蘗 飲 芍 朮 白芍 陳 蘗 歸 酒浸各 參 甘

。右分二貼姜五片葱一根

。保 嬰 散 治胎動心悶唇青口乾上衝下築手足厥冷

。歸 參 各一 甘 二不 右水煎又膠珠二兩葱二握再煎溫服

。一 方 治 妊 娠 身 痛 或 衝 心 致 死 不 能 食

。木 五兩 芍 四兩 苓 二兩 右水煎

十一 母 一子痲 妊娠中風頭項強直筋脈事急言語蹇澁痰涎

。壅盛或發搐不省人事名曰子痲

。鈴 羊 角 散 治妊娠中風子痲

。鈴 鑄 獨 酸 炒 五加 各一 薏 風 歸 酒浸 芍 神

。杏 各一不 木 甘 各七 右分二貼入姜三片

獨治防風湯治妊娠角弓及張口噤謂之風痙又曰子痙

麻去毒 風獨各一不 桂 珍鏡 升 寸各 酸棗炒

芫各八 芎 歸 杏各六 右每服一不姜四片竹瀝合水煎

防風茵陳湯治妊娠中風腰背強直時及張

風 芎 芎 生地各二 杏 麻去毒各 桂 獨 已 甘

各一不右

葛根湯治妊娠臨月發風狂暈悶不省人言吐逆醒後

後發謂之子痙

貝 芎 牡 已 風 歸 芎 桂 苓 澤各半 甘各二

獨 膏 參各一 右煎服則母令久易產未臨月者升麻代之

防已湯治妊娠中風口噤四肢強直角弓及張

已五不 羗一不 右為末別用黑豆一合炒黑投好酒中沸

定去三調葉末灌之稍醒再灌

十二子嗽 妊娠感風寒咳嗽不已謂之子嗽

天門冬 飲 天門 芫 芎 知去毛 桑蜜炙各 五味 桔各半

右水煎嗽血者加膠半不 大便澁加苦苧蘆半不

百合散 治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合 芫 芎 麥 門 桔 桑各一 甘半 茹一不

右水煎入蜜半匙再煎一二沸去粗服

治妊娠咳嗽不止胎動不安

杏 甘 桑各一 芫 天門各一 桔三合 茹一塊 右水煎入蜜

百合散 治風壅咳嗽痰多心胸滿悶

百合 芫 芎 貝 白 芎 前 赤 苓 桔炒各 甘各 右

右水煎入蜜各四 桑各 杏去皮 甘各 茹一塊 右

十三傷寒

芍藥散 治妊娠感風寒壯熱頭目眩運

芍 藥 白 芍 木 門 陳 葛各六 甘三合 右入姜 葱三寸

升麻六物湯 治妊娠七月傷寒壯熱或發赤斑或黑瀉血

升二不 梔 杏大 寸少 草 寸各一 右加葱三寸

妊娠傷寒百節痛壯熱不急治諸胎

柴 葛 知 高 芎各六 大 青 升各八 梔 二 葱十四 右取煎

傷寒安胎木苓各分瓦上 右每服三不加姜三片水煎

治胎傷寒 柴^{各七} 前歸^{各七} 參^{各四} 芍生地^{各六}

甘^三 右作一服加薑三片葱三莖

婦 治胎傷寒增寒發熱葱^{十莖} 生薑^{二兩}

右煎連服取汗愈

標 胎散治胎傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎

蛤粉^五 嫩捲荷葉^{培乳} 右為末每服一茶匙少許水

調服一方搗家園生薑汁服

治胎寒熱心驚去半夏最效

熱病護方 乾浮萍 朴硝^{另研} 太炒 蛤粉炒 藍根

右等分為末水調三不貼臍上安胎解煩極效

一方伏龍肝末水調塗臍下乾則換用井中泥塗臍下可

十四 赤白痢并泄瀉

佛 當歸芍藥湯 治胎下痢赤白腹痛

白芍^一 歸^一 白苓澤木^{各半} 條苓^{各半} 甘連木樨^{各三}

右如白痢腹痛甚者恐有寒去苓連加干姜^三

芎朮香連丸治證同前

膠珠木^{縮炒} 芎^{各五} 乳木^{各二} 枳^炮 姜^連 一兩葉黃

右為末醋糊丸如梧子大每服三十九丸白湯下

治胎泄瀉兩腹虛鳴臍下冷痛由食生冷及薑風取涼

訶皮櫻木^{各一} 陳良炒木^{白芍} 兩炒炙甘^{各半}

十五 葱^{麩裏環} 右加生薑五片

傷 一兒在腹中叫哭臍帶上疔瘡乃兒口中含者因胎婦

登高取物脫兒口以此作聲令胎婦曲腰向地拾物使

兒得冷口口中即止

用多年空屋下鼠穴中土塊令胎婦含之即止

又方用黃連三五不濃煎汁時時呷下自止

一胎肥身居富貴口欲甘肥聚樂不常食物無度即飽

便時致令胞胎肥厚根堅牢行動氣急蓋緣不曾

預服瘦胎之藥致於臨產必難生八月可服百發散

血餘^{即髮及一不} 右為末每服三不水煎服

備胎易產救生散 安胎益氣易產令子緊小令母無病

參訶環取麥蘗炒木麴炒陳炒右為末每服二不煎服

枳殼散散瘦胎易產抑氣枳麴炒右為末湯

湯調食前服孕七月便宜服大便同滋加防風體弱加

軟勝方寸冬生薑烏梅等分每貼五不水前食前

服便令腰膝軟易為生養

丹溪束胎丸七八個月內服之

芩炒夏木二兩苓七不陳三兩不右為末粥丸如梧

桐子大每服三四十九丸白湯下

丹溪達生散孕八九個月內服十數貼易產胎少痛

腹原本三不恐太多今用一不先而參陳連莖葉白芍

木各一寸冬二不右作一服外入黃楊腦七不食少胎

須用葱五莖夏加芩連五味春加芎風秋加澤冬加縮

氣上通心加蘇地性急加柴多怒加芩食少加縮麴湯加

門茶能食加黃楊腦此物長瘦有痰加半茶

丹溪臨月用以養胎方芎芩苓陳木各一不

芩半寸冬右水煎調益元散一不脈虛者加參七合

仲景當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服

芎芩芍木條苓右芩分為末每服二不溫酒

或湯調下

局方枳殼散妊娠八九個月內胎氣壅滿常宜服

之滑胎易產

枳五兩甘冬一莎一兩右為末每服二不空心湯點

服之方加糯米炒如妊婦稍弱者單衣胎寒胎痛者

胎弱多驚者加芎一兩木半兩

一腰痛腎主腰因勞損其經虛風冷乘之則腰痛甚

則胎墮

芎三兩甘一兩右水煎入膠珠二兩葱白一升再煎

一疝大黑豆二合以酒煮熟去豆空心頓服

娠娠腰痛如折不轉側鹿角右大塊令酒淨再

燒再淨以碎為度細末酒調服

通氣散治娠娠腰痛不可忍

青嫩不老丸 治胃氣虛弱風冷寒之脾胃痛

胡朮仁 去皮二 蒜 研膏 破故 酒浸炒 仲 去皮其汁

右為末蒜膏丸如梧子太每服五十九空醋湯下

十八 升

飽食觸熱冒寒疲極勞傷目眩未固便隨露

芎藭補中湯 養新血去瘀血補虛扶元

姜 炮 膠 蛤粉 芎 五味 各一 不 春 蜜水 歸 酒浸 木 赤芍

各一 不 木 參 仲 炒去系 甘 各 右

奪命丸 治小產下血死情寒手指唇口爪甲青黑面色

黃黑或上搶心悶欬死冷汗出或食毒物傷胎氣下血不

已胎未損服之可安已死服之可下 牡白芍 桂 朮 炒去

赤芍 各 右為末煉蜜丸如彈子太每服一丸細嚼醋湯下

連進兩服不效加三丸

安胎湯 治胎氣不固時帶小產宜預服此以固胎元

四物加膠珠 莎木 條芩 縮 糯米 桑寄

治小產後心脈疼痛 芎 歸 熟地 白芍 各一 延 七

芩 紅 各三分 莎 牡 青 炒 澤 蘭 各十分 右水一盞半

童便酒各半盞煎至一盞酒服

治小產後下血不止 參 歸 芩 不 白 芍 芎 艾 葉

甘 多 膠 炒 青 莎 縮 右等分煎服

海胎散 治胎寒脈痛胎熱多驚腰痛脈滿胞急卒有斯下

或因頓仆或食毒物或感冒時疾致傷胎

芎 根 熟地 三 糯米 一 右作一服生薑三片大棗一枚

更加金銀三五分同煎

孕而服毒末致胎牙關緊急強直自汗身微振掌中風相

似直脈白扁豆一味生者新汲水調灌之清米飲亦可

一胎死母因患熱病胎極重其胎是以致死緣兒死身冷

不覺自出醫家以真神散治之恐本方內有姜附桂之大熱豈

宜病熱之人宜以草麻子朴硝散治之散之劑主對

下胎死草麻子搗碎敷脚心即下如子腸隨下急去脚心却敷

頂心即收

朴硝散下死胎取胎衣朴硝末每服二三不溫童便調服

婦
一五雄鼠屎一枚水三升煮一升去粗取汁作粥食之即下
損胎不特病重所致或因傾仆或因驚恐或失口日崩壞
胎最多其惟青知子死

一石治熱病胎死是即馬神散也

桂歸 白芍 甘草 生地 各二兩 黑豆 炒去皮 附地 去脂 二兩 二分

右為末空心酒調下 有無附子有蒲黃

一五下熱病胎死紅一味酒水煎飲二三盞

備 催生散 治熱病胎死身冷唇青不吐自出

蒼 一石 桔 半石 橘紅 三分 芒桂 甘 各一分 歸 酒洗 姜 炮

朴芍 半石 芎 枳 炒各二 木杏 炒各 一分

右作一服 姜三片末一枚

番桂散 下胎死 麝 半石 桂 三石 右作一服 溫酒調下

常歸湯 一名佛 治妊婦因事跌仆子死腹中惡露下

疼痛不已口噤欲絕用此藥探之 子死腹中立便下若腹

痛隨出子母俱安又治臨產難生胞衣未下及產後血暈一
切胎前產後危急並皆治之

婦 酒洗 芎 一石 右作四服 用水一盞煎水均氣投酒一盞半煎

五沸溫服如口噤灌之如人行五里許再灌至四服有

治橫逆不順子死腹中 伏龍肝 為末 溫酒調下 二不其兒

頭戴至而出甚驗

治產難數日死腹中不出母氣欲絕

瞿 二兩 通草 三兩 桂 三兩 膝 四兩 榆白 四兩 右無榆白天花粉 四兩 能墮胎

右水九升煎取三升去粗分三服頓飲即下

治子死腹中不出 用黃牯中屎塗母腹上立出

云牛屎炒令大熱入醋半盞以青布包於母臍上下尉之立下

一難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有因

八九個月內不能謹愍者

又曰臨食倉惶用力失宜遂有難產之危

催生散 白芷 炒黑 百草霜 白滑石 各等 為末 芎歸

湯調下 二三石

神應散 治難產及橫逆皆因坐草太早努力過多兒

轉未速或以破水先下其血必乾若先露手謂之橫或先

露足謂之道此菜存因其血脈之如魚得水

皂莢百草霜 右等分為末童便末醋各半煮調菜三

冬沸湯泡溫服分二次服之畢又用蜀葵子四十九粒滑石

末三冬頂流水煎湯調服如人行五里即生

加味芎歸湯 治產難三五日不出

芎歸 各二兩 乾龜殼 一個酥炙 婦人髮 一握燒 右為末每服

三冬水一盞煎七分服約行五里生胎死胎皆可下

催生鉛母 治橫生逆產

黑鉛 一兩 右以此火土鎔化投入水銀二兩急攪結成砂

子傾出用熟絹紐作丸子如棗豆大臨產以香水送下立產

如神母 治難產 巴三枚 草麻七枚各 研入麝少許捏作

餅子貼臍須臾子便分張

無名散 治難產及胞衣不下臨月預服之則子易生

歸 面洗 芎 白芍 各七分 木 甘各五分 枳 殼炒 乳 各一兩

血餘灰右為末分作三服水一盞煎八分去粗溫服

床麩散 治孕婦欲產未產之時忽然暈倒不省人事

木 麩炒 陳 玄白 麥女藥 炒 蒼生 薑 切碎 膠炒 成珠

白芍 各半 糯米 令 芎 根二兩 甘三合 右作一服水一盞半煎

至一盞去粗灌下未醒再服

灸法 治難產及胞衣不下急於產母右腳小指尖頭上灸

三壯炷如小麥大立產

又灸至陰二穴在足小指外側去爪甲如韭葉灸三壯

又灸大衝二穴在足大指本節後二寸骨節間灸三壯 肝經命也

胞漿先破下多胎乾先与四物湯養血氣次濃煎葱湯放

冷洗產戶令氣上下通暢仍滑石末蜜調塗產戶重灸服

催生菜乳香末蜜丸溫湯下佳

傳 若手足先露者用細鐵刺兒手足心三分深三四刺之以塩塗其

上輕送兒兒得痛驚轉一縮即頂生

或兒脚先下急以塩塗兒脚底又可急搔之併以塩摩母腋上

則正生

標 令易產以春杆頭細糠燒末服方寸匕

又皂甲燒末滴服方寸匕 又方用鱉甲

治產後惡血冲心胎衣不下腹中血塊
錦文大黃為末米醋熬成膏丸如彈子太每服一丸湯化
開服溫童便調更好

二方酸米醋七升沙鍋內慢火熬至一升入百草霜末三兩黃
末二兩熬成膏丸如彈子太每服一丸溫童便化開服治胎衣
不下惡露不行腹中血塊名匪神丸可代匪神散用大効

巨退飲治胎衣不下

蛇退一條 蚕退紙 一方 蟬退四十 右薤瓶盛燒存性
全者 細研順流水調服立下

婦人科下產後一

丹溪曰凡產前當清熱涼血為主產後宜大補氣血為
要雖有雜証以藥治之此万世不易之論也
新產不可用芍藥以其酸寒能代發生之氣十日之內
只以芍藥易芍如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但
以酒炒不炒

產後之諸疾或乍寒乍熱似瘧或大熱頭疼体痛如傷
寒或卒中口噤如瘡如痲或角弓及張或妄言見鬼
心神惶惑或耳目口鼻忽覺黑氣如烟薰之狀或
脈中脈痛綿不絕已上諸証若指惡露未盡即是勞
傷血氣大虛之論

產後補虛用參朮芪陳歸身尾芎其熱自除常則於此 炙甘草如發熱
輒則加茯苓滑石其熱自除常則於此 或大熱用干薑何也曰此熱非有餘
之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾毒能入肺分利肺氣又能
入肝分引衆業生血然必与補陰藥同用之此造化之妙

二 產後血暈因氣血俱虛痰火沉上作暈陳搏 隨

氣血加減殊妙安神丸亦可服以表門冬湯下

血暈者因產時下血過多血氣虛極致暈同其則昏
不知人氣息欲絕若作暗風治之誠為認

婦 血暈由敗血入肝經眼見黑花頭目旋暈甚則昏不知人
其因有三一有用思使力過多為暈者二有下血多為暈者
三有下血少為暈者

生子了燒硬炭或江中黃石冷通赤置器於床前以醋沃
之得醋氣除血暈產後一臈時作妙一臈者謂一七日也

一法燒干漆令烟濃薰母面

二方治產後血暈危困 婦一分赤芍二分生地一分

右水煎數沸溫服如煩熱去婦入童便妙

清魂散 治產後氣虛不安血隨氣上達亂心神故眼
前生花甚則不知入口噤氣冷

澤蘭葉 參各一分 荊 二兩 芎 半兩 右細末溫酒熱湯調
灌即醒二方有 傳 每服二不溫酒入童便調下

儲 產後血暈用非葉細切盛於甌瓶中以滾醋浸之急封

又五用鹿角一兩燒存性出小毒為末而調灌下即醒

瓶口以瓶嘴納產婦鼻中即醒

二方紅花 二兩 為末分二貼酒二盞煎一盞溫服

芎藭湯 治產後去血過多及傷胎去血多昏暈
婦身芎 右等分每服五不水二盞煎八分服

二方治產後血暈沖心悶絕 五灵脂半生半炒 為末
作一服酒調下口噤者灌之湯調亦可 二方加荊穗焙末等分

牡丹皮散 治產後血隨熱上充心昏暈悶絕

牡太 蕙 芩 各三 冬瓜子 木托去皮末 右分二貼水盞半
煎至一盞合芒每煎一二沸去粗服口噤灌之

奇効方 治產後血上心已死

真前合 燒存性為末溫米醋調灌下立活

蒲黃散 治產後惡露不挾血止搶心煩悶昏迷或狂言

乾荷葉各 延壯 生地甘各名 蒲生 右水煎以蜜少許服

凡產婦昏暈敗血上沖者牡丹葉蒲黃散奇効方五灵脂
紅花為主對 若血虛者清魂湯芎藭湯為主對

其餘韭菜熏法等及返魂丹可通用也

三 一產後惡露不尽腹痛

雖惡露方尽或感邪或喜怒斬然而止餘血停滯故腹痛

一方治惡露不尽腹痛往來胸滿少氣

澤蘭熬生乾地各三芍各三生薑各十甘七分棗十四

右水煎溫服欬死逢身得差

一方治產後下血不尽腹內堅痛不可忍

歸芍各三韭百二右煎服未差加大黃三兩

一方治產後惡物不尽腹內疝痛

生乾地并累炒生薑如蠅頭大右細末薑酒調下

傳 因積血而刺痛者宜飛紅歸之類

丹溪治套曰惡露不尽作痛四物湯調香附五升末服甚者加

惡血不盡發寒熱成癥瘕者四物加積莪乳沒香附木

紅五靈乾漆之類

產後腹痛不息四物加烏朮香附桂良陳童便和

醋煎服甚効

不調赤白帶下腹痛 歸赤芍各四杜桂炒

延炒各右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸或酒或米湯下

定痛散 治產後惡血不尽腹中作痛

歸芍各三桂一右作服酒水合一薑半姜五片煎服

理神散 治惡露不尽血氣攻脹痛及血運等証

黑豆炒半升熟地酒浸歸酒浸桂姜炮炙白芍

蒲各四一方無蒲有附右為末每服二小童便和酒調服

治產後腹痛鯉魚鱗燒灰酒調服

治產後血不尽心中疼悶荷葉熬香末煎水下方寸匕

治產後腹中絞痛末桂溫酒方寸匕日二服

治腹痛非芍藥不可雖新產亦可用但酒炒

產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血

一兒枕痛者產母胎中宿有血塊產時其血破散每兒俱

下則無害若產婦蔽府風冷血凝滯在小腹則結疼名曰兒

一方治兒枕腹痛 延歸各三琥蒲炒各芍半桂二

紅二右為末童便和酒調下

一五 芎歸膏 干漆 碎熬 桂甘 右水煎

失笑散 治產後心脈絞痛欲死及兒枕痛

傳 蒲炒 五苓 各等 右為末醋調二不熬或薑湯化服之

四物黃散 治產後血塊作痛

歸炒 芎炒 熟地 白芍 炒各 蒲炒二 右為末每服

二不空心溫酒調下

四神散 治產後留血不消作塊疼痛下利不止

歸善炮 芎 赤芍 右等分為末每服三不溫酒調下

治兒枕痛 伏龍肝 為末溫酒調二不服効

產後消血塊 滑 沒 二不 血竭 二不如無 牡丹代之

一產後乍寒乍熱 附瘕

因產帝傷血氣陰陽互相乘為乍寒乍熱亦有惡露下

少留滯經絡亦令人寒熱必小脈急痛

陰陽不和 增損四物湯 敗血停留奪命母

增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒乍熱

歸芎 參 善 炮 甘 各 白芍 各等 右煎服

奪命母 在胎衣不下之內 如無奪命母可用五積散加醋

前服或黑神散

大調經散 治產後血虛惡露未盡不調陰陽相乘

增寒發熱或自汗腫滿皆血氣未平所致

大豆 炒去皮 神 一兩 瓊 一不 右為末每服三不濃煎

紫蘇黑豆湯 空心調服喘急煩悶小便不利亦効

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯心胸煩悶

知四不 赤芍 苓 三不 桂 一不 甘 各 一 右煎服 或四物湯加柴

小柴胡湯 加生地黃 治產後惡露方下忽然斷絕寒熱

往來登靜暮劇狂言此乃熱入血室

傳 增損四物湯 治產後陰虛發熱或日間明了暮發寒熱

歸 芎 生 地 苁 各 等 分 右水煎

當歸散 治產後氣血俱虛惡露增容熱宜服此以去惡露

歸 白 芍 芎 苓 各 一 木 半 兩 右為末每服二不童便入溫酒調下

糕

。草果飲子 治產後癩寒熱相半或多熱者

半赤苓 果煨去皮 甘 陳 芎 芷 各一分 蘧 良

青 各六分 葛 二斤 右分二貼水二盞薑五片末二枚煎至

八分當發日早連進三服無不効者

。治產後癩疾熱多寒少清脾湯養胃湯佳也

六 一產後蓐勞

婦

。產理不順疲極筋力直憂勞心慮令虛高眠容悴食不

消邪感肺咳嗽口氣痰逆喘之頭昏節痛脈中絞刺業

衛受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶肢重着床

名曰蓐勞

傳

。產後發熱自汗肢疼痛日久不愈名曰蓐勞可用

。當歸羊肉湯 歸身 參 各七分 薑 二兩 生薑 半斤 西

右用羊肉一斤煮取清汁五大盞當肉菜慢火煮取四

盞分六服徐徐飲之

。人參當歸散 治產後去血過多陰虛生內熱心煩短

氣自汗頭痛

婦

熟地 參 歸身 桂 門 白 芍 炒各一分 右入竹葉五片生薑三片水

。治蓐勞 熟地 參 白 芍 白 苓 木 各一分 續 菴 桂

五味 歸 門 芍 各三分 右入生薑水煎

。一方 治產後高熱瘦煩熱自汗欬變蓐勞寒熱羸瘦用之

白 芍 歸 地 骨 參 各半 沒 桂 各二 牡 各三 右水煎

。一方 治血虛勞倦盜汗多困少力咳痰

歸 菴 芎 各一分 柴 前 各一分 右入桃柳枝三寸大束

烏梅各一枚生薑三片水煎右有痰不用烏梅

。一方 治產後虛乏不食四肢倦怠心脈痛補虛治氣

參 芍 桂 甘 生 薑 各一分 歸 二兩 生 地 二兩 右入大棗煎

。巨命散 治產後日久虛勞針灸俱不効

芎 歸 熟 地 芍 木 苓 芪 各二錢 柴 參 各二 苓

半 甘 各七分 右分二貼水二盞薑三片棗二枚煎八分服

。犀角飲子 治產後亡血津液虛損自汗發熱困倦口乾

犀 門 木 各八分 柴 一分 枳 地 骨 生 地 甘 各一分 歸 參 苓 苓

各一分 右分二貼水二盞薑三片浮麥七十粒同煎八分溫服

人參鱉甲散 治產後由產內未滿百日或動作勞傷
 成毒勞其狀虛羸乍起乍臥飲食不消時咳頭目昏
 痛發渴無常盜汗寒熱如癘背時拘急服之立效
 參桂桑寄生 歸白芍 白芍 赤 熟地 門甘 各各
 續 二不 膝 七錢 鱉 各 莖 各一 右為末 猪腎一對 五不
 去脂膜水二大匙 薑一片 棗三枚 去核煮一匙 去粗 藥
 末二不 葱三寸 烏梅半 荆芥五穗 空心服 晚食前
 又一服效

八味散 治月水不調 胸膈疼痛 全不思食 臟腑怯弱 世浮
小版 堅痛 時寒熱 四物四君 合為一劑 各等 右為末 煎服

二方 產後補虛 參 木 苓 甘 各各 苓 歸 身 芍 各
 陳 二不 右分二貼 水二匙 薑三片 煎八分 溫服

一 產後浮利 腹痛者 未通月 飲冷當風 邪毒 留分肉之間
 布腸胃之內 致腹痛 洵世 又有食肉太早 強食過多 停
 積 不化 腹痛 而成 世病者

調中湯 傳 治產後浮利 腹痛 六脈沉細 無參 加生薑五片
產後自飲 當風 腹痛 腸鳴 世病者 用之

良妙 歸 酒浸 桂 白 芍 附 炮 芍 各二 甘 參 各一 右
 胃風湯 治產後當風 致浮世 腹痛者

參 苓 芍 歸 桂 木 白 芍 各等 右入粟米一小撮
 治中湯 加砂仁 治因停食 而腹痛 世病者

傳 產後浮利 用陳 木 苓 芍 芍 酒炒 滑 苓 甘 各
 煎服 立效 一方 有干姜

八 一 產後面目四肢浮腫 皆因敗血 乘虛停積 於五臟 循經
 流入 四肢 深腐 爛如 冰令 水腫 不審 作水 治之 大枉 者多
 但服 調經 散 血 行 腫 消

調經散 沒 瑰 各一不 桂 赤 芍 歸 酒浸各 麝 細 各半
 甘 二不 右為末 每服 半不 薑汁 溫酒 各少 許 調勻 空心 服

大調經散 治產後惡露 不消 敗濁 成腫 滿 方在下
 加味 四物湯 治產後浮腫 氣急 肢太 喉鳴 熱之內

本方 加 牡 木 荆 桑 小 豆 版 杏 半 馬 兜 入 葱 薑 芍
 脚腫 又加 荊 皮 生 薑 皮 陳 桑

枳 木 湯 治 版 大 如 盤 水 飲 所 作 調 經 散 治 血 合
 枳 木 湯 治 氣 合

未產前乳汁自出多者生子多不育

乳子忽睡乳不時泄結痛亦有不痒不痛腫硬如石

名曰吹奶不急治則癰腫急與括樓散等揉之則散

括樓散 乳香一分 括樓根二兩 右酒調下

兒不飲乳脹結捏其汁不盡皆蓄留輕者吹奶如乳

重者癰

傳 一方治吹奶作癰 葵莖及子 右末酒服方寸匕

治乳汁不通 通中七分 瞿菜 天花粉各一分 桔二 青

芷木通 赤芍 翹寸各半 右為一貼水煎食後細

飲之更摩乳房或無子食乳者要消乳麥藥二

兩炒作眼白湯調下

漏芦湯 治婦人肥盛氣脈壅滯乳汁不通或留結款

或膿 漏芦二兩 蛇退各二 土瓜根十根切片 右為末每服二兩酒調

下仍吃熱羹湯助之 糖無土瓜根有括樓實十大大塊存性

按土瓜當作王瓜如瓜萎而小如荔枝色黃藤蔓葉圓

無缺者是

鍾乳散 治婦人氣虛血少脈法不行乳汁絕矣

鍾乳粉 細研 每服二兩煎漏芦湯調下

母猪蹄湯 治乳汁不通 糖服末仍梳頭乳自下

母猪蹄 一隻 通中四兩 用水一斗煮取四五升飲之未下

更作一料服之

玉露散 治產後乳脈不行身熱頭目昏痛大便澀

參 白苓 甘各一分 桔一分 芍各一分 歸七分

芍二 右水煎 奇効方 麥煎糖末 酒磨犀角約一兩 右門冬末

二不用犀角酒服

二下乳汁 粳米糯米各半 葛苴子一分 生甘半兩

右同研末合細去粗分三服立下

釀乳方 澤四 不搗 赤苓 天花各二分 生地三分

茵甘各一分 右分三貼水煎半飢時服

消毒犀角飲 治產後吹乳

荊穗四不 風不 甘不 鼠耗子八不 右水煎食後頻服
服以手揉之乃用芙蓉葉搗爛并水調稀塗之加蜜
少許調尤妙

婦。鐵法 乳癰腫痛諸藥不止痛鐵足三里五合痛立止
乳癰定陽明經法不通血氣不散結取乳或癰四十歲以
下治之愈年歲以上難瘥又妊娠乳癰無言

連翹湯 治產後乳汁內結而腫硬疼痛
麴升芒各十 玄參 芍 白欬已射干各八
大黃十二分 甘六分 杏八分 右剉水煎下芒消服之
一產後乍見鬼神

因產是耗其血敗血奔冲淫於心所以乍見鬼神言語
顛倒非風邪但服調經散方在面目四肢浮腫之內 加生龍腦一
捻煎服得睡即安又有因血虛心氣不足驚悸恐
怖者宜用蕪合香也溫童便調服或朱砂炒香散
生地黃當歸煎湯調服又有熱入血室而顛狂者
小柴胡加生地

傳 耽胎散 治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

玳鐵粉 各一 參 神 生地 膠珠各七 硃砂五不 甘

麝各一不 右為末每服二不用金銀煎湯調下

皮感地黃煎丸 治產後古強不語眼見黑花或發狂
見鬼及胞衣不下心脈脹滿等証

生地新掘 生薑各二斤 各用石臼研細以布 婦延炒 琥各一
為西 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸煎當歸湯化下
生薑各至氣堪為末為度

栝子仁散 治產後譫妄昏心血虧欠心神不守所致

栝子 遠 參 桑 寄 瓜 瓞 歸 熟 地 甘各 右各等
分細切每服五不先用白羊心一枚煮汁以五不煎至一盞
去羊心及相溫服

茯苓散 治產後心虛怔忡言語錯亂

參 甘 山 歸各一不 遠 苓 桂 門各半 右作一服加生
薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服

婦 一五 治產後七日內痛血不散時時衝心迷悶

荷葉三分 延八分 地黃汁二合 右細切水二升煮沸下延

胡空心三服忌肉一日
一產後中風附症

產後風邪來虛而合或身體緩急或不仁或口目不正或忽悶亂乃中風候宜續命又有產後五七日強九下床或月裡房室或懷真怒動腹冲和得病之初服法口噤肌肉抽搦漸致腰背筋急疆直者不可治此乃非的尔凡也

婦 邪乘虛入諸陽經則腰背及折如角弓

林 血虛而理不密故多汗風搏之則變瘛口噤背強搦頭身及折灌小續命稍緩若汗出手拭不及者不治

舉婦右拜散 治產後中風口噤手足痠癢

荊艾穗焙末 每服二不豆淋酒調服 婦 童使亦可口噤者

一治產後中風不省人事吐涎搦搦

歸荊穗等分 右每服五不水酒各一盞煎七分溫服

如牙關緊急軒開灌之

大豆子湯 治產後中風如角弓及張口噤涎潮

黑豆半升炒焦黑復烟起以無灰好酒二分沃之入磁器中每用此酒一盞入

婦 獨活五不 同煎至六七分去滓溫服

治產後中風四肢疼痛背項強急

風一兩 芍桂各半 羚羊屑 芎 羌 歸 酸棗仁

牛蒡子炒冬 右水煎溫服

產後中風口眼喎斜等証不可作風治矣補氣血

然後治痰

傳 產後中風口眼喎斜 八物加附荊少加瓜蒌煎服

一產後不語者敗血停蓄上心氣閉塞則舌強不語

宜服

八珍散 參 芎 生地酒蒸焙 芎各一 朱砂 風各五

細一不 寸各半 右為末每服三不薄荷湯調服

地黃 慈 膈 胛 胃 不快者以當歸代之尤妙

孤鳳散 治產後閉目不語明礬為末一不白湯調服

十五

一產後遍身疼痛者因產走動血氣升降失常留滯關節筋脈引急是以遍身疼痛甚則腰背強不從伸手足不從屈伸或身熱頭痛不可作他病治之但服愈痛散循流血氣使筋脈舒暢痛自止

愈痛散 膠 酒浸 歸 酒浸 桂木 獨生 各半

燕白 一各二 分半 甘 各半 右水煎加桑寄生佳

如神湯 治產後餘血不流以腰脚疼痛

朴 芎 芎 枳 木 桂 陳 白 姜 各六 蒼 各三 不 桔 甘 各

沙 炒 茵 炒 參 苓 芎 芎 歸 苈 赤 皮 各六 瓜 各六

右分二貼水二盞薑三片煎六分食前過服

十六

一產後脚氣者產後熱回氣上轉為脚氣亦有產婦平日感風寒暑濕之氣薰蒸足經乘虛而發其狀卒起脚弱熱回心煩兩足痛痺吐氣上背其候也服小續命兩三劑必愈惡心附子者宜服獨活寄生湯若吧者去地黃倍加生姜

十七

一產後腰痛婦人胃鬆胞產則勞胃損胞諸虛未復感風乘腰故腰痛

一五治產後風冷腰痛不可轉側

獨 芎 芎 桂 續 生 姜 桑 寄 各六 歸 風 各八 右水煎

當 歸 黃 耆 湯 治產後失血過多腰痛身熱自汗

歸 身 三 不 脊 二 不 白 芎 一 不 半 右加生薑三片

十八

一產後血崩者因產血氣暴虛未得平復或因勞役或因怒致血暴崩又有氣衰血弱亦或崩中者小腹痛甚此為肝經已壞難治便且因經丸止之若小腹痛滿此為內有瘀血未可止之且服芎藭湯

一因經丸 治產後血氣未復而有房事及勞後損傷

致血暴崩或淋瀝不止

以 赤 石 補 骨 木 賊 各半 附 一 條 炮 右為末米糊

丸如梧子大每服二十丸溫酒下或陳米飲下

一煎乾地黃散 治証同前亦治一切崩中下血不止頭目沉重

熟 地 一 不 分 蒲 炒 思 蟹 瓜 一 不 微 炒 白 苓 半 不 桂 二 分

膠 一 不 炒 得 煎 白 芎 半 不 伏 龍 肝 七 分 男 子 襪 襠 一 不 燒 存 性

婦 一 右作一服入竹茹一不水二盞煎至一盞服
二 治產後七八日惡露不止

歸 芍 芎 續 各八分 芍 茹 各四分 生地 炒乾十分

傳 丹溪活套云產後目餘紅血淋瀝不止四物加芫升

調血餘灰

烏金散 治產後血速敗血不止淋瀝不斷脈暗疼
痛頭目昏眩多汗又治崩中下血不止

血竭 百草霜 男子亂髮灰 松茸 醋碎 鯉鱗 燒末

婦 延 桂 芍 赤 右等分為末每服二不空心溫酒調服

壯 斷 散 治產後淋瀝不絕心悶短氣不食面黃體瘦

蠣 粉 芍 熟地 白苓 龍骨 各二分 續 煨 艾葉 調炒

參 五味 地榆 各一分 甘草 各一分
右分二貼水二盞薑三片棗一枚煎服

一 產後淋 附尿不通附尿數遺尿

十八 婦 產婦不謹損破尿管而致淋瀝不禁其脈虛甚宜峻補

參 本為君芍 婦為臣 菝葜 菝葜 為佐以猪羊膠煎湯
熬藥汁極飢飲之一月而安

茅 根 湯 治產後諸淋無向冷熱膏石氣血赤心主之

白 茅 根 五分 瞿 穗 白苓 各二分 芩 子 各一分 蒲 黃

菝 膠 滑 各七分 甘 半斤 紫 貝 一分 石 首 魚 腦 沙 二分

右分二貼水二盞薑三片灯心二十莖煎八分溫服為末

每服二不木通煎湯下亦可如氣壅木通搗皮煎湯下

木 通 散 治產後小便不通

通 麻 仁 芩 子 滑 石 枳 殼 各二分 甘 半斤 右水煎

灸 法 治產後小便不通脈脹悶亂用鹽於產婦臍中

填手臍平却用葱白剥去麋皮作一葉切作一指厚

安塩上用艾炷於上以艾炷之覺熱氣入脈內即時使

通効難具述

桑 螵 蛸 散 治產後小便數及遺尿

桑 螵 蛸 十五分 鹿 茸 酥 各一分 西 蛻 煨 參 赤 石 脂 各六分
右為末每服二不空心米湯調下 不 禁 者

加龍骨一方無赤石有子朴有甘中生姜

治產後小便不禁 雞屎燒灰空心酒服方寸匕

一五治証同前 雞尾毛燒末溫酒調下 三治產後尿數并遺尿 益智仁厚末飲下

一產後大便秘澁 因產津液暴竭且進橘杏丸以潤之

滑石若尚不通服麻仁丸以通利之

橘杏 治弱氣少大便不通 去皮炙 各等分 右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸飲下

麻仁丸 治產後大便秘結

麻仁 去毒 各等分 枳參太師 各等分 右為末煉蜜丸如梧子大

每服十丸白湯下未通漸加丸數以便潤為度

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸閉澁傳導難艱

杏 各去皮尖麩 炒各二兩 栲子仁 半兩 松子仁 二兩 郁李仁 一兩 麩炒

橘紅 四兩 右五仁研為膏合橘皮末和勻煉蜜丸如梧子大

每服三十丸加至五六十丸清米飲下 一五有婦橘梢五兩

一產後口鼻黑起鼻者陽明者經脈之海起鼻文頰冲

俛口人中左右之右尤產後氣消血敗入於諸經却還

不得故令口鼻黑起及變鼻衄此產後虛熱變生此候

不可治名胃絕肺敗

急取緋線兩條並產婦頂心髮二條繫兩中指上節止

無葉可孫亦厭根之一端也 若口鼻無葉氣至正鼻衄則正神母 犀角地黃湯皆可

一產後喘急者因產後所下過多采血暴竭氣無

所主獨取於肺故令喘名孤陽絕陰難治 若惡

露不快敗血停凝上潮於肺亦令喘急但奪命丹

血去喘止

一五治產後血入肺面里喘欬死

參 二兩 細末 蘓木 二兩 右蘓木一味煎去滓隨時加減參

末服之

奪命丹 治惡露不快敗血薰肺喘急若感風寒

者因憂怒者食鹹冷者並不可服此况孤陽絕陰者乎

一產後咳嗽

一母散 治產後惡露上攻流淚肝經咳嗽

知貝參 白苓 龜杏 並去皮炙 右等分水煎

旋覆散 治產後血風感寒暑濕喘滿咳痰坐卧不安

旋赤苜前半 杏荊穗 五味 苓 麻 寸 各等分
右入姜枣

三石 治產後肺虛感微邪咳嗽

甘 桔 各六分 欬 四分 生 麥 門 冬 生 地 各十分 葱 白 一 握

右水煎

一石 治產後咳嗽痰唾稠粘氣急

前 五 味 菴 貝 各六分 桑 苓 各八分 竹 葉 三 片 右 水 煎

若產後喫塩太早而咳者難治

一產後頭痛

加 減 四 物 湯 治 產 後 頭 痛 血 虛 氣 弱 疾 痺 寒 厥 背

冷頭痛

羌 芎 風 香 附 炒 熟 地 各一分 細 苳 蒼 各一分 甘 炙

歸 各半 膏 二 右 水 煎 如 有 汗 者 是 氣 弱 頭 痛 也

加 芍 三 桂 一 生 姜 三 如 疾 痺 頭 痛 加 半 夏 三

苓 一 生 姜 三 片 如 熱 厥 頭 痛 加 芫 三 膏 三 知 一

如 寒 厥 頭 痛 加 天 雄 二 附 子 一 生 姜 三 片

一產後虛汗

麻 黃 根 散 歸 芍 麻 黃 根 蛎 粉 參 甘 炙

小 麥 等 分 右 煎 服

當 歸 黃 芩 湯 治 產 後 自 汗 壯 熱 氣 短 腰 脚 痛

芍 芎 各四分 歸 六 右 分 二 貼 入 生 姜 三 片

傳 黃 芩 湯 治 產 後 虛 汗 不 止

芍 二 木 風 熟 地 蛎 粉 白 苓 門 甘 各半

右入大棗一枚

一產後渴

熟 地 黃 湯 治 產 後 虛 渴 口 乾 少 氣 脚 弱 眼 昏 飲 食 無 味

熟 地 酒 浸 焙 乾 一 參 四 門 三 甘 一 括 六

右分三貼水二盞糯米一撮生姜五片棗二枚煎八分服

見現丸 治產後食麵太早麵毒薰肺口乾煩悶或飲食

過飽所致

良 炒 姜 黃 筭 澄 茄 陳 參 菽 棧 各

右為末用蘿蔔煮爛研汁煮麵糊丸蘿蔔湯下

人參白朮散 治產後勞傷虛弱怒氣上逆口乾煩悶

參朮芎縮生地苓甘 芩滑藜 各等分 右水煎

門冬飲 治產後血虛煩渴不止

芎根 括參甘苓 各三 大棗 各四 門冬 各四

右水煎頓服四劑而疾忌松菜

一產後陰脫

治產時勞力太過陰脫如脫肛扶逼迫腫痛

以鐵精粉上推內之 又灸臍下橫文二十七壯

又用枳殼煎湯浸良久即入 又用五倍白礬煎湯浸良久

又用麻子十四枚去殼研塗頂心如入即去 謂陰戶中宮脫下也

當歸黃芪飲 治產後陰脫

當歸白芍 各二 升 右水煎

當歸散 治婦人陰脫

芎 白芍 各二 蠟皮 半兩 蛎 煨二兩

右為末溫酒或米湯調下忌冷高舉重

丹溪活套 產後子腸不收入物加升風以酒炒為君

付 龍仁膏 治產後陰疼項悶 桃五味 枯瓦為末研桃仁 膏拌

洗 硫黃湯 治產後玉門不斂

硫 吳茱 兔絲 各一 蛇床 二兩 右水煎頻洗之自斂

參 治產後陰脫 硫 烏賊骨 各五 五味 二兩 右為末搽患處

參 二方加蛇床子炒 布包乘熱熨之亦治產後陰痛

參 車麻葉 枯瓦 為末以紙片攤葉托入

洗 治子宮不収痛不可忍以淡竹葉根煎湯洗仍用

參 五倍 白礬 為末乾搽立斂

一玉門瘡腫 此乃難產後人論產後陰脫速之

治婦人陰瘡先以荊艾蛇麻子煎湯重洗軟帛搥乾

次以枯丸黃丹扁膏 荊艾 硫 各兩 荊艾

蛇床 各五 白蛇蛇 一條 右為末脂麻油調塗濕則乾搽

二方治陰中生瘡如虫咬痛 生搗桃葉綿裹內陰中自

三四易之 黃芩散 治陰戶生瘡

芩 芎 芍 白礬 連 右等分煮湯重洗

治陰門腫 甘菊苗研爛百沸湯泡先熏後洗

治陰腫不聚 麻黃荊 茄種皮 蛇床 真杉木

蝟皮 右為末敷或煎湯熏洗

二方 小麦 朴硝 白凡 五倍 葱白 右煎湯淋洗尤妙

治陰瘡 硫黃末敷

治婦人陰痒不可忍 麝少許 杏燒存性 右為末如瘡口

深用 軒絹包葉線割口火炙熱內陰中

又方 枸杞子根煎湯淋洗 蒜煮湯亦可

大黃散 治陰痒 大黃微炒 苓各 蒼各 赤芍

玄參 丹參 山朱 蛇床各半

右為末每服三不食前溫酒調服

治婦人陰中生痔凡八九枚有肉 草烏七七燒存性

右用小瓦罐盛末醋淬乘熱薰候通手洗之

治婦人交接輒痛出血 桂心 伏龍肝各等分

為末每服三不空心溫酒調服

二方 連各 勝各 甘各 右為末作一貼水四升煎三升

洗之日三度

治婦人交接陽道違理及他物傷起血出淋瀝

髮灰并 青布灰 搽之

二方 刺雞冠血塗之

治陰門腫里痛 枳實半斤 碎炒令熟故帛裹

熨冷即易之

廿八 一 新產

四物湯加芩苳子一撮 經行後空心前服新產

升麻葛根湯三兩加明雄各七 枳殼炒各七 右分八

貼水二盞煎六分空心午前服二粒并煎晚食前服

通作四日服亦每月經行後便服亦加芩苳子一撮炒

一方白麵麴一升無灰酒五升打作糊煮至二升半絹帛

濾去粗分作三服候三服候月經來日晚喫一服次早五

更一服天明眼經便行終身無孕

下胎不動聲色三四日後如月水通為驗 五積散二貼

藕木二不桂紫金牛 稜菰 乾漆炒黑色 芒一不

牡二不紅一不 婦二不 右酒水各二盞煎一盞服

一返魂丹一名益母丸 益母草一味此中注二種 於端午

小暑或六月六日花正開時連根收抹透風處陰乾用

時以石臼搗羅為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸專治

橫生倒產難產後諸証及孕婦胎氣不安或跌磕

觸動下血胎漏等証為量加木香金當歸赤芍藥之妙

廿九

不限丸數以病愈為度日服三五丸或九桐子太服五十九熬膏尤佳。

熬膏法 益母草依前法揀連根葉葉洗淨石臼搗爛以麻布揀取濃汁入砂鍋內文火熬成膏如黑沙糖色為度入磁罐內收貯每服用一飯匙極妙。

子死脈中脈冷痛小便淋血沫出脈脹四肢冰冷指甲青者是也或臨產時服此藥一丸血氣調順諸病不生破血甚痛補虛養血便酒各七分化下或只生取一握連根搗爛絞汁入蜜少許服立下。

產難者或產後惡物不化臍肢刺痛惡露衝心胸煩悶童便好酒化下。

胎衣不下者發寒熱時有冷汗但出敗血其衣自出如芎藭了服此藥自下或橫生不順心悶欲死者童便好酒化下薄荷炒鹽湯亦可。

暗風 產後三日起卧不得眼前黑花俗呼為暗風或血熱口乾渴心悶亂如見鬼神狂言童便好酒各七分化下。

產後面肢浮腫多寒熱者或氣喘或小便澀滯喘嗽胸膈不利兩肢疼痛溫酒化下。

產後寒熱往來如瘧或時痛溫米湯化下桂枝湯亦可。

產後中風牙關緊急半身不遂童便好酒各七分化下。

產後大便閉結口苦煩渴童便好酒化下薄荷湯亦可。

產後痢疾來湯下。

產後身痛肢脹痛溫米湯下。

產後崩中不止者糯米秦芫湯化下當歸桂枝湯亦可。

產後鼻衄口乾舌焦童便好酒化下。

產後吐逆不止溫酒化下。

酒調下。

胎前臍脹痛或作聲溫米湯下。

產後浮血來湯下。

月水不調溫酒下或回物湯送下。

急用時連根生搗汁入水飲可治喉閉吐即命冬用根

產後一切血病并傷損用膏一匙酒化服內損亦可

三十一 產後不治之三証

一產後氣急喉中作猫兒聲者敗血入心肺亦無一生不治也

二產後中風者蓋因七日未滿勞動百日之中傷房事
中風其狀眼流腰強筋急口張牙關緊急如此者非外邪自傷死者三不治也

三產後面色黑青遍身黑黯者百無一生三不治也

○小兒科

一 拭穢之法

林

生下急用軟帛拭淨或綿裹手指離連甘汁拭口惡汁稍定更以蜜少許調朱砂一字抹口中

鎮心安神解毒一生免瘡豆之患

惠。炙甘草細切水煎去滓綿裹指離灌兒口中令嚥

吐痰涎及瘀血方與乳汁智睿無病

二 一胎帶斷法

附回氣法附胎

帶

斷胎帶可只留三寸許帶中有小虫急去之留之

異病或線札定然後洗之不然濕氣入胎生胎風况

生三日烙胎帶三共別處勿加大艾恐成驚癇

惠

初生氣欬絕不能啼者蓋因難產氣悶或冒寒

所致急以綿絮包裹未可斷胎帶且將胞衣置

炭火上燒之仍用大紙捲蘸油點之燒胎帶得大氣由

胎入腹須臾氣回方可斷胎帶

折胸之後為水濕所傷或襁褓濕氣傷胸中胸腫多
哭不乳 赤足金頭蜈蚣 一條 黃柏 釜下事 亂髮灰 等分為末傳之
胸中汁出并痛枯槁傳之 或黃柏末傳之

一 胸風撮口

因胸折傷風或尿在胞中遂成胸風發熱面赤啼
聲不出 赤足金頭蜈蚣 一條 明 牛不 蝎梢 四錢

僵蚕 七錢 右末鴉管吹入鼻中如噴噴叫聲可治

後用薄荷汁調服

面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎熱流心脾

故令舌強唇青撮口飲乳有妨 真姜蚕 炒去系嘴

為末蜜調塗口又牛黃研作餅調一字抹口中

蝎梢散 治胸風及百日內撮口胸風

蝎梢 四十九分 每一分用薄荷葉揀定以線扎 姜蚕 甲九分生薑汁

右二味為末更以腦髓各少許研勻紫礁雞肝二片煎湯

調服一字

灸法胸風撮口諸治不効灸然谷三壯 穴在內踝前起

四 一二便不通

初生二便不通腹脹欬絕急令婦人扭湯漱以吸嘔

前後心并胸下手足心共七處每處凡三五次漱以吸嘔

紅赤為度須臾自通

生下不大便先用葱末入肛門次用甘黃散送下

硃砂丸 甘黃散見月裏生赤肉

一 破泡

生下即死急看口中上脰有泡以手指搗破用綿拭

淨便後若入喉不可治

每日頻於無風處看小兒上脰頰內有白泡起以指甲

刮破拭淨

一 貼顛

出胎時被風白鼻塞 南星末薑汁調成膏貼顛

上病去除

初生白鼻塞乳食不下用牙皂草烏取葱涎

杵成膏貼顛會定甚効

一不飲乳

治初生不飲乳及未便用葱白寸四破以乳汁銀石器煎灌之立効

治初生不飲乳赤脚蜈蚣一尾去足炙令

焦細研如粉每用半錢以猪乳汁二合和勻灌之

茯苓丸 治拭口不淨穢惡入腹之滿短氣不能飲

乳 赤苓五皮 連 松炒各 石末 煉蜜丸乳

汁調灌下

白尾散 治產婦胎中受寒兒腹痛不飲乳

木陳 煨各一柱 白毒 甘各 右對水煎綿蘸

手 吧加木似丁香

一洗浴

兒洗浴時寅卯酉日吉壬申丁巳癸巳日出

用益母草金銀草煎汁浴則不生諸瘡

小兒新洗浴用五根湯終身不生瘡疥

柳桃棟梅槐謂之五根

胸帶未脫不可頻浴之則水入胸中致肺風撮口

一護養之法

天氣和暖抱之使見風日則血盛氣剛可堪風寒

常令着地氣使筋骨壯 若厚衣過暖傷皮

膚損血脉發瘡瘍汗出膝理開風邪易入腸胃

尚脆而窄丸魚肉果麩燒炙稠粘等物皆宜禁絕

苛務姑息隨所欲積成痼疾

天寒用父母常着四衣忌新綿太煖則筋骨軟弱

血令兒枕乳母臂作豆袋枕之

乳母子兒同睡口鼻氣吹兒顛門必自鼻塞

襦衣太烘兒必丹毒熱瘡

兒衣服晒月下被惡鳥羽屎落遂成無辜之疾

將惡相異物嬉戲忽見遂成驚悸

一胎驚

有胎中受驚故未滿月而發驚目上視腹硬手足

抽掣角弓反張痰涎壅盛名胎驚宜辰

砂研牛黃少許 乳汁調抹口中太妙 母服防風通聖散

臣聖保命丹 治胎驚及急慢驚風

蝎十四 白附 南星炮 蚕砂 辰麝各一分 天麻

風各二 金箔十片 蟬蛻一名 右為細末粳米飯丸每

兩作四十九丸 初生兒半丸 乳汁化下 同歲兒一丸 金銀

薄荷湯化下 十歲左右有急候者二丸 薄荷湯化下

一月裏生赤

初生兒月裏生赤 肌膚如丹塗者 先用甘黃散

托裏散 用藍條散塗外乳 母服清涼飲子三服

甘黃散 附金 甘草 桔 天花粉 苜蓿根各等

右為末 薄荷湯入蜜調服

藍條散 藍青 知母 甘草 杏仁 枳殼 杏仁 升

柴 寒水石 真膏 赤芍 磁石 右水煎

清涼飲子 歸 酒浸 甘 太芍 各等 右水煎

一月裏生黃

胎黃之證 兒生下遍體黃色如金 身熱三便不通 乳

食不進 啼不止 母因文溫熱或衣被太暖 所致宜漸

減綿厚衣 被服生地黃湯

生地黃湯 生地 赤芍 芍 歸 桔 各等 水煎子母俱服

一視手紋 附頭面脈

一歲至六歲 曰嬰孩 以男左手 女右手 次指 三關 脈為駁

病 輕重 生死 訣 右曰虎口

第一節名風關 無脈則無病 有脈則病 耗

第二節名氣關 脈見則病 重 第三節名命關 脈

見則病 劇 九死一生 惡候也 三關通度 脈候是極 重

三關通度 斜入指甲者 不治

九頭面或肚腹有大脈 併青筋 見者 并是食毒物

及驚積 難治

胸背百會穴 下有二條青脈 下對耳尖 久而愈 青不治

一診脈 九診 以大拇指 三部一息 六七十至 平和 八九至 發熱 五

至内矣脉風痾沉緩傷食

七八歲日氣九十歲日氣如可以一搦探掌後三部

脉以一息七八至為無病

十一歲至十四歲日氣一息五六至為常脉

十五 觀形

兩眼赤精光重睛不運轉目睫無鋒銳如魚眼猫眼者不治

鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋

俱惡候更煩脈有直身紋

顛門腫起定為風此候應知取是山忽陷成坑如蓋

足未過七日命須終

十六 審外證

咬牙甚者發驚口吐涎沫而叫者蟲痛昏睡善嚏者

將發瘡疹也吐沫昏睡露睛者胃虛也吐相涎者

血者肺熱也吐露睛者胃實也浮青白穀不化者

胃冷也吐浮乳不化者傷食宜下身熱飲水也

在内也浮赤黃者胃熱毒也呵欠面赤風熱也呵欠面

青驚風呵欠面黃脾虛驚呵欠而多睡者內熱也

呵欠氣逆者傷風也

十七 一變蒸

一變蒸有十變五蒸者乃生精神意智俗謂之牙

生骨長丹後曰是胎毒散也

自生且始每三二日一變其治不汗而熱者發其汗

大吐者微下不可別治

一變蒸之時切不得艾灸即宜少食乳食亦不可妄投藥餌

性可散

杏仁 甘草 細辛 石水煎

紫霜丸

杏五十枚 赤石二兩 巴三十粒 代赭石一兩 石各別研和

白湯浸蒸餅丸如黍米大三歲以下以二三丸八歲以

上十數丸食前米飲或乳汁送下

人參散 治變蒸骨熱心煩啼叫

木香附朴 參陳 葉佳 甘 各一 右水煎

。神仙黑子散 治疫毒傷寒相似者當詳其證若
且厚中心有白點升者為疫重宜服此

麻 去節 太杏 連皮 右燒存性為末每服一字水煎服
抱兒於溫暖處有微汗身涼効

吐瀉

。少兒初生吐瀉拭口中穢惡不盡嚥入喉中故吐可用

木瓜丸 瓜 檉木 腐 臙粉 即鞋粉也 右 各一 研勻麩
糊丸如黍米太每服三九甘草湯送下

。初生三日內吐瀉壯熱不乳大便乳食不消或白色傷食
當下之而後和胃下白餅子和胃益黃散

。白餅子 治小兒腹中百癖但飲乳嗽而生痰

滑 鞋半 南 各一 巴 二十四粒去皮膜煎水一升
後入粟米糯米飯丸如粟米大三歲已上三九餅已下

。三餅薄荷湯下

。益黃散 治小兒脾胃虛寒

陳 一 青 訶子皮 寸 各一 丁香 二分 右水煎 加參木

。吐瀉泄黃傷乳也 浮青傷冷乳也 皆當下白餅子
主傷乳者臣露散傷冷乳者益黃散溫中丸並

於下後服之亦有不瀉下但服此藥愈者

。臣露散 一名甘

其月 寒水 各半 生甘 二 右為末每服一字或半字溫水調

。溫中丸 參 寸 各一 木 各一 右為末薑汁麩糊丸如粟米太每服

一二十九粒梗米飲下

。吐瀉調脾胃散 入熟蜜和蘓合香丸末飲調服

。兒生月裏生記先用硃砂丸下後用硃砂煎惡物下而止

。硃砂丸 辰南 巴霜 各半 右為末麩糊丸如黍米太每服
二九薄荷湯下

。硃砂煎 硃砂 二 葉 三 滑 五 丁香 十 右為末每

服半不用新汲水一盞香油滴成花抄茶在土須更墜
下澄去水別用取空心送下

紫金散 治男婦一切吐瀉小兒尤効

半湯泡七次 參木木丁香 蘇佳 各二 右為末麩糊丸

如李核大 姜汁糊丸効 沉香 硃砂 各一 細研為末臨乾

每一丸用米一枚云 積因葉在內濕帝畏燥 麩餅米

飲歷

背中散 治吐乳

白豆蔻 砂仁 各十 甘 中西生 右為末 姜中乾吃

搽口中

白木散 治小兒脾胃久虛吐泄 溼不止 津液枯竭 煩

渴 飲水乳食不進 高眠瘦困 勞

參木木 苓 蘇佳 甘 各 葛 二 右水煎

一腹脹由脾胃虛氣攻作也 亦有實者 必問乳喘滿可

下之用紫霜丸 白餅食不喘滿者 虛也 不可下

桐氣丸 治小兒虛脹如版大者 加蘿蔔子

胡椒 一兩 蝎尾 去毒 右為末 麩糊丸 如粟米 太每服五七丸至

三十九 陳米飲下 二方有木香一

治小兒虛脹先服桐氣丸不愈 腹中有食積結 蘇

便黃微喘 脉伏而實 時飲飲水能食者可下

宜消積丸 紫霜丸 蓋脾初盈而後結 有積所治宜

先補脾而後下 後又補脾則愈也

二方治腹脹 蘿蔔子 紫蘇梗 葛 陳 各等

甘 少許 右水煎 食少者加木

消積丸 丁香 九粒 砂仁 十二 巴 二子去皮心 右為末 麩

糊丸如黍米大 三歲已上三五丸 已下二九 溫水下

二 腹瀉多是飲食所傷

木 一不 陳 去白 青 各七 山查 三粒 麩 炒 麥芽 炒 縮 各一

甘 多 有寒加薑 吳茱 有熱加苓 右為末 米飲或 白湯

服痛口中氣溫面黃 目無精彩 或白睛多及多睡 畏

食或大便酸臭者 當磨積 宜消積丸 甚者用白餅食

下後和胃用白木散

心腹痛面皸 白口中沫沫及清水出 發痛有時當作

蛇虫 又司凡積痛食痛寒痛虫痛大同小異 惟虫痛

都當口淡而津自出。小兒本指胃冷故虫動而心頭痛
与痢相似但目不射于不搗身每更散主之。

母虫散 金鑑用未糊丸名母虫散

黃粉 炒黃色 胡粉也 枳 川練子 去核 虱 各二 枳丸 二不中

右为末每服一字大者半錢或一不溫米飲臨痛時服

集効丸 治虫痛

木虱 炒 枳 訂 櫻 去 蕪 炒 附 炮去 姜 各七 太 一兩

烏梅 去核三 右为末煉蜜丸陳皮湯下或醋湯下 亦有茶連

治蛇虫作痛 陳湯加苦練根煎服或只以苦練根向

東南生不出者去殼皮取白皮細切濃煎汁一盞徐

徐飲之不可多飲先以糖蜜或炒肉食引虫頭向

正然後服之看兒大小斟酌之

一方 治小兒腹痛

甘 各二 毒 各二 伏龍肝 一兩 參 各 苓 各 百草霜 木 各五

右为末粥丸梧子太每服三五丸陳皮湯下

十一 疳癖

甘

小兒寒温不調乳哺失節或咳糯未食生冷似菓
脾胃微弱不能消化致五臟不利三焦壅滯脈內

堅硬或發寒熱如瘧漸致弱羸

紅丸子 治血膜包水腹傍疔痛發寒熱日久結癖亦効

棗 炮 棗 煨 芫花 醋炒 桃 杏 各去殼 烏梅 炒各

巴 干粒 硃砂 五不 右为末醋糊丸如菽水豆太硃砂

為衣未湯下三五丸

照 大黃 其真 治疳癖小兒大人俱用之

大黃 朴硝 等分 為末蒜泥成其真用絹帛攤成膏

菜貼之自軟消

又 木別 其真 治疳癖 木別 多用 獨蒜 半不 雄 半不

搗為膏入醋少許蠟紙貼患處取積後調理宜

異香散 治腎氣不和腹脹膨脹痞疔疔喘

滿飲食難化噫氣刺痛能破癥瘕和胃進食

蓮 去皮 我 煨 棗 炮 益 炒 甘 各 青 陳 各

朴 二兩 右为末每服二不水一盞每 三片 寒 一枚

鹽一匙 煎六分通口服

。灸法 乳下寸灸三壯

。小兒疳氣久不瘥灸中脘一穴章門二穴各七壯又
臍後脊中灸二十七壯

三
。小兒眼滿浮利積取水腹痛不嗜食灸脾俞二穴各七壯
一夜歸者心經有熱有虛

參連 每汁炒各一分 廿五分 竹葉 行右作二貼加薑一片

。鐵氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也宜益黃散 方見吐

。花大膏 燈花三顆 乳汁調抹乳口或抹乳令吮之

。治驚啼邪熱乘心也其神丹主之

。鐵氏神神丸 治邪熱驚馬啼

。門白苓 馬牙硝 山 寒水 甘 各一兩

。腦 一子 右為末煉蜜丸如芡實大每服半丸白水下

。導赤散 治心燥煩啼小便赤口中熱脈熱或有汗仰

身而啼至晚方息

生乳地黄 通甘 各等 右每服二三不入竹葉煎右證

加芩用之末効用通心飲加門車燈心薄荷

。通心飲 通 翹 明佳 梅甘 苓 各等 水煎

。二九治夜啼 蟬蛻 十四個 全者去大脚為末入硃砂一

字蜜丸吮之

。龍齒散 治夜啼不往 龍齒 蟬蛻 去翅 鈞鈞藤

苓 參 右等分為末每服一茶水煎

。六神散 治腹痛夜啼面青口中冷氣四肢冷或泄

瀉青白及不吮乳

。參山 炒木 各五分 甘 各二分 白苓 扁 炒各一兩 右入薑末

。五味子散 治夜啼及腹痛飲有鬼祟

五味子 赤芍 木 各五分 神陳 桂甘 各二分 右水煎

。乳頭散 治夜啼不止腹痛

。香甘 歸 赤芍 木 各等 為末塗乳頭與吮

。蘇丸 治冷證腹痛夜啼面青手冷

大蒜 一枚搜火煨熟研爛 乳香 半斤 右研勻丸如芥子大

每服七粒乳空時服

治夜啼乾牛糞如手大女卧席下勿令海知子母俱苦
黃土散 治客忤夜啼 室中黃土蚯蚓屎 等分
石為末水和塗頂五心良

凡小兒口到乳上便啼身熱心微熱急看口內或瘡
或重舌於各類治之

女三 一客忤 附中惡

小兒神微弱外邪客氣卒暴解忤口吐青黃白沫
面色變易喘眩痛及側癱瘓狀似驚癇但眼不
上齒視其口中上腭左右如有小泡或竹針刺或以指
甲摘破即服蘊合香丸姜湯化開頻與之仍以皂角
燒重身次用淡豆豉三合水濕搗丸如雞子太摩兒顛
上及足心各五六遍次摩胸心良

犀角散 治客忤驚喘吐熱

天麻 犀 門 鈞藤 硃砂 各一 鐵粉 雄 各半 麝 少許

右為末每服半匙金銀煎湯調服

海神丸 治証同前 方在前 黃土散亦可 方在前

女四 小兒中惡卒死以葱白內下部及鼻中立法

女四 一口瘡 附鵝口

如聖散 治小兒口瘡不能吮乳者

巴豆 三粒研爛入硃砂 剉開鵝門貼上如四面起粟米泡

便用溫水洗去恐成瘡用葛蒲湯洗便安其効如神

傳 治口瘡黃連為末蜜水調服

又方 黃柏細辛等分為末付之

小兒白屑滿舌及兩腮名鵝口用髮纏搗頭蘸井花

水拭口令淨之用濃煮粟米汁以綿纏筋頭拭之更

以板過黃丹搽之即愈

治鵝口 桑白皮汁和胡粉傳之

女五 治小兒口瘡端生蝦蟇炙杵末傳之瘡上即瘥

一重舌 附重舌重銀木舌 舌上瘡

重舌乃心脾熱也心候於舌脾之脈絡出於舌下心脾熱
則血氣俱盛附之根而重舌生一物形如舌短小有者
頰及上腭者曰重舌看牙銀者曰重銀皆當刺去其

血也真蒲黃散或髮灰或牙硝或煇硝或竹瀝
浸黃柏煎敷皆效

治小兒重舌黃丹如豆大內管中安舌下
又方釜下苦酒和塗舌下

又蜂房燒灰研細和傅舌下三四次用
又蛇脫灸魚末一豆許傅舌下日三

治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗
兒足底二七即愈

重舌木舌用三棱針於舌下紫脉刺出血而愈
又用竹瀝調蒲黃末付舌下神效

治小兒木舌塞口欬滿者紫曹二斤竹瀝半合研
勻頻付即愈

紫曹治內外煩扭不解口中生瘡顛狂驚病等證
黃金百兩 寒水石 磁石 石膏 滑石各二斤 已上用水

一石煮至四汁去粗入下項藥 甘草 青木 犀角
於屑 沈各五斤 丁香 兩 升 玄參 各一斤 已上再煮至一斗

五升入下項藥 硝石 二斤 芒硝 一斤 朴硝 一斤 已上入煎藥汁
中微火煎柳板不住手攪俟有七分投放水盆中半日

入下項藥攪令勻 硃砂 三兩 當門子 即麝香 右煎成
霜雪紫色每服一平或二平涼水調下並食後服

一弄台

脾臟微熱令舌為微緊時舒舌紙以治之勿用冷藥及
下之當少予厚黃散漸服或飲水膏疑為扭非也飲

水者脾胃虛津液切也又如面黃肌瘦五心煩扭弄舌為
疳黃宜用黃連丸大病後弄舌者山

厚黃散 薤 七分 梔 一兩 膏 半斤 甘 七分 風 四分 右細
切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至半盞去粗末

一洗泥胃氣扭也用軟石膏 荅 陳荅木煎服
一滯順乃口涎常流而漬於頤頷也宜分冷扭而治

溫脾丸治脾胃虛冷而流涎不能收約

半丁香 木 各五斤 姜 桑木 青 陳 各二斤 右為末糊丸
麻子大每一歲十丸米湯下

女九

通心飲 方在夜 通心氣令水穀退熱利便

一語遲

首飾且 臨兒在胎其母卒有驚怖亦來心舌本

不通長四五歲猶不能言

參茸門遠 汁炒 芎歸 各三 乳硃 各一 右為末

煉蜜丸如麻子大每服十丸未飲下

可林

一行遲乃稟受氣血不充骨髓不滿軟弱不能行

或肝腎俱虛蓋肝主筋之弱不能束腎主骨之弱

不能載故也宜

地黃丸 熟地 四兩 山茱 各二 澤 二兩 牡 各一 白苓 各一

右為末煉蜜丸如菉豆大空心鹽湯下三十九丸

虎骨丸 虎胫骨 兩多 歸芎 桂 酸棗 兩段 生地 白苓 風

膝 各半 右為末煉蜜丸如麻子大每服十丸酒或木瓜湯下

羚羊角丸 治小兒五六歲骨氣虛弱脚弱不能行

白苓 酸棗 矜 虎胫骨 酸多 生地 各五 桂 風

煉 炒各三 右為末煉蜜丸如小豆大食前溫酒化下三五

丸服一月漸令即可行也

五加皮散 治三歲不能行

五加 兩 膝 似 各五 右為末每服一茶半酒飲調次入

好酒兩滴調日二服

可林

一鶴節乃稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節

星露乃得之腎虛精髓內枯膚革不柔易為邪

氣所襲自就枯碎其形如鶴脚之節宜地黃丸

可林

一腳拳不展乃稟受胃氣不足血氣未榮脚指拳

縮無力不能伸屈宜

海桐皮散 海桐牡 歸 熟地 膝 二兩 山茱 補 各五

可林

右粗末每服二茶匙白一根水一盞煎半盞服

一伸屈無力宜 伸屈無力宜

慈苾丸 歸 芎 薤 酸 風 薤 各一 右為末煉

蜜丸雞頭大每服一粒麝香荆芥湯化下

或四

顛腦乃因臟腑有熱湯引水漿致泄痢久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛腦如玩用黃狗頭骨炙黃為

林

手雞子清調敷之

或五 顛填乃顛門腫起也蓋脾主肌肉乳食不常飢飽過度或寒或熱致使臟腑不調其氣上衝為填脹顛突而高毛髮短黃如寒氣上逆則堅硬熱氣上沖則柔軟寒者溫之熱者涼之肝盛風起交攻亦然

補

傷

防風 栝子白及 各末 乳汁調塗顛上十日愈 顛門腫起定作風此候應知最是出忽臨成

或六

解顛 合也 因母氣虛子熱多也 鐵氏曰生下而顛不令腎氣未成也 雖長少笑更有目白睛

多面皴白多愁少喜也 丹溪用藥物煎加酒炒

林

連煎服更以帛緊束及以白欬末付之 地橫丸 方在行 治年長頭縫開解不令服此丸仍用

炮南星末米醋調攤緋帛上烘貼之 三辛散 治頭骨不令

細桂 各五 桑 右為末 乳汁調敷乾再敷

面赤即效

或七

魚胸乃肺熱脹滿攻胸膈胸高如魚蓋乳母多食酒麪熱物五辛炙博而得之

厚白散 治魚胸 桑 蜜水拌炒 地骨 甘

加芥子一匙水煎

百合母 治魚胸 太 天門 杏 百合

桑 通 甜葶藶 軟石膏 右為末煉

蜜丸 每服五丸食後臨臥煎水下

或八

魚背小兒生下客風入脊遂骨髓即成魚背以魚尿點背脊骨節即平取魚尿法用

蓮葉置魚於上尿自出或令向魚於明鏡則必尿出

灸肺俞三五壯

項軟筋軟
五加皮散 治項軟頭不得正

五加皮末酒調塗項骨上

健骨散 治久患痲疾体虛不食及諸病後

天柱骨倒 白姜蚕 三歲兒 薄荷酒調

下脈後用注筋散貼

注筋散 木鱉 草麻 石末

摩頸項上令扭津唾 調貼

掠肝丸 即厚青丸方 治風扭項軟

貼項方 治肝膽風熱致令筋軟

附 星 等分 為末姜汁調貼項軟必效服

防風丸 掠肝丸 防風丸方名天麻防風丸 香獨活 天麻

小茸丸 治胎中受扭遍身筋軟

鹿茸 茯苓 膝 似菟絲 熟地 歸 天麻

仲青塩 為末煉蜜丸如皂角子太每服一丸塩

湯溫酒化下

羚羊角散 治面紅唇白腸扭項軟

羚羊 白苓 熟地 酸炒 虎胫骨 酒炒 風桂 甘 等分

石末每服半不或不溫酒或塩湯調服

一丁奚哺露

小兒手足極細項小骨高尻削体痿胸突號哭

胸膈或生軟癥是名丁奚 盧扭往來頸骨分開

及食虫煩渴吧噦是名哺露 二者皆無辜種類

之疾最為難治宜甘金母救之

甘金母 青 陳 菘 根 白豆蔻 芎 五靈

栴 香 木 使君子肉 蝦蟇 石末

猪膽汁浸蒸 丸麻子太每服二十九末飲下 有熱薄荷

一脫囊陰囊腫大墜下而不取也亦有囊皮脫爛者

歸 連 芥 通 甘 煎服

囊爛者野紫蘊葉 為末香油調付便則

搽之皮脫兩丸露者以青荷葉包之付茶後自生皮

一脫肛 用東壁玉泡湯先薰後洗

又五倍子為末付而頻托入
又鰲頭煖存性香油調付 一云殘相董之良久自托

又浮萍并末乾貼患處

又車麻子四十九粒研爛水調作餅子貼頂上即收入袋

小兒疳積後肛門不收赤石伏龍肝 等分 為末每用

半以傳腸頭上

一 魁病

聖惠方 治小兒生十餘日後母又有姓令兒精神不

爽身體羸瘠為魁病用伏翼燒灰細研粥飲調

下半日四五服効

龍膽湯 治小兒被惡祟導腹中致令兒病其證

下利寒熱去來又治婦人有欠飲乳復有娠孕兒喫

此乳亦作此病

北柴 臆 芥 桔 釣藤皮 芍 甘 苓 各二

蠅 蝦 二枚 太 二兩 浸 湯 畏 服 石水煎得利則止量大小多少手服

一 盤腸內吊

釣藤膏 治小兒盤腸內吊腹中極痛乳啼

乳 沒 木 姜 黃 四不半 各另研 木 別 十二个 去 煮 研 爛 成 膏 石以木煎膏

和四味更入煉蜜少許凡櫻桃太煎釣藤湯化下

次服

魏香散 蓬木 五不 真阿魏 一不 先以溫湯化開阿

魏浸蓬木一日夜焙乳為末每服半錢煎紫蘊米

飲空心調服

三方 乳 沒 各少許 研 細 木 一塊 熬 水 調 一 味 煎 投 進 服 之 立 効

面香散 治盤腸氣痛 苗 炒 木 炮 附 炮 金 鈴 子 各

蘿蔔子 炒 檉 補 炒 白豆蔻 炒 石入鹽水煎

沐香散 治小兒盤腸氣痛不巳面青身冷啼時尿

如米泔 川練子 七之五 投 投 用 也 三 三 五 投 同 炒 令 三 三 黃 去 也 不 用 使君肉 木

延 苗 各 二 右為末清米飲空心調下量兒大小手

一齒不生蓋齒者骨之餘髓之所養稟氣不足則髓

不能充於骨故齒久不生宜

芎黃散 芎 歸 白芍 地 山 各 一 五 不 時 三 不

石末溫鹽湯調服半匙仍用少許擦牙根
。元雄兒燻三七粒高頭大者是每日用一粒搯齒根上至二十
一日當生

甲六林一折乳

畫眉膏 施二分 雌黃 硃砂各少許 右為末入
香油輕粉少許調勻候兒睡着濃抹兩眉覺末自
不喫乳末効再用即驗仍以墨調塗乳頭

四十七林一誤吞諸物

治小兒誤吞錢坑大炭末白湯調方寸匕服即出
。又眼蜜一升即出 又濃煎艾汁服之効
。治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下 兩眉根燒
細研白湯調一服之

四十八林諸熱論

潮熱者胃熱也時向發熱過時即退末日依時發
熱此致發驚也地骨皮散主之
。壯熱者心熱也一向熱而不已甚則發驚痾導
赤散主之

風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有風證人參
生犀散主之

濕熱者脾熱也但溫而不熱厚黃散主之

心熱者視其睡口中氣溫或合面睡及上齩咬牙
昏冒者心熱也導赤散主之

肺熱者手揉目鼻付桔湯主之

地骨皮散 治虛熱潮熱亦治傷寒壯熱

知柴甘 參地骨 赤苓 半各等 右每服二不姜

一片水煎

導赤散 在夜啼

生犀散 治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱

及病後餘熱不除

太並焙 煎醋炙 門春 尤厚 鑄桑 參苓

地骨 赤芍 柴 枳各等 一方有知母 直夜加半反

石入青蒿少許煎

浮黃散 治脾熱自黃 吐太口唇生瘡 眼生翳針等證

黃連 膏 可 風各等分蜜 右為末 溫湯調服

加減浮黃散 治濕熱胸膈煩滿 皮色如橘子黃白

睛赤黃 連 茵各五 柏 苓 槐 苓 澤各三 右煎服

丹桔湯 治肺熱 手搯眉毛

桔 五不 可 一西 右水煎

甘露飲子 治胃熱口臭 齒齦腫痛 咽口有瘡

赤眼及瘡疹 煎盛者

枳去毛 熟地 門 枳 麩炒 茵 生地 天門 石斛

苓 甘 炙 右等分 水煎 一方加連

傳

四十九驚風 附慢脾風 天齋 發搐 馬脾風 嘔風 痲風 痲證

一驚風有二證 急驚屬痰 熱慢驚屬脾虛

。夫急驚之候 因聞不常 一青或駟馬禽獸之吼

以致面青口噤或聲嘶而厥 發過則容色如故 良久

復作 其身熱面赤 引飲口鼻中氣熱 大小便黃赤

惺惺不睡 蓋熱甚則生痰 之盛則生風 偶因驚

而發耳 宜用鐵氏利驚丸 浮青丸 抱龍丸 宜風散

五福化毒丹等

慢驚 證多因飲食不節 損傷脾胃 以致吐瀉

久中氣大虛 而致發搐 發則無休止 時身冷面黃

不渴口鼻中氣寒 大小便青白 昏睡露睛 目上視

手足痠軟 筋脈拘攣 蓋脾虛則生風 之盛則筋

急俗名天疔風者 即此候也 治宜東垣黃芪湯 錢

鈞藤凡溫白丸 丹溪參朮湯 送下珠砂安神丸 類

急驚者十生二死 慢驚者十死一生 有合病者 身涼精神倦怠 不吐不瀉 又能乳食而

發搐者是半陰半陽，合病如傷寒半表半裡也有
急驚涼浮不愈或吐下未太過變為慢驚有慢
驚溫補不愈或與溫補劑太過變為急驚
備 判驚丸 治急驚風神效

天竺黃 二錢 輕代 各一錢 黑丑 頭末半錢 石研勻煉蜜丸如
梧桐子大一歲兒一丸三歲二丸五歲三丸溫薄荷
水可食後

厚青丸 又名厚 治肝扭急驚搐等證

卷太 臣帝製煉 芎藭 歸風 各等 石為

煉蜜丸如芫青太每服半丸至一丸竹葉湯下
抱龍丸 治傷風瘟疫身扭昏眩氣厥風扭痰實
壅嗽又治驚風潮搐及盡毒中風壯實小兒且
時予服之則免疾扭驚搐

雄 二錢 辰 五錢 牛膝 南星 石為末煮甘草真丸如皂子太溫
水化下百日兒每丸分作三服一歲兒半丸五歲二丸

童壯三五丸臘雪水煮甘草和丸尤佳立法漿水或
新水浸南星三日煮三五沸去皮取白肉切焙炒黃
色為末每八兩以甘草二兩半拍破用水二碗慢火煎
至半碗去粗旋入南星末徐徐研入餘茶

宣風散 治急驚風搐搦不定
枳 二枚 陳甘 各五錢 黑丑 四兩半生半炒 石為末蜜湯
調下二三歲兒半錢四五歲一不食前服

五福化毒丹 治急驚風發扭搐搦等證
桔 微炒 玄參 洗焙各六兩 代黑 研 牙硝 各三錢 參 二兩 苓 五兩

甘 二錢 銀鈎 八片 金鈎 八片 腐 半斤 石為末煉蜜
丸每兩分作十二丸一歲兒每丸分四服薄荷水化下
奪命丹 治急驚不省人事自定直視牙關不開
唇白或黑者

星 半 各四兩為末以姜汁和作餅子焙乾 珍珠 新白者 巴 去油 硃砂 四錢
金鈎 銀鈎 各十片 輕 腐 各半 石為末麵糊丸如黍
米太每歲兒一丸燈心湯化下

鎮驚丸 鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止咳

珠珀 琥珀 雄雞 各三片 金鉤 十片 膽星 五片 牛黃 二片

齋 辰 右為末 麥麵糊丸 如梧子大 每服五

六丸 薄荷 姜蜜湯化下

鐵氏安神丸 治邪阻驚啼心忪面黃頰赤壯熱

門牙硝 白芍 山寒 甘 辰 腦 一兩

右為末 煉蜜丸 如芡實大 每服半丸 砂糖水磨化下

慢驚 參木煎濃汁化下

金鉤丸 治急慢驚風痰涎壅盛

半星 煨裂 白附 炮 風 雄 珠 犀 一

牛腦 齋 各半 金鉤 二十片 右為末 姜汁糊丸

如麻子大 每服三五丸至二十丸 人參湯下 慢驚 腦

格 厚活湯 治急驚風角弓反張

參 苓 杏 膏 麻 甘 桂 芍 首

升 芎 獨 右合姜煎

人參湯 最能利驚 小柴胡加風松

蟬散 治驚風天癇心忪夜啼驚癇

蟬 去足翅 荆穗 一兩 甘 太 煨 苓 蝎 梢 五

右入白茅根少許水煎

神效萬金母 治急慢驚風十無一失

硃 輕 右研白用青蒿內 虫兒取於淨磁盞

內以硃輕虫汁和丸 黃米大一歲兒一丸二歲二丸 乳汁

送下 取虫時七月初五日最靈

能 千金龍膽湯 治嬰兒出腹血脉實盛寒熱交作

四服驚刺手併諸病驚等證

膳 釣鉤 藤 柴 芥 枝 芍 神 甘 各三片

螳 蟻 太 五 右水煎徐服

二方 治急慢驚風

薄荷 寒 代 蠶 硃 蝎 牙 皂 角

槐 角 右為末 灯草湯和乳汁調時之灌之

黃芪湯 治慢驚風之神藥也 慢驚風者皆由久停解

底 參 炙 芍 加 白 芍 右水煎

益黃散 治胃中風熱

芫二不陳去白 參各一 白芍七分 生甘 炙甘各五
連少許 右為末水煎食前服

鐵氏白朮散 治積痛和胃生津止渴頻得利將

或慢驚風者服之効

參 木 白朮 甘 炙 木 藿各一 乾薑二 右水煎

丹溪加山扁肉蔻根各 入姜一片煎如慢驚已

作加細 天麻各一 蝎三枚 白附八分 同煎服

一方 治慢驚風子母俱服

參 木 苓 陳各半 甘 芍各二 夫各七 細三分

蝎去毒炒 右作一服加姜三片水煎

釣藤飲 治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣 鈎 藤半斤 蟬 風 參 麻五節 蚕 炒 蝎 尾去毒

天麻各二 甘 芍各一 石水煎虛寒者加附半分

溫白丸 治脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷痢洞泄及吐瀉

久病轉成慢驚身冷痠痿等證

天 牛 兩 蚕 炒 白 附 生 蝎 炒 星 湯 泡 七 次 焙 右 為 末

麵 凡 如 菘 豆 太 每 服 五 七 丸 至 二 三 十 丸 空 心 姜 米 湯 下

○冬法

治急驚風灸前項一穴在百會前一寸 如不愈項後兩眉頭

及人中一穴各三壯

慢驚風陰證也因吐瀉病久脾胃虛困似搐不搐

眉心 顛會一穴在入髮際三寸 各三壯 百會一穴

又治慢驚風灸尺澤二穴各七壯

一慢脾風

小兒慢脾風證蓋有吐瀉損脾病傳已極總歸虛

心推脾所受故曰慢脾若逐風則無風可逐若鎮驚

則無驚可鎮但脾同疾涎凝滯而然余

因氣乏神志沉迷痰涎凝滯而然余

一 小兒頭雖扭眼珠青白而足冷

二 小兒頭雖扭或腹脹而足冷

三 頭雖扭或浮而足冷 四 頭雖扭或嘔而足冷

五頭雖扭或渴而足冷 已上五證忽然吐而作搐者
 名曰慢脾風速予補脾益真湯每服三錢更加蝎一枚
 如因驚而搐者予前朴散每服三錢更加附前各半
 息慢脾候如身冷指汗直吐如尸喘嗽頭軟二便不禁
 團痰上攻呼吸氣危者不可治
 且慢脾十救三抵當生膏回陽如大街脉在則取百會
 穴多救之

補脾益真湯 治小兒胎稟怯弱外實中虛因吐
 吐乳好黃便青色而成慢驚風氣逆涎潮眼珠直
 視四肢抽搐或因受寒客忤而作或因特拘驚嚇
 而作或因濕服鎮心寒涼藥而作

木 歸 參 芍 苓 丁香 訶 肉 陳 朴 薑 葱 麩 裹
 日 果 苓 木 桂 干 湯 泡 七 次 附 七 分 全 蝎 玉 毒 微 炒
 右 每 服 三 不 毒 二 片 水 一 盞 半 煎 六 分 去 滓

吐飢稍扭服之訖心腹揉動以助藥力候一時久喫乳食
 渴者去附丁葱加參苓薄荷者加丁訶吃吐者加

陳丁半腹痛者加朴良腹痛者加朴丁前枳
 咳嗽加前五味去附桂果葱痰喘加前枳赤苓
 去附丁葱果足冷加附丁朴氣逆不下加前枳
 去湯附葱惡風自汗加桂香

前朴散 治心腹結氣或吐或泄腹脹特痛或發驚
 搐 前 木 參 陳 良 薑 甘 朴 剉 各 分 石 水
 煎肚飢特服

異方銀白散 治或吐或泄涎鳴微喘露睛驚跳
 石 運 白 扁 炒 各 一 分 參 天 白 附 炮 全 蝎 玉 毒 木
 可 參 陳 末 炒 香 右 每 服 二 錢 冬 似 仁 七 粒 姜
 一片水半盞同煎服此藥助胃祛風慢驚通用

一天獨證
 小兒壯熱翻眼手足搐掣如魚之上鉤皆由乳母過
 食熱毒旋即乳兒兼扶風邪所致但解利風熱則應

平而愈
 九龍控涎散 治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰名為天吊

滴乳一不 雄另研 鴈茶 枯竹各一 甘各
荆穗炒 菜一百粒半 赤脚蜈蚣一條 石為末每服

半錢至一錢人參薄荷湯調下
釣藤飲 治天吊潮熱 釣藤 冬各半 蝎 天各
犀角各 石為末每服一不水煎

一發搐

男發搐目左視無聲右視有聲
女發搐目右視無聲左視有聲

寅卯辰時發搐潮熱目上視手足動搖口流涎
延頸筋急此肝木太旺當補腎抑肝補腎地黃丸
抑肝浮青丸

己午未時發搐潮熱目上視白睛赤牙關緊
急口流涎手足動搖此心火太旺當補肝浮心補肝地黃丸
浮心導赤散 涼驚丸主之

申酉戌時發搐潮熱喘而喘目微斜視睡則露睛
足冷大便下淡黃水此肺病當補脾而抑心肝補脾

極黃散 抑心導赤散 抑肝浮青丸

亥子丑時發搐潮熱不吐搐而卧不穩身體溫
無壯壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食
不消多睡不醒當補脾抑心補脾極黃散抑心導
赤散涼驚丸

傷風發搐口中氣熱呵欠頻同手足動搖當發大青膏
主之小兒稟賦素怯者多病此

傷食發搐身體溫多睡多唾或吐不飲食而當先
定搐退用白餅子後服安神丸

百日内發搐有真假二證真者不過三二次必死假者
發搐不為重真者內生驚痾假者外傷風冷蓋車
氣未實不能勝邪乃發搐也矣知假者口中氣出
粗也治之宜發散大青膏主之及用塗顛法子浴法

地黃丸 在行座 浮青丸 在急驚
涼驚丸 膽風 各三 連 腦 一不
牛 膚射 各一 右為末麥麩糊丸如黍米太每服三五丸

至一二十丸金銀湯送下

益黃散 在吐瀉

大青膏 治少兒傷風吐瀉心溫作涼作熱

天 代志各一 白附 一不 蝎尾 五毒 烏蛇肉 備浸 硃砂

等 麝香 各一 石為末生蜜和成膏每服半皂子大或

一皂子大月中兒糲米大同伴黃其膏溫薄荷水化一

匙服五歲已上同甘露飲服 錢李有天府 無大青

伴黃膏 治熱及傷風壯扭引飲

雄甘 甜硝 冬 生各二 餅金 一不 棗豆粉 五不 腦 一不

石為末蜜和成膏薄荷水化下半皂子大食後服

可露飲 在吐瀉 白餅子 在吐瀉 安神丸 在夜啼

淫鱖法 腐 蜈蚣末 牛 代志 各一 蝎尾 去毒

薄荷葉 半不 石為末熟末肉為膏新綿上塗白貼

顛上四方可出一指許火多手頻慰百日裏外吹可

用此及浴法 俗伴法 治肥胎併胎怯胎熱

烏蠟 百浸 白礬 代志 天 二不 蝎尾 去毒

硃 各半 腐 一不 石為末每用三不水三碗帶葉

桃枝一握向前至于教沸溫熱浴以勿浴背

一馬脾風 謂暴喘也

小兒肺脹喘滿氣急兩肋扇動鼻竅張

問亂嗽過聲嘔痰涎潮塞俗呼馬脾風如不急

治死在旦夕 伴黃膏散 無價散 各半生半熟 取頭末五不 太 樞 各一

伴黃膏散 白牽 黑牽 石為末每服一不

用溫 無價散 治風扭喘促向亂不妄俗呼馬脾風

硃 一不 輕 半不 甘遂 一不半麵 色不燥乾 石為末每服一不

用溫 漿水少許滴香油一點抄茶在油上滾下去却將漿水灌

上方加滑石二不名油墜膏

暴喘俗呼馬脾風大小便硬宜急下之用伴黃膏散

下 次用白虎湯平

林

眼闭口噤喘声渐少舌上取米由如粟米状以乳不
得口吐白沫二便不通盖由胎中感受热毒流毒
放心肝故见於喉舌或为风邪所搏致之直

辰砂^辰 辰^辰 珊瑚^{牙硝} 牙硝^{各一} 玄明粉^二
蝎 真珠^{各一} 麝^一 右为末油纸包自然成膏

每用豆许乳汁调敷乳头上以金银薄荷汤下
亦可有潮热甘草汤下

单立 治初生七日口噤
牛黄一钱细研以竹漚调一字灌之

一痲證

傳

凡治小兒五痲皆當隨臟治之並五色丸治之
五痲重者死 病後甚者亦死

患

風痲癢手足如雞或口喎
食一傷由食股搐角了及張大舌吐食方定

驚一厥頭目^昏或昏或邪視

痰一似在耳不聞目不視如夢如醉或日發或

狂年發

飲一手足搐動食不知飽或數日不食寐中發

林

飽^{亦發} 亦發
有人事多曰痲

先身熱制一癡驚啼而後發痲脉浮者為陽痲

先身冷不驚制不啼而病發脉沉者為陰痲

治風痲之法大率行按為主星中葦連尋痰

傳

尋痰太分多少治之
五色丸 硃 珍珠^{各五} 水銀^{三四} 雄^{三四} 黑鉛^{三四} 銀熱

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

林

硃砂^辰 辰^辰 治五痲
硃 白礬^生 赤石^{各等} 硝石^{各等} 右為末研蒜膏丸

如等水豆大每服三十丸食後荆芥湯下

參珠丸 治痲大神效

參蛤 朱砂 右為末猪心血丸如梧子大每服

三十九 金銀湯下

灸法

神庭一穴 在入髮際五分 治角了及張羊痲吐舌灸三壯

少衝二穴 在十指端內應 治驚痲吐舌沫出灸三壯

前頂一穴 在入髮際三寸五分 治驚痲灸三壯

長強一穴 在脊骶端 治驚痲灸五壯

治急慢驚風危證及諸痲症病縮帛縛兩手足大指甲角縫半甲半肉之間灸三壯先足後手

或髮際或顙會

五十痲證

一五痲 併雜痲

肝痲 搖頭揉目白膜遮睛汗流腦扭合面而臥筋青髮之肉色青黃羸瘦當補肝宜地黃丸或生

熟地黃湯

心痲 面黃臉赤煩滿壯熱口瘡虛驚當補心宜

安神丸或黃連丸

脾痲 体黃肚大吃泥去脹滿氣急利下酸臭當

補脾宜益黃散

肺痲 欬嗽氣逆多喘揉鼻咬甲寒熱白鼻生

瘡當補脾此宜者補母也宜益黃散或清肺湯主

腎痲 体瘦身有瘡疥其起時作頭極扭足冷如

凍當補腎宜地黃丸

筋痲 浮血而瘦當補肝地黃丸

骨痲 喜卧冷地當補腎地黃丸

內痲 目腫腹脹利色無常或沫青白漸而瘦弱

此冷證也宜木香丸

外痲 鼻下赤爛自揉鼻頭有瘡不結痂透耳而

生當治瘡爛宜蘭香散白粉散

熱痲 潮熱如大便乾法肌肉黃瘦雀目宜胡黃連丸

冷痲 時時泄汗如雨不止宜厚聖丸

脊痲虫食脊脇身扭下利羸瘦頻咬指甲大芫菁皮
。疣痲食肉太早或腸胃停畜肥膩其證多啼嘔
。清水腹痛脹滿唇口紫黑腸頭及齒疔宜下臣反
。鼻疔上焦壅滯疔至鼻上蝕鼻中赤疔壯扭啼呼
。皮毛乳焦肌膚瘦削鼻下連唇生瘡赤爛宜腐香散
。走馬牙疔牙齦潰爛由臟腑虛熱乳食不調致成
。疔病內有疔至蝕齒牙腫爛消黑口多臭氣

。尿白乳哺失節脾傷便濁白色久而成疔宜扶苓散

。地黃丸 在行匪

。生助地黃湯 生地 熟地 芍 赤苓 枳 杏 連

。半 天 甘 參 地 骨 歸 各 等 分 石 每 服 二 錢 水 一 盞

。姜 三 片 黑 豆 五 粒 煎 半 盞 服

。母 神 丸 在驚風 治 邪 扭 驚 吐 心 疔 面 黃 頰 赤 壯 熱

。益 黃 散 在吐瀉 治 脾 胃 虛 寒 脾 疔 伴 黃 脈 大 食 苦 鼻 疔

。清 肺 湯 治 肺 疔 咳 喘 揉 鼻 咬 甲 寒 熱

。桑 葉 蘇 前 芥 歸 天 門 翹 風 赤 苓 桔

。生 地 寸 各 二 錢 半 石 每 服 二 水 一 盞 煎 服

。木 香 丸 治 瘦 冷 疔

。木 青 檳 葱 各 二 分 腐 一 分 續 隨 一 兩 蝦 蟄 大 者 三 分

。石 為 末 煉 蜜 丸 如 芫 菁 太 每 服 三 五 丸 至 二 十 丸 荷

湯 送 下

。胡 黃 連 丸 治 肥 扭 疔

。胡 連 川 連 各 半 兩 硃 砂 二 分 半 石 為 末 和 勻 入 猪 膽 內

用 淡 漿 煮 以 杖 子 置 匙 子 上 用 線 釣 勿 着 底 候

一 坎 冬 取 出 研 入 芫 菁 腐 香 各 一 分 飯 丸 如 麻 子 太 每

服 五 丸 至 二 十 丸 未 飲 下 有 青 黛 蝦 蟄 各 二 分

。蘭 香 散 治 外 疔 鼻 下 赤 爛

。蘭 香 葉 莖 各 二 分 銅 青 各 半 分 輕 粉 各 半 分 石 為 末 乳 付 入

。白 粉 散 治 疔 瘡

。烏 賊 骨 末 一 匕 白 芫 末 三 匕 輕 粉 一 匕 石 和 勻 先 用

清 漿 水 洗 瘡 拭 乾 付 入

。臣 聖 丸 治 冷 疔 特 令 泄 浮 虛 汗 不 止

木丁皮 丁香 朴 史君肉 陳 菴 溫身 畏燥
右為末 麩糊丸如麻子太 每服七丸 食前米飲下

大蘆薈膏丸 治脊疔
蒼 葦 木 代 檉 檉 連 各一 蟬 單 二 十 胡 連 五
腐 少 許 右為末 猪膽二 分 取汁 浸 糕 丸 麻 子 太 每 服
二十丸 米飲下

下虫丸 治蛇疔

新白苦練根皮 酒 浸 綠色 貫 衆 木 桃 蕪 焙 各
雞心 栝 榔 三 分 虱 炒 一 分 半 乾 蝦 蟇 炙 焦 史 煨 取 肉

右為末 麩糊丸如菴豆太 每服二十九丸 天明用清肉汁下

如歸 連 各二 治脊疔及疔疔

廣香散 治鼻疔 鼻下連唇 生瘡 赤爛

腐 半 分 雄 升 各 二 拓 契 五 右為末 人乳調敷

茯苓散 治尿白 久而成疔 赤心 膈伏 熱 煎 而 得 之

核 煨 莪 縮 赤 苓 各 五 青 陳 滑 甘 各 各
右為末 每服二 分 麥門冬 研心 煎湯 調下

如聖丸 治冷疽疔

使 一 兩 胡 連 川 連 白 蕪 蕪 五 皮 炒 各 三 兩 乾 蝦 蟇 五 炙 成 膏

腐 半 分 右為末 蝦蟇 膏 和丸 如麻子太 二三歲 兒五
七丸 已上 十九丸 至十五丸 人參湯下

香蟾丸 治疔消食 積虫 積肉 積及 治腹脹大

核 莪 青 陳 曲 炒 麥 蘆 曲 炒 膳 檉 各 五 木 二 分

川 練 子 五 枚 史 胡 連 川 連 各 四 木 一 乳 蟻 五 分

右為末 以乳 蟻 用醋 煮 成膏 和 菜 如乳 再 加醋 丸 如

麻子太 每服十五丸 清米飲送下

芦薈丸 治疔氣 腹脹 骨疽

蒼 木 檉 各 二 蝦 兩 浸 炙 連 各 一 蕪 五 皮 青

陳 各 五 巴 三 七 粒 去 皮 同 右為末 猪膽汁 凡如 小豆太 三歲

以三十丸 米湯下

又方 治疔積腹大

胡 連 魏 醋 浸 各 腐 當 門 子 川 連 炒 麩 炒 各 右為末

猪膽汁 和丸 如麻子太 每服三十丸 白木湯送下 蒼 半 分

祖傳 換掃丸 治疳疾積塊腹大有虫等證

栝二兩 棗根去毛 莪醋炒各 青麩炒 陳去白 蒸二斤

雷去毒 鶴三斤 漆五斤炒 木三斤 良二斤東壁

縮一斤 麥蘖麩 胡連 甘多三 麩五斤炒

山查兩 右為末醋糊丸如棗豆大每服三五十九

空心淡姜湯下

五疳保童丸 治五疳 五臟之疳也 蓋小兒骨肉

輕軟腸胃微細如乳哺有節則臟腑相調或

乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及小兒

百晷以修五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥

膩甘酸之物即成五疳並皆治之

連 白鱉 草龍膽 青皮 五倍 墜頭 棟根

夜明砂炒 雄 麝 代天漿子 熊膽 蒼

明連各一分 右為末糯米糊丸麻子大一歲以每服

一丸米飲下日三服之方有乾蝎牛做炒

化虫丸 治因疳生虫五心煩熱

蒸連 麩炒 麥蘖 等各 右為末麩糊丸黍米

太空心米飲下煉蜜丸名黑黃丸葶藶豆大每服十

丸至十五丸米湯下

肥兒丸 治諸疳多因乳喫食太早或因患泄

浮胃虛虫動自漸羸瘦腹大不能行髮堅發

熱無精神

連 麩各一 麥蘖 木二斤 栝三斤 蒸二斤

史君由各五 右為末麩糊丸蘿蔔子大每服三二十九

量以歲數加減煎水下

一方 治諸疳 便桶中蛆河水浸三日新瓦上頓放

外以天福乳為末以兒亦治走馬疳疔患兒良

蝦蟇全 治五疳腹脹面黃体瘦寒熱喫飯揉鼻

咬甲頭髮不長肌肉瘡癩吐乳食利色不定自漸

黃瘦

蝦史 皂角二兩 代二兩 膽四兩 雄二兩

右為末水糊丸粟米大一歲十丸乳米飲下

右為末水糊丸粟米大一歲十丸乳米飲下

一方治疳病

枳一升 史由七方 陳 香附各二 輕二貼 石為末每
服一錢 飯湯空心調服 同肉食亦可 次日有
虫從糞中出

冬法 疳瘦冬 翠尾骨十三壯

腹滿得利積取 腹痛痰涎寒熱瘦黃 灸脾
俞二穴各七壯

一無古辛病毒

腦後項也 有核如彈 按之轉動而不痛 其間
有虫如米粉不連破之 則隨氣流散 淫蝕臟

腑以肢體作癢便利 膿血壯熱高肌瘦頭露骨高
皆由氣血虛微所致 用三稜鍼刺破膏菜貼而愈

林 婦

小兒衣服勿晒月下 被惡鳥羽屎落遂成無古辛之疾
蚶蚶丸 治無古辛病毒項也 結核如瘰癧 按之不疼

兼治諸疳 一服虛損退 二服渴止 三服得利佳

蟾蜍 一枚夏月海渠中取最大 石取糞虫一杓置一桶
不能不鳴者其類石為多

中夜尿浸一桶 要氣不冷 虫走却將蟾蜍打殺

投桶中 任虫自食 一日夜次以新布袋盛 包繫定
置急流水浸一宿 取出瓦上焙乾 為末入麝香一字

粳米飯丸 麻子太 每服三三十九丸 米飲下

一方 白蒸菜 連 胡連 代各五 蚶蚶去不用

石為末 糊丸如粟米太 每服三三十九丸 食後米飲下

疳 疳

一疳疔 附丹毒 白卷牙疔 鼻疔 癰疔 疔瘡 疔毒 疔毒

自孩提至成童 潮扭發疔 乃疔氣便然 疔虫蝕
其肌膚 遍身扭疔 發過無已

林

小兒三歲頭及遍身生疔 皆因在胎中 父母交合
所致 名曰胎疔 先用化毒母消毒散 却用艾小便以

鵝膽刷洗 青黛細末 乾搽之 効

疔血飲 治諸般疔毒 敗毒散 加生薑 生地 白芍

薄荷煎服 一方有首烏 芍 天麻 蟬

甜瘡 多生面部耳前 令乳母嚼白米成膏 隨時塗

三五次 効 忌烏魚動風物

丹隨走不定嫩赤腫痛。寒水膏連柏。右為
末水調刷患處。

一方青黛。土朱。右為末并水入蜜調敷。

一方黃丹。用磨刀水調刷。

丹毒腫痛如火。大黃。朴硝等分。為末水調塗之。効。

藍青散一名藍青散。治丹毒赤腫身熱如火。

小兒赤瘤。熱毒附結肉間發皮膚赤如瘰癧。宜生地。

通荊芍藥。若寒帶表。剉外。芍藥連煎。

湯入芒硝泡洗。又芭蕉根汁塗之。

小兒遍身赤腫。乃久伏熱毒。氣防其入腹之。腎

則死宜。

防已散。已五。朴硝。厚朴。各分。右入。

竹葉五片水煎之。

治白禿瘡及髮中生癩。取熊脂付之。

又搗榆白皮醋和塗之。至即出髮即生。

又白禿髮不生。濃煮陳香蒿汁。少許和胡粉。傅上。

又小兒頭無髮。鯽魚燒末。醬汁和傅之。

金線錠子。治走馬牙疳。凡點相無如此。藥取効。

人參一。雄二。乳胭脂半。飛羅麵四。右為末。水和

用米泔洗患處貼。

銅青散。治口內疳瘡。牙銀潰爛。

草五。牙硝。銅青各一。腐一。石為末。搽之。仍服。

蟾酥丸。治諸疳。殺虫。止腹痛。退虛熱。

蟾蜍一枚。酥四。硃連。川連。膽。練五。木香。

史君五。燕各一。腐下。巴十四。苗炒。陳各一。

右為末。猪膽汁丸。或糊丸。青黛為衣。紫蘇湯下。

一捻金散。治走馬牙疳。黃丹。白礬。青鹽。

草綿燒。腐少許。石等分。為末。先溫鹽水洗淨。乾貼。

蟾酥散。治走馬牙疳。齒銀鼻爛。及唇鼻一應疳瘡。

蚶殼燒。連。代各。右等分。為末。入腐少許。敷之。

情牛散。治牙疳。蝸牛大者。代各。右等分。為末。入腐少許。敷之。

腐一。石研白。先湯洗。搗乳。鵝翎點之。

鼻疳 桃葉湯 治天行頭面鼻疳

桃葉 二兩 搗研水五升煎去粗洗五七次

腐香散 治鼻疳及鼻下連唇生瘡赤爛

腐 雄 升麻 各二 枳殼 五 右為末入乳調付

一方 能騰湯化塗鼻中

丹 小兒丹煩 柳葉 一 水煎去滓洗日七八度

疳 小兒疳疔 蛇床末和猪脂塗之

諸 小兒頭面身上諸瘡 蛇蛻末和猪脂傳之

耳 小兒耳後月蝕瘡 胡粉和土塗之

又黃連末傳之 又燒蚯蚓屎猪脂調傳之

又黃連 枳殼末傳之

諸 洗瘡疔 芷若 參 腹 等分 煎湯淋洗尤妙

又 栢甘 馬鞭草 連鬚葱 荆 等分 水煎洗

疔 疥 疥 疥 赤芍 連 蛇床 等分 輕少許 右為末香油調敷

五十一 痘疹

一辨真疑

小兒痘疹大抵与傷寒相似發熱煩躁赤唇紅

唇紅身痛寒乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎如

教之時有因傷風傷寒而得者有時氣傳染而得

者有因傷食發熱吐而得者或目雷驚搐如風

狀或口舌咽喉肚腹疼痛或自汗或下利或發熱

或不發熱證候多端卒末易辨必須以耳冷尻

冷驗之蓋痘疹屬陽腎臟無證其耳身尻俱

屬腎故取目之所部獨冷又不如視其耳後有紅

脈赤縛為之真

傷寒身重面黃女面赤喘急憎寒口中氣熱呵

欠頓問項急也

痘疹腮赤多嚏噴悸動昏倦四肢冷

傷食大便酸臭腹脹不消化畏食宜下之

一辨內外因 辨疑似

凡瘡發而未出因發搐者是外感風寒之邪而
內發心熱也宜理之散或升麻葛根湯參蘇飲
瘡發出而未出而吐利者是中焦停寒或挾宿
食宜四君子湯加縮陳或和中散如挾宿食者用
紫霜丸

凡瘡疹覺身熱似傷寒疑似未明先予理之散或
參蘇飲其甚者升麻葛根湯人參敗毒散若
見紅點便忌首根湯恐得表虛也

右方以升麻葛根湯治瘡疹已發未發世習以為
常蓋葛根升麻性皆寒損胃氣凝血脉不能起發
凡起不可驟進且難解之蓋瘡疹無起則不能起發
此種之值天時暄暖則易生

凡瘡疹初發出時身發熱耳尻冷呵欠欬嗽面赤
必是出瘡之候宜升麻葛根湯加大力子山查瘡
必稀而易愈

一治法

瘡未出已出之時辰砂細末看兒大小或一不或半不
蚤水調服多者可少之者可無

又紫似近帶三寸連皮子燒存性細研砂糖拌乾吃
入硃砂尤妙

瘡發起時以蔥實子為末蚤調貼顛門去兒
眼障之患

瘡初出頂看胸前若稠密急宜服消毒飲加木豆茶
紫草減食者加參

瘡初出之時色白者便當大補氣血參木芪芍
升黃甘木丁歸白芍如大便泄加訶慈

初起發時自汗不妨蓋濕熱重故也甚者當以
參芪芍黃實毒之藥防其難癒也

初起發時煩躁語狂渴引飲若飲水則後來
屬不省意以涼藥解其標如蒼朮散之類

凡瘡瘡已出可少予化毒湯出不快者加味四聖散

紫草飲子 紫草木香湯 快班湯 雞爪湯 類
瘡出稠密甚者 人參敗毒散 犀角地黃湯

凡瘡瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解

之酒炒芩連之類全數服亦不妨庶無害眼之患

治痘大法 活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑

兼而治之此平治之法也 滑如春 歸木 葦涼 如

前首升 華伏 以芎 白芍 枳 桔 菴 通 紫草 屬

顏色正者以前法平治則在將成就脚色淡者宜助

血系 歸芍 酒芍 之類或少加紅花以活血色將成

就除脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛

根湯炒芩連及連翹之類甚者必用犀角蓋犀

角大解痘毒

○消息大小便如小便赤淡者大便稠濁 甘露飲大

便秘結內煩外熱者小柴加枳殼或少服四順清涼

飲子

大便黃黑色其毒氣已盛不可多與劫劑但少用

化毒湯可也若二便一有秘結則腸胃壅遏脈結

氣滯毒氣無從發泄自閉聲啞肌肉瞤運不

旋踵而變矣

天扭毒利小便且五苓散通利赤散小扭毒解毒宜清

毒飲四聖散

○按陳氏不香散異功散乃從治之法又謂之扭因扭

用也蓋痘瘡熱毒拂于內而不得起發故用丁

附木 荳蔻 桂 辛 散 劫 爵 之 劑 三 服 劫 而 用 使

爵于內者因藥氣而發越于外故臨伏灰白色者

皆翕然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如二

服後劫不起者亦不可多與多則反其毒轉增黑

爛咽閉聲沉而死

○凡痘瘡灰白色白淨者作寒紫黑色者齊瘡

者煩躁者作熱黑屬血熱涼血為主白屬氣虛

補氣為主甲黑臨而外白起得遲者則相宜而治

○凡痘瘡氣虛者參木加解毒藥血虛者四物湯

加解毒茶調炒芥連各解毒

○凡痘瘡至令氣血虛實大抵多屬氣血不足有
下
概外邪而實者少加防風等藥

○瘡乾者且退火止用輕清利荊芎升首烏類
瘡溼者肌表間有濕也且浮濕芷風類蓋風藥
能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃杏仁湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○凡痘瘡當分表裏虛實吐瀉少食為裏虛

不吐瀉能食為裏實裏實而補則結毒毒

陷伏倒靨灰白色者為表虛紅活凸綻者為表實

表實而復實其表則潰爛而不結痂也表虛不

起發者或用燒人屎驗

○黑陷甚者用燒人屎別用無病小兒糞燒存性

蜜水調服一方用人猫猪太四糞於臘月燒灰
名萬金散

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者備炒

春紫草人參等藥

○陷入者加味四聖散更以胡安酒薄付其身厚付

其足噴其床帳衣被併以厚綿衣蓋之若未起

獨聖散入木香煎服若其瘡已黑可用宣風散

加青皮

○鐵氏云黑陷青紫者內祥丸下之不至者換勿下

又半後身熱氣溫欲飲水者可冷水澀不消或寒

戰者為逆又云內祥丸恐太峻當以宣風散代

浮後溫解用炙甘草木等分朴木各減半為妙

○痒塌者實則脈有力氣壯虛則脈無力氣怯

虛痒實表之利加涼血藥

○瘡痒如大便不通者加大黃等藥少下下其結毒

氣怯輕者用淡蜜水調滑石末鴨翎刷瘡上固

○將腐時全白色如豆豉者蓋因初起時飲水多其腐不有名曰倒腐不好宜服實表之藥及消息二便

○瘡已出而聲不変者形病也
○瘡未出而聲変者氣病也宜補肺散加生耆
○瘡出而聲不出者形氣俱病也身温者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸也

○形氣俱病稟賦素弱者宜預服十奇散倍時少加木香煎服

○陽證足旺熱腮紅大便秘小便澀渴不止氣急脈洪數已上證不可服熱藥瘡疹及發便密如蚕刺種布者宜清表連翹升麻湯瘡出不快清便自調知其在外升麻首根湯若瘡乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下直風散如表大熱者不可下黑陷甚者百祥丸若瘡已發稠密微喘渴飲水宜微下之當歸且

及麻地黃膏外以黃柏膏塗面佳

○陰證定旺冷脈虛脹黃青面皖白吐乳食自晴青脈沉微已上證不可服寒藥瘡出四肢逆冷或自利且急温異功散附子理中湯調中也瘡瘡平塌灰白色不澤此正氣不足宜補托散散倍耆加附或四肢厥逆時搗搗宜温異功散加青風或和中散去首耆加附桂

○肺氣不足證自汗聲不出瘡頂陷塌不綻肥並宜汗奇散自汗倍耆聲不出倍耆

○心氣不足證灰白色根葉不紅不光澤並宜芎歸湯加芍紫草紅

一瘡瘡日教輕重

○瘡瘡二三日始見微紅欲出如粟黍米或如粟豆或如水珠光澤明淨者佳

○西日五大小不等根葉紅光澤者輕稠密陷頂灰白色陷而浮者重

六日瘡形肥紅光澤者輕身扭氣喘口乾脈
脹定指令者重

八日九日長足肥滿瘡蠟色者輕寒戰同亂腹脹
煩渴氣急咬牙者重至也

十日十一日瘡當結腦疔之欲落時將愈

十二十三日當腐而不腐者為逆身扭稍利以防

其餘毒身不壯扭或腹脹或浮渴用十二味異功

散救

一瘡出不快者有五證

一證天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫

裏紅班初見宜用五積散正氣散參蘇飲調解散

木香散

一證尖身者隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散

煎生地門冬調服身扭甚者小柴加生地煩渴而使

實者白朮加人參溫軒有人參竹葉湯加生地煎服

一證服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中養氣

宜理中湯吐利甚者加附或異功散木香散巨勝丸

一證或成血疱一事尚是紅點此毒氣發越不透必

不能食大便如帶者宜半溫中養氣助養利用四

聖散加減及紫草木香湯絲瓜湯阮氏萬全散

湯氏母班湯

一證外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄

固出不快宜消毒飲透肌散如大便秘於消毒飲內

加大黃梔子煎服瘡出太稠宜犀角把黃湯解毒

防風湯血氣不足十奇散咽嗝不利如聖湯加松

奇中氣扭咽痛口舌生瘡宜甘露飲子

一解肌清熱利

傳 手風散 治風扭瘡疹變毒吐熱疑似之間皆

宜服木炒 桔細參苓可 括各三 石入薄

奇三片煎

所麻葛根湯 傷風身扭未明一瘡子不瘡宜服

如既出不可服 葛升芍甘 石等分水煎

木香參蘓飲

參三分 蘓桔 葛 前各一分 陳苓 各半各一分 枳炒三分

木一分 半一分 右作一服加生姜三片

解毒防風湯

風一分 地骨 春生 芍 荆穗 鼠粘炒各一分 右水煎或為末湯調下

消毒飲精 痘疹欲出及未出已出粗末解急宜服

牛三分 荆一分 甘半 風半 右水煎加犀末元炒

一溫表補氣血之劑

十奇散 即托表十補散 又名十宣散

春 參 歸 冬 二 枳 桂 各 一 分 芍 風 甘 其 各 一 分

右為末每服一錢或二錢溫酒調下水煎亦可

補肺散

膠一分 牛炒三分 馬兜半 甘二分 杏三粒 糯一分

加春生 右水煎食後服

芎 芎 湯 歸 芎 右 等 分 水 煎

一散寒溫表之劑

伍精散

苧 芎 各 三 分 枳 半 芍 苓 甘 冬 歸 桂 半 各 二 分

陳 去 白 枳 殼 炒 麻 玉 根 節 蒼 君 一 姜 炮 各 一 分 朴 四 分

右除桂枳二味別為末外十三味細切慢火炒令

轉色攤冷次入二味作一服水一盞半入姜三片煎

一盞去粗煎服

正氣散

朴 半 各 半 剉 各 各 一 分 陳 葉 僅 玉 梗 木 各 半 甘 各 三 分

右作一服加姜三片大棗一枚水煎

調解散

青 陳 枳 殼 炒 枳 殼 參 半 芍 通 首 各 四 分

甘 蘓 各 二 分 右作一服加姜三片大棗一枚草糯米

一補中溫養之劑

四君子湯

參 木 苓 各 一 分 甘 半 右加縮陳名六君子湯

和中散

朴善射名砂木半斤 姜炮 甘各三分 右加姜一片水煎

理中湯

參各三分 甘各三分 木各三分 姜炮 右作一服加炮附三分 甚者五分

木香散

木腹參 桂青 赤苓 前 訶煨 半 丁香

甘各三分 石作一服加姜三片末一枚水煎

異功散

木煨 附三分 丁香 右作一服加姜三片末一枚水煎

調中丸 附三分 右作一服加姜三片末一枚水煎

調中丸

木炒 參 甘各半 姜炮 右為末煉蜜丸如葶水

豆太溫水食前送下

肉苳菴丸

木縮 白龍骨 訶肉各半 赤石 柘各七分

寇半西錢 右為末麩糊丸如黍米太每服三十九丸

功散送下

一清肌涼血之劑

犀角地黃湯林 瘡疹出大盛者以此解之

犀鎊 生地 牡 赤芍各等分 右水煎

連翹升麻湯 即升麻首白根湯 加連翹一分

甘露飲子

生地 熟地並而洗 天門 麥門 枳各五分 枳炒

芥 斛 茵 苳 右水煎

紫草湯一名紫草木香湯 治痘出不快及大便自利

紫木 苓 木各一分 甘各一分 石作一服入糯米百粒

四聖散林 治痘出不快及倒靨

紫草 苳 木通 枳炒 甘各一分 右水煎

透肌散一名化毒湯每服三

紫草 苳 綠升麻 甘各一分 右水煎或于消毒飲

同煎尤妙

如聖湯 治身熱如火頭痛頰赤痘瘡已出未出

並煎服 白芍 升 苳 甘 紫草 通

右每服二三錢姜三片葱白二根同水煎服性熱
心煩加參赤苓膏門

紫草木通湯 治痘出不快

紫參去毒通去毒苓糯米各等分甘減半 右水煎

紫蟬蛻治痘日可參通去毒芍甘各等分 右水煎

連翹散 治痘瘡發熱

翹風極甘各等分 右水煎

升麻湯 治斑在面

升一麻一射干一苓酒浸參各半甘各半 右

一和解毒利

小紫胡湯

柴二苓一參各一甘八分甘半 右加姜三片大

車二枚

人參白虎湯 一名化

知二真一膏一甘二梗五白加參二

竹葉湯

四兩參寸各三半四竹葉二 右每服五小內

梗米三十粒加膏二名竹葉石膏湯

五苓散

澤二木一赤苓猪桂半 右為末白湯或

清米飲調服或加姜末煎服亦可加辰砂半

名辰砂五苓散

一通便利

紫霜丸 方在變

當歸丸 痘疹欲行大便宜此

連一太二甘一 右先以當歸熬成

膏入三味末為丸如胡椒太三歲已下只十丸食前

清米飲下漸加以利為度

宣風散 枳二陳甘各半 豈丑四 右為末

蜜湯調服氣怯者加木香先下豈丑次

下稠糞後以四君子加朴木陳末湯服和胃良

黃黃瘡自出透

百祥丸

紅牙大戟 陳乳水為軟去骨乳復 右一味蒸餅丸如粟
未太每服三十九丸赤芝麻湯下

一痘毒攻口舌

加味犀角消毒飲 治毒氣壅遏壯熱心煩痘疹
雖出未能自透口舌生瘡不能吮乳

犀三兩 荆穗 門桔 各五 甘草 各一 風升 各七
炒研

犀 三兩 右水煎

射干湯 治痘疹後身壯大便硬口舌生瘡咽喉

腫痛 牛 二兩 升甘 射干 各三 右水煎

五福化毒丹 治瘡疹餘毒上攻口齒

參 玄參 代參 甘草 牙硝 枳殼各 苓 枳 各

腐腦 各半 一方無腦子有金銀箔

右為末煉蜜丸每兩作十二丸一歲吹一丸分作四

服用薄荷湯化下

口舌生瘡者蜜漬黃柏汁飲之

一痘疹入眼

決明散

草決明 赤芍 天花 甘 各等 為末食後茶清調下

撥雲散

羌 國 柴 甘 各等 為末水煎服或薄荷湯茶清

或菊花苗煎湯調皆可

蟬菊散 治斑瘡入眼或病後生翳障

蟬 白菊花 各等 右每服二匙水一盞入蜜少許

煎乳食後吞之屢驗

朱明丸 治痘疹入眼赤白障翳遮睛但瞳子

不陷者可治

石決明 椒 芍 枳 各一 蒼 五 加黃連 右為末

用兔肝爛搜和丸如粟豆大每服三十九丸食後

臨卧米泔下

蟬花無名散 治瘡疹入眼

苓 甘 冬 風 各四 石決 鹽水煮 芍 羌 歸 各等

赤芍 十三 茯苓 炒去皮 蟬 去頭足 蒼 炒十二

蛇蛻 西 右為末食後未時調服茶清亦可

洗方 黃連 對 白滑石 研 銅青 研 右縮包泡湯

假溫洗眼

治出疹眼內有翳 輕粉 黃丹 各等 石研勻丸

眼翳吹入右耳內左吹丸

一瘡後餘毒

瘡癰者毒氣當出而不得出流於脾經則腐發

四肢手腋膝臍腫痛或頭項胸脇赤腫宜清毒飲

或五香連翹散解了未成膿者小柴胡加減用

重者或面赤便秘或渴嗽喘驚尿赤後十六日

氣飲加附或加大黃

如稟受性弱腦後面青不能飲食身體倦怠

無扭證字調平茶食不可一於解利也虛

則十補湯加枳桔

瘡後瘡毒不同發於何經初起紅腫時即用黑

菜赤三豆以嚴醋浸研搗以鵝翎刷之効

必勝膏 馬齒莧 并打 猪脂 石蜜 右共熬為

膏塗腫處

蚬子水 蚬子 活者以水養五日取水

毒氣入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘結宜用

犀角地黃湯 身煩熱渴宜黃連解毒湯加煎

為小量氣湯下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸

駐車丸

瘡後二旬不大便其毒煤作痛用太芒枳巴等

毒塗身及服香油一碗便不通令婢以真麻油

含口內用小竹筒內穀道中吹油入腸內須臾即通

清毒飲 在前

五香連翹湯

乳木 瓜丁 翹 射干 升 通 桑寄生

獨太 腐 各等

水煎

小柴胡湯 在前

十六味流氣飲

參 春 歸 各一 芎 桂 朴 芷 甘 風 烏 梅
芍 枳 木 各半 桔 三分 蘊 一分 石 水 煎

氣血虛而自利者加熟附大便實加大黃

十補湯 一名十時散 方在前

黃連解毒湯 連 一 苓 柏 枳 各二 右

水氣湯 太 一 朴 實 各三 右

小黃連阿膠丸

白豆蔻 苓 訶 各一 連 微炒 右為末阿膠一兩

醋煎和丸如粟米大一歲兒十粒未湯下

駐車丸

連 三 兩 膠 湯 各一 姜 二 兩 右為末醋糊丸未餅下

若又瘡疹後再作瘡疹者此餘毒未寒也宜解利

氣血虛者未可解利

一中地風

瘡疹愈後忽遍身青或黑手足厥冷口噤

延喘如鋸者此名中地風蓋瘡疹方愈榮衛

尚弱而暴感時令寒暑風雨地氣毒氣龍

虛而入致宜消風散 入蟬蛻末 二分

服酒生薑之薄苛汁數點湯調二三服立醒或

少汗而解或再出應疹而愈

消風散

荆 甘 炒各 陳 半 兩 參 苓 桑 炒 風

蟬 蛻 炒 芍 黃 各 二 兩 朴 卷 二 兩 右為末

一班瘡水痘 附溫毒發斑

以班駁瘡毒之病俗言瘡子是肺胃有積

也其肺胃蘊積積毒或以時氣所作童叟發於

膚狀如蚊蚤所咬故赤班遍體也凡發赤斑者

十生二死發黑斑者十死一生

又小兒時氣咳嗽聲重涕唾稠粘目眶赤頰

熱渴躁此則肺胃蘊積積毒發則易出一出遍

於肌皮之上如泡子見而漸沒病在表之毒是也

此名瘰子亦名膚瘡俗曰麻子
或時行溫毒扭氣薰蒸病在重衣受毒之深發於
膚遍体狀似錦紋或如虫咬痕類小豆大或赤
或黑是曰斑也

又有水痘一證与正痘不同易出易腐不宜深
濕或濕亦不為害但不能結痂則爛成疔瘡

陽根麥門冬散 治小兒扭毒發斑或赤或黑頭

痛壯熱心神煩悶

葛門各三 參升 甘冬 赤苓 赤芍 各二

真膏半西 右水煎

生地黄散 治小兒瘰子身熱口乾咳嗽心煩

生地半西 門各七 杏炒 欬陳各三 甘藤各二 右水煎

麥湯散 治小兒水痘

麻去節 太溫紙果 知羞 甜葶藶 腦紙

參各一分 滑地骨炒 甘各各 右為末每服半錢

水一小盞入小麥七粒同煎溫服

補

傷寒溫熱病而發斑如錦文者曰發斑皆扭毒
之所致也是皆冬應寒而反溫人受不正之氣

故至春夏而發為斑爛陽脈浮數而陰脈實大
者名為溫毒治法用化斑湯升麻葛根湯玄

參升麻湯黑奴丸黑真膏等類

丹溪曰發斑屬氣熱挾痰而作通聖散中消息

戴咸曰有色點而無顆粒者白班

內傷發斑者胃氣極虛一身之太遊行於外宜

補以降之

化斑湯 即白虎加入人參湯 升麻首烏根湯 在前

玄參升麻湯 治溫毒發斑咽痛煩躁謔語

升玄參 甘 各半 石水煎

黑奴丸 治溫毒發斑煩躁大渴

芩 釜底煤 芒 麻 梁上塵

灶突里 小麥奴 各一 大黃 一兩 右為末煉蜜丸

如彈子太新汲水化服如不渴不可予此藥
。黑膏 治溫毒發斑 凡冬月大溫人受不正之氣
至春發斑脉浮散屬陽沉伏屬陰用此消疫毒
生地半斤 香豉一斤 石細切以猪膏二斤合煎
取濃汁如膏用雄黃射香如豆大內中攪和勻
每服用彈子太白湯化下

陽風通聖散

風 芎 歸 白芍 太芒 麴 芍 麻各四分
膏 桔 苓各八分 木 樨 荆各二分 滑二不四分
甘各二分 石加毒水煎
犀角消毒飲 治發斑癰疹等証
牛 芩 荆 穗 風各二分 甘一分 犀一不鑄亦可
湯煎

右水煎調犀末服

解毒防風湯 在前 治發斑及癰疹痒痛

陰毒升麻鱉甲湯 治陰斑

升二不 歸 甘各一分 蜀椒二不 鱉各一分 雄四分
另研

右水煎調雄末服

加味羌活散 治感四時不正之氣發癰疹

羌 前各一分 參 桔 甘各一分 枳 殼 砂 天 麻 芎
苓各半 蟬 芎各三分 右作一服加姜三片
調中湯 治內傷外感所發陰斑
蒼 一不 陳 一不 縮 茶 雀 芍 焙 甘 各 桔 半
苾 羌 枳 各 七 分 芎 五 分 麻 去 節 枝 各 三 分

右作一服加生姜三片

加味敗毒散 治瘟疫及癰疹等證

獨 前 柴 芍 枳 桔 參 苓各五分
甘 芎各二分 加 本 風 荆 蒼 歸 芍 生 地各五分
石作一服加姜三片末二枚此因虛而感風濕致
發斑者服之良

一乃子婦痘瘡

凡孕婦發痘宜單胎散
胎動不安宜獨聖散安胎飲

身熱甚宜木香參蘇散

或瘡稠密宜升散倍芍歸減桂加黃芩

如胎已五月則桂心半夏屬俱不必禁

厚胎散 赤苓 木歸 白芍 赤芍 葛

北柴 參 桔 條 芩 風 陳 荆 枳 紫草

膠 糯米 甘草 縮 大熱加前金

若作一服水一盞半煎至一盞乳柿帶七箇野

苧根七寸甜瓜蒂一个用銀器煎以荷葉解定

熬至八分去粗仍用荷葉蓋復空心溫服

獨聖散 用連殼縮砂慢火炒去殼為末每服半

匙煎酒調下胎動則服之後覺胎動則去

母胎飲 腹 再為三汁洗 參 陳 木 白芍

歸 芍 香附末 縮 薏 苓 甘草

石作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮煎一盞

食前溫服

一痘瘡膿汁不乾

傳

蓋瘡出太盛表虛難騰以致膿水粘衣者席

濕痛不能轉側宜白龍散敗草散等附

白龍散 黃牛薑 日乾火取成灰取心中白者

為末帛裹撲之

敗草散 用蓋屋及牆背上遠年腐草洗淨

焙乾為末帛裹撲之及鋪床席上佳

或以麥麩摻席簾上可

一惡證

疔癩寒戰咬牙渴不止 痘紫黑色喘喝不

寧灰白色陷頂腹脹 頭溫足冷胸亂飲水氣促

世得渴

瘡正出而吐利者困 出而謔語不止者惡候

便血而乳食不化者脾虛已死 浮血而瘡爛

無膿不治 大小便秘目閉声啞肌黑者死 遍

身黑陷目閉無魂者死 面色青黑者死 後

後發驚者危 面黑或鼻有黑氣不治

瘡

渴尿後世浮不食者危 頭面腫痛 疔毒 疔
爛不可近 或足冷至膝不消 面腫鼻陷 齒
咬牙不消 疔瘡黑焦 風攻頤頤頤頤頤頤頤頤
胸膈高寒不消

一室中禁火 并穰法

避風寒 帝和暖 忌生冷 忌開諸穢氣 忌

與外人 忌犯房色 忌近月水婦人 陳臭者

直燒黃蒼木以辟惡氣 燒木香亦佳 勿燒

檀降真乳香 腦麝

憚帳之內 宜懸胡多或以胡多漬酒噴床帳

疔瘡最怕穢惡之氣 解犯

一疔不出方

凡值天時不正 婦隣疔瘡 盛發宜服禁方

不出方 巨豆湯 油飲 鳳龍膏

巨豆湯 赤豆 大黑豆 苜蓿 各一升 甘草 三四

右三豆淘淨用水八升煮豆熟為度 逐日空心

任意食豆飲汁七日水不出

油飲子 真麻油 一升 逐日飲之 水不出

已上三方出扁鵲 倉公方

龍鳳膏

烏雞卵 一箇 地龍 一糸活者 右以雞卵用下竅

入地龍在內夾皮紙糊其六竅飲鍋上蒸熟去

地龍子兒食之 每歲立春日食一枚 終身不出

疔隣里有此證流行時食一二枚亦好

一雜方

廉氏地黃膏 瘡已發稠密微喘湯飲承以此微下

生地 四兩 豉 半升 雄 一糸 麝 半 右以猪膏一斤

和勻露一宿前五之佛令三分去一紋去粗下

雄黃射香攪勻稍飲之 毒從皮膚中出即愈

黃柏膏 瘡已發稠密用此塗面佳

柏 二兩去粗 苴 二兩 甘草 四兩 右為末以生芝麻油

調後耳前至眼距厚塗之 日三二次如用

令瘡不至面縱存亦稀少 林三方有紅花三四又云或乳胭脂連服四時亦

林 周天散 治痘黑陷脈脹直視喘急發搐

蟬退 五名 地龍 二名 右為末每服半錢太兒一錢

研乳香湯調下連進二服愈

奇方 治痘出不透腹痛甚或黑腐者

蟬蛻 五十五个洗 右為末每服一錢白湯調下腹

痛立止乳母亦可服一丸

人齒散 治痘初出先壯忽然黑陷心煩性躁

氣喘妄語或見鬼神不速治毒氣入臟必死

人齒 燒存性 右為末每齒作一服酒下

傳 活血散 治痘未出已出項躁及瘡發身痛者

白芍 一味 為末每服一不溫水調下止痛酒調尤驗

痘四服出不快加防風 二方用赤芍

虎骨萬全散 林非 治痘出不紅潤

風參 蟬 各等 右每服四錢水一盞薄荷三

葉煎六合溫服煎而實者加升麻

綠瓜湯

絲瓜連皮子燒存性為末每服一抄時用米湯

調服此物發豆瘡最妙或紫草甘草煎湯

調服最可

又羚羊角一枚剉尖為末酒調服方寸匕

又大麻根三莖水一升煎半升頓服之產衣不下亦可

治難產 珍珠末一兩和酒服之立生

又赤小豆生吞七枚即生

治橫倒梁上墜酒服方寸匕

治橫產鐵杆搗末者是也若無用斧或銅秤錘亦可右燒令赤投酒中飲之

自然順生

治難產及胞衣不下人溺一升用葶苈各一分煎三四沸乘

熱飲便下

治倒產子死腹中艾葉半升酒四升煮取一升服

惡候難產惡証身重熱作寒面黑舌青及舌上冷子母俱

死面赤舌青母活子死面青舌赤口沫出者母死子活唇口

俱青吐沫子母俱死

婦 舌下脈青黑而反卷冰冷者子母俱死

婦 一胎衣不下母生子訖流血入衣中為血脹故不下但服奪

命丹逐衣中血散脹消衣自下

芍藥 黃芩 芍藥 黃芩 芍藥 黃芩

石方 石方 石方 石方 石方 石方

賊甲 箭 檉皮 三 三 三 三

事 多 疏 系 孔 香 二十三名

右水煎連進三四服立下

如聖旨治胎衣不下又下死胎

草麻一兩雄二枚研成膏塗母右足心繞下即洗去

治胞衣不出婦人視面復井口立下本婦人者佳

又燒鐵杆令赤投酒飲之

又牛膝八兩葵子一兩水九升煎取三升分三服

一方血道閉胎衣不下黑豆一合炒熱入醋一盞煎三五

佛去粗分二次服仍取鞋底炙熱熨小腹上下三五次

一方米麥赤小豆同煮濃汁服之出

又羚羊角二枚剉火為末酒調服方寸匕

又大麻根三葉末一升煎半升頓服之產衣不下亦可

治難產 珍珠末一兩和酒服之立生

又赤小豆生吞七枚即生

治橫倒梁上墜酒服方寸匕

治橫產鐵杆搗末者是也若無用芥或銅杆錄亦可右燒令赤投酒中飲之

自然順生

治難產及胞衣不下人溺一升用姜葱各一分煎三兩沸乘

熱飲便下

治倒產子死腹中艾葉半升酒四升煮取一升服

惡候難產惡証身重解熱作寒面黑舌青及舌上冷子母俱

死面赤舌青母活子死面青舌赤口沫出者母死子活唇口

俱青吐沫子母俱死

舌下脈青黑而反卷冰冷者子母俱死

一胎衣不下母生子訖流血入衣中為血脹故不下但服奪

命丹逐衣中無散脹消衣自下

奪命丹 附 炮半兩 牡 二兩 干漆 二兩炒相盡 右為末醋

一升熬大黃末二兩或膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫

酒吞下衣爛下

倉卒無此藥直朴稍散 舌在胎死部

一方紅花一兩酒煮濃汁服之

一方皂角棘燒末每服一不溫酒調下

治胞衣不下 膝 二兩 婦 一兩 通 三兩 滑 四兩 葵子 二兩

右水煎連進三四服立下

如聖真膏治胎衣不下又下死胎

草麻 一兩 雄 二兩 研成膏塗母右足心繞下即洗去

治胞衣不出婦人襪覆井口立下本婦人者佳

又燒鐵杆令赤投酒飲之

又牛膝 八兩 葵子 一兩水九升煎取三升分三服

一方血道閉治胎衣不下黑豆一合炒熱入醋一盞煎三五

佛去粗分二次服仍取鞋底炙熱熨小腹上下三五次

一方米麥赤小豆同煮濃汁服之出

地黃 麥冬 十棗 芍藥
 海狗 青皮 藜蘆 甘遂 礞石
 石脂 石炭 貝母 礞石 白芷
 賊甲 箭 檢白皮 三棱 烏氏
 事考 硫系 乳香 三七 各研