

醫
學
叢
書
五

×

i 17

田中素之先生

市村七刻

田中素之

10冊 { 490.9
I 9-5
1

No. 2032
18 j 17



富士川文庫

1270

荆艾茵陳可并用莖葉

白酒

九折堂山田氏圖書之記

白汗

鄉堂篇養生秘訣

千金養性篇

暮臥閉口

養生訓

遠行備急

服瀉湯說

五更瀉

四時用藥之異

古尺

仲景權量

肘后脫逸

卒死吹散

卒死中惡尸厥客忤鬼擊等

肘后吹鼻方

脚湯田 肘後多用此法方

服鹽方

古貴生姜

肘後存疑

雞卵湯

黃連解毒湯

蠶證用蠶甲

痘古屬傷寒

水飲病有裹果

人身憑一氣之通塞

褚氏遺書多確言

案紫蘇亦當

並用莖葉

中言紫蘇莖

葉蘇梗者甚

多

外臺卷十救急

療肺氣積聚

心肋下滿急發

即欬逆上氣方

中用乾蘇莖

葉十合

又崔氏療上氣

暴欬方中用

紫蘇莖葉

劉十廿六

荆芥茵陳當用莖葉

天保庚子十月十七日

荆芥茵陳藥舖多帶實而不用莖葉今

攷古多稱荆芥穗茵陳亦未聞用子本草綱

目荆芥揭莖穗之功茵陳舉莖葉之功是知

二物不當專用子也世習而不怪因述之耳

本草衍義卷十假蘇荆芥也只用穗

薄荷亦夏秋採莖葉曝乾蘇頌可考

藿香古惟用葉今枝梗亦用之因葉多

偽也本草備要卷二

荆芥茵陳當用莖葉不可專用子

清酒、鄭注、事酒、酌有事者之酒、其酒則今之醪酒也、昔酒、今之酋久白酒、所謂舊醪者也、清酒、今中山冬釀、接夏而成、賈公彥正義曰、昔酒者、久釀乃熟、故以昔酒為名、清酒者、此酒更久於昔、故以清為號、又曰、其酒則今之醪酒者、事酒冬釀、春成、以漢之醪酒況之、云昔酒、今之酋久白酒者、言昔為久、酋亦遠久之義、故以漢之酋久白酒況之、但昔酒對事酒為清、若對清酒則為白、故云酋久白酒也、疏卷五ノ十五才十六才

白汗 庚子十二月十九日

金匱大烏頭煎主治寒疝、脇痛、若發則白汗出、手足厥冷、其脈沉緊者、大烏頭煎主之、原作白津

外臺作程林注以為冷汗也、按素經脈別論、真虛

痛、心厥氣留薄、發為白汗、千金方廿七道林養性

弟二兩手摸空白汗流出口、唱皇天、無所逮及、淮南

脩務訓、奉一爵酒、不知於色、挈一石之尊、則白汗

交流、注言其重也、楚策四、夫驥之齒至矣、服鹽車

而上太行、蹄申膝折、尾湛肘潰、漉汁灑地、白汗交

流、中阪遷延、負棘不能上、鮑彪注、白汗不緣暑而

汗也、以上並苦極汗出之義、為釋為冷汗、謬也、又生

脈經卷四診五
藏六腑氣絕證
候第三白汗不止
又云白汗出如流水

白汗

李白南陵別兒
童入京詩云白
酒新熟山中
歸黃雞啄黍
秋正肥呼童烹
雞酌白酒云
李白集卷
十五

唐孟詵食療
本草

白氏長慶集
卷十朱陳村
黃雞與白酒
歡會不隔旬

千金卷廿三癰
疽門以白酒煎
楊柳皮及煖
尉火之廿九
外臺廿四深
師內寒散方
後云先以新
成白苦酒置
新器中內赤
豆廿四十一
病源八十白
酒以桑枝煮
牛肉炙食并生薑

引李白詩云白酒始熟滯山中姚孝錫詩云白酒
黃雞亦易求而成章以為是薄酒也其說亦脆
揣然詩意言忽卒易求之義我可見也畢竟白
藏漿亦未詳米醋否余異日欲試代用俗間濁
酒而未果

千金十二卷安方病園方後云服藥忌陳臭生冷
酢滑粘食大蒜猪雞魚狗牛馬驢肉白酒行
房按此酢与白酒並載之因讀千斯
證類本草獸部中品白馬莖下引食療云食
諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加千金食
治篇作諸食馬肉心煩悶者飲以美酒則解白

酒則麪是知白酒即濁酒可以確愚說也余鸛
酒疑濁酒之說然未有所據後檢證類本草得此說喜而不
能止蓋從前之疑腐一朝冰釋豈不愉快哉不堪飲躍請於
斯

易貢卦白貢无咎

醫心方服石鍾乳法十六引極要方云不得眠嗔怒
及大喜恚房室勿飲白酒冷醋等物

飲白酒食生韭令人病增金匱見果實菜穀林忌并
治九二十五

醫心方卷六錄驗方治胸痛連背不得臥方大桔樓

實一枚搗薤白三斤切半夏半升洗生薑六兩切九物

切以清白漿水一斗煮取四升一服升六二九

周禮酒正辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰

清酒鄭注事酒酌有事者之酒其酒則今之醪酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醪者也清酒今中山冬釀接夏而成賈公彥正義曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒為名清酒者此酒更久於昔故以清為號又曰其酒則今之醪酒者事酒冬釀春成以漢之醪酒況之云昔酒今之酋久白酒者言昔為久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒為清若對清酒則為白故云酋久白酒也疏卷五十五才十六才

白汗 庚子三月十九日

金匱大烏頭煎主治寒疝繞臍痛若發則白汗出手足厥冷其脉沉緊者大烏頭煎主之

原作白津今從千金

外臺作白汗

程林注以為冷汗也按素經脉別論真虛

痛心厥氣留薄發為白汗千金方廿七道林養性

弟二兩手摸空白汗流出口唱皇天無所逮及淮南

脩務訓奉一爵酒不知於色挈一石之尊則白汗

交流注言其重也楚策四夫驥之齒至矣服鹽車

而上太行蹄申膝折尾湛肘潰漉汁灑地白汗交

流中阪遷延負棘不能上鮑彪注白汗不緣暑而

汗也以上並苦極汗出之義為釋為冷汗謬也又生

白汗

脉經卷四診五藏六腑氣絕證候第三白汗不止又云白汗出如流水

氣通天論魄汗未盡形弱而氣燥穴俞以開發
為風瘡王冰注汗出未止陰陽別論陰爭於內陽
擾於外魄汗未藏四逆而起則重肺使人喘鳴
王冰注丹爭外擾則流汗不止通評虛實論暴
癱筋綆隨分而痛魄汗不盡胞氣不足治在
經俞王冰注癱若暴發隨脉所過筋怒綆急
肉分中痛汗液滲泄如不盡攷古魄白通礼記
則去其皽鄭玄注皽謂皮肉之上魄莫也魄莫
即白膜可以徵魄汗白汗同義我更以王氏汗出未止
流汗不止汗液滲泄等解視之足知白汗亦流汗之
謂矣劉君桂山鄉有此說載金匱要略輯義我素問

藏等今復敷衍之以備參攷

白猶言汗白者白飲白湯白粥白粲白粉之白不

必深講

賈公彥周禮內雍食正義曰犬赤股而躁躁者
言赤股者股裏無毛謂之赤股非謂肉赤謂
若禮記檀弓流矢在白肉非謂肉白

疏卷四十六

千金方養性
篇可攷

暮卧開口 辛丑二月

千金方養性篇曰暮卧常習開口之開即失氣
且邪惡從口入久而成消渴及失血色業廣常侍
文孝公側公見公平生暮卧開口天保庚子公病亟
視睡中口開深為憂畏公遂薨頃讀千金想往
年之淪喪深服古言之不誣因識

史倉公傳齊中大夫病齟齬云々得之風及卧開口食
而不嗽

醫方攷卷二秘結
門曰秘結燥也
然有大燥有風燥
有水竭之燥有血
虛之燥從六合養
血清燥為上手
急處攻下通腸
為下手

千金服瀉湯說

千金卷一論治病略例篇曰凡病服利湯得瘥者此後慎不中服補湯也若初瘥氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之人不妨行走氣力未衰欲將補益冷熱隨宜凡散者可先服利湯瀉除胃腹中擁積痰實然後可服補藥也其原之重虛則不又卷廿七居處法篇曰凡畜手力細累春秋皆須與轉瀉藥一度則不中天行時氣也又同房中補益篇曰人年四十已上勿服瀉藥常餌補藥大佳

服厚湯說

案肘後方卷二治溫疫方用大黃甘草麻黃湯
人芒消黃芩巴豆丸方後云家人視病者亦可先
服取利則不相深易也

本事方三論疝氣曰大抵此疾因虛得之不可以
虛而驟補藥經云邪之所湊其氣必虛留而不
去其病則實故必先滌所蓄之邪然後補之是
以諸方多借巴豆氣者謂此也

肘後方脫簡

外臺卷十一引千金治消渴二方並云肘後同逸
又引千金治渴小便小豆藿方云肘後同逸
又引肘後療消渴云小便數方逸
又引千金治嶺南瘴氣云虛滿而渴四味方云
肘後同逸

又浮萍丸云肘後同逸

又地黃丸引千金云肘後同逸

又治渴小便數方引千金云肘後同逸

又黃連丸引文仲云肘後同逸

又加減六物丸引文仲云肘後同逸

肘後脫逸

又主消渴秋麻子方引肘後才二卷中逸
又治小便數八方引肘後才二卷中逸

外臺卷七張文仲療卒腹痛方灸兩足指頭

各十四壯使火俱下良備急肘後同

今本卷一卒腹痛方中逸

又引備急療卒心腹脹滿又胸脅痛欲死方

枳實灸桂心石三味等分下篩以米汁服一匕

忌生葱肘後張文仲同並出才一卷中逸

又引肘後療霍亂苦絞痛不止方薑薑三累豉

二升合擣中分為兩分手捻令如粃熬令灼

尔更番以熨火臍中取愈云出才一卷

逸醫心方

引葛氏方

又療苦嘔不息方取雞白一虎口切以水三升煮令

得升半服之不過三度

又乾姜茱萸湯方乾姜切茱萸略二味以

水三升煮取升頓服之下不止手足逆必者加椒

百枚附子一枚炮水三升煮取一升頓服日出才

二卷逸

又療兩臂脚及胃脅轉筋者方煮苦酒三沸

浸氈裹轉筋上合少粉尤佳又以綿纏膝下

至足日出才二卷逸

又卷十一治少睡中遺尿方六首引肘後日出

才二卷中逸

外臺卷五勞瘵方引肘後療勞瘵瘵甲

酒逸

同卷八引張文仲五膈丸注肘後同逸

同卷十二療寒癖大黃甘草蜜東東四味方引肘

後逸

又引備急治魚鱸生肉成癖病大黃芫消二味

方曰肘後同逸

同十四引肘後療中風云紫湯方云出才二卷

中逸

同十五引肘後主狂言恍惚方灸天樞百壯

又引肘後麻子湯方逸

外臺引深師療噎方用鸕鷀喙曰肘後同

逸

又引肘後春杵頭糠置手巾角以拭齒立下

逸

又才八諸骨硬門引六方逸

諸卒死吹竅

救自縊死云、令兩人以管吹其兩耳、采好、金匱

救卒死方、令三人以衣壅口、吹其兩耳、極則易、又可以

筒吹之、肘後一

又方以管吹下部、令數人互吹之、氣通則活、同上

又方取雄鴨、就死人口上、斷其頭、以熱血灌口中、并以

竹筒吹其下部、極則易、入氣通下即活、同上

尸厥之病、卒死而脈猶動、云、方以管吹其左耳中、

極三度、復吹右耳三度、活、同上

案金匱肘後千金等所載、皂莢末、半夏末、吹

鼻中、或雞冠血、吹鼻中等、藥方雖殊、而皆

卒死吹竅

取氣也通与吹耳中下部蓋義同也

又方、熨其兩脇下、取竈中墨如彈丸、將水和飲之、須臾三四以管吹耳中、令三四人更互吹之、又小管吹鼻

孔、梁上塵如豆著中吹之、令人差同上

治卒魔寐不寤方、以蘆管吹兩耳同上

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡、此五絡皆會於耳中、上絡左角、五絡俱竭、令人身脉皆動而形無知也、其狀若尸、或曰尸厥云、不已以竹管吹其兩耳、易其左角之髮、方一寸燔治、飲以美酒一杯、素問繆刺論

火醋薰鼻法

匡方考六

凡感冒臭穢瘴毒
暴絕者名曰中惡
不治即死宜燒
炭火一杓以醋沃
之令患人鼻受
醋氣則可復甦
甦既甦以感胃
門薰香正氣
散主之
禮拜法同上
凡遇屍喪訖
古廟入無人所
居之室及造天
地鬼神壇場
歸來暴絕面
赤無語者名
尸症又亦曰鬼

肘後方所載曰中惡曰尸厥曰客忤曰鬼擊曰飛尸遁
尸停尸名雖異而其實則不出外來內發陰陽二
氣乖戾之義茲抄其文以備攷核更究其所用方
法吹竅吹藥灸法等亦皆不出通氣法當參伍錯
綜以味其旨耳

凡卒死中惡及尸變皆天地及人身自然陰陽之氣忽
有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶
可治而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於
其間故亦可以符術而獲濟者 卷二
客忤者中惡之類也多於道間門外得之曰加
卒死中惡尸厥客忤鬼擊飛尸遁尸停尸

症即中出之謂

也進藥便死宜

移患人東首使

主人焚香北面

禮拜之更行

火醋熏鼻法

則可復甦否

者七數逆血而

死

尸症

孫思邈曰凡中尸

者飛尸直尸風

尸注也今皆取

一方治之

飛尸注十六

事方

扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法恐非庸世所能

故不載而此病即今人所謂中惡者与卒死鬼擊手

亦相類為治參取而用之

客者客也忤者犯也謂客氣犯人也此蓋惡氣治之

多愈雖是氣來鬼鬼一作毒厲之氣忽逢觸

之其衰歇故不能如自然惡氣治之入身而侵剋藏

府經絡差後猶宜更為治以消其餘勢不尔亟

終為患今有時輒發

鬼擊手之病得之無漸卒著如火刀刺狀胸脇腹內絞

急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼排

同七方

病源廿三中

惡候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

尸尸候

今巫實見人忽有被鬼神所擺拂者或犯其行伍或

遇相觸突或身神散弱或行心負所貽輕者因而

獲免重者多見死亡猶如燕簡輩非為虛也必應

死亦不可要自不得不救尔

五尸者其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸旁攻兩

脇或硬塊涌起或赤手引腰脊

雖有五尸之名其例皆相似而有小異者凡五尸即身

中屍鬼接引也共為病害

尸注鬼注病者葛云即是五屍之中尸注又挾諸鬼

邪為害也其病變動乃有三十六種至九九種大略

使人寒熱淋瀝恍惚不的知其所苦而無處不

惡累年積月漸就頓滯以至於死後復傳之旁人乃至滅門覺知此候者便宜急治之同

按是注病非暴卒之病特係五尸中因客熱則

五尸

本事方七十二

葛洪云鬼症者是五尸之症之急治獺肝一具宜和間天
慶觀一法師行考校極精嚴時婦人投狀述患人有
祟所附須臾至附語云非我為禍別是一鬼亦因病
人命衰為病爾渠今已成形在患人肺中為患食其
肺系故令喘聲嘶師掠之曰此鬼還還有畏忌否久而無
語再掠之良久容某說惟畏獺爪屑為末以酒服之則去
矣患家如其言而得愈此等所見也究其患亦相似獺爪

吹鼻中方

才九卷有補遺

救卒死方取皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣
肘后一

扁鵲法又云半夏末如大豆吹鼻中

同

又張仲景諸要方割丹雄雞冠血管吹於鼻中

同

同

救卒死而張口及折者未手足兩爪後一目閉者騎
牛臨面搗薤汁灌之耳中吹皂莢鼻中立交

同

金匱同

張仲景云尸蹙足脈動而無氣氣閉不通故靜然
而死也以菖蒲屑內鼻兩孔中吹之同
肘後吹鼻中方

同三

又方小管吹鼻孔梁上塵如豆著中吹之令入差

治鬼擊方以淳酒吹入兩鼻中

同六

治卒魘寐不寤方末皂角管吹兩鼻中即起

三四日猶可吹同八

又方割雄雞冠取血以管吹入咽喉中大效同八

又方末竈下黃土管吹入鼻中末雄黃并桂吹鼻

中並佳同八

又方取韭搗以汁吹鼻孔同八

又方擣雄黃細篩管吹納兩鼻中桂亦佳同九

又方菖蒲末吹兩鼻中同九

毒病後若生瘡有者燒豕二七粒末內管鼻

中以吹之同二五

比歲又有虜黃病者若初覺便作苾蒂赤豆散

吹鼻中黃汁出數升者多差同二六

赤散方牡丹五分皂莢五分炙之細辛乾姜附子各三分

肉桂二分真珠四分躑躅四分擣篩為末初覺頭強

邑便以少許內鼻中吸之取吐日二七

治卒啞不止方同四七

以物刺鼻中各一分來許皂莢內鼻中令嚏差

濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩

總病命卷五黃疸
目黃不除瓜丁散
瓜丁細末含水膏
豆許深入鼻中
黃水出盡為
度

外台卷四附錄
瓜蒂散方

云吹於兩鼻中
中云吹於兩鼻中

延年秘錄瓜蒂
瓜蒂散方

瓜蒂散方
瓜蒂散方

外台卷四附錄
瓜蒂散方

療黃疸瓜蒂散
瓜蒂散方

方用瓜蒂赤豆
瓜蒂散方

生林米丁香四味
瓜蒂散方

方後文与千金
瓜蒂散方

畧同而云俗人
瓜蒂散方

或使人以竹筒極
瓜蒂散方

力吹鼻中無不
瓜蒂散方

死者慎之
瓜蒂散方

冠宗龜曰熱湯
瓜蒂散方

助陽氣行經絡
瓜蒂散方

患風冷氣痺人
瓜蒂散方

多以湯洗脚至
瓜蒂散方

膝上厚覆使
瓜蒂散方

汗出周身然別
瓜蒂散方

有藥亦終假湯
瓜蒂散方

氣而行也四時暴
瓜蒂散方

泄利更宜冷膺腹
瓜蒂散方

疼深湯中坐浸
瓜蒂散方

其脉大自能飲食腹中和無病之在頭中寒濕
故鼻塞內藥鼻中則愈 金匱

治鼻衄至氣息不通方 千金六上鼻病

瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

治黃疸方瓜蒂秫米赤豆云病重者取如大豆

二枚內著鼻中痛縮鼻須臾當出黃汁或

從口中出汁升餘則愈病輕者如一豆不瘥間

日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死

大慎之 千金卷十

小兒諸黃方四首

外臺卷三十六引千金第五卷可攷 八十六

脚湯

藥治通義九ノ十二漬浴澡洗可攷

焚石湯

治脚氣冲心 金匱

救卒死而壯熱者方 同上

治卒心腹煩滿又胸脇痛欲死方以熱湯令灼

爾漬手足復易秘方 附後方

治卒霍亂諸急方 同上

可作灼之爾執湯著雍瓦中漬足令至膝

若兩臂脚及胸脇轉筋 同上

脚湯

次以鹽湯浸足乃愈十七

風搔遍身并艾濃煎湯淋

深或坐湯中

同十九

醫方考五眼疾

門云目疾者戒

沐頭宜濯之

崑崙此句者先

醫之格言也太極

之道動而生陽

靜而生陰沐頭

則上動矣必生陽

而損目况夫濕氣

難乾乘風而梳

拂不已則風濕

龍衣手首而併

明之少陽之經根

于足大指岐骨

間上貫于瞳子

竅足陽明之經

根于足中指內間

上貫于承泣易曰

水流濕火就燥若能以

溫水濯其兩足則頭目

間之熱邪亦能引之而

下况夫溫濯之餘膝理

疏泄又足以導經中之

治人書卷卷七

脚氣鋪灸為

佳服補藥與

用湯淋洗者

皆較自之大禁

取鹽一升半水一斗煮令熟灼之爾漬手足在胸

脇者湯洗之

治毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉者適寒

溫以漬足令踝上有赤許水止之同傷寒門

又方以稻糠灰汁漬足日

又方酒煮苦參以漬足差日

又方鹽豉及羊屎一升搗令熟以漬之日

又方細坐黃礬五斤以水三斗煮漬之亦治攻陰

腫痛日

又方作坎令深三赤少容兩足燒坎令熟以酒灌

坎中着履踞坎中壅勿令泄日

又方煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好日

又方煮馬矢若羊矢汁漬日

又方搗常思草絞取汁以漬足日

又方猪蹄一具合葱煮取滓內少鹽以漬之日

治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹欲絕方溫

湯令灼之爾以漬兩足及兩手數易之也同三十九

若腫從脚起稍上進者入腹則逆之治之方小豆

一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝已下日二

為之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小

豆食之也同三十九

又方削楮或桐木煮取汁以漬之并飲少許加小豆妙日

患赤目以熱水濯足佳若深浴必致失明醫說卷四

曾有士人得脚弱病云用杉木為桶濯足及全排樟腦於兩股間醫說卷八

引遜齋閑覽

遇夜濯足臥醫說卷九引脩真秘訣

大醉恐腹腸爛肘後七

作湯於大器中以漬之冷復易

杉作屑者煮汁浸洗脚氣腫滿令處有草本

衍義卷十五

醫心方

治傷寒汗不溜搖却手脚海蛤川烏頭各一

兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許捏扁置

所患足心下辟手芎白蓋藥以帛纏定於暖

室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水

候遍身汗出為度凡三日一次浸脚以知為度日

如汗不出用紫蘇葉煎湯以器盛於被內於脚腕下薰

之用生薑渣綿布裹週流擦之其汗自出回春卷二傷寒門九味羌活湯方後

救卒死扁鵲法又云斷狝尾取血飲之并縛狝

以枕死人須臾活肘後

治交接勞復方取狝子一枚撞之三六放於戶中

逐使喘極乃刺脇下取血一升酒一升合和飲之

同二

又方取狝狝脰及血和酒飲之差同上

奔豚病從卒驚馬怖驚馬遂得之氣上縱衝

心胸臍間築發動有時不治熱人諸方用

藥皆多又必須熟豚同三

葛氏療白朮方殺猪即取肚破去屎及熱

肘後多用此法

以及搗頭上卷五

醫心方卷九引小品方集驗方等並有殺化用祝文

卷九外臺卷十二並無用祝文疑係宋臣所

本刑去

治鬼擊方肘后

鹽一升水二升和攪飲之并以冷水噀之勿令即

得吐須更吐即差

治卧忽不寤方同

以鹽湯飲之多少約在量

治卒中五尸方同

乾姜桂分等末之鹽三指撮熬令青末合

服之即差

治卒心痛方同

敗布裏鹽如彈丸燒令赤末以酒一盞服之

用鹽方

陳藏器曰生熟

湯味鹹無毒

熱塩投中飲

之吐宿食毒惡

物之氣腫脹欲

為霍亂者覺

腹內不穩即進

三升令吐得盡

便愈亦主痰癰

皆須吐痰及

宿食調中消

食本草十五

三因吐法醫方考

燒鹽兩熟飲

壯三飲而三吐

之

欲吐不得吐飲酒

不得瀉腹中痛者名曰乾霍亂令人暴死急以此方探吐之鹽鹹物也多則苦美經曰鹹能軟堅故可以開宿食積滯若能湧泄故探之則易吐矣此法能回生起死幸勿輕而勿忽之
鹽湯探吐法
同上卷四
燒鹽溫湯
和之飲之以
指探吐
飲食自進胃
膈飽脹宜以

此法吐之
又同上
木鬱
兩脇大痛脈
代者此方主之
又法諸腹痛
連于脇膈手
足冷脈來伏
匿者此方主之
同卷五腹痛門

又方者三沸湯一升以鹽一合攪飲之若無火作湯亦可用水

治卒腹痛方同

食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方肝煎

鹽二升以水五升煮取一升頓服得吐愈

治傷寒及時氣溫病及壯熱脈大始得一日方同上

鹽一升食之以湯送之腹中當絞痛便覆取汗

便差

服鹽方療暴得熱病頭痛目眩并卒心腹痛及

欲霍亂痰飲宿食及氣滿喘息久下赤白及

積聚水吐逆之氣少力顏色痿黃瘧瘧諸

風其服法同八

取上好鹽先以大豆許口中含勿咽須臾水當

滿口水近齒更用方寸匕抄鹽外口中與水時

咽不尔或令消盡喉若久病長服者至三月

每日先服或吐或安摩手卒病可服三方寸匕取

即吐利不吐不利更加服新患瘧者即差心

腹痛及滿得吐下亦佳久病每上以心中熱為善

三五日亦服佳加服取吐利不損人久服大補

豚腎氣五石無不差之病但恨人不服不能久

取此療方不一小品云卒心痛鬼氣宿食不消霍

亂氣滿中毒鹹作湯服三升刺便吐之良

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方金匱要略

鹽一升 水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差

古貴生姜

今諸療多用辛甘姜桂人參之屬此皆貴價難得常有千金十一

生姜大有功能遠行旦將自隨外臺七引救急世

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方生姜若乾姜二三升以水六升煮三沸頓服之無新藥煮滓亦得肘后二霍亂門

傷寒若已六七日、熱極、下煩悶、狂言見鬼、欲起走方、附後二

黃連三兩、黃芩黃芩各二兩、梔子十四枚、水六升、煎取二升、分再服、治煩嘔不得眠、

八寶丹
藥試良藥

黃連三兩黃藥末各二兩蘇子十四枚水三升
煮取一升服之

謝寒苦已六日瘰癧二十餘日見其效

瘰癧證勞復等用驚電甲 按葉二次入

治時病新差起早勞復及食飲過多復發
欲死方右以驚電甲三兩醋塗炙令黃焦去襖
襖搗羅為散每服二錢以粥飲調下不計
時候服聖惠方治時氣後勞復諸方
治熱病後虛勞諸方
聖惠方驚電甲
朱胡散人參散黃連丸
類聚五十二ノナウ十二ノナ

濟聖車才驚電

田湯畧同

類聚五十二ノナウ十二ノナ

治瘰癧傷寒任路口未解潮熱作時煩燥面赤升
麻散方川升麻三兩驚電甲三兩前胡半兩烏梅肉兩
枳殼三兩犀角屑三兩黃芩三兩甘草半兩首烏根
末每服五錢水一大盞煎至五升去滓入生地黃汁
煎至用驚電甲

更煮一兩沸。神巧萬全方。以取冰五十八

聖濟柴胡散

同秦苑湯三營二安一陰四時五氣六相七風八雨九

同秦元柴胡湯

壽域神方篤病新起云、六十三、六十八

衛生易簡方治執病新差云々六十三七十六ウ

斷計此將生一子母祖二姓必所增斷一不信
於元大寸及增事三兩語至主火合意默去時
此報殊深云味早於財及合增圖多財發
此本信也財事用增甲貨業二六八八

溫疫壞證互散

聖惠方治壞
傷寒諸方可
改葱白聚四十九
十枚土灰
又宜湯洗之

又治傷寒後
夾熱方諸方

五十八
六十一
六十二
六十三
又前
紙皮

活人書^十名敬電
甲散、敗作壞、
總病論卷五名
驚電甲犀角湯
枳實、前胡作筆
胡、

余嘗見某醫用柴胡鼈甲湯於溫疫轉、
雜治為壞症者而有奇效近日得壞症宜鼈甲
之徵識以備攷

肘後卷二若病失治及治不差十日已上皆名壞病

唯應服大小蠶甲湯方不載

外臺一張文仲方療傷寒八九日不差名為敗

傷寒諸藥不能者方用蠶甲升麻前胡皂梅

枳實犀角黃芩甘草生地黃分量者法注本書

瘟疫論凡疫邪交街道在一七遠在三九甚至三七

過此不愈者因非其治不為壞證即為痼疾也夫

疫病壞記互用盤甲

外臺卷三
必効即此方
三ノ十六ノ

痼疾者所謂客邪膠固於血脉主客交渾最難
得解且愈久益固治法當乘其大肉未消真
元未敗急用三甲散多有得生者三甲散用鼈
甲龜甲川山甲蟬退姜蚕牡蠣麝虫白芍藥
當歸甘草分量加減具于本書

治驚病新起早勞及食飲多致欲死方肘后三
燒鼈甲服方寸匕

天行病經七日以上熱勢彌固大便秘澀心腹痞滿食飲不下精
神昏亂恍惚狂言異語其脉沉細衆狀之中無二可救决計附子
中湯傷寒論卷五方用鼈甲白芍藥皮茵陳細辛桂枝梟
柴芎附子枳實大黃生薑十味

水飲病有囊裏

諸病有囊裏衣二作心平力

治久欬嗽上氣十年二十年諸藥治不差方肘后三
生龜一隻著坎中就溺之令沒龜死漬之三

出燒末以醇酒一升和屑如乾飯頓服之須臾大
吐嗽裏出則差小兒可服半升

治卒大腹水病方同四

取草麻繩熟者二十枚去皮研之水解得三合
日一服至日中許當吐下渚水汁結裏若不盡
三日後更服三十枚

治結積留飲癖囊胃滿飲食不消方灸通谷五
十壯千金十八

卷三十八心腹才二作癖囊十二才
水飲病有囊裏

萬病回春卷
二痰飲門二
陳湯方後加
減痰飲与死
血結成寒囊
千金翼卷十九
雜療門苦瓠
瓢主水腫石淋吐
呀嗽裏衣症盡
痰飲廿二ノ
千金卷十八咳
嗽門治三十年欬
嗽方後若強
人欲嗽吐者可小
增服之便吐膿

囊裏結

外臺卷三十三

錄驗水瘕病方

日中許當時青

黃如莢汁當囊

結裏衣二十三日

又卷二十六引肘

後寸白從食牛

肉飲白酒散成相

連一尺則殺人服

藥下之須結裏

潰然出盡萬

佳也

千金十九大建

中湯飲已如

從百下決

決然也

肝後療頸下
卒結裏裏
大欲成癭

卷三十三
三十一

予平生有三疾一則臟腑下血二則膈中停飲下血
有時而止停飲則無時始因年少時夜坐為文
左向伏几案未是以飲食多墜向左邊中夜以
後稍困之必飲兩三杯既卧就枕又向左邊
側睡氣壯盛時不覺三五年後覺酒止從
左邊下墜有聲脇痛飲食殊減十數日
必嘔數升酸苦水暑月止是右邊身有汗
熱常潤左邊病處絕燥遍訪名醫及海
上方服之少有驗間或中病止得月餘復作
其補則如天雄附子樊石其利則如牽牛
甘遂大戟備嘗之矣予後揣度之已成癖

囊如潦水之有科臼不盈科不行水盈科而行
也清者可行濁者依前滯滯蓋下無路以決
之也是以積之五七日必嘔而去稍寬數日復作
脾土也惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕
崇土以填科臼則疾當去矣於是悉屏諸藥
一味服艾葉木三月而疾除云本事方三九

天下之病竟有不宜服藥者如黃疸之類是也黃
疸之證仲景原有煎方然輕者用之俱效而重
者俱不效何也蓋疸之重者其脇中有囊裏
黃水其囊並無出路藥祇在囊外不入囊中
所服之藥非補邪即傷正故反有害若輕病

則囊尚未成服藥有效至囊成之後則百
无一効必須用輕透之方或破其囊或消其
水另有秘方傳授非泛然煎丸之所能治也
痰飲之病亦有囊常藥亦不能愈

徐大椿醫學

源流論

肺移寒於腎為涌水者按腹不堅水氣客
於大腸疾行則鳴濯如囊裹漿水之病也
氣厥論

結氣高囊裹針藥所不及灸育募

千金十七廿二翼方廿七十五

外台卷七千金同九

蒼朮治濕痰留飲或挾瘀血成窠囊裹及脾
濕下流濁瀝帶下滑瀉腸風細目十二下蒼朮主
芫花大戟甘遂之性逐水洩濕能直達水飲
窠囊隱癖之處

同十七下芫花條時珍曰

皂莢除痰嗽囊結

本草黑字

魏荔彤曰寸脈沉者支飲有窠囊欲去之而
不能盡去也

金匱本義青龍湯下已注

蒞庭先生曰許氏所患即支飲中一證其所辨
說殊為精核蓋如苓桂朮甘湯澤瀉湯小半夏
及茯苓湯茯苓飲等證皆是支飲之自脾

土失權而致者、即所謂癰囊也、癰囊之名、今世多唱之者、而少知其實為支飲者、又莫識支飲之證、得許氏之言、而其理更明者、故今表而論之、金匱述義

吳江縣志王思中字建甫之人、邑周氏患發熱咳嗽、以陰虛內傷治之、愈劇、經月不得眠、思中診之曰、此謂懸飲、乃鬱氣所致、氣不升降、則湯液停積、漸成飲、囊法當開鬱行氣以消之、每齋用荷葉帶七枚、一服而鼻睡、數日平復、

醫術列傳十三列

人身憑一氣之通塞

流水不腐、戶樞不蠹、動也、形氣亦然、形不動則精不流、精不流則氣鬱、鬱之處、頭則為腫、為風、處耳則為聾、為聾、處目則為瞶、為盲、處鼻則為鼽、為窒、處腹則為脹、為疔、處足則為痿、為廢、輕水所多、禿與癭、人重水所多、漚與臂、人甘水所多、好與美人云、呂氏春秋三盡數篇

凡人三百六十節、九竅、五藏、六府、肌膚、欲其比也、血脈欲其通也、筋骨欲其固也、心志欲其和也、精氣欲其行也、若此、則病無所居、而惡無由生、疾病之留、惡之生也、精氣鬱也、故水鬱則為汚、樹鬱則為蠹、

人身憑一氣之通塞

草薶則為薶國亦有薶生德不通民欲不達此
國之薶也國薶處久則百惡並起而萬災並取
至矣 同二十、達薶篇

陽氣所歷充滿周流陰氣上不過腦下遺指趾二
氣之行晝夜不息中外必徧一為痰積壅塞
則疾生焉疾證段晉候統紀浩繁詳其本源
痰積虛耳或痰聚上或積留中遏氣之流
艱於流轉則上氣逆上下氣鬱時下臟腑失
常形骸受害暨乎氣本衰弱運轉艱達
或有不周血亦偏滯風溼寒暑乘間龍之
所生痰疾 痰疾 與痰積同凡人之生熱而汗

泄而易二便順利則氣之通也陽虛不能運
陰氣無陰氣以清其陽則陽獨治而為熱
陰虛不能運陽氣無陽氣以和其陰則陰獨
治而為厥脾以養氣肺以通氣腎以泄氣以
役氣云 褚氏遺書

褚氏遺書確言並要論
羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚

養耳力者常飽養目力者常瞑養辟月指者常

背陰肢末雖夏宜溫胸包心火雖冬難熱

女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十
年思男子合亦不調。則舊血不出新血誤行
或漬而入骨或變而之腫或雖合而近子合男

子多則源枯虛人產乳衆則血枯殺人
鳥獸無天癸而成胎者何也鳥獸精血往來尾間
也天癸起至齡十年無男子女合則不孕
制劑獨味為上三味次之多呂為下酸通骨甘解毒
苦去熱鹹導下辛殺滯曰三八雖入藥
當驗之藥未驗切戒亟投大勢既去餘勢不宜再
藥
修而肥者飲劑豐羸而弱者受藥減
善用兵者徒有車之功善用藥者要有桂之效
病有微而殺人勢有重而易治
未并之女天癸始至已近男色陰氣早洩未完而

傷未實而動是以交而不孕、而不育、而子脆不

壽
老陰遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也

Blank manuscript page with vertical ruling lines.



Handwritten text in cursive script, likely Japanese, covering the entire page. The text is written in dark ink on aged, slightly textured paper. The characters are fluid and connected, typical of cursive calligraphy. The text is arranged in several horizontal lines across the page.