

✕
K 57

490.9

Ig-5
7

No. 2556
1A 1C 57



富士川文庫

1276

鼠乳

金鯉治禁口痢

九折堂山田
氏圖書之記

兩臂脫肉

大豆紫湯類諸方

風引湯類諸方

徐王

脚氣用小半夏加茯苓湯

腎間有膿

吐鼠

桃花湯中赤石脂一半全用一半篩末類似煮

法

人子不可不知醫

箕并髮蒜髮宣髮

醫心方不引傷寒金匱

癰積左屬於肝右屬於脾

理中丸散酒服

石膏單方

楸葉治癰瘍

菊葉治下瘡

鯽魚治諸瘡

羊蹄根治癬

生地黄治諸瘡



鼠乳

鼠乳者身面忽生肉如鼠乳之狀謂之鼠乳也

此亦是風邪搏於肌肉而變生也病源卷三十一

候

跌陽脉浮緩少陽脉微緊微為血虛緊為微寒

此為鼠乳其病屬肺脈經卷六肺手太陰經第七六十五千金

卷七肺藏脉論第一無其病屬肺四字并外臺卷十引千金与脉經同十三十

鼠乳方常思根拭去土勿洗以附本繫之一日

一夜便断消千金翼卷廿四鼠瘻第二廿九

凡癰疽之疾云云結筋腫肉鼠乳皆不當療也

鼠乳

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出

孔外時時膿血出者名牡痔也同上卷廿六

痔有雌雄為病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無

數者有鼠乳附核者有腸中煩痒者同上深

丸主治廿六

治腸痔在腹內有鼠爛下血方本事方卷五行

治痔有鼠乳結核作渴疼痛方同上

肛邊生乳此
牝痔同治
十年痔如鼠
乳同上六
肛邊轉生肉
如鼠乳同
繁廿六

金鯉治禁口痢

久痢禁口病勢欲死用金絲鯉魚重一尾重一

二斤者如常治淨用鹽醬葱必入胡椒末三

四錢煮熟置病人前嗅之欲喫隨意連湯食

一飽病即除根屢治有效本草綱目卷四

拱醫方摘要廿四

兩臂脫肉

臂薄者其髓不滿故善病寒熱也。靈樞五變篇
蘇遊傳屍論曰此病若脊脊肉消及兩臂飽肉
消盡曾前骨出入即難療也。外臺卷十三抄
業廣數診久病其三部脉際臂肉脫落扁而
如削者必不治以為古人未言及後讀片倉
鶴陵情囊瑣探云凡病人肌肉柴瘠者手腕
後肉脫而形匾醫握其中央時指頭將相合
者不問何證為死候也。雖飲食如故此游魂
之假息耳。勞瘵之病累月後必見此候唯傷

兩臂脫肉

寒痢疾脚氣後有此候者往往愈卷上病此人死候此
言与余說暗合頃日又得古人既說破者因
揭于斯以徵愚說之不誣

此等言以不詳以爲古人未言又對諸凡論
業未嘗得信入識其三府相察管內却然無而
能益管而管出入有難發也代臺卷十三林
種或動與論曰此味皆管管肉或又兩管論肉
管或言其謂不漸如善味其然也
兩管相肉

大豆心方入心

大豆紫湯類諸方

才四卷卷冬放

若口噤不開者取大豆五升熬令黃黑以酒五

升漬取汁以物強發口而灌之畢取汗附後

三治中風諸急方第十九三ノ上ウ

治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但煩

熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視

此皆因虛風冷濕及勞傷所為大豆紫湯方

千金卷三九ノ

大豆五升 清酒斗

右二味以鐵鑊猛火煮豆令極熟焦烟出以

大豆紫湯類

酒沃之去滓服一升日夜數過服之盡更合
小汗則愈一以去風二則消血結如妊傷
折胎死在腹中三日服此酒即差

治產後百日中風瘓口噤不開并治血氣痛勞

傷補腎獨活紫湯方同上九升

獨活斤一 大豆伍 酒三升

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮

之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以

獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

大豆湯主產後卒中風發病倒悶不知人及妊

娠挾風兼治在蓐諸疾方同上十二升

大豆五升炒 葛根 獨活各八

防已六兩

右四味以酒一斗二升煮豆取八升去

滓內藥者煮取四升去滓分六服日四夜二

治產後中風頭面手臂通滿方同上十三升

大豆參升以水陸升煮取壹升半去豆澄清

更煎取壹升內白朮切兩附子參兩獨活參

兩生薑切兩添水壹斗煎取伍升內好酒伍

升去滓分伍服日參夜貳間粥頻服參劑

治五色帶下方同卷四廿九

服大豆紫湯日三服注方見前三卷風篇中

治卒中風口喎方同卷八廿六才

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服之

注肘後以治口噤不開外臺卷十四引斤

治四肢骨碎筋傷蹉跌方同卷廿五廿三才

大豆二升水五升煮取二升以淳酒六七升

合和豆汁服之一日盡如湯沃雪注肘後方

瘀血無大豆用小豆佳

治頭破腦出中風口噤方同上廿三才

治驚風瘡血出不止方取豉三升漬熱湯食頃絞去滓內蒲黃三合頓服之及作紫湯方在產婦中千金卷廿五卅三才

大豆一斗熬去腥勿使太熟搗末熟蒸之氣
徧合甑下盆中以酒一斗淋之温服一升覆
取汗傳杏人膏瘡上

治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或產

婦墮胎凡得此者用紫湯大重者不過五劑

方在第八卷中同上廿三才按第八卷疑第三

肘後療中風無問男子婦人中風脊急身痊如

弓紫湯方外臺卷十四才

雞屎升二大豆升一防風切三兩

右三味以水三升先煮防風取三合汁豆雞

屎二物鎗中熬之令黃赤色用酒二升淋之
去滓然用防風汁和少為再服相去如人行
六七里衣覆取汗忌風出第二卷中

必效療風入耳角弓反張及婦人風方同上
烏豆二升熬令聲絕酒三升內鎗中急攪以
絹濾頓服取汗不過三劑極重者和雞糞合
熬若口不開者灌之良

備急陶隱居效驗方療人卒中風口不開身不

著席大豆散方同上廿六方

大豆二升熬

乾薑

椒汗各三兩

右三味為散酒服一錢匕日一汗出即差大

良文仲同

又方同上

若口噤不開大豆五升熬令黃黑以五升酒
漬開口灌之取汗肘後同並出第二卷中

小品大豆紫湯主婦人產後中風困篤或背強
口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇

者嘔逆直視此皆因風冷濕所為方同卷卅四廿五

大豆三升炒令炮斷預取器盛清酒五升沃
熱豆中訖漉去豆得餘汁盡服之溫覆取微

醫心方卷廿三
引小品方文小異
廿三ノ卅三

汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結云
周德成妻妊胎觸覽因傷折胎死在腹中三
日困篤服此酒卽差後療無不佳注千金用
大豆五升
酒八升又云更合獨活湯所以爾者產後多
虛著風以獨活湯去血故也重者十劑崔
氏云如中風口噤加雞屎
白二升和豆煮更佳

卷十四有續命
風引湯

風引湯類諸方 按千金卷七有風引獨

活湯風引湯小風引湯等數方並續命

命湯類方而与此所載者方意不同故

不錄

若風盛脉得浮大及緩宜服續命湯兩劑若風

盛宜作越婢湯加木四兩若脉轉駛而緊宜

服竹瀝湯脉微而數宜服風引湯二三劑此

皆多是因得而得若大虛乏氣短可其間作

補湯隋病躄之冷熱而用續源卷十三脚氣
緩弱候

紫石煮散治大人風引小兒驚風癇瘕瘖日數十

風引湯類諸方

發醫所不藥者方、千金卷十四 風癩第五

紫石英 滑石 白石脂 凝水石

石膏 赤石脂 各六兩 大黃 龍骨

乾薑 各四兩 甘草 桂心 牡蠣 各三兩

右十二味治下篩為麤散盛以韋囊懸於高

涼處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取

一升五合大人頓服未百日兒服一合未能

者綿沾著口中熱多者日四五服以意消息

之注深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂

治百二十種風癩驚狂及發即吐沫不識人

者四月五月宜服煮散方同上

紫石英 芍藥 龍骨 一本用黃芩

麻黃 青石脂 當歸 甘草

桂心 人參 桔樓根 白鮮皮 各

兩 牡蠣 三兩 大黃 五兩

右十三味治下篩為麤散分作七裹每以大

棗十枚水三升煮取二升半下一裹大棗汁

中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖

即差

廣濟療風癩卒倒嘔沫無省覺方 外臺卷十五 風癩及驚癩

麻黃去節

大黃

牡蠣熬

黃芩各四兩

寒水石

白石脂

石膏研

赤石脂

紫石英

滑石

研各八兩

人參

桂心各二兩

蛇蛻皮

炙一兩

龍齒

研六兩

甘草

三兩

炙

右十五味搗篩為散八兩一薄以絹袋盛散藥用水一升五合煮取一薄取七合絞去滓頓服之日一服一方水二升煮散方寸匕取一升去滓服之少小百日服一合熱多者日二服三五日一服亦得本方無麻黃龍齒蛇

蛻皮

深師療大人風及少小驚癇癩瘖日數十發醫

所不能療除熱方

同上廿五

龍骨

大黃

乾薑

各四兩

牡蠣

三兩

滑石

赤石脂

白石脂

桂心

甘草

炙各三兩

亦同

各八兩

大黃

龍骨

龍齒

炙

右九味搗下篩韋囊盛大人三指撮以井華水二升煮三沸藥成適寒温大人服一升未滿百日服一合未能飲者綿裹筋頭內湯中著小兒口中以當乳汁熱多者日四服無毒

以意消息之

崔氏療大人風引少小驚癇癩瘕日數十發醫

所不能療除熱鎮心紫石湯方同上廿六

紫石英 滑石 白石脂 石膏

寒水石 赤石脂各八兩 大黃 龍骨

乾薑各四兩 甘草 炙桂心 牡蠣各三兩

右十二味搗篩盛以韋囊置於高涼處大人

欲服乃取水二升先煮一沸便內藥方寸匕

又煮取一升二合瀝去滓頓服之少小未滿

百日服一合熱多者日二三服每以意消息

之紫石湯一本無紫石英紫石英貴者可除

之永嘉二年大人小兒頻行風癇之病得發

例不能言或發熱半身掣縮或五六日或七

八日死張思惟合此散所療皆愈古今錄驗

范汪同並出第六卷中注此本仲景傷寒論

徐王療乳中瘰癧起痛方 附後方卷五三ウ

徐王治蛇毒方 同卷七六

徐王治蛇毒方同卷七六

徐王 又作徐玉 徐王ヲ前ハ生シ徐玉ヲアトハ入レル

徐王方五卷 隋書經籍志

徐王八世家傳効驗方十卷 同上

徐王八代効驗方十卷徐之才撰 舊唐書經籍志新唐書

藝文志同

齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少小千金方卷五上小兒序例

姚公集驗殊不殷懃徐王撰錄未以為意 同卷七論

風毒狀

徐王

崔氏療患嘔人參湯方後云徐王張文仲千金

同外臺卷六乾嘔方

古今錄驗療欬氣上多涕唾杏人煎方云出徐

王同卷十上氣欬嗽多唾方

備急徐王療偏風半身不遂兼失音不語方同卷

十四偏風方

古今錄驗療面白駭方出徐王同卷十五白駭

吳氏竊尋蘇長史唐侍中徐王等脚氣方

同卷十八脚氣論按舊唐志脚弱方八卷

徐叔向撰新唐志同

新唐志云脚氣論一卷蘇鑿金徐王等編集宋志云蘇敬徐王唐侍中三家脚氣論一卷

宋 徐熙徐秋夫徐道度徐叔嚮

南齊 徐文伯徐嗣伯徐雄

北魏 徐寒言

北齊 徐之才徐之範徐敏齋

徐王用尋常氣滿日服一劑同文仲毒氣攻心欲死者方後十六甲毒

是高麗老師方與徐王方相似同文仲若毒氣攻心云云方後

十八四十四方

文仲徐王枳實散空春秋服同卷十九四方

文和斜玉時實者... 古拾... 是言... 翁王用... 十四...

脚氣用小半夏加茯苓湯
 一商脚氣ヲ患フ咳嗽甚シ一身皆腫呼吸迫
 シテ衝心ノ兆アリ越婢加朮附ヲ與フ無
 驗豁胸湯ニ轉ス又無驗甘遂丸ヲ與フル
 二下利セス一日俄ニ嘔逆シ水藥共ニ不
 受氣息急迫平臥スルヲ不能坐シテ脊ヲ
 按摩スルニ陰囊腫脹シテ寸時安キヲ不
 能其嘔甚ヲ以テ小半夏加茯苓ヲ投ルニ
 飲受タリ次日依然タレニ嘔吐少シヤム
 故ニ連服スルヲ三日許嘔逆止ミテ粥ヲ

食ス小便清利スル故猶前方ヲ守ル追日
 快利腫モ隨テ消シ呼吸穩ニ平臥スル
 ヲ得タリ餘リ其功アル故ニ前方ヲ守ル
 三十日許ニテ全快シタリ醫事小言卷三
 業廣嘗テ一旗下ノ内室ヲ診ス脚氣呼
 吸息迫但坐シテ側臥スルヲ得ス是唐
 侍中一方ノ正證ナリ前醫ノ處方ヲ檢ル
 ニ矢張唐侍中ノ一方ナリ傍人ニ問フニ
 嘔逆ノ氣味アリテ稍ク一服ヲ服スル位
 云フ因テ小半夏加茯苓ニ吳茱萸少

〇尔後癖ニナリ
 テ脚氣ニ屢角
 ニ屢角旋復
 湯ヨリ其具
 合甚ヨロシ

許ヲ加テ用ルニ飲コ、口甚互シト云前
 方ヲ用ルルニ三月許ニテ全快セリ。先年
 醫事小言ヲ讀シトキ心ニトメザリシガ
 後ソノ書ヲ檢シテ暗合ヲ喜ベリ頃日外
 臺ヲ讀テ古人己ニ小半夏湯ノ類ヲ用タ
 ルコアリ茲ニ揭テ參攷ニ備フ
 必効療脚氣方 外臺卷十八ノ枕
 吳半夏三兩淨削去皮 生薑汁三升
 右二味水五升煮取二升去滓空腹一服盡
 每日一劑三劑必好禁羊肉錫此方梁公家

出方始有本，奇異神效。羊肉煎此，其效甚速。文仲療脚氣入心，悶絕欲死者，同上。十八ノ四十四ノ

半夏三兩洗 生薑汁二升半

必右二味，內半夏者，煮取一升八合，分四服，極效。

忌羊肉錫按二方俱全 薑薑生薑半夏 湯藥味全同 但煮法各異

ナルノ三古今本草 小羊夏湯人煎之 用者

醫方八書人煎之 部合喜為七 煎取

經言取同 煎之二十 倍入世 煎之

一煎之 煎之二十 煎之二十 煎之二十

按本草 煎之二十 煎之二十 煎之二十

合其五二〇
其具
其具
其具
其具
其具

腎間有膿

小品師曰：病如奔狎者，氣從少腹起，上衝喉咽。

發作欲死，復還者，皆從驚恐得之。腎間有膿。

故也。范汪同。外臺卷十二 四材

亦療卒心痛，腰腎間冷膿水，服亦佳。同卷十八 近効加減

青木香丸方後六四材

月猪指前三全 腎間及少腹冷膿水之法日廿八

酒服從後 出五 煎之法日廿八

治五 煎之法日廿八

取月間有膿

出方始有本音異和效
文件瘡胸氣入心悶欲死者

生薑夏... 升八合... 服極效

亦療卒心... 亦封... 亦封

姑... 代... 卷十二... 亦封

小品... 亦封... 亦封

吐鼠

葛氏卒得鼠瘦云云又方取白鮮皮煮服一升

當吐鼠子 肘後方卷五

又方取猫狸一物料理作羹如食法空心進之

鼠子死出又當生吞其功彌效

又方取鼠中者一枚亂髮如雞子大以三歲臘

月猪脂煎之令鼠骨肉及髮消盡半塗之半

酒服鼠從瘡中出姚云秘不傳之法

廿三載此方文小異... 異方卷廿四

治癩癧方千金卷廿三

吐鼠

故鞋內檀替燒末五匕和酒一升旦向日服
之強行須臾吐鼠出三朝服注外臺不同

千金療癩癧方外臺卷廿三引

槲白皮三斤

又右一味細切以水七升煮取三升去滓真珠

砂方寸匕和汁一升旦向日服之強行須臾

吐鼠出三朝服良按錄

文同鼠瘻者取二升服一升葛氏治鼠瘻方取槲

范汪療鼠瘻癧癧身熱方同上

猪椒二十斤

右一味以水淹足煎熟去滓置瓶中覆瓶口
以瘡當上熏候熱極乃止痛膿血鼠當從瘡
出便愈

故能... 燒天... 和酒... 一升... 旦向日服...
 之... 行... 領... 吐... 鼻... 出... 三... 朝... 服... 汗... 外... 遺... 不... 同...
 千金... 瘰... 癧... 疔... 方... 之... 公... 產... 卷... 三... 下... 方... 下...
 柳... 白... 皮... 三... 方...
 右... 一... 味... 細... 切... 以... 水... 七... 升... 煮... 取... 三... 升... 去... 滓... 置... 於...
 日... 方... 寸... 七... 升... 汁... 一... 升... 且... 向... 日... 服... 之... 隨... 行... 煩... 更...
 又... 出... 三... 朝... 服... 長... 時... 陰... 陽... 氣... 血... 氣... 營... 於... 營...
 此... 實... 也...
 若... 以... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香... 香...
 可... 一... 起... 以... 水... 煮... 只... 煎... 煉... 去... 滓... 置... 於... 中... 煎... 只...

桃花湯赤石脂一半全用一半篩末類似
 煮法

赤石脂一斤一半全用一半篩末傷寒論少陰
 阿膠二兩一兩入藥二兩銷作清方後云以
 醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸外
 卷廿五崔氏治痢云云方廿五ノ十八ノ

救急療崩中下血數斗氣欲絕方伏龍肝五升
 人參二兩麝香二兩生薑四兩右四味切以水一
 大斗煮土取二升下藥煎取一升半更別研
 伏龍肝一雞子許并香肉湯中攪令調勻

桃花湯煮法

服外臺卷三十四

五十二才

香內馬中鬱令既

大半煮土煎二代下藥煎取一升半更限

入參二兩與棗杏二兩主薑四兩可四和以水一

升急煎以服中下血婦女產後發熱大洲諸州

卷廿五崑崙丸治麻云云云廿五十八分

酒送服青煎以火吹餅子煨服二十五分

阿膠二兩一兩炙入藥一兩陰升膏大酒云

赤石脂一升一半全用一半酒末

煮

林外臺赤石脂一半全用一半酒末

人子不可不知醫

嘗謂人子不可不知醫唐書二百一王勃傳

伊川先生曰病臥於牀委之庸醫比之不慈不

孝事親者亦不可不知醫朱子小學外篇

此語原見程子外書

君親有疾不能療之者非忠孝也孫思邈千金要方序

人子不可不知醫

入平下...
 醫家...
 此書...
 昔非忠...
 入平下...
 不味...
 入平下...
 不味...

筭髮 蒜髮 宣髮

少而筭髮

千金翼卷五瓜子散主治細外臺

少而生蒜髮

外臺卷卅二引翼方瓜子散

壓油塗頭能變蒜髮

證類本草卷廿七菜部上品燕菜月條引孟詵

北齊書卷二十慕容紹宗傳紹宗頗有凶夢

意每惡之乃私謂左右曰吾自年二十已還

恒有蒜髮昨來蒜髮忽然自盡以理推之蒜

者算也吾算將盡乎

雲谷雜記今人言壯而髮白者目之曰蒜髮

筭髮 蒜髮 宣髮

猶言宣髮也。人言髮而髮白者曰白髮。

昔附宣髮

易說卦釋文黑白雜為宣髮。二ノ廿二 寡髮注

周禮考工記下車人之事半矩謂之宣。鄭玄

注頭髮皓落曰宣。又易巽為宣髮正義云今

易文不作宣作寡。四ノ十二ノ二十三

聖由全題誰變絲變又變

少而士絲變

少而寡變

寡變

素問靈樞

醫心方不引傷寒論全匱要略

醫心方無引傷寒全匱文者但引醫門方者往往

與傷寒全匱文同其他二書辨載引小品千金

等而不載仲景書當時猶有江南諸師秘之之

習而皇朝不始載是以丹波氏不及觀之耶

書以質識者

卷十引張仲景青龍湯方用麻黃細辛干姜半

夏四物十ノ廿七

同棗根白皮湯用棗根白皮桂生薑人參四

物同上

載素問文者 重聖祀 並引太素經

醫心方不引仲

景

卷十六引張仲景方治消核腫黃耆帖方用黃耆
當歸大黃芩羌活白欬黃芩防風芍藥雞子
黃連十物十六十九

癰積左屬於肝右屬於脾

通玄云絃癰之疾亦不專於一絃病者肝之所
生癰病者脾之所成絃生於左癰成於右絃
者如弓之絃肝者所生肝與膽為清淨之府
不受外邪故知自生病也癰者脾胃為水穀
之海食不消偏僻一邊故名為癰令一絃癰
同為一疾實亦難矣醫心方卷九必升

令恐今訛

癰積左屬於肝

右屬於脾

今恐今誤

卷之六... 治... 同... 之... 不... 未... 主... 國... 藥...

理中丸散酒服

凡四物搗下蜜丸如彈丸取一枚內煖酒中服

之日三醫心方卷上錄驗方治霍亂虛冷吐逆下利

凡四物治篩酒服方寸七日三同効驗方治霍亂吐下

方後十一方

遠行防霍亂依前作丸如梧子服三十九丸如作

散服方寸七酒服亦得千金方卷廿治中湯方後廿九方

理中丸散酒服

諸邪方寸七...
 遠行...
 方寸七...
 只四...
 之日三...
 只四...
 只四...
 只四...

三國志

錄驗方止汗石
 膏散方
 石膏四兩 甘草四兩
 合搗篩先食
 將水服方寸七
 日三

石膏單方

范汪方治小便一日一夜數十行方醫心方卷十一

石膏半斤吹咀以水一斗煮取五升稍服葛氏

方同之

深師療柔風體疼白汗出石膏散方外臺卷十四

石膏二兩 甘草一兩

右二味搗篩為散以酒服方寸七可以七服

武家黃素方

崔氏療五蒸五日内蒸所以言内蒸者必外寒内熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中

石膏單方

其人必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮
燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跌腫起方外臺

卷十三方

石膏十兩研如乳粉法水和服方寸七日再
以體涼為度

治少小中風手足拘急二物石膏湯方研塗卷

石膏如雞子大一塊碎外臺卷三十

真朱一兩外臺一兩外臺

右以水二升煮石膏五六沸內真朱煮取一
升稍稍分服之

三四方玉屑散

子母祕錄治乳不下以石膏三兩水二升煮之

二沸三日飲令盡妙證類本草卷四石膏條

小品方下乳散石膏三兩以水三升煮三沸一

日飲令盡良醫心方卷廿三廿八才

治小兒盜汗葛氏方石膏一兩同上卷廿五廿三

阿州岡作殷嘗テ子ヲ舉久舉體柔軟人

皆視テ廢症ト十ス作殷他ヲ顧ニ不レ唯石

膏甘草二味ヲ採テ煎服セシムル一年

餘病愈テ壯健ノ一小郎ト成ル夫レ若個

廢忘ニ唯此一小方ヲ用テ始終更改ス

ルヲ死ク、年餘ニ收功タリ、此レ深造自得
卓乎トシテ成見アルニアラズンハ、馬ソ
之ヲ能クセシヤ、作殷ノ巨壁手ニシテ、其術
古ノ明師ニ愧サルナリ、又癩家ニ自汗出
テ止サル症一種有之、此方大ニ效驗アリ、
有持桂里方輿觀卷五外臺深師石膏散
方後五ノ四十一
睦州楊寺丞有女事鄭迪功、昔有骨蒸內熱之病、時發外寒、寒
過內熱、附骨蒸盛之時、四肢微瘦、足跌腫者、其病在五臟六府
之中、宋醫曾不差、因遇處州吳醫曾、看曰、請為治之、只單用石膏散
服後體微涼如故、其方出外臺秘要、只用石膏乳細十分、似麩
以新汲水和服方寸匕、取身無熱為度、醫曾說卷四引名醫錄十ノ

楸葉治癰腫諸瘍

若潰後膿血不止急痛、肘後方卷五 五ノ二
引葛氏

取生白楸葉十重、貼上布帛寬縛之、

治癰腫痛煩困方、醫心方卷十五 十六

生楸葉十重、帖之以布帛裹、緩勿令急、日二

易止、痛消腫食膿、勝於衆帖、冬以先干者、臨

時塩湯沃潤用之、注葛氏方劉涓子方同之

葛氏方云、凡毒腫多痛、風腫多痒、按之隨手起、

或非癰、隱軼皆風腫、治之方、同上十六ノ十二

楸葉浸水中、以裹腫上、

楸葉治癰

千金治少小兒
不生髮及五下ノ
十六ノ

千金廿二ノ十九

救急單驗方療諸瘻瘡方同上十六卅二

煎楸枝菜淨洗瘡內孔中大驗

崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟證類本草卷

取楸葉十重薄腫上即以舊帛裏之日三易

當重重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾

葉塩水浸良久用之或取根皮剉爛搗傳之

皆効

續醫說九ノ五ノ

菊葉治丁瘡

百濟新集方治丁腫毒氣已入心欲困死方醫

方卷十六卅六

取菊花合莖搗絞取汁三升頓服之

醫門方療犯丁腫欲死者方同上卅六

搗菊葉取汁服之冬月取根神驗

肘後方疔腫垂以菊花一握搗汁一升入口即

活此神驗方也冬月采根卷

有持氏桂里曰治疔神方生菊葉搗取汁

二甌許頓服之煎用亦可此杉浦老人所傳

菊葉治丁瘡

瘡醫方大全菊
花甘草子用之
及心

廣惠濟急
方上ノ五ノ

余亦以此救人不可勝紀後閱肘後方有與此類者但花者雖我未試用其功必如葛氏言矣方輿輓卷十四

又曰菊葉ノ疔ヲ治スル誠ニ神妙ナリ人余也瘍科ニ非レドモ疔ヲ病ム者多ク來テ治ヲ求ム其所施モノ非有他タゞ此葉ノ在ル有ルノ三花ト根トハ未タ試ミズト雖葛氏指示ノ如ク定テ效用齊カルベシ但イツレニモ生者ヲ採リ用フルヲ佳トス其乾枯ノモノハ効劣カルベシ同上

鯽魚治諸瘡

葛氏若惡核腫結不肯散者肘後方卷五

搗鯽魚以傅之

千金方治爛疽著手足肩背累累如米起包白

刮之汁出復發方醫心方卷十五

鯽魚長三寸亂髮如鷄子大猪脂二升煎塗之

又治久疽方同上

取鯽魚破其腹勿損腸腑內上白塩末以針縫合於銅器中火煎令干著創中無膿者以猪脂和付小疼痛勿怪也

鯽魚治諸瘡

肘后ニシテ九ノ
又五ノニシテ九ノ
又五ノニシテ九ノ
千金五下治
不生髮
千金方
才

千金方
才

僧深方凡得惡腫皆暴卒初始大如半梅桃或有核或无核或痛或不痛其長甚速須臾如雞鴨大即不治之腫熱為進煩悶拘攣腫毒又肉侵填塞血氣氣息不通一再宿便致人垆

卷十六ノ十八

鯽魚搗薄腫上

又方噉鯽魚膾蒜菹

葛氏方云治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫奔分散上下周匝煩毒欲死方同上卷十七取生魚切之如膾以塩和傳之通身赤者務

多作令竟病上干復易之鯽魚為佳

槎要方丹腫方同上十七ノ七

生鯽魚肉搗如泥塗之

千金方治惡瘡十年不差者同上十七ノ十五

燒鯽魚灰和醬漬清付之主一切惡瘡

刪繁方治癬及疥等乱髮膏方同上十七ノ十三

乱髮如鴨子大一枚 鯽魚一頭

雄黃二兩 八角附子一枚

苦參一兩 猪膏一枚

凡六物前搗附子三物為末猛火煎猪膏髮

治小兒白秃葛氏方云燒鯽魚末以將薑汁和傳之嚴惠心方廿五ノ
廿三
 治小兒鬼詆頭方產經云亂髮如鴨子大一枚酢鯽魚二頭若參多一兩附子一枚雄黃三兩猪膏四升凡六物搗篩下用薑月魚身及魚令盡內諸藥末絞之傳瘡上良同上廿五ノ
 廣利方瘡小兒面上忽生瘡黃水出方鯽魚二頭燒作灰和將薑汁塗上同上廿五ノ

魚令盡內末藥傳瘡上

葛氏方治大人小兒卒得諸惡瘡不可名識者

方同上十七ノ十六 肘后五ノ十七木

鴈月猪膏一升乱髮如鴨子一枚生鯽魚一

頭合煎令消盡不沸止又內末雄黃雌黃苦

參屑各二兩大附子一枚令攪凝盛器以傳

諸瘡无不差

劉涓子不用生薑用生魚三味等分余比用

鯽魚妙外臺卷卅四備急乳癰方後卅四ノ

每驗方治小兒眼注不見物方醫方 魚膽月且鯽魚等良 治小兒治在耳新錄方云鯽魚鮓魚膽并並良 本草拾遺云鯽魚鱗主小兒大人丹毒同上廿五ノ

水出方鯽魚二頭燒作灰和將薑汁塗上同上廿五ノ

千金方

千金方

千金方

千金方

羊蹄根治疥癬

千金方治癬秘方醫心方卷十七ノ九

搗羊蹄根分著甕中以白蜜和之先刮瘡邊

傷先以蜜和付之若炊一石米頃拭去更以

三年大酢和以付癬上燥便差若刮瘡少許

處不傷即不差

范汪方治癬濕方同上

取羊蹄根細剉數升以桑薪灰汁煮四五沸

校去滓以汁洗創

僧深方云治蝸癬浸淫日長痒痛搔之黃汁出

羊蹄根治疥癬

差復發方同上十七ノ十

日未出時北向取羊蹄根勿令婦人小兒見洗去土切搗淳苦酒和洗瘡去痂以傳上一時間以冷水洗之日一傳又可取根搯之神良日未出取者不欲影加根上

槎要方療濕癬方同上

右以日未出時採取羊蹄根其根須獨並不
得有杈枝不得令見風切搗為末和殺羊酪
著少塩於日中曝兩食久以塗癬上

范汪方治疥方同上十七ノ十三

羊蹄搗根猪脂和塗或小与塩

五ノ廿二
廿三ノ方

生地黄五兩
凡四物切綿裹苦酒五合薄漬一宿用猪膏
一升煎取竹葉黃為度去滓煉半傳瘡
生地黄汁三升酒一升半煮取二升七分少
三脫

差復發方同上

日未出時北向取羊蹄根勿令婦人小兒見
洗去土切搗淳苦酒和洗瘡去痂以傅上一
時間以冷水洗之日一傳又可取根搗之神
良日未出取者不欲影加根上

桂要方療濕癬方同上

右以日未出時採取羊蹄根其根須獨並不
得有枝枝不得令見風切搗為末和熟羊脂
著少鹽於日中曬兩食久以塗癬上
此藥能止疥癬謂咳金在大小醫

諸瘡用生地黄治諸瘡瘍

剛敏系方治火瘡灸瘡等膏方醫心方卷十八五

柏樹白皮五兩 甘草一兩 竹葉三兩

生地黄五兩

凡四物切綿裹苦酒五合淹漬一宿用猪膏
一升煎取竹葉黃為度去滓摩傅瘡

千金方被打傷有瘀血方同上十八廿

生地黄汁三升酒一升半煮取二升七合分

三服

葛氏方治挽蹠倒踉有損痛處氣急面青者方

生地黄治諸瘡

廿五ノ廿二才
廿三ノ才

干地黄半斤、酒一斗、漬、火温、稍、飲汁、一日、令盡之、

又方、搗生地黄汁二升、酒二升、合煮、三沸、分、四五服、

又方、干地黄六兩、當歸五兩、水七升、煮取三、升、分三服、若煩悶、用生地黄一斤代干者、

新録云、治頭破方、

同上十八ノ廿一

生地黄不限多少、熟搗、薄傷處、

葛氏方、挽折、四支、破、骨碎及筋傷、跌方、

同上十八ノ廿二

熟搗生地黄、以薄折上、破竹簡編之、令竟病、上、急縛之、一日一夕、十易地黄、三日後則差、

千金方、治四支骨破碎、筋傷、蹉跌方、

同上十八ノ廿一

又生地黄不限多少、熟搗、用薄損傷處、

煖要方、療手脚折方、

同上十八ノ廿二

取生地黄熟搗、以傅折上、破竹木編之、急縛、之、一日一夜、十易地黄、三日後則差、

葛氏方、卒從高落下、瘀血振心、面青、短氣欲死、

方、

同上十八ノ廿三

地黄干生无在、隨宜用服、取消、

小品方治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方

同上十八/卅三

春生地黄酒沃取汁稍服甚良

醫門方療卒墮損筋骨蹉跌或骨破碎方同上

熟搗生地黄薄之日夜數易之若血聚者

以針決去之

又方浸地黄酒飲之令酒氣不絕佳同上

樵要方療墮馬崩血腹滿短氣欲死云云新錄

方云搗生地黄封之同上

集驗方治妬乳方同上卷搗生地黄薄之熱則易

嚴惠心方十三引小
品方治妬乳方云
生地黄煎汁以薄之卅三/卅九



Kitasato Memorial Medical Library