

✕
i 17

490.9
Ig-5
9

No. 2033
113 117



1278

段曾學管錐卷十八

及診

香需飲類方

料理

桂心

洗浴發汗

瓜蒂下水

黃疸用酒

瘡疾方用酒

瘡病用附子

治瘡灸法

茯苓杏仁甘草湯治胃中有痰血者

心痛用當歸桂心

心痛用黃連梔子

誘虻法

虻痛用鶴虱

心痛用桃人魚

五疇丸

噎用羚羊角

竹筴治諸哽法

用獺肝諸方

續命湯類有用酒煮者

兩髀熱如湯沃

乱字

黃連用酒

於谷發干

味辛

又急

通胃藥皆難卷十八

用酒煮者

兩髀熱如湯沃

乱字

黃連用酒

於谷發干

味辛

又急

通胃藥皆難卷十八



反診

九折堂山田氏圖書之記

北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反其診則見矣素問經真不應皆為脉沈脉沈下者仰手而沈覆其手則沈為浮細為大也王冰前文注

寸口脉沈者骨反仰其手乃得之此腎脉也和脉經卷十〇按反仰蓋王冰所謂

和脉經卷十〇按反仰蓋王冰所謂

反診

香薷飲類方
治霍亂方千金方卷二十
扁豆升 香薷升
右二味以水六升煮取二升分服單服亦得
霍亂洞下不止者方同上
香薷一把水四升煮取一升頓服之青木香
亦佳
廣濟療霍亂吐痢扁豆湯方外臺卷六
扁豆葉物一 香薷葉物一 木瓜一枚
乾薑切兩
香薷飲類方

香薷飲類方

治霍亂方千金方卷二十

扁豆升

香薷升

右二味以水六升煮取二升分服單服亦得

霍亂洞下不止者方同上

香薷一把水四升煮取一升頓服之青木香

亦佳

廣濟療霍亂吐痢扁豆湯方外臺卷六

扁豆葉物一

香薷葉物一

木瓜一枚

乾薑切兩

香薷飲類方

右四味以水六升煮取二升五合絞去滓分
温三服服別相去如人行六七里並無所忌
救急療霍亂初覺不好則用此方主腹痛吐痢
香薷湯方同上

生香薷物一

小蘇一升

厚朴六兩

白朮

生薑十兩

右四味切以水一斗煮取三升分三服得吐
痢止每服皆須温

刑繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯
方同上

厚朴

四兩

乾薑

二兩

茯苓

三兩

白朮

五兩

人參

三兩

右五味切以水七升煮取二升分三服

李治古今註可攷 千金卷七割記

葛原詩話卷四十九

通俗編卷十二

本草合藥料理

料理

取猫狸一物料理作羹如食法空心進之肘後方卷

五葛氏卒得鼠瘦有瘰癧未發瘡而速熱者

猪肚一具淨料理如食法千金翼卷廿二飛鍊研煮五石及和草藥

服療第二猪肚煮火石英服方廿二ノ六才外臺

右九味各別依法料理外臺卷十七延年枸杞子煎方枸杞子杏人生地黃人參茯苓天門冬白蜜牛髓鮓

大豆五升取肥好者一依作醬法料理取黃上同

延年服大豆法

除飽吞已外料理如生肝同卷廿五必効療痢初較後膿血云云

料理

右四味以水六升煮取二升五合飲去滓分
三服服時如人行六七里止無所忌
生白木五兩大寒食瀉胃氣吐不止厚朴湯
方聖休四兩 薄黃帶豆葉二 芥菜三
古五粒以水六升煮取三升分三服得吐
白木五兩大寒食瀉胃氣吐不止厚朴湯
生白木五兩大寒食瀉胃氣吐不止厚朴湯
生白木五兩大寒食瀉胃氣吐不止厚朴湯

生羊肝一具右一味云云方後廿五ノ卅五

所以辛苦料理使光滑者恐有浮碎同卅七服石法卅七ノ卅

下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理

乃佳病源卷十三脚氣緩弱候千金方卷七

少來多遊山林未經料理此事外臺卷三十三ノ四十三才引崔氏

獸一具羊肝野吹食去千金翼卷十三

頭酥野一味味野神美吹食去空心並之

味野

本草綱目卷之十一
李時珍本草綱目卷之十一

徐靈胎曰桂枝去皮即桂心非近時所用之肉桂心也竹園堂軌範卷二大建湯湯注

桂心

桂削去皮用裏黑潤有味者為佳玉函經

凡用桂心削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤

之陶弘景

桂心蓋取其枝中之肉千金方凡例

桂即肉桂也厚而辛烈者去粗皮用其去內外

皮者即為桂心李時珍

按桂心始見靈樞壽夭剛柔篇仲景用桂枝

其義一也心者熟好之謂不必擊重言古有導

心鼓心亦与此同外臺卷廿五救急療赤白

桂心

痢方用香鼓心云鼓心謂合鼓其中心者熟

而且好不是去皮取心勿浪用之此言當發

桂心之義也按又有朴心杜心互攷外台卷五

艾心外臺卷四引備急早人十七才

其用其去其心者

其用其去其心者

其用其去其心者

其用其去其心者

其用其去其心者

桂心

新書卷四十一

洗浴發汗

洗條互併攷

其有邪者清形以為汗素問陰陽應象大論

病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭

痛惡寒腰背強重此邪氣在表洗浴發汗即愈

巢源卷七傷寒候

延年祕錄療天行頭痛壯熱一二日水解散

方麻黃四兩去節大黃三兩黃芩三兩桂心

二兩甘草二兩炙芍藥二兩芍六味搗篩為

散患者以生熟湯浴訖以煖水和服方寸匕

洗浴發汗

覆取汗、或利則便差、丁疆人服二方寸匕、外臺

卷三

必效療天行一二日者、方麻黃一大兩去節、
右一味以水四升者、去沫取二升去滓、則著
米一匙及鼓為稀粥、取強一升先作生熟湯
飲、浴淋頭百餘椀、然後服前粥、則厚覆取汗於
夜最佳、同上麻黃、此藥、之間、姑蘇、赤、夜

瓜蒂下水

必效療諸黃眼已黃亦差、瓜蒂散方、外臺卷

丁香分一赤小豆分一瓜蒂分一一方加秫米分一

右三味搗末、溫水食前頓服、使盡則當利、并

吐黃水、不差更服。

廣濟療急黃身如金色、瓜蒂散方、同上外

赤小豆二七枚丁香二七枚黍米二七粒瓜蒂二七枚

麝香等分陸香等分青布二方寸燒為灰七

右七味搗篩為散、飲服一錢匕、則下黃水、其

黃則定。

瓜蒂下水

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散主之友千金翼卷

第三款

苦參 黃連 黃蘗 黃芩 大黃

瓜丁 葶藶各壹兩

右采味搗篩為散飲服方寸匕當大吐吐者日再得下服藥五日知可消息不知可更服

之、黃連黃芩白黃亦苦瓜蒂酒六兩

瓜蒂不木

黃連用酒

仲景湯藥論黃疸麻黃酒湯主之友外證卷

麻黃一大把去節碎裏

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服

盡言今方云傷寒熱出表發黃疸宜汗之則

愈今月用酒煮宜用水煮之良小也古今

藥方仲經心法同

治傷寒熱出表發黃疸麻黃酒湯方麻黃三

兩以清酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗

出即愈今月寒時用清酒煮月宜用水

凡人無故忽發振寒便發黃皮膚黃麩麩出小便赤少大便時開氣力無異食飲不效已服諸湯藥不除久黃者若參散主之
瓜丁 草歷 黃連 黃芩 黃芩 大黃
右采味搗篩為散飲服方寸匕當大吐吐者日再得下服藥五日知可消息不知可更服之

黃疸用酒

仲景傷寒論黃疸麻黃醇酒湯主之方外臺卷四廿九

麻黃一大把去節綿裏

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服

盡古今方云傷寒熱出表發黃疸空汗之則

愈冬月用酒春空用水煮之良小品古今錄

驗張文仲經心錄同

治傷寒熱出表發黃疸麻黃淳酒湯方麻黃三

兩以淳酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗

出即愈冬月寒時用清酒春月空用水千金

傷寒發黃第五計五按金匱要畧附方引斤

必効黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方外臺

卷四卅五

取東引桃根細切云云服後三五日其黃離

離如薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃

散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不則

散遲忌食麩猪魚等肉卅二卅半去辛煎服

麻黃一大吋去黃絲裏

抄景別與命黃麻黃麻黃酒卅卅主之文也

黃蘗用酒

瘡疾用酒 卷二可參攷

右二十二味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛

五斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛

如膠漆內諸藥煎為丸金匱要畧鼈甲煎丸方

治瘡或間日發者或夜發者又方千金卷十文小異

又先作羊肉臠麩餅飽食之并進少酒隨所能

其令欣欣有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取

大汗即差外臺卷五集驗瘡從四肢始又方同

又方燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三同

治老瘡久不斷者方同上方後云右五味吹咀

瘡疾用酒

外臺卷五
引備急瘡
間日瘡方
畧同

絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿
成一服一合同上 外臺卷五引作山瘡瘡

治瘡無問新久者方馬鞭草汁五合酒三合分
三服同上

又方常以七月上寅日採麻花酒服末方寸匕
同上

治瘡方後云右五味吹咀以酒二升半漬之
五露一宿明日塗五心手足過發時瘡斷若不
斷可飲一合詳差同上

鯪鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘡方後云

右五味吹咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜
之同上 千金翼同

酒服十九日再飲服亦得同上治肝邪熱為瘡
未發前酒服十九同上恒山丸方後 外臺卷

卯時發者鞭死鬼所為治之用五白衣燒作灰
三指撮著酒中無酒清水服千金翼卷十八

酒服方寸匕外臺卷五肘後療諸瘡又方方後
以酒三升漬一宿同上又方後

以酒三升水四升合煮取二升同上深師常山
以酒二升漬一宿同上深師療臍湯方後五ノ才

病未發前一日以酒浸藥於椀內以白紙一張覆之同上必效常山酒方後

以酒飲任下三十九同後吐今錄驗烏梅丸方

酒服十九日再同上千金烏梅丸方後

以溫酒下二十九至三十九同上廣濟療溫瘧常山丸方後

以酒三升漬之同上抄品療山瘴瘧鯉甲湯今

平旦空腹溫酒三合服方寸匕同上備急麻黃散方後

以水一斗漬之并春酒二升合煮取三升去滓分三服

發日平旦酒服一方寸匕臨發又一匕發後又同上救急蜀漆湯方後

一七二日不得洗手面七日忌食雜物唯藥

用酒得餘皆斷或吐或不吐皆差同上常山散方後

以酒小一升半漬一宿同上古今錄驗常山酒

候欲發前一食時酒下四十九同上近効常山

酒飲服三十九同上木香犀角丸方後

以酒漬藥刀置上覆安露地同上抄品常山湯後

以濃酒一盞調三錢空心頓服相次更服三錢

更飲三兩盞酒任意醉却睡候過時方得食

同上集驗黃連散方後

以酒一斗宿漬之向晚以瓦釜煮取六升一服

八合比發時令得三服同上深師常山湯方後廿九才

先發熱飲和服若先寒清酒和服之同上崔氏常山散方

後

未發時酒服二十九同上備急烏梅丸方後廿

以酒三升漬經再宿空腹早朝温服一合近山

酒方後廿一才

以酒三斗漬一宿平旦服一合稍稍加至二合

日三四服同上肘後驚甲酒方後廿九

用清酒下行五十餘步隨意坐臥無酒湯下亦

得同上古今錄驗朱砂丸方後廿三

右三味各別搗五六百杵又和更搗六七百杵

然點好酒如黑泥自成丸不飲酒事須酒下

三十九丸如梧子未發前服同上近山

平旦空肚以酒飲下同上許仁則當歸等六味散方後廿九

治瘡病又方常山三兩甘草半兩水酒各半升

合者煮取半升先發時一服比發令三服盡後

方卷三治寒熱諸瘡方第十六三ノ二才

又方常山三兩剉以酒三升漬二三日平旦作

三合服欲嘔之臨發又服二合便斷舊酒亦

佳急亦可煮同上三ノ二ノ

老瘡久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻一

兩附子一兩烏賊骨一兩以酒六升漬之小

令近火一宿成服一合比發可數作同上三ノ二ノ

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有酒

氣不即斷更作不過三服而止同上三ノ三ノ

又方末龍骨方寸七先發一時以酒一升半煮

三沸及熱盡服溫覆取汗便即效同上三ノ一ノ

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩酒

一斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服八合

○殺菌心方卷十
四引葛氏方
同三ノ三ノ

比發時令得三服熱當吐冷當利服之無不

差者半料合服得同上三ノ一ノ

發日五更酒下三十九同上治一切瘡烏梅丸

葛氏方治瘡病又方炙鼈甲搗末酒服方寸七

殺菌心方卷十四廿八
斷者方畧同三ノ三ノ後又引葛氏方老瘡不

本草替疑云治瘡燒猫屎為末酒服方寸七同上九

當發日從旦至發時溫酒服方寸七三服同上九
治

鬼瘡方梓

恒山三兩豉一升秫米一百粒蒜七片研清酒

瘡病用附子

二升、漬之一宿、早旦服之。同上通玄鬼瘡方

桃菜十四枚、恒山四兩、凡二物、酒二升、漬一宿、

同上僧深方治勞瘡、桃菜湯方後廿四才

恒山二兩、甘草二切、以白酒大一升、浸一宿、去

滓、分二服、云云。同上錄驗方治瘡及瘴氣方

鼈甲一兩、淡竹葉切三升、恒山三兩、甘草三兩、久

酒三升、凡五物、以酒漬藥、云云。同上小品方

外臺卷五、引作小品恒山湯

牛膝草一把、好酒三升、凡二物、牛膝內酒中、漬一宿、

恒山兩、甘草一兩、大黃二分、桂心六銖、凡四物、切以恒山酒漬一夜、

恒山五分、干漆四分、桂心二分、杏仁仁二分、凡四物、下篩、酒服方寸

瘡疾用附子 卷二可冬攷

治瘡病又方、臨發時、搗大附子、下篩、以苦酒和

之、塗背上。附後方卷三治寒熱諸瘡方三十一

又方、巴豆一枚、去心皮、射蔞如巴豆、大棗一枚、

去皮、合搗成丸、先發各服一丸、如梧子大也、

同上三初

老瘡久不斷者、常山三兩、鼈甲一兩、炙升麻一

兩、附子一兩、烏賊骨一兩、以酒六升、漬之、小

令近火、一宿成、服一合、比發可數作。同上三初

治瘡瘡、常山、黃連、豉、熬各三兩、附子二兩、炮、搗

瘡疾用附子

千金卷十文
小異、十、廿、六、夕
外臺至卷五、引
千金、作、寒、引
作、熱、作、有、作
無、山、瘡、瘡、酒

篩蜜丸空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時勿喫食同上三三外臺卷五備

治瘡方千金方卷十温瘡第六十七

鼈甲抄 烏賊骨二方 附子 甘草各一

恒山二 右五味以酒二升半漬之露

一宿明日塗五心手足過發時瘡斷若不斷

可飲一合許差

鮫鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘡方同上

千金翼卷十八作瘡疾江南瘡瘡十八四ウ外臺卷五引小品主治類異五十七ウ

鮫鯉甲抄 鼈甲 烏賊骨各一

恒山三 附子一枚

右五味以酒三升漬一夕發前稍稍啜

之勿絕吐也兼以塗身斷食過時乃食飲之

翼方鮫鯉甲鼈甲下有炙字附子下有炮去皮字外臺作陵鯉甲十片炙烏賊魚四片去甲鼈甲炙附子炮方後文小異

古今錄驗療瘡鼓心丸方外臺卷五九ノオ

香鼓五合熬 常山三 大黃三分 附子二分

右四味搗篩蜜和丸服如大豆十九當勿食

比至發來令服三十九瘡不止亦可至四十

丸瘡必止若膈上有停淡欲吐聽之若腹中

實欲下亦無妨常有驗

深師療久瘡難斷香豉丸方同上廿九才

香豉一分常山七蜀漆分附子一分

大黃二分

古右五味搗下篩蜜和發日早服五丸如梧子

須臾又服五丸發晚者至發可三四服令其

得吐為佳欲不即斷畏吐者但則長將久服

無不差也

備急龍骨丸療久瘡不斷者方同上

龍骨兩

常山兩

大黃兩

附子二分

右四味搗末以雞子黃丸如梧子大先發臨發各飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年瘡

肘後療勞瘡鼈甲酒方同上

鼈甲二兩常山兩蜀漆兩烏賊魚骨一兩

附子兩知母兩椒兩

右七味切以酒三斗漬一宿平旦服一合稍

稍加至二合日三四服

僧深方治一切諸瘡無不斷恒山丸方醫心方卷十四

大黃一兩二方附子一兩炮恒山三兩

龍骨一兩

凡四物治合下篩蜜和平日服梧子七丸未

發中間復服七丸臨發服七丸若不斷至後

日復發更服如此法甚神良按此方与前備急龍骨丸畧同

僧深方治卅年瘡龍骨丸神方同上卅六

龍骨分四恒山分八附子分三大黃分八

右四物治從雞子和發前服七丸如大豆臨

發服七丸

續醫說卷六附子愈瘡醫方攷卷二七寒湯

治瘡灸法

弦緊者可發汗針灸也唯貴要略瘡病脉證并

療瘡病又方大開口度上下脣以繩度心頭灸

此度下頭百壯又灸脊中央五十壯過發時

灸二十壯肘後方卷三治寒熱諸瘡第十六

集驗瘡瘻又方桃葉二十七枚安心上艾灸菜

上十四壯僧深方同之醫心方卷十四廿七

千金方治瘡又方未發前預灸項大椎尖頭漸

灸過時止同上

外台卷五引備急方可效

葛氏方治瘡病又方灸鼈甲搗末酒服方寸匕

治瘡灸法

外臺云大椎穴在背從第一椎上節陷中是也
又三間穴在虎口第三指節根下一寸
又腎俞穴在第十四椎下兩傍各一寸半是也
又上星穴在鼻中央直入髮際一寸陷容豆是也

至發時令三服兼用火灸无不断同上
凡灸瘡者必先問其病之所先發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎夫頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎輸百壯從手臂發者灸三間千金方卷十卅下並同外臺卷五瘡灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也同上覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線頭三七壯炷如小豆

又灸風池二穴三壯

一切瘡無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右五歲一切諸瘡灸尺澤七壯穴在肘中約上動脉是也

瘡瘡上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆是也灸七壯先取諍諱後取天牖風池

瘡日西而發者臨泣主之穴在目眦上入髮際五分陷者灸七壯

瘡實則腰背痛虛則鼻衄飛揚主之穴在外踝

上七寸灸七壯

瘡多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主
之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯

瘡醫曾並不能救者方千金翼卷十八六寸外臺

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截

斷繩取所量得繩置項上著反向背上當繩

頭處中脊骨上灸三十壯即定候看復惡寒

急灸三十壯即定比至發過一炊久候之雖

飢勿與食盡日此法神驗男左女右同上

若脉數而緊者可發汗針灸之脉浮大者不可

針灸之病源卷十一瘡病候

茯苓杏仁甘草湯治胸中有痰血者

治有痰血者其人喜忘不欲聞人聲胃中氣塞短氣者方千金方卷廿五被打第三

甘草兩一 茯苓兩二 杏仁五十枚

右三味以水二升煮取九合分二服

刪繁療下焦虛寒損腹中痰血令人喜忘不欲聞人聲胃中氣塞而短氣茯苓丸方外臺卷

茯苓八分 甘草七分 杏仁五十枚 黃去皮 炙令

人參七分 厚朴五分 乾薑七分 黃耆六分

桂心四分 當歸八分 芎藭五分 乾地黄八分

茯苓杏仁甘草湯

右十一味、搗篩下蜜和為丸、如梧子、初服二
十九丸、加至三十九丸、日再服、清白飲進之、

若杏仁 甘草 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁 杏仁

間入鹽、管中、厚、塞而、臥、床、發、冷、其、大、也、蠶、卷、

惻、燥、發、下、為、通、寒、煎、頭、由、感、血、冷、入、喜、之、守、心、

古、三、和、以、水、二、升、煮、取、六、合、分、二、

甘草 一 升 杏仁 二 升 杏仁 五 升

跌、床、者、大、金、大、卷、廿、五、疔、在、其、三、

亦、有、感、血、者、其、入、喜、之、不、殆、間、入、鹽、管、中、厚、

亦、入、杏、入、甘、草、長、亦、中、有、感、血、者、

肘後一合
十五ノ才

其心痛用桂心當歸大方中用此二味者不

備急療心痛方外臺卷七

桂心末、温酒服方寸匕、須臾六七服、乾薑依

上法服之亦佳、味、苦、大、味、苦、子、頭、三、大、醉、

必效療心痛方同上方

又當歸末、酒服方寸匕、頻服、

必效療蛇心痛、茱萸丸方同上方

吳茱萸升 桂心兩二 當歸兩二 三五服亦主

右三味搗篩、蜜和丸、如梧子、酒服三十九丸、日

再服、漸加至四十九丸、以知為度、

心痛用桂心當歸

肘後一ノ十六ウ

肘後療卒心痛桂心散方同上桂

桂心當歸略一 梔子人十四枚

右三味搗為散酒服方寸匕日三五服亦主

久心痛發作有時節者

肘後一ノ十六ウ 又桂心丸同上

桂心二兩 烏頭一兩

右二味搗篩蜜和為丸如梧子服三丸稍增

之

肘後一ノ十六ウ 集驗卒心痛桂心湯方同上

桂心八兩

右一味以水四升煮取一升半分二服

先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩千金卷七

防風湯方後七ノ十八才

肘後一合

心痛用黃連梔子
大方中用黃連梔子者
多今唯舉單捷者
古今錄驗療心痛黃連湯方外臺卷七
黃連兩八
右一物以水七升煮取一升五合絞去滓適寒溫飲五合日三服
肘後療卒心痛桂心散方方見前條
下及吐水永在同上以煎薑湯方後
肘後療心口痛如刺口中吐清水方
取有子陳木根剉以水煮取濃赤黑汁用末

心痛用黃連梔子

相妙藥卒心感封心惜太如見

牽直寒感增五合日三

古一也如胆以木才升煮煎一升五合味去

黃連

古今疑藥心感黃連煎之

心謂用黃連煎之

誘虻法

先以猪肉脯一片空腹啖嚙汁勿嚙肉後取胡

粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十

歲以上斟酌增減外臺卷七救急療心痛不
可忍似蛔者胡粉丸方七七

右二味以猪肉汁六升煮檳榔取三升去滓內

鶴虱末先夜不食明旦空腹頓服之須臾病

下及吐水永差同上必効
七八十鶴虱檳榔湯方後

肘後療蛔蟲攻心痛如刺口中吐清水方同卷

廿六廿六ノ四十六

取有子棟木根坐以水煮取濃赤黑汁用米

誘虻法

煮作糜宿勿食旦取肥香脯一斤先喫令蟲
聞香舉頭稍從一口為度始少進自後食一
斗七食半升糜便下蛔秘不傳治本病後元及

卷廿六ノ下十ノウノ二ノ方ノ入ルハハ
論盛末夫或不會肥且空則取則之取更麻

古二和以散肉六六升煮熟味取三升去其肉
煮以土饅酒治本病後元及

味味肚麻時許六以少青酸刻丸煎服治本病後元及
夫以散肉餅一升空則更熟十心煎肉餅取

精製去

虬病用鶴虱

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胃背撮

痛欲變吐當歸鶴虱散方外臺卷七

當歸八分 鶴虱八分 橘皮六分 人參六分

檳榔十二分 枳實六分 芍藥六分 桂心五分

右八味搗篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕

又日二服漸漸加至一匕半不利

又療諸盡心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴虱

散方同上

當歸 桔梗 芍藥 橘皮 鶴虱各八分

虬病用鶴虱

人參六分 桂心六分 檳榔一分

右八味搗篩為散，空腹煮薑棗湯服，方寸匕，漸漸加至二匕，不利。

又主心腹攪結痛不止，仍似有蛔蟲者，當歸湯方，同上。

當歸 橘皮 細辛 甘草炙 生薑各四分

大黃別剉 鶴虱二分

右七味切，以水六升，煮取二升，分溫三服，如人行四五里，進一服，不利未差，三日更作服。

之

張文仲療蛔蟲心痛，鶴虱散方，同上。

鶴虱二分末，溫酢一盞，和服之，蟲當出。

延年療蛔蟲吐水心痛，鶴虱丸方，同上。

鶴虱三兩，搗篩，蜜和為丸，用蜜漿水，平旦服。

二十九日，只一服。

又鶴虱丸療蛔蟲心痛方，同上。

鶴虱六兩 吳茱萸五兩 橘皮四兩 桂心三兩

檳榔四兩

右五味搗篩，蜜和為丸，如梧子大，一服二十丸，蜜湯下，日二服，加至三十九丸，以蟲出為度。

必效療蛭心痛方鶴虱檳榔湯方同上八才

鶴虱二兩小兒用一兩 大腹檳榔二七枚切碎

右二味以豬肉汁六升煮檳榔取三升去滓

內鶴虱末先食不食明旦空腹頓服之須臾

又病下及吐水永差神效

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴

虱散方同上十九ノウ

雷丸分 鶴虱分 貫衆分 狼牙分

桂心分 當歸分 檳榔人分

右七味搗篩為散空腹煮大蜜水半雞子許服

方寸七日二服若重不過三服則差不利

延年療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲齧心痛

當歸湯方同上十九ノウ

當歸兩三 桔梗兩二 吳茱萸兩三

桂心兩三 芍藥兩二 大黃兩二

右六味切以水六升煮取三升三合去滓內

鶴虱一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利

為度

山雀氏廿六
日十九ノウ

肘後一十五
少用桃人味
下必効可冬

必效療結心疝方 大腹積積湯方

高莢末以豬肉汁六升煮覆椒取三升去滓

六升煮以水六升煮取三升三合去滓

黃芩二兩 芍藥二兩 大黃二兩 甘草二兩

大黃湯方 外臺卷七十九

崔氏療疝心腹痛不可忍似疝病者或暴得惡

疝攪刺欲死桃人大黃湯方 外臺卷七十九

鬼箭羽 兩二 桃人 皮六十枚去

鬼臼 二兩 削 橘皮 兩二 當歸 兩二

桂心 兩二 柴胡 兩二 朱砂 兩二 生薑 五兩

麝香 湯一分 研 朴消 湯二兩 研 大黃 三兩 麝

湯欲熟內之

右十三味切以水九升急火煮取三升温分

三服如人行相去六七里服但得快利三四

心痛用桃人

心痛用桃人

心痛用桃人

心痛用桃人

心痛用桃人

行必差八升去六寸里邪野野野野三四

廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方同上

當歸 桔梗 芍藥 各八分 厚朴 十分

橘皮八分 人參六分 良薑十分 桃人五十枚去皮夫兩人

生薑八分

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分

温三服服別相去如人行六七里進一服不

利

廣濟療心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯

方同上煎

高良薑十分 當歸十分 橘皮八分

厚朴十分 桔梗八分 桃人五十枚去皮夫

吳茱萸八分 生薑八分 訶梨勒五分

右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓

分温三服服別相去如人行六七里再服

必效療三十年心痛方同上

桃人七枚去皮夫

右一味研湯水合頓服酒服亦良

廣濟療心痛心撮肋心悶則吐血手足煩疼

食飲不入桃人丸方同上煎

桃人八分去皮當歸六分芍藥八分

訶梨勒六分甘草六分延胡索四分

人參六分檳榔八分

右八味搗篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十丸漸加至二十九日再服取快利

五膈丸類 五噎丸附

膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣勢得相燻染有五膈丸方肘後

方卷四十三

麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子

炮乾薑人參桂細辛各六分搗篩以上好蜜

丸如彈丸以一丸含稍稍嚥其汁日三丸服

之主短氣心胸滿心下堅冷氣也此疾有十

許方率皆相類此丸最勝用藥雖多不合五

膈之名謂憂膈氣膈恙膈寒膈據巢源十三疑脫熱膈

五膈丸類

其病各有診別在大方中

五膈丸治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病同藥
治以憂患思慮食飲得之若冷食及生菜便
發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀
食即心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即差飲
食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短
氣方千金卷十七疔

麥門冬

甘草

各五兩

蜀椒

遠志

桂心

細辛

各三兩

附子

一兩半

人參

四兩

乾薑

二兩

右九味末之蜜和丸微使淖先食含如彈丸

一枚細細咽之喉中肯中當熱藥力稍盡復

含一九日三夜二服藥七日愈注延年方

云若不能含者可分一大丸作七小丸益服

之夏月含益麥門冬甘草人參胡洽云亦可

梧子大十九酒服之經心錄以吳茱萸代桂

心酒服梧子五丸空腹服之治寒冷則心痛

咽中有物吐之不出咽之不入食飲少者

備急膈中之患名曰膏盲湯丸徑過針灸不及

所以作丸含之令氣勢得相熏染有五膈要

九方外臺卷八

麥門冬十分 椒六分

遠志

附子炮

乾薑

人參

桂心

細辛

甘草

十分

右九味搗篩以蜜和丸如彈子以一枚著牙

齒間含稍稍嚥汁日三主短氣胃滿心下堅

冷氣此病有十許方率皆相類此丸最效五

膈者謂憂膈氣膈悲膈熱膈寒膈也千金肘

後文仲同

張文仲五膈丸方同上

吳茱萸

麴

杏仁

去皮

乾薑

蜀椒

汗去開口者及目

好豉

熬令

右六味等分搗篩蜜和丸如梧子飲服七丸

日三此方出隱居効驗備急肘後同

延年秘錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同

藥常以憂愁思慮食飲而得之若寒食食生

菜便發其病苦心滿不得氣息引脊痛如刺

之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則

差飲食不得下甚者乃手足冷上氣欬逆喘

息氣短療之九物五膈丸方同上

麥門冬法

蜀椒

汗各

遠志

三

甘草五兩

附子二兩

乾薑三兩

人參四兩

桂心三兩

細辛三兩

程敬通曰此即前五膈要丸一味不差

右藥搗篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈子丸一九置喉中稍嚥之喉中曾中當熱藥稍盡復含之丸日三四夜一二服服藥七日愈二十日平復若不能含者可分一大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不異神良椒當以銅器熬於火上使極熱下置地內椒器中熟攪之

須臾汗出便搗合曰起椒力有熱亦去其毒非今有熱也忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜千金集驗同不能具於此方錄用之耳

古今錄驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處又歲有虛冷氣迫咽喉曾滿氣逆脅有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉強筋骨利五藏好顏色補不足益氣力友同上卅九

細辛
桂心
黃芩
吳茱萸

厚朴各三兩杏仁三枚乾薑二兩

椒汗各一分遠志各三分甘草一分小蘗一分芍藥一分

附子炮當歸各二分黃連二分

右十四味搗篩蜜和服如梧子二丸日三不

知加之以知為度

又五膈丸療夏膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同

古藥神方同上附子炮遠志法桂心

人參全附子炮遠志法桂心

細辛各四分乾薑各五分蜀椒各五分

右七味搗篩以蜜和服如彈丸著牙下吹咀

噉之若病劇者日三夜再并療諸毒風注氣

腹中百病皆應當得真新好藥即可中病耳

神秘妙方不傳程敬通曰此方比前五膈丸全但少麥冬甘草二味

又療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五藏俱虛則受

風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於

外陰陽雜亂語言無常俠舌左右狀如結氣

喉咽不利氣出不入此血氣衰微藏凝冷氣

成之服此丸安穀通氣溫藏五膈丸出僧深

方同上

蜀椒一分乾薑二兩桂心二兩芍藥一兩

半

半

半夏洗 細辛 茯苓各一兩 前胡一兩

右八物搗篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再又療曾痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方同上研

半夏一分削去 甘草炙 遠志去心各四分

乾薑 桂心 細辛 椒去目 附子炮各三分

右八味搗篩以蜜和為丸先飯酒若粳米飲服如梧子五九日三服增至十九

經心錄五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐

之不出咽之不入食飲少方同上秤

乾薑三兩 麥門冬二兩去心 附子一兩炮 細辛二兩

蜀椒一兩汗 遠志一兩去心 甘草一兩炙 人參二兩

食茱萸二兩 桂心三兩

右十味蜜和為丸如梧子服五合千金同煎

通曰此方即前五膈丸多食茱萸一味

古今錄驗五噎丸主治文長畧之又見千金十六

乾薑 蜀椒汗 食茱萸 人參

桂心各五分 細辛 白朮 茯苓

附子炮各四分 橘皮六分

右十味搗篩以蜜和為丸如彈丸酒服三丸、日再不知漸增、

經心錄五噎丸主五種之氣皆令人噎方同上

人參 半夏 桂心 防葵一方用防風

附子炮 細辛 甘草炙各二兩

食茱萸合紫苑 乾薑 芍藥

枳實炙 烏頭各六分

右十三味搗篩以蜜和為丸如梧子大服五丸日三不知加至十五丸

○者波女方治

人風噎方醫

卷三十八

雲金羊角五兩

通草二兩半

防風二兩

升麻二兩

甘草四兩炙

五味搗篩為散以白飲服

一方十七日二

○噎用羚羊角

○深師通氣噎方外臺卷八十四

半夏洗三兩 桂心三兩 生薑八兩 羚羊角三兩

右四味切以水八升煮取三升分服半升日

再服醫心方無羚羊角

救急療喉中氣噎方同上

半夏洗 柴胡 生薑各三兩 羚羊角屑一法

犀角屑 桔梗 昆布 通草 甘草炙各二兩

右九味切以水八升煮取三升分三服

古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方

噎用羚羊角

古同上○千金卷十六羚羊角湯全同廿七

羚羊角兩二厚朴炙吳茱萸

乾薑各三兩通草二橘皮各二兩

烏頭十五枚炮○

右七味切以水九升煮取三升分三服日三

深師療噎方同上梨

羚羊角屑前胡甘草各一

人參橘皮各二

又方同上梨右五味切以水六升煮取二升分四服

羚羊角

右一物多少自在末之飲服亦可以角摩手噎

上良醫心方卷廿九引葛氏方治食卒噎方以梨

羊角摩手噎上廿九引葛氏方

同上○竹筴卷十六於羊角湯全同以
 羚羊角原朴吳茱萸
 乾薑略三通草略二橘皮略二
 烏頭千金五石略
 右七味以水九升煮取三升分三服日三
 深師略噎方同上詳
 羚羊角略前胡略甘草略
 土身羊角湯
 昔三略心自甘末之類亦何如詳
 又詳羊角

竹筴治諸噎法

治諸噎方作竹筴刮令滑綿裏內咽中令至硬

處可進退引之噎即隨出

外臺卷十六十三少

同八ノ五十三

醫心方卷廿九引葛氏方畧同

按片倉元周青囊瑣探上糯資噎塞用牛膝
 牛蒡根摺扇等法並此類法也

半美射野麻著志並此藥去也

并六會示周吉青嘉美與烈土熱發貧豐塞用半相

自八至天

醫心方卷十四凡其方古醫同類

處百並引凡之更兩翻出

宗前更方并竹葉散合醫醫裏內即中令至更

竹葉散前更去

用獺肝諸方

肘後獺肝散治冷勞又主鬼疰一門相染金匱要略

附方引

醫心方卷十四引集驗方作治鬼注病相染易盡門方十四ノ廿三ウ

獺肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

尸注鬼注病者葛云即是五屍之中尸注又按

諸鬼邪為害也其病變動乃有三十六種至

九十九種大略使人寒熱淋瀝怳怳默默不

的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓

滯以至於死死後復傳之旁人乃至滅門覺

知其候者便宜急治之方肘後卷一

肘後灸作陰外臺引備急心同醫心方引集驗方作乾之下條十四ノ廿三ウ

用獺肝諸方

獺肝一具陰乾搗末水服方寸匕日三未差

更作姚云神良千金卷十七文類同外臺卷十三別備急文畧同

江南度世丸主萬病癥結積聚伏尸長病寒熱

疰氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩

熱嘔逆不食傷寒時氣惡疰汗出口噤不開

心痛方千金卷十七

蜀椒三人參細辛木甘草各二茯苓

真珠 大黃 乾薑 丹砂 野葛 桂心

雄黃 鬼臼 麝香各一烏頭 牛黃各三

附子 紫苑各六 巴豆枚十 蜈蚣枚二

右二十味末之蜜丸飲服小豆大二丸加至

四九日二加獺肝一具尤良

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

同上

獺肝具一 雄黃 莽草 丹砂

鬼臼 犀角 巴豆各一 麝香各一

大黃 牛黃各一 蜈蚣枚一

右十一味末之蜜和空腹服如麻子大二丸

加至三丸以知為度

廣濟療瘦病每日西即弄色脚手酸疼口乾壯

熱獺肝丸方和外臺卷十三廿六

獺肝六分 天靈蓋燒四分 生犀角四分

前胡四分 升麻四分 松脂五分

枳實炙四分 甘草炙五分

右八味搗篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸

豉汁下二十九日再不利

文仲論傳屍病亦名痲瘡道注骨蒸伏連殮殍

此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年

三年有能食不作肌膚或三日五日若微勞

即發大都頭額頸骨間尋常微熱合時然死

復家中更染一人如此乃至滅門療之方同上

廿七ノウ

獺肝一具破 鼈甲一枚 野狸頭一枚

紫苑四分 漢防已一分 蜀漆洗

麥門冬炙各 甘草炙各

右八味搗篩以成鍊殺羊腎脂二分合蜜一

分烱冷和丸藥如梧子大服十九丸加至十五

丸日再以飲下之其藥合和訖分一分頭邊

著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次

服臂上次服門上者大驗

古今錄驗犀角丸療百病鬼疰惡風入人皮膚
淫淫液液流無常處四肢不仁牽引腰背腹
脹滿心痛逆氣填胃不得飲食噯噯短氣寒
熱羸瘦喜惡夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆
療之方同上丸

犀角屑 桂心各三 羚羊角屑

牛黃 鬼白 附子炮

獺肝炙各二分 巴豆三十枚去心皮熬 蜈蚣四枚去足炙

麝香研 真珠 雄黃研 丹砂研各四分

射干一分貝齒十箇燒

右十五味搗篩蜜和搗五千杵平旦服如胡豆
二丸日三

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方同上

獺肝十六分 人參 沙參 丹參各三分

鬼白 苦參各二分

右六味搗篩蜜和丸如梧子大一服十九飲
汁下日三服加至十九

本事方卷七 十三方

古今錄驗產自九癩百病鬼疰惡風入人皮膚
淫淫夜夜流無常處四肢不仁重引腰背腹
本產天毒上氣喘實不得飲食噎噎短氣寒
長不日三服效並七日交通款款唾膿血皆
古六和書補遺味大咬餅干大一頭十式煇
與白 告無心必三 趁羊角屑

續命湯類酒煮方
諸續命湯類者法有有用水酒煮者今
世絕無用者茲鈔千金外臺方後所載
以備他日試用如其丸散酒服諸酒劑
類及二十味以上方省不錄

續命湯類酒煮方
諸續命湯類者法有有用水酒煮者今
世絕無用者茲鈔千金外臺方後所載
以備他日試用如其丸散酒服諸酒劑
類及二十味以上方省不錄

紫方書

續命湯類酒煮方
諸續命湯類者法有有用水酒煮者今
世絕無用者茲鈔千金外臺方後所載
以備他日試用如其丸散酒服諸酒劑
類及二十味以上方省不錄

大八風湯千金卷八九 考本書下皆倣此 主治分量畧不載當

當歸升麻五味子烏頭黃芩芍藥遠志獨活

防風芎藭麻黃秦艽石斛人參茯苓石膏黃

耆紫苑杏仁甘草桂心乾薑大豆

右二十三味咬咀以水一斗三升酒二升合者火

續命類用酒者

取四升，彊人多四服，羸人分六服。

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產

後中風方

同卷八

羌活桂心芍藥葛根麻黃乾地黄甘草生薑

大右八味咀咀以清酒三升水五升煮取三升

溫服五合日三服

治四肢緩弱身軀疼痛不遂婦人產後中柔風

及氣滿葛根湯方

同上

藥味方後文與前方全同

白斂薏苡湯治風拘攣不可屈伸方

同上

白斂薏苡人芍藥桂心牛膝酸棗人乾薑甘

草附子

右九味咀咀以淳酒二斗漬一宿微火煎三

沸服一升日三扶杖起行不耐酒服五合。

石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行

要脊僵直五緩六急手足拘攣陰疹搔之作

瘡風尸身癢卒風面目腫起手不出頭口噤

不能言方

同上

石南乾薑黃芩細辛人參桂心麻黃當歸

芍藥乾地黄甘草食茱萸

千金翼卷
十七有車前
子共十味方
後作漬復
時

右十二味以水六升酒三升煮取三升
分三服大汗勿怪

倉公當歸湯主賊風口噤角弓反張痙者方同

世七才 外臺卷十四引千金無方名

當歸防風獨活麻黃附子細辛

右六味以酒五升水三升煮取三升服

一升口不開者格口內湯一服當蘇二服小

汗三服大汗千金翼作酒八升水四升合煮

深師療賊風入腹五藏四肢心胃急痛背反寒

咽乾口噤戴眼方外臺卷十四注云此

不同

藥味与次大續命湯全同故畧

右九味以水酒各五升合煮取四升分

為四服

又大續命湯療毒風賊風身體不能自收不知

痛處咽中卒不得語若拘急腰痛引頸目眩

不得見風坐欲却倒覺即反張脊不著席脉

動不安恍惚恐懼欲啼上氣嘔逆面腫方同

十五升

杏仁芎藭石膏甘草桂心當歸麻黃乾薑黃

苓

右九味切以水六升酒三升合煮取三升分
為四服取微汗汗出粉之勿見風
又防風療瘵中風兩目不開不能言短氣欲死
方同上廿九才

又防風甘草黃芩茯苓當歸杏仁秦艽生薑乾
棗麻黃

右十味吹咀以清酒水共四升煮取三升分
三服發汗

古今錄驗八風九州湯療男子婦人寒冷不自

愛護當風解衣汗出臥冷濕地半身不隨手足
苦冷或不隨或俛仰屈伸難周身淫淫痺
四肢不收狀如風狂飲食損少方同上卅六才

麻黃甘草乾薑附子防風獨活石膏茯苓白
朮芎藭柴胡當歸人參杏仁細辛

右十五味切以水一斗清酒五升漬三夜煮
取四升分為三服一日令盡若病人羸瘦者
用水煎服藥訖厚覆當汗出微微去上衣汗
解以粉粉之

論文... 風水... 又... 可... 宋... 蘇... 四... 又... 古...

兩髀熱如湯沃

其著於伏衝之脉者，揣之應手而動，發手則熱。

氣下於兩股，如湯沃之狀。靈樞百病始生篇。

胞痺者，少腸膀胱按之兩髀若沃，以湯原作陽今改。

澹於小便，上為清涕。論少腹作少腹兩髀作

內痛新校正云按全元起本內痛二字作兩髀

眩冒狀如厥，氣衝髀裏熱。脉經卷九平齏冒

婦人病苦氣上衝，昏眩冒吐涎沫，髀裏氣衝熱。

同上

日工

款入諫苦屣土禮皆謂冒也或末醫果屣禮

相冒也吹風原禮實燕

奇笑小勇土為青氣始素

兩單者少期期期對之兩單者犬以馬

其音似為齊之神音語之獸手而連發手傾燦

兩單燦燦燦燦

兩單燦燦燦燦

乚字

方論醫學源流論卷上六十三

洪若臯乚僊記云乚或作叶与稽同卜以問

疑也虞初新志

說文三下卜部叶卜以問疑也

疑不疑何上問疑从口卜讀與稽同

又占視兆問也从卜口

入同

乚集韻正韻並堅奚切音雞說文卜以問疑

也通典西國用羊卜卜師謂之斯乚通雅乚

乚方字

當與叶同。字典乙部。

叶唐韻古奚切。集韻韻會堅奚切。正韻堅溪

切。然音雞。說文卜以問疑。从口卜。廣韻問卜

也。集韻說文引書叶疑。一曰考也。又或作此。

通作稽。韻會今文尚書作稽疑。又集韻遣禮

切。音啓。卜問也。同上。卜部。

疑也
 說文引書
 葉上六十三
 出字



Kitasato Memorial Medical Library