

醫
療
正
始

附
醫
院
類
案

一

松
科
別

i 101

492 1411
Tr 1

天保六年冬孟開雕


冲齋伊東先生譯本
医門療正始

附

醫院類案

初篇

象先



青藜閣叢兒



醫療正始標目

卷之一

宗類
第壹
替留熱

○屬類第一 热挾熦衝本性

第一種汎發真熦衝熱

真熦衝熱類案

一壯婦真純熦衝熱愈後再感治驗

純熦衝熱治驗

真熦衝熱血大灌溉於頭部治驗

熦衝樣一日熱治驗

頭上熾盛熱經過太疾治驗

卷之二

第二種聖京倔熱

聖京倔熱類案

單聖京倔熱治驗

聖京倔熱兼喉頭所患治驗

熾衝樣聖京倔熱兼氣管枝所患及唇上瘡

疹治驗

聖京倔熱胃痛治驗

聖京倔熱挾肝熾衝樣感觸治驗

卷之三

熾衝樣聖京倔熱挾胸脇刺痛治驗

聖京倔熱經過往再治驗

第三種僂麻質斯熱

僂麻質斯熱類案

單僂麻質斯熱治驗

熾衝樣僂麻質斯熱病勢位於中等治驗

姪婦僂麻質斯樣腸胃熱治驗

僂麻質斯熱頸項強治驗

熾衝樣僂麻質斯熱兼關節痛治驗

醫療正始卷之一

獨乙

昆斯骨夫著

和蘭

漢越而實幾譯

西肥

伊東淵玄朴重譯

此一回熱病莫因於局發疾患者。

熱病局發ノ疾患ニ因ルナキ者ハ其發歇スル時刻

ノ長短ニ隨テ之ヲ二宗類ニ分ツ

○宗類第壹 詛留熱

一回。發ノ其經過終ルマテハ熱病ノ諸證少モ間

○宗類第貳 間歇熱

斷ナク留連スル者。之ヲ誓留熱ト曰フ。發作時アリ其兩間ハ熱病ノ諸證。盡ク休止スル者之ヲ間歇熱ト曰フ。此區別ハ其由テ來ル所。已ニ久シ實ニ醫治ノ準繩ト爲ス可シ而ノ其日用ニ關ルモ亦極メ切ナリ。

宗類

誓留熱

アーチンホウデンデコールミン蘭
アーブリスコンチニア」羅

熱病一回。發ノ初ヨリ終リニ至ルマテ微シモ其熱勢増減スルトナク連続トノ誓留スル者。之ヲ名ケテ一向

誓留熱ト曰フ。按スルニ此ノ如ク熱勢少シモ消息セス儼然トメ留連基スルハ諸熱一發作ノ間ニ非サレハ之ヲ見ルト稀大ヒ太略。其他各種ノ熱病。每ニ必ス些子ノ進退ナキ。留才能ハス故ニ此篇說ク所。一向誓留ノ證ノ如キハ之ヲ見ルト甚尠シ。○純熾衝熱ノ如キハ一向誓留ノ熱種ニ屬スルノ最近キ者タリ然トモ尚其諸證凡ノ勢一弛一張。微シク相消息スルヲ免レス。是故ニ一向誓留ノ名ハ其弛張ノ昭々タル誓留熱ニ對メ之替フ命スルノミ

誓留熱ニノ病人。一時。其病惱ノ平ナルヲ覺ヘ他證モ亦隨テ消息スル者。之ヲ名ケテ弛張誓留熱ト曰フ。此熱一向弛張ノ別アリト雖トモ其本性ハ異ル所アルニ非ズ。但其熱勢ノ劇易ニ隨テ留連ノ際。少ク異同アルノミ故ニ熱勢愈劇ケレハ其熱モ亦愈一向ニ誓留ス。

誓留熱ヲ診スル者ハ體上何ノ器種カ病ヲ得ルト最甚キヲ審明メ其本性○下ニ開載スル熱性ノ四屬類是ナリヲ判斷ス可シ故ニ此熱病ヲ分テ四屬類ト爲ス。

○屬類第七 血管。病ヲ受ケル最深キ者熱挾、焮、衝、本性。

卽チ焮衝諸熱是ナリ

○屬類第二 消食器害ニ遭フ最甚キ者熱挾、腸胃病,

性卽チ腸胃諸熱是ナリ

○屬類第三 神經。病ニ罹ル最甚キ者熱挾、神經熱、性

卽チ神經諸熱是ナリ

○屬類第四 消食器。神經。俱ニ病ニ感スル最盛ナル

者熱挾、腐敗本性。卽チ腐敗熱又溶渙熱是ナリ

○屬類第一 热挾、焮衝、本性、

凡フ焮衝ノ本性ヲ挾ムノ熱病ハ皆誓留熱ニメ心臓

ト動脈ト殊ニ多ク病ニ感染シ血液。一種ノ造力ノ後
衡門ニノ起シ生力或ハ充張シ或ハ抑屈スルノ状ノ
詳ナリノ見ス者是ナリ之ニ属スル者三アリ其第一種ハ真煥

衡熱其第二種ハ聖京ヨンキン僵熱其第三種ハ僕麻質斯熱是

ナリノ

第一種汎發真煥衡熱

ワーレアルダメー子オ

ルツ蘭「左ブリス・イン・フランマトリ
ア・ゲニイナ・ユニ左ルサリス羅

真煥衡熱ハ即チ一向警留熱ニメ心ト動脈ト殊ニ多
ク病毒ニ感触シ血液ノ造力倍加シ生力太夕充張ス
ルノ状アリテ各部ニ局發スル煥衡ノ候ナキ者是ナ

リ○此熱善ク他熱ニ變ス故ニ之ヲ諸熱病ノ基本ト
云モ亦誣サル所タリ○人ノ此熱ヲ得ルヤ體上貴要
ノ諸機ト諸部ト著シク其常度ヲ失スルニ至ラズト
雖トモ然トモ一々モ其害ヲ蒙ラザル所ナシ

證候

此熱ハ太約全ノ前兆無ク或ハ暫時コレヲ見シ病人
卒然トメ洒浙惡風シ或ハ劇ハサカ憎寒シ嗣テ一身盡ク
壯熱シ熱留連シテ歇息セス或ハ其熱勢極キモ亦之アリ○而赤ク豊大ヒラタキガル生氣ニノ燔熱シ目中光澤甚
ク眼采銳クノ閃發ス○頭重痛撓タマク如ク額中最甚シ

但シ此際。神氣昏憒スルトナシ○此時ニ方テ感触シ
易キ人。若クハ小兒ノ如キハ動スレハ譖妄ヲ繼發ト
小兒ニ在テハ之ニ兼テ瘡撗ヲ得ルト多シ○睡寐。安
カラズ夢中。驚惕シ小兒ハ即チ夢中。驚起ス○鼻ト唇
口ト皆燥キ舌上滋潤シ或ハ時ニ乾燥シ其色過赤或
ハ薄キ白胎ヲ生ス○大渴連絲飲ヲ得テ暫ク消シ酸
味ノ飲液ヲ喜フ食機廢メ啖フト欲セス○口味惡
ク或ハ鑽ヲ嚼ムカ如シ○呼吸粗ク或ハ時ニ大息シ
氣息熱シ深息スルモ胸内妨クル所アルトナシ○肌
膚潤軟ニノ熱シ其色。或ハ赤ク之ニ觸ルニ其熱掌ヲ

灸ルカ如キヲ覺エス○諸道ノ排洩皆澁リ小便短少
ニノ透明シ色黯紅ニメ且熱シ大便難ニノ燥結ス○
患者身倦怠スルヲ覺フ○脉齊ニメ稍數洪強實大ニ
メ緊ナリ然トモ血著シク各部ニ逼迫シ或ハ疼痛。或
ハ痙攣ヲ挾ム者ハ其脉之カ爲ニ抑壓セラレテ縮小
ス爲ス然レトモ緊ヲ帶サルナシ○刺絡ノ血。水液ヲ含
ムト少ク稠厚ノ一大血塊ヲ結ヒ塊上凝固シテ豕脂
ノ如キ焮衝皮ヲ生ス○焮衝熱ノ證狀。今古衆人ノ患
ル所。凡テ上ニ述ル者ノ如久ナラサルナシ故ニ數百
年來諸家ノ記スル所モ亦皆コレト異ル所ナシ

局發疾患此熱ハ局發ノ所患ヲ挾マサル者。稀ナリ
此熱ノ真徵ハ其脉。洪大ニメ實シ或ハ伏シテ而ノ緊。
渾身。齊シク熱シテ一向ニ蟄留シ血。一異質○刺シ出
ヒタスリスノ血。脂
状ノ煥皮ヲ得。生力充張ノ狀アル等ナリ
経過

此熱ノ經過八十二時間熱一
或八三日或八七日ニノ
解散ス其十四日ニ及フ者ハ稀ナリ

素質 其人ノ生力。動スレハ充張スル者ハ特ニ此熱ヲ
得。易キ人素質ヲ胎スル者タリ

發因大氣ノ連寒。久燥蒸氣ノ壅遏感胃或ハ酷寒乍チ
溫ニ變シ或ハ大熱。盛暑菜蔬ノ食。熱性ノ飲ヲ慎用シ
身ヲ運スル度ニ過キ。睡寐ヲ廢シ神氣ヲ發揚スルノ
情思憤激等常習ヲ爲ス出血ノ壅遏○月經痔血皮上
ニ發スル癰疹內陷或ハ泄液○涕淚耵聍血閉等
火一切ノ外傷諸種ノ傳染毒等皆此病ノ發因ニ屬ス

復於平康。吉里濟○病毒分離ノ義ノ機轉ニ由リ殊ニ汗尿出
血。經血。痔。二由ノ病毒全ノ解散スレバ病人乃チ康ニ復ス

變於他病。其傳變。六アリ。一ハ局發ノ煥衝ニ變シ。二ハ神經ノ熱性ヲ露シ。三ハ腐敗ノ熱性ヲ見シ。四ハ遷延熱ニ徙リ。五ハ間歇熱ニ轉シ。六ハ病毒轉徒ヲ爲ス。煥衝熱ハ其病本ト血器中ニ在ル者タリ。今其病徙テ腺ニ著キ。水脉ニ及フ。アツテ他病ヲ爲スノ類ヲ云フ。歸於死。其病勢極メテ盛ニノ全ク救治ヲ怠ル。アリニ非サレハ之ヲ得ル。ナシ然トモ他病ニ轉徒スルノ後。竟ニ死ニ至ル者モ亦コレアリ。預後。

凡ソ此熱。救治法ヲ得ル者ハ後來ノ諸證。太略吉ナルヲトス可シ。○煥衝熱。出血ノ壅止ニ原キ來ル者ハ危

シ癰疹内陷。若クハ強テ泄液ヲ壅遏スル等ヨリ來ル者モ亦或ハ危嶮ニ至ル。アリ。○病ノ經過。叙ヲ逐テ亂レサル者ト吉利濟ノ鼻衄トハ皆善候ニ屬ス。

區別

第一 純雜ニ即テ之ヲ分ツトキハ曰ク單曰ク複。○其單ナル者ハ血管。病毒ニ感觸スルノ外。他ノ熱性ヲ合セサル者。是ナリ。其複ナル者ハ煥衝熱ノ本性ノ外。別ニ他ノ熱性ヲ副ル者ヲ名グ。○然トモ凡ソ熱ノ單ナル者ハ稀ニノ複ナル者。毎ニ多シ且初起ハ其病。單ナル者モ經過ノ間。多クハ必ス他性ヲ併スルニ至ル。○

故ニ其合性ノ如何ヲ精辨スルハ醫家ノ一大切須タリ何者。一切ノ諸熱皆此ニ原ビテ治法ヲ下サ、ル者ナキカ故ナリ

熱ノ合併ヲ致スニ三種アリ

○其一ハ熱漸ヲ以テ他性ヲ併ス○熱故單ナル者。其經過ノ間。本性ノ外ニ於テ更ニ他性ヲ副ヘ加ル者ヲ謂フ譬ハ焮衝熱。經過ノ間。夏日ノ炎熱ニ遭テ更ニ膽熱ノ性ヲ加ルカ如シ此時ニ方テ其熱焮衝本性ノ證候ヲ見シ更ニ又膽熱ノ見證ヲ兼發スコ、ニ至テ病。膽樣焮衝熱ト爲ル○又。脫隨ノ一片。

子宮中ニ残リ滯ルヨリメ遂ニ焮衝熱ヲ得ル者ハ經過ノ間。焮衝ノ本性未タ全ク除カサルニ早ク已ニ腐敗ノ性狀ヲ發スルアリ如此ニメ腐敗樣焮衝熱ヲ生ス○是此副性○腐敗仍尚去ラス本熱ノ原性。其時限ヲ經過スルノ間ニ其副性漸ヲ以テ除キ去ルアリ或ハ副性ノ熱日ニ盛ニメ遂ニ主者ノ位ヲ篡ヒ本熱ノ原性ハ却テ衰微ノ見レサルアリ譬ハ焮衝本性ノ證候ハ徐々ニ自ラ消滅ニ就キ腐敗獨大ニ其猛威ヲ逞スルカ如シ此證ノ如キハ焮衝變メ腐敗ノ性トナル者ナリ

世人太都積習ニ因循メ上證ノ如キ熱病ヲ見レハ
輒チ曰ク病人。煥衝腐敗ノ二熱ヲ得タリト殊ニ知
ラス其病ム所。本ニ熱ニアラス但一熱ノ本性。時限
ヲ經過スルノ間變化ノ諸種ノ熱性ヲ顯シコレヨ
リメ萬種ノ證候ヲ起シ諸般ノ病相ヲ現シ或ハ危
峻ノ證ヲ媒起スルニ至ル者ナリ。

○其二ハ病ヲ得ルノ初。已ニ兩性ヲ合シテ見ル譬ハ
此ニ人アリ大ニ怒テ身ヲ熱シ又釀烈ノ液○酒等酒燒
ヲ服ノ竟ニ膽液様煥衝熱ヲ得ルカ如シ。

○其三ハ病初ヨリ他性ヲ夾マス經過ノ間攝養法ヲ

失シ情思ヲ過勞スル等ノ如キ偶然ノ因アリテ不
意ニ副性ヲ發ス。

按ズルニ熱病ニ名クルノ法。先ツ其本性ニ據テ其本
名ヲ命ス此名。和蘭ニ在テハ必ス實詞ヲ用フ而ノ
其副性ノ如キハ必ス虛詞ヲ用フ譬ハ膽樣○虛煥
衝熱○實詞ト云ガ如キハ煥衝ノ性。主ニメ而ノ膽病
ハ乃チ其副ノミ故ニ膽樣煥衝熱ハ煥衝樣膽熱ト
異ナリ決ノ混同ス可ラス。

第二兼攝ノ證ニ即テ煥衝熱ヲ區別スレハ此熱局發
ノ疾患ヲ兼子サル者アリ或ハ血液。各部ニ逼迫シ或

ハ各部ノ感觸。増發スルノ證ヲ兼攝スル者アリ之ヲ
管惕ト名ケ又焮衝様ノ顫惕。焮衝様ノ感動ト云フ
等ノ諸證ヲ見ズ者。是ナリ其證外部ニ在ルハ赤色腫
脹。燔熱ノ諸證ヲ其所在ニ現スルヲ候トス○此證固
ヨリ自ラ局發ノ真焮衝ト別ナリ譬ハ管惕ノ諸證ハ
其勢凡テ彼ヨリ輕ク其證ノ留連スルモ亦彼ヨリ短
ク機運ノ乖戾甚ガラス轉歸モ亦彼ト同シカラス何
諸此證ニ於テハ血ノ造力增長スト雖トモ真焮衝ノ
如ク病的ノ產物○膜、生肉、新、膜、生肉、新、合等、
ト生下スルニ至ラサル

ヲ以ナリ○然トモ此證動スレハ真焮衝ニ變シ易シ
故ニ醫此證ニ遇バ宜シク應ニ真焮衝ノ初度ト看做メ
毎ニ能ク意ヲ用フヘシ嬰兒ノ焮衝熱ハ動スレハ頭
腦ニ此種ノ管惕ヲ發シ易シ○此ヲ以テ真焮衝熱ニ
シテ或ハ腦中頭脳盛熱或ハ肺臟胸膜ニ此焮衝様感觸
ヲ挾ム者ハ一々之ヲ精辨スヘシ
若シ局發ノ病惱。管惕ニアラズシテ各部ノ真焮衝大
ルトキハ徑チニ其名ヲ下シテ脳焮衝。肺焮衝。腸焮衝。
ト云フ

若シ其劇易ニ即テ此熱ヲ區別スルトキハ輕純單刺衝熱

治法

眞焮衝熱ヲ治スルノ法。一ハ原由ヲ除クニ在リ二ハ此熱ノ單複ヲ精辨シ其本性ニ隨テ之ヲ救療スルニ在リ三ハ各部ノ管惕ヲ細察スルニ在リ四ハ吉里濟ヲ斡旋シテ康平ヲ得セシムルニ在リ單焮衝熱ヲ治スルハ應ニ須ラク生力ノ太タ充張スル者ヲ減殺スルヲ要スヘシ故ニ焮衝ノ劇易ニ隨テ消焮治法ヲ進退メ之ヲ用フヘシ

其輕キ者ハ身體ヲ靜養シ醋。拘櫻汁。伏牛醋。等ヲ伍ス

ル酸味飲料ノ衝動スルヲナキ者ヲ作リ微溫ニシテ之ヲ服スヘシ藥物ニハ消石。純精酒石。孕鹼酒石及ヒ軟和吉利詞スケル爹兒等是ナリ其重キ者ハ刺絡ス應シ小兒ノ如キハ蜞針ヲ行フニ宜シ

複焮衝熱ハ精シク其副性ヲ審明ス可シ例スルニ焮衝熱ニシテ聖京僵**キン**僵**レウ**麻質斯索蒲爾刺列。膽液。神經。腐敗等ノ諸熱性ヲ併合スル者アリ其治法ノ如キハ各病門ニ詳述ス

各部ノ管惕。其太甚ノ者ハ蜞針ヲ行ヒ導洩劑○發泡浴法。下ヲ與テ其眞焮衝ニ進マントスルノ勢ヲ防制

スヘシ

施療提要

凡ソ煥衝熱ノ輕キ者ハ良能ノ營爲ニ信スヘシ。若シ吉里濟キリジノ衄血ヲ繼發セントスルノ候アル者ハ殊ニ人爲ヲ加テ之ヲ擾ル可ラス。凡ソ煥衝熱ニ用ルノ藥ハ少シモ衝動ヲ致サル者ヲ擇フヲ法トス。

真煥衝熱類案

一壯婦真純煥衝熱愈後再感充治驗
一侍婢年二十歲稟賦多血ニメ體格強健痘ヲ患ルヨリ以來復疾所アルトナシ但シ尚未夕月事ヲ得ズ。千八百十六年二月廿二日操作シテ身ヲ熱シ汗出涼隙風ニ取リ乍チ大ニ頭痛シ四支倦怠全身困重スルヲ覺フ已メ憎寒頗甚キト半時許ニメ嗣テ又發熱燬カ如ク呻吟堪フ可ラズ脊梁ノ際最大熱アルヲ覺ヘ煩渴引飲通宵眠ルト能ハス。次日諸證倍峻重スコニ於テ其宵病ヲ得ルノ第二日自ラ醫

院ニ來テ治ヲ請フ

當時見ス所ノ證候下ニ述ルカ如シ

廿三日第二日○全身熱アリ勢燉カ如ク面色過赤ニメ

豐大。目光炯然タリ前額大ニ痛ミ舌根胎アリ全舌皆潤フ大渴止ス全然食氣ナク味苦シ脉息全喪田實入

○頸脉頗ル大ニ動キ呼吸妨ル所ナク腹疼痛セス一昨日來大便秘シ小便モ亦通ゼズ○肌膚熱甚_シ和シテ潤フ脉數ニメ倫アリ強實ニメ弦但シ甚_シ緊ナラズ此病風寒ヲ感冒スルニ因テ來ルノ純真厥衝熱ナル_ヲ診決ス是中等ノ消瘀治法ヲ用ヘキノ證ナリコ、

ニ於テ左方ヲ作テ之ヲ與フ

遏爾託根

半弓

水適宜ヲ以テ煎スル1八分時許ニノ濾テ八

弓ヲ取り後藥ヲ加フ

淨消石

一弓

屋施蔑兒

半弓

右調匀シ一時毎ニ二食ヒヲ服ス

註藥方ノ下其服法ヲ記サル者アリ皆通ノ此服

法ヲ用ヘシ○又飲料ノ如キモ亦爾リ

飲料ニハ大麥煎ニ湯泡甘艸ヲ加フ○輕化吉利詞爹_キ

兒ヲ行ヒ○淡薄ノ飲食ヲ用シム

廿四日第三○前宵ヨリノ熱氣増シ頭痛ト渴ト皆甚

キヲ以テ身體。安カラス終夜眠ルヲ能ハズ○朝諸證ノ劇勢稍減ズ病人腰部ノ疼痛最甚キヲ覺フ他證ハ依然トメ變スルヲナシ脉略數實ニノヤ、弦小便太赤クノ少ク熱シ上面タレ些ノ雲翳アリ皮管輕ニ蒸發ス大便スルヲ一次○此ニ於テ蒸氣ヲ宣發メ止サラシムルカ爲ニ前方中ノ屋施蔑兒オツレ去リ接骨子昆設爾弗半弓涅局方ニ云ク接骨子適宜ヲ取り搗細十四分時尚溫ナルニ乘ノ濾過シ藥液ヲ絞リ取ル此液十五分ニ白糖四分ヲ加ヘ煮テ昆設爾弗ノ稠ト爲ス

ヲ加フ○其宵諸證減シ小便濃黃ト爲リ渾濁ス

廿五日第四

○前夜安靜睡寐太夕安シ全身蒸トノ

汗濺カ如シ○頭痛去テタ、頭重ヲ覺ヘ舌潤テ白胎アリ渴減シ肌和シ身溫ニノ蒸氣ヲ發スルヲ多ク小便濃黃ニノ渾濁シ白物アリ玻璃验尿虎子○驗尿虎子玻璃ニ附ク此日大便セバ脉ホド數ニノ仍實シ少ク弦此ニ於テ前方中ニ孕鹹酒石二ヲヲ加フ

廿六日第五

○昨日午後病者保護ヲ慎マズ床ヲ出テ

、起卧シ新ニ復寒氣ヲ感冒ス此日ハ正ニ吉里濟ノ期ニノ病毒方ニ汗ト小便トヨリ解シ去ント欲シ而

メ其小便ノ如キハ未タ眞ノ渣滓ヲ得サルノ時ニ方
テ偶然トメ復新^シニ寒氣ヲ冒觸スルガ故ニ其宵間ヨ
リ諸證ノ勢復大ニ張リ熱復盛^シニ身熱留連シテ去ラ
ス其皮膚頗^ク燥烈シ或ハ譖妄シ渴甚^ク小便再ヒ復透
朗トナリ色太タ赤ク脉太タ數且抑屈セラレテ伸^ス
是ヲ以テ指下ニ應ノ縮小トナル但頗^ク緊ナルヲ覺ル
ノミ○此變惡ニ由テ良能病ヲ^{キリ}濟ヨリ解シ去ントスルノ營爲一朝ニノ其績ヲ敗リ病
又新^ニ前ヨリ長キ時日ヲ經過セサルヲ得ズ而ノ從
崩憂心ニ足^サル輕證ノ如キヲ能ハザルナリ○此ニ

於テ前方ヲ用^ルノ外猶熾衝ノ等級ニ應シ脉ノ形狀
ニ準ノ六弓ノ血ヲ放ツ但其經血尚未夕來^ラサルノ
故ヲ以テ之ヲ臂ニ行ハスシテ乃チ其脚ヲ刺ス
廿七日○昨夜一二時ノ際汗アリ尿渣脚ヲ得ルト多
ク諸證減シ脉平カニ略^シ數ニメ緩其力甚^ダ強カラズ
甚^タ弱カラズ食氣生ズ後三日ノ間皮管開キ續テ蒸
氣ヲ發ス

三月二日第十病痊ヘ辭ノ家ニ歸ル

備考

此證若シ其攝養ヲ慎ルトナク^シバ刺絡モ亦施スヲ

要セサルナリ。○凡ソ熾盛熱ハ脚上ノ刺絡ヲ施スベキ者少シ假令之ヲ施スモ亦臂ニ施ス者ノ如ク太効ヲ奏スルトナシ。○然トモ此證ニ於テハ一切ノ證候皆脚上ノ瀉血ニ宜ギヲ證明ス故ニ之ヲ行フノミ純焫衝熱治驗。

一釀婢年二十七歳體格強健ニメ故曾テ病所ナシ千八百廿一年三月十五日。縣ヲ溸ヲ鑒スルニ由テ乍チ寒氣ヲ觸冒ス頭痛極テ甚ク操作スルト能ハズ已。ト得ズ枕ニ就ク倏チ大ニ惡寒シ續テ發熱ス。次日經水來リ十二時ニメ乃チ止ム一身怠惰大渴身

熱止バ是ニ於テ一醫ヲ延テ方ヲ處セシム。○諸證。荏苒トメ少モ解スコナキヲ以テ月ノ廿一日即チ發病ノ後第七日遂ニ病院ニ造ル。

頭人深處甚疼痛アリ頭ヲ擡ルト能ハズ。○顏熱シテ光澤アリ赤色ニノ脾大ス結膜稍赤ク目光輝ニ堪ヘズ唇赤メ乾燥シ舌ニ薄キ白胎アリ中心乾燥ス口味ナク大渴頸脉搏動シ呼吸妨ル所ナシ但氣粗メ疾ナルノミ腹中他患ナシ肌膚熱ノ乾燥シ小便濬ニノ熱ス二日以來圃ニ上ルトナシ脉倫次アリ略數ニノ實弦ニノ緊

八弓ノ血ヲ放チ後方ヲ作テ之ヲ與フ

常水

四弓

再製酒石英

名

蟇姑石 各ニ刀

白糖 二弓

右。攬セ調停シ一時ゴトニ一食ヒヲ服ス
飲料ニハ大麥煎ヲ用ヒ軟和吉利詞爹兒キリツテス行ヒ淡薄
ノ食餌ヲ與フ

廿二日第八〇血ヲ瀉スルニ由テ病者。大ニ寛解ヲ致
スラ覺フ然トモ其夜ハ尚煩躁シ眠ラント欲レハ乃

夢ミテ驚キ醒ム頭痛。大ニ減シ渾身。汗出。○朝ニ至テ
肌膚熱シ之ヲ循ナツルニ乾燥ス諸部ノ運營皆増盛メ生
力充張ス小便。雲翳アリ其色。太タ赤ク大便セバ○刺
絡ノ血。稠厚ノ焮皮ヲ結フ
處方 上方ノ内蟇姑石ヲ去リ消石半勺ヲ加ヘ緩和
吉利詞爹兒キリツテス行フ
廿三日第九 ○生力ノ有餘スル者。著シ減ズ○夜間安
靜。睡寐穩ニ全身蒸々トメ汗出。○頭痛除キ顔ノ脰大。
減シ赤色ヤ、退ク舌上潤テ尚胎アリ微シ咳シテ些
ノ粘痰ヲ吐ス其他ハ胸腹。患ル所ナシ○大便スルノ

一次皮管續テ蒸氣ヲ發泄シ身溫平人ノ如シ○小便攬渾シタル膠冰ノ如ク早ク既ニ渣脚アリ○脉略數微ク緊ニノ實此日處方前ニ仍ル
廿四日第十○昨宵些ノ發作アリテ身熱増シ頭痛口渴シ病人之力爲ニ眠穡ナラズ大汗出○今朝諸證盡々除キ小便多ク渣脚アリ但其上際ハ澄澈ス
廿五日十一○方ニ輕快ノ始ナリ○食氣增シ小便淡黃少ク雲翳アリ○病人ノ好ニ應シテ大麥煎二匕ニ酒石酸十五氏ヲ加テ飲料トシ與フ其他ノ諸藥ハ上法ノ如シ○食餌ヲ増シ且樹菓ヲ與フ

廿七日第十一三日○冒寒ノ頭痛尚在リ脉モ亦未々衝動ノ狀アリ故ニ前方ヲ連服セシム○次日頭痛仍止ズ此ニ至テ芫菁膏ヲ項上ニ帖ス
廿九日第十二五日頭痛去ル病者體氣和シ食氣倍旺ス諸生機常ニ復ス但大便稍難ナリ○コニ於テ再製酒石英一弓ヲ水四弓ニ溶シ食ヒニ抄シテ之ヲ與ヘ軟和吉利詞爹兒ヲ行フ
三十一日○西洋ノ三月八日數三十一日ナリ藥ヲ與ヘズ
四月朔病痊ヘ病院ヲ辭シ去ル
備考此病ハ純然衝熱ニノ局發ノ病ヲ挾マザル者タ

リ○其頭痛ハ寒氣ヲ冒觸スルニ由テ生ズ僂麻質斯性ノ者タリ故ニ熱解シ去ルト雖トモ仍治セズ羌菁膏ヲ帖ノ始テ痊ユ

眞焮衝熱血大灌溉於頭上。治驗○頭部熾盛熱一室女。年二十三歳。體質強壯。天資多血ニメ快豁。年甫テ十五ニメ月經ヲ得。此ヨリ以後。去來其期ヲ愆。ラズ其量モ亦頗多シ○二十一歳ニメ經血ノ量。大ニ減シ爾後。屢頭痛ヲ患フ。歲ノ四月初五。寒熱ヲ得テ後。頭痛。大ニ發シ左邊尤モ甚シ○熱ノ經過。一向替留ノ狀ヲ保シ一身盡ク大熱シ大渴。少汗。分泌排泄。皆濶少ス

未ダ病院ニ來ラザルノ四日前。一醫ヲ請フ。刺絡ヲ施ス。第五日ニノ病院ニ詣テ治ヲ請フ。

頭困重。甚夕疼痛シ左邊。殊ニ甚夕眼采閃發シ目光澤。多ク凹。脾大ニメ太々赤シ唇潤ヒ舌乾キ白色ノ粘膩。其上ヲ被ヒ其邊圍。太々赤シ少シ渴アリ呼吸妨グ。所ナク咳嗽ナシ身溫頗甚シク蒸氣發越シ大便難。小便濶ニノ赤色。火ノ如シ脉數實緊弦○下方ヲ作テ之ヲ與フ

遏爾託根

半弓

煎ノ八弓ヲ取ル

淨消石

半弓

再製酒石英 一匁

白糖 二匁

右。調停攬渾シ一時コトニ二食ヒヲ服ス。

蜞針。六個ヲ耳後ニ施ス○之ヲ行フ後。頭痛頗減ジ舌滋潤ス大便一次○其宵病進ミ頭痛増シ舌乾キ大渴ス○再ヒ蜞針四個ヲ行ヒ前方ヲ連服セシム。第七日諸證極テ惡グ嗣テ汗出尿中濃稠ノ渣脚アリ次日小便再ヒ鮮紅ニメ透明其熱留連シ勢大ナラズト雖トモ宵間尚發作ス第十一日尿上雲翳アリ漸クニ沈テ玻瓈底ニ垂ル第十四日復多ク渣脚ヲ得第十

五日全ク痊ユ

焫衝様一日熱治驗

一少女年甫テ六歳天資多血體格頗壯實素病所ナシ但時々鼻衄ヲ患フルノミ千八百十七年十月廿日秋景濛々人ニ佳ナラス其朝ニ方テ食ヲ欲セズ一身少シ倦怠シ體氣違和スルヲ覺フ○宵間大ニ惡寒スル七八分時許續テ發熱燬ガ如クロ渴ス○上ニ記載スル因ヲ除ク外復發因ノ何タルヲ知ナシ○頭困重眼上擦ガ如キヲ覺フ面色赤クノ焚ガ如ク且豐大ヲ做シ目赤ク鼻ト唇ト皆乾ク舌上滋潤微シ白胎アリ渴。

甚シ○氣息粗ク稍疾。深息スルモ亦妨ル所ナク咳嗽
ナシ○腹中患ル所ナク昨日硬糞ヲ通ズルト一次小
便澄徹ニメ太タ赤シ○脉齊ニメ甚夕數實大ニメ稍
緊ナリ○煩燥安カラズ轉側定時ナシ
此病ハ汎發燥衝熱ニメ局發ノ管惕ヲ兼ザルノ證タ
リ○是ニ於テ床中ニ安臥セシメ淡薄ノ食物ヲ與ヘ
後方ヲ處ス

覆盆子水 四弓

淨消石 八氏

霸王鹽 一勺

覆盆子舍利別 半勺

右調匀シ一時ゴトニ一食ヒヲ服ス

又軟和吉利詞爹兒ヲ行フ○沙糖水ヲ飲料トシ與フ
○夜間ハ麥粉醋鹽ヲ捏和シ酸餅子ヲ製シ足蹠ニ帖
ス

卅一日第二日○昨夜仍ヤ、煩躁ス暁ニ及テ眠リ汗出
○今朝頭中太タ重ク前額疼痛。擦ガ如ク鼻底搏動ア
リ兩目掣ガ如キヲ覺ヘ少ク涙アリ○已ノ大便一次。
脉。昨ト異ナス○申半牌大衄血アリ約スルニ二弓ニ
下ラス面微ク蒼ムタリ但脈仍疾ニノ實弦ニノヤ、

緊ヲ帶^フ。是ヲ以テ其出^ルニ信^カセテ敢テ之ヲ阻ル。ナシ八分時ヲ過^ルノ後。衄^ム自ラ止ム。○半時ヲ過^ルノ後。小便多ク渣脚アリ。糠ノ如ク色。薔薇ノ如シ渾身蒸^ムトメ汗出。夜間安靜ナリ。○次日小便已ニ黃熱證盡^ク除^ク。第四日ニ及テ快復ス。

備考此證第二日ノ朝ニ方テ蜞針ヲ處ス應シ。但其諸證ニ據^ルニ其必ラズ將ニ衄血ヲ發セントスルヲ證スルニ足ル。是以テ其動靜ヲ觀望シテ宵ニ及フ而シテ良能早ク己ニ衄血ヲ出^ジ。蜞針ヲ施^ス須ヒザラシムルニ至ル。

頭上熾盛熱經過太疾治驗

一幼僕年十一歳體氣頗^ク康壯ニメ資性沈默ナリ○黒

粘液ノ質詳ニ

診候篇ニ見ニ夙ニ牛痘ヲ種ユ爾來病所ナシ

千八百二十二年十一月十九日前夜四更ノ後大頭痛ヲ得テ熱アリ眩暈耳鳴ス○其朝諸證倍劇^ク精神昏憤智識冒昧シ之ニ兼テ咬牙止時ナシ○眼瞪視^シ滑澤多ク面赤^ム熱ス○病人醫家ニ寄食ス故ニ其鑿血ノ大ニ頭上ニ灌漑スルヲ診知シ扁桃乳ニ消石ヲ加ヘテコレヲ服セシメ蜞針四箇ヲ耳後ニ帖ス○蜞血ヲ咽^フ甚シ二時ヲ過^ルノ後尚輕快スルヲ覺ヘズ再

ヒ 蟻針三箇ヲ前額ニ行フ○此法太ダ驗ヲ奏シ一二時ノ後頗爾寛解スルヲ覺フ○細心ニ查問メ此兒昨宵大ニ其屋室ヲ過暖スルヲ知ル○今宵ニ及テ遂ニ病院ニ詣ル

病人。床上ニ在テ煩悶。安カラズ目光澤多ク白膜ノ細管。血アリ擁積ス兩顎。赤ゾ熱シ耳騒鳴ス起テバ則チ眩暉シ病人。自ラ言フ身邊ノ諸物皆旋運スト舌潤ヒテ白胎。口渴頗甚シ頸動脈搏^{ウツ}ト極^{タマニ}テ甚^ク一二日來。微咳アリ肌膚軟ニメ蒸氣ヲ宣發ス○昨日更衣ス○脉ノ數^{カス}一秒時間百六十動。實ニメ軟○病頭内ノ煥衝熱タルト明

ナリ○此ニ於テ遏爾託根煎ニ消石一刀ヲ加^クテ之ヲ服セシメ沙列布煎ヲ飲料トシ芥子泥ヲ腓腸ニ帖ス廿日^日第二○前夜夢ミテ驚惕シ眠ルト能ハズ微咳アリ今日諸證ヤ、減ズ脉猶少^ク熱様ヲ帶^ブ然^ドモ緩小便黃。玻璃底雲翳アリ○此日仍大便セザルヲ以テ軟和吉利詞爹兒^{キリツバノレ}ヲ行フ○宵大衄血ヲ得タリ頃^{シテ}アツテ小便濃稠ノ渣脚アリ且^ク玻璃ノ周圍ニ著ク○廿一日熱樣ノ諸證盡^ク消ス小便黃色ニメ透朗ス病人病痊^ルヲ以テ病院ヲ辭シ去ント欲ス是ヲ以テ許メ家ニ歸ラシム

