

醫療正始

附醫院類案

九



F
イ-133

492
I-
5

16.2226
12/101



富士川文庫

2660

醫療正始卷之九

著者

獨乙

昆斯骨夫

著

和蘭人和漢。越而實幾。譯

十六日。○妙大ニ歟。西肥。伊東。淵玄朴。重譯。

歎。後。中。頭。大。時。六。一。力。

神經熱類案第二

著者

產婦神經熱治驗

一侍女。天資薄弱。齡二十三歲。安產ノ大ニ亡血シ千八

百十八年十月十一日。病院ニ來ル。病ノ第

三日。○寒熱頻ニ

往來シ頭困重耳鳴リ大渴。舌燥キ乾咳頗強ク呼吸困

難ニメ疾促。腹脹満之ヲ按スレバ痛ム大便秘結。脉疾

ニメ少シク弦

芫菁膏ヲ肩胛間ニ帖シ遏爾託根煎ニ硝沙一刀。沙糖

ヲ伍シテ外服セシメ緩和吉利詞爹兒ヲ行フ

次日。諸證故ノ如シ但胸中ノ疾患甚キヲ以テ胸上ニ

蜞針四頭ヲ帖ス

十六日○咳嗽大ニ減ジ呼吸利ス然ニ重聰譫語。頻ニ
眠ヲ嗜ミ舌上乾燥ノ褐色ノ胎アリ其脉弱等ノ諸證
凡テ明ニ神經熱ノ性ヲ發露セリ

處方 兩膊ニ芫菁膏ヲ帖ス

内服ニハヨ蟲入ヘ辟惡丸及全齋大風丸重獅太藥家散
纈艸出三勺酒ヘ下マ取リ安樂ニシカセ吹ヘ
滾湯ヲ以テ泡出メ八弓ヲ取り後味ヲ加ス
精製硝沙
鹿角精各一刀 中ク半升半升トノ身體
白糖○立翁丈母散入齊銀散自餘殊大部也
此方ヲ行フ十二日ニメ病狀頗佳候アリ但困難ノ
咳嗽再發スルヲ以テ下方ヲ劑ノ之ヲ與フ
遏爾託根煎半弓
煎タルトハ分時ニメ纈艸二弓ヲ入レ泡出シ

濾過ノハヨヲ取り白糖ニコヲ加へ與フ
 別ニ緩和ノ抵剤○地亞格日溫ニ亞刺比亞
 セシム
 上ノ諸方ヲ連用メ頭部寬解シ夜中安靜。舌上滋潤シ
 咳嗽減タ○重聰及ビ渾身ノ衰弱尚自若トメ治セズ
 故ニ後方ヲ投ズ

幾那ニコ

煎ズルト八分時ニメ後此液中ニ纈艸三コヲ
 泡出シ濾過ノハヨヲ取り沙糖ニコヲ加フ
 此劑ヲ行ヒ病人ノ精力復スルニ隨テ重聰次第二消

散シ病院ニ在ルト四週ノ後。病全ク痊ヘ辭シテ家ニ
 歸ル日本書院
 神經熱變爲間歇熱治驗

一女子。衣ヲ澣濯スルヲ業トス年紀二十六歳。體格偏
 スル所ナシ一日。隙風ニ中テ澣濯シ卒然トメ身體大
 ニ違和スルヲ覺ヘ寒熱頻ニ往來ス○其後。九日ノ間
 ハ尚。病ヲ忍デ事ヲ操リ自之ニ魁シトス然氏病勢倍
 増劇スルヲ以テ遂ニ枕ニ伏スニ至ル○十一月十七
 日第十病院ニ詣ル○其病狀下款ノ述アル所ノ如シ
 頭昏冒シテ懸會ノ邊。鈍痛シ耳鳴聽難ク鼻口皆乾キ

舌上胎アリ乾燥ス氣息短促不利シ胸中刺痛。深息スレバ其痛最甚シ且乾咳アリ一身懈惰。四肢疼痛メ裂ガ如シ皮膚燥熱。小便短濶。大便^{パツ}怖ノ如タ脉。疾ニメ稍緊。實ヲ帶ブ○後方ヲ行フ

過爾託根煎 ^{八弓}

精製硝沙 ^{十五氏}

白糖 ^{二勺}

肩胛間ニ芫菁膏ヲ帖ス

十八日第十○夜間眠ラズ一身衰弱シ身熱。煩渴。共ニ增劇シ頭困重甚シ^ク心神昏冒。腹脹滿脉太數ニタ弱○

神經熱ノ性狀ヲ顯ハスノ明ナルヲ以テ後方ヲ行フ

水楊梅根 ^{三勺}

滾湯ニ泡淹シ濾メ八弓ヲ取リ後件ヲ加フ

精製硝沙 ^{十五氏}

白糖 ^{二勺}

又緩和吉利詞爹兒ス行フ細脈ニ神志失蘇後大汗出此藥ヲ用フル。三日ニメ諸証全勢大々寛解シテ其大半ハ除キ去ル○病人快眠シ食氣アリ

廿一日第十四日○病人食機盛ナルニ應メ竊^カニ未熟ノ果實ヲ飽喫ス○次日煩悶不寐。頭疼痛昏重シ口味ナク

胃部困重ス○胸中刺痛少々乾咳アリ肌膚熱メ燥キ
大便秘結腹脹満胃部ヲ按スレバ痛ム脉數ニメ顫惕
ノ状アリ

徑ニ緩和吉利詞爹兒ヲ行ヒ其餘ノ方法ハ前ニ治ル
諸證速ニ減ジ大便利シ腹脹減ジ軟ニメ痛ベズ夜簡
汗出デ睡寐安ク小便雲翳アリ

二十三日午後其熱大ニ作ル留連スルト半時許。其初
惡寒シ續テ發熱シ終ニ全身汗出デ解ス諸証ノ勢。總
テ廿一日ニ比スレバ太劇シク胃部ノ疼痛殊ニ甚シ
但其熱ノ發作減去スルニ隨テ患者大ニ輕快ヲ覺ス

○惡寒・發熱・汗出_{病初テ}解スルハ間歇熱ノ本徵
次日。這熱復發作ス但昨日ニ比スレバ早キト半時
廿五日其熱倍劇シク發作ス

其熱明カニ間歇ノ时限ヲ具ヘ且生力已ニ沈衰虛弱
スルカ故ニ此如キ頑痼ノ經過ヲ得不幸ノ轉歸神
經熱轉ノ木証ノ如キ頑痼ヲ見ハスヲ以テ後方ヲ興
テ其熱ヲ防制ス

煎スルト八分時ニノ此藥汁中ニ水楊梅根三
赫勿淹シ濾過ノハコヲ取り後件ヲ加フ

精製硝沙

一勺

白糖

二勺

此日ヨリノ熱ノ發作除キ。琶布ノ如キ大便ヲ利スル
ト六行。患者大ニ寬解ヲ覺ヘ。睡寐安靖。神經ノ諸證解
シ去リ舌上淨ク。食氣次第ニ生ジ。尿中粘稠。外渣脚ア
リ諸機運故ニ復シ。

胃ノ消化力ヲ補充スルガ爲ニ。後方ヲ作ツテ與へ服セ
シム。

茴香子

二勺

○熟湯ニ泡シ濾過ノハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

健胃丁幾

二勺

爾後前方中ニ越栗失兒筆設刺列

○即忽脚滿脣藏越

爾刺列熱治法

ヲ加ヘ服セシム之ヲ服スルノ間精力

ノ下ニ見エ

次第ニ復シ。固貌華澤ヲ爲メ病全ク痊工。正月二日。病

院ヲ辭シ去ル

○其後大野原也

歲次庚申

○其後大野原也

一少年齡十六歲樂官ノ弟子ナリ天資多血體質嬌柔。

痘ヲ病ムノ後。十二歲マデハ健康ニメ病ム所ナシ此

年樂器ヲ吹キ肺ヲ努張スルニ由テ肺血

○咯ヲ得タ

リ其證留連スルト四日。醫藥ノ助ナカメ自愈エ由

千人百十四年十二月四日。粘膩ノ魚肉ヲ食フニ由テ身體大ニ違和スルヲ覺フ○次日尚病ヲ忍テ寺ニ詣。氏惡寒昏憒。一身大ニ怠惰ニ堪エ。又辛メ家ニ返リ竟二卽ナ枕ニ伏ス○惡寒留連スルト半時許ニメ發熱シ惡心煩悶一身勞倦ス○一醫苦味ノ藥劑ヲ投ス何方料タルヲ詳スルトナシ○此宵大便瀉スルト一行兼テ裡急後重腹痛アリ通宵眠ラズ頭痛推ガ如ク大熱汗出ヅ
以上ノ諸證及ビ眩暈昏憒ノ狀治セサルト五日。每朝辰時太抵微惡寒ヲ發シ次デ咳嗽大泄瀉ヲ得タリ此

泄瀉次第ニ甚シク本月九日ニ至テハ殆三十行許ニメ劇ク重墜努責疼痛等ヲ兼發ス是ニ於テ遂ニ病院ニ來テ救ア求ム

十日第八○病人一身虛衰甚シク大ニ昏憒シ萎縮ノ床中ニ在リ耳中騷鳴面色鮮紅ニメ熱シ眼光衰ヘ舌潤上白黃ノ滑胎アリ口苦ク食ヲ欲セズ噫氣大渴シ喉嚨内澁澁ア覺ヘ少シ咳嗽ノ粘痰ヲ吐ス但呼吸妨グル所ナシ腹脹滿肝部少シ痛ム皮膚蒸氣ヲ發洩ソ柔軟ナリ泄瀉八行小便過赤ニメ熱シ皮溫增加シ脉齊實ニメ頗カアリ少シ緊ヲ帶ズ

其原由ヲ考索シ且今ノ諸證候ヲ以テ參互スルニ此熱初發ノ際ハ腸胃熱様焮衝熱ノ性状タルト明ナリ且其泄瀉ハ疑ラクハ前鑿與ル所ノ下劑ヨリ來リ而メ調護宜キヲ失シ屢床ス出テ廁ニ上リ大ニ身ヲ冷ス等ニ由テ其下利倍劇々遂ニ異常ニ衰弱シ腹脹唆嗽神經狀ノ諸證等ヲ蜂起スルニ至ル者タリ是ニ於元後方ヲ與フ入一後方

來沙列布根半弓

陳重右水煎シ濾メ八弓ヲ取り後味ヲ加フ
地亞格日溫木半弓

飲料ニハ沙列布煎ニ沙糖ヲ加ヘ興夫
大便スル後毎ニ加密列淹方ニ漿粉ヲ加ヘ吉利詞爹兒ヲ施ス

十一日 第九 ○前夜午夜一睡ス今朝發作頗甚シ兩顴赤暈アリ渴稍甚シ脉實ノ顛悶ノ狀アリ但泄瀉ハ二行ノミ○宵間鼻ヨリ血一二滴ヲ流ス
十二日 第十 ○心神昏憤。耳中騷鳴ノ證倍劇ク面赤ク熱甚シ舌白胎アリテ半ハ乾燥シ渴太甚ナラズ咳嗽少シク増シ痰少シ粘稠テメニ條ノ血縷ヲ交ヘ此血ハ寂ヨリ深息妨グル所ナク皮膚熱ノ乾キ腹少シク脹リ出ヅ

大便瀉スルト。唯一次。痛ヲ兼子べ。小便黒紅。粘膩ノ雲翳アリ。脉齊ニメヤ、數實メ力アリ少シ。弦○下方ア處ス。

扁桃 十 半弓

右水ヲ加ヘテ研磨シ乳劑八弓ヲ製シ左ノ品味ヲ加フ
亞刺比亞趨謨漿 六勺
地亞格日溫 半弓

兩肺腸上ニ芥子泥ヲ帖ス

十三日 第十〇 病狀。渾ベテ故ノ如シ唯起テバ頭眩シ耳

聽難キノ證ヲ加フ皮膚常ニ燥熱シ毎夜半ノ後ハ其熱必々發作シ翼朝ニ至テ頗アル甚シ宵ニ及デ初テ弛解ス熱解スルノ間ハ脉狀毎ニ必々緩弱。小便。朝ハ赤クメ熱シ宵ハ淡紅ニ變ズ。脾ノ部強ク按スレバ少ク痛ム。

十四日 第十一〇 諸証。故人如シ唯譫妄止ム時ナク眼采力ナク昏憤重聽。倍盛ニ發作ノ間。面色初メニ比スレバ紅色少々脉稍弦ニメ顛惕ス然ニ緊脉ハ全夕去ル間歇ノ時ハ其脉誠ニ弱。小便鮮紅。粘膩ノ雲翳アリ大便瀉スルト。毎日一行。

總テ其病状ヲ察スルニ焮衝ノ性状ハ頗衰ヘ神經ノ性自増劇ス。少々體温高カ。脉微下大歛處方 大羌青膏ヲ項上ニ帖シ後方ヲ内服セシム
 扁桃乳 八弓 扁桃半弓ヲ以テ
 龍腦 二氏 亞刺比亞趙謨乳劑八弓ヲ製ス
 地亞格日溫 二弓
 十九日 第十日 ○此日吉里濟ノ運動ヲ生スルヲ希望ス
 热ノ發作少緩。但晚ニ至テ氣息短急ナリ且コレマデ稀少ニメ。輕易ナル咳嗽大增劇シ腹脹滿。小便薔薇色ニメ粘膩ノ雲翳アリ皮膚熱ノ燔クガ如ク脉數ニ

メ緩弱
 沙蘿蔔根ニ醋ヲ加ヘ兩膊ニ帖ノ打紅劑ト爲ス内藥ハ故ノ如シ
 廿日 第十日 ○前夜間病證甚兇惡。譫妄甚ク咳嗽劇クノ苦悶。渴時モ止ム時ナシ。○今日ニ至テ咳嗽尚止マズ面色蒼白ニメ瘦削シ人事ヲ省セズ耳聾ヒ眼目光澤ナク直視シ言語蹇澁。舌乾キ大渴シ頻ニ咳ノ粘痰ヲ吐喀シ中ニ鮮紅濃稠ノ血縷ヲ交フ氣息太短促ニメ困難ナリ。但病人全ク知識ナキヲ以テ深息ノ疼痛ノ有無ヲ試ル。能ハズ腹痛ミナクノ脹滿シ小便少ク

熱ス大便自利一行。病人之ヲ知覺セテ肌膚乾燥ノ其
以上ノ諸證凡テ大危嶮ノ狀ナリ○神經狀ノ病性已
ニ甚盛ニ發露スルト明ニ加之吉里濟ヲ得ベキノ時
ニ方テ病毒解散セバ最大貴重ノ肺臟却テ其毒ヲ感
受スル者タレバ大謹慎ヲ加ヘテ療治ヲ施サズンバ
性命ヲ保續スル能ハザルヲ必セリ○預其後ヲ度ル
ニ其證已ニ大ニ困篤ナレバ之ヲ救拯スルハ刺絡ノ
外。他策アルヲナキヲ決ス
是ニ於テ血ヲ放ツト五弓許。內服ニハ沙列布煎及ビ

趨謨漿扁桃乳ノ合方ニ龍腦ヲ加ルトナクノ之ヲ與
フ
夜間○今日放ツ所ノ血。許多ノ血水ヲ含シテ小塊ヲ結
ビ上ニ焮皮ヲ結ブノ崩^{カキ}アリ○氣息頗^カ安ク短促ヤ、
舒ビ咳嗽略緩外痰少シク黑色ノ血縷ヲ交フ大便瀉
スルト一行○脉尚稍數實然比緩。其餘ノ諸證ハ尚故
ノ如ク峻逆ナリ眼采少ク活動ス

廿一日第十
九日○夜間微シ汗出^シ譫妄昏憤尚續テ愈ヘ
々氣息舒寛シ咳嗽甚シカラズ粘膠ノ痰ヲ吐ス但血縷
々交ヘ^シ大便瀉スルト黄次。脉過不及ナクメ緩○上

方之外。一時半。毎ニ金硫黃半氏ヲ與ヘ服セシム。

廿二日第廿○諸證。故ノ如久譫妄止マ。面部萎黃。痰粘稠モノ咯出シ難シ。但血色交へズ腹脹。大便瀉スル。

1 一二次。脉數實ニメ太緩。處方トキニ。

處方トキニ。

亞兒尼加根アカルニカ三弓。滾湯ニ泡出シ濾過ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ。
亞刺比亞アスピア越謨漿オムク。地亞格アコ日溫ヒツヨウ各半弓。

又方トキニ。

乙百葛格イペカコ亞那末アナ六氏。

龍腦ラバウ半氏。

白糖ハチヤク八氏。

右末調匀シ八裏ニ分チ一時半。毎ニ一裏ヲ服ス。

芫菁膏アラビカ兩肺腸二帖ス。

廿三日第廿○前夜安靜ナラズ大ニ昏憤シ譫妄止マ。ズ口中常ニ喃々語言シ面色萎黃ニノ溫。舌潤ヒ氣息短促。咳嗽甚ガラズ痰稠粘ニメ黃。小便黯紅大便瀉スル。一行。皮膚燥キ脉齊ニメ數緩沈弱。

處方

東大纈艸

三弓

亞兒尼加花

一弓

鹿角精

一刀

亞刺比亞趙謨漿

各半弓

散藥ハ行フ前ノ如シ

廿四日第廿二日○前夜間少ク安靜。譫妄減ジ病者始テ耳
騷鳴スルヲ厭ヒ惡ムヲ知リ耳稍聽ニ面白色萎黃。語言
稍明ナリト雖氏尚吃ス氣息安舒。咳嗽少ク痰略粘稠

ニメ咯出シ易シ腹疼痛セゞ大便瀉スルト一行。小便
黯紅。身溫常ノ如シ脉稍數ニメ實緩○方藥前ニ仍ル
廿五日第廿三日○前夜中安靜ナラズ譫妄復甚シメ止ム
時ナシ兩顴萎黃。身溫常ノ如シ舌上滋潤稍渴ス氣息
少々短促。咳嗽困難。痰粘稠ニメ烹熟入脉小緩弱。中夜。
毎ニ熱ノ發作アリ
廿六日ヨリ正月ニ日至ルテ危篤人狀留連シ病
人常ニ譫妄ス但心神昏重ノ狀ニメ狂躁スルトナシ
耳聾。重聽ニ變じ昏憤續テ止ムテ兩顴仍萎黃。發作ノ
間或ハ間赤色ヲ爲ス舌滋潤メ淨ク口吻ヲ繞テ癒疹

アリ氣息短急ナレ。氏疼痛大久深息スルモ妨^アナシ。咳嗽續^ヒテ愈ヘバ但^シ濕潤ナリ。痰白色ニメ粘膠^{フル}ノ^ヲ交シ膿^シノ如シ。腹軟ニメ少ク脹滿シ。小便ノ色正月一日ヨリ酒黃色ニ變^ル者全ハ乃^チ淡紅ニメ粘稠ノ雲翳アリ○大便順序アリ。狀^{アバツ}芭布^アノ如シ。皮膚乾燥。脈齊ニ^{タツ}其數^{タツ}百十二動^{一分}。若^ハ百廿動ノ間ニ在リテ毎ニ必^ラズ小緩弱^{タゞ}。發作ノ時^之、^ヲ診スレバ或^ハ緊^ラ帶^ブ筋ノ衰弱最甚^シ。

仍前方ノ中ニ遠思根一勺^ヲ加^ヘ用^フ別ニ地亞格^{アゴ}日溫^ア亞刺比亞^ア謨^ア扁桃油[。]雞子黃^ヲ調^メ緩和舐劑^ヲ製^ス

シ與^フ飲料ニハ扁桃乳或^ハ沙列布^{アビツ}煎^ノ○發作ノ寸ハ緩和劑^ヲ行^フノミ○時^々芫菁膏^ヲ四處[○]兩肺[・]二帖上ス
三日 第三十○病人始^テ大夢ノ覺ルガ如ク知識^ヲ生ジ自^ク大ニ虛衰スル^ヲ訴^フ。面兒太^ダ瘦削其色萎黃。眼ノ周圍ニ大環^ヲ現^ス。癰疹乾枯シ咳稍減メ。痰ニ膿様ノ物ヲ來^フ。貨少^ク胸豁^{キハラ}ニメ病ム所ナシ。肌膚潤^フテ蒸氣^ヲ發^ス。小便赤^{タゞ}許多^ノ渣脚アリ。脉數減^ジ緩^ニ弱^シ○初^テ薦骨上^ニ眠瘡^{スル}ヲ發覺^ス。病方^{キリ}濟^ス。时限ニ在リ○眠瘡ノ處ニ龍腦及^ビ

趨謨粘汁アシカヒ調傳アシカヒ燒水毒アシカヒ○類參アシカヒ氣アシカヒ藥酒アシカヒ

四日 第三十 ○ 神識續アシカヒ靈慧アシカヒ食氣生アシカヒ渴輕アシカヒ咳大
二減アシカヒ深息妨アシカヒ久痰稠粘アシカヒ烹熟アシカヒ腹膨脹アシカヒ小便許多黃色アシカヒ渣脚アシカヒ大便二行アシカヒ琶布アシカヒ如山身溫
幾常アシカヒ復アシカヒ皮膚微アシカヒ蒸氣アシカヒ發アシカヒ脉齊アシカヒ稍數略
實アシカヒ但緩アシカヒ誠アシカヒ弱アシカヒ面臭アシカヒ與聞其聲アシカヒ其聲
吉里濟アシカヒ期幾終ルアシカヒ垂アシカヒ消化アシカヒ機初アシカヒ振起アシカヒ此
ニ於テ幾那アシカヒ行アシカヒ可アシカヒ但初アシカヒハ少量ニ之アシカヒ行アシカヒ

幾那アシカヒ依蘭苔アシカヒ各二アシカヒ

水アシカヒ量宜アシカヒ以アシカヒ煮ルアシカヒ會分時此藥汁アシカヒ以アシカヒ後
八味アシカヒ件アシカヒ淹アシカヒ苦アシカヒ甘アシカヒ幾服アシカヒ走アシカヒ舒長アシカヒ斷卦アシカヒ
纈艸アシカヒ二アシカヒ甘アシカヒ本良平日全アシカヒ今日每晚
廿正日濾過アシカヒ六アシカヒ取アシカヒ後味アシカヒ如アシカヒ幾服アシカヒ榆アシカヒ
鹿琥精アシカヒ遺半アシカヒ粗水アシカヒ一量アシカヒ其人康平無病
天地亞格アシカヒ日溫アシカヒ半アシカヒ大妙臨アシカヒ知アシカヒ愈アシカヒ故アシカヒ寒アシカヒ
一時半每ニ龍腦末半氏アシカヒ與アシカヒ本熟アシカヒ黃アシカヒ二アシカヒ爾來夜間安靜アシカヒ快眠アシカヒ頭中日アシカヒ二アシカヒ爽力アシカヒ但朝アシカヒ
三アシカヒ或アシカヒ譖妄アシカヒ少アシカヒ口アシカヒ邊アシカヒ瘡疹アシカヒ大アシカヒ癰アシカヒ皮アシカヒ結アシカヒ
脫落アシカヒ咳日アシカヒ二アシカヒ減アシカヒ輕アシカヒ痰稠粘アシカヒ大アシカヒ頗アシカヒ灰白血アシカヒメ

黒色ヲ帶ビ其吐喀ノ量モ大ニ減々氣息全ク調適メ妨ゲナク心神爽快。病者自ラ脱然トメ初生ノ入メ如キヲ覺フ食氣日ニ倍シ消化ノ機運モ亦隨テ旺盛ス○小便病ノ第三十五日ヨリ初テ本然ノ黃色ニ復シテ再ビ變惡スルトナシ大便調利。眠瘡愈ヘ筋ノ衰弱スル者復漸ク盛ニ脉力生ズ

廿五日○咳嗽吐痰初テ除ク○病人能ク幾那ニ耐フルガ故ニ加テ半弓ニ至ル但本月十日ヨリ今日マデハ沙列布ニ依蘭苔ヲ伍メ幾那ヲ去リ恰好ク消化ノ機力ニ適メ之ヲ強壯シ而ノ衝動スルトナキ食養ヲ

守エシム○剝禮毛樂亞麻樂過爾託ニ味人煎方ヲ用テ後服藥ヲ止ム廿八日第五十○諸機運常ニ復シテ病全ク差ヘ病院ヲ辭シ去ル其器質ノ變遷後此之を察する此證今ヲ距ル已ニ七年前。今ニ至テ其人康平無病。身體榮暢メ胸中些子ノ疾ナク又少モ咳嗽アルトナシ益々良へる。其首雖微熱、山燒公體雖熱、大歸熱、或寒熱留連、其體雖微熱、

第二種遷延神經熱

スレーベンデ。セーラー。コ
ールツ蘭ヘブリス。子ル小

サ。レンタ羅

此熱ハ經過極メテ緩慢ナル弛張誓留熱ニメ真虛衰人症狀ヲ見シ熾盛神經熱ニ比スレバ其諸證劇烈ノ勢アルトナシ中華七人矣大風寒氣地也。○遷延神經熱ハ體中諸部曾テ其器質ノ廢闕ヲ承ル所ナシ勞療熱ハ器體闕損(肺臟ノ硬腫諸部ニ係ル然)而膿ヲ成スニアズ膿熱ハ體中ハ一二部膿ヲ生スルニ由テ大ニ荒蕪シ之ヲ病因トシテ遂ニ其熱ヲ成ス者タリ。

證候

此熱ヲ發ヒントスル前數日人間多クハ一身倦怠シ容貌慘澹事ヲ操テ樂マサル等ノ病崩ヲ發ス其初テ發スルヤ微惡寒發止往來之後續テ發熱又其熱勢太劇ガラズ熱ノ減弛スルコ明白ニシ久シ毎日一發ノ者アリ隔日一發ノ者アリ其發作スルヤ肌熱強ク之ニ觸ルニ手指ヲ熨灼スルガ如ク手掌足心殊ニ甚シ病者一身勞倦スルヲ以テ少モ精カヲ奮勵メ事ヲ操ルト能ス頭困頓メ頭中輕虛ナル未覺ヘ耳頻ニ鳴リ頭旋眩暈面兒瘦削兩眼ヲ繞テ環アリ兩顴時ニ

赤暈ヲ潮シ舌燥キ口渴スレ不呼吸短促ス皮膚乾燥^{シテ}或ハ時ニ虛汗出テ小便赤々若クハ黃色ヲ爲シ或ハ光澤アル膜^{シテ}生ベ大便泄瀉シ易ク脉不齊太數ニメ顛惕^{ハルヒ}シ小ニメ弱^ハ吸^{ハシメ}呼^{ハシメ}氣^{ハシメ}甚經過^ハ而日^ハ發^{ハシメ}昔マリ其發^{ハシメ}而^{ハシメ}其^{ハシメ}病^{ハシメ}甚^{ハシメ}病人^{ハシメ}經過極^{ハシメ}テ緩慢ニメ短^{ハシメ}者ハ四週長^{ハシメ}者ハ六週十二週ニ至ル其際ニ身圍減^{ハシメ}眼陷リ四肢ノ肉瘦削シ骨露レ皮膚皺揭^{ハシメ}ノ縱緩ス此ニ至^{ハシメ}テ時ニ譴妄シ言語蹇澁^{ハシメ}シ聲嗄^{ハシメ}レ病人衰弱メ屢^{ハシメ}卒死シ或ハ屢^{ハシメ}水腫肺勞ニ變^{ハシメ}ソ死ス

原由

素質

天資虛弱之^{ハシメ}望ムニ安健ナラズ或ハ病ニ嬰リ或ハ攝生法ノ如クナラズ或ハ過^{ハシメ}テ精神ヲ奮勵シ或ハ諸液ヲ乏竭スル等ニ由^{ハシメ}テ身體虛衰スルノ人ハ特ニ此素質ヲ有スル者トス

發因

一處ニ籠住シ若クハ濕潤ナル大氣粗糲ノ食物毒物隱憂神經病瘡疹^{ハシメ}各攻^{ハシメ}諸排洩ノ壅遏^{ハシメ}又粘液熱熾盛神經熱間歇熱等ノ諸熱病ヲ患^{ハシメ}ル後殊ニ之ヲ發入

轉歸

平服此未^{ハシメ}外^{ハシメ}「太補斂ニ^{ハシメ}營溌^{ハシメ}養氣^{ハシメ}」

復於平康此狀ニ復スルト太緩慢ニメ醫術ノ資ヲ假ルニ非レバ決ノ之ヲ致スナシ其吉里濟ハ漸々以テ汗尿ヨリ生々^ニ虚無感天憲^ニ勞^ニ水腫病等ニ轉變スル者モ亦之アリ

歸於死^ニ生力耗竭ノ乃此狀ヲ爲ス

預後

此熱ハ預後凡テ嘉吉ナラズ虛衰羸瘦倍甚シク消化ノ機衰弱スル1倍強ク神經諸證倍發露シ熱勢倍劇

キ者ハ其轉歸モ亦倍凶惡ナリ

區別

遷延神經熱ニ單複ノ別アリ○其單ナル者ハ上文ニ記載スルガ如シ此熱ハ太約他熱ノ續發スル所タリ此熱病又能他熱ノ性ト相合併ス故ニ煥衝様聖京僵様。僵麻質^{トキ}斯様。膽液樣。粘液樣。腐敗樣等ノ遷延神經熱アルナリ

又諸種局發ノ疾患本熱ニ兼併スルトアリ脳肺腸ノ局處ノ疾患ヲ得ル1殊ニ多シ

治法

熱ノ因ヲ考索シ其本性ニ應メ之ガ醫治ヲ下シ兼テ局處ノ疾患ニ細心注意メ失フトナカルベシ

熱性單ナル者ハ輕ク衝動滋養シテ辛熱ナラザル藥ヲ行フ可シ○其藥ハ沙列布^{サリバ}依蘭苔^{イラン}剥禮毛^{ボウライ}樂亞麻樂^{ラマラ}水楊梅^{カスカ}加栗刺^{カツラ}輕キ苦味藥ナリ若消化ノ機略健ニメ胸ニ籍頸^{ジツケイ}ヲ覺ヘザル者ハ幾那。山酸^{サンソウ}硫黃酸^{リュウイエイ}ヲ最宜トス

其食養モ亦切要ノ一法タリ卽^{ヤハ}西國米^{ヨーロッパ}粳米^{ヒヨウ}肉汁^{ヌク}諸卵及ビ謹慎ノ酒ヲ服スル等皆宜シ

熱性合併スル者ハ細心ニ體認スルヲ要ス須^ベシ○若

焮衝様ノ狀アル者ハ緩和包攝ノ衝動セザル劑ヲ用フ可シ火候^{ヒコウ}八十丹。重身粉^{ヒヨウ}百二十丹。腸胃ノ病性ヲ合併スル者ハ解凝苦味ノ藥ヲ用フ卽蒲公英根。硝沙。小量ノヒ百葛格^{カコ}亞那。大黃。水楊梅。纈艸等是ナリ二十一單五月子日復燒大斬大卦。又^{アリ}增補局處ノ疾患ハ大ニ體會^{アリ}ノ忽ニスル^{アリ}ト大カルベシ此證ハ導洩法^{脚湯等ノ如シ}發泡膏^{アヒン}芥子泥^{カイジ}ヲ行フニ宜シ或ハ證ニ隨^{アリ}テ局處ノ瀉血ノ施ス可シ火候^{ヒコウ}一百二十丹。

遷延神經熱類案

遷延神經熱挾煥衝性治驗

一匠人人弟子。二十一歲。體資頗強固。千八百二十年。劇
キ肺煥衝ヲ患フ已ニメ愈ユ。○家道窘迫シ且其父重
病ニ嬰テ竟ニ死シ悲慘無聊遂ニ健康ヲ失フニ至ル
○千八百二十一年五月七日身熱大渴ヲ得少シク動作
スレバ汗漏洩シテ身體倍衰弱シ一身困倦ス。○一醫
生一二ノ方藥ヲ劑メ之ヲ與フ。○十七日ヨリ泄瀉ヲ
得。日ニ六行若ハ十行。虛衰倍甚シ百方ニメ僅ニ之ヲ
止ムルヲ得タリ。

精神身體之ガ爲ニ増衰弱ス病六週ニメ纏綿愈ザル
ヲ以テ六月十六日竟ニ醫院ニ來テ治ヲ求ム

病人顏色慘蒼トメ瘦削シ容兒一異悲哀鬱憂ノ狀ア
リ頭時ニ困重眩暈シ眼光彩ナク鼻燥キ舌胎厚ク大
渴ス氣息妨ゲナク或ハ時ニ咳メ膠痰ヲ吐ス腹軟ニ
メ陷リ大便一二日以來濇ニメ硬シ小便淡黃皮溫滋
加リ脉略數軟ニメ沈弱

夜間ハ則一二日以來微ニ戰寒メ後大熱ヲ發ス
處方

甘扁桃乳

八弓

甘扁桃半弓ヲ以テ乳
劑ハ弓ヲ製スル者

亞刺比亞越謨漿

六勺

白糖 二勺

十七日○頻ニ咳嗽ノ痰ヲ咯^ハス以テ夜眠成ラズ皮溫大ニ增加シ小便黃。脉惕動ノ狀アリテ且^ハ頗緊ヲ帶^ブ午後大惡寒ヲ得テ渾身振掉シ續^テ焚熱ヲ發ス脉仍緊ヲ帶^ビ小便太^ダシ

上方ヲ行フノ外緩和吉利詞爹兒^{アーハ}ヲ用フ

十八日○夜中大汗出デ咳嗽吐痰頗^ハ多シ小便太^ダク雲翳遙曳ス脉恒ニ弦數病遷延神經熱ニメ煥衝様ノ性ヲ副^フルト知ル可シ○

消石十二氏ヲ前方中ニ加フ

十九日○汗甚^シカラズ熱ノ發作太強カラズ小便淡紅雲翳ナシ脉少^ク數ニメ稍^ク弦入虛爽^ハ○食慾尚存後二日其狀變ズル^ハナシ一身太^ダ勞倦ス氣息妨^ハゲタク唯咳嗽頻ニ作リテ痰沫ヲ吐シ之ガ爲ニ病人虛衰ス○舐藥○亞刺比亞謨謨地亞格^{日溫}合スル者ノ如キナルベシヲ用ヒテ少シク輕快ス廿二日○故ヲ以テ後方ヲ行フ^ハ體好^ハシ精勤^ハシ對斯^ハモ委曲

過爾託根

剝禮瓦樂亞麻樂

各二勺

煎ト爲シ濾メハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

甘艸膏耳ニ刃

朝夕菲阿斯粵幾斯半瓦々散藥ヲ服セシム此二方ヲ用フル一六日ニノ諸證甚佳候アリ痰出デ易シ廿八日○食氣アリニ便調順シ脉少々數ニ外緩○前方中ノ遏爾託ヲ去リ依蘭苔ニ弓ヲ加フ諸證減々然黎明大汗出テ病人虛衰ス○食機頗振フヲ以テ七月四日後方ヲ行フ大體次々小野新造斷乎幾那及於中間感々可也

依蘭苔各ニ弓

煎ト爲シ濾ノハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

撒爾非亞粵幾斯

白糖各ニ弓

上方ヲ連服シ滋養ノ品ヲ餅食スル間病人漸ニ輕快シ痰沫次第ニ減シ終ニ全ク治ス容兒佳適筋力復シ苑中ニ行歩スルヲ許ス大氣中ニ行歩スルト太病人ニ恰當スルヲ以テ體氣倍康健ヲ致シ十六日病院ヲ辭シ去ル越テ一年ニノ再病院ニ詣ル容色鮮華ニノ太健康ナ

遷延神經熱治驗

一滌工ノ子。體質虛弱。年紀十三歳。病ヲ得テ四週ニメ
病院ニ歸ス。從前其何ノ病ム所アルヲ詳ニセズ。其目
今ノ証狀左ノ如シ。○頭頑痛。譖妄止マ。耳鳴。重聽。面
色萎黃ニ。瘦削シ。眼昏花メ。光采大ク。唇舌乾燥メ。褐
色ノ胎皮アリ。大渴。乾咳甚シ。ノ胸痛壓ガ如ク。氣息安
ラズ。腹脹。不大便。脉甚數ニ。ノ小弱。

處方

遏爾託根煎 八弓

精製硝沙 一匁

白糖 二勺

緩和吉利詞爹兒○兩肺陽ノ芥子泥

大便通スルト一行。他証故ノ如シ。○大汗出テ病人大
ニ勞倦シ。胸上ノ所患倍甚シ。氣息滋困難ナリ。○蝶針
三個ヲ胸上ニ行ヒ且後方ヲ與フ

遏爾託根煎 八弓

撒爾非亞粵幾斯 一匁

此藥ヲ行フ。八日ニノ頭爽快シ。譖妄止ミ。舌滋フテ
淨々。啖少々。氣息舒暢ス。唯渾身尚衰弱シ。重聽盜汗未

痘、又是又以テ後ノ煎方ヲ與フ尚難調ニ重複盡ト

幾那煎

ハ弓

幾那二弓ヲ以テ煎シ古紙ヘテ

撒爾非亞粵幾斯

一弓

汁ハ弓ヲ製スル者

耳漸ク聞ヘ汗止ミ病瘥ニ四週ノ後全ク故ニ復シ病院ヲ辭シ元家ニ歸ル。

備考此證ニ用ナル所ノ撒爾非亞粵幾斯強固シ汗ヲ止メ神經病ヲ治スル益妙劑トメ良効ヲ奏セル所夕

脉味嗜味嗜食○西藥即入其處或

白紙

絲繩即變

一弓

第三種惡性神經熱

ヒトコト平アルダヘセ一弓

子ルホサマ
リグナ羅

惡性熱ハ較著ノ發因ナクノ初發ノ際已ニ生力耗竭ノ狀アル者之ナリ。其時百脉皆虛。黃熱病等。此熱ハ別ニ一種ノ熱性アルニアラズ。凡テ各種ノ熱病○煥衝性、腸皆其初發ニ於テ此狀ニ陥ル。アル者タリ。

五神錯亂ノ昏憒甚ク目凹ミ陷リ眼采矇昧面色萎黃ニノ神彩ナク之ヲ望ヘニ恰モ屍ノ如シ身溫增劇ノ手ヲ炙ルガ如ク或ハ身溫減少ス。厥舌振掉シ大渴飲ヲ

得テ消セズ生カ暴ニ脱盡シ身臭屍ノ如ク大便自利シテ敗血ヲ交エ渙崩ノ汗漏洩シ紫赤斑。惡性瘍ノ發シ脉倫次ナク至テ數之ヲ診スルニ無キガ如ク振惕ノ結代ス以上ノ諸證ハ皆此病ノ嶮逆畏ル可キノ状ナリ。

此熱性ハ最善ク流行ノ惡性疫ニ發スルト多シ故ニ痘瘡。猩紅熱。傳染病扶思百思多類ナリ。亦疫ノ黃熱。英圭黎汗熱。蓐熱ニ此證ヲ發ス又。間歇熱モ亦此證ヲ發スル

トアリ

貴要ノ部。劇キ焮衝ノ得ル者其初發ニ在テ生カ抑屈

ヒラレテ此狀ヲ見ストアリ此證動スレバ悞リ認メテ惡性熱ト爲シ易シ○故ニ此病ニ臨ム者ハ細カニ發因ヲ檢索シ彼是ノ諸證ト流行スル他病ノ性トヲ精細ニ計較商議メ這ノ大危急ノ病ヲ點定スベシ此熱ノ轉歸ハ屢幸ヲ得ルト少シ此斯ノ病ニ命ズルニ惡性ノ名ヲ以テスル所以ナリ

病因ニ應メ治法各異ナリ○惡性流行疫ニ此症狀アル者ハ瞬間に生命ヲ喪ナガ故ニ勉テ之ヲ保持シ且上ニ開列スル治則ニ隨テ沈垂消耗人生カヲ升提スルヲ要スベシ。ヒラレテ此狀ヲ見ストアリ此證動スレバ悞リ認メテ惡性熱ト爲シ易シ○故ニ此病ニ臨ム者ハ細カニ發因ヲ檢索シ彼是ノ諸證ト流行スル他病ノ性トヲ精細ニ計較商議メ這ノ大危急ノ病ヲ點定スベシ此熱ノ轉歸ハ屢幸ヲ得ルト少シ此斯ノ病ニ命ズルニ惡性ノ名ヲ以テスル所以ナリ

然、凡其因、燃衝若シクハ生力抑屈ノ狀ニ生タル者ハ別
ニ有力消燃ノ治法ヲ施スベシ此コノ病人ハ明ニ其
病ノ本性ヲ覈知し、鑑治ヲ施ス片ハ一生ヲ萬死ニ回
ス。トアリ。宗志谷、美十郎○惡卦氣音無ニ、凶盡卦
無事也、各不以之、大少神也ナリ。

風熱火脾證ハ、熱辛火卦也。火主炎上故ニ熱根火赤而命火
亦然也。肺脾兩虛火盛ハ、火運衰弱入肺也。脾虛火盛
則火乘脾也。火乘人肺者、火家也。火出肺也。肺火
亦然也。火乘土也。○火也。出肺二廟火皆火勝也。火
勝則熾。十陰之陽也。○火也。出肺二廟火皆火勝也。火

醫療正始卷之九畢

天保八年丁酉五月發兌

京都寺町通松原下ル

勝村治右衛門

秋田屋太右衛門

書林

大阪心齋橋北二町目

須原屋伊

江戸浅草茅町二町目

八

