

醫
療
正
始

附
醫
院
類
案

十

松
科
別

✕
i 101

492
I
6 No. 2227 12/11/11


天保九年夏開雕

冲齋伊東先生譯本
四篇

醫酉療正始
附

醫院類案

象先



青藜閣發兌



富士川文庫
2661

醫療正始標目

卷之十

○屬類第四 熱挾腐敗本性 腐敗熱

腐敗熱類案

腐敗熱發斑治驗

腐敗熱兼頭瘡治驗

腐敗熱下血治驗

極劇腐敗熱治驗

卷之十一

宗類間歇熱

間歇熱類案第一

日發熱治驗

產婦日發熱治驗

間日熱治驗

卷之十二

間歇熱類案第二

索蒲爾刺列熱變為間歇熱治驗

重複間日熱兼肝胃燠衝遂變為僵凍之惡

寒治驗

變形日發熱治驗

性頑三日熱兼脾臟腫大更嬰傳漆弟扶思

療之收大效治驗

三日熱變為替留熱治驗

醫療正始卷之十

本心之熱類其殊解獨乙 毘斯骨夫 著

和蘭其 漢越而實幾 譯

西肥 伊東 玄朴 重譯

○屬類第四 熱挾腐敗性 腐敗熱 溶渙熱

腐敗ノ性ヲ挾ム熱病ハ即諸力沈垂ニ兼テ凝體縱緩

諸液溶解スル替留熱ナリ○故ニ此熱其真虛衰ノ狀

ハ神經熱ト同シ唯其凝體縱緩諸液ノ中血液最燂解

ニ傾クヲ異ナリトスルノニ○腐敗ノ狀ハ太凡他熱

ニ續發スル所ノ者タリ但其熱將ニ腐敗ノ性ヲ併セ
ントスルノ狀ハ預メ先明白ニ鑒識シ得ベキ者多シ
證候

大凡。其徵候ハ病人初發ヨリ甚衰弱スルヲ覺ヘ睡寐
安カラズ精力虚脱。人事ヲ省セズ多クハ頭重ク鈍痛
ス○微惡寒若クハ大惡寒ノ後。續テ發熱シ其熱次第
ニ増劇ノ其膚ニ觸レバ手ヲ燔クガ如シ○面貌呆然
トメ遺ル、所アルガ如ク其色或ハ紅或ハ赭赤。眼中
赤クメ腫脹シ其狀硝子ノ如ク鼻竅。黑色ノ物ヲ蓋ヒ
唇齒ニ褐黑ノ皮ヲ生シ次第ニ全口ニ滋蔓シテ黑色

粘膩ノ物ヲ被ニ至ル
太約舌上始メハ白胎アリテ或ハ乾燥シ或ハ始終滋
潤シ次デ其胎。褐黑ニ變シ中ニ裂紋アリ口中腐味ヲ
覺ヘ食氣全ク止ブ渴甚シキアリ甚カラザルアリ氣
息及ビ身邊一種ノ腐臭ヲ生シ聲音弱クメ聞ク可カ
ラザルニ至ル

腹脹滿。皮膚穢垢乾燥シ或ハ粘稠惡臭ノ汗ヲ出シ或
ハ兼テ打撲斑。杖斑。赤白癰疹ヲ發スルト多シ
其小便ハ酷變化多シ始メハ其色黯紅ヲ爲シ或ハ光滑
ノ膜ヲ上面ニ結ビ邇後渾濁シ叔格刺多ノ色○製劑
名其

色深褐ヲ爲シ黑色ヲ爲シ臭氣甚ク赤土狀ノ沈渣アリ
 或ハ屢骨喜ノ渣○骨喜ハニ類スル渣脚ヲ生ス
 其大便ハ頻數ニシテ溏泄ニ褐黑色血樣腐敗様ニシテ其
 臭屍氣ノ如ク自利ノ知覺スルナシ其下利愈多ク
 レバ腹脹愈加ハル
 其脉ハ甚據信シ難シ初ハ太約數實之ヲ診スレバ力
 アルニ似タリト雖氏其實ハ軟弱次デ乃チ太疾ニ變ジ
 僅ニ之ヲ候フ可ク且結代ス或ハ平脉ノ如キ搏度ヲ
 見シ或ハ平脉ヨリモ遲ナル者アリ
 以上ノ諸證ニ兼テ鼻竅肛門腔尿道等ヨリ稀薄溶解

ノ血ヲ漏洩スルアリ
 病人眠瘡ヲ生シ易ク又其處乍寒壞疽ニ變シ易シ
 其病頭等ニ至ル者ハ神經性ノ諸證ヲ蜂起ス其證ハ
 心神昏憤シ口裡喃喃嚙語ス但狂錯ノ大謔妄ヲ發ス
 ル者ハ甚稀ナリ一身振掉筋惕理線身重クノ恰モ鉛
 ノ如ク身垂テ足ニ向フ○脉沈衰スルニ隨テ謔妄倍
 劇ク一身振惕大便泄瀉亦倍甚シ
 經過

太約腐敗ノ性狀ハ病ノ第四日ヨリ第七日ニ至テ明
 白ニ見ハル其經過ハ十四日十七日二十八日ニ至リ

或ハ四十日ニ及ブ者アリ
腐敗熱ハ幾下一向蓄留熱ニ近キ弛張蓄留熱ナリ
原由

素質體質縱緩衰弱シ其天稟寒粘液惡液ヲ挾ミ殊ニ
失苟兒陪苦家未劑ヲ服ノ虛衰スル人ノ如キハ皆腐
敗熱ヲ得ルノ素質ヲ有スル者ナリ
發因一處ニ籠住シ且腐敗ノ蒸氣ヲ汚染スル大氣腐
敗ノ傳染毒濕ヲ帶ブル大暑新鮮ノ食料ニ乏シク或
ハ腐敗ヲ帶ブル物ヲ餐シ身體ヲ動運スルナク隱
憂ヲ抱キ諸種體中ニ宣露スル腐敗毒但其分量ハ至

テ少キモ害ヲ惹キ起スハ皆同シ喻ヘハ第一道ノ腐
敗物腐敗膿停蓄ノ小便胞衣ノ一片子宮内ニ残り留
ル等ヲ其最大ナル者トス○諸種ノ焮衝熱腸胃熱ニ
除泄法○吐下方瀉血等ヲ過用シ或ハ除泄ヲ行フ當キ時ニ
方テ之ヲ怠ルヨリ終ニ腐敗熱ニ變スル者亦屢之
轉歸

復於平康腐敗熱將ニ治セントスル者ハ病毒分解ノ
機徐ニ來リ汗尿ヨリ吉里濟ヲ生ズ其尿中ニハ夥
ク赤褐ノ渣脚ヲ交ル或ハ赤色ノ聚粟疹ヲ發メ解シ

唇邊ノ瘡疹ヲ得テ解ス其脉頗旺盛譫妄減シ舌滋潤
 ノ胎刺去リ睡寐食機故ニ復ス
 變於他病遷延神經熱耳腺腫惡性瘍ニ變シ或ハ病毒
 轉徙ニ變スルヲ最多シトス
 歸於死亡焮衝ヲ兼發シテ遂寒壞疽ニ變スルニ由テ
 死スルアリ生力乏竭メ死スルアリ或ハ四肢戰振冷
 汗失音瘧搐脉太數ニノ結代シ麻痺不遂頻ニ黑色ノ
 物ヲ吐シ出血止ム可カラズ血貴要ノ部ニ内漏スル
 等劇烈ノ諸證ヲ發メ死スル者モ亦之アリ
 預後

腐敗熱ノ預後法ハ凡テ不吉多シ上ニ記載スル嶮逆
 諸證愈劇キ者ハ其死愈速ナリ
 區別

腐敗熱ヲ分テ單複ト爲ス○其單ナル者ハ諸力沈衰
 諸液溶渙ノ狀ヲ見スノミ○其複ナル者ハ焮衝様腐
 敗熱ナリ譬ハ此熱初ヨリ焮衝ヲ帶ブルアリ或ハ經
 過ノ間腐敗性ニ他部ノ焮衝就裡腦肺腸ノ焮衝ヲ兼
 子生スルアリ又索蒲爾刺列様膽液様粘液様神經様
 等ノ腐敗熱アリ
 其兼攝ノ證候ハ即上文ニ開載スル局發焮衝或ハ腺

燉衝ヲ最本熱ニ兼發シ易シトス
治法

此熱ヲ治スルハ先原由ヲ除キ去ルヲ法トス○一二ノ諸證緩急ノ其治ヲ加ヘザレバ由テ腐敗性ヲ生スル者アリ是ノ如キ者ハ速ニ之ヲ除クテ勉ム宜シ
喻バ燉衝性ノ病狀腹内ニ積滯スル毒物子宮内ニ殘滯スル胞衣ノ一片○以上三症ノ如キ者即チ此等ノ如キ是ナリ

既ニ能原由ヲ治シ得ルニ及テハ其本熱ノ性ニ應ノ之ヲ療シ諸液ノ溶解ヲ防止シ凝體ノ縱緩ヲ收固シ

沈垂ノ諸カヲ升提スルヲ要ス須シ○腐敗ノ狀漸ク生スル者ハ輕クニ升提シ且溶換ノ勢ヲ攔住スル治法ヲ行フ可シ

其藥ハ醋。鑛酸ニハ綠礬精。粵栗失爾亞失儒。謨華爾列

利即チ名ノ收。亞的兒收。粵栗失爾赫多立沃利。名。ナリ。甘酸精ニ

ハ甘消石精。那布答赫多立沃利即名ノ。忽弗滿鎮痛液

ナリ。又。亞爾尼加根。亞爾尼加花。白芷。纈艸。攝爾扁答里

亞。龍腦。葡萄酒。燒酒等而其最大驗アル藥ハ幾那トス

但此藥ハ消化ノ機尚健ニシテ燉衝ノ勢已ニ除クニ非

ザレバ用ユルナシ然ザレバ病者之ニ耐ユルヲ能

ハズノ泄瀉倍甚キガ故ナリ
 外用ノ皮膚ノ衝動スル藥ハ芥子泥沙蘿蔔芫菁膏ヲ
 必用ノ藥トス但芫菁膏ヲ帖スル處動スレバ寒壞疽
 ニ變ジ易キガ故ニ之ヲ帖スルモ惟赤色ヲ打メ止ム
 ベシ
 攝養ハ甚緊要ノ一事トス清涼乾淨ノ大氣ヲ納レ精
 神ヲ欣慰シ輕ニニ滋養ノ生鮮芳香ナル飲食喻バ肉
 汁粘膩ノ藥ニ枸櫞汁ヲ加フル者葡萄酒ノ如キヲ服
 スベシ
 焮衝様腐敗熱ハ其原由ヲ拔去ル可キニ論ナシ其初

發ノ際ハ清涼ニメ焮衝ヲ消尅スル治法ヲ行フ宜シ
 故ニ植物酸。鑛酸ニ宜シ其心神昏憤スル者ハ寒罨ノ
 如キ頭ヲ清涼スル治療ヲ行ヒ證ニ隨テ蜚針ヲ施シ
 醫藥モ亦之ニ準ズベシ
 索蒲爾刺列様腐敗熱ハ乙百葛格亞那ノ吐劑ヲ行フ
 可キ證ヲ發スルヲ多シ或ハ答麻林度。大黃。酒石英ノ
 如キ下劑ヲ用ヒ爾後亞爾尼加根。菖蒲根。忽弗滿鎮痛
 液ヲ行フ可キ者アリ
 膽液様腐敗熱ハ膽液毒ヲ除クヲ必要トス故ニ答麻
 林度。酒石英。小量ノ大黃ヲ與ヘ爾後亞爾尼加花。水楊

梅菖蒲根。忽弗滿鎮痛液。幾那二宜。神經樣腐敗熱。ハ微ハ衝動スル方法ニ防腐藥ヲ合ス

蘇シ縷艸。攝爾扁答利亞。龍腦。幾那。坵酸ノ如シ。...

腐敗熱類案

腐敗熱發斑治驗

一傭夫十八歲體資中等ニメ偏倚スル所ナシ五日以來熱様ノ諸證ヲ得其發因何タルヲ詳ニスルナシ千八百二十二年七月十三日病院ニ歸ス其証左ノ如シ虚衰甚クメ起坐スルハ能ハズ頭困重。兩額赤暈。雙目光滑。唇舌乾燥シ。...

處方

過爾託根煎 半弓ヲ以テ煮テ八弓ヲ製ス

精製硃砂 十氏

白糖 二弓

蟻針六頭ヲ胸上ニ行フ

病人徹夜譫妄シ狂躁止時ナク逃脫セントシ下利一

二行翌朝之ヲ診スルニ頭熱灼ノ大ニ困重シ目赤ク

大ニ譫妄シ胸上遍ク發斑ス腹脹滿脉數小○蟻針四

頭ヲ顛顛ニ施シ全頭ヲ寒罨シ芥子泥ヲ兩腓腸ニ帖

ス○内服ニハ

沙列布根煎 一弓ヲ以テ煮テ八弓ヲ製ス

地亞格日溫 半弓

又方

乙百葛格亞那末 三氏

白糖 十氏

調停散藥ト爲シ六服ニ分チ每一時ニ一服

飲料ニハ沙列布煎ニ比ニ綠礬精二十四滴ヲ加フ

上方ヲ行フト雖泄瀉倍甚ク病狀嶮逆ニ陷ルニ由テ

後方ヲ代ヘ用フ

乙百葛格亞那末 三氏

白屈林子末 三氏

白糖 八氏

調勻散ト爲シ六裏ニ分チ每一時ニ一服スニ由テ
 沙列布煎ニ格綸僕粵幾斯半ヲ加フ○大便スル毎
 ニ漿粉吉利詞爹兒ヲ行フ令キ其一部ニ一服
 此諸藥ヲ行フノ間泄瀉減ジ精神次第ニ知覺ヲ生シ
 脉旺シ熱勢調適シ發斑盡ク消散ス
 沙列布加格綸僕粵幾斯煎ニ桂露半ヲ加ヘ與フ然
 ル所以ハ初發ハ其脉弱キガ如シト雖氏頗動惕ノ狀
 アリ且頭中熾衝ノ疾患現在スルヲ以テ衝動ノ劑ヲ

行フ可カラザルガ故ナリ ○淵按ニ初ハ病者衰弱ス
 レドモ忌所アツテ衝動劑

ヲ用ヒズ今ハ唯圭露ヲ
 與テ以テ衰弱ヲ扶ク○其發前ハ其ハニニ精ニス

病人次第ニ輕快ニ第十三日ニ至テ熱盡ク消散シ食

氣復生ス○散藥ヲ停メ煎劑ノ反ヲ與フ其後沙列布

煎ニ越栗失爾赫多立沃利ヲ加ヘ與フ之ヲ行フ

日ニ至リ又後服ヲ停メ唯滋補ノ食養ヲ攝セシ

メテ快復ニ至ルハ時ハ皆藥味ノ出ニ藥中ニ在リ

八月六日病全ク痊ルヌ以テ病院ヲ發スハ時ニ

備考此證ハ衰弱甚ク諸液溶解ニ傾クト雖氏衝動ノ

本劑ヲ行ヒ難キヲ以テ治術施シ易カラザルナリ

腐敗熱兼頭瘡治驗
 一小廝。八歲體資偏倚ナシ千八百二十一年十月二十四日病ノ第七日ニノ病院ニ來ル其証左ノ如シ
 頭上髪ヲ生ズルノ部ハ皆瘡痂ヲ生シ瘡中ニ小蟲アリ髪大半脫落シ頭困頓。謔妄停時ナク耳重聽止爲リ面色萎黃瘦削。眼采衰ヘテ眼陷。言語分明ナラズ唇舌乾燥シテ褐色ノ皮ヲ生ズ大渴。氣息短促。乾咳アリ胸及ビ上肢ノ内面ニ許多ノ斑ヲ發ス腹脹滿。皮膚燥熱大便水瀉シ脉數小弱○其從前ノ狀ハ之ヲ詳ニスル不能ハズ

芫菁膏ヲ肩胛間ニ帖シ丹服ニハ後方ヲ與フ

纈艸根

亞爾尼加根

各ニク

滾湯ニ泡シ濾過メハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

桂露 半ク

白糖 二ク

飲料ニハ沙列布根煎ニ比粵栗失爾亞失儒謨華爾列利一クヲ和シ與フ

病人夜間安靜ナラズ徹夜謔妄シ重聽增盛ニノ聾ト爲リ下利止マズ更ニ筋惕ノ證ヲ加フ

是ヲ以テ又二個ノ芫菁膏ヲ腓腸ニ帖シ丹服ニハ後方ヲ行フ

纈艸 三々

亞爾尼加根 二々

滾湯ニ泡シ濾過ノ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

亞刺比亞蘧謨漿

桂露 各半弓

鹿琥精 半弓

又方

實亞篤刺瓦屈散

一弓 ○方 聖京 熱 挾 肝 焮 衝 樣 感 聖京 熱 挾 肝 焮 衝 樣 感

觸治驗ノ下ニ詳カナリ

東京麝香

○布廉幾ノ藥說ニ云麝香ハ東

亞ノ者ヲ下品トス

羯布羅 二匹

調停散ト爲シ六帖ニ分チ一時半ゴトニ一服

大虚ノ證候變化スルヲナクメ六日ヲ經ル後其勢初

テ漸クニ復シ數行ノ泄瀉減少ス ○困難ノ乾咳アル

ヲ以テ過爾託舍利別ニ亞刺比亞蘧謨漿ヲ合メ輕キ

舐劑ヲ製シ上方ト同シク之ヲ行フ散藥ハ停メテ服

スルヲナシ ○次デ羯布羅三匹ヲ本藥ニ加ス ○此方

ヲ連用ノ病ノ第十四日ニ及デ全身汗出テ頭爽快ニ
耳能聽キ咳嗽減ス然レ腹痛甚ク手少ク觸ルモ之ヲ
耐ルト能ハザルノ症ヲ發ス○從前太沈垂スル生力
アリト雖レ蜈蚣針四個ヲ腹上ニ帖シ緩和琶布ヲ罨
之ニ由テ悞リ認メ易キ炊衝様ノ性狀乍自解ス
頭上ヲ淨潔ニスト雖レ瘡疥ノ小蟲倍蕃滋スルガ故
ニ淡婆姑葉泡方ヲ以テ頭ヲ罨ヒ丹服ニハ尋常湯泡
纈艸ヲ與フ
舌上ノ胎皮次第ニ脫メ淨潔滋潤シ胃饑ヲ覺ヘ大便
調順生力漸クニ復シ頭瘡俄カニ除キ頃ニメ全ク痊

へ服藥六週ノ後體氣故ニ復シ精神快暢心思悅樂ノ
病院ヲ辭シ去ル

腐敗熱下血治驗

一商客十五歲體稟中等樹菓ヲ縱噉ノ大泄瀉數行ヲ

得テ太衰弱シ強テ病ヲ忍デ僅ニ未枕ニ伏サザルノ

ミ○食氣凶ビ渴甚ク飲ヲ引クト多キガ故ニ大便倍

下利ス○遂ニ大ニ憎寒シ續テ發熱ス○病纏綿メ治

セザルト十日尚醫ヲ請ハズ病倍增劇スルヲ以テ千

八百廿二年十月三十日病ノ第十一日ニメ病院ニ

歸ス刻夜寐甚難大臥坐反ト下語不又困困且昏

其證候ハ病者衰弱ノ起坐スルヲ能ハズ頭困頓且昏
眩ニ耳鳴重聽時々譫妄ス眼冒昧ノ眼采快々面色萎
黃瘦削舌乾燥ノ褐色ノ皮ヲ被ヒ唇齒ニ褐黑粘滑ノ
物膠著ス大渴氣息妨ル所ナク腹少ク脹リ強ク之
ヲ按セバ痛ム大便尚下利スルヲ數行小便短濇ニ
色黯黑皮膚乾燥ノ熱シ脉數動惕ニ重ク按スレバ乍
チ絶ス十五粒中藥掛菓ヲ煎ルハ大抵高燒計
處方煨燒下血ノ銀
沙列布根 一ツ
煎上爲シ濾過ノハヲ取り後件ヲ加フ樂

精製礮沙 十五氏

白糖 二ツ

飲料ニハ沙列布煎○肩胛間ノ芫菁膏○漿粉吉利詞
爹兒○腹上ニ温巾ヲ罨フ

十一月三日 第四日 ○夜間睫ヲ交ヘズ譫妄シ重聽更ニ

進デ殆ド聾ト爲ル大渴幾ド撲滅ス可カラズ

處方 兩腓腸上ニ芥子泥ヲ帖シ前方ヲ連服セシム

六日 第七日 ○下利止マズ虚衰倍甚ク腹倍脹滿ノ知覺

甚ク脉收小

處方 腹上ニ蟬針六頭○股上ニ芥子泥

内服ノ泡方 煎後六煎 ○煎上ノ茶子 煎後
水揚梅 二芍

滾湯泡淹 三濾メ八芍ヲ取り後件ヲ加フ味覺
精製硝沙 十伍氏

亞刺比亞 藪謨漿 煎後 煎上ノ茶子 煎後
地亞格 日溫 ○各半芍

又散藥以方 煎中ノ茶子 煎後
乙百葛 格亞那末 煎後 煎上ノ茶子 煎後

亞刺比亞 藪謨末
白糖 各五氏

調勻メ散ト爲シ六服ニ分チ每一時ニ一服ス

八日 第九日 ○譫妄甚フメ止時ナク頭熱シ眼采活潑兩

顫赤暈ヲ潮シ腹尚鼓ノ如ク脹滿メ知覺甚シ脉緊ヲ
帶ビテ搏度太數兩手戰振スス口開テ外ニハ鼻内

處方 顫顫ニ四頭ノ蟻針頭上人寒罨腹上ノ芥子泥
内服 二ハニ十 ○煎後 煎上ノ茶子 煎後

亞爾尼加根 二芍 煎後 煎上ノ茶子 煎後
滾湯泡出シ濾過メ八芍ヲ取り後件ヲ加フ量

地亞格 日溫 二芍
又方 煎後 煎上ノ茶子 煎後

東京麝香 六分

白糖 一分

調勻ノ散ト爲シ六帖ニ分チ上方ヒ百葛格散分量増

加シテ每服ト毎半時ニ交互ノ與フ

十二日 第三十日 ○熱増加シ衰弱甚ク頭上ノ疾患倍強

ク耳。全ク聾シ舌短縮シ糞澁ニメ振掉シ乾黒ノ皮ヲ

生ズ口吃メ言語曉ル可カラズ口開テ収マラズ鼻内

口中皆乾キ肌膚和セズ手ヲ觸ルレバ其熱熨灼スル

如クニメ憎ム可シ大便自利メ知覺スルヲナク脉細

ニメ絲ノ如シ

處方 四個ノ蜚針ヲ前額ニ行ヒ寒罨ヲ連用シ芫菁

膏ヲ兩股ニ帖ス

内服ニハ

亞爾尼加根 三分

滾湯泡出シ濾過ノハヲ取り後味ヲ加フ

龍腦 三分

亞刺比亞越謨漿 半勺

白糖 二勺

麝香ヲ行フ前ノ如シ

十三日 第四日 ○病候至嶮逆ニメ昏睡ノ状ヲ爲シ脉振

暢大便數行血樣ノ物ヲ自利ノ少モ知覺スルコトナシ
此大便ハ百骸ノ諸液ヲニ溶解セントスルノ前兆夕

處方 亞爾尼加根 三々
遠思根 一々
滾湯泡淹ニ濾過ノハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

龍腦 四片
鹿角精 半々
茴香糖油 二々

又方 阿芙蓉 一片半
乙百葛格亞那末 二片
白糖 一々

調勻ノ散ト爲シ六帖ニ分チ麝香散ト每一時ニ交
互ノ一服ヲ進ム

飲料ハ 沙列布煎 二北
越栗失兒亞失儒謨華爾列利 半々

又揮發膏一弓龍腦一々ヲ研合ノ腹上ニ摩入シ芫菁

膏ヲ兩膊ニ帖ス

十四日第廿五日 ○大虚ノ候尚故ノ如シ

處方

亞爾尼加根 三勺

滾湯泡出スルヲ八分時許。濾過ノハヲ取り

後味ヲ加フ六神ニ合テ濃香精十每一朝ヲ交

龍腦 六分

桂露 一勺

亞刺比亞越謨漿 半勺

又方

乙百葛格亞那末 半分

白糖 十八

調勻散ト爲シ六服ニ分テ每一時ニ一服ス

十五日第廿六日 ○至嶮逆ノ証及ビ血樣ノ泄瀉。仍故ノ如

處方

亞爾尼加根 三勺

滾湯泡出シ濾テハヲ取り後件ヲ加フ

格綸僕粵幾斯 半勺

越栗失爾赫篤立沃利 一刃

挂露 一弓

亞刺比亞越謨漿 半弓

乙百葛格散ハ行フテ前ノ如シ

十六日第廿七日○下血止マザルヲ以テ生力盡ク脱スル

状アリ○病人少モ智識ナク百事需ムル所ナシ

處方

赤幾那 半弓

煎メ濾過シ六弓ヲ取り後件ヲ加フ

生明礬

篤爾面室刺粵幾斯 各一弓

挂舍利別 半弓

十七日第廿八日○病人羸瘦骨立ニ薦骨及ビ大回轉ニ眠

瘡ヲ生ゼントス泄瀉止マス

處方

赤幾那 半弓

煎ト爲シ此藥液ヲ以テ後件ヲ泡出ス

加斯加栗刺皮 二弓

濾過メ八弓ヲ取り更ニ後件ヲ加フ

生明礬 一弓

坎百設木粵幾斯 二弓

桂丁幾 二弓

又方

白屈林子末 十二弓

桂皮末

白糖 各半弓

調勻散ト爲シ六帖ニ分チ每一時ニ一服

後方ヲ以テ四肢ヲ澡洗ス

羯布羅精 二弓

香竄精

一弓 國菜沃刺那 圭皮肉豆蔻丁香各半
水六弓 右淹ス 一 二日 蒸
餉ノ精液二十弓ヲ取ル

十八日 第廿九日 ○初テ一線ノ活路ヲ見ル ○血様ノ下利

減ジ少ク省識スル所アリ ○處方前ノ如シ

十九日 第三十日 ○夜間 カガニ 抵聲ニ譫妄シ泄瀉止ム眼頗光采

アリ脉數ニノ弱

處方

赤幾那 半弓

煎ト爲シ此藥液ヲ以テ後味ヲ泡ス

加斯加栗刺皮 二弓

濾メ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

格綸僕粵幾斯

越栗失爾赫多立沃利 各半勺

茴香糖油 二勺

散藥ハ停メテ用フルナニ

飲料ハ...

沙列布煎 二匕

綠礬精 半勺

廿二日 第三十日 譚妄止ミ前夜間安靜ニノ快睡ス右

ノ大回轉ノ眠瘡。黑色寒壞疽狀ノ皮ヲ被フ耳尚聾ニ

乾咳アリ

處方

赤幾那 半勺

煎ト爲シ此藥汁ヲ以テ後件ヲ泡出ス

加斯加栗刺皮 二勺

廿五日 濾メハ弓ヲ取リ後味ヲ加ス

亞刺比亞越謨漿 半勺

白糖 二勺

舐劑 亞刺比亞越謨漿。地亞格日溫ヲ以テ製シ與フ

眠瘡ノ處ハ羯布羅斯麗謨ヲ以テ之ヲ覆フ

廿四日 第三十日 兩耳中ヨリ白色膿樣ノ物ヲ洩ス耳

頗通ズ面白鮮明。乾咳頗甚シ

處方 西良神即神如神甚

廿四 赤幾那 ノ ○兩耳中 ニ 白鳥類 ノ 味 ノ 角 ノ 耳

過爾託根 ノ 各半 ヲ 煎 ノ 爲 シ 濾過 メ 八 ヲ 取 リ 後味 ヲ 加 フ 與 ル

煎 ノ 爲 シ 濾過 メ 八 ヲ 取 リ 後味 ヲ 加 フ 與 ル

亞刺比亞越謨漿 ノ 半 ヲ

白糖 ノ 半 ヲ

廿五日 第三十 ニ ○食氣生 シ 脉稍復 ス 然 レ 氏尚恒 ニ 弱微

ク按 ス レバ絶 ス 咳嗽稍減 ス 眠瘡ノ處知覺敏捷 ニ 過

ギ初 テ 愈 ユ ル ニ 向 ケ 十 ノ 八 ノ 針 ヲ 出 ス

處方 赤幾那 ノ 半 ヲ

赤幾那 ノ 半 ヲ

過爾託根 ノ

煎 ノ 爲 シ 濾過 メ 八 ヲ 取 リ 後件 ヲ 加 フ

真女硃沙加亞泥子精 ノ 半 ヲ

薑苗香糖油 ノ 二 ヲ

食料 ニ 八鬼爾斯布 ノ ○製法未詳 カ ナラ ズ 二雞卵 ヲ 配

シ與 フ 取 リ 服 ス 二

三十日 第四十 ニ ○耳ヨリ膿汁ヲ洩メ止マズ耳倍聰咳

倍輕ク稀ナリ

處方 赤幾那 ノ 半 ヲ

赤幾那 半弓

過爾託根 二弓

三十日煎ト爲シ濾メ八弓ヲ取テ後件ヲ加フ

與白沙糖 二弓

十二月三日 第四十日 諸力頗旺シ筋力大ニ衰弱スル

ヲ覺力香蘇由 二弓

處方 煎ト爲シ八弓ヲ取ル

赤幾那 爲シ 各ニ弓

剝禮瓦樂亞麻樂 各ニ弓

煎ト爲シ八弓ヲ取ル

食養ニハ物印斯布○葡萄酒ヲニ雞卵ヲ加ヘ與フ

六日 第四十日 病初テ快復シ諸器ノ機運其本然ニ復

シ筋力尚大ニ衰弱ス

處方

赤幾那

依蘭苔 各ニ弓

煎ト爲シ八弓ヲ取り服セシム

飲料内ニ葡萄酒ヲ加フ

病人至危篤ノ疾ヲ耐テ遂ニ徐々ニ復スルヲ

得タリ下肢水狀ニ腫脹ス

上方中ニ越栗^{エリキ}失爾^{シトル}赫篤^{ヒツト}立沃利^{リヨ}珊多里^{サントリ}越幾斯^{エキス}各半^ハ。
杜松實傑^{ゲレ}列^レ。橙皮糖油^{セウキドウ}各二^ニヲ加^フ。大便新ニ復^ス。
又此ヲ以テ後方ヲ行^フ。

黃幾那^{ワウキナ} 半^ハヲ

煎^ルズル^ノ八分時此藥汁ヲ以テ後件ヲ泡^ス。

格綸^{コロン}僕根^{ボクネ} 二^ニヲ

濾^シテ八^ハヲ取^リ又後品ヲ加^フ。

坎^{カン}百^{ハク}設^{セツ}木^{ボク}粵^{エツ}幾^キ斯^ス 一^一ヲ

六日^{ロクニチ}茴香糖油^{フエウキドウ} 二^ニヲ

此方ヲ連服シ兼テ滋養ノ食餌ヲ與ヘ恰好ク葡萄酒

ヲ服セシメ體氣初テ故ニ復シ二月十一日病全ク愈
ルヲ以テ醫院ヲ辭シ去ル其間凡四月又半ナリト云

極劇腐敗熱治驗

一書生二十二歲家道甚窘迫ス材識高遠意ヲ銳クメ
困學シ久ク眠ヲ廢スル後一身甚勞倦シ飲食進マズ
心神恍惚大便大ニ泄瀉ス○一醫生瀕艸泡方ニ格綸^{コロン}
僕^{ボク}粵^{エツ}幾^キ斯^スヲ加^フル藥ヲ進ム此藥ヲ服スル^ノ三日少
効ナシ○千八百廿二年八月廿六日看護人ナキヲ以
テ病ノ第四日病院ニ歸ス○渾身衰弱兩脚戰振スル

ヲ以テ起行スルヲ能ハズ ○ 頭太困頓シ眩暈耳鳴リ顔色萎黃瘦削シ舌乾燥ノ褐
 黑苔皮ヲ覆ヒ大渴泄瀉止マズ皮膚乾燥手ヲ觸ルレ
 バ其熱炙ル方如シ脉數弱一異怔忡ヲ爲ス方ニ
 處方ニ入ルル者ニ
 一書續艸根ニ有ル者ニ
 亞爾尼加根 各ニツ
 滾湯泡出シ濾過ノハ弓ヲ取り後件ヲ加フ
 龍腦 三瓜
 桂露

亞刺比亞蘆漿

各半ヲ

飲料ハ沙列布煎兩腓腸上ニ芫菁膏

一二日ノ間ハ其病狀依然トメ變ズルナシ但夜ニ

至レバ譫妄シ目中赤點アリ頭ヲ按スレバ熱灼ス目

光炯然兩顴赤暈脉數弱○血頭中ニ進ムノ甚シキ

疑ヒナシ

九月二日 第十日 ○ 後法ヲ行フ

耳後ニ蟬針四條○頭上ノ寒罨○兩股ノ芥子泥

上方中龍腦ヲ去リ鹿角精一カヲ加フ

又方

乙百葛格亞那末

二氏

亞刺比亞越謨末

白糖 各半々

調勻散ト爲シ分テ六帖トシ一時ゴトニ一服

謔語仍劇ク頭ノ所患更ニ甚ク兩手ノ振惕之ニ加ハルヲ以テ四日再ビ蟻針四條ヲ顛顛ニ施シ芫菁膏ヲ項上ニ帖シ仍前藥ヲ與ル外又後方ヲ處ス

亞鉛華 半氏

止白里葛斯篤儂謨

二氏○止白里ハ魯西亞東

所ノ葛斯篤儂謨ヲ以テ最上品トス涅局方ニ詳ナリ

白糖 十氏

右調勻六服ニ分チ每一時一服

翌日再ビ芫菁膏ヲ胸ニ帖シ生新ノ芥子泥ヲ腓腸ニ行フ○病次第ニ増劇シ熱モ亦隨テ甚ク生力沈垂筋肉抽掣ス皮膚乾燥ノ糙澁シ手ヲ觸レバ灸ルガ如クニノ惡ム可キヲ覺フ○謔妄止マズニ便失禁腹脹滿スル等危篤ノ証盡ク備ハル

六日第十五日○下法ヲ處ス頭巔ノ髮ヲ剃ノ芫菁膏ヲ帖

シ芥子泥ヲ前臂ニ行ヒ揮發膏ヲ腹上ニ摩シ斯百詩思設華里加里其方未詳ナラス百詩思ハ散末設華

強腦藥末ノ合劑ナラノ泡方ヲ以テ四肢ヲ洗澡ス
ニ他日ノ考証ヲ待ツ

六日 纈艸根下切 各三ツ

亞爾尼加根各三ツ

滾湯ニ泡シ濾メハ弓ヲ取り後件ヲ加フ

東京麝香越八氏ヲ取リ亞刺比亞

鹿角精半ツ

白糖二ツ

凝流ノ體俱ニ溶渙スルノ勢アリ少ク背上ノ皮膚ヲ
按スルモ縱緩ニ薦骨及ビ大回轉ノ部。眠瘡ヲ生ズ百

方之ヲ治ムト雖レ効ナク乍寒壞疽ニ變ズ大便失禁

ノ太惡臭アリ病人ノ體ニ論ナク身邊ノ物件皆其臭

ヲ傳フ晝間ハ心識冒昧。人更ヲ省セズ夜ハ乃譫妄ス

身體勾屈ノ頭。足ニ朝ニ百事需ムル所ナク摸床撮空

少モ停時ナシ脉振惕。舌糙澁黑皮アリ且全ク短縮ス

口中惡臭アリテ嗅グニ堪ヘズ腹滿。鼓脹ノ如ク其人

平常頗強固肥滿スル者今ハ乃瘦削ノ骨立ス虚憊幾

ド極ル○十日第九日後方ヲ處ス

水楊梅根六ツ

菖蒲根三ツ

滾湯ニ泡シ濾ノ八ヲ取り後件ヲ加フ

桂丁幾 三ヲ

越栗失爾赫多立沃利 一ヲ

平常亞刺比亞越謨末 ニヲ

每半時ニ食ヒヲ取り後方ト更番ニ進ム ハ其入

亞爾尼加根 各三ヲ

額艸根 各三ヲ

滾湯ニ泡シ濾ノ六ヲ取り後味ヲ加フ ニ

鹿角精 ニヲ

東京麝香 溶化ス

泡茴香子ノ飲料ニ貴好ノ翁加里亞酒一二ヒヲ加フ

又方

羯布羅精 ニヲ

芫菁丁幾

忽弗滿生拔爾撒摩 各ニヲ

刺那油水揚梅油各一ヲ府刺賢垣兒油菜沃

油誅廿四滴芸香油白琥珀油各半ヲ生橙皮油

一乃龍涎油半ヲ右諸油調勻シ用フル時ニ臨

劑十滴ヲ入ス

此藥ヲ用ヒテ後命火熄ントノ復燃ユヤ、知覺スル

所アリ夜間安靜振惕止ム脉稍浮ビ宵間倍旺盛ノ且
頻ニ譫妄ス○揮發衝動ノ劑ヤ、其服量ヲ減スベシ
○十二日後方ヲ投ス

幾那

纈艸根

各三々

水楊梅根

半弓

滾湯ニ泡シ濾ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

越栗失兒赫篤立沃利 一々

亞刺比亞越謨漿 半弓

腓腸ニ芥子泥ヲ帖ス○此日又奇異ノ一症ヲ發ス即

其左手ノ諸指大指ヲ除クノ外皆代指ヲ得テ乍化膿
スルヲ以テ一々刀ヲ用テ割開ス而其次指ノ所患尤
甚ク毒勢延テ第三節ニ及テ指骨腐化シ其第一節ハ
脱落ス乃之ヲ割開シ微温湯ヲ以テ勉テ惡性ノ膿ヲ
燙滌ノ幸ニ愈ユ○代指僅ニ愈レバ右臂上脇下胸腹
左腓腸頭部等ニ又陸續トノ焮衝様腫ヲ繼發ス一々
緩和琶布ヲ帖メ化膿セシメ刀ヲ以テ割開シテ許多
ノ膿汁ヲ導洩ス○十四日第二日○後方ヲ行フ

幾那 半弓

煎スル計四分時後味ヲ其内ニ泡ス

水楊梅根 半斤
菖蒲根 二斤

此方ヲ行フノ間體上幾多ノ潰瘍及ビ疼痛アリト雖
氏其景況快復ニ向フ但宵間ハ毎ニ熱氣發動シ頭ヲ
候フニ太温ニ過グ兩額赤暈アリ時々謔妄脈動惕ス
○宜ク衝動劑ノ分量ヲ減ズ宜シ○十七日 第廿
六日 ○後

法ヲ行フ頭上ノ寒罨股上ノ芥子泥內服ニハ

幾那

水楊梅根

各半斤

滾湯ニ泡シ濾メ八寸ヲ取り後件ヲ加フ

越栗失兒赫篤立沃利

又

亞刺比亞越謨漿 半斤

沙列布煎 二匕

病人尚此藥ニ耐ルヲ能ハズ脈動惕シ血頭ニ上攻ノ

謔言妄語シ眼義異常ニ炯々タルヲ以テ又其劑ヲ轉換ノ植物酸ヲ用フ

十八日第廿七日○後藥ヲ行フ

又 過爾託根煎 八弓

酒石酸 十二氏

白糖 二弓

午前熱退ク間ハ幾那泡方ヲ行ヒ午後熱潮スル寸ハ過爾託煎ヲ與フ○以上熱沸諸証鎮止スルヲ以テ廿四日第三十日○幾那依蘭苔煎ヲ與フ之ヲ行フ數日又其久ク病床ニ臥スルト一身ノ津液乾燥スルヲ以テ

關節ノ滑液因テ減耗ノ支節強直シ膝關殊ニ甚シキトヲ治スル爲ニ溫浴ヲ行ヒ且強壯滋養ノ食餌ヲ用ヒシム病人次第ニ快復シ七週ノ後全ク瘳ユ病者家ヲ懷フテ切ナルヲ以テ許メニ親ノ許ニ返ラシム乃陸路ヲ取テ去ル
後三月ヲ歷テ來リ謝ス體氣榮暢些病ナシ

醫療正始卷之十一 畢

象先堂

象先堂

醫藥正女 卷之十 三

醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三
 醫藥正女 卷之十 三

