

醫
正
始

附
醫院類案

十一

松
科別
i 101

時ト云フ

間歇熱ノ毎發作ハ皆暫時ニ經過シ去ルノ暫留熱ト
看做ベシ故ニ暫留熱ハ又熱發時ノ陸續トノ斷ザル
熱病ト見ルベキナリ
證候

間歇熱ハ之ヲ患フル前。太約病萌アツテ發ス其病萌
ナクノ發スルハ稀ナリ其病萌ハ身ニ一異勞倦ヲ覺
レ舉動怠惰ニノ操作カナク欠伸シ面ト四肢ト其色
蒼白ニノ冷ヘ唇及ビ爪甲青色ヲ爲ス○此種ノ諸證
太約病者自ラ覺ヘザル前。傍人先之ヲ見ルト多シ

發作ノ際。必ラス三時限ヲ分ツ○一ハ惡寒ノ時限○

二ハ發熱ノ時限○三ハ發汗ノ時限

惡寒初ハ背ニ生メ微々戰慄シ遂ニ背ヨリ渾身ニ蔓
延シテ一身震掉戰振困悶シ氣息短促。燥渴。惡心。胸悶。
皮膚知覺ナクメ且、欽束シ小便淡白。脉疾小ヲ爲ス其
餘。熱病總論ニ記載スル諸證候ヲ發ス○間歇熱ノ惡
寒ハ多クハ暫留熱ノ惡寒ヨリモ甚ク熱發作スル毎
ニ必ス發ス其甚キ者ハシバク真ノ僵凍ノ寒ヲ起シ
其勢極テ暴劇ニシ或ハ終ニ之ガ爲ニ斃ルハニ至ル
モ亦之アリ或ハ惡寒太微ニシ知覺セザルアリ或ハ

發作ノ間始終止サル者アリ
熱勢ノ微甚ハ惡寒ノ劇易ト相應ス一身ノ知覺熱時
ニ方テハ銳敏ヲ爲シ其熱徐クニ盛大シ汗出テ乃チ
解ス其他ノ證候ハ暫留熱ト同ジ○熱灼留連スル
一二時ニメ面ノ皮膚先漸クニ濡ヒ嗣テ上部ヨリ次
第二全身ニ及ブ此ニ於テ温煖ニメ蒸クタル酸臭ノ
汗ヲ渾身ニ發シ脉徐ニメ緩渴止ニ熱消シ病人大ニ
寛解ヲ覺ヘ遂ニ屢安眠ス○小便許多ノ赤澱脚ヲ生
ス是即間歇熱ノ一徵候ナリ○汗止テ熱發時正ニ終
ル

發作ノ後ハ一身倦怠病的容色身寒氣ニ觸ルムヲ怯
レ食欲減ズル等ノ外體氣病ム所アルヲナシ
區別

間歇熱ハ其斥ス所ニ隨テ其別數種アリ
第一發作ノ形狀ニ因テ之ヲ分テバ
乾明間歇熱發作ノ間三時限明ナル者ヲ云フ坤暗
間歇熱上證ニ反シテ三時限明ナラザル者ヲ云

乾明間歇熱又分テ二種トス
上整正間歇熱其熱ノ發作定叙アル者ヲ云フ下

上不正間歇熱其熱ノ發作定叙ナキ者ヲ云フ

上整正間歇熱更ニ又之ヲ數等ニ分ツ

春免熱時ノ長短ヲ以テ之ヲ區別スレバ

一日發熱其發作十二時毎ニ來ル者ヲ云フ

此熱ノ發作ハ太約朝ニ始マリテ午後ニ

終ル惡寒多クハ長カラズ其熱モ亦甚強カ

ラズ汗出ルル多カラズ且之ヲ病者寡シ

二間日熱其熱一日ヲ隔テ、發作ス故ニ隔

日ニ免熱日アリ○此熱ハ之ヲ病ム者甚多

ク春節最多ク流行ス○其發スルヤ太抵午

時或ハ午後ニ方テ大惡寒ヲ發シ肌熱灼ク

ガ如クニシテ乾燥シ次デ夥ク汗出テ小便

熱シテ渣脚多シ○第五發ヨリ第九發ノ後

屢唇上ニ瘡疹ヲ發スルヲアリ此一善候ト

ス

三三日熱其熱二日ヲ隔テ、發作シ免熱ノ

日ヲ得ルル兩日○太概惡寒頗盛ニシ且長

ク熱勢甚強カラズ發汗モ亦太多カラズ○

太約發作晚ニ向テ始リ留連スルル四時許

○此熱ハ甚頑痼ノ者多ク十四發ノ後甚非

レバ治スルコト稀ナリ而メ汚濕ノ地方若クハ
 秋節ニ方テ流行ス惡液家内臟壅塞ヲ此ノ
 善ク之ヲ病ム且動モスレバ水腫病黃疸消
 耗病等ノ如キ久性ノ病ニ變ジ易シ且身
 四日熱多日熱此症ハ甚希ナリトス
 復免熱時ノ景況ヲ以テ區別スレバ
 天悉皆間歇熱發作止ムトキハ熱氣悉ク皆
 消散スル者ヲ云フ
 地不悉皆間歇熱發作已ニ止ムト雖凡其熱
 悉ク消散セス尚一ニ熱性諸症殘留シテ

去ラザル者ヲ云フ

秋發作ノ多少ヲ以テ之ヲ區別スレバ

壹單間歇熱或時日ノ間唯一發作ヲ得ルモ
 ノ是ナリ

貳複間歇熱其複セザル者ニ在テハ唯一發
 作ヲ得ベキノ間ニ其熱再發作シ而メ其劇
 易長短其本來ノ發作ハ自ラ本來ノ發作ト
 相應シ重複ノ發作ハ每重複ノ發作ト相類
 スルモノ是ナリ

複間歇熱ノ最多ク行ハル者ハ

一 複間日熱此熱ハ日發熱ノ如ク十二時
 毎ニ發作シ其狀恰モ日發熱ニ相類ス唯其
 異ナル所ハ發作始マルノ時刻病勢ノ劇
 易留連ノ長短等奇日○本熱ノ發作ノハ
 毎ニ奇日ニ應シ偶日○重復ノ發作ノハ
 正ニ偶日ニ同シキヲ以テ知ルナリ
 此熱ハ其行ハル、一日發熱ヨリ多ク而
 ノ動モスレバ單間日熱ニ變ジ易シ

二 複三日熱此熱ハ兩日續テ發作シ而ノ
 第三日ハ發作ナシ○第一日ト第四日ノ
 發作ハ本熱ノ發作ニ

即チ重復ノ發作ナリ
 注 三日重三熱アリ其熱日發熱ノ如ク毎
 日發作ス唯其分別ハ發作始マルノ時刻
 及ビ病勢ノ劇易第一日ハ第四日ト相符
 シ第二日ハ第五日ト同ジク第三日ハ第
 六日ト相應スルヲ以テ知ルベシ○此熱
 ハ爾後單三日熱ニ變スルナリ

冬發作始マルノ時刻ヲ以テ之ヲ分テバ
 一定發間歇熱其發作始マルノ時刻一定ノ
 變ズルナシ此熱ハ至テ頑痼ナリ

變ズルナシ此熱ハ至テ頑痼ナリ

二進前間歇熱次ノ發作ハ前ノ發作ニ比ス
 レバ其始マルノ時刻毎ニ早キ一幾許時ナ
 ル者ヲ云フ此熱ハ動スレバ暫留熱ニ變ズ
 註其發作大ニ進前スルトキハ前ノ發作未
 止マザルニ後ノ發作已ニ繼ギ起ル者アリ
 三却行間歇熱次ノ發作ハ前ノ發作ニ比ス
 レバ其始マルノ時刻遲キ一幾時ナル者ヲ
 云フ

下不正間歇熱此熱ハ少モ發作ノ定期アル一ナ
 ク意外ニ發スル者ヲ云フナリ

坤暗間歇熱○此熱ハ三時限ノ中一限甚幽微ニシ

テ覺ルベカラザルアリ或ハ一限全ク闕ル者アリ
 リテ太凡。三時限ノ分明ナラザル者ヲ云フ太約
 此証ハ本熱ノ初發ノ際ニ發ス或ハ三時限先後
 顛倒スル一アリ倒發間歇熱ト名ク或ハ其發作
 異常暴劇ノ病狀ヲ見ハス者アリ然レ尚微ナル
 戰慄熱灼尿中赤土様渣脚等ノ如キ間歇熱ノ蹤
 跡ヲ顯ハス一屢コレアリ之名ケテ兼攝間歇熱
 ト云フ或ハ其發作唯劇烈ノ一證ヲ發メ少モ熱
 性ノ證候ヲ見ハサマル者アリ之ヲ變形間歇熱

ト名ク此熱ハ鑒識スルノ最難ク危篤モ亦隨テ甚ジ但其證ニ發歇ノ定期アリ且同時ニ間歇熱流行シ尿中渣脚アリ幾那驗ヲ奏スル等アルヲ以テ其間歇熱タルヲ考證スルノ一助トナルナリ

其變形間歇熱ノ最危篤ナル諸證ハ昏睡卒仆癱眩暈瘧播顛癩強直瞽盲腦焮衝頭痛齒痛脇痛肺焮衝咯血喘息吃逆胃瘕疝裡急後重痢霍亂嘔吐脾痛腎痛^レ僂^レ麻質斯疼痛溶渙ノ汗^熱僵凍等ノ如キ是ナリ

太約此諸證ハ至テ峻逆ナル者多シ而ノ屢不意

ニ發見ス故ニ此種ノ熱ハ又敗亡間歇熱ト名ク

第二病ノ本性此別最醫治ニ切當ナリニ据テ區別スレバ

一焮衝様 二腸胃様 三索蒲爾刺列様 四膽液様 五粘液様

一神經様 四腐敗様 五惡性様ナリ○此熱モ亦此ノ

如ク替留熱ニ同シキ本性ヲ有ス故ニ又彼ガ如

ク純雜ノ證アルナリ譬バ膽液様間歇熱ハ屢焮

衝様若クハ腐敗様ノ性ヲ合スルガ如シ

第三此熱ノ行ハル、景況ヲ以テ之ヲ分テバ

一流行 二土病土地卑濕ニノ止水或ハ腐穢ノ物其地ヲ圍繞シ或ハ浩濤大波ノ衝ニ當

一ル地方等
ニ流行ス
三傳涼間歇熱等是ナリ

第四 歲序ニ隨テ之ヲ分テバ

一 歲首熱 二 歲秒熱 ナリ 其歲秒熱ハ頑痼ナリ

原由

素質間歇熱ヲ受ル一種ノ素質ハ蓋確定ノ之ヲ言ヒ

難ニ然レ之ヲ事實ニ參驗スルニ男女ヲ問ハズ老幼

ヲ擇バズ時アツテ身ニ不可ノ感觸ヲ得ル寸ハ乃間

歇熱ヲ病ミ易ク又他時ニ在テハ之ヲ得ルモ必病ヲ

成サズ ○千八百十三年布刺臥地名ニ于テ間歇熱大ニ

流行ス其後九年ノ間ハ街市村落皆之ニ罹ル稀ナ

リ以テ徵スベシ ○其餘纖維縱緩シ若クハ惡液家腹

中諸臟壅塞アル人既ニ屢間歇熱ヲ病ム者等ハ此病

ニ嬰リ易キ一種質ヲ有スル者トス

發因 一種濕濡ニメ寒溫驟變ズル天氣殊ニ此天氣ヲ

春秋ノ時節ニ得ル者ハ最甚ニ一切濕濡ノ大氣裡ニ

就テ其氣汚穢ヲ挾ミ寒氣ヲ感冒シ消化ニ難ク或ハ

配伍宜キヲ失フ食物ヲ喫シ腐水ヲ飲ミ下劑ヲ長服

ニ意思ヲ勞動ニ尋常ノ排除機痔血 衄血 經水ヲ阻

遏シ皮疹ヲ内攻セシムル等ハ皆此熱病ヲ啓發スル

ノ因ナリ

轉歸

復於平康或ハ發作或燼ヲ得ル後醫治ノ力ヲ假ラス
 ヲ自カラ康平ヲ致スアリ然氏特ニ醫治ノ力ニ由テ
 健康ニ歸スル者毎ニ多シ○太約此熱ハ再發シ易シ
 間日熱ハ最後ノ發作ノ後第七日ニ再發シ日發熱ハ
 其第十四日ニ再發スルト多シ
 變於他病別様ノ發作ハ間日熱ヨリ日發熱ニ轉シ或
 正變ノ不正間歇熱トナル
ガ如ヲ爲ス間歇熱ニ變ジ替留熱ニ轉ジ最善ク粘液
 熱神經熱遷延熱等ニ變ズ其進前スルト甚キ者ハ殊
 ニ上ノ諸熱ニ轉歸シ易シ又熱ヲ遏止スルト太早ク

若クハ太遲キ寸ハ肝脾腫脹又熱塊ト云ノ○漢ノ如
 人ノ所謂瘧母ナリ
 キ無熱諸病ニ變ズ又水腫黃疸消耗病失苟兒陪苦痛
 風處女病脾病發狂等ニ變ズルトアリ
 歸於死亡惡寒甚劇クメ死ニ至ルハ間之アリト雖氏
 太約明間歇熱發作ノ間ニ方テ死スル者ハ極メテ稀
 ナリトス但兼攝若クハ變形間歇熱ニ於テハ發作ノ
 間窒息聖シ京ヤシ屈グ或ハ卒仆ヲ發メ死スルト屢ナリ敗亡
 名
アルハ是○太略他病ヲ續發メ終ニ此不幸ノ末路ニ
 轉歸スル者毎ニ多シ
 預後

間歇熱ノ輕クノ定叙アル者ニ在テハ不幸ナル者稀ナリ
其吉候ハ發作次第ニ輕ク唇上ニ瘡疹ヲ發シ發作ノ時刻却行スル等是ナリ○歲首熱ハ七發ノ後自ラ消シ去ルヲ多シ
三日熱歲秒熱ハ皆頑癩ナリ土病ノ間歇熱ハ最頑癩トス又少モ時ヲ違ヘズ發作スル者モ亦然リ
老人小兒姪婦惡液家ハ此熱ヲ得ル寸ハ危シ
嶮重ノ諸證ヲ兼攝スル者及ビ變形間歇熱ハ至テ嶮逆ニノ動スレバ之ガ爲ニ命ヲ殞ス一アリ故ニ此證

ヲ診スル者ハ速ニ其證タルヲ斷決スルヲ醫家喫緊ノ要務トス
然レ間歇熱ノ實ニ人身ニ益利アルヲモ亦少カラズ
譬バ諸藥寸效ナキ諸病間歇熱ヲ得テ却テ自ラ除キ去ルヲアルナリ
治法
間歇熱ヲ治スルハ他病ノ如ク先其發因ヲ除クヲ要ス應シ○之ヲ爲ント欲スル者ハ先體中ニ殘滯スル惡毒ヲ除キ去リ身體ヲ寒冷ニスル要件ト濕濡汚穢ノ住處トヲ謹ミ避クベシ

然^レ正病已ニ其因ヲ除キ去ル^レ能ハザルニ至ル者毎
ニ多シ此ノ如キ者ハ後ノ三治綱ヲ行フ可シ其一整
正間歇熱ハ其發作ノ數已^ニ幾何ナルヲ考索シ其本熱
ノ情狀ヲ照メ之ヲ治ス應^シ其二本熱ニ兼攝スル局
處ノ疾患ヲ精細ニ查勘スベシ其三惡性兼攝變形ノ
間歇熱ハ各之^ニ兼發スル證候ノ危篤ノ度ニ應^メ勉
テ速^カニ其發作ヲ遏ムベシ
凡^レ此病ハ他ノ時日ヲ刻メ發止スル諸病ノ如ク二道
ノ治法アリ甲ハ發作ノ間乙ハ發作ノ外是ナリ
發作ノ間其整正間歇熱ハ其發作ニ備^ラ虞スルノ方法

ヲ行フヲ以テ足^レリトス例スルニ其發作ノ前ハ食
ス可カラズ惡寒ノ時限ハ過不及ナク溫煖ニ被覆シ
四肢ヲ溫メ床中ニ靜養スベシ渴アル者ハ加密^カ列^レ花
菩提樹花^ノ點^ノ栗^ノ薩^ノ葉^ノ淡泡ヲ與フ發熱ノ時限ハ衣被
ヲ減ジ清涼酸爽ノ飲料ニ宜シ發汗ノ時限ハ再^レ衣被
ヲ厚クシ微溫湯ヲ與ヘ謹慎メ發作全ク止^ムヲ待チ汗
後ハ襯衣ヲ更ルヲ佳ナリトス
然^レ正^レ焮衝ノ狀太盛ナル者ハタゞ消焮飲料及ビ導洩
法[○]刺[○]絡[○]ヲ行フ可シ○其焮衝太劇ク焮衝狀ノ頭痛
狂躁ノ譫妄心神昏憤肺焮衝ヲ兼子殊ニ其人多血ニ

ノ卒仆若クハ略血ヲ發シ易キ者。一時流行ノ疫皆燉
衝様ヲ挾ム等ノ數項アラバ瀉血但大謹慎ヲ加テ施
スベシ但之ヲ行フ
當者稀ナリヲ行フ宜シ

發作。眞虛脫及ビ神經狀ヲ以テ始マル者ハ發作ノ間
モ亦芫菁膏及ビ升提法ヲ用フ可シ

發作終テ間歇ノ時ニ方ハ熱ノ本性ニ隨テ適當ノ治
法ヲ行フ可シ故ニ燉衝性ノ者ハ消燉方法。神經性ニ

ハ升提法ヲ行フ可キナリ
我邦ノ間歇熱ハ太略。腸胃ノ性索蒲爾刺列
膽液粘液ヲ兼ル

十ノ七八ニ居ル是ヲ以テ初發ハ稀釋治法。裡ニ就テ

蒲公英。失格列乙。濱瞿麥。硃沙其他ノ中和鹽。少量ノ韃

爾答越默窒ヲ用ヒテ的當スル者極テ多シ○汚物已

ニ此藥ニ由テ稀開ニ次テ其毒或ハ上湧ニ或ハ下走

スルノ勢ヲ察シ宜ニ隨テ吐下ノ劑ヲ用フ可シ○吐

劑ヲ免熱時ニ用フル寸ハ腸胃内ノ穢毒ヲ泄除スル

ノミナラス内臟ヲ振蕩シ且神經ノ運動ヲ變革スル

ヲ以テ大ニ此病ニ偉効アリ○下劑ハ大熱大渴。腸胃

中ノ穢毒。下走スルノ勢アル者等ニ用フ應シ然ドモ

此藥ハ謹慎ノ之ヲ施スヲ要ス若シ不時ニ之ヲ用フ

レバ太約。間歇熱ヲメ頑痼ニ進マシメ易ク且病勢減

之若クハ愈ントスルノ時之ヲ行フ寸ハ再發ヲ媒起
 シ易シ
 上法ニ因テ已ニ穢毒ヲ泄除シテ後病人ノ素質惡性
 ナラズ熱ノ經過整正ナル者ニ於テハ第五七發或ハ
 症ニ隨テ第九發ニ至ルマデハ熱ヲ截絶スルノ治法
 ヲ行フベカラズ何トナレバ此五七九ノ發作ハ良能
 ノ吉里濟ノ期ナルガ故ナリ此際ニ唇邊ニ瘡疹ヲ發
一症ト雖モ毎ニ極テ佳候第九發ノ後モ發作尚正
ニメ即チ分利ノ一兆タリ第九發ノ後モ發作尚正
 ザル寸ハ熱ヲ過絶スルノ治法ヲ下スニ宜シ
 其熱ヲ過絶スルガ爲ニハ身驗躬試ノ間歇熱ヲ治ス

ルニ的當シ世醫ノ通知スル方藥ヲ用フ可シ○其藥
 ノ最ナル者ハ

- 一ハ香竄苦味藥。水楊梅。加密列。菖蒲。睡菜。珊多里。橙皮。
- 紫堇。亞爾鮮。健質亞那。
- 二ハ収瀋藥。七葉樹皮。楊皮。檳皮。
- 三ハ變革藥。乙百葛。格亞那根。亞爾尼加花。金硫黃。
- 四ハ麻藥。裡ニ就テ阿芙蓉ヲ其最トス。痙攣。抽掣。神經
 狀ノ昏冒強直。大吐。瀉下。霍亂等ノ如キ兼攝危峻ノ証
 ニ於テハ闕ク可カラザルノ要品トス
- 五ハ間歇熱ノ發作ヲ過絶スル一種カヲ具スル藥○

質増進スル状ヲ見ハシ發作久フメ治セザル諸證等
 是ナリ
 間歇熱ヲ患フルノ人ハ腹中諸藏ノ壅塞ヲ兼ル者甚
 多シ此證三種ノ別アリ其一ハ間歇熱ヲ得ザル前腹
 中已ニ壅塞アル者此證ハ太略熱ヲモ荏苒持久セシ
 ム其二ハ壅塞間歇熱ノ發作ヲ過絶スルヲ太早キニ
 過クルヨリ發スル者其三ハ熱久ク留著メ去ザルヨ
 リシテ壅塞ヲ生ズ○其一ニハ證ハ先壅塞ヲ治スル
 方法ヲ行フベシ而頗ル竄透稀釋スル藥ヲ久服メ後
 幾那ヲ與フルヲ妙トス○其第三證ハ熱ヨリ續發ス

ル所ニメ熱治ストバ壅塞モ亦隨テ去ル故ニ幾那ヲ
 用フルヲ最大嚟緊トス
 不正及倒發間歇熱ハ之ヲメ務メテ整正間歇熱ニ變
 ゼシムルヲ要ズ稀釋苦味ノ藥ニ硝沙ヲ伍シ用フレ
 バ太約効アリ次叙已ニ整フノ後ハ整正間歇熱ノ如
 ク之ヲ療ズルニ宜シトス
 頑痼ノ間歇熱ハ病者居住ノ地大氣ノ性質或ハ家政
 活計ノ萬件等其宜キヲ失フヲアルニ本ッキ生ズル者
 多シ故ニ此等數項ノ事件ヲ改革シ病人ノ意思ヲ調
 適シテ大ニ効ヲ奏スルヲアリ又發作ニ先ヅク一霎

時ニメ吐藥ヲ行ヒ大ニ神經ノ作用ヲ變革シテ奇効
 アルト極テ多シ（此ノ事ハ）惡性兼攝變形ノ間歇熱ハ諸症極テ峻逆ナルヲ以テ
 直ニ次ノ發作ヲ遏絶スベキ者多シ設使其發作ヲ遏
 絶セザレバ危困極テ劇ク其更ニ甚キ者ハ終ニ之ガ
 爲ニ生命ヲ殞スニ至ルヲ以ナリ○此種ノ間歇熱ニ
 發スル所ノ諸症ハ各一病ト見テ之ヲ療ズベシ故其
 發作ノ時直ニ急速ニ之ヲ救治スルノ法方ヲ施スヲ
 緊要トス譬バ僵凍ノ惡寒ハ局處ヲ溫暖シ昏暈ニハ
 升提法ヲ施シ大吐泄瀉ニハ定靜藥阿芙蓉疼痛ニハ緩

和劑。卒仆。咯血。肺燉衝ニハ刺絡導泄法○發泡。蟻。鐵。皮。法。脚湯等

膚ノ衝動方○芥子泥ヲ用フルガ如シ○發作已ニ終ラバ

勉テ速ニ原由ヲ除キ去ルヲ要ス若其因ヲ除キ去ル

ヲ能ハザル者ハ的當ノ用法ニテ幾那ニ芳香藥ヲ伍

シテ多量ニ之ヲ服シメ以テ次ノ發作ヲ遏止スルノ

外生命ヲ救フノ術ナシトス故ニ間歇熱ノ此性○惡性兼

攝變形ノタルヲ診定シテ疑ナキヲ證セバ直ニ幾那

ノ量ヲ加倍ノ用フベシ其或ハ病人ニ害アラントラ

懼レテ遲疑スルト勿レ○幾那煎ニ幾那細末芳香藥

等ヲ伍シ或ハ證ニ隨テ阿芙蓉ヲ伍シテ之ヲ服セシ

へズ故ヲ以テ本月廿五日。病院に詣ル。○頭痛。不食。一
 身勞倦ス。○舌白胎アリ。口味酸ニシテ噫氣アリ。胸上箱
 頓スル方如ク胃部墜重。大便日ニ通シ小便淡黃。皮温
 及ビ脉略常ノ如シ。○肉食ニ難シ。○心腹ニ大
 處方 蘆根一考 煎ト爲シ濾過ヲ入テ取リ後件ヲ加フ
 飲料ニハ大麥煎ニ泡甘艸ヲ加フ發作ノ間ハ加密列
 茶ヲ服セシム

廿六日第六日 ○熱。晡後申牌ニ再發ス其劇勢前ノ如ク

次叙モ亦前ノ如クニシテ留連スル一時許○發作間。發
 作後。惡心。酸噫。吐セシト欲ス○其明朝後方ヲ與テ

乙百葛格亞那根末十二分 韃而答越默窒半分

右調勻ノ涌吐ノ散藥ト爲シ一次ニ頓服セシム

病人大ニ酸臭ノ物ヲ嘔ス其大半ハ食物ヲ混ス吐後

徑ニ大ニ寬輕ヲ覺ス

廿七日第七日 ○常時ヲ以テ發作ス廿八日。廿九日。卅日。

卅一日皆同シ○蒲公英根煎ニ礶沙ヲ加ヘ與テ熱去

九寸ハ身和適ノ他患ナシ舌淨久口味常ノ如ク大便
日、去利シ小便色淡黄ハマ發熱ニ廿八日廿九日代其
本月卅一日後方ヲ處ス大便日ニ通シ小便淡黄ハ
赤入 珊篤里穗 ニク 赤入其大半ハ食味ニ苦ス如
處方 瀉湯 煎泡シ濾過ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

精製礪沙 半ク

四月朔至五日○日、ニ發作ス但其發作太輕クノ留連
半舌尚胎アリ口味常ノ如ク食氣復シ小便渣脚アリ
大便常ノ如ク
處方 煎泡シ濾過ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

幾那 ニク

煎ト爲シ此藥汁ヲ以テ後味ヲ泡ス

菖蒲根 ニク

濾過シ換リ八弓ヲ取り與へ服セシム

六日 第十 七日 ○發作ノ時少ク振戦ニ微ニ發熱シ汗出ヅ

ル一少シ尿尚渣脚アリ

七日至九日 ○發作ノ形影アリ十日全ク解シ去ル○

體氣復和ニ違フ一ナシ ○是ニ於テ後方ヲ處ス

水楊梅根 三ク

滾湯泡出シ濾ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

精製硝沙 十五氏

麻爾羅歌粵幾斯 二乃

此方ヲ連用ノ十四日ニ至リ又後方ヲ更へ與フ

加密列 二乃

泡ノ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

健胃丁幾 三乃

此藥ヲ連用ノ病全ク痊ユ其再發ヲ慮ル時日モ亦恙
ナク過グ廿五日其主家ニ返リ仕フ

産婦日發熱治驗

一侍婢廿歲其容ヲ望ムニ惡液狀ニシテ體稟偏倚セズ

十九歲ニシテ妊娠ス臨月ニ至ルマデ體氣違和スル

ナシ分娩前八日故ナフメ大惡寒ヲ得ル一時許ニ

シテ發熱汗出ヅ○發作止テ後一身少ク怠懈ヲ覺フル

ノ外別ニ患フル所ナシ○爾後日晡後申牌ゴトニ必

ラズ發熱シ大汗出テ解ス

已ニシテ輕ク分娩ス後其熱復發作ス○此ノ如クナル

一四週ニシテ少モ輕解セザルヲ以テ五月廿日病院ニ

來ル

頭部患ル所ナク舌白胎口苦ク不食稍渴シ心下壓ガ

如ク大便日ニ通ズ小便攪混シタル膠水ノ如シ脉微

少數ニシヤ、カアリ野鬚、
 處方 荊芥、薄荷、白芷、口苦、不食、
 蒲公英根 一弓
 煎、濾過、八弓ヲ取り後味ヲ加フ日、
 精製硃砂 十二分
 白糖 二弓
 飲料ニハ大麥煎ニ屋施、
 廿一日 ○申牌發作、惡寒スル、
 一時、
 廿二日、廿三日、廿四日、次叙初ノ如ク日、
 發作ス舌尚

胎アリ口味常ノ如ク食氣生ジ腹中患フル所ナク大
 便日ニ通ス
 處方

黃幾那 半弓

煎ノ絞リ濾シテ八弓ヲ取り服セシム
 後二日ノ間前方ヲ行ハ發作前ニ比スレバ輕緩ヲ爲
 シ廿七日全ク止ム舌胎去リ食氣旺盛シ一身病ム所
 ナシ ○是ニ於テ後方ヲ投ス

菖蒲根 二弓

滾湯ヲ以テ泡シ濾シ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

醫藥正始 卷之十一 三三

精製礪沙

茴香糖油

此藥ヲ服スル一更ニ一二日。體氣全ク故ニ復シ六月

四日。病院ヲ去ル

間日熱治驗

一侍婢。廿歲。體氣強固ナリ身ヲ熱メ後冷乳ヲ服シ俄

ニ惡寒。大渴發熱ニ續テ汗出デ解メ後體氣略和適ス

唯一身懈惰不食スルノミ

熱數發ニメ其勢倍熾ニ必ラズ一日ヲ間テ同時刻ニ

發作ス○千八百十三年五月廿四日。病院ニ詣ル其翌

朝卯牌發作ヲ得タリ大惡寒止ザル一小時許リ次テ

發熱。渾身汗出デ大渴頭痛ス舌上白胎口苦ク噫氣胸

悶。食ヲ惡ミ胃部妨滿之ヲ按スレバ痛ム大便難小便

黯黑。脉收縮ノ數

處方

蘆根

蒲公英根

煎ト爲シ濾メ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

孕礬酒石

韃而答越默室

失格列乙舍利別加大黃 半弓

飲料ニハ大麥煎ニ泡甘艸ヲ加フ發作ノ間ハ加密列

茶淹劑煎ニハ...

宵ニ至テ惡心胸悶盛ニノ嘔吐セント欲スルヲ以テ

後方ヲ作り明朝之ヲ服セ...

乙百葛格亞那根 十五氏

韃而答越默室 一氏

右調停ノ涌吐ノ散劑ト爲シ一次ニ頓服セシム吐

ヲ發スル寸淡泡微温ノ加密列花茶ヲ服セシム

病人吐スルヲ三次大ニ苦味粘滑ノ物ヲ嘔出ス吐後

徑ニ快暢ヲ覺フ

廿六日 第十日 ○夜中熟寐シ頭快爽舌ノ兩邊及ビ尖端

淨ク口復苦カラズ胃部ノ妨滿去リ大便一次小便赤

キ澱脚アリ下唇ニ水泡狀ノ瘡疹ヲ發ス

處方

蒲公英根

失格列乙根 各一弓

煎ニ濾シテハ弓ヲ取り後件ヲ加フ

廿六 大黃水製丁幾 一弓

廿七 失格列乙舍利別加大黃 半弓

廿七日第一日 ○卯刻第六回ノ發作ヲ得タリ但太輕ニ
廿九日モ同刻又發ス ○病人其發作ノ寸服シタル羹
湯ヲ吐ス余ハ惡候ナク舌倍淨ク口味常ノ如シ食氣
復ノ大便平日ノ如ク通ス

處方

水楊梅根

加密列花

滾湯泡出シ濾シ

睡菜粵幾斯

精製硃沙

各二刀
各二刀
一刀

蘆根粵幾斯

飲料ニハ過泥子泡方

卅一日 ○此日ハ發作ノ日ナリ卯半刻纔ニ微戰シ熱
至テ輕ク汗少ク出ヅルノミ ○熱消スル後體氣和暢

處方

黃幾那末

白桂皮末

乾姜末

右調勻シ八裏ニ分チ一時ゴトニ一服

六月二日○今日少シモ發熱ナシ病人患ル所ナク食氣
 旺シ大便日ニ通ズ○散藥ヲ行フ故ノ如シ
 三日○體氣少シモ不豫ナシ○此人家事ノ已ムヲ得ザ
 ルヲアツテ固ク病院ヲ辭シ去ルヲ求ム忌口攝生
 ヲ悞ル可カラザルヲ告諭シ許メ家ニ返ラシム○熱
 再發スルヲナク康平ヲ致ス

醫療正始卷之十一 畢

