

醫療正始

附醫院類案

十二

松
科別

X
1101

F
イ-133

492
Tr
8

No. 2229
四月一日



富士川文庫

2663

醫療正始卷之十二

獨乙

昆斯骨夫

著

蜘蛛赤根蠍小木ノ郎和蘭

漢越而實幾

譯

誠ハ良蟲蟲之蟲類蒸西肥

伊東淵玄朴

重譯

拿蟲等蟲ハ人體等之蟲類。如。如。如。如。如。如。如。如。

如。如。如。如。如。如。如。如。

如。如。如。如。如。如。如。如。

間歇熱類案第二

吉田黃郎

ニヒ断コロ苦々大歎不

貪索浦爾刺列熱變爲間歇熱治驗

不尋不尋不尋不尋不

不尋不尋不尋不尋不

一市人人女十八歲體資略強壯無病

○一日重キヲ扛

八ニ由テ薦骨上疼痛ヲ覺エ其痛亦自消散ス次ニテ惡

寒戰慄え得皮溫大ニ增劇シ遂ニ床ニ臥ス

○已ニメ

新ニ燒タル白蒸餅ヲ喫病勢倍盛ナリ○一相識一婦人ノ製シタル丸藥ヲ與フ之ヲ服メ大ニ吐瀉シ病人愈衰弱ス千八百二十一年六月六日第六病院ニ歸ス頭鈍痛甚ク耳鳴リ目火光ヲ見ル下唇ニ瘡疹ヲ發シ已ニ乾テ痂ヲ結ブ舌汚黃胎ニノ潤ヒ口苦ク大渴不食。胸部患フル所ナク微咳。腹軟。胃部ヲ按スレバ少シ痛ム身溫盛ニ肌腠蒸氣ヲ發ス昨日以來下利四行。小便黯赤脉數小ニノ弱

處方

沙列布煎十八弓

精製硝沙十五氏

白糖二勺

飲料ニハ沙列布煎沙列布ニ刃ヲ以テ煎汁ニ比テ製スル者

七日第七日○夜間夢多クノ安カラス眠リ少ナシ頭痛耳鳴止マズ大便溏瀉一次餘ハ昨日ニ同シ○處方前

ニ依ル

宵ニ向テ其熱發作ス即チ熱灼增シ頭痛強ク大ニ煩渴シ脉疾。小便黯色ナル等其發作タルノ徵ナリ但夜中ニ至テ其熱再ビ減ジ病人睡ル一ニ時八日第八日○朝來頗快シ頭痛輕ク耳鳴減ズ舌尚胎ア

リ口苦ク腹痛ナシニ日以來大便セズ○尿中大ニ薔薇色ノ赤濁ヲ生ジ色渾濁ノ瑩晶ナラズ病者ノ容貌ヲ望ムニ頗快暢ス脉稍數ニメ盛ナリ

處方

蘆根煎 八弓

精製硝沙 十二瓦

蘆根粵幾斯 半弓

九日第九 ○夜間安眠ス翌朝頭痛太微。舌倍淨ク口味常ノ如ク食氣復ス大便一行。小便許多ノ濶脚アリテ其上面ハ澄澈ス脉唯少シク平脉ト異ナルノミ○此狀ヲ

得ルト三日ニメ熱氣除キ食氣倍旺シ軟便日ニ通ズ十三日病狀全ク變化ス○辰刻大惡寒ヲ得。次デ口渴頭痛發熱シ遂ニ渾身汗出デ一身勞倦シ舌微ク胎アリ。小便赤クメ渾濁。脉縮小ノ緊ヲ帶ズ○發作留連。午後未刻ニ至ル其熱解メ後快爽他證ナシ○細ニ其故ヲ詢ニ其發因ヲ得ルトナシ

處方

十四加密列花 半弓

水楊梅根 各二勺

滾湯泡出シ濾テ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

精製硝沙

一刃

蒲公英粵幾斯

半弓

十四日○病者住適脉ニ熱狀ナシ

昨日發スル所ノ熱ハ間歇熱タルト疑ナシ但其時期未分明ナラザルノミ

十五日○此曉寅刻ニ發作入其勢前ニ同シ留連スル一時此ノ如キ間歇熱病將ニ瘥ントスル時ニ發スル者ハ動スレバ頑性ヲ爲シ易ク若其熱進前スル寸ハ遂ニ誓留熱ニ變ズル懼アリ且之ヲ啓發スル所以ノ本因分明ナラザルヲ以テ勉メテ速ニ其發作ヲ抑

過スルヲ要ス可シ○是ヲ以テ後方ヲ行フ

幾那細末
十五氏

菖蒲根末

十五氏

茴香精油
各五氏

十調勻散藥ト爲シ六裏ニ分ツ發作ナキ時ヲ候テ一

時ゴトニ一服ス

十六日○免熱日

十七日○發作。丑半時ヨリ始マリ留連スルト一時

十八日○免熱日其藥方外和之處

處方幾服

卷之十二

卷之十二

卷之十二

幾那

半弓

十八日煎ト爲シ其藥汁ヲ以テ後味ヲ泡ス

廿九日葛蒲根二弓

濾過メ八弓ヲ取り復後味ヲ加フ

橙皮舍利別半弓

十九日○發作夜中子時ヨリ始マリ留連四分時
廿日○免熱日○病人大ニ咳シ胸中苦悶ヲ覺フ
處方上方ハ外菲阿沙密粵幾斯半氏ノ散藥ヲ製シ
八分時ゴトニ一服ヲ與フ

廿一日○前夜亥刻殘餘ノ寒熱僅ニ發作スルノミ小

便赤土様ノ渣脚アリ○方藥前ニ仍ル
廿二日○乾咳倍強ク且胸中ノ患苦甚ギヲ以テ幾那
ヲ停メザル可カラズ
處方

剝禮尾樂亞麻刺

三弓

甘艸膏

半弓

水煎シテ藥汁八弓ヲ製シ後味ヲ加フ

廿三日○發作止ム○病人尚前方ヲ服スルト一二日

咳嗽胸中ノ疾患消ス熱復發動セバ廿六日病院ヲ辭
シ去ル間日發作止ム

重複間日熱兼肝胃熾衝遂變爲僵凍之惡寒治驗

一侍婢天資略健全年紀廿五歲冷肉ヲ喫スル後胃部
痞重ヲ覺フ○已ニメ食ヲ惡々口苦等ノ證ヲ加ヘ次
デ發熱シ終リニ汗出ヅ○口大渴。大頭痛。恶心嘔吐。
然レニ諸證靜止スレバ百事ヲ操作メ妨ダル所ナシ○
但此諸證毎宵發動シ靜止スレバ復太苦ム所ナシ
一醫吐方ヲ行フ效アラズ下劑ヲ投ス亦驗ナシ○此
ノ如クニメ纏綿治セザル。八日病勢倍峻惡ニ進ム
ガ故ニ十八百十三年六月朔病ノ第九日ヲ以テ病院
ニ歸ス○頭痛止ム時ナク恶心溫々吐セント欲シ舌

黃胎。口苦ク大渴。肝部刺痛。之ヲ按スレバ倍甚ク深息
シ難シ○疼痛右胛ニ擊テ痛ニ右ノ手足麻痺ス○大
便秘結ニ小便黒色ニノ濁。脉疾緊ニノ暢ビズ
處方

三日蘆根 一弓

川芎 答麻林度 六弓

麻仁煎ト爲シ濾メ八弓ヲ取リ後味ヲ加ス
久慈屋施萬兒 一弓

飲料ニハ大麥煎ニ酒石酸ヲ加フ
緩和琶布ヲ肝部ニ帖シ緩和吉利詞爹兒ヲ行フ

二日第十一○前夜亥半刻大惡寒ヲ得。留連スルト一時
煩渴。頭痛甚^レ續テ發熱。汗出解ス○翌朝辰刻。新ニ
又惡寒シ次デ發熱汗出^ズ○肝脾ノ部位刺痛シ左臂
麻痹ス○大便通ゼ。又脉疾ニノ緊^ト帶^ブ上方ニ瓦老^{ガラシ}
別里鹽ニ弓ヲ加ヘ緩和吉利詞爹兒^{テル}ヲ行フ

三日第十二○熱ノ發作前夜ト同時ニ始マリ惡心止マ
ズ一切飲食スル所ノ物ヲ吐ス○胃部燒^クが如ク煥痛
シ其痛一處ニ留テ移ラズ手少^シク之ニ觸ルモ亦痛ミ
吐逆止マズ毎吐痛ヲ兼^キル等甚^シ。嶮惡ノ症狀タリ脉發
作ナキ時ト雖^ニ亦緊ニノ伏シ面貌一種痛楚ノ状ア

リ○蓋此證。肝ノ左葉煥衝シ其勢延テ胃ニ及ビ胃モ
亦共ニ煥衝ヲ得ルト知ル可キナリ

刺絡メ血ヲ瀉スルトハ弓後方ヲ行フ

甘扁桃

半弓

之ヲ以テ乳劑八弓ヲ製シ後味ヲ加フ

亞刺比亞謨漿

遏爾託舍利別

各半弓

肝胃ノ部ニ緩和蒸劑ヲ施シ緩和吉利詞爹兒^{テル}ヲ行フ
恶心嘔吐速ニ消散シ頭痛及ビ胃部燒^クガ如キ證減ジ
手之ニ觸ルト雖^ニ復耐フ可シ○刺絡ノ血焫皮ヲ結

四日第十一〇卯時再發作アリ翌日五ハ丑時其明日六
ハ復卵時ニ發ス〇熱發作スル間ハ肝部ニ壓迫ヲ覺
エニ刺痛ヲ兼子病人之ガ爲ニ苦楚ヲ覺フ〇大便
難小便黯色渣脚ナシ〇腸胃ノ病狀ヲ得ルヲ以テ六
日後方ヲ用フ

蒲公英根

失格列乙根

各六勺

煎メハ弓ヲ取リ後藥ヲ加フ

霸王鹽

失格列乙加大黃舍利別

各半弓

午前ヨリ未時ニ至テ病人昏暈ヲ覺ヘ頻ニ欠伸ス諸
證去レバ復他患ナシ

七日第十二〇前夜丑時熱發作ス其際屢腐臭ノ噫氣ヲ
發シ肝脾ノ部刺痛ス〇晝間腹大ニ脹滿ノ遂ニ夥シク
綠色苦味ハ粘物ヲ吐出ス肝部ノ感觸其吐逆ノ努力
ニ由テ歟衝ニ變ゼンヲ懼ル、ガ故ニ後方ヲ處ス

麻僵涅失亞マグネシア十氏

酒石酸五氏

調勻散藥ト爲シ六裏ニ分チ二時毎ニ一服ス
諸證速ニ消散ス此時正ニ免熱時ニ在リ

八日第十六日○熱。卯時ニ發作ス○此病重複ノ間歇熱夕ルト明カナリ此晝黃綠苦味ノ液ヲ吐ス中ニ乾酪状ノ塊片及ビ消化セザル膜様ノ肉ヲ交フ
九日第十七日○丑半牌。熱發作シ復乾嘔ス脣脹ノ知覺頗過敏。大便秘ス○腸ノ煥衝ヲ媒發シ易キヲ以テ後方ヲ行フ
發アラニ遏爾託根ハラ半弓ハラ
ソ日正煎メ其藥汁ニ後味ヲ溶化ス
鬱去滿那マシナ半弓ハラ

子前濾過メハ弓ヲ取り聴用ス

十日第十八日○辰時發作アリ惡寒ノ勢甚熾ニノ一身振ハトメ戰栗ス留連スルト半時許

十一日第十九日○前夜安眠ノ後朝辰時ニ及デ發作ノ大惡寒ヲ得タリ其狀誠ニ僵凍ト名ク應シ心神全ク昏憤ノ人事ヲ省セズ眼瞪シ瞳孔縮張セズ諸肢節強直大便失禁。一身石冷脉厥絶ス
香竄ノ洗方ヲ行ヒ毛布ヲ以テ強ク體上ヲ摩擦シ加密列ノ溫濃泡ニ忽弗滿鎮痛液ヲ加ヘ嚥下シ難シト雖氏強テ口内ニ灌グ此諸方法ヲ施ス一四分時ノ後生機初テ復動クヲ覺フ此狀實ニ大危篤タリ發作止。

デ後病人脱然トメ疲レ臥ス○此ノ如キ大發作再ビ
來ラバ必死ノ懼アリ故ニ發作ヲ緊シク阻遏ノ必發
スルヲ莫ラシムルハ施治ノ緊要タリ○是ニ於テ後
方ヲ投メ之ヲ服セシムニ以テ病氣轉止其舉舉之
大妙赤幾那半弓

劑入煎ズル四分時ニノ濾過シ八弓ヲ取り後件
參寒ヲ加フ其細末半弓全く春
十一赤幾那細末半弓對脾氣根火益々發散ハス
桂皮末留血メ半牛根精

乾薑末火根精一良附

十日乾薑末火根精一良附

橙皮末 各半弓

茴香糖油 二勺

右善ク振蕩ノ調和シ半時ゴトニ二食ヒヲ滿抄シ
服ス

晚ニ及デ略、一劑ヲ服シ盡ス夜間モ亦前方ヲ連服セ
シム

十二日第廿〇夜中熟寐入頭痛セキ口味常ノ如ク食
氣少シ生ズ火根精ノ發作ノ來否ヲ候フ〇午前已時
半欠伸ヲ發メ唯發作ノ形影アルノミ繼デ發熱汗出
デ惡寒ナシ水幾那火根精一良附

方藥同前。但赤幾那ヲ黃幾那ニ代へ每一時ニ一服スルヲ異トス其分量ハ前ノ如ク香竈藥モ配伍スルヲ亦前ニ仍ル

十三日第廿一日及十四日。病人平和。發作ノ蹤跡ナシ食氣旺シ舌淨ク小便赤塗アリ○一時半ゴトニ上方ヲ與ヘ服セシム一快復ス○大便難

十五日第廿三日○快復ス○大便難

處方

薄荷水 四弓

珊瑚多里粵幾斯 二刀

大黃水製丁幾 一弓

甘消石精 二十滴

一時半毎ニ一食ヒヲ服ス

十七日。上方ヲ止メ後藥ヲ行フハ吸水清濁量甚々半

邏瑪加密列水 五弓

大黃水製丁幾 一弓

健胃丁幾 二弓

此藥ヲ連用スルヲ二日病全ク痊ヘ十九日辭メ家ニ返ル○一週ヲ過テ後。病院ニ來リ謝ス容姿佳適。爾後病ム所アルトナシ

備考 如此瀕死危極ノ症ニ於テ確實ニ病者ノ生命ヲ挽回スルハ幾那ノ間歇熱ニ神効アルヲ確證スル所ナリ

變形日發熱治驗

一庠生二十一歳。資性快爽。寒氣ヲ侵シ身體ヲ冷過シテ后千八百十五年二月十六日大惡寒、ヲ發シ兼テ頭痛ス。○翼朝頭痛復發スル。故ノ如ク前額最甚。シ午時ニ至テ乃チ消散ス。○此頭痛毎日同時ニ至ル。毎ニ再發シ且四肢ニ游走痛ヲ兼發シ其留連スル必一時許

本月二十六日

第十

醫校ニ來ル

○今ニ至テ頭痛仍定

時ヲ以テ發ス。舌淨ク食氣ナシ。深息スレバ胸骨ノ部疼痛捺ス。ガ如ク時々乾咳ス。大便日ニ通ジ。肌腠ノ蒸氣發洩シ皮溫過不及ナシ。脉少ク疾頗力アリ。

處方

亞爾託根煎ニ接骨木子昆設爾弗ヲ加フ

廿七日 第十
○前夜安靜翼朝辰時頭痛再發ス。○其腹ヲ診スルニ肝部ヲ按スレバ知覺稍敏ナリ。餘ハ昨日

ニ同シ

處方

蘆根

答麻林度 各一弓

煎ト爲シ濾過メハ弓ヲ取り後藥ヲ加フ

廿九 精製硝沙

十五氏

接骨木子舍利別

半弓

項上ノ羌菁膏○脚湯

翼日。時ヲ同フメ又頭痛ヲ發ス小便赤ク大便通ゼザ

ルトニ二日○答麻林度ヲ去リ大黃水製^{オシキ}丁幾六弓ヲ前

方中ニ加フ

頭痛。整日定時ヲ以テ發シ發作止メバ體氣和適スル

ヲ以テ考フルニ今已ニ春節ニノ間歇熱流行スルノ時節タルトキハ此証ハ間歇熱其本相ヲ繙晦メ頭痛ヲ假裝スル者タルト必セリ○發作已ニ數次ニ及ブが故ニ次日後方ヲ行フ
幾那細末 一刀
白桂皮末
乾薑末 各三氏
調勻散ト爲シ六服ニ分チ一時毎ニ一服ス
三月二日○前夜熟寐ス○頭痛。辰時ヲ以テ發シ竟日歇マズ宵間。耳後ニ蟬針二條ヲ行フ○大便難ニメ硬

キヲ以テ散藥ヲ行フ外蘆根煎ニ大黃水製丁^{イシキ}ヲ加
ヘ與フ

三日四日○頭痛。夜ニ至テ止マズ

五日○宵間戰慄シ次デ發熱ス深夜ニ至テ全身汗出
解ス六日ノ朝。頭痛微。小便渾濁ニノ渣塗アリ○大便
通ジ難キヲ以テ瓦老^{ガラシバ}別里鹽三勺^ヲ稀釋劑中ニ加ヘ
與フ○午時ノ頃。歷々トノ熱ノ發作アリ惡寒。頭痛發
熱。汗出^ヅ發作止メバ體氣平和初ノ如シ

處方

赤幾那細末 半勺

菖蒲根末

四氏

調勻散劑ト爲シ六服ニ分チ每一時ニ一服ス

此時ヨリ以來發作止ミ食氣復ス○幾那ヲ連服メ十
五日ニ至リ病全ク瘥ヘ辭久家ニ返ル居ルト頃クニ
メ又來リ謝ス曰ク體氣續ヒテ康平。些モ病ム所ナシ
性頑三日熱兼脾臟腫大。更嬰傳染^{アハシ}扶思療^ス之^ヲ收^セ大
效治驗

一獵戶。三十六歲。體格強固。大怒ノ後。左ノ腹側疼痛シ
其處漸クニ腫脹シ手之ニ觸ルヒバ知覺敏捷ナリ然
毛病人之ヲ意卜セズ己ニノ身ヲ冷ス後。大惡寒スル

一時許ニメ發熱シ其熱熾タガ如ク終ニ汗出テ解
シ發作ノ間ハ大渴ス○是ヨリ以來。每三日午後輒徑
ニ發作ス得。留連スル一時半。少シ睡ル後乃解シ去
ル○一醫方藥ヲ劑ス少モ寬解セズ○纏綿治セザル
一七箇月。千八百十八年五月十一日病院ニ來ル
其容貌ヲ望ムニ甚惡カラズ舌上微シク胎アリ口味
常ノ如ク食機完シ左腹側大ニ腫脹シ之ヲ按スレバ
略痛ム此脾ノ腫脹ナリ大便日ニ通ジ小便瀉黃脉常
ノ如シ 大便十日六次ニ食キ每二日一解ス

處方

蘆根

蒲公英根 各一弓

煎水爲シ濾過ノハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

精製硝沙 十二氏

蘆根粵幾斯 半弓

十四日○午半牌。熱發作ス初ハ左腹側腫脹ノ處裂痛
シ延テ四肢腹背ニ及ビ是ニ繼テ微惡寒發熱シ略汗
出テ解ス○發作ノ間ハ腫脹ノ處巨大ヲ爲シ硬滿ス
ル1甚シ其部人銳敏ノ知覺增劇メ疼痛ヲ發シ手之。
ニ觸レバ殆堪少不能ハ不論也

發作留連スル太約一時半餘發作止メバ一身少シク急
懈違和ヲ覺フルノ外別證アルヲナク脉平ノ如シ
處方

蒲公英根

失格列^{シヨレ}根

各一弓

煎メ濾過シ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

精製硝沙

一刃

蒲公英粵^{エイヨウ}幾斯^{ギス}

半弓

亞麻子細末八弓。黑石鹼切片二弓ヲ以テ緩和琶布ヲ
製シ脾部ニ帖ス

其熱十七日廿日廿三日廿六日廿九日皆同時ヲ以テ
發作ス其勢ノ強弱留連ノ長短及ビ諸證候ノ劇易皆
前二同シ○左腹側ノ腫脹大ニ增長ス○下方ヲ行フ
・ 加密列^{カミル}三弓

泡淹シ濾テ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

精製硝沙

半弓

蒲公英粵^{エイヨウ}幾斯^{ギス}

三弓

又

加羅蔑兒^{カラメル}

三氏

白糖

一弓

大根二枚々薯蕷一枚白ニ主火

調匀散劑ト爲シ六貼ニ分ツ每服一貼日ニ三次

又

亞爾託膏アールト

水銀膏 各二勺

右調匀シ毎日此膏豆大ヲ取り脾部ニ摩入スル

二次

又

亞麻子末 二升

失鳩答葉末

二勺

製ハサフ芭布ト爲ス

○按ニ脾部ノ腫處ニ帖ス

六月一日○熱發作ノ初裂痛ナクソ徑ニ惡寒シ其勢甚微ナリ○日ニ汞劑ヲ服スルヲ以テ吐涎ノ兆アリ散藥及ビ摩膏ヲ停ム

病人食進マズ舌上少ク胎アリ口味惡ク免熱時ト雖旺脉感暢ノ狀アリ○左方ヲ處ス小點重斷々或輕断加密列花

菖蒲根 各二勺

其他方法前ニ仍ル

淹泡メ濾過シ八勺ヲ取り後味ヲ加フ

精製硝沙

半勺

蒲公英粵幾斯

二勺

又

金碗黃 二氏

硫黃華 十二氏

白糖 一勺

調勻散ト爲シ六貼ニ分ツ每服一貼日ニ三次
四日○頭痛不食渴甚^ダ口味汚穢。小便渾濁ノ渣滓糠
ノ如シ^ミ古土少々胡^{アリ}口和藹^モ後燒銀十錢
前方ヲ止メ後劑ヲ行フ

常水 六弓

蟬姑石

再製酒石英 各一勺

茴香糖油 二勺

右善ク振蕩ノ相得セシメ每一時ニ一食ヒヲ與フ
五日○昨日發作例ニ沿^{ヨツ}テ發セズ○前夜間。安靜ナラ
ズ頭痛加ハリ頭困頓シ苦味ノ物ヲ吐スルト三回。胸
上癰^{ツツク}頸皮溫增加シ脉ノ搏度平ニ比スレバ甚^ダ多シ
處方 項上ノ芫菁膏○其他方法。前ニ仍ル

六日○前夜間眠ラズ昏眩ノ頭痛ヲ發シ耳鳴リ少シク
譖妄ス○其朝舌上半乾キ大渴ス○大便二三次下利
ス○胸上及ビ兩臂ニ赤様平滑ノ瘡疹ヲ發^ス其狀斑

ノ如シ此證ハ目今多ク病院中ニ行ハル、傳染第扶思ニ感染スルノ致ス所タルト疑ナシ。更ニ不快處方○補充間期モ大音頻々而歎氣之甚也。其沙列布煎八弓
木龍精製硝沙十五氏
白糖ニ弓
飲料ニハ沙列布煎
八日○泄瀉止マズ前夜間譫妄眩暈シ眼采冒昧。大渴。舌胎乾涸。皮膚乾燥熱灼ス其脉數ニメ弱ヲ帶ブ赤疹全身ニ蔓延ス

處方 上方中ニ桂露六弓ヲ加フ○百葛末半氏ヲ與ヘ腓腸上ニ羌青膏ヲ帖ス

九日十日○諸證增劇シ脉沈微。皮瘡消散ス譫妄續テ止マズ精神大ニ昏沈シ耳重聽舌乾燥ノ戰振シ渴滋甚シグ下利止マズ皮膚乾燥肌熱燬クガ如シ脉略數ニ

ノ甚沈微

處方

纈艸

三弓

亞爾尼加根

ニ弓

泡出シ濾メ八弓ヲ取り後味ヲ加フ

桂靈

一弓

茴香糖油

二弓

又

乙百加格亞那末 三氏

百屈林子末 十二氏

白糖 二刃

三氏

調勻散ト爲シ六貼ニ分チ一時半毎ニ一服ス

十一日十二日○諸証前ノ如シ

處方 兩股上ノ羌菁膏

十四日○諸証ノ大勢漸々減メ景況初テ佳境ニ入ル

但泄瀉未止マズ○前夜間安静時ニ譫妄ス耳漸々聽
キ半神秀徹。舌角淨ク食氣復シ脉略數ニノ尚甚弱○
脾ノ重脹減ソ半ヲ過ク

處方 前方ヲ行フ其散藥ハ後方ニ代へ行フ

乙百葛格亞那末 半氏

淨製阿芙蓉 四分氏

白糖 十氏

調勻散ト爲シ四服ニ分チ一時半毎ニ一服ヲ與フ

食養ニハ物印斯布 ○葡萄酒ヲ加エタル肉羹汁

後三日ノ下利尚止マズ然ニ神經諸證八次第二自

ラ消散泉

○味尚苦、大熱引脾氣鬱、大渴ニ自

處方

○味甘酸、味淡々、內炎ナ

黃幾那

二弓

白煎ト爲シ此藥液ヲ以テ後件ヲ泡ス

亞爾尼加根

二弓

濾テ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

尋常鎮痛丁

幾

十

二

滴

○方未詳ナラズ他日

考證ヲ俟ツ

白糖

二弓

此藥ヲ行フ間下利少々左腹側ノ腫脹大ニ減ジ去ル廿日○快復

處方

黃幾那

半弓

依蘭苔

二弓

煎メ濾過シ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

東橙皮

丁

幾

二弓

食機旺盛ノ時ニ乘メ滋養ノ食餌ヲ行ヒ其生力ヲ培
補スル間。仍前ノ方藥ヲ連用シテ骨立柴瘦スル者頓
ニ故ニ復シ面貌鮮華豐盈ス○脾腫盡ク消シ熱全ク
去リ身體健全七月四日病院ヲ辭ス

三日、熱變爲稽留熱、治驗

一磨戸 年十九歳幼ニメ多病ナリ一日肉ヲ喫スルニ
方テ惡心ス邇後三日熱ヲ得タリ諸種ノ俗方ヲ服メ
遂ニ愈ヘザルヲ幾ド一周歲ニ及ブ○千八百十九年
十一月十五日病院ニ來ル其容色ヲ望ムニ其病ノ遷
延メ瘡ヘザルヲ見ルニ足レリ○其面萎黃瘦削目深
ク窠内ニ陥没シ狐忪青輪アリ舌少シク白胎。口味常ノ
如ク食氣乏弱。胸中病ム所オク左腹側大ニ脹脹ス此
脾ノ腫脹スル所ニメ稍強ク按スレバ痛ム大便好ク
通洩シ小便少ク常制ヲ變ジ脉モ亦然リ○前ノ發作
ハ本月十四日ナリト云フ

處方

蒲公英根

一弓

失格列し根

半弓

煎ノ濾過シハ弓ヲ取り後件ヲ加フ

膾菜粵幾斯

一弓

此藥ヲ連服シ且勉テ脾部ニ緩和琶布ヲ行フテ十七
日ニ至ル此日申半牌。發作ヲ得タリ初ハ脊背掣引シ
身ヲ伸ス頃ニメ輕ニニ戰慄シ其症脾部ヨリ始リテ
背ニ及ブ留連スルヲ半時餘ニメ熱氣次第ニ増發シ
一時許後汗出ルヲ無クメ解ス○間日ハ其狀故ノ

如シ○大便硬ニメ難ナルヲ以テ後藥ヲ行フ

青蒲公英根 一弓

煎ノ濾過シハ弓ヲ取り後味ヲ加フ

日二精製硝沙 一刃

丸藥大黃水製丁幾

蘆根粵幾斯 各半弓

廿日廿三日發作アリ其發症ノ次叙。發作ノ時刻留連ノ長短病勢ノ劇易一々前ニ全シ○其惡寒。脾部ヨリ發シ來ルト知ルベシ其部發作ノ間。疼痛增劇ス發作已ニ歇メバ其痛復耐ユベシ

大黃丁幾ヲ去リ孕鹼酒石ニ弓ヲ加フ別ニ水銀膏ニ
弗爾拔斯屈謨等分ヲ合メ軟膏ト爲シ脾部ニ摩入ス
此ニ至テ病狀乍變シ病者大ニ全身ノ疾苦ヲ覺ヘ兼テ
頭痛シ睡寐安カラズ身溫增加メ醒ル時ナク脉愈
疾ニメ緊ラ帶ブ諸證宵ニ向テ愈劇シ終夜安靜ナラ
ズ○廿六日ハ發作日ナリ此日發作ナク止尋常晚間
ノ發作○諸病太略晚間ニハ其症少アルノミ
治法前ニ仍ル○廿八日。鼻衄アリ病人一身大ニ懈惰。
心下痞重捺スガ如ク左ノ腹側甚疼ミ腫處ノ大サ故
ノ如シ頭困頓舌上半乾キ皮膚ス按スルニ甚熱シ渴

増盛セズ脉數ニメ動惕シ少シ弦妙ハ行基無シ出
處方 水楊梅根二勺鼻吸ハ頭間甚寒ニ薦處ハ大サ姑
水泡出シテ八弓ヲ取り後味ヲ加フヘシ
精製硝沙十五氏
麻爾羅歌粵幾斯官半弓ニ愈陳ヘ多安靜ナリ
此狀著シキ變化無シテ留連スルト本月三十日至
ル此日左腹側疼痛シ腫處最甚シ手之ニ觸レバ痛ニ
忍フ可カラズ皮膚乾燥熱灼シ頭中困頓滋甚シ脉緊
ニノ數

處方 鳩針四頭ヲ脾部ニ行フ

十二月一日○脾部ノ所患減ズ然ニ胸中ノ疾患增劇
ス痰中處ニ血縷ヲ交フ然ニ深息妨グル所ナク咳嗽
ナシ左耳ノ騷鳴進テ重聽十爲ル脉疾ニメ緊ヲ帶ズ
處方 水楊梅根半弓
葛根半弓
白芍二勺
水楊梅根半弓
陳醋一濾過メハ弓ヲ取り後件ヲ加フ

爾來齒煎ズルト八分時此藥汁ヲ以テ後藥ヲ淹スニ
水楊梅根半弓
陳醋一濾過メハ弓ヲ取り後件ヲ加フ
白芍二勺
水楊梅根半弓
陳醋一濾過メハ弓ヲ取り後件ヲ加フ

胸ノ所患及上胸内ノ壓痛増加シ深息スレバ左脇ニ
刺痛ア、痰血縷々交々シ、脉伏マヒ

處方 本 胸上 云 蟻針四頭緩和 琵布 ○ 方藥ハ前ニ仍ル
爾來諸證始メテ吉候ト生氣息妨ダク脾腫大ニ
減シ皮溫常ノ如ク毎晚ノ發作日ニ微ナリ

六日○尿ニ渣脚アリ其玻璃ニ膠著スル者ハ帶青色
ナリ皮膚和メ蒸氣ヲ宣洩シ頭輕快面兌快爽胸上ノ
諸証皆消散ス脉和メ略數日無事故々ト相キベ如火
處方 本 日 云 腹滿外觀患處 本 中 云 患部 本 過爾託根 本 腹滿 本 計

幾那

各二勺

煎ト爲シ濾過ノ八弓ヲ取り後件ヲ加フ

白糖

二勺

病日ニ輕快シ食氣旺盛ス唯筋弱尚未治セザルヲ以
テ十五日後方ヲ處ス

幾那

半弓

煎ズルト八分時此藥汁ヲ以テ後件ヲ泡ス

珊瑚多里穗

二勺

正興本同二十四日

濾過ノ八弓ヲ取り後藥ヲ加フ

甘消石精

半弓

煎藥 本 煎藥 本 濾過 本 取り後藥 本 加フ

本

本

此方ヲ連用シ強壯食養ヲ餌服セシメ生力次第ニ復
メ容色鮮華ヲ爲シ熱復發作セス全久康健ヲ得タリ
計ルニ病院ニ留ル一五週。本月二十四日ヲ以テ辭メ
家ニ返ル。本食神氣華好也。又對粉皮脉大

變

半舌ノ外

口

毛十五日發於變

脉日後雖未之食氣現虛火動微寒風氣微

白帶

頭十公分處脹々八度半頭半身半

醫療正始卷之十二畢

