

醫療正始

附醫院類案

十三



F
1-133

4492
11. 2230
10/10/1
天保仲年春開離

冲齋伊東先生譯本


五篇

醫正始療西醫

附

醫院類案

象先



青藜閣叢書

醫療正始標目

卷之十三

○局發焮衝

焮衝總論

卷之十四

○甲 胸腔諸焮衝

第一肺臟焮衝

第二胸膜焮衝

肋膜焮衝

真胸痛

第三肺管焮衝

卷之十五

富士川文庫

2664



肺臟胸膜等焮衝類案第一

真肺臟焮衝治驗

肺焮衝兼泄瀉久咬治驗

打撲後發肺焮衝治驗

聾啞兒肺焮衝兼肝臟亦焮衝治驗

老人家類肺焮衝治驗

左胸膜焮衝已愈復發治驗

左胸膜類焮衝治驗

醫療正始卷之十三

獨乙

昆斯骨夫

著

和蘭

漢越而實幾

譯

西肥

伊東淵玄朴

重譯

○局發焮衝

焮衝總論

證候

本體

量

其

其

其

其

凡ソ焮衝ハ體中一二ノ部分。熱灼。疼痛。焮赤。腫脹。スル

ア其主症トシテ徵知スベキ病ナリ而メ之ニ一種病
的產物○新タニ血管。纖維。膜。皮。等ヲ生ジテ生ゼ
或ハ膿ヲ釀成スルガ如キ是ナリヲ生ゼシト

スル機能ヲ兼子起ス者ナリ
此病外部ニ在ル者ハ辨識シ易シ然ニ内部ニ生ズル
者ハ其諸主症○熱灼。疼痛。焮。悉ク見ハレザルヲ以テ
之ヲ檢知シ難シ故ニ此症ニ於テハ其之ヲ啓發スル
過去ノ原因ヲ考索シ之ニ併セ發スル熱狀脉緊實見ハシ或ハ間、縮小ヲ商量シ其疼痛連綿誓留シテ一
伏カスル者ナリ部ニ在テ動カズ痛其部ヨリ延テ近傍ノ諸部ニ及ブ
者ヲ察定シ其病ノ經過大約急疾ヲ爲シ且其時一般
ニ流行スル病性聖京偏。傷寒質斯等ノヲ查點スル
等ヲ以テ其内部焮衝ト否ラザルトヲ判裁ス可キナ

焮衝内部ニ生ジ而メ其狀甚夕診知シ難ク或ハ毫モ
之ヲ察識ス可カラザル者アリ之ヲ隱伏焮衝ト名ク
焮衝ノ諸症ハ上ニ舉ル次序○先熱灼。疼痛。後赤
スルノ次序ヲ見ハシ終リニ腫脹云ハリ循テ發見シ焮衝消散スレバ諸症モ亦
隨テ漸クニ除キ去ルナリ
焮衝毒ノ本然ノ所在ハ髮細管中ニ在リ此髮細管小
平全無病ノ時ニ在テハ曾テ血ヲ通輸スルノ無キ者
ナリ
體中何ノ部ヲ論ゼズ。病毒ニ衝動セラレテ感動スル

所アレバ血必常度ニ超テ其部ニ灌注シ其處ノ網絡充張シテ豁大ヲ爲ス其部若分泌ノ機ヲ具スル者ナル時ハ其機必増盛ス各部ノ感動此ノ如ク增劇スル寸ハ至細ノ動脈中ニ血充實スルメニナラス血モ亦其本然ノ調和ヲ變メ髮細管内ニ滲入スルノ質ヲ得ルナリ是ニ由テ平日血ヲ通輸セザル髮細管乃_チ變メ輸血ノ管脉トナリ其運轉大ニ增盛シテ強劇ノ抗激ヲ起シ疾急太過ノ病的生カヲ得ルニ至ル此ヲ以テ其髮細管ノ本然固有ノ分泌機增進メ物_シ及ビ纖維元ヲ滲出シテ從前之アラザル所ノ新血管新髮細管

○即_チ病的產物等ヲ生出スルニ至ルナリ
各部ノ髮細管ノ感動增劇スル時ハ其勢常ニ近傍ノ大動脈ニ及ビ其甚シキ者ハ遠隔諸部ノ大動脈及ビ心臟ニ連及シテ過劇ノ運動ヲ發セシムルニ至ル是即_チ各部ノ焮衝ニ熱ヲ兼ヌル所以ニゾ此熱ハ畢竟全身ノ血管悉ク太過ノ運動ヲ發スルヨリ生ズル所方リ全身ノ血管此ノ如ク運動増劇シテ熱狀ヲ發起スルヲ以テ體上一切ノ髮細管モ亦之ニ連累セラレテ同ク熱狀ヲ得物_シ纖維元ヲ分泌スルト平日ニ倍シ夥シク之ヲ血管ノ内面ニ滲漏シ此ニ由テ所謂焮衝皮

○ 嘘衝性ノ諸病ニ瀉血スヲ生ズルナリ
レバ其血、嘘衝皮ヲ生ズ
嘘衝ヲ得ル部分ハ其織質擴張○腫起セラレテ屢堅
硬トナリ至細ノ血管皆搏動ヲ生ジ嘘衝増進スルニ
從テ其部ノ分泌機抑屈セラレ其甚シキニ及シデハ
其機全ク廢絶スルニ至ル然ニ嘘衝減退スルニ隨テ
分泌ト泄泄トノ二機復見ハレ或ハ屢多量ノ泄泄ヲ
ナスモ亦之アリ

嘘衝ト血ノ窘迫ト同ジカラズ窘迫モ亦嘘衝ノ如ク
其血一部ニ聚積シテ血管ニ填充スト雖ニ造力増進
スルノナキテ以テ病的產物ヲ生下スルトナシ是其

嘘衝ト異ナル所ナリ然ニ窘迫増盛シテ劇等ニ至ル
者ハ眞嘘衝ニ變シ易シ故ニ此症ハ毎ニ嘘衝ノ輕度
ト看テ之ヲ處置ス可シ
心臟。動脈ノ運動。增劇シテ全身ニ汎發スル熱病モ亦
局處ノ嘘衝ヲ續發スルトアリ其理。猶局處ノ嘘衝ニ
全身ノ熱狀ヲ繼發スルガ如シ
嘘衝ハ總テ熱ヲ兼子ザル者ナシ故ニ此ニ原ヒテ三
項ノ區別アリ

○其一ハ局發嘘衝ノ諸症先見ハレ熱之ニ次デ發ス
ル者

○其二ハ局發ノ疾患ト熱ト一時ニ併セ發スル者、
○其三ハ熱ハ其本病ニシテ局發ノ煥衝。後之ニ加ハ
ル者

區別

諸病ヲ總說スル學科ニ於テハ煥衝ヲ數種ニ分ツト
雖氏然モ日用施治ノ間ニ在テハ次ノ區別ヲ最切要
トス

第一 原由ノ著々處ニ原ヒテ之ヲ分テバ其一ハ直
中煥衝其二ハ連累煥衝其三ハ兼攝煥衝是ナリ
○其一直中煥衝ハ啓發ノ因徑チニ觸レ犯ス所。即煥

衝スル者是ナリ譬バ眼中ニ飛入スル物アリテ眼
煥衝ヲ發シ酷烈ノ毒物ヲ呑デ胃煥衝ヲ生ズル如
キ者ヲ謂フ

○其二連累煥衝ハ他部ニ病患アリ健全ノ部之ニ感
ジテ亦煥衝ヲ得ル者ヲ謂フ○故ニ連累煥衝又曰
ハ其部ニ在ラズノ他部ノ疾患ニ由ル喻バ腦ケ疾
患。肝臟煥衝ヲ媒發スル如キ是ナリ
連累煥衝ニ二種ノ別アリ

○一ハ部分ノ交感ニ由ル故ニ此部ノ疾患能ク彼
部ニ同種ノ病症ヲ惹起スナリ○此交感亦四種

アリ一ハ其部分ノ位置。彼此近接スルニ由リ二
ハ其結構ノ相類スルニ由リ三ハ神經ノ聯絡ニ
由リ四ハ其理未ダ吾人ノ究メ得ザル所ト雖凡
之ヲ實驗スルニ彼此ノ部能ク相感應シテ同一
ノ病ヲ得ル者アリ譬バ肝ノ左裂ノ煥衝。胃モ及
デ同種ノ胃煥衝ヲ發シ。○按ニ部分ノ近鼻漏膜
ノ煥衝蔓延メ喉頭肺管ニ及ビ。○接ヨリ生バル者
横膈膜ノ煥衝ヨリ腦煥衝ヲ媒發シ。○結構相類スル
者子宮煥衝ニ由テ乳房煥衝ヲ發スル者ニ由テ
發明スル所ノ交感ヨリ生バル者等ノ如シ。

二ハ番替ノ運爲ニ由ル者。此症ハ初煥衝ヲ得ル
部分ハ其病勢減じ之ニ相反スルノ器具代リテ
其病ヲ得ル者は是ナリ譬バ皮部ノ瘡瘍内陷ノ肺
煥衝ヲ起シ脚痛風消散メ胃煥衝ヲ生ルガ如シ
○其三兼攝煥衝ハ別ニ本病アリ煥衝ハ其一傍症ト
爲テ發スル者ヲ謂ス譬バ猩紅熱ニ喉煥衝ヲ兼子
麻疹痘瘡ニ眼煥衝ヲ兼發スルガ如キ者是ナリ
第二所在ノ異ニ由テ之ヲ分テバ外部煥衝ナリ内
部煥衝ナリ。○其外部ノ者ハ一ハ羅斯様ナリ其所在
ハ皮部ノ脈網表被ノ裏面ニ在リ其赤色薔薇ノ如ク

指ヲ以テ之ヲ捺バ指下白色ヲナシ其部焮熱ヲ覺フルヲ以テ徵知ス一ハ焮衝深ク皮上皮下ノ蜂窠體中ニ在リ之ヲ弗列僅没涅烏斯○焮衝ノ義、羅斯ト名ク此焮衝ハ其部位熱灼メ疼痛甚シク其色黯紅滑澤ニノ中心突起シ其根脚分明ナリ

○其内部ノ者ハ或ハ獨リ其患部ノ上面ニ在アリ或ハ深ク其部ノ織質結構ノ中ヲ犯ス者アリ

○病性ニ由テ之ヲ區別スレバ通常イ因の外感傷等ノ因ヨリ生バ常焮衝アリ體中一種ノ病毒ニ_{ヲ謂フ}原キ來ル一種性ノ焮衝アリ譬バ痛風様。瘰癧様。梅毒

様失苟兒陪苦様癌樣等ノ焮衝ノ如キ是ナリ

第四 其發生スル前後ヲ以テ之ヲ分テバ本症○先

者スルアリ續症○他病ニ續發アリ

第五 留連ノ長短ヲ以テ之ヲ分テバ急性○急性者

慢性ニ移ル故ニ其慢性ノ名ヲ命ズ慢性ノ者アリ○

其慢性ノ者ハ屢急性焮衝ノ續發スル所ニノ之ヲ鑒

識スルヲ難ク之ヲ療ズルモ亦易カラズ且諸慢性病

ノ本原トナルナリ

第六 兼發スル熱性ヲ以テ之ヲ分テバ單純焮衝熱ア兼發スル真焮衝アリ又聖京僕様。僕麻質斯様索蒲

爾刺列様。膽液様。神經様。腐敗様等ノ焔衝アリ是皆熱ノ本性ニ原ヒテ之ヲ名クルナリ。

第七 部分ニ由テ之ヲ分テバ巴連舍馬質ノ諸器。肝脾腎等ノ如ク其質及ビ坎凹器。腸胃氣管。胃管。膀胱充實スル器具ヲ云。及ビ坎空アル諸器ヲ。坎空アル諸云ノ焔衝。神經。管脈。動靜二脉。皮器。本皮。滑液膜。纖維腺筋腱。堅骨。軟骨等ノ焔衝是ナリ。

原因

素質 烔衝ノ素質ハ男女ヲ問ハゞ老幼貴賤ヲ論ゼズ皆之ヲ固有ス。但天資多血ニメ年紀壯盛。體質強固。血液盈滿ノ人。職業ニ因テ身體ヲ勤勞役使スル人。已ニ

屢焔衝ニ嬰ル者等ノ如キハ其素質ヲ得ル。最多ニ
發因 其發因ハ局發。汎發ヲ分別スベシ。

其局發ハ創傷。挫傷。震掉。脫臼。骨傷。籍頓。狼僂。屈湯。潑火傷。衝動ノ摩藥。腐藥。中毒等并ニ銃丸。結石。腫脹。硬結。膿瘍。腐骨。く桺等ノ異體。中ニ擯入シ或ハ體中ニ留存スル等ノ如キ類皆是ナリ。

其汎發ノ因ハ大寒大熱。殊ニ寒熱ノ驟變。甚寒ノ大氣風吹。傳染毒辛熱ノ飲食ヲ悞リ用ヒ大ニ身體ス勞動ニ過ギテ精神ヲ役使シ情思妄動。出血壅閉。諸液ノ排泄壅塞ノ利セズ。皮上ノ瘡疹及ビ痛風ノ内攻。

其他一種性ノ因アリテ尤能^{アルトク}或部ノ焮衝ヲ發スル者アリ譬バ勞神役情及ビ麻醉ノ藥ハ脳焮衝ヲ生ジ強烈ノ光輝ハ眼焮衝ヲ發シ大音劇響ハ耳焮衝大聲吽

號ハ肺焮衝煙霧濕潤ノ大氣ハ咽喉焮衝忿怒ハ肝焮衝焦腐毒ハ胃焮衝酷劇ノ利尿藥ハ腎膀胱焮衝ヲ發スルガ如シ

轉歸

復於平康其熱ハ汙尿出血ノ吉里濟^{キリジ}ヲ得テ解シ局發ノ病患○即^ナ焮衝腫^{ムツ}ハ分解ヲ以テ治ス皮焮衝ハ太約鱗屑ヲ爲メ解散ス○分解ノ徵ハ焮衝ノ諸證漸^マ以

テ解シ去リ其部ニ固有スル分泌機復生ジ其機運モ亦故ニ復スルガ如キ是^{ナリ}變於他病焮衝ノ最善^モク傳變スル病ハ一ハ結膿二ハ物^{モノ}乙液滲出○焮衝ノ部ニ硬結贅肉^{モツ}三ハ壞疽○其餘ハ貽後ノ腫脹開大織質弛縱知覺ノ過敏若クハ減耗麻痺不遂患部ノ變性部分人緩軟消瘦ハ太約皆焮衝ノ續發スル所タリ^モ一結膿ハ一種病的人分泌ニ由テ淡黃柔軟稠膩ナル液體ヲ焮衝ノ部ニ排除シ出ス者ヲ謂フ○其膿一二ノ部ニ聚積スル者之ヲ膿腫ト名ケ又其患處ニ

囊ノ如キ空間ヲ生ニテ膿ヲ包有スル者之ヲ膿囊ト名ク。其處出入口也。其處善性ノ膿ハ色白ク、酥ノ稠ニメ微ク臭氣アリ。冷ルニ及デハ少モ臭ナク之ヲ水ニ投ズレバ器底ニ沈ミ之ヲ攪拌スレバ乳様ノ液トナリ之ヲ靜定スレバ復沈澁ス。○若其膿苛厲ニメ褐色帶綠色惡臭粘膠ヲ爲シ瘍ノ四邊爲ニ荒穢スル者ハ之ヲ敗膿ト名ケ。此種ノ腫瘍之ヲ潰瘍ト名ク。亦焮衝將ニ結膿セントスル徵ハ消散ス可キ。時期ニ方テ其候ヲ見ハストナク焮衝ノ諸證稍消散スト。

雖氏皆盡ク解シ去ラズ其疼痛搏動ヲ帶ビ患處墜重ヲ覺ヘ掉運恒ニ自由ナラズ其外部ニ在ル者ハ液ノ波動歴々トノ手ニ應ズ太約。病人惡風ヲ覺ヘ或ハ大ニ憎寒シ晡後戰慄熱灼ヲ發シ夜間盜汗ヲ出ス。尿常ニ赤ク日ニ濶脚ヲ得ルト雖氏寛解スルトナク或ハ屢過多大量ノ濶脚ヲ得ルトアリ患處ノ近傍腫起シ足モ亦屢浮腫ス食欲過度ナリト雖氏病人羸瘦ス。○或ハ焮衝ヨリメ徑チニ潰瘍ス生ズルアリ或ハ結膿ノ後之ヲ繼發スルアリ。○這潰瘍ハ最善ク體稟不良惡液家全身諸器大ニ虛衰ス

シム

中蜂窠體ニ滲出スル者ハ硬結ヲ生ズ腺様ノ器體ニ滲入スル者ノ如キハ最善ク硬結ヲ爲ス然ル所以ノ者ハ此膠性ノ物ヒ蜂窠體中ニ滲透シ之ヲメ相膠著セシムルガ故ナリ

下滲出スル者物ヒ液ニアラズメ血中水。其蜂窠體中ニ滲漏スル者ハ熾盛○即熱性水。水腫病ヲ發ス三壞疽○焮衝ヲ得ルノ部分。血ノ運行全ク遏止シ動機盡ク廢絶メ局處ノ死狀ヲ見ハス者ナリ○此故ニ壞疽ノ本性ハ其部死瘡ノ生氣ノ運動盡ク耗竭

ル人。病毒ノ衝動連綿トメ止ザル者。汚穢不潔ノ大氣良善ナラザル食料ヲ用フル等ヨリ生ズ。二滲出○此證ハ焮衝ノ部ニ物ヒ液及ビ纖維元ヲ滲出スルヲ謂フ○各部ノ結構ト織造ノ異トニ應メ此滲出ヨリ生ズル病的產物モ亦各同ジカラズ上物ヒ膜滑液膜ニ物ヒ滲出スル寸ハ新膜樣體ヲ生ズ所謂類膜是ナリ之ヲ生ズル者ハ近傍ノ諸部此ニ生合附著ノ其部胖大シ或ハ此新膜凹器○前スノ内面ヲ被フテ竟ニ其本然ノ機運ヲ害シ或ハ屢其機運ヲメ全ク廢絶○所謂類膜咽喉焮衝ノ如シスルニ至ラ

スル者ナリ。此ノ其等又其處寒冷ト爲シ劇
壞疽ヲ生ゼントスルノ證ハ熱灼熾クガ如クニメ
耐忍ブ可カズ其色黯赤。其痛極テ猛烈。腫處緊脹乾
燥スル者是ナリ。焮衝已ニ此クノ如キ極度ニ到リテ尚些子ノ知覺
運動溫氣ヲ貽シ留ムルノ間ハ之ヲ熱壞疽ト名ク
若シ其部全ク死痺シ生機盡グ遏絶ノ屍臭ヲ爲ス
者ハ之ヲ寒壞疽ト名ク。

寒壞疽ノ證候ハ焚灼ノ熱止ミ患處寒冷ヲ爲シ劇
痛頓ニ止ミ黯紅色變メ灰白褐黒ト爲リ腫處縱緩

シ皮膚軟柔萎衰シテ水泡ヲ生ジ泡中赤様若クハ
黒様ノ敗膿ヲ盛リ表被剝脱スル等是ナリ。

壞疽ニ乾濕ノ二種アリ。其乾壞疽ハ液ノ灌漑減ジ
テ其部灰白若クハ黎黒ノ其皺揭スルノ木乃伊
ノ如シ其濕壞疽ハ液ノ灌漑増甚シ排除シ出ス所
ノ敗膿終ニ血ニ變メ速ニ其禍ヲ健全ノ部ニ及ボ
ス。○乾壞疽漸クニ增長メ竟ニ濕壞疽ニ變ズ
内部ノ焮衝壞疽ニ變ゼントスル者ハ甚シキ戰慄
ヲ發シ諸證ノ勢極テ劇烈ヲ爲ス。

壞疽已ニ生ズル者ハ劇痛頓ニ止ミ名狀ス可カラ

ザル大煩悶乍消散スルハ是其徵ナリ是ニ於テ病
人自以爲病甚寛解スト然此クノ如キ寛解ヲ覺
ユル間ハ唯少頃ノニ次デ其脉頓ニ沈伏シ眩暈メ
粘膠ノ冷汗ヲ出シ四支厥冷二便失禁體上處ニニ
鈍色若クハ黒色ノ斑ヲ發シ依^ボト顔ト爲リテ終ニ
死ス

歸於死^ト。煥衝極テ劇シク貴要諸器ノ機運爲ニ廢絶
メ、終ニ死ニ至ルアリ又壞疽不遂ニ因テ死シ煥衝貴
要ノ部ニ轉移シ或ハ貽後病ニ由テ死スルアリ

預後

預メ煥衝ノ後來ヲ述アルニハ此ニ兼發スル熱性ト局
發ノ疾患[○]。煥熱疼痛起^是ナリトニ應メ工夫ヲ下ス可シ[○]。其
兼發ノ熱ハ上ノ論說スル所ニ据テ之ヲ考索シ其局
處ノ疾患ハ生命ニ切要ナル諸器ノ煥衝タラバ皆危
篤ナリト認メ爲スベレ

煥衝ノ勢愈甚シク生命ニ切要ナル部位病ヲ得テ其
廣袤愈廣ク原因ノ威勢愈熾ニ的當ノ治術ヲ下スニ
怠ル^ト愈久シキ者ハ其危篤モ亦遠ニ準ノ倍盛ナリ
○内部ノ慢性煥衝ハ之ヲ診定スルヲ極テ難シ而メ
其經過ハ緩慢ナリト雖正生命ノ爲ニ危篤ナルトハ

最甚シ○焫衝劇甚ナリト雖氏治療宜キヲ得ル片ハ全ク健康ニ復スルト少カラズ○姪婦及ヒ老人焫衝ニ嬰ルハ至ツテ危シトス

治法

焫衝ノ治法タル一ニハ其啓發ノ因ヲ除クニ在リニハ本性ニ隨テ其熱ヲ療スルニ在リ三ニハ局處ノ疾患○焫赤・腫痛等ハ病勢ノ劇易ト部位ノ廣狹トニ應ジ其部ノ要否ノ差等ニ隨テ精細ニ考證シテ的當ノ治法ヲ行ヒ以テ之ヲ分解スルニ在リ

其第一法○啓發ノ因ハ最大ノ要務トス而メ其局處

ヲ除ク法

ヲ傷害スル原由ヨリ發スル焫衝ニ於テハ此法最緊要ナリ故ニ焫衝ヲ療スルニハ初先ツ此等ノ因尚存スルト無ヤ否ヲ檢索スルヲ常法トス何トナレバ此因ヲ除キ去ルトキハ全病隨テ治スル者數之アルヲ以テナリ○又一種性ノ病毒○梅毒・痛風・毒・類ヨリ發スル一種性ノ焫衝ハ各其根源ノ首病ニ的當スル一種性ノ治法○梅毒ハ汞劑ヲ以テ要スルナ川テ療スルが如シ

其因已ニ除ク可カラザル者ハ熱々本性ニ隨テ之ヲ療ス宜シ○其本性初發ノ際ハ繼テ焫衝性十日ニ焫衝ノ名アルハ但其輕重純雜ノ別各齊シカラザルヲ異之カ為ナリ

トスルノミ之ヲ治スルハ數百年來峻緩ノ消焫治法ヲ經驗メ有效ノ方法トスルナシ○熱病總論内二說明スル諸規則ハ之ヲ此篇ニ引用シテ亦以テ焫衝ヲ治スル規則ト爲ス可シモ要入川す。

大凡局處ノ疾患ヲ治スルハ皆分消ヲ以テ治法ノ標的ト爲ス可シ内部焫衝ノ如キハ尤然リ然レバ諸器ノ構造各同シカラズ患部ノ運用要否ヲ異ニシ焫衝ノ劇易齊シカラザルヲ以テ之ヲ治スル方法モ亦隨て一樣ナラズ譬バ此器ノ焫衝ニ奇效アル方藥モ之ヲ彼器ノ焫衝ニ用フレバ反テ大害ヲ媒發スルが如

シ
凡諸焫衝其熱劇シク局處ノ疾患熾ニメ患處生命ニ切要ナル部分ナル寸ハ刺絡ヲ行フ可シ若熟勢甚カラズメ局發ノ焫衝其勢熾ナル者ハ局處漏血ヲ行フニ宜シ○其餘各種治法ハ各種焫衝ニ應メ撰用ス可シ○緩和琶布蒸漏蒸氣浴粘滑吉利訶翁兒緩和包攝清涼ノ藥劑飲料等ハ諸焫衝ニ多ク用フル所タリ然レ必其患處ノ景況ニ注思メ之ヲ用スルヲ要トス焫衝ノ輕キ者ハ醫治ヲ施サズ解散スルヲアリ又其頗烈シキ者セ天然ノ出血○衄血痔等ヲ得テ自カラ

消散スルト屢之有リ○但出血人證已具ハル者ニ於テ天然ノ出血アラント僥倖ノ漏血ヲ行フベキ妙時ヲ失フ可カラズ全身ノ熱勢漏血ニ由テ減シ局處ノ熐衝大ニ輕解シ但其患處ノ運行一半障礙スル所。有ルニ由テ猶未全キ分解ヲ得ザル證ノニ患處ニ芫菁膏若クハ芥子泥ヲ帖ス可シ然凡真熐衝ノ状留貽メ尚熞ナルガ爲ニ十分ノ分解ヲ得ザルニ非ザルヤ否ヲ精密ニ考索スルヲ要ス何者若其真熐衝ノ状留連メ未去ラザル者ニ芫菁膏芥子泥ノ類ヲ施セバ却テ其患苦ヲ増劇シ

再ビ漏血ヲ行ハザル可カラザルニ至ルガ故ナリ全身ノ熱性此ヨリ彼ニ轉變○譬ハ其熱初熐衝性ノ交スル如シスルヲ診知シ此轉變ニ由テ局處熐衝何ノ状態ヲ爲スヤ否ヲ參考スルハ俱ニ熐衝ヲ治スル一大緊要ニメ醫ノ最心ヲ用フベキ所タリ但全身ノ熱ハ其性ヲ變ズト雖凡其局處ノ熐衝ハ尚從前ノ熐衝ニメ唯其轉歸ニ至ル間危篤測ル可カラザル勢アル者ナリ然ト雖凡其患所○局發熐ノ差異ニ由テ劇易輕重各同シカラズ○故ニ醫此證一逢ハ先患處ハ幾許ノ貴重ナルヤ其病ハ全身○熟ト局處○熐ト何カ

危急ナルヤヲ參觀考證メ何ヲ先療シ何ヲカ後ニ
治ス可キヲ判定ス可キナリ
治法ノ變化○病性ノ轉變ニ隨テ各症ニ應スル藥物
ハ各自焮衝篇ニ列舉ス

久性焮衝ハ諸久病及其遂ニ屢救治ス可カラザルニ
至ル病人禍原タルナリ○凡諸久病ヲ得ル患者ニ對
し醫意ヲ潛テ精密ニ查點スレバ内部ニ疼痛スル所
アリテ其痛移動セズ絲連トメ暫留シ其部ノ常機頗
廢シ心ヲ用テ候ヘバ明白ニ熟ノ發作アリ爾後一身
虛衰シ漸クニ羸瘦スル等ノ證ヲ見ハス者少カラズ

○其屍ヲ剖視スルニ焮衝或ハ其轉歸○結膿・物乙液
ニ由テ其部荒蕪スル蹤跡ヲ遺スヲ見ル○胸腹二腔
ノ内臟ハ尤久焮衝ニ嬰リ易シ○此病ハ其初起ノ間
速ニ之ヲ發覺スルハ至テ容易ナラズ而速ニ之ヲ診
決スルハ亦甚切要タリ何者。其病常ニ深ク潜匿メ見
ハレズ暗ニ大毒ヲ醞釀シ而其外状ヲ望メバ甚輕症
ノ如ク大氐人力ヲ以テ補理ス可ガラズ已ニ死ニ瀕
スルニ及テ其病勢乃初テ發露スルが故ナリ
久性焮衝初發ノ症状ハ體中一人部ニ輕微ニメ留
連スル疾苦疼痛ヲ覺ヘ其部ノ機運頽敗ス若シ其病

患排除ノ器具ニ在ル者ハ其機當ヲ變シ仔細ニ之ヲ
候ヘバ熱ノ動運アリ又下ニ列舉スル各種焮衝固有
ノ諸証ヲ見ハス等ヲ以テ其久性焮衝タルヲ判決ス
ルニ足ルナリ
久性焮衝ヲ治スル法。身體虛衰シ肌肉漸クニ羸瘦ス
ルヲ以テノ故ニ衝動強壯ノ劑ニ宜シトス可カラズ
若シ此劑ヲ行フキハ病滋、險逆ニ進ム但諸種對証ノ
消焮治法ヲ連用メ尚幸ニ其嶮逆ニ陥ル者ヲ拯拔ス
ルヲ勉ム宜シ此ヲ以テ緩和包攝ノ藥劑。乳酪劑。粘滑
緩和滋養ノ食料ヲ與ヘ謹慎メ數次局處ノ漏血ヲ行

ヒ 荊蕎膏芥子泥。瑞香皮打膿法等ヲ遠隔諸部ノ皮上
ニ施メ皮膚ノ運動ヲ促進シ緩和浴方ヲ用フル等ニ
宜シ其内藥ハ患處ノ異ニ應メ實^ヤ芟答利斯^ヒ阿沙密
斯^カ加羅默兒^ル用ヒ殊ニ的當ノ食養法ヲ行フ等ハ最
切要トス○但精細ニ檢視シテ明カニ此病タルヲ診
決シ諸攻剝治法ヲ施サズ病人ノ意思ヲ怡悦セラメ
病者。醫ノ言所ニ信從シ久キヲ經テ厭惡嫌疑ヲ生ズ
ルコトナクシバ或ハ此危患ヲシテ變メ幸ニ良善ノ經
過ヲ得セシムルニ至ルアラ
病已ニ平復ニ向フニ及テ初テ謹慎メ輕緩ノ強壯治

法ヲ擇ヒ用フ可シ

轉歸治法

各種内部ノ結膿ハ其轉歸皆危篤ニメ決テ喜ヒ待ツ
可キ者ニ非ズ但扁桃腺ノ結膿ノミ或ハ此例ニ在ラ
ザルトアリ○故ニ此轉歸ニ至ラントスル者ハ熟ク
其病ヲ商量シ消炎治法ヲ連用シテ其化膿ノ勢ヲ挫
折ス可シ○此ノ如クニメ尚其勢ヲ阻ムルト能ハズ
竟ニ膿ヲ結フ者ハ恰好ク精力ヲ保續スルヲ要ス可
シ若シ其瘍自然ト人作トニ論ナク其口ヲ閑通スル
ヲ要ス可キ者又外科ノ成法ニ据テ潰瘍ヲ變化メ純

正結膿ト爲スラ要スル者ハ皆勉テ卷法。薰氣浴。芫菁
膏。打膿法ノ類ヲ行フテ其膿ヲ外表ニ導キ出スラ要
務トス

各部ノ愈完ト硬結ト甚大ナラザル者ハ新ニ復熾衝
ヲ生メ遂ニ或ハ之ヲ分消シ去ルトアリ然モ其治ス
可カラザル者甚多シ○若シ尚其治ヲ希望スベ者
ハ緩和分解ノ罨法ヲ連用シ蒸氣浴ヲ行ヒ水銀膏ヲ
摩擦ス可シ内服ニハ殊ニ石鹼。安質。沒綻劑。加羅默兒。
實芝答利斯。失鳩答。萸菪ヲ試ミ用フ可シ
熾盛水腫ハ熾衝ノ状尚存スルニ非ザルヤ否ラ商榷

メ治法ヲ施ス可シ此ニ嗣デ緩性利水劑ヲ用フ其藥ハ酒石英。酒石葉液ノ類是ナリ或ハ証ニ隨テ屋那尼スナニミズカ海葱實斐答里斯加羅默兒遠思龍腦ヲ用ヒ其更ニ進ム者ハ茺菁膏。芥子泥。打膿法ヲ行テ皮膚ノ運動ヲ促役ス可シ○昔ノ傷寒之症亦有此者壊疽ハ其初務テ消焮法ノ大力量アル者ヲ擇ヒ用テ其將ニ生ゼントスルノ勢ヲ阻遏ス可シ然ニ終ニ阻絶スルノ能ハズメ壊疽ヲ發スル者ハ死瘡ノ部ヲ點化メ再ヒ生活セ使ルニ術ナシ此時ニ方テハ天爲ト人作トニ論ナク死瘡ト生活トノ二部ヲメ相分離セ

令ル外ハ救拯ノ法アルトナシ

焮衝後ノ壞疽ヲ治スルニハ千萬其蔓延スル勢ヲ約制シ勉テ喪亡ノ部ヲ補續メ其故ニ復スル方法ヲ講ス可シ
熱疽方ニ生ゼントシ脉實ニメ強緊。熱灼甚ク全ク焮衝ヲ治スルニ怠ル者ハ適切ノ消焮治法ヲ行テ或ハ其死ニ瀕スル勢ヲ挽回スルトアリ故ニ此症ハ刺絡若クハ蜞針ヲ行フヲ救死ノ奇法トス○然リト雖凡生力耗竭ノ徵アル者ハ揮發衝動ノ劑ヲ用フ就裡幾那龍腦。白芷。麝香。亞的兒。密涅刺列諸酸ヲ最効アリト

ス○壞疽ノ部ノ生力此方藥ニ振起セラレテ再ヒ盛大ヲ爲ス者ハ良能ノカラ以テ自ラ死瘡ノ部分ヲ脱化シ四沿焮衝メ膿ヲ釀熟シ終ニ盡ク其餘ノ死瘡スル者ヲ分離シ去ル此時ニ方テ良能ノカラ扶掖セント欲セバ先ヅ敗膿ノ泄路ヲメ障碍ナカラシメ香竄釀烈ノ卷方蒸劑ヲ行ヒ適切ノ内藥ヲ用ヒ殊ニ幾那葡萄酒ヲ用ヒテ鄰近部分ノ運動ヲ増發スベシ内臟ノ寒壞疽ハ太約百治皆驗ヲ奏スル1ナシ凡ソ焮衝ハ解剖ノ叙次ニ沿テ頭。頸。胸。腹。四肢。關節。焮衝ヲ區別メ之ヲ論列スル者多シ○然リト雖凡胸腔掲載スト云フ

ハ血脉ノ宗源ニメ備ニ純正焮衝ノ正形ヲ具ヘ且之ヲ患フル者殊ニ多キが故ニ此篇先ツ胸腔諸焮衝ヲ掲載スト云フ

化之氣也。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之氣。其氣之發於臟腑者，則爲之津液。其氣之發於經脈者，則爲之血。其氣之發於筋骨之間者，則爲之筋。其氣之發於皮肉之間者，則爲之皮。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之肉。其氣之發於筋骨之間者，則爲之骨。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之髓。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之液。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之津。其氣之發於皮肉筋骨之間者，則爲之水。

醫療正始卷之十三畢

