

X

|-133

F  
1-135

499.9

Ir-4

No. 2302

10/1/135

富士川支庫

1394



醫療手引草中編下

參河 滕謙齋烏巢先生著

平安男 玄順謐之 校補

越前門人尾崎正龍 校正

・ 中風

・ 中風

眞中風ト類中風ニツノ訣アリ此辨ハ玉安道ガ沖洞集ニ詳ニ論調  
有テアレテ至極能スニサレズアノ上ヲ論ズルニ虞天民ガ醫學正傳ニ云直中  
風類中風トニツバナシ中風上矣唯一病トイヘリ是モ至極尤ナ論ナリ謙此二論  
ノ異ヲ考シ虞天民ガ合点ナレバ成程アレデヨイ玉安道ノ說ヨト一等向

ノ論ナリサレモ未難ノ者ニ王安道ガ如クニツトレタモヨン能合点スレバドモラ  
デモヨン悪ク合点スレバモワルイ鬼角兩方压ニ能意ヲ呑ムテ合点サ  
ハスドヨイ此書ニ真ト類トニツニ立冬ニ中風ノ一門ヲ立テ正傳ニ從ヘトモ  
中風ノ治法ヲヤニ記スルニナツテハ自ラ眞中ト類中トノニツガアル然ハ  
王安道ト虞天民ニ先生ノ意ヲ兼用タリト意得ベシ

○此病ヲ論スルニ經ニ中リ府ニ中リ藏ニ中ルト云辨アリ此辨諸書ニアリ  
然レニ是ハ眞中風ノ上ニアルコト類中風ニナコト其上コノ經ニ中リ府ニ中リ藏  
ニ中ルト云コトハ推量<sup>スイリョウ</sup>ノ說ミテレカトシタ說<sup>セイ</sup>デナイト俞嘉言<sup>カケイ</sup>醫門法律ニ云  
テアルホドニアリ穿議<sup>カツギ</sup>スルコトニテハナシ唯眞中類中ニ二陽中ニ陰中カト云

コトヲ第一吟味スル陽中ニ熱ニ屬ス陰中ニ寒ニ屬ス何レモ虛實ハアル也  
其中熱ニ屬スル中風ハ實ノカタ多シ寒ニ屬スル中風ハ虛ノカタ多シ又閉証  
ト脱証トガアル此病狀モイワクアレニ閉証ハ齒ヲクヒツメ手ヲ握ル脱証ハ手ヲ  
撒キ口ヲ開ク閉証ハ多ハ實ナリ脱証ハ多ハ虛ナリ此陰中カ陽中ニ閉証  
カ脱証カト云ヲ主ニ吟味シテ拳ル所ノ諸方ヲ用ベシ  
○此病ハ卒中風ハ急ニメンジノツクモノ既ニ中風ト云病ニナツテハ急ニ効ハ  
ケイモノト兼テ意得ベシ香川子コノ病ヲ窺<sup>シ</sup>ノ已ニ地ニ隣<sup>シ</sup>テ破レテ未々離  
レズドイヘ尼<sup>キ</sup>已ニ貞<sup>シ</sup>文七<sup>シ</sup>決ノ難復故<sup>ソ</sup>タゞ善<sup>シ</sup>藏<sup>シ</sup>メ謙<sup>シ</sup>テ謙<sup>シ</sup>三養<sup>シ</sup>テ可保久  
上云譬<sup>シ</sup>アリ彼家著<sup>シ</sup>處ノ行餘医言ニ中風ノ名議詳ナリ古之辨ト云歟

レニ今医俗オレナ中風ト称スルト尚シ今更名モ改メラレズ古方家ニテハ多ク痛上云テ中風トモ云ハズ此金匱風引湯ノ方下ニ除熱癲癇トアルニ據テ也其治方續命湯或黃湯ナトヲ兼子用アリ虚分ノ証ナドノ治驗モ見聞セズ間ニ前医ノ温補ニ過允後ニ三黃湯一二貼ニテ即効アルコトアリ又香川子ノ說アベリ治方モ見ヘズ急ナル時熊膽カクタウナド最上ノ茶トス其外手足ヲ輕搖スルノ養生アリ此其病中又六幾キサニアル時ノ保養ナリ行餘医言ニ詳ナリ然レニ又輕重アリテ輕キハ後世八味順氣散ナドヲ用テ正氣ツキ收行ナド苦ム三面春ノ除濕湯中風ナド用井步行モ大半復故モノモアリ其卦方角法多シ又富貴奉養ノ人ハ丹水翁ノ醫方問餘ニアル保元湯ナド窪カマメテ効アリ然レビ此病

富貴保養ノ人ハ虛損多シテ中人以下ノヤウニ大半モ復故希ナリ唯保元卦劑ヲ常服ノ年數ヲ保ツノミナリ

○卒中風ニ氣中食傷中寒霍亂痞積瘀氣サク紛レモノアリ兼て心得ジ

### 陽中陰中之辨

陽中者面色赤唇焦牙關緊急上視強直搏腋煩渴多見閉證○陰中者面色青或白或黑痰喘脣舌眩晕多汗手足厥冷多見脫證

### 卒中風類證辨

○中氣者七情過氣厥冒或牙關緊急或暴怒氣逆脉多心中風脈多浮中氣身冷中風身溫也八味順氣木香順氣之類

○中寒者厥冷，手足脉沉微或無，姜附湯之類。

○癥厥者卒發，背冷或膈脹或眩暈，生姜綿煎合童便調守服之，或

加陳二陳湯虛寒，脈沉細大劑，六君子加附子木香南星竹瀝姜汁。

○食厥者酒飽過度或感風寒或因氣惱，厥逆昏迷口不能言，肢不

能舉，宜煎姜鹽湯探吐之後，風寒藿香正氣散氣滞八味順氣散。

○夏月無故卒倒昏不知人，面垢冷汗自出手足微冷，搐搦或喘渴必

喘乏而無痰，先以蟄土熨臍中或蒜水灌鼻中。

○元氣素弱或遇勞役嗜欲，卒然厥仆，手必撒，必開太劑參附湯。

○肝木之風內中，六經之邪外侵，良由五志過極火盛，水衰獨參溫。

### 加童便尋用六味丸

○血暈者皆因平日去血過多虛而成，血暈脈微濇也，加味四物湯類治法。

卒中風閉證，齒牙緊，手足握，類牛黃清心圓。

閉證而熱甚者，清心牛黃圓。

閉證而寒甚者，至寶丹。

○中氣亦卒昏迷，不省人事，或有痰或無痰，溫茶也熱蘓含香圓。

卒中風脫證，口瘡，手足撒，類大劑參耆湯加蘓，有寒者加附。

前證火逆上者，獨參湯加蘓，針鍼。

卒中風陰中者。面白青或白或黑。痰喘昏眩。暈多汗甚。卷手足。硬冷。三生飲或鼻吹。某本ニテ。醒後用續命省風等之藥。頑痰愈盛者。

### 北湯主之

前證危者。常見脫證。人參三生飲。即本方加參三兩。是始薛已。

痰涎壅盛。不得服。熱藥者。三生飲ノ類。星香湯。

十七文中不論。中風中寒中濕中暑中氣及痰厥飲厥之類。初作皆可用此。先以皂角去皮弦細。辛生南星半夏為末。吹入鼻中。吹盡ノ方。イ俟其噴嚏。即進前藥。牙禁者。中指點南星半夏細辛末。并烏梅肉頻捺。自開是良法也。攝生飲調蘿合杏圓。此治法通用。雖然難取。必矣。

以上卒中風ノ治法。ナリ。從是下。醒テ後ノ治法ナリ。

中風醒後有表證者。小續命湯。治中風外有六經形證及風癱脚氣。

季春三月。初夏表證。踈風湯。治表中風邪。半身不遂。麻木語言微澁。

中風表證。涼解劑。壯實者。人參敗毒散。加防荆獨柏松柏。夏去。根有

義。更加虎。

中風痰涎壅盛。皆運手足搐搦。大省風湯。痰逆嘔吐。脉沉緩者。宜用之。

前證屬熱者。省風湯。

暴怒氣逆。嘔逆後。木香順氣散。治中氣運倒。

其人因七情鬱滯。或偏身麻痺。肩膝麻痛。或口眼喎斜。氣急。有癥等證。

人壯邪實者烏藥順氣散間服酒化蘿合香圓良方ナリ。一身俱  
麻者加參术歸閨。久癱瘓者桂實者去麻加麻防羨夏星鎧歸。  
口眼喎斜者加鍼羌防荆鎧對。

前證氣弱者八味順氣散良方ナリ。間服酒化蘿合香圓良法ナリ。治  
中風法先用順氣次用治風之藥或攻痰氣加星蜜或加夏蠅。

口眼喎斜右急者屬氣分去青加羌

中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服勻氣散全因氣滯者

五十餘歲之男素嗜酒少食體瘦于時旅行外感風冷歸家夜中  
卒欲氣絕把燈看之口眼喎斜脉沉濇四動木香流氣飲用五貼病

證減愈謙云脈沉濇者氣滯也外有風寒故用此湯  
痰涎壅盛胸膈留飲宿塞不通導痰湯。前方加歸鬚名加味導痰湯  
因痰火者加減導痰湯清熱導痰湯此二方太要同可選用  
丹溪云半身不遂在右不必屬痰屬氣虛三陳湯合四君子加鎧對  
痰厥暉倒氣實者加味二陳湯不可用氣弱者唯宜用大劑六君子湯  
痰火中風口眼喎斜清痰順氣湯  
痰迷心竅不能言語滌痰湯或加芩連鎧對  
前證瓜蒌枳實湯去蜜加硝  
食厥口塞益前湯吐之而後風寒藿香正氣散氣滯八味順氣散

中風脾緩舌強不語半身不遂資壽解語湯

腎氣虛弱舌瘡不能言足痿不能行地黃飲子

驚癲堵塞竅隧肝熱生風舌強不正正舌散

寒風不語舌不能言遠志甘草水池不去骨不拘多少為末細清調敷

天突咽喉前心三處効

痰門塞心竅不語熱者涼膈散加連或牛黃清心圓

口噤不開大實證者此湯加犀連

中風內有便漏且隔者三化湯

腸胃積熱大使結燥小便赤澁者搜風順氣丸

三化湯

水煎服後世代

此丸

中風風熱甚大便閉有表裏之證者防風通聖散

被乘手足陽明經之虛風口目喎斜不能言語遇風寒則四肢拘急脉

浮而緊者秦艽升麻湯

口眼喎斜左急右緩血脈受邪者舒筋三聖散

風中半脉左半肢瘻口目左喎參歸三聖散

中風右脉不足右半身不遂者四君子湯加麻桂有痰不可峻補

燥者此湯加星蜜或六君子湯

胃風能食手足麻督目睭面腫升麻胃風湯

中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見而不拘一經者大秦艽湯

中風外無六經之形證。內無便溺之阻隔。知為血弱不能養筋。故手足不能運動。舌強不能言語者。此症古法用大秦艽湯。今改十四味建

中湯或十全大補湯人參養營湯

左右手足皆癱瘓者。此血氣之大虛也。加味大補湯。

左右手足癱瘓。大防風湯加蜜烏梔獨薏桂各加味防風湯。

血虛兼濕。前症虛寒兼氣滯。獨活寄生湯。

風熱頭面腫痛。頰上如糊。咽喉不利。犀角升麻湯。

腎藏虛熱生風者。天麻丸此方利濁痰濕。扶正焦衛生寶鑑云。預防

中風之藥也。

中風如疾者。沉香天麻湯。

中風神氣昏冒虛火妄動。挾痰而發火。氣逆太剛。參芎歸兼柴梔涼火。

若閉證而非脫證者。牛黃圓。虛人者。六君子湯。閉証虛人。加星臘痰

涎蜜順氣菖。開心竅遠昏冒。蘚。痰火對痰。○偏枯其脈沉細。是風與

痰在上焦。導痰湯加羌。蘇不應此湯。加歸。補血。寒。加桂。熱。加蘚。○中

風不外而口眼喎斜肢體不遂。此湯加陳皮。風木對蘚中後脉虛有

瘀者亦如此法。○中風有內外證。內外邪除而後言語蹇滯半身不

遂。此湯加著桂歸芍。久々服之。

中風脉緩大無力而四肢不舉者。土太過也。當瀉其濕。胃苓湯。脈細小。

無力而四肢不用者土不及也當補其氣補中益氣湯隨證加減。

癥人血枯筋急土旺風淫者四物湯加鈞秦防肥盛色白痰盜者六君子加秦麻蠶劑。十指并面麻晬乃氣虛風襲此湯去木歸橘加的珠麻晬肺軟癰起白屑乃脾氣不榮此湯加馳芍○手足麻氣虛者去歸陳加珠的甜虛甚挾風者加烏附羌防麻○中風遺尿不禁脾虛下陷而膀胱不約者此湯加齒腎虛不能攝者地黃飲子若卒中有此兼諸惡證者為腎絕不治。

中風血虛四物湯補之扶痰則此湯用對炒通入盤能食者去盤加荆瀝○半身不遂大率多痰在左丹溪說不必歸死血與無血宜此

湯加桃紅盤劑○治風之法此按實症者宜從之初得之即當順氣及其久也虛人宜補氣血即當活血此萬古不易之理久患風疾此湯香活絡丹愈者正是此義若先不順氣遽用烏附辛熱又不活血徒用防癰羌輩三味風藥燥劑吾未見能治也。

中風病在半表半裏外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能語言古法用大棗丸湯然不若詳大棗丸湯下大棗丸湯與大補湯非類古古人誤十全大補湯大建中湯入參養榮湯選用○陷下者灸之至於用藥宜潤燥則風自息古法用大棗丸湯踏古人之誤今改用此湯尤安○血弱舌痿不

能言。手足不能舉。此湯主之。血寒心失滋養。語言不出。叩之不應。  
此湯加菖遠。半身不遂。而多汗。神昏。痰涎上湧者。大劑參耆補中。  
益氣。此湯人參養榮湯大建中湯考症脉選用。虛風傷衛而汗出。  
者。黃耆建中湯陽氣虛者。加附。若兼寒熱者。小柴胡湯氣虛補中。益  
氣湯。每夜發熱。自汗為血虛。當歸補血湯酒客輩。多濕熱。兼房勞汗。  
出。中風下財。多汗。不能穿衣。常濡口乾。善渴。此湯加附。防癲澤。中  
風有風熱壅者。有血虛氣虛者。有腎虛。老人忽言不出者。此湯去。

桂加菖遠。有房勞中風下財多汗曰內財。此湯加附。防  
劉氏者。專守表之說。殊不知火之有餘水之不足也。劉氏原以補腎。

為本觀其地黃飲子之方。可見矣。故中風又當以真陰虛為本。但陰  
虛有二。有陰中之水虛。有陰中之火虛。火虛者。皆專以地黃飲子為主。  
水虛者。又當以地黃飲子與六味九分。六味丸為主。果是水虛辛  
熱之藥與夫。參耆之品俱不可加。是不概不可意得。

漏。不論冬夏。頭上常有汗出。得之醉後。當風所致。頭乃諸陽之會。酒  
能發陽。所以飲必具。而醉後陽氣上升。頭面之竅必開。當風坐臥。風  
邪入之。以致頭面汗名漏風。黃耆六一湯加防風桂。已除只口眼  
渴斜。未正者。以草麻去殼。搗右。渴金在左。左渴塗在右。入門云渴  
風。黃耆六一湯加參术。葛葛。

一切中風中氣中濕手足癱瘓癰癧及產後血少筋不榮身體疼痛等

證加味豆淋酒

中風頭痛發熱肢倦舌強不能言語者八解散奇効良方加菖遠蕙蜜  
物藥等分瀝減半名十二味正氣散

胸膈多痰心下痞日久不快類中風之漸也良方參蘿飲瀝蘿夏茯  
葛前各三分甘蜜陳枳桔各二分右分二貼姜煎

藥方

牛黃清心圓 清心牛黃圓 至寶丹 蘿俞圓以上四方見續編

參耆湯

參 耆

右水煎入蘿薈氣虛中風湯補之

獨參湯

瀝 水 盡

右煎一盞溫服

中風虛寒者挾痰則

濃煎參湯加蘿薈對火逆上者加龍

三生飲

星 生 一 級 頤 生 附 生 各 五 分

右四味水煎治卒中

風并痰厥○前症危者常見脫症即加參一爻名入參三生飲

星香湯

星 三 級

蜜

蒼

細

甘 生

菖 各 三 分

攝生飲

夏 炮 五 分

右剉散為一服水一盞半搗三片煎取其半乘熱調

蘿合香圓半丸灌下痰盛者加錫二枚灸

○中氣卒厥痰涎壅盛者可用之若陽熱症可用牛黃清心圓之類症禁用若脫症可用入參

三生飲之類症誤用則難救

小續命湯 千金稱小續命湯者有三方其始一方也加減見續編

麻桂

甘草杏

芍药

防參

芩各一分

防炮七分附

附僵

右姜棗水煎溫服虞天民曰金匱本方有磧歸無附防炮按本方磧  
歸固不可無而附防炮尤不可缺此恐傳寫者之脫簡耳

時風湯

麻芩杏

薑各二分

甘

升各一

右水煎去渣溫服但冬月忌服

太省風湯

省風湯屬寒劑大省風湯發劑也

星分

防四分

獨附

蝎子

甘各半分

升各一

右姜二片水二盞煎至八分溫服不拘時候日進一眼

省風湯

防四分

獨附

蝎子

甘各半分

升各一

省風湯

防四分

獨附

蝎子

甘各半分

升各一

右姜二片水二盞煎至八分溫服不拘時候日進一眼

木香氣散

蜜別研

砂

烏

甘各四分

升各一

右姜棗水煎溫服

八味順氣散

麻桂

芍藥

陳皮

烏

甘草

升各一分

乾姜五分

附僵

附僵

附僵

附僵

附僵

附僵

右前服○或加星蜜以攻痰氣○或痰盛加夏二錢一○氣厥者與

中風相似何以別之風中身溫氣中身冷先以此湯

勻氣散 治腰腿痺手足不能屈伸半身不遂口眼喰斜風氣中風中

氣用風藥而十無一愈即服之見効

附四分烏參

參各一沉

芷

青

甘

蘆

枳各五厘

右姜煎風氣腰痛亦宜服之○或合二陳湯奇妙○右急左緩者倍用半熟甘加薏苡緩其急加鬱蕤籠以熄其風又去芷蘆可常服導痰湯治風濕痰一切痰涎壅盛或胸膈留伏痰塞不通

夏八分星

實

茯

陳各二

甘五厘

右姜煎

清熱導痰湯 中風痰涎壅盛不能言語不省人言牙關緊急有火有

痰有氣或面赤身熱手足溫暖脉繁盛宜服此此因痰火者也

夏星

實

茯

陳

連

數

桔

芩參

白朮

苓

甘五厘

右人參芩白朮薑服

加減導痰湯

前方加歸鬱而已主治大要同可選用中按清熱導

痰湯痰迷心竅不省人事一服立省真神方也

○如久嗽肺燥熱本方去夏加硃杏○痰嗽喘急咯吐不成本方加桑欒因痰火治中風

芩連清火散降氣潤痰參木補脾更入蘆薈清痰實良方

加味二陳湯

陳夏茯歸實桔杏各一

良砂各七

蜜桂

甘各三

右姜煎合九分三厘或倍為一克八分六厘

或倍半為二克四分諸方分兩做之

清痰順氣湯

星 蕤 貝 陳 蒼 桂 防 荆 芩

連

甘各等

右姜煎臨服入麝沈末各五

同服實症者可用之

條痰湯

導痰湯 加礞石硝

資壽解語湯

防

麻煥姜附炮各

分半

東草

羚

桂

羌

角

五厘

水煎入簾對服無時脉虛加參

經驗方也然一方組合非可投通例

方將羊角一味寒而有桂附物藥溫補劑也

中風漸中風後餘症快

言語不好者可用之

地黃飲子

熟

巴

蝶

酒

蒸肉

洗

砌

附炮珠

桂

遠

礞

桂

闌各等

右剉每一兩入薄荷少許姜枣溫服

醫通分

兩馳三兩餘藥一兩

珠

姜

每服五錢姜五枣

薄

水煎

腎脈至

葉

舌本藥品皆補腎藥而其闌珠遠竇心肺之藥也河間制多寒涼而  
獨此方溫補經驗良方也

正舌散

左半身不遂口眼喎斜言語澁手足抽掣者用之

去毒滾醋

茯一兩姜

為散每服二錢溫酒調服并擦牙

泡炒三錢

汁拌曬

並擦牙

齒日三度○面赤倍蝎尾加薄荷半兩

每服四錢水煎熱服取汗

効驚癱二年之可為的候全蝎厥陰風木諸風掉眩及小兒驚搐要藥也

三化湯 中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便

溺阻隔復以此藥利之

朴

虎

實

羌各等

右每服三錢重水三盞煎至一盞半終日服之以微利為度

中編下 中風

搜風順氣丸 此藥先通氣血清熱潤燥通利大小便

車 載

檳

郁李仁 別研

虎

酒七次 各五錢蒸熟

右為極細末練蜜梧桐子大每服二十

丸溫酒下如覺大腸微動以羊肚肺羨補之膏藥之人大便結燥者

常宜服之庶免風秘老人虛秘最宜

防風通聖散

防

芎

歸

芍

虎

硝

蔻

薄

麻

薑

各一錢

桔

芩

膏

各一分

白

朮

各三分

梔

各二錢

荆

各三分

石

膏

各二錢

右作三服或作四服加姜水二盞煎至一盞溫服日再服劉氏原方也方後嗽加夏五分云○吳氏方考無分兩小青囊言劉本真方者

與原方少異○一方有縮砂無芒硝○一方無芒硝

葵花升麻湯 治中風口眼喎斜 升葛湯加葵參桂芷防風

或傳云無故而口喎無餘症者可用此湯此亦中風類也服藥而愈或灸百部佳但二十歲前有口喎者多死

舒筋三聖散

歸

桂

延

分

各等

為散每服五錢水煎早暮各

一服風中血脉不行者用之歸桂溫補營血且行延胡運血滯血行血冷滯之諸病可用之

參歸三聖散

前方去延加參

大抵與前方同方中延胡去耗血

品用參引桂歸溫補營血或合前方或先用前方後用此方法宣  
辰時



鱗各八枚

右鹿剉與黑豆同入瓶內無灰酒二升拌浸封固置密室春夏五日秋冬七日取出去渣每服一小鍾自然在功效○此

方老人腰膝疼痛產婦血弱癉痛等亦用之而穩當

霍香正氣散感冒

參蘿飲

八解散

人參敗毒散

時疫涼膈散

陳湯

瓜萎枳實湯

木香流氣飲

四君子

虛勞六君子

同

補中益氣湯

內傷四物湯

調經

十全大補湯

虛勞六味丸

黃耆六一湯

大防風湯

痺獨活寄生湯

附方

惺鬆飲

中風醒後宜用之

白芍

定

歸

芎

芍

桂

星

陳水煎入女竹瀝

千金附子散治右半身不遂

麻黃附子細辛湯加乾桂參防芎羚

加減除濕湯治右半身不遂手足癱瘓筋骨疼痛見痺

加減潤燥湯治左半身不遂手足癱瘓呵欠嘔嘔口眼喎斜頭目眩

暉痰火熾盛筋骨痛心悸頭痛見痺

嚴氏稀荳丸

稀荳草

五月五日

六月六日採葉九蒸九曝

用酒蜜浸之晒乾為末蜜丸桐子大每日空心酒下百丸

丹水子曰按吳氏方考言其能甚詳故今俗亦用之甚多然元氣不

甚虛水虧火盛而胃陽強者當免害且有得功雖水虧火盛胃陽不  
強太便易滑者決不可用

裴氏烏犀圓見和劑局方

丹水子曰今人以為中國之神劑貴之

信之我勤言排之難敵於楚人咻其品衆多所服者少而皆香竈風燥  
疾之物至積久則耗神散氣而風獨居則終太便滑中氣養乏而一  
日急斃矣是誰咎乎醫之所教也慎之慎之近代医不教之只告信

五木湯 本綱云陳藏器曰白芍茱萸五木為陽浸損處時珍曰五木者  
桑槐桃楮柳也並去風和血今人多用此法以載之○丹水子曰医  
者教使浴之病者浴後筋脉縱快故頻用浴之雖五木皆利濕之物

水氣終浸筋脈陽氣難復必決勿用或又谷溫水木黃砒石辰砂之  
毒固當去濕痺焚心腎虛耗者其毒入藏變症立生難救但退補養  
心腎脾當待天陽之發時始不可求速効

醫方問餘曰中風之病元陽虛而侮風寒或左或右或首面或上或下  
或虛而見瘍金匱詳說處方之微意明矣

候氏黑散方見金匱治太風四肢煩重心中惡寒不足者○丹水子曰  
詳方旨當用乎舊風久不治并兼用保元湯則本固而風症自緩愈  
予三折臂始悟此方之微意矣

保元湯丹水子自制治中風脾胃素虛元湯衰微不勝風寒在發冒不

省人事半身不遂

白七分

參五分者

蜜

四分

歸一八分桂枝

交

附三分半冬

右水煎初發皆冒

不省人事

危者

分兩倍之以足

錢六分為一服醒後分兩隨時宜或以二錢八分為一服或又病常

用者以一錢四分為一服此予屢用試効之法也○白朮附子局方

水附湯也去濕脾莫先於此人參附子丹溪人附湯也盛元陽莫養於此人參黃耆陳無擇參普湯也補衛氣莫重於此桂枝為扶陽寒當歸微溫盛榮血不补足於是去風大補元氣健脾胃則無不愈之理若稟火盛腎氣易動而燥者宜加芍藥地黃脾氣虛弱者宜加乾薑元陽一盛則風自去故以保元名之○知

利

氣丹丹水子自制

治痰涎忽壅盛而氣急等急症可用之

蘆

三分

炮姜生姜

鴨半姜

附生姜

蜜三分半炒一錢

辰

右細末煉蜜為丸梧桐子大三粒生姜煎湯送下此即濟竇方順元散也加入參辰砂以丹藥備倉卒凡氣厥氣中中風等正氣發聲瘡涎上衝則必宜用此必不可用五奪丹破飲圓蘿合香固之類小兒驚風尤宜傳云此方去參修合以參姜湯送下亦佳參姜各丸口噤不開不可進藥以藥吹鼻取嚏即蘿無嚏不治

鼻吹方

細辛

牙皂

為末吹之

鼻方

生半夏末吹之即破棺散

又方胡椒末吹之

嘔風或未癓或已癒或初病或久病忽發吐紫紅者死

中風牙關緊急水漿不入者以三一氣氣湯灌鼻中口自開矣

一方 治卒風痰癥

生薑二兩

附子一枚

石膏煎

治痰卒發或皆仆或膈脹或眩暈生姜自然汁合童便調匀服之姜能開痰童便降火最妙更入竹瀝尤妙

暴死有痰声者名痰厥以四君子湯加竹瀝姜汁

中惡 尺厥飛尸卒厥此即中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足

冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊皆不知人須旋

轉倒此是卒厥客忤鬼擊吊死及入廟登塚多有此疾以薄荷香丸

灌之俟甦以藿香正氣散加南星木香

○尸厥腹痛不知人事卒然悶亂此卒中天地戾氣用附子一枚大參

三兩酒煎三服炙百會四十丸丹田三百壯艾炷大如棗豆

○暴厥脈伏不省人事莫辨陰陽急用粗紙一層亦閉孔對當臍令熱氣透達於內即蘇然後按脈證

療之如連換三枚不應不可救矣

○夜睡厥死者不得近前斗臭但疼痛其脚跟及足拇指用際多垂其

面不省者移動些少卧處徐々喚之原有燈則存無燈則不可點照

口 救厥死卒死 急于人中穴兩脚太拇指離甲一韭葉許各灸

三壯見活臍中灸百壯亦効

痺

内經痺論ラ按元ニ風ト寒ト濕ト三氣雜合シテ患ラ痺ハ云痛ヲモ痺ト云不痛ソレビル、ヲモ痺ト云其訣ハ風寒濕ノ三氣雜合スル中ニ風ガ主トナルヲ行痺ト云痛痺ノコトナリ寒ガ主トナルヲ緊<sup>ナシ</sup>痺ト云寒痺ノコトナリ濕ガ主トナルヲ着<sup>キ</sup>痺ト云濕草<sup>シ</sup>ユトナリ行痺緊<sup>シ</sup>痺ハ病<sup>シ</sup>痺ハ不痛レテビル、ナリ此外内經ハ周痺衆痺又五藏ノ痺アリサテぐナレ左ノ風寒濕ノ三痺ラ不出其中ニ風痺ガ多キユニ後世<sup>テ</sup>ハ痛風<sup>云</sup>云痛風ト云モ痺ト云モ同事ナリ此書六痺オ云テ外ニ痛<sup>シ</sup>立

ザ<sup>シ</sup>ナリ濕熱ニ因<sup>ル</sup>痛風<sup>ガ</sup>多キモノナリ回春ノ恙活湯ナドガ能効アル  
藥ナレビアレモ濕熱ラ目當<sup>アテ</sup>トスル又痰ニ因<sup>ル</sup>アリ瘀血<sup>クイエ</sup>アリ太極<sup>タケイ</sup>如此意得<sup>テ</sup>各<sup>カク</sup>方ノ下ラ考<sup>カシ</sup>テ施治スベ<sup>ル</sup>惣<sup>ソ</sup>ノ風痺ノ病ハ急證ニテモ無レビ早速<sup>サツシ</sup>ハ不愈<sup>イヌ</sup>モノナリ血痺ノ證ハ金匱<sup>キンケイ</sup>虛證ナリソレ<sup>テ</sup>金匱要略ニモ血痺<sup>クセイ</sup>勞<sup>リ</sup>一所ニヨセテアル終<sup>フリ</sup>ハ益氣湯八物湯大補湯ノ補劑<sup>ジテ</sup>ケレバ金効<sup>ジカ</sup>ハ取レヌモノナリ此モ脉<sup>チ</sup>ノ遲數<sup>タメ</sup>デ寒熱ラ分別スベシ古方家ニ金匱ノ桂枝芍藥知母湯ニ專ラ用ルナリ此モ風寒濕ノ三ツガ當<sup>シ</sup>衛筋骨三焦<sup>ジヤウ</sup>ノ痺<sup>シテ</sup>スナリ濕多キ片ハ腫<sup>レ</sup>寒多キ片ハ痛<sup>ミ</sup>風多キ片ハ動<sup>ス</sup>此症腫<sup>リ</sup>筋動<sup>リ</sup>ニアリ故ニ桂枝風<sup>シテ</sup>治<sup>シ</sup>芍藥生姜甘草ノ桂枝湯ノ如キ當<sup>シ</sup>衛<sup>ラ</sup>和

麻黃寒ラ治シ白朮濕ラ治シ知母腫ラ治シ諸藥ヲ引テ下行シ門風  
桂枝ニ佐トレ附子ハ麻黃白朮ニ佐トス或初發ニ續命湯ヲ用ル後懷症  
リテハ黃耆桂枝五物湯ヲ用ルナリ此方尊榮奉養ノ肉軟カ筋骨脆シ微  
邪ニ冀傷ラ如風痺狀モノハ風寒濕ノ氣ニ微シ傷アルナリ五物等分ニ桂枝  
湯加黃耆去甘草モノナリ然レバ黃耆建中湯ニ去甘減芍五物等分ニ血痺  
ノ劑トス加減分兩進退ニ依テ主治向力ニ異ナリ或此症濕勝身煩疼冬月麻  
加朮湯ヲ用井痛強キニ烏頭湯ヲ用ユ其外金匱中風門ノ千金三黃湯又六  
麻黃杏仁薏苡甘草湯桂枝附子湯白朮附子湯甘草附子湯類何レニ金匱ノ治  
法ナリ其外古方家見證ニ隨テ仲景ノ方ヲ用ルケリ

治法

痺證初發痛風尤宜羌活湯風濕癥○風痛如防○濕痛倍  
痛倍芩加勸枳蘇○血虛痛如地○上痛加芷葳○下痛加藁本○  
痛甚加乳○發熱加柴○小水短濶加通

風濕相搏身體煩疼手足冷四肢沉重尤宜羌活病之補藥也  
除濕觸痺湯歸芍耆補營衛去風濕蕡入手臂

遍身壯熱骨節疼痛解表升麻湯除濕解表之劑有歸順血行痺兼治  
風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣改定三互脾湯改定古方手足拘攣  
風寒濕三氣襲於足三陰經腰以下至足冷如冰不能自舉腰冷為的

通痺散

肢節腫痛。屬火腫。屬濕。兼受風寒。而發動於經絡之中。濕熱流注於肢節之間。而無已也。濕熱肢節腫痛。尤為的靈。仙除痛飲。痛在下焦。加蘖酒炒。○婦人加紅。○腫多加續腰澤沒。○一云脉滻數者。有瘀血。宜桃紅芎歸及酒虎微利之。

中風右半身不遂。手足癱瘓。及筋骨疼痛。加減除濕湯。六君子加葛根。而蒼苔濕芩。連解炎先防。踰痛桔烏枳利肺順氣。

中風左半身不遂。手足癱瘓。及語言費力。呵欠遺尿。面目口眼喎斜。寬弛頭目眩暉。痰火熾盛。筋骨時痛。頭或痛心悸。加減潤燥湯。即虛瘀行濕。此非白虎歷節風也。疎經活血湯。

遍身走痛。如刺。左足痛尤甚。左屬腎。多因酒色損傷筋脈。虛空皮風。寒濕襲感於內。熱包於寒。則痛傷筋絡。是以晝輕夜重。宜以疎經活血。

祛風順氣活血脉。壯筋骨。除寒濕。逐冷氣。又患痢後。脚痛。瘻弱。不能屈伸。名曰鶴膝風。或兩膝腫大。痛解脛枯。腊但存皮骨。拘攣踰臥。不能屈伸。名曰鶴膝風。服之氣血流暢。肌肉漸生。自然行履如故。大防風湯。夫腰背痛者。皆由腎氣虛弱。卧冷濕地。當風得之。不時速治。喜流入脚膝。為偏枯。冷痺緩弱。或腰痛。羣脚重痺。宜急服獨活寄生湯。煩渴。身四肢骨節走注疼痛。牽引胸背。亦作寒熱喘嗽煩悶。或作腰痛。或

風濕倦怠常汗微出。常汗微出為的候。麻黃復煎湯。  
風濕相搏客在皮膚關節疼痛腰已下疼重脉浮。的自汗惡風脉浮自  
汗為的候。防已黃耆湯。

遍身疼痛者五積散寒痺加乳沒細○已成風痺加羌獨防○手足痺拳加檳榔膝○感風寒濕臂膊痛或遍身麻痺者宜此湯○遍身壯熱四肢骨節痛因風寒者加羌獨穿○痺風寒多加定附○歷節風毒骨節疼痛發作不定者烏藥順氣散不應此湯

風熱走注疼痛麻痺者。風實發防風通聖散。  
因於風者百節走痛。風寒氣滯烏藥順氣散。用痛風最為良劑。加羌星  
蒼○歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定此散不應五積散四肢歷  
節疼其人短氣脉沉為留飲導痰湯加減○筋骨疼痛俗呼為痛風。  
或痛而遊走無定俗呼為走注風並宜此散和煎復元通氣散。燕地  
仙丹或青龍丹未効用大防風湯治寒濕補劑或五積散除寒之劑

調乳未○白虎歷節走注骨節痛者加孤役蘿○手足痛不能起寐此散加續歲○手足拘攣者加孤鞠○二三年不能行步合獨活寄生湯○四肢冷痺痛者寄生湯加桂附○遍身痛者此散加歸桂乳沒未○身體不能屈伸多為末溫酒調下

氣不順如痛風一身悉痛分心氣飲

諸氣鬱滯走注痛或痺者木香流氣飲

痛風因風濕者百節痛脚氣痛寒煩人參敗毒散

傷濕重著骨節疼痛澀淅欬嗽不換金正氣散加孤壯男癆愈後時々微寒一身甚麻痺肌浮四肢不能舉食少進脈細數

人參養胃湯加芎歸

濕熱走注遍身骨節煩疼胸膈不利足脰赤腫重痛當歸粘痛湯

因暑濕而身體骨節痛者胃苓湯

痛風氣虛實骨節疼痛者益元散加附子

濕熱作痛不拘上下二妙散

濕熱入隧道一身盡痛或作偏枯者大補丸

尊榮奉養人肉軟筋骨脆襲風寒濕氣血痺身體不仁如風狀黃耆桂

枝五物湯耆桂芍各七分半桂一錢半牛膝七分半以水三合煎取一合

脾胃虛而所傷濕熱為痛風升陽益胃湯

齊臥氣短卷之六君子湯

遍身痛逍遙散加防風芎

丁老人性急味厚作勞兩腿痛甚此兼虛證四物湯加桃陳膝附入姜研潛行散敷飲三四十貼而安○一少年患痢用滸藥最效致痛風斗虎此惡血入經絡也血受濕熱凝濁所下未盡留滯隧道久則必成偏枯與此湯加桃紅膝芩陳甘煎姜研潛行散入酒飲之或十貼又刺委中出黑血三合而安○下體痛者宜流濕行氣○陰虛臂尖痛者膀胱有火加知藥及桂少許○有癰合二陳湯加澤前鬚為引○痛甚加乳沒○熱者合養氣湯下之○兩腿痛者加膝陳

氣血俱虛者八物湯加羌芎濕熱腫痛者清燥湯兼痰佐以二陳湯肝火作痛者加味逍遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯○一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脅緊用附子八物湯

虛弱之人遍身痛十全大補湯倍桂加夏

痺風因痰者二陳湯加滑炒羌蒼○一人項強動則微痛脈弦而數實右為甚予作痰熱客太陽經治之用此湯加滑羌紅愈○雜病周身痛者乃風痰壅滯加星羌蒼芩滑蘇或挾瘀血者再加桃紅背心常一片水冷者導痰湯合蘿子降氣湯

八、  
藥方

羌活湯  
羌  
蒼芩  
歸  
芍  
茯  
夏  
防  
各半  
歸各一  
分半  
歸等甘減  
歸分甘半

陳耆甘量

右姜煎

除濕蠲痺湯  
歸

芍  
耆

蠲  
羌分

甘二分

姜煎熬服無時

解表升麻湯  
柴

升  
藁

羌

防

麻  
蒼

陳

歸分甘半

右姜葱水煎熬服出微汗

參  
耆

歸  
芍

茯  
芩

桂  
防

麻  
蒼  
陳  
歸分甘半

改定三痺湯  
參

耆  
防

顛  
獨

藁

歸  
芍

茯  
芩

桂  
防

通痺散  
定半獨

藁  
防

顛  
獨

藁

歸  
芍

茯  
芩

桂  
防

姜棗水煎不拘時熬服

姜  
棗

水煎二錢熬酒調服

靈仙除痛飲  
麻

郝各半  
防

荆  
羌

獨  
羌

雙  
蒼

歲  
芩

苓  
蒼

桔

葛  
芩

芎  
歸

升  
甘

各四量

右水煎

加減潤燥湯  
歸

歸  
芩

桔  
防

各  
分

右姜煎溫服

桔

連  
芩

桔  
防

各  
分

右姜煎溫服

郝

酸  
芩

桔  
防

各  
分

右姜煎溫服

右水煎入蘇姜少許溫服

歸  
分

生

蒼  
膝

陳  
桃

歲  
各

右水煎入蘇姜少許溫服

歸  
分

生

蒼  
膝

陳  
桃

歲  
各

右水煎入蘇姜少許溫服

歸  
分

生

蒼  
膝

陳  
桃

歲  
各

右水煎入蘇姜少許溫服

歸  
分

生

蒼  
膝

陳  
桃

歲  
各

右水煎入蘇姜少許溫服

歸  
分

生

蒼  
膝

陳  
桃

歲  
各

右水煎入蘇姜少許溫服

大防風湯

熟附防歸耆的仲各芎附參

膝炙分

右姜棗水煎溫服空心食前溫補良劑

獨活寄生湯

獨牛膝古今錄驗仲膝細蓁茯桂防

芎

牽牛半斛用續斷仲膝細蓁茯桂防

芍

參甘歸芍各一分

右以水三盞煎一盞三服溫

身筋冷風虛下利者除牽牛後有附一分時方無斛參甘歸

黃耆桂枝五物湯

桂枝湯去甘加耆五物等分千金加參名黃耆湯

清濕化痰湯

星夏陳茯蒼羌芩各四兩或倍生姜

芷

白芍各半

甘僵七厘半水煎入篋服

犀角散

犀銹二羚銹一前芩橘虎升五味子酒炒黑

別研廿四兩

甘僵七厘半水煎入篋服

芷

白芍各半

甘僵七厘半水煎入篋服

麻黃復煎湯

麻黃去節用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

各七分

豉升

右九味為散每服五錢水煎食後熱服

羚羊角散

羚銹二桂附炮各一兩

附炮各半兩

附炮各半兩

各七分

芎一兩歸薑

芎一兩歸薑

為散每服四五錢生姜三片水煎食後熱服

麻黃復煎湯

麻黃去節用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

各七分

柴

防羌

麻黃去節用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

各七分

湯中煎至二盞臥時半餓熱服不可飽服後微汗為度不可過汗則

熱不止而煩擾不寧也梔子豉湯解之分兩合十後時方分五服

防已黃耆湯

防已黃耆湯

杏仁酒洗各半

各七分

白朮五分

右京味水煎熱服後當如蟲行皮中腰已下如水後坐被上又以一

防已黃耆湯

防已黃耆湯

杏仁酒洗各半

各七分

白朮五分

右京味水煎熱服後當如蟲行皮中腰已下如水後坐被上又以一

防已黃耆湯

防已黃耆湯

杏仁酒洗各半

各七分

白朮五分

右京味水煎熱服後當如蟲行皮中腰已下如水後坐被上又以一

防已黃耆湯

防已黃耆湯

杏仁酒洗各半

各七分

右京味水煎熱服後當如蟲行皮中腰已下如水後坐被

被遠腰下溫令微汗差

當歸粘痛湯

羌

桂枝  
芍藥知母湯

防風通聖散

中風

烏藥順氣散

分心氣飲

諸肢節疼痛身體羸弱羸脚腫

頭眩短氣溫

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

蒼耳歸全白制猪澤

防下腫口瘻

易鹽知各一分六厘

蠆二分

右水煎服無時

五積散感不換金正氣散

同

防風通聖散

中風

烏藥順氣散

分心氣飲

諸肢節疼痛身體羸弱羸脚腫

頭眩短氣溫

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

防下腫口瘻

易鹽知各一分六厘

蠆二分

木香流氣飲氣冒芩湯利人參養胃湯瘧益元散暑人參敗毒散疫時大補丸火二妙散瘻升陽益胃湯內傷六君子湯上編逍遙散

下編

八物湯虛勞十全大補湯

同二陳湯痰飲導痰湯

附方

桂枝芍藥知母湯

諸肢節疼痛身體羸弱羸脚腫

頭眩短氣溫

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

防風通聖散

中風

烏藥順氣散

分心氣飲

諸肢節疼痛身體羸弱羸脚腫

頭眩短氣溫

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

防風通聖散

中風

欲吐者桂知防風芍藥甘麻附

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

防風通聖散

中風

烏藥順氣散

分心氣飲

諸肢節疼痛身體羸弱羸脚腫

頭眩短氣溫

各酒炒各參

膠酒洗升多汗葛

防風通聖散

中風

烏頭湯

病歷節不可屈伸疼痛者

麻芍薑甘

各六分

鳴二錢以蜜四勺煎取二勺即出頭

右五味哎咀四味以水

三盞煎取一盞去滓內蜜煎中更煎之服七分不知盡服之

麻木

麻木不仁ハシビテ覺ナイコト婢門ニ云着婢外邪ヲ去シテ云ソレ別二門ヲ立ルナリ麻ハシリクシヒルヲ木ハ木ニサハルヤウニ覺ナイコト拳ル所ノ

丹溪ノ說ノ如ク麻ヲ氣虛トシ木ハ血虛ナリ。諸藥方ハ氣虛孟君子湯ヲ用ルハ  
キコヘタ血虛ニ黃耆建中湯ヲ用ルハ仲景ノ本意ナリ。建中湯ハ氣血兩虛  
用ル某ナレ。ビ四君子湯ト井戸片ハ血虛ヲ主トスル藥ナリ。其旨ハ續編建中湯  
下ニ云如レ血ヲ補フト云ハ實ニカウレタ藥デナケレバ補レハセヌゾ。續編ヲ  
考ベシ此門ノ始ニ此ニ方ヲ立テ氣血ノ補劑トスルガ麻木ノ一門ヲ貫クニ  
氣血俱ニ虛ニ十四味建中湯ヲ用ルハ砌氣血而補ヲ用ル藥ノ凡例ナリ。諸  
氣血不足バカリニ限ラズ色々ノイタデ麻木スルモノナルガ腹中ノ瘡ツボヘ或  
氣ナドニ腹内ガメグラヌト手足ガ痺ヒビル、モノナリソレハ腹中ヲ行ラセタ  
リ。和スルヤウナ瘡ツボヘ或氣ノ療治ニテ自ヅト愈ルモノナリ。此サイトレ

コトナリ。麻木ハ中風ノ前兆ナルコトアリウチ捨テカレスモノナリ。

治法

氣虛麻木丹溪云麻属氣虛木属痰死血 四君子湯

血虛麻木不仁者 黃耆建中湯去膠飼加桂枝

傷寒氣虛不能周流於身為邪氣所侵是筋體頑麻不知痛癢脈虛者十四味建中湯  
舌指盡麻并面目遍身皆麻此氣虛也補中益氣湯加桔梗、防風、烏  
脈浮表蘇桂麻各半湯脉數甘草乾姜湯桂枝參湯脉虛者十全大補湯或大建中湯  
氣血兩虛之人兼濕痰或因風濕手足麻木加味八仙湯  
十指麻木胃有湿痰死血者二陳湯加二木紅桃或少加附行經

婦人麻木素有鬱悒者當舒鬱逍遙散加補氣行濕藥  
濕熱下流兩脚麻木或如火燎二妙散加膝為丸

麻病初起嘔吐發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩者升麻葛根湯加蘿蔔  
解肌忌大汗

風熱走注麻痺者防風通聖散

一塊不知痛癢遇陰寒甚晝輕夜重脉濶而芤或弦是屬痰挾死血宜

活血行氣三陳湯加歸芎桃紅藤對若太便黑不瀉煮小劑桃核承氣湯微利之

藥方

加味八仙湯

歸芎

夏蘆各一分

陳金參

膝

芩各一分

防

羌羃各

白芍四分

柴瞿桂瞿

姜枣水煎食遠服

四君子湯

上編

黃耆建中湯虛十四味建中湯

同

補中益氣湯傷

桂麻各半湯

傷寒

甘草乾姜湯

上編

桂枝人參湯

同

二陳湯痰逍遙散

二妙散

桑升葛湯

感冒

防風通聖散

時疫

桃核承氣湯

上編

附方

芍藥補氣湯

治皮膚間有麻木此肺氣不行也蒙古人真効神方

耆半搗

酒七分

桂枝半

分

澤漆

三分

甘草

五分

右水煎溫服

人參益氣湯

治五六月間兩手麻木四肢困倦忘記嗜睡乃濕熱傷

元氣也以此藥治之

普勞參

三分

生草

二分

升柴

一分

升分

柴

分

蘆

半

水煎空心溫服服後令少臥於麻痺處按摩屈伸少時午飯前又一  
服日二服

導氣湯 治兩腿麻木沈重

澤陳各紅少許珠六粒

苦参甘秀散升柴歸  
右水煎溫服

### 瘡

本文清燥湯ノ主治ニ六七月ノ間ト云が瘡證ノ病根病因ガイ、又イテ  
アルアノ外ニ云「ハナシアレト云ガ多ハ腎陰ノ不足カラ生スル病ト意得  
ベシ瘡厥ト云モ畢竟同事ナリ

### 治法

六七月間濕熱克肺金腰以下癰癧行步不正清燥湯  
濕熱腰膝痛者二妙散

濕熱陰火盛而成瘡症著大補丸

凡人自覺兩足熱如火炎自足踝下上衝膝腿且瘡弱軟痛能行而不  
能久立脉濡而數乃陰虛而挾濕熱也虎潛丸不應少加附  
目中流火視物暗耳鳴耳聾困倦乏力寐汗憎風行步不正兩脚軟  
側卧而多驚腰膝無力腰以下消瘦加味虎潛丸  
血虛脚腿枯絨無力瘡弱滋陰降火湯加苦參木芩柏或更加蒼朮宜本方  
氣虛成瘡者四君子湯加參木芩柏或更加蒼朮宜本方

脚膝痺軟行步乏力或痛乃腎肝伏熱補中益氣湯少加藥不已更加

漢杏脉緩顯沉困怠惰無力者加蒼澤參木茯苓

人若足常痺者後必瘻也多年不得起者有之矣參歸養嘗湯

瘻病血虛四物湯加蒼柏下補陰丸○或合生脈散加蒼柏膝○有瘀

血妨碍者加蒼柏紅

足痺弱不收為瘻厥有二一屬腎與膀胱經云恐懼不解則傷精精傷則骨瘦瘻厥精時自下是腎傷精脫也都丸九審係陽虛八味丸

脾濕流而傷腎發瘻厥者甘薑芩木湯加草薢

瘻證夾寒者五積散合獨活寄生湯見痺

瘻證因濕痰者三陳湯加木芩柏之類加簾針

陰縱者前陰受熱小柴胡湯加瀉

濕熱證肝氣熱色青沉枯口苦筋膜乾而攣急者名曰筋癰龍膽泻肝

湯火門十便良方原方龍膽泻肝湯

藥方

清燥湯

連

藻

柴

分

闊

歸

牡

絨

猪

麴

各

參

茯

升桑

橘

白朮

澤

各

蒼

耆

半

硫

金

糸

右

分

三

服

二妙散

蕤

乳潤

蒼泔浸

七日

虎潛丸

大補丸

三兩

加

駁

丸

各三兩

知

膝

各二兩

鵝

瑣

歸

各兩

五錢

燼半兩 醇酒為丸，侵晨淡鹽湯下三錢，而歎冷加飴半枚

加味虎潛丸 虎潛丸去知加參耆薯葛各三兩 珠一兩

參歸養榮湯

參歸

馳 牡 茯 陳

鴟酒相同

膝酒仲善酒破酒各石等分

甘減半

水煎肥人屬氣虛有痰加夏枯

瘦人屬血虛有火倍加歸馳

小柴胡湯

上編

大補丸火龍膽瀉肝湯

同

五積散

感冒

四君子湯

上編

短氣

二陳湯

痰癥

補中益氣湯

內傷

甘薑苓木湯

下編腰痛滋陰降火湯

虛勞

八味丸

同

四物湯

調經

附方藿香養胃湯 治胃虛不食，四肢痺弱，行立不能，皆由陽明胃虛

附方藿香養胃湯 治胃虛不食，四肢痺弱，行立不能，皆由陽明胃虛

宗筋無所養遂成瘻嬖

蠶烏白

參

茯

蕤

夏

葛

夏

葛

葛

砂

意

分半

草澄

甘

各一

姜東煎服

厥

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

&lt;p

病主方ナリ此外證ニ隨テイロノ治法アリ。舉ル所ノ如レ考ヘ用ベシ  
始ニ小續命湯ヲ載テ。剛柔ニニ瘡トモニ用ニサレバアノ方ニカギリハ

セヌ群書ヲ考ベシ

○瘡癰俗云搗搗ノコトナリ。病因ハ瘡ト同レ治法所載考ヘ用ベシ

治法

剛無汗柔有汗。二瘡頭項頭熱面赤目赤足冷腵寒頭搖背反張口噤咬牙手足挛搐。小續命湯類方多續編等之臨症可考用。剛瘡去附。

柔瘡去麻

風痰盛者人參敗毒散加防定芩蝎蝶薄

風熱。久瘡。盛暑防風通聖散加人參柴  
口噤臥不着席。足挛急以咬牙者重證危急也。大承氣湯  
風瘡。星香湯加蝎

瘴火發瘡者。瓜萎枳實湯加闔參蘇

火盛則遍身戰慄。掉猶火炎而旋轉也。火能燥物而使氣液不足。三陳湯  
合四物湯加芩連知桑蘆菔

血虛者四物湯加防羌

血虛之人發瘡或反張或只手足搗搗或但左手足動搖。十全大補湯  
加鈎蝎。○凡瘡病有出汗多。要瘡有因。去血過多元氣虧極。或外邪

相搏以致牙閔緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體搐搦若有汗而不惡寒者曰柔癰若無汗而惡寒者曰剛癰由去血過多筋無所養故傷寒汙不過多潰瘍膿血大泄多患之乃敗證也急以此湯治之如不應急加附

氣虛者六君子湯加連芩簾針○癰疽金瘡諸失血致癰癰者大劑保元湯加歸芎鈎不應此湯加歸芎鈎○小兒天鈎內鈎抽掣作痛或泄瀉縮脚內證○烏蝎六君子丸外證○釣藤飲方外也

小兒內鈎冷痛者芎歸湯加韓桂等分丁沉青竹減半水煎服  
癰疽膿水過多金瘡出血過多及嘔血下血後或虛弱人誤汗誤

十下氣血津液受虧而致此者六劑保元湯加歸芎鈎兼生陰血則陽火自退不應六君子加芎歸鈎以補脾土  
瘻癰虧損氣血用八珍湯加鈎梔○產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用此湯加般鈎

瘻癰之證多屬心脾肝三經若自汗少氣脈急按之則減少者是心氣之虛也辰砂妙香散若氣盛神昏筋掣脉滿大此心火之旺也導赤散加芩連梔豨犀若體倦神昏不語脈遲緩反溫者脾虛生風也歸脾湯加鈎梔○若寒熱往來目上視搖頭脈弦急者肝熱生風也

加味逍遙散加桂

熱傷元氣。四肢困倦。手指麻木。時々癰癧者。補中益氣湯。  
傷寒此證。過汗經虛。又翼發症。不可用表藥。十四味建中湯有熱去桂  
附桂。及芩連鷄梢之類。

藥方

小續命湯中風。星香湯同人。參敗毒散時疫防風通聖散。太承氣湯上編。  
六君子湯上編。短氣。二陳湯。痰飲。瓜薑枳實湯同四物湯。調經芎歸湯同。  
保元湯虛勞。入珍湯同。十全大補湯同。補中益氣湯。內傷歸脾湯同。  
十四味建中湯虛勞。

牽

牽ヒンハ筋ヒノニキツル病ナリ。熱アリ。寒アリ。虛アリ。實アリ。舉ル所ノ治  
法ヲ考用ベシ。

治法

虛邪轉筋。牽痛五積散見感冒

牽皆屬肝。肝主筋故也。有熱有寒有虛有實。熱者經所入。謂肝氣熱則  
筋膜乾。筋膜乾則筋急。牽六味丸加膝歸之類見虛勞。

轉筋皆屬血熱。四物湯加芩。紅薑星。コレ筋轉スル足ノ太指ヨリ轉  
上リ。大腿ニ至リ。近腰結スル乃ナ。奔瀆厚敷酒ノ人。寒ニ惑スル

ニ因テ作ルナリ

筋攣不可屈伸属寒者薏苡仁湯

兩肘俱攣者曲池九分先瀉後補

尺澤手如弓方可鍼

五分先補後瀉

藥方

薏苡仁湯

白

薏

芍

桂

酸

棘

膝

甘

兩

附

三枚

右九味㕮咀以醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶我

起行不耐酒服五合

旋覆根

絞取汁塗而封之

筋斷復續絞取汁以筋相對塗而封之即

相續如故此藥百不失一

顫振

頭搖

手擗掉

此病ト瘓癰ト相似タリ瘓癰ハ手足ヒキツリ或伸ヒ或屈ス顫振ハ身  
力振フテ屈スルコトハナイ俗云ラルヒ中風ト云モノナリ又頭バカリ振フテ手ハ  
不動アリ太抵肝熱ナリ虛熱アリ實熱アリ挙ル所治法ノ九例ヲ載考  
用ベシ此病ハ鈎藤鉤ガ主藥ナリ肝虛風熱動搖ヲ治スル藥ナリ  
○頭搖ハ頭バカリ動搖スルナリ是モ顫振ノ病ナリ  
○手足搖ハ手足バカリ振フナリ是モ瘓癰ハ手足カ伸タ  
リ屈シタリスルナリ

治法

顛振脾胃虛弱者六君子湯加歸芎鈎

脾虛者補中益氣湯加鈎○婦人胎前產後顛振瘦瘠逍遙散歸脾湯

小柴胡湯此湯皆可選用

諸風掉眩皆屬於肝若肝木實火漏青丸肝木虛熟六味丸肝木虛弱

逍遙散加參木鈎

腎虛而行步振掉者後世八味丸

頭搖有二證風火相煽卒然頭搖項背強痛以陽經證也小柴胡湯去參加防裏實腹痛不大使而頭搖者陽明府證也涼膈散大柴胡湯選用若老人及病後嗜苦人用氣血益火犯上而鼓動者十全大補湯或

十四味建中湯加羌

手顛掉者逍遙散加防荆薄

徐春甫曰治顛振以參木補虛茯苓行痰飲腎虛者青鹽丸如實熱積滯而顛振者子和之法治之及仲景藜蘆甘草之類

心虛手振統旨補心丸

老人戰動風氣所致及血虛而振統旨定心丸

藥方

補心丸 归地各一  
芍藥各一  
甘草各一  
參各一  
梗各一

酸各一  
遠志各一  
砂星各一  
蜜鋐半斤

麝香一  
琥珀一  
砂硝一  
朱砂一

為末餅糊丸菉豆大辰砂為

顛振頭搖手顛掉三十九

衣每七八十九津唾嚥下或姜湯下

各防 荆萎

定心丸

定

熟

蒸

蝎

細面

享

生

歸

芎

芍

各

附

著

雨半

歲五毛

為末酒糊丸梧子大每服七八十九

食遠血湯或酒送下

六君子湯上編 短氣補中益氣湯內傷歸脾湯虛勞六味丸虛勞

後世八味丸虛勞十全大補湯同逍遙散驚

小柴胡湯上編 傷寒大柴胡湯同涼膈散時疫

內傷 補遺

内傷虚實アリ實傷飲食ナリ虚機飽勞倦因テ脾胃ヲ傷ルサルヨツテ張三錫ガ六要ナドニ内傷一名ラ脾胃ト名ル是ハ内傷ノ病ハ脾胃ト云フラハツキリト知セシタメナリ故ニ一切ノ療治本イヅレモ内傷門ノ始ニ補中益氣湯ヲ擧ル補中益氣湯ノ方意立方ノ本旨上編ニ詳ナリ然レモ凡内傷ト云カラ必脾氣下陷バカリニ限ルベカラズ仲景虛勞内傷主方ハ建中湯ナリ此旨ハ續編ヲ熟覽シテ建中湯ト益氣湯トノニ方ノ方意ヲ數遍熟覽スバオノレト理曾々ベシオツトツテイハウナレバ建中湯ハ温補ノ劑益氣湯ハ平補ノ劑ナリ但シ建中湯ニ此スレバ益氣湯涼補ト云テモ可然ナリ益氣湯ノ證ニ少シ筋ガ透テ建中湯ヲ用タリトモ

益、アリトモ損ハ無レシ。若シ建中湯ノ證ニ誤テ、益氣湯ヲ用レバ、忽ニ害アリ。故仲景ノ方ヲ以テ内傷ノ始ニ載セ、東垣ノ方ヲ以テ次ニ載之コレ此書ノ旨ナリ。

治法

此書景東  
壇場湯  
虚勞矣  
綱領也

内傷勞倦因寒温不適寒温不適衣食起居遯退身熱虛瘦或夾外邪頭痛自汗惡寒脉微而弱黃耆建中湯○其脉浮大無力手足煩熱勞熱春夏陽升者烈秋冬陰沉者差此湯主之○表分衛虛惡寒者此湯或調中益氣湯加著桂外感重而內傷輕者和營而邪自解此湯加歸

頭疼大作氣高而熱渴面頰上氣鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言或煩躁悶亂心煩不安或渴或不渴心火上炎封肺經則渴。此脉中有濕則不渴或表虛不任風寒目不欲閉口不知味氣口脉大於人迎兩半倍俱急大而時見下代此內顯脾氣不續之脉也。此湯本證補中益氣湯○凡用此湯病熱的已退的升柴不可用。若太便此一勺的燥結小便不利或平常見此證此清氣下陷也。此湯雖數貼無妨如熱甚不去者甘草少故也○如用此湯表和而汗可出而少則不和故不開汗少肺氣不開功用黃耆汗多裏氣不守。加用人參數不退功用甘草漏火臍以下無汗氣不行下加酒黃柏

渾身拘急作脹一身係風寒外邪宜加羌防但作脹一身不拘急無  
寒邪為內寒宜加附○凡用此湯下體痺軟腎虛或虛弱者不可用。  
當與八味丸○脾氣虛而脉弦者服此湯後必發瘡脾氣虛而濕勝  
服此湯後必患痢此邪尋出路仍服前湯自愈○肝脈細肝虛餘脉  
和緩此湯加枸不限此湯可有此加味方以枸杞子補肝血故也○  
身如蟲行汗多口渴也遂用此湯倍參米加蘖酒炒服二十餘劑而  
愈○內傷如挾瘀者則以此湯加夏蔻仍少入薑傳送○內傷勞役  
感寒困倦加乾附諸加減見續編

饑飽勞役損傷脾胃元氣不足之人其脉多弦或洪緩按之無力中時

丁濬其證身體沉重四肢困倦百節煩疼胸滿短氣膈咽不通心煩  
不安耳聾耳鳴目熱如火視物昏花口中沫沫飲食失味忽肥忽瘦  
怠情嗜臥面色變赤或清利而數或半飲下便或時飧泄腹中虛痛  
不思飲食蘭室秘藏調中益氣湯○如時顯熱躁是下元陰火蒸  
々發也加地○如大便虛坐不得或太便了而不了腹中常逼迫血  
虛血溢也加歸○如身體沉重中濕雖小便數多亦加茯澤蒼蠽  
如胃氣不和加湯洗夏捷胃氣壅有嗽加姜地漏陰火○如兼燥熱  
下焦加蘆地

胃虛弱不能營食大便或瀉見內傷之候者升陽順氣湯

脾胃虛弱所傷。濕熱兼內傷之候者升陽益胃湯飲食勞倦者八解散或去參輕症加桔

脾虛不思飲食食後致飽悶者香砂六君子湯

脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒者香砂養胃湯

脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇脹脹脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄瀉水穀不化肢體倦怠不思飲食者建中散內傷太便閉者補中益氣湯加藜枳杏小便不利加膝汗多加的減升口乾加葛根珠無汗加用升火病而熱不退氣短促者保元湯加桂附○煩躁加歸鵝鬚珠。

酒渴嘔吐胸中煩悶全不食尿亦苦焦乾脉細數錢氏白朮散加砂陳芩間用酒蒸大黃丸

內傷挾痰者二陳湯加參耆木對或蘿蔔無脾氣下陷內傷七情皆能動血治宜開痰行氣加酒紅升歸連虛者加參术及附一片熱者加梔牡蠣殼氣急者痰加薑桔○內傷痰火發厥脈弦滑者加蘿蔔皮加附子火加芩連梔子肥人加參對○脾虛有痰元氣未虛不下陷宜補中虛以運痰降下加舶麴麥兼用升麻提起

負重傷血者在胃口則欬嘔血腥痞滿少食膈間隱々刺痛脉必氣口見弦飲良奔馳入多犀角地黃湯加虎酒稍奪其勢吐血勢即當因

痛制宜餘積不攻而去矣

陰虛火動脈洪大而不作瀉，六味丸惡寒，後世八味丸腹痛少食，理中丸作瀉，六味丸去熟，加遠沉砂不應，加破鉢倘病顛倒難明，必從脾胃

胃調理

內傷久而不愈，潮熱微汗，欬嗽不思飲食，補中益氣湯加乾疎自愈，不必理痰治嗽，正氣足則痰嗽自除矣。丸用補中下體疎軟或虛弱者不可用，當與八味丸。內傷中虛，自是內傷治例表熟或潮熱自汗補中正方表熟加熟防，腹中滿加附，中氣不和加青曲間用八珍湯調理氣血，俱虛十全大補湯。陰虛火動脈洪大而不作瀉，六味丸。

寒此丸主之。

虛人飲食所傷及外感暴病新愈之後，皆當用六君子湯理脾為主，新愈之後內傷勞倦及久病之後用補中益氣湯理脾為主，理脾則百病不生，不理脾則諸病續起。又之以入於胃也，泄瀉之類起。食入則困倦精神昏冒，欲寐者氣虛也。此湯加麴麥楂。

藥方

補中益氣湯  
耆病甚勞役費甚者一錢  
名年歸二分酒焙乾或日乾以和血脈陳不去百  
又能益元氣，得諸甘藥乃可。若獨用瀉脾胃升升分或三分引胃

氣上騰而發其本位便是行春升之令。柴二分或三分引清氣行少陽之氣上升。昧三分除胃中熱利腰脊間血。右件藥咬咀都作一服水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去楂食遠稍熱服如傷之重者不過二服而愈若病日久者以權立加減法治乏加減法見續編

調中益氣湯蘭室秘藏 橘如腹中氣不轉運加桔一分如無此症不加藥酒洗各升此丁味為上氣不足胃氣與脾氣下溜乃補土氣從陰引陽柴各三分有數者去之。甜桔各五分蒼各五分耆一錢右水二大盞煎至一盞。脾胃論無藥有桔此加減之法也以蘭室秘藏可為本方。

升陽順氣湯 菖一錢夏三分。穀二分曲一分子半炒升歸陳各一錢。藥各五分參三錢

右水二盞每二分煎一盞溫服食前

升陽益胃湯 防風各七分連五厘。白朮各七分連五厘。柴各半連五厘。參二分砂一錢桔各一分獨蘆半橘一分澤不淋。茯小便利勿用。杏渴者勿用

右姜棗煎以水三盞取一盞溫服早飯午飯之間服之。厭服藥者右香砂六君子湯 参砂桔甘益各一分。香附五厘。昧三分。分量分二貼。陳朴各半連五厘。右姜棗水煎正傳本方加翻藿砂

香砂養胃湯

翻砂桔枳朴曉

藿荳白

茯陳

夏各甜庵

姜枣水煎

建中散

陳去白

半斤朴

姜汁

東各一

夏湯燒罐炮

甘谷五

已上六味用

水三斗煮

令水盡焙乾為散白湯送下

八解散感冒保元湯

虛勞六味丸同

八味丸同錢氏白术散泄漏

二陳湯痰飲犀角地黃湯吐血

六君子湯上編短氣

不能食

不能食ト云ハ何ナリモ不能食ノ訣ガアツテ不食スルナリ故ニ別ニ不能食ト云病門ヲ立ル書ハ希ナリ皆諸病ニ因テ不食スルナリ然

何病モ無ク外ニ煩キコトモナクテ不食スル脾胃不運エナリソレニ香砂養胃湯ヲ用テ多シ其効故ニ不食トサヘ其所ニラ不考香砂養胃湯ヲ用ヒユヘ却テ不食レ或他病ヲ生ス其時ラ治スレバ食自進モノナリタトハ虚ニ因ヒ四物湯ノ類ニ食進ニ熟シハ芩連デ食が進ム此訣ヲ知ゼシタメニ此書ニ不食門ヲ立て始ニ香砂養胃湯ヲ挙テ類ニテ不能食ノ方剣ヲ記スルナリ此方藥ニ不可泥不能食ノ所以ラ考テ療治スベシ

治法

脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒香砂養胃湯

惡食有虛實實者下悶痛口苦二陳湯加枳連虛者倦怠面白舌黃心下軟也異功散加砂桔痰惡心六君子湯加香砂

脈虛氣弱脾胃不和或兼而惡心不食六君子湯枳實理中湯選用有

痰可考寒微甚燥濕導痰湯

少食無泄瀉者二陳湯加苡仁制歸芍甘草因飲食實積有更加苡仁食過多而傷停留中完胃食氣則區加砂未愈更口桔或青

○惡食者胸中有物痰食宜導痰

此湯加苡仁桔梗

病人脉緩脾不健

怠惰四肢重著或便泄瀉不食者此濕勝也胃苓

湯有食滯泄瀉加楂麥

胃虛不能食而太渴不止者不可用淡滻之藥乃胃中元氣少故也錢氏白术散補之如桔梗或此湯下三黃丸空心服最妙也此補泻兼用ノ胃弱半者二用ルノ法ナリ近世ノ如ク無用捨下劑ヲ用ユルニアラズ○一婦人五十餘歲有悲憤之事飲酒倍常已久今也胸寒不食口乾脈濡而無倫次用此湯而愈後改用增損四物湯而全可老僧不食只美湯茶而發熱先與香葛湯順和散大半愈熱血燥未退用生津補血湯而全安

脾冷甚食不進者宜理中湯不効則附子理中湯加砂  
餓不欲食此證有二一屬胃中虛熱六君子湯加薑附連一屬陰火

乘胃六味丸加桂枝

十四歳女全不食服酸果雜穀如常香薷散下枳术丸而愈  
諸病之後酒漸憎寒或潮熱者必可用人參養胃湯謙云此法甚佳然

病後虛甚者可用純補之藥此湯不可用

不限大人小兒無餘證只有不食飯者以參苓白朮散為煎餌可服  
之自然食者也人參去之亦佳每處經驗之法也

藥方

香砂養胃湯內傷異功散  
上編 短氣六君子同二陳湯痰飲胃苓湯上編  
附子理中湯傷寒六味丸虛勞

錢氏山朮散泄泻生津補血湯

下編 脾膈

附子理中湯

傷寒

六味丸虛勞

香薷散感冒枳术丸傷食人參養胃湯瘧  
參苓白朮散虛勞  
傷飲食補遺

此病八何仔細モナク飲食ヲ消スルニデレバ其傷ハ物ニ因テ藥ヲ異ニス  
ル東垣ノ諸枳朮丸并所載ノ諸方テ顯然明白外ニ待コトナシ後世テハア  
人少ソレクニ分カテ療治スルコトガムツカシキユヘ家傳ノ方ナドヲ秘藏シ  
胃散一方ノ藏デスムヤウニルハ正道ノ療治ニテハナシ必ス一九一藥テ治スヤウ  
ナコトアルベカラズ其傷ル、物ノ寒熱或重キ物古輕キ物或大過ト不大過ト  
其病人ノ虚實ヲ詳考ヘ施治スベシ但ヒ食傷ト知ルヒ別ノコトハナイムツ  
カシキ食傷食傷十三カスルコトアリ或他病ト食傷ト雜ルコトアリコ

が專一ノ意得ナリ先づ右寸關ノ脈が繁盛ナレト云ガ古ヨリ云フコレニ達  
ナイモノ右關ノ脈テ必知ルモノナレ寸脉バカリテナシ何ヲ食ンタルト食物  
吟味尤力肝要ナリ或嗜氣吞酸ナドスルモノ頭痛腹痛發癥寒眩暈ソ  
外イロモノ目ツケアルモノナリ常ニ多キ病ナルホドニ意ヲツクレバ見易キ  
病也常ニ澤山ナル病ユニ仕損レモ多キモノ中風門ニ記ズル食厥ノ證不  
子見合テ油断スベカラズ霍乱門上參者ズレ

治法

治痞消食強胃枳朮丸

老幼无氣虛弱飲食不消或藏府不調下痞悶橘皮枳朮丸

為人所勉勸強食之致心腹滿悶不快麌來枳朮丸  
破帶氣消飲食開胃進食木香枳朮丸  
因冷食內傷者半夏枳朮丸  
傷肉食濕麌辛辣味厚之物頻塞闊舌不快三黃枳朮丸  
破除寒溼氣消寒飲食木香乾姜枳朮丸

開胃進飲食木香人參生姜枳朮丸中補藥脾胃弱者宜用之  
傷食總司香砂平胃散肉食不化加楂蘿○米粉麵食不化加麌麥  
○生冷瓜果不化加乾青○飲酒傷者加連葛梅○吐瀉不止加枳  
白夏枯去枳

胸腹有食積。大便不通者。枳實大黃湯。腹痛甚。加芻。

近來古方家傷食ト云ヘバ、胸腹痛。大便不通ハ勿論ノコト。微シノ腹脹停食アレバ、大便通不通ニ拘ラズ。小承氣或厚朴七物湯。厚朴三物湯等ノ下劑ヲ主トス。妙藥ノ新病ハ大便下利ノ即効アリ。老人小兒稟賦虛弱ノ者ハ、下後疲レルト云ヘ。凡曾ア調理ノ劑ハ用井ス。薤翁トノ肥立ズ。是ニ於テ、佐蒸ト偽リ。他医ノ調補ノ劑ヲ用テ全快スル。今京都ナド素以日大友ノ理會メ古方家ノ医ヲ欺クオリ。尤ナル哉。予金匱撰註ノ序ニ書ス如レ仲景ノ書モトヨリ。金匱ニアラザレバ、傷食ニ用ル輕劑ナシ其了簡モナシニ無理矣。体ニ承氣七物等ヲ引付テ用ルトイヘ。虛弱ナルモノ又ハ輕症ニハ害多シ。京都ナドハ病家不案内アリトイヘ。外ヨリ此言或聞合せ用ルニヨリム。サトシタル仕損ニナシ。仙國ニテハ多クハ此害アリテ取リ。逐レナリ難シ。○去秋近驛一婦人三十歳計多産ニノ。年

瘡面青氣力弱シトイヘ。外ニ餘症モナキニヨリ平常<sub>子ニ</sub>養性モナク。服茶モセズ。或日生糞<sub>ヒツク</sub>。食シ吐逆<sub>ヤキ</sub>。斯ト医消導ノ茶ヲ用井効アリトイヘ。二十三日ノ申次第ニ處レルトイヘ。食事モ不絶。薦萬タル所ニ腹滿脚腫<sub>ヒダリ</sub>。斯此一朝一夕ノ事ニアラズ。血虛メ大補湯。養營湯ナト。礪<sub>メタ</sub>ベキ症ニメ曾テ甚手當ナレ。右ノ生芻ニ傷ラレ。吐逆後倦怠スルモノハ血虛ノ上スデニ。脾胃ニ及ブニヨリ。腹滿脚腫或逆上スルモノハ無根ノ火穴<sub>ヒツク</sub>。症ニメ前医益氣湯ヲ投ジ。升提ノ劑ニテ亦六味<sub>ヒツク</sub>。真陽虛シ。虛火上炎<sub>ヒツク</sub>。遂ニ氣急ヲ發ス。此時ニ至リ。病家驚キ急ニ古方医ヲ招キ。診セシム。古方医云是脚氣衝心<sub>ヒツク</sub>。越婢湯ノ意ナリ。寸效ナシ。翌日ニ至リ。平水丸五錢斗<sub>ヒツク</sub>。兼用<sub>ス</sub>些甘遂入ノ逐水ノ礪<sub>ヒツク</sub>。劑ナリ。服スル。丁酉度ニメ黑色ノ大便下ル。刃兩變<sub>ヒツク</sub>ノ氣急定リ。即効アリテ。食氣モ不絶。病家医師庄ニ安堵ス。脉ノ虛實ハ不知コレ。古方家脉ニ不拘ユヘナリ。其夜

二至リ次第ニ倦怠甚シ。唯睡子レル如シ。此ニ於テ又右ノ古方医ヲ招キ。前医益氣湯ヲ投セシ。医ト議スル。トイヘヤハリ急定ルトイヘ庄。大イニ元氣脱シ倦怠甚シ。キ時大補ノ参附等モ最早届ク。ジキナレ。庄少シノ調補モ用ズ。麻黃杏仁甘草石膏湯ジニイトハサテク。痛シキコトナラ。スヤ是古方家病ニ補ド云。丁ナント云見識イガ、利ニナリ。テタヒ。補藥ヲ用テ見タウテモ負惜ニナリ。テ投ズ。即ち得病也。病人ノ甚々不運ナルコトナリ。他國ニテ庄。古方家ヲ頼メ。下劑ヲ用井子バ。ナラヌ勢ナラバ。細ニ後世家ノ医ラ豫メ。賴置ベシ。必古方家ノ医ト立合。力ラズ銘々ノ得手クニ。任スベシ。此目利ノコト。病家示テ書シ通リナリ。殊更近來峻劑行ルレバ。陰沖断スベカラス。此病婦多産血虛ノ症。生鰯ノ食傷半ニアラズ。下地虛分ナレ。庄元來病婦ノ親族古シガラ信メ。聊モ補藥ヲ嫌フ。叶逆甚ク脾胃頓ニ虚ス。虛寒ノ候。

ナリ亦益氣湯ノ涼補升提添元陽虛憊シ氣急ニ至レバ。平水丸ニテアシ効アレ。庄下後調補モナシ。所謂病愈而人覺者從古之禁戒トハ是ナリ。京都ニ限ラズ。城下ナドナラバ。衆医ノ議論セアルベケ庄。邊鄙ハ右ノ庸医ト古方家ノ見高ク右ノ立合ノ医ナドハ奴隸ノ如ク掌ハシマ。以モ前函ノ云言ハ。オケシ病家ハ素人医者次第上編題言ニモ云ヘル如ク田舎ニテハ此弊アリトハ此事ナリ。是病家ノ覆轍ノ戒ニ書スモノナリ。兼テ意得置ベキコトナリ。

内傷生冷飲食厚味之物。肚腹脹滿疼痛者。行氣香薷散加體油。謙云此方感冒兼氣與食之。主方也。然食滯雖不兼氣與外邪而為食傷通治之劑有經驗尚可考用。勿兼也。

傷食之證頭痛發熱惡寒。但身不痛耳。治中湯加砂。食過多

而傷停留中脘。聞食氣則嘔。此湯加砂丁。○挾傷飲食生冷。嘔逆積

痛者加桔。

虛弱者傷食之輕證。四君子湯加麴。

痰食已消。中焦未和。不思飲食。或嘔或瀉。倦怠面黃心下按之而軟者。

六君子湯加桔。縮憲湯者。七味白朮散。

食飲胸膈飽脹。大便溏泄者。升陽順氣湯。

食積者。不換金正氣散。老醫云。食在下者。用此方。則却復腹痛。

食厥探吐。而後氣滿者。風寒者。藿香正氣散。八味順氣散。

藥方

枳朮丸

枳麩炒黃  
本色一兩

白朮二兩

右為極細末。

荷葉裹燒飯為丸。如菉豆

一倍。大每服五十九。

白湯下。不拘時候。量所傷多少。加減服之。

橘皮枳朮丸

橘

枳各

白朮二兩

麩蘖枳朮丸

枳

麩炒麩各半

白朮二兩

右件為細末。

荷葉裹燒飯為丸。如梧桐子大。每服五十丸。熟水送下。食遠

木香枳朮丸

橘

枳各

白朮二兩

右丸法同前。

半夏枳朮丸

夏湯洗七次燒乾

本色一兩

枳各一

白朮二兩

右丸法同前。

木香人參生姜枳朮丸

乾姜三分

橘三錢

參五分

陳四錢

枳炒一兩

附五錢

右丸法服。法烹制同前。

木香乾姜枳术丸

桔梗三  
韓信五  
枳一兩  
附子一兩

右丸法同前

三黃枳术丸

芍藥二  
芩二  
連酒

虎炮

麥炒

橘

右丸法同前

枳  
芩炒

五  
錢

右浸蒸餅為丸如豆大倍每服五十九白湯送下

香砂平胃散

桂枝  
陳皮  
蒼朮

朴硝各二分

枳  
蘿各六厘

砂一兩

桔梗一兩

甘草一分

附子一兩

右姜煎加減見前

枳實大黃湯

枳  
朴

虎

棗

甘草各一錢

少水煎空心熱服腹痛甚加稀

保和丸

枳實導滯丸

紅丸子

砂二陳湯

枳杷葉湯上編

行氣香蘿散

感冒不換金正氣散

同治中湯霍亂

升陽順氣湯內傷

八味順氣散

中風四君子湯

上編短氣

六君子湯

同

### 傷飲酒

丹門記云如ニテ外ニ云丁モナシ古ハ酒懲丸ノヤウナル熟藥ヲ用ルナリ東垣先生ヨリ改メニアノ類ノ藥ハ不用ナリ東垣葛花解醒湯ハ極メテ良方ナリサレモ酒懲丸モ證ニ因テ可用一向ニ不用藥トハ不可意得傷胃吐血ト云コトアリ吐血門ヲ考ベシ

### 治法

飲酒太過區上瘀血心神煩亂胸膈痞塞手足戰慄飲食減少小便不

利葛花解醒湯

傷酒者五苓散加葛花解醒湯者葛根煎湯用此散

飲酒而傷風發熱吐逆者藿香正氣散

酒毒發燒渴者人參敗毒散加葛連

飲酒人元氣虛弱無力飲食減少面紅者補中益氣湯加夏芍葛連

傷酒夾虛者六君子湯加乾陳○酒客感冒倦怠不思食○遍身痛○六脉浮大按之豁然此湯加荅歸葛

傷酒惡心嘔逆○吐出宿酒○昏冒眩暈○頭痛如破○者理中湯加葛飲酒人食油膩物○腹痛○吐瀉不正者順氣和中湯去枳加藿乾

薄荷涼膈散加葛連名清心湯用蜜築同煎峻劑也宜斟酌之

藥方

葛花解醒湯

上編  
傷食

五苓散

傷寒

理中湯

上編  
脾氣

藿香正氣散

感冒

人參敗毒

時疫

涼膈散

同上

補中益氣湯

內傷

六君子湯

上編  
脾氣

順氣和中湯

峻飲

泄瀉 補遺

泄瀉ノ因種

アリ

本要上編ニ述ル如シ右ノ外ニ濕渴ニ風藥ヲ用ルコトア

リ升陽除濕防風湯

神木散

類ニナリ湿門ヲ參看スベシ然ニ痢病常ニ

紛ルモナリ其分別ハ餘證ニカハズ唯

タタチ

裏急後重アルヲ痢痛トシ裏急

後重ナキヲ泄瀉上丸此的ヲ以テ分別スベシ但初無裏急後重後云乎裏急

醫學手引草

卷之三

中編下 泄瀉

平四

烏巢堂藏

後重スルコトアリ己ハ泄泻ヨリ痢病ニ變スルナリ初裏急後重アツテ後重急後重ナキ八痢病愈ルトキノ吉事ナリ

治法

濕漏四苓散加蒼○火漏加通苓

泄漏遍身浮腫者五苓散濕漏暑渴火漏瘀漏加分柴○濕漏者渴水多而腹不痛腹響雷鳴脉細口暮陳蒼驥訶砂甘蠻梅燈○暑渴腹痛有積滯者此散利水道合蘿香正氣散外感若雖無積滯腹痛甚者此散加桔或六和湯暑食加桔此散與六和湯同煎調下蘿合香圓○火漏痛一陣泻一陣此散加連芩○熱漏火漏暑渴太於同

著糞色赤黃有聲少痛糞謂熱而如湯煩渴小便不利者此散用香連丸或傷暑氣泄泻者暑與熱漏同胃苓湯或此散加芩

傷冷食泄泻者平胃散加香砂轉豆蔻

飲食停積浮腫泄漏脉證俱實者胃苓湯○氣虛加參○虛寒加乾○水泻加滑○食積加麥芽○痰多加夏○濕勝加防升升提○火泻加升提○腹痛加桂○渴不止加訶○夏月泄泻去桂加芍連○夏月先泻下而後雖泄滯當用此湯○夏月泄泻去桂加芍連妄者伏熱在內故也合黃連解毒湯

夏月泄泻或兼嘔吐者益元散以蜜汁調服

夏月泄瀉或傷食濕瀉俱以兼腹痛者藿香正氣散○七情氣瀉虛痞

太便欲去而不去此湯加丁砂良

冷瀉不止者不換金正氣散加楂

訶

泄瀉通用大人小兒俱用之益中散

劉艸菴治泄瀉丸方<sub>詳世醫</sub>如神

消食止泄止吐消疳消黃消脹定腹痛益元氣健脾胃啓脾丸良方

泄瀉脾胃虛四君子湯加陳朴姜棗○大府瀉利加罂粟殼炒○泄瀉不正加訶<sub>或加楂</sub>○氣虛泄瀉加蟳升○虛瀉困倦無力內傷飲食飲食則瀉加楂砂蓮糯為末砂糖湯調服○多年泄瀉肚腹痞

滿諸藥不効脉弱而瀉本方用五十餘貼加陳楂煎○水瀉不止加楂訶<sub>或</sub>○小兒泄瀉本方加楂藿○下利久而氣血大虛腹痛後重不食或產後得之者加歸陳糯○虛煩或泄或渴本方去參不必去加芍○脾氣虛弱久泄食少者加薯蓮楂桔扁○泄瀉挾熱焚渴腸垢便瀉痛一陣瀉一陣口乾者此湯合芩散加連及通少許<sub>詳</sub>○一男年七十餘歲泄利腹痛一點治之及十七八日而不愈行圃晝夜十八九度不食微寒口渴脈緩弱異功散加芍妙升防內傷生冷腰痛利青白六君子湯加藿或砂楂燒○若傷魚肉之類者加楂砂○若痢色紅黃赤黑腸胃俱熱養胃湯加楂連

脾胃虛弱食不進、大便堅滯或泄泻、參苓白术散

脾胃虛損泄濁久不止者參木膏

大人小兒風冷乘虛客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴痾  
痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度胃風湯○老人五更  
漏腹微痛脉緩者加砂○產後感風冷泄瀉者此湯主之

寒漏者惡寒身痛腰脹切痛雷鳴瘡生冷丸穀不化四肢冷理中湯  
加茯朴○似痢非痢寒熱不調證或熱積內而以冷藥冷物冷之或  
寒積內而以熱藥熱物溫之寒熱相搏或濁或溏裏急後重利色不  
者香連丸或此湯加連翫○素虛冷泄泻煩躁引飲轉泄瀉者參附

湯或此湯加連棗名連理湯。因傷酒。每朝泄瀉者此湯加鶯。用酒

食滯久大便色白腸鳴切痛脈沉遲身冷不渴小便清或綿々腹痛者  
附子理中湯加蔵

脾胃虛弱不思飲食五更泄瀉不止者二神丸加吳楂減半名四神丸

久瀉米穀不化水穀入口即時直下元虛冷滑脫溫脾散  
虛寒滑脫不止者木香散

濕利滑脫不止者四柱飲或六柱飲

久瀉穀道不合成脫月乃元氣下陷大腸不行收令而然補中益氣湯  
加訶礬末以梅肉為丸或四君子湯加防升○憂思太過脾氣鬱結  
而不能升舉陷入下焦而成泄瀉者逍遙散去歸加升椿或越鞠枳  
术相和服不確用此湯加椿○經行時先泄瀉者此脾虛也脾主血  
而惡濕經水將動脾血先注血海然後下流為經脾血既虧不能運  
行其濕所以必先作泻此湯加棗有棗兼連若飲食減少六君子湯  
理中湯選用○產後泄瀉若小便混濁如泔或大便中有白沫如腸  
垢者乃元氣下陷之故並宜此湯加桂枝棗升舉之或臭水不止加  
艾附吳若兼瘀結不通腹脹喘急神舟不能復圖也○瀉久不止大

糲如竹筒直出無禁氣陷者升陽補胃湯此湯加的○滑泄痞悶加

歸

憂思太過云見前條益氣湯中加減逍遙散去歸加升椿或越鞠丸  
枳木丸相和服○久瀉者木方加蘆

傷寒下利惡寒手足溫者陽邪陷太陰經小建中湯

肝虛所傷於忿怒克脾土泄瀉而青者五積散去麻○百二十方云泄  
瀉去枳加蠶丸

發熱下利參蘿飲加蓮鴟

有積聚轉症兼氣滯瀉者杏蘿散

痰瀉者或多或少或瀉或不瀉脉沉滑二陳湯加蒼蠅薯車通朴韓梅  
燈若瀉不止去朴加訶臘○食積此湯加澤蒼附查麴或吞裸和

丸

痰瀉者回春二陳湯

一人下疳瘡或發或止患泄瀉，醫與理中湯，悶厥而漸甦，脈濶長按弦數丹溪云是下疳深重者也。與當歸龍鬚丸去麝麝四貼而利減小柴胡湯去夏加連芍芎姜四貼安。

下利愈而後至其年月日發者可下之大小承氣湯

泄瀉腹痛有積或無積蘿合香圓一方五苓散加桔下之

五更瀉是腎虛失其閑藏之職也。經曰腎司開闔，腎開竅於二陰。可見腎不但治小便，而大便之開闔皆腎操權也。今腎既衰，則命門之火熄，而水獨治。故令人水瀉不止。其瀉每在五更，天將明時必洞泄。二三以腎旺於亥子五更之時故特甚也。惟八味丸以補其陰，則腎中之水火既濟，而開闔之權將宜。况命門之火旺，則能生土，而脾亦強矣。有用此丸加遠益兼調脾腎而愈者。有用此丸七分雜二神丸三分服之，而愈者。有用茲煎湯送四神丸愈者。有用二神丸加茲桂茴，陳米飲糊為丸服。

脾氣虛寒不禁者用六君子湯加桂若命門火衰脾上虛寒者後世八味丸腎水不足之人患泄或過服分利之劑而渴者加減八味丸失治必致小便不利水腫脹滿等證成矣○脾腎虛者四神丸命門火衰者些丸○漏在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸日間服白术散如不應或愈而復作或飲食少思急用此丸

藥方

益中散 附子 茯苓 陳各一錢  
劉艸窓方 蒼朮炒陳 防風各一錢 右糊丸如棗豆大 久泄加升分  
加減一方 附子十錢 参三錢 茯苓一錢 暮草一錢 薑甘三分 右六味細末治脾

胃虛久瀉菜餅小鳥類輕症常用去參投丁應泄瀉極効  
啓脾丸 参三錢 附子二錢 蔴一錢 蓮各一錢 陳澤各一錢 甘各一錢 或加使右細末煉蜜為丸或姜棗煎到十四歲者常患停食諸疾專用  
二神丸 破四兩 磬二兩 右為末以大肥棗四十九枚生姜取棗肉搗膏入菜和丸如梧子大每服五十九鹽湯下一方飛霞子加桔梗兩名三神丸○師曰二神丸之加桔梗旋氣機不如砂行氣尤為善運○加吳茱萸四神丸

溫脾散 老薑炒蜜參白芍炒沙棘炒姜炒阿膠酒炒阿膠丁桂附制連姜砂陳朴炒甜茶分 右姜棗煎

木香散 甘 韶各 附 丁 楷 麻 薤 詞 赖脂各

右為散每服三錢陳米湯下世木無乾多歸

四柱飲 參一兩 茯 附炮

桔梗各

右為細末每服四錢

蠭五片大棗二枚煎如稀糜入鹽一字調服○六柱飲見上編

四苓散 五苓散

上編

傷寒

理中湯

同

小柴胡湯

同

大小承氣湯

同

小建中

同

附子理中湯

同

不換金

藿香正氣散

五積散

參蘿飲

香蘿散

五方

胃風湯

上扁

泄渴回二陳湯

痰平胃散

傷食

二陳湯

渴胃芩湯

上扁

益元散

暑

補中益氣湯

內傷逍遙散

鬱四君湯

六君子湯

異功散

短氣

參采膏

上扁

參苓白朮散

同

六味丸

同

後世八味丸

同

、痢 補遺

痢病ノ證治古今ノ論說紛々トシテ適從シ難シ此病時疫傷寒ト併テ最大病ナリ謙翁曰予有一得故記以俟明論凡此病ヲ療セハ不論證以脉肝要トスベシ脉實ハ證ニカ一ハズ實證トソ<sup>ノ</sup>疎滌<sup>ノ</sup>斯ベシ脉虛ハ證ヲ不論虛トスベシ之脉不甚實不甚虛モノアリ其人平素ノ虛實ヲ考テ或為虛補之或為實瀉之其補瀉ノ輕重臨病<sup>シテ</sup>斟酌<sup>シテ</sup>スベシ或初實ニシテ後ニ虛トナルアリ日數十前医ノ所用ノ補泻温涼ヲ考テ葉ヲ用ベン諸虛脉ニツイテ虛數ト溼虛<sup>ノ</sup>異<sup>ノ</sup>醫リ虛數ナラバ平補スベシ異功散ニ加減シ參歸芍藥湯類湯ツヨクバ七味白朮散ノ類可考用虛脉不數不遲ハ便虛寒ナリ理中湯虛運脉虛寒甚シ雖溫

補之猶恐不及惟附子理中湯ノ類大溫補ノ劑ヲ用ベシ實數ノ脉ハ芍藥湯王  
節齋芩連芍藥湯遲實ノ脉ハ希ナルモノナリ平胃散ノ類加姜附若木抵不  
虛不實モノニハ通用初起道三ノ和中湯雖歷日數有此證則可宣之良方也  
此法證ヲ不論唯脉ノ遲數虛實ニ因テ療之法ナリ證候種々名狀甚多シトイ  
ハ因脉而否證之法ナリ然レモ因脉コモ未熟ノ中ハ精ク診察シ得ザレ  
ハ抵上編ニ云如ク施治可無誤治乎

### 治法

痢病初起裏急後重而便膿血所謂行血則便膿自愈和氣則後重自  
除此方初起壯實者宜用之芍藥湯

痢病通治初起屬濕熱者宜用之王節齋芩連芍藥湯加減法見續編  
漏痢腹痛後重或濕毒下血身熱久而不愈及膿血稠粘芩連芍藥湯  
痢疾不甚虛不甚實不偏寒偏熱不問赤白通用和中湯

冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重香連丸良方也虛人兼服平  
補之劑最宜渴加梅以膠和丸。又冷者以煨蒜和丸。久痢加龍  
○噤口痢加罐○小兒冷熱痢加訶瀉痢加餽

痢疾多因食積必保和丸。丁人飲水過多腹脹瀉痢帶白用蒼朮朴  
枳滑煎湯下此丸。濕熱下痢小便澀少煩渴桂苓甘露飲之症也  
能食脈洪大而緩腹痛後重桂苓甘露飲送此丸。濕多熱少食小

腹痛後重夜多利下胃苓湯送下此丸。氣虛面色痿黃或枯白色  
瘦倦痢頻併痛後重不食脈細弱或微汗出黃耆建中湯下此丸。良法  
○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮下此丸良法。脾胃不和食寒  
腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍藥桂葛附下此丸良法。脾氣大  
虛腹滿頻併後重不食或產後得此證四君子湯加歸陳下此丸。良法  
○下痢赤積身熱益元散加通芍陳附為湯下此丸良法。

痢疾初起裏急後重腸胃中有積塊者木香欖榔丸。

暴痢赤白相雜腹痛裏急後重者胃苓湯加楂換。白痢初起裏急後  
重頰上廁或所下少者濕熱鬱滯所致此湯加楂縮。

痢毒滯而上攻者平胃散加連楂換。痢後調補宜異功散惡甜者此  
散加參芪各半錢。

痢疾輕證不換金正氣散加連枳去甘

前證兼外邪者藿香正氣散加枳。戴氏曰赤痢血色鮮紅或如蛇蟲  
形而其間有無鮮此湯加點三十粒。

時行瘟疫下利赤白發熱口乾身痛人參敗毒散加陳倉米連錢東名  
倉廩散。噤口痢加陳蘇連。痢後手足痛加枳換。一男子痢瘧晝  
夜二十四行裏急後重便膿血腹痛頭痛熱甚脈弦數此散加芍桃  
虎。一人常過酒近日渴甚頭面風疹出腰脚附腫大使虛坐一日

四五十行通只工二次脉細數此散加芩連葛歸桃○痢疾用此方  
因外熱其候頭痛為的宜角之頭痛兼腹痛者加散休息痢亦加之  
○因風濕者雖冬月與此散揚妙○一鄉患痢世俗謂之腹瘡病加  
粳蓮○熱痢與訶姪則雖痢止而熱不退此散加三黃或芩宜解散  
其藥毒

痢久一二十日痢去多不止用此調理氣血自愈參歸芍藥湯

痢日久虛寒滑脫或邪去而後重仍在者真人養藏湯

身熱外感者不惡寒小柴胡湯去參惡寒發熱身首痛表證也微寒  
可和解用蒼芎陳芍甘蠻○下痢赤白腹痛身熱加芩芍○痢疾加

連枳去甘○瘧痢此湯合四君子四物湯加耆名三分散  
一種陰虛痢疾切戒攻積之藥凡見痢十五色濃血稠粘滑泄無度發  
熱煩渴脣干急痛至夜轉劇而惡食或下鮮血者便屬陰虛脾氣未虛也  
急宣救熱存陰為主白頭翁湯加甘膠

傷寒論曰傳經陽邪內陷與胸膈中焦陽氣不能交通故陽氣不行四肢厥冷似寒證反熱證腹中痛或大便泄利者四逆散

痢疾晝無度夜間發熱而譖語煩渴與敗毒散無効九味清脾湯加  
歸芍而安  
熱痢兼腸痛者左金丸香連丸之意也

丁人患痢甚逼迫其證承氣湯證也。發以氣口脉弱先用參术陳芍十

餘貼而並用後胃氣漸完承氣湯下痢愈而後至其年月日發者可

下之

勞倦氣少脾胃虛而惡食此其症也。此症屬熱脉虛數四君子湯○赤

痢加歸芍數○白痢加燉數

疫痢血痢身熱尿浮者陽旦湯。血痢初起腹痛進迫或脈數大身有微熱者小建中湯。如之膿血稠粘勢熱不可遏者如芩芍延滌砂腫痛者少如桂而和之血積稠厚可用連若血少或稀淡不可用苦寒之藥。

氣虛下陷者屬虛熱補中益氣湯。裏急而頻見污衣者氣脫也。去歸加桔。痢後太便祕濇裏急後重或少有白膿者加防升提。前膿血後變白沫白膿加燉枳。久痢年高與產後病後及泄瀉後作痢者加燉桔有血加梅芍。休息痢加臘桔杏駐車丸陰虛多火不能勝任升柴桔狀只用駐車丸參桂梅之類有積者可加枳燉查此湯數服不應反鮮紫下血鬼者是久風成飧泄三奇湯倍防加羌升柴○痢後變成痛風者加羌活

休息痢經年用不瘥有過服涼藥以致氣血虛者八物湯加陳膠大連

少許

一人二十餘歲泄利之後。腹虛弱食後困眠。上氣脈細弱。八解散加

歸升柴桂方

桂朴者也

積滯久不除。亦白瀉。脾胃既病者。溫脾湯。冷痢去甘加桂三錢。倍參  
姜附減虎一錢。謙云此方。利良劑。雖初起可因證與之。

痢血色紫黯。數服冷藥所下。理中湯。渴而食冷物。呃逆者。加丁  
林蒂。盜注毒痢。血色如雞肝心。煩脹痛者。茜根丸主之。虛人。此湯

加連梅

下痢清白。腹痛不止。附子理中湯。嘔逆惡心。下桃膠。不良物。右關脉  
沉細而緊。宜用厚朴實人楮韓桂等之藥。虛人。此湯主之。久痢虛

寒。滑脫時。發虛熱。加桂附訶。服太劑。參木而不應。養藏湯亦不應。  
以此湯調服石脂末。

痢病發呃逆。吐蛔虫者。四逆湯參附湯或吳茱萸湯。  
下痢身軀疼痛。理中湯或四逆湯。

血痢。血色瘀晦者。當歸四逆湯。

暑痢。自汗發熱而煥。嘔逆。咽乾。腹痛。小便不通。作血痢。黃連香薷飲飲。

五苓散

暑。腹痛甚。食不進者。六和湯合藿香正氣散。

暑痢渴甚。數日後。脈大而不數。益元散以參木湯送下之。數日後。倦怠

甚發效逆用此法而以煉蜜為圓藥

噤口不食胃熒甚者參連湯

噤口利肺胃虛弱甚而不堪黃連之苦寒者參芩白朮散加礞末用  
米湯下之

因服冷藥過多爲噤口痢者治中湯加稽或加砂

痢病攻尅不効遂爲噤口又因食煩火肩背發癰不赤不疼陷伏不起  
六脉弦細欲絕所下之物如爛魚腸腦辛氣無常息脉無躁擾太劑

保元湯加桂以伏龍肝湯代水煎服

噤口痢之奇劑開噤湯

有腸癰似痢病下腹脹無裏急後重薏苡仁湯

小兒痢變為瘧則六君子湯加升柴積滯已去痢猶不止則四君子湯加餽有寒加吳燈有熱加連炒黑為丸藥服之

小兒痢手足指熱飲冷者為實熱香連丸手足指冷飲冷者為虛寒理

芩湯若兼體重肢痛濕熱傷脾也升陽益胃湯

藥方

芩連芍藥湯 彌草タウキ 芍キヌガサ 芩連タマスギ 各三分 右水煎

溫脾湯 虎タケノコ 研参甘ミツロウ 輻炮各附一右水煎溫服

開噤湯 砂研五分 砂糖半錢細茶半錢半片右水二鍾煎至分露一

宿次早面北溫服外木別子一去殼麝共搗置臍中即恩食  
秘傳斗門散 黑豆炒皮乾薑炮粟殼蜜炒地榆炒鉗各三兩  
右每服三錢水二盞煎一盞半溫服

牛扁丸 治一切痢疾甚妙

牛扁和名ゲンノセウコ 一名野ガヘリ云

右一味為霜糊丸菉豆大每服二十丸白湯送下

薏苡仁湯

薏タマシ 分桃トモシ 牡ダク 薏タマシ 各三分

右水煎

本方芍藥湯

玉筋齋芩連芍藥湯

和中湯

香連丸 參連湯

參歸芍藥湯

真人養藏湯

以上七方見上編

保和丸傷食

平胃散

小柴胡湯

上編

白頭翁湯

同

四逆散

大小承氣湯傷寒上篇理中湯同附子理中湯傷寒吳茱萸湯同四逆湯同

當歸四逆湯同

上篇

黃耆建中湯同

上篇

不換金盛胃

上篇

藿香正氣散同

八解散

洞

人參敗毒散時疫

陽日湯

上篇

冬溫

黃連香薷飲

暑六和湯

同

益元散同

治中湯霍亂

胃風湯

泄

胃苓湯

刺

上篇

九味清脾湯瘧左金丸

火補

益氣湯內傷

升陽

益田月湯

同

小建中湯虛勞

八物湯

同

保元湯參苓

白朮散同

四君子湯

上篇

短氣

六君子湯

同

三和散氣

分心氣飲

同

木香

枳榔丸同

四物湯

下篇

調經

犀角地黃湯

吐血

### 瘧補遺

證治大要上編速ル如上編遺治法ヨクダ

載能

穀察ス

外ニ別說ナシ

### 治法

瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾小柴胡湯去夏加參艱。暑瘧只  
熱而不寒渴不甚故不去夏此湯加薷連葉。春夏伏氣之溫瘧但  
熱不寒春用此湯夏用白虎加人參湯。瘧太渴去夏加知闐  
連。瘧痢者此湯合四君子四物湯加耆名三分散。

瘧發寒熱作湯病在表裏陰陽不分者柴芩湯

暑瘧又名瘴瘧發盛暑之時白虎湯或人參白虎湯或桂枝白虎湯

瘧寒多有微熱或但寒不熱者柴胡桂枝乾姜湯

瘧熱多寒少或但熱口苦咽乾或小水短赤者九味清脾湯。咽乾去

夏加粉參○挾食倍朴○無汗加麻○有汗加桂憎寒亦加之○久瘡加勦○肺弱加參謙云此方不可用○久瘡體弱之人宜斟酌。

因食傷脾停痰飲發為寒瘡者七味清脾湯加檳榔截時為截瘡之奇方○九味清脾湯用炒瘡此湯用寒瘡發日脈數間日不數者此湯的飲食傷脾發為瘻瘡或脾胃中脘虛寒嘔逆惡心者人參養胃湯○寒瘡惡寒者加附名二十味不換金散○寒多加桂熟多加柴○汗多去蒼藿加蒼朮○飽悶去參加青縮○渴加闢知有痰而渴不飲水雖渴猶宜半夏○渴加芍藥瀉不止去朴草加祖○嘔噦去草不宜○朴蒼藿加縮柏薯之子○痰多燥痰去夏草加貝母○內熱盛渴甚去夏加

進參○暑熱盛渴甚去夏藿加薷○脉弱無力或寒多者加乾附○脉洪有勞者熱多加芩連柴

夜間陰瘡引出陽分而後宜用人參截瘡飲柴胡芎歸湯

虛人截瘡及一切瘡疾宜截之人參截瘡飲

勞瘡夜瘡久不止或暫止復來芎歸鱉甲飲

老瘡腰脇有塊成瘡毋參歸鱉甲飲

老瘡諸藥無効其人消瘦日晡發熱左脇有塊者藜芷鱉甲散

瘡自汗不止人參實衛湯○初發加桂○久瘡加梅

瘡疾不問先寒後熱先熱後寒頭疼身痛者人參敗毒散加蒼葛草根

瘧疾頭痛甚者十神湯加草薢

瘧腰痛甚者四物苦棟柴胡附子湯

瘧疾屬風寒者外邪香薷散加良青草

瘧疾初發無汗藿香正氣散

新久諸瘧不換金正氣散加柴芩青竹澤檳莫梅丁法加嵒檳莫大抵  
食瘧脾瘧對金飲子○十七八歲男子患瘧疾四發他鑿治之寒熱往  
來大半退殺少寒多聞食氣則欲吐脉弦微用此方愈○一方此湯  
加前或加縮愈後調理加參茯

瘧發寒熱病在表裏陰陽不分五苓散

暑瘧用加味香薷飲細服辰砂  
五苓散是亦一法也

因濕身體重痛肢節煩疼寒熱而嘔逆者濕瘧也胃苓湯加羌薷  
暑瘧者香薷飲加虎青梅

瘧寒熱或痰滯胸滿熱多寒少太便燥實者大柴胡湯

狂悶讐妄太便秘者涼膈散○瘧瘧山溪蒸毒令人迷困發狂或啞下  
寒乍熱乍有乍無者加柴檳○產前瘧脈實雖峻劑有故則無損煩  
渴太便六七日不通陽明府實也此湯去硝黃加鮮荷鵲

結促用藥丁貼而愈瓜蒂散

瘧疾不問已發未發嘔吐痰食俱出者三陳湯○有痰者此湯加草薢

柴芩。久瘡加芎蒼柴葛。一補一發之藥也。久瘡不得汗。以此湯倍蒼。加柏子仁。瘡加青良煎。吞神保丸五粒。瘻瘡嘔吐者。倍曉食。則吐。瘻胸滿。腹脹者。合小柴胡湯或平胃散。俱加枳。膩查。青不食口苦。乾嘔。熱多寒少。他療不効。順氣和中湯加芩柴葛。瘻風敷。盛筋脉。抽搐者。禹藥順氣散加柴芩。

一婦因事忤意。至夜發熱。次夜又發寒熱。医用加味小柴胡。反加浮腫。後變成瘡。乃作欠伸。腰背俱痛。請予為治。脈之沉弦。因思因怒。發瘡正合小柴胡法。何得反加浮腫。腰背俱痛。以脉論之。莫非素有瘡氣。

耶問之。果然。遂投米香流氣飲十餘貼。而瘡止。腫消後。用補脾泻肝劑而安。逍遙散加參陳。

常有積之人。患瘡。寒熱往來。腹皮堅張。無汙數方。不應濟。生七氣湯。加韓麻二貼而安。

一蟹患瘡已久。結成癰塊。在右脇。自服雜藥。其證愈甚。脉左弦滑。右弦實。因作食瘡。紅丸子。每三十圓。以老瘡飲下之。不三發而諸苦如失。老瘡飲。蒼菜、青陳良各二分半。並茯夏桂枳甘韓各一分半。蕪芩各一分。鹽少許水煎空心服。日三夜一。仍吞下此丸。一小兒十歲。連

年遇夏即發瘡者。四載矣。用此丸以補中益氣湯加夏茯。送下十五

圓服圓子一百五十圓湯藥二十貼其證不復作此兒胃氣虛弱故易  
湯使也劉宗厚曰三因紅丸子出厥陰半夏南星例之藥也專治食  
瘡消積滯通鬱氣之溫藥矣然而食瘡既因飲食而得亦當隨其所  
傷而治之更審人之虛實而以補瀉兼煎湯隨宜庶乎可也

脾寒發瘡四君子湯去茯苓甘加茱萸砂附梅姜東名快脾散  
瘡後不喜食四肢倦怠面色痿黃六君子湯加查連枳元氣大虛惟  
可補正此湯加茱萸名四獸飲。久瘡經年不愈其脉如絲面青唇  
白此湯加桂附四服不應每服加參一兩桂附各三錢四服愈後獨  
參湯與八味丸。小兒瘡胃虛者此湯加茱萸夜發則加歸臘晏則加

茱

勞役所傷飲食失節成瘡則虛弱自汗補中益氣湯加夏枯疾自汗日  
甚不能止此表虛不能衛護也人參實衛湯加桂○夜瘡俗名鬼瘡  
此邪入血分宜升散血脈之邪千金內補建中加升柴鷄生脾胃素  
虛人此湯加鷄桂芍○形盛氣虛人多濕痰發則多惡寒日久不已  
脉軟而沉帶滑用此湯加茯苓兼用附二三分○若元氣下陷日發  
漸晏者此湯太輕參米姜棗為治○虛人久瘡時止時發芎歸鱉甲飲  
不應脾虛也急用此湯加鱉甲食痞悶胃虛也四獸飲加鱉甲桂枝  
○一婦妊娠七月前瘡後痢而多鮮血與此湯加連吳藥而愈見

孕婦病瘧胎慎而致不斂者多矣。胎前瘧如元氣本弱或有幾得之必需理脾行氣惟六君子湯為合劑有痰食結滯則加枳菓肉有寒則加桂外有風即加桂胎動上逆不安則加芩胎下墜則加柴倍參以參為舉胎聖藥也間有不應者又需此湯大劑入參以升舉之中有留滯則枳實理中湯加柴桂合表裏而治之。或產後一月半月感犯風暑而瘧小柴胡此湯選用。小兒瘧脾虛則此湯加桂胃虛則六君子加菓夜發則加歸日晏則加升若薦後瘧瘧後痢與夫三日瘧及久瘧不止惧此湯為生。大人因勞役昏倦少食者此湯芩夏

初秋濕令大行濕數之虛且秋霖乃霽民病瘧痢並作医者試用雜方死者極多時友松翁首老母於肥之豐浦瓊民患瘧與利而請某者修合升陽益胃湯隨手與之隨服隨愈病雖重亦不過二十貼而瘳信乎東垣制方之神妙今後或遇虛弱人有患濕瘧濕泄者幸其試之始信予之有得乎古人言外之微意也

有齎證似瘧者齎症多發寒熱寒熱與瘧無異但口苦嘔吐清水或苦水面青腸痛耳鳴脈濶道通散倍柴加吳連。壯婦怯弱瘧發間日數方不應於是詳問則久月信不來有盜汗故加石膏服得奇効。小兒至於勞瘧瘧之類小兒本無不復贅及其有因乳母七情六

六淫所致者又當以小柴胡此散之類兼治乳母為當。

一富商行賈折本抱鬱多日忽患瘧疾医用清脾驅瘧前症更甚脈沉滑歸脾湯加陳夏十數貼而全安。每用此湯治思慮傷脾而作瘧

痢等證。

截瘧之奇方用法見類經獨參湯

一人作勞發瘧與瘧某三發變為發熱舌短痰吼脈洪數似滑此獨參湯加蘿蔔服吐膏痰三塊語清服參耆湯半月全愈。

素陰虛有勞嗽或因瘧為勞調理小建中湯稍加桂枝姜棗後六味丸料加桂鱉

夜瘧俗名鬼瘧是邪人血分可消散血脉之邪內補當歸建中湯加升柴鵝生。產後瘧初產之時絕少產前久瘧及產後微寒發熱不止者是衛氣虛榮血傷宜此湯倍加，寒多加薑，夜發倍歸，三倍薑不應加鵝生虛熱不止大便不實加炒苡仁露不行者小腹結痛別用查炮黑鱉枯伏龍肝湯煎服或產後一月半月感風暑發瘧小柴胡補中益氣湯換用風加羌活暑加薷朴。

寒瘧閏甫驅邪湯 脾腫泄加續一匙。小便短少加茯苓桂。大

便不暢加白芍各一。寒去熱獨發者腎水虛脾陰弱加鱉知

小腹痛引陰如淋輕者小建中湯重者此疝氣也四物湯加延齡附。

血虛夜發者合小柴胡湯加升紅知柏水煎露服。  
瘧疾截性後參歸養榮湯調養血氣。虛汗加耆去砂  
氣血俱虛弱頻食少或遺精效嗽者人參養榮湯加敲梅園  
朴麻不肖者十全大補湯加柴芩陽虛去柴芩加附  
瘧寒甚而不甚熱面青足冷六脉弦細數後世八味九料三倍桂附更  
以保元四君之合方間服。

藥方

柴芩湯 小柴胡湯合五苓散

九味清脾湯

青朴朮夏柴芩菝葜甘等善煎

分量

七味清脾湯

朴青夏良梅各一  
分量

人參養胃湯

參朮陳夏朴蒼蘿  
分量

姜棗水煎

分量

右姜棗水煎

回春有歸芩  
分量

柴胡芩歸湯

柴桔歸芩朮葛朮  
分量

右姜棗鰥水煎食遠服

分量

八參截瘧飲

參朮葛朴歸青芩  
分量

知常浸鱉羹

分量

柴桂

甘朮葛朮參朮葛朮  
分量

右姜棗桃腦水煎露宿臨發日五更空心

分量

溫服查待日午再煎服糖拌騎下藥切忌雞魚豆腐麴食及房勞

怒氣

分量

芎歸鱉甲飲

鱉朮葛朮芍夏陳青  
分量

分量

右姜棗煎服如癰多加柴胡多加葛

參歸鱉甲飲

參查枳砂各

各分

者歸芍青鱉甲

翫芍朴各半甘六厘

右姜棗鱉水煎食前溫服

人參實衛湯保元湯加附子

初發加桂久瘧加鱉

四物苦練柴胡附子湯

四物湯加練柴附

對金飲子

朴蒼甘陳茱各等分

善東煎服

參歸養榮湯

參歸茯苓陳砂礫蓮芍酒

芩朴各等分

右太棗水煎

小柴胡湯

上篇傷寒

大柴胡

同小建中

五苓散

同瓜蒂散

敗毒散

時疫

十神湯

同藿香正氣散

不

換金

同柴桂姜湯

上扁塘

開甫驅邪湯

下扁塘

胃芩湯

同香薷散

暑

紅丸子

上扁獨參湯

參耆湯

同烏藥順氣散

人參養榮湯

同十全大補湯

後世八味丸

同歸脾湯

葵花鱉甲散

同四君子

湯

上扁短氣

六君子湯

同補中益氣湯

升陽益胃湯

同二陳湯

順氣和中湯

下扁膈噎

木香流氣飲

氣逍遙散

同七氣湯

續數四

物湯

調經當歸建中湯

下扁產後

附方

虞天民曰風瘡口苦嘔吐惡心脹滿屬少陽寒熱相等者柴胡桂枝湯

風盛筋脈抽搐者烏藥順氣散加柴芩身痛者敗毒散數嗽者參蘇方廣曰秘方清脾丸 治瘧三日一發或十日一發

讚三錢半白朮一兩 参 檳 菓 茯苓 炒朴 芩 夏 青 各一

右糊丸梧子大每服六十九丸食遠白湯下

盧廉夫曰小兒瘧疾有痞塊

趾

均各二分

加姜煎調醋末

嚴用和曰治瘧疾久不愈炎法

不問男女於大椎中第一骨節盡处

先針後炙三七壯立効

虛勞 補遺

謙竊前賢治虛法アシ 按ズルニ脾腎重シトス故仲景治脾胃虛無然

者用理中湯治脾胃虛寒者加附子後世称附子理中湯治脾胃虛勞建黃  
耆建中湯虛火虛損ナリ勞火困勞ナリ虛損スレバ自勞シ困勞スレバ亦虛  
ス故因虛勞スルアリ因勞虛スルノ異アリトイヘ此其ツル處ハ一致ナリ  
虛勞必有熱即虛熱ナリ内經ニ所謂陰虛生内熱者是也治之小建  
中湯ヲ建ツ此方本ト傷寒論桂枝湯ノ變方ナリ桂枝湯ノ辨續編桂枝  
湯ノ方後ニ詳ナリ桂枝溫補發汗ノ藥ナリ芍藥涼補收汗ノ藥ナリ  
畢竟氣血陰陽兩補ノ劑ニ合今治陰虛內熱倍芍藥加膠飼為小建中湯  
芍藥ヲ倍スレ補ノ中補陰ヲ以テ重シトス加膠飼此證多々腹痛裏  
急アリ膠飼補虛緩急然ルニ更加黃耆為黃耆建中湯加黃耆曰ハ表

虛自汗ノタメノミニ非ス桂枝入心補血分黃耆肺經補氣分甘溫補脾ノ藥兼  
達表固衛氣比小建中湯補陽ノ力ヲ進ム小建中湯ハ補陰ヲ重ニス黃耆  
建中湯補陰ノ力不減ノ更ニ進補陽之功是ヲ以テ後世大建中湯樂令建中  
湯八物湯大補湯人參養榮湯ノ類皆此方ヨリ出ズ東垣補中益氣湯ハ內  
傷勞倦藥ナガ八物大補湯ト其類ヲ異ニストイエ此湯ヲ以テ原方  
トス金匱要畧曰勞之為病其脉浮大手足煩スト云ニ此脈症ヲ觀ヨ補  
中益氣湯ノ脉症ニアラズヤ然ハ此湯ハ直ニ内傷勞倦ノ藥ト意得ベシ  
故ニ東垣勞倦ノ症ニ於テ徃々用此方仲景ノ時未嘗虛勞勞倦之ニ一用  
此方治之然ルニ今虛勞ノ脉ヲ診スルニ多ハ虛數ニシテ甚則虛細數

此湯ノ脉上不應繁ル而景亦以此湯治之小建中黃耆建中八味  
陽兩補劑ニ陽生陰長スル寸八血液自然ト潤ヒ地黃當歸ノ類ヲ用テ  
直ニ滋潤ノ劑ヲ不假トイヘニ勞欲自除キ虛數ノ脉漸々ニ平ク是ハ  
物湯大補湯ノ方祖トスル所ナリ若ヒ火動盛ニ燥渴ノ症甚シキ者ノ為  
メニ製八味丸八兩ノ生地黃大苦寒ノ品ヲ用テ急ニ下焦ノ腎火ヲ消  
シ桂附各二兩ヲ以テ苦寒ノ生地黃ヲ監ス此仲景治虛勞ノ手段ナ  
リ凡治虛勞ノ法皆此沫則ニ從ヘン臨病ノ加減進退始メヨリ局定  
ナレ尚續編補中益氣湯ノ條下ト考索スベシ此說據ナキニ作ス俞氏ノ  
法律張氏ノ醫通ニ本ヅクトイヘニ二氏ノ說未透徹處アリ惜其不

言乎但レ微塵モ理會せザリシヤ未可可知享保癸卯ノ孟者新ニ此矣  
ヲ得タリ嗟呼長沙氏ノ後千五百有餘歲可恐々々謹冀ノハ天道冥  
ヲ垂レテ醫ノ正道ヲ得セシメ玉ヘ

治法

金匱要畧云虛勞 陰虛裏急憤血腹中痛。夢遺<sup>ミハ</sup>虛漸甚失精四肢痠疼。寒  
陰虛手足煩熱陰虛咽乾口燥陰虛小建中湯氣血兩虛之祖劑○  
虛勞雖有外感此湯大劑加服  
表虛自汗黃耆建中湯千金方多入參二錢○虛羸寒熱腹痛裏急自  
汗喘嗽忽然吐血氣口之脉虛濶左三部強微而左尺微尤甚此湯

加歸細○虛勞之感冒此湯主之或小建中湯加服先吐血若陽  
加歸○服甘藥微覺氣阻氣滯更當慮甘藥太過令人中滿發用橘  
砂以行之可也

藏府虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆瘵樂令建中湯潮熱自汗為的  
此藥大能退虛熱生血氣

當衛失調氣血不足積勞虛損形體羸瘠知氣嗜食欲成癆瘵十四味  
建中湯一名大建中湯

當衛氣血不足保元湯用此方法與不治之辨詳於續編之  
瘀傷肺胃虛熱喘嗽脈虛無力生脉散

柴衛氣虛者。府怯弱心。腹脹滿全。不思食。腸鳴泄瀉。嘔吐逆。四君子湯。氣虛之總司。脾氣虛弱加芍。兼補陰倍甘。脾胃不和者。加的。姜枣。○脾胃虛弱者。加桂歸耆。溫補。○傷脾面色瘡黃唇腮焦。慘飲食無味。腹痛。腸鳴漏利。四肢倦怠。脉虛濡數。加連翹。薏苡薯蕷澤。兼濕熱。○小水利者。去茯加耆。常服調氣加薯。和氣加蠻。○肝氣虛加歸蠻陳。○心氣虛加歸蘭。虛搜。○肺氣虛加耆。珠閣。可有喘嗽。寒加丁桔。○本方加麥蘂。姜名養脾丸。補脾胃。○本方合平胃散。名調胃散。健脾和胃。○本方加丁咀。桂名胃愛散。治脾胃久虛。中焦虛功散去蘇。良法。加薯。次與六味丸。加閼珠。

氣滯壅上有冷涎。上潮或嘔吐。心胸腹疼痛。不思飲食。○勞。血加暮蘿。蘇姜名七珍湯。

陰虛燥證。有乾渴而清痰甚。或吐。或大便枯燥。小便如淋。異功散去蘇。良法。加薯。次與六味丸。加閼珠。

虛勞腰痛。少腹拘急。小便不利者。陰虛火動。崔氏八味丸。

腎經不足。發熱作渴。小便淋秘。氣壅痰嗽。頭目眩晕。眼花。耳聾。咽燥舌痛。齒牙不固。腰膝痺軟。自汗盜汗。諸血失音。水泛為痰。血虛煩躁。躁下部瘡瘍。足跟作痛等症。錢氏六味丸。陰虛者。此丸加鰐膠珠。欬嗽益甚。即於建中湯稍加基難細辛。以搜散之。候其勢衰。脈虛。確不

趙以德甘寒杜風清製之劑庶無差誤如此。九合生脉散去附子倍熟參加蕤大劑作湯。晨夕兼進合標本而為施治。服後效噦消渴。未除此虛陽不能欵制也。加膝鱉

足三陰陽氣虛敗惡寒發熱手足俱冷吐痰不食二便滑數等證後世

八味丸

腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形

躄サリレク卒寢汗發熱五藏齊損加減八味丸

此壯水之劑也。凡命門之陰衰陽勝者宜用左歸飲加減主之。如肺熱而煩者可加闔ヒツ二錢。如肺熱多嗽者可加蛤二錢。如血熱者

可加歸二錢。血滯而熱者可加腋二錢。陰虛不寧者可加貝子二錢。如血熱妄動者可加趾二錢。如脾熱易饑者及多汗傷陰者可加芍二錢。如心熱多躁者可加芩二錢。如腎熱骨蒸者可加歌二錢。如津枯熱渴者可加拗二錢。如上實下虛者可加藤二錢。以道。

此益火之劑也。凡命門之陽衰陰勝者宜用右歸飲加減主之。如氣虛中脫或厥或昏或汙或運或虛狂或短氣者可加參良法自十二錢以至半兩。如火衰不能生土而或為虛寒或為吞酸者可加炮姜三錢。如陽衰中寒而泄泻不止腹痛無休所用制附自一錢以

至二三錢亦須入參兼用。或再加龜二錢。○如小腹疼痛加至桂川  
仍不止者再加吳子錢。謂以佐之。如淋遺白帶臍腹疼痛者。加研  
一二錢炒熟搗碎用。如血凝血少者可加歸二三錢。

陰虛陽暴絕眩仆下失血者獨參湯。有瘀者加龜。有痰者加龜

蘇。○虛甚者加附

多慾之人腎氣衰微欬嗽不止。人參膏用蜜橘煎湯化膏服之。

虛勞之人脾胃虧損或脹或渴。參木膏

滋陰降火養血清肝地黃膏

虛勞乾姜瓊玉膏

補胃健脾口中進食白朮膏

大補精髓益氣養神龜鹿二仙膠

降心火益腎水三才封髓丹

脾腎虛寒飲食山食發盜汗遺精白濁真氣虧損肌體瘦弱等證

還少丹

心血不足神志不寧津液枯渴健忘怔忡太便不利口舌生瘡等證

天正補心丹

陰虛火旺煩熱易驚足膝痠軟者大補陰丸

勞瘵此陰虛之極痰血病有蟲者其傳尸一證不可云無大法四物

湯加燉蘆薈。蒸之發熱積病最多勞病此湯加燉蘆薈大補為

上肉脫熱甚者難治

婦人氣血不足四肢惰怠之力少氣兼治產後下血過多營衛虛損陰

陽不和下寒夜熱增損四物湯

感冒愈後風勞骨蒸藜瓦鱗甲散

面色黃痺五心煩熱欬嗽吐血痰補心湯風勞兼鬱證無汗者最宜

婦人經水不調因鬱生勞潮熱欬嗽有盜汗者滋陰至寶湯

陰虛火動發熱欬嗽吐痰喘急盜汗口乾脾胃未虛者滋陰降火湯○

骨蒸勞熱者陰虛火動也加葛根如服藥數劑熱不退加乾炒黑

肝脾血虛發熱或潮熱晡熱自汗盜汗或頭痛目澁怔忡不寧或煩熱  
口乾或小便澀或腰作痛或小便壅滯水導澁痛或腫痛出體內  
熱作渴等證和劑逍遙散○五心煩熱加葛根○發渴加葛根○心  
慌心跳加遠酸

前證有血熱者加味逍遙散○本方加葛根或以桂枝易芍藥

婦人血勞精神不正者四春加味逍遙散此方毛子癲狂主方

思慮過制勞傷心脾健忘怔忡歸脾湯○血虛發熱者加葛根名加味

歸脾湯

虛勞有血熱者參散

心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血八物湯

男子婦人諸虛不足五勞七傷十全大補湯

前證收飲表氣止汗補心除血虛潮熱入參養榮湯

前證血虛腹痛者雙和湯

一切失血或衄虛煩渴躁熱睡臥不寧或瘡症膿水出多五心煩熱作

渴等證聖愈湯

婦人虛勞心腎俱虛水火不交初則微熱過夜發熱即冷有盜汗倦怠瘦弱減食恍惚或微嗽唾中有紅線名曰肺痿為不治却勞散

勞熱手足煩心怔忡悸悶婦人血室有乾血身體羸瘦不為肌肉散

### 地黃湯

勞證體虛骨蒸服之決補八物湯之變方尤宜遺精保真湯

治虛勞參歸益元湯津夏病之藥

虛勞類瘧者人參截瘧飲

虛勞自汗不止者人參實衛湯

三十七八歲之男近年病身不交世人常用藥而未覓効問其病症及動作者云素肥白近年漸瘦食減雖然比常人之食未嘗好也近年不好關節微痛于時眩暈世事應心則氣快不應則眼眩大便澁滯小便清利脈浮軟而弦補中益氣湯去升柴加紅藥

虛勞、夏月羸瘦、從時活法清暑益氣湯

婦人多怒經行旬餘方止淋瀝無期肌體倦瘦口乾脣齃盜汗如洗日

晡熱甚皆因肝脾虧損無以生發元氣加減益氣湯

虛勞泄泻者參苓白朮散赤水玄珠為補脾之主藥

中焦不行或飲食勞倦或兼鬱滯或氣虛類勞證有欬嗽者八解散加

芍珠

陰病開闔行痰利氣此症世通稱痰火二陳湯加酬制貝附歸查  
蛇柏少許。陰虛腎火炎上痰火肺燥者合四物湯去芍夏加貝附  
數桔潤而降之。一人體長露筋骨體虛而患勞頭痛甚自以為

矣脉弦大帶數乃藥力未至也自欲加薑予不許明日頭痛頓除  
脉稍盛又膈滿不飢而腹脹審知其因加薑也遂以此湯加朴枳連  
以瀉其衛三貼而安是瘦人虛勞多氣實也

熱勞小便不利瀉白散加礞礬蘇桔通澤歸樞小便利而病去也

肺傷咽痛喘嗽瘀血百合固金湯

心脾不足恍惚不睡盜汗遺精衄血溺血辰砂妙香散

初有表邪發散不足而致欬嗽醫誤為陰虛肺熱用清肺降火之藥傷

胃欬嗽畏寒太劑桂枝人參湯用此方下血經驗或下積沫小腹微

痛喜溫按者邪從下泄以小劑理中湯加之

陽虛反似陰虛者四逆湯或四逆加人參湯  
真陽虛之上氣喘息自汗盜汗短氣頭旋眼

藥方

樂令建中湯

細  
耆蜜  
足參  
桂  
橘

歸鴟

茯苓分  
右每服三錢姜棗水煎  
加至一啜廿四之二啜廿五之者少用之  
水二鐘煎七八分食遠溫服  
甘在次味

右歸飲  
仲景  
姜湯炒桂  
至二爻  
水二鍾煎七八分食

**人參膏** 用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內，以柴火緩煎取十盞瀘汁再以水十盞煎取五盞，前汁合煎成膏瓶

收隨病作湯使

參术膏 白术一斤人參四兩切片以流水十五碗浸一夜桑柴文  
武火煎取濃汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服 治一切脾胃虛

標益元氣不無白石附之

地黃膏

生地一兩  
酒洗

歸三兩  
酒洗

的

炒

甘草五錢

酒洗

的

炒

六

皮二毫

蜜酒

的

炒

七

便炒

多炒

瓊玉膏

牛四觔  
白蜜十三兩

蜜二觔

參六兩

右以地黃汁

洞蜜

熬沸攪勻用絹濾過將參芩為細末和勻煎汁入磁器用綿紙十數

層加箬封札瓶口入砂鍋內以長流水煮沒瓶頭用桑柴火煮三晝夜取出換油紙口以蠟封固懸井中一日取起仍貯半日白湯點服

白朮膏

白朮十兩幼取子潛出者先煮熟湯待冷浸一宿刮去皮角切片用山黃土蒸之晒乾再以米粉糊之臘乾

右用水百碗桑柴火煎取三十碗加白蜜二觔熬成膏

每服六錢水

淡姜湯點服

龜鹿二仙膠

鹿血取者  
十觔

龜

三觔

自敗者  
柏甘州者  
三十兩

參

清河者夫

十五兩

末

右用鉛鑼如法熬膠初服酒化一錢五分漸加至三錢空心下

三才封髓丹

閏馳參

各半

藥炒褐色

砂炒兩

白蜜

七錢

右為末糊丸梧桐子大每服五十丸以內蕤英五錢切片酒浸下

宿次日煎三叩沸去渣空心送丸子

還少丹

黃耆

五味

嵌

遠

歸

噉

嶧

枸

馳

磽

膝

仲

古等分別末用棗肉百枚并煉蜜丸桐

子大每服五七十丸空心溫酒或鹽湯下加續斷名打老兒丸

天王補心丹

參

睽

芩

炒

遠

炒

桔

各五

殊炒

歸

丸

卷之三

卷之三

右為未蜜丸如椒目大白湯心  
桂枝各六兩  
知母四兩  
熟地各六兩

右為未煉蜜丸如椒大補丸四兩知四兩熟皁各六兩  
柏仁炒酸炒各一兩生酒洗

右豬脊髓和蜜桔子大五十丸姜鹽湯下  
增損四物湯 彌散參 菊花 炮姜 雜物等分

右六味每服  
半兩鱸一枚  
鰯五葉水一盞煎至七分臨臥空心溫服

右姜棗水煎溫服，百藥不効。一料除根。

加減益氣湯 耆 參 歸 腺 蔴 閨 遠 素 皮 柴

升 酸 醉 甜

右棗二枚水煎

蛤 半 雜 生

芍 炙 各二分

芩 分 驚 分

桔 貝

百合固金湯

歸 童

右水煎服

辰砂妙香散

耆 蜜 參 各

歸

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

辰砂妙香散

耆 蜜 參 各

歸

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

桔

桔

八物湯

參 牡 茯 归 芍 驚 蔴 驚

桔

礞

遠

蒜

桔

桔

桔

孫真人曰治腎風虛寒方 炁腎喻百壯對臍兩邊向後夾脊引各一寸五分

虞夫良曰凡骨蒸勞熱元氣未脫者灸崔氏四花穴無有不安者也  
孙竹玉璽曰代灸膏治老人衰弱元氣虛冷藏府虛滑腰脚疼痛沉  
重飲食減少手足逆冷不能忍者用此灸方功效不可盡述

大附子一箇

炮

吳茱萸

桂皮

木香

蛇床子

各半

馬蘭花

一兩

燒

右為細末每用藥半匙白麵半匙生姜汁半盞同煎成膏攤於紙上  
臨臥貼臍以油紙覆其上綿衣繫之一夜至明乃去每夜如此貼之  
其腰腹如灸百壯除寒積腰疼貼腰腹京北紫竹峯雲坊炒艾  
以此方合艾末等分煉

或書曰秘方治虛症有火服參耆則作喘嗽服歸地則少飲食服降  
火滋陰之藥則及削元氣而火又不降宜用此方

桔  
解酒蒸  
枳  
多用  
橘  
多用  
楂  
炒研  
蔓  
多用  
薄  
四五分  
忌  
知藥苦寒之藥犯之則躁愈甚矣

痰飲 補遺

上編二詳ナリ参考スベン丹水翁医方間餘ノ說ニ古云痰八長流水  
如レーモ壅礙スハ痰トナル其壅凝スルモノハ百病ニ因ルナリ然キ

八百病ハ本ニシテ痰ハ標ナリ治法先ツ治百病トキハ痰自退シ又丹溪ノ說ニ依ルキハ百病皆痰ヨリ生ス治法亦痰ヲ本トス或謂痰ノ字從炎則ハ痰モト陰火ニ生ソ病ニ因テ胃陽不運冷食停滯ニ由テ胸膈三衝上セ上ニ鬱ソ顏頰赤キヲナセバ皆痰火ト為メ治之芩連梔子瓜蒌ノ類ヲ用テ弥々陽氣ヲ損ジ胃脘閉塞メ食不進トキハ深痰丸竹瀝及香竈ノ丹劑ヲ與ヘ殘陽ヲ擊彈ノ衝逆ノ上ル者才キニ至ル片ハ以為此藥伐痰神妙ナリト終ニ斃ソ不悔寃哉又瘦實火盛ナルモノ厚味冷食ソ稠痰常出ル者少シ化痰ノ劑ヲ用ヒ不愈片ハ溫胃運脾ノ藥ヲ用ベシ不然片伐胃陽久為脹脹是皆深ク厥理ヲ不燭シ本

未處ヲ異ニス我不得辨之凡病ヲ得テ有痰モニ二陳湯ヲ合スルニ宜シ治病藥中ニ於テ與之諸病無不兼痰故ニ古人ハ諸方必生姜ヲ備フ是ヲ考可見ナリ又金匱ノ論痰症其名數種ニ立方亦多シ其立方ノ意第讀片ハ各緣アリテ痰ノ本トスルニ非ス太小青龍十枣桂苓水ヲ治ス腎氣丸治虛ノ類咸ナ治本ナリ如此ノ類太多シ特一痰ノミニ非スト云云按加味半夏湯豁痰湯金匱腎氣丸ノ三方ヲ主トソ痰ノ本ヲ治ス附方ニ載ス考ベシ是後世妄リニ痰ヲ本トシ化痰降火ノ藥ヲ用テ誤ル者為ニ云ヘリ瘦實火盛ナル人ノ為ニ設ルニ非ズ近來古方家ニ控涎丹トニ溜飲ヲ下シタレキ病モ即愈スルコアレハ一概ニ意得ベカラス是痰火劑

ヲ丹溪以來專ラ投スルニヨリ丹水翁此說ヲ發セリ中人以上ノ治法此治  
痰ノ意得ナル

### 治法

濕痰二陳湯。若寒痰加乾附。○寒痰清色痞塞胸中倍夏甚者加  
一麻細頭。○熱痰黑色加芩連梔。○因火逆上有痰降火為先加白石膏  
芩連。○風痰加枳星。胞附麻黃氣虛者更加籠氣實者加瓣俱用對  
○濕痰白色加蒼附。甚至加姜附。濕痰多見燥痰力大口人也。○燥痰  
老痰加海硝百草散。謂之云麸炒枳對浸蒸海粉之類。又云五子  
佐他藥大治頑痰宜丸服。鬱痰加枳飴。○食積痰加麴麥楂煙枳。

○痰飲凝結如病入目睛微定暫時轉動目如炭烟色皆肥今瘦喘  
嗽轉側半難臂痛痰也在上部寸口脉浮滑在中部右關脉滑大在  
下部只脉洪滑或在心包寒熱胸滿氣促口無倫語如見鬼狀此痰  
結也。以上病皆痰火也。俱加薌枳芩連數貝桔梔前去甘薌調辰砂  
溫服。○凡為喘為咳為嘔為泄為眩心嘈怔忡驚悸為寒熱痛腫  
為痞膈為壅閉或胸脇間輒有声或背心一片常如冰冷戴元禮  
曰皆痰飲所致此而如水之壅有游濁臭穢故善治痰者不治痰而  
治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣右件之症皆濕痰宜本方  
加星枳。名尊痰湯。合蘿子降氣湯。○熱痰而嘔去甘陳加橘。平虛、  
加星枳。名尊痰湯。

皆無他事。只有痰數口。或清或堅。去陳甘。痰飲成心衝脉。古加星枳酸。痰氣。痰火。加連或去陳甘。加枳。痰在腸下。加礞。痰在皮裏膜外。加對鑊。痰在四肢。加瀝。痰在經絡。加瀝對鑊。痰在膈間。或顛證。或健忘。或風痰。加對鑊。氣痰。加橘瓣宿枳葛。燥痰。

加薑杏貝珠

痰涎壅盛。胸膈留飲。痞塞不通。導痰湯。自此加減法。氣痰。加葛。橘。沉柏。或加參木。培脾。加連。清熱。加澤。蚌。滲之。加桂。航行之。加桔。防提。加勸潤之。若頑涎隨氣逆上。不為藥解。當自下。部利之。老人虛人。當利其小便宜。小半夏茯苓湯。改用橘。而倍用之。或此湯加猪半錢。

○痰飲流入四肢。令以肩背發疼。兩手軟痺。宜此湯。加橘。葛。各半錢。胸膈停痰。橘皮湯。  
痰盛。前胡半夏湯。

○胸痺。胸中悶々如滿。噎塞。習々如癢。喉中濁燥吐沫者。橘皮枳實姜湯治痰逆。此藥溫胃可思飲食。枇杷葉散。氣痰停胸膈。欬唾稠粘。若潤下丸。或橘紅一斤。甘草。桔梗。花各四兩。水五。椀。慢火煮乾焙。為末。白湯點服。名二賢散。  
暴飲流肌皮膚。胃之外謂之溢飲。宜汗之。小青龍湯。  
五飲。飲之說。痰飲者。其人素盛。瘦水走腸間。瀝々有声。謂之痰飲。

懸飲者飲後水流在腸下欬唾引痛謂之懸飲溢飲者飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身休疼重謂之溢飲支飲者欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲是四飲也留飲者其人背惡寒冷如掌大或留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則輒已胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰痠目泣自出其人振々身悶而劇必有伏飲是等證通曰五飲金匱要略之治法各別也王海藏製此方五飲通用之先輩雖議之輕症五飲湯可通治

結聚脇腹間有類積聚之形但按之甚不堅時々吐涎沫六君子湯合

五苓散加枳○痰多加陳夏○有痰有熱者加桑參前  
吐痰涎壅盛此藥不大嘔吐但令涎微々自口角流出而自行稀涎散男子婦人半身不遂類中風手足頑麻只眼喝斜痰涎壅盛及一切風他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風并宜服之

青州白圓子

氣痰七情鬱成咯之不出嚥之不下形如破絮或如梅核久者四七湯換薦加芩梔瀉

若頑涎隨氣逆上不為蒸解當自下部利之宜五膈寬中散加夏半錢吞破飲圓仍佐以半硫圓二圓書外

四十歲男本虛今瘦素大嗜酒頃日禁止之蓋因有病而然也痰涎壅盛且呼吸促迫而不安胸膈及右脇甚痛而不能轉側食如常大小便順脉沉濡自曰氣如常烏藥順氣散治法愈而後異功散

痰火因惱怒發者沉半升氣易

痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿悶作寒熱氣急并

痰迷心竅不能言語者并皆治之瓜蒌枳實湯

惡心吐痰水順氣和中湯

熱痰脉浮洪面赤煩熱心痛唇口乾喜笑多其痰硬作塊者涼膈散加茯半

病者脈伏自利反快而渴雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也治法甘遂半夏湯

痰飲流在腸下欬唾引痛者懸飲也脉沉弦十枣湯

一切濕熱沉積痰飲變生諸病者三花神祐丸

諸實熱積痰異證滾痰丸 孕婦勿服

胸中痰熱積年痰火無血者卽證宜服沉香化痰丸

脾虛熱痰堵塞膈氣不舒運痰丸

老痰結於喉中燥不得出消痰餅子

張子和以此方為吐劑之專方三聖散

張景岳以一方代三聖散等一切吐劑

太抵骨節疼痛加寒熱發腫塊者是濕痰流注經絡與痛風同治法若

醫遲不散則成膿矣外用敷藥羌活湯

痰喘氣急痞塞某不得入者急煎六和湯奇法入麝少許

痰火涎湧盛效逆喘滿良方玉竹飲子

痰火嗽氣急生痰滋陰降火湯加桑蠶芩蘆。痰火作熱煩躁不安氣隨火升也并痰火怔忡嘈雜加酸梔連茹辰蘆痰火驚惕同治。

陰虛火動之痰飲加貝鬱

內傷停飲目眩四君子湯去參加桂減甘。素有痰飲胸膈痞滿脾胃

虛寒不嗜飲食不得服燥藥者此湯合二陳湯去甘加枳亦名六君子湯合二陳湯去甘加芎順氣消痰止嘔調中益氣補胃驅濕名赤茯苓湯合五苓散加夏陳枳旋朴前芍名五飲湯

肺脾氣虛而不能運化有痰者六君子湯加桔。肺胃氣虛而不能清化而有痰者此湯加桔。內傷氣虛夾痰則氣口脈滑而濡欬吐涎飲二陳湯加桔虛人此湯加香砂。脈細滑或緩痰涎清薄身熱倦怠手足癱軟是脾虛而夾濕也此湯加桔或補中益氣湯加半茯。不時多唾是胃氣虛寒不運病後多有此證理中湯或此湯加桔。痰火其人氣虛肥白者此湯加瀉對。婦人肝脾鬱滯渴不飲食二年

面部微黃浮腫能步履四肢倦怠肝脾二脈浮弦按之微而結滯此湯加吳下痰積而愈。痰積類積聚者按甚不堅此湯合五苓散加枳。痰火胸中時痞滿眩暈或目齒痛食後少快暫復迷悶大便或結或泄小便或赤或清是健脾而運痰清肺潤燥此湯加蘇子蘿卜子人背腫一塊按之則軟肉色如故飲食如常勞則吐痰此脾虛而痰滯用補中益氣湯加茯半羌外以翻末薑調餅灸之而散後因勞役頭眩作嘔仍以前藥減羌加蔓頭眩而愈。一人素有痰飲每歲必四五發發即嘔吐不能食此病久結成窠囊非大漏之弗愈也須先進此湯十日後以瓜蒂散頻投涌口赤豆沙者數升已而復得水晶

色者升許如是者七補之七涌之百日而窠囊始盡耑服六君子味丸經年不輟。勞役傷脾失升降者加夏瀝劑。痰火生夏白木天麻湯或加朴或加羌防此痰生蟄蟄生痰之意也手足動眼眶蠕動卧則覺如人引足者亦痰火也。

凡十全大補湯之證而有痰加瀝

腎虛不能納氣歸原出而不納則為積滯積滯不散則痰生後世八味丸肺氣鬱滯用二陳湯加貝桔陰虧水泛用六味丸腎虛陰火加

減八味丸

肝腎陰虛而痰中有血者六味丸加烏鵲骨茜根○陰血不足相火上

炎肺受火乘不得下行化令由是津液凝滯生痰不生血當用潤劑  
如二冬膏此丸之類滋其陰使上逆之火得返其宅而息則疾自消  
○瘦人陰虛多火此丸去澤合生脉散使金水相生自然火息痰降  
去澤者以其利水傷津也若命門脈弱真火或微或不時上衝頭面  
悶熱又須此丸加桂珠以攝火歸陰陰平陽秘精神迺治須知治痰  
先治火治火先養陰此為治病治火之的訣

藥方

二陳湯 夏 陳各三分 茯苓三錢  
橘皮湯 橘 枝 夏各三分 旋覆花三錢  
批杷葉散 青 豆各一分 前桃夏  
潤下丸 陳二斤去白甘二兩  
五飲湯 旋參陳枳夏茯参腹朴  
稀涎散 桂枝各等分 茯朴夏澤猪  
青州白圓子 星附各等分  
少薑枳實湯 薑枳貝陳芩梔各等分  
為末每用一錢溫水調下

青州白圓子 星附各等分  
少薑枳實湯 薑枳貝陳芩梔各等分  
為末每用一錢溫水調下  
稀涎散 明礬一兩牙皂五錢  
潤下丸 陳二斤去白甘二兩  
五飲湯 旋參陳枳夏茯参腹朴  
稀涎散 桂枝各等分 茯朴夏澤猪  
青州白圓子 星附各等分  
少薑枳實湯 薑枳貝陳芩梔各等分  
為末每用一錢溫水調下



王竹飲子

萎蕤

一名王竹三分

茯苓二分

甘桔

橘各三分

貝紫各三分

同橘蜜煎四分

右八味長流水煎入熟白蜜少許

氣虛加參三分虛火加桂五厘

客邪加細三厘香豉三分咽喉不利唾膿血加膠三分藕汁少許頭額痛加薑三分便溏用伏龍肝擊碎煎湯澄清代水煎服氣塞臨

磨沉香汁加入

小青龍湯

上扁

五苓散

同

十枣湯

上扁

痰飲涼膈散

時疫烏藥順氣散

中風

羌活湯

渾下

五膈寬中散

膈噎

順氣和中湯

同

沉香降氣湯

氣

七湯

扁

心痛

六和湯

暑

四君子

六君子

補中益氣湯

見上

十全大補湯

虛勞

滋陰降火湯

同

六味丸

八味丸

見續

半夏白朮天麻湯

下扁

眩暈

附方加味半夏湯

治諸痰飲

夏

三

茯苓

一

韓八

右蠶

三錢

水煎服

宿飲小便短少則加桂一錢

○若實瘦氣盛者

加陳五分

○脾氣虛弱生痰者

加附子二錢砂一錢

彼曰消化食而用

麵麥枳之類

則脾氣弥虛痰

盛○丹水子曰此

金匱小半夏加茯

苓湯也專治痰

莫先於此

加韓助胃湯莫不愈

若老痰稠塊凝滯

胸膈火盛氣實者宜用化痰類必不可過用

豁痰湯脾虛而胃陽不化痰飲湧溢者頻用之則胃陽運而痰飲疑

結為一團黑色物自然吐出氣降食消無湧溢患

參

三錢

茯苓一錢

夏

二錢

韓一錢

甘少

蠶八分

右裝五錢水煎為三貼服 丹水子曰參木芩甘四品局方四君子  
也半夏治痰之料品也用之大補脾胃治痰乾姜苦溫開胃盛陽故  
痰飲湧溢而滿胸者聚結而胸膈開放氣得升降而安牡蛎咸柔稀  
痰其聚結之痰不留戀胸間而遂出

八味腎氣丸 後世八味丸也

丹水子曰古人所謂痰本在腎中在  
脾末在肺蓋命門火衰不生脾土脾氣不運生濕而聚痰至肺肺氣  
不清而留滯咽喉間此方全補腎腎陽盛生脾土脾氣運而消化飲  
食則何為得生痰腎陰盛生肺金肺氣清則何為有留滯咽喉乎

方見續編

欬嗽 補遺

上編二大要述ル如レ今補遺スル所ハ初亦氣ノ欬嗽ヲ載セソレヨリレ  
テ寒熱虛實種々ノ欬嗽ヲ並ベ記ス儲丹水翁ノ說ノ如レ世ニ称勞嗽  
モノ虚勞嗽ニ非ス 禦賦火熾ニシテ肺弱キモノ風寒ニ感シ直チニ肺肺ノ藏ニ  
入ル藏ハ陰ニシテ陽ナリ五藏各精神ヲ包ムナリ寒邪藏内ニ鬱鬱ソ陽氣熾  
ノ為ニ發熱斯平生ハ元氣ナリ為熱却テ邪氣トナルナリ偶々天陽發升ノ  
時ニ方リ發熱惡寒欬亦甚シ麻黃佛耳草前胡桑白皮杏仁紫蘿陳皮等ア  
輕劑ニテ發散セント欲スル片ハ本表邪ニ非ス故ニ退ルナラズ黃柏知母麥門冬  
貝母紫苑龜板等類ニテ內熱ヲ涼セント欲スル片ハ本實熱ニ非ス故ニ反テ藏内

ノ神陽ヲ伐テ寒邪自若タリ又附子肉桂乾姜參木ノ類ニテ元氣ヲ補ヒ寒  
邪ヲ祛シト欲スル片ハ久寒既ニ熱邪トナツテ熱藥ヲ得テ除甚シ或陰虛火  
動トナシテ大補丸滋陰降火湯斑龍丸ノ類ヲ投スレハ補陰ノ潤劑脾濕ヲ生メ  
太便溏シ終ニ死瀕キニ至ル故ニ我治此症百二ニ活スル者ナシ明季黃承  
薛立齋医案ヲ輯メ治法多端ヲ詳ニ且ツ盡セリトイエ全ク虛勞嗽ノ為ニ  
論之世俗ノ嗽ト称スル者ニ非ス故ニ治勞嗽惟初感ノ時ニ在リ初感少  
し惡寒欬嗽ヲ覺ヘ甚キ者寒邪肺藏ニ在リ麻黃附子細辛湯或乾姜  
肉桂ノ類ニテ當溫內表症ヲ兼ル者ハ青龍湯ノ類可治之此時却テ參蘿  
飲清肺湯ノ類ヲ用ハ其計意慢ナル片ハ終ニ至不治ト云是上編ニモ  
飲清肺湯ノ類ヲ用ハ其計意慢ナル片ハ終ニ至不治ト云是上編ニモ

荒増此旨ヲ記スト云又近世医ノ參蘿飲清肺湯ノ類ヲ妄用ルモノ、  
意得トス然ルニ近世古方流行リカクアラスレハ感冒初欬ニ小青龍湯ヲ涼膈ノ  
地ニハ專用ルニヨリ昔年ノ如ク勞嗽モ少カルベキ乎他國邊鄙ニテハ  
參蘿飲清肺湯ノ為ニ誤治スルト多シ故ニ舟水翁ノ說ヲ再挙ルナリ

### 治法

感風欬嗽者脉浮惡風自汗或身體發熱鼻塞或流清涕臥起甚語未  
竟而欬桂枝湯火嗽亦流清涕語未竟而欬但風欬者痰濶火欬者  
急欬無痰此分別也加豉細○惡風欬嗽者虛也此湯加參杏珠喘  
者此湯加杏嗽者加珠渴者津液乾屬虛加參○酒後中風汗多而

嗽謂之漏風此湯加澤瀉利尿脾濕根汗多○陰虛火動之人有客邪欬嗽者此湯加附子

欬嗽倚息急迫不得臥者小青龍湯是亦外邪感寒也上氣而作水雞聲者此湯主之此方發表下氣潤燥蠲痰此四具此一方○痰逆勢甚者此湯加礞石○痰逆熏氣素虛者灸甘草湯宣之

感冒風邪鼻塞声重風寒俱感語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦欬嗽多痰胸滿氣短三拗湯○風寒鬱於夜欬嗽甚者此湯加芩知必効アリ○久嗽經年月而不愈是風寒之邪久客肺胃之間與勞嗽不同用此湯佐以千繒湯瘦人多火者勿用

時行欬俗云ハヤリ欬氣或ハヤラズトモ外邪ノ欬嗽惡寒頭痛鼻塞氣急連欬不止始得病即臥枕一兩日而亦輕參蘿飲加細散寒○氣促喘嗽肺燥此湯加知貝○惡寒無汗寒欬嗽欬嗽喘促傷風無汗鼻塞声重欬嗽并加麻杏麻杏屬寒邪故十九○肺多有熱加杏芩桑礪○初欬嗽屬風加杏桑久欬嗽加五味子

風寒欬嗽頭痛血分頭痛鼻塞声重者苦蘿散

欬嗽喘滿者兼寒湿五積散入蜜煎服或加杏桑或更加蘇

右風寒嗽

感暑欬嗽者自汗煩渴或帶寒面垢六和湯加蘇

夏月嗽而發熱者小柴胡湯加知柏但手足心熱而不發熱者泻白散  
加橘桔不應涼膈散去硝黃加萎蕤蜂蜜

右暑嗽

濕嗽者脉細而緩身體重著骨節疼痛或自汗小便不利面腫喘急者

麻黃加术湯

有一嗽痰即出者脾濕勝而痰滑也以辛平燥其脾形盛脈緩體重嗜  
卧之人嗽者脾濕勝也二陳湯加桔梗香附之類○膈上有痰加枳推  
下痰夢清肺桔梗開肺薑燥溫麻發表通利濕○嗽而肠痛宜以青疎  
肝氣後以此湯加星翻龍鬚實者肺之類○嗽春升之氣用清涼

之藥此湯加薄荊之類風寒行痰開腠理用此湯加麻枳杏○寒乘  
肺嗽則胸緊声啞加麻杏○下半午嗽多者陰虛合四物湯加知柏  
丹○火嗽通用去貢加貝蠶龍梔芩桑○食嗽因食積生痰痰氣衝  
胸腹滿者加朴查芽○嗽則涎多或結胸者加桔蠶芩貝○有嗽吐  
痰與食俱出者此飲食失節致肝氣不順而肺又有客邪肝濁道肺  
清道濁相半者加桔杏細枳各五○九屬虛諸嗽味審內外所感  
加杏珠參各五分○嗽嗽白痰者肺之風寒也風痰加星桔防枳  
喘嗽煩躁不得眠五苓散加膠○恍惚加辰○膀胱嗽加參

右濕嗽○二陳湯干園自嗽而脇痛以下到效

嗽白痰者肺之風寒也諸咳嗽雜記

深秋傷燥欬嗽而洒淅惡寒發熱者千金麥門冬湯

但嗽無寒熱痰不得出極力咯之乃得一絲粘痰者十全五味子湯

右燥嗽燥嗽者乾欬乃燥氣乘肺氣壅不利百節內痛頭面汗出

寒熱往來皮膚乾枯燥癢大便秘痰膠血腥屬齎火證乃

痰鬱火邪在肺先用逍遙散加桔梗以開之後用六味丸

加芩不已則成勞此證不得志者有之

火嗽有声痰少面白半日嗽多屬有火竹葉石膏湯。胃氣虛者補中益氣湯或五味異功散並加杷

火嗽便秘涼膈散。痰嗽者加夏○咽喉腫痛涎嗽加桔荊○欬而嘔

。

者加夏姜

欬嗽痰中見血而脉細者此火邪傷血分也歸脾湯或血絲此肝血傷也補中益氣湯去升加附服○勞心思慮心血耗散人每有思慮則心火上乘必發乾欬此為神傷雖服藥亦難取効以此湯加闇味作膏蜜收其橋或減半或換砂別為細末離火加入不時滋養方妙

右火嗽

欬嗽者脈數煩渴引飲喘急面白赤潮幹咽喉乾痛鼻出欬氣喉声不清欬唾稠粘其痰壅而難出色黃且濃或帶血縷或出血腥臭或堅如蜆肉的稠粘不若風寒之嗽痰清而白也萎蕤湯○先傷風欬嗽

後亦傷。欬嗽者。宜加減此湯。增減衣服。寒熱。感。午。寒。乍。熱。脉。浮風多者。金沸草散。脈數或濇者。熱重。此湯去芎。加頭。

熱嗽失音多服寒劑。声愈不出者。消風散。方去蟬蟬。加桔薄以對調。服冷。熱嗽失音尤宜。

熱嗽。金沸散加硃杏茯苓。冷嗽。因增藏衣裳。寒熱俱感。遇乍寒。亦嗽乍熱。亦嗽飲熱。亦嗽飲冷。亦嗽。此散與消風散合方。秋月。欬嗽。此散尤宜。

凡欬嗽而赤胸腹脇常熱。惟手足乍有涼時。其脈洪者。熱痰在膈上也。小陷胸湯。

風傷於肺

風熱。欬嗽喘急。防風通聖散。壯實之人。加夏桔號。

右熱嗽

嗽而煩者。益元散加桔梗。方後安神加桔。此證之類也。

肺熱。喘者。瀉白散。五更時。欬必不火虛。多痰少食。積濕熱流肺中。此散

加知。火欬久者。無痰。此散加桔梗。開之。

喘者。陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮無所依從。故喘。欬。東垣瀉白散。

肺熱。喘急。口乾。胸膈不利者。寶鑑瀉白散。肺熱痰甚。胸膈滿者。加減瀉白散。

肺熱。欬吐血。痰血者。田春黃芩湯。

肺嗽欬有血加味柴胡湯

肺嗽痰嗽脉數脾胃不虛者痰嗽有三因痰火者瓜蒌根實湯因濕痰者二陳湯因肺熱者此湯主之清肺湯

凡痰嗽二陳湯若久嗽肺燥熱者導痰湯

午前欬嗽因痰者瓜蒌枳實湯

七情飢飽欬無非傷動臟腑正氣致邪上逆結成痰涎肺道不理宜順

氣為先四七湯加桑杏味參膠各半錢

氣滯欬嗽分心氣欬加桔夏或杏桃

壅嗽聲重痰稠或欬有聲以薄荷生胡麻各一撮細嚼煎蘿子降氣湯

送下

因氣痰欬久不止上嗽下虛生的瘡秘傳降氣湯。痰嗽加夏。心肺虛加麥苓煎。上膈熱加芩。下部太段虛加附子。計使附子多加蜜。婦人血虛加歸

氣虛勞嗽四君子湯加茱萸杏。喘嗽加杏桑。盜汗吐紅脈虛弱因苦寒之劑者加陳楂。四十餘歲男素嗜酒肥白四十日以前感風冷欬嗽頭痛他醫治而愈至冬微欬不止胸中微痛飲食無味大小便順脉弦與此湯愈用某一七日飲食有味胸痛止時欬痰出此湯合二陳湯此六君子湯而倍橘夏加蜜

肺胃虛寒喘嗽五味異功散或加桔

脾。欬者六君子湯加枳桔。欬喧俱有者三陳湯加蘆薈。虛者此湯  
加桔。五更嗽食積也二陳湯加陳枳。虛者此湯加陳桔。小兒發癥  
喘欬有水雞声吐綠水者此湯加柴桔。小兒喘欬吐後此方主之。  
內傷欬嗽補中益氣湯。久病痰嗽者去參肺有伏火初病者勿去之。冬月  
或春寒或秋涼時各宜加不去根節麻。春令太溫只加佛耳艸。欬  
冬。夏月病嗽加珠蘭。內傷久而不愈潮熱微汗欬嗽不思飲食。  
此湯加乾珠自愈不必理。痰治嗽正氣足則痰嗽自除矣。太陽欬  
此湯去升加桔。凡內傷氣虛不能上輸於肺而時嗽時止其人黃  
皮。欬者六君子湯加枳桔。欬喧俱有者三陳湯加蘆薈。虛者此湯  
加桔。五更嗽食積也二陳湯加陳枳。虛者此湯加陳桔。小兒發癥

白少神脉亦虛微少力此湯去升加葛根附珠或兼腎水不足前湯  
送下都蒸丸○嗽嗽痰中見血而脈細者此火邪傷血分也歸脾湯  
○若痰中微有少血或如絲此肝血傷也去升加阿胶  
瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食此方夏月尤宜參木調中湯  
不嗽不止氣降甚著保元湯含生脉散

久嗽不止氣降甚者保元湯合生脉散  
一男子年五十治傷寒欬嗽喉中恚如齁獨參湯一服而齁除三服而  
欬漸退服至三片而瘳此樓英治驗也

多慾之人腎氣衰憊欬嗽不正用生姜橘皮煎湯化膏服之人參膏  
肺虛甚者此膏以歸橘佐之有痰加痰藥此好色腎虛者有之腎虛

則水失所養不能制火。火寡子畏而悔。所勝肺金受傷而虛。所謂子能令母虛。

喘。肺熱喘嗽煩渴者。人參固本膏

肺胃燥熱痰濁嗽二冬膏

乾嗽。難治此係火鬱之證。乃痰鬱其火邪。在肺用桔梗開之下用補陰降火之劑。四物湯加藥瀉之類。午後嗽多者屬陰虛。必用此湯加藥知降火。肺脹而嗽或左或右不得眠。此痰挾瘀血礙氣而病。宜養血以流動乎氣。降火疏肝以清痰。此湯加桃訶青瀉卦之類。陰虛喘嗽。或吐紅者。此湯加知藥珠參鬱柔散。陰痰喘者補陰。

降火此湯加枳夏。因打損勞力傷肺遇風寒則嗽。或見血紫黑色者去芎。加虎櫟為末酒調服。後服人參養榮湯調理。肺脹滿喘急或左或右眠一邊不得者。加桃訶青瀉卦。

一婦人晡熱內熱寒熱往來作渴盜汗小便頻數。其經兩三月一行此。

肝脾氣血虛損用八物湯六味丸

虛勞嗽十全大補湯

嗽見血。肺虧損而腎水不足以致虛火上炎。真藏為患也。須用異功散加陽珠補脾土而生肺金。用六味丸滋腎水而生陰精。否則不救。大批乾嗽乃燥氣乘肺屬火鬱證。乃痰鬱火在肺先用逍遙散。

如桔梗以開之後用此丸加珠以補之。午後嗽多屬陰虛此丸加  
闕珠以飲之。小兒嗽久不止服發散之藥不應至夜微發急當改  
丸用小劑此丸以濟其陰。妄夢失精小水時白時黃拙秋忽大欬嗽  
坐間偏地清痰周身粟々畏寒肌表微々發熱欬甚則嘔嘔則鼻衄  
如注大便枯燥小水如淋先用異功散去木加葛根次與此丸加闕珠  
半月而嗽方止。

欬嗽煩冤者是腎氣之逆也八味丸安腎丸主之。好色之人元氣素  
弱欬嗽不愈喉中血腥腸中隱痛瓊玉膏不應加減八味丸久服乃  
効。一婦人素勤苦冬初欬嗽發熱吐血盜汗通身作痛或寒熱并  
作。

來用化痰降火之藥只噤筋癢此血本虛而藥復損之耳余用此丸  
○一婦人欬嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗喘欬胸痞渴不食  
崩血如此脾土虛寒用此丸及附子理中湯

欬逆只伏而不能卧上氣面目浮腫者古今錄驗續命湯氣盛脉滑實  
者勿用。

肺胃虛寒欬嗽補肺湯

欬嗽呷熱湯而暫止者冷嗽也理中湯加珠

欬嗽兼火鬱者茯苓補心湯。陰虛火旺欬嗽加貝杏桑之類

丁安素常之鬱乾欬春間感冒風邪而欬逆愈甚以小建中湯用蜜煎

卷加蜜。補外邪即解而效。不。止。次。以逍遙散仍用蜜煎。姜橘更與異功散用蜜制。或姜橘而安。或加硃砂。吐痰加夏貝。嗽

嗽。效無痰及喉痛生瘡者。難治滋陰降火湯加芩。數貝。硃杏。來苑

梔。嗽痰多津液生痰不生血也。加貝。欒。或加硃。欒。

欒。惡寒發熱用參蘿飲敗毒散不効人參養胃湯加硃。欒。得効。謙云。此本寒嗽也。

欒。諸藥不効。八解散加佛耳草。婦人欒嗽身體疼痛加硃杏。毗  
因虫而久嗽不止時久惡寒發熱。脈細緊者七味清脾湯或有乾欒聲。  
嘔瀉。欒嗽。謙云唇裏面或有白點。小兒欒嗽屬蟲者有効。

前後心脹喉中有血腥氣。氣口脉濶。此膈間有畜血也。試法呷姜湯作厄者瘀血也。犀角地黃湯加雞桃虎杖散之。或平胃丸越鞠加菲汁。顧消伐之氣竭。肝傷而欒嗽血腥者。四烏鰣骨一蘆茹丸。

痰嗽氣血壅滯見腫滿者。實熱者。三花神祐丸。

諸嗽久不瘥者。陰虛勞嗽不可用。貝母湯。

諸嗽通用杏仁五味子湯。方後加減見上編。

### 藥方

三拗湯

麻根

不去節

杏皮

生各

甘

五分

姜棗水煎溫服

消風散

芎

羌

防荆

藿

參

茯

蠡

蟬分餅

陳

朴姜制

減半

連

二分

六分

人

六分

二厘

右水煎服

傷寒下之早癥結

右水煎

傷寒下之早癥結

小陷胸湯

連

二分

夏

五厘

薑半連穰

右水煎

傷寒下之早癥結

効或痰飲紛迷症有自汗欬嗽者必効

加味柴胡湯

參

夏柴

芩

知

甘

右剉劑青竹茹一圍粳米炒食鹽一撮水煎入姜汁少許同服

參术調中湯

歸

半

耆

桑

鍼

參各一分

歸

陳

骨碎補

茯苓

硃

十粒

右水

二盞煎至一盞溫服

人參固木膏

參

歸

地

鈎

地

各四

右以

二冬二地

右以二冬二地

熬成膏以人參細末和勻時々挑少許置口中噙化

二冬膏

閔志閔志

等分

秘傳降氣湯

燮

酒浸去白皮

炒黃色

骨碎補

去毛

炒黃

桔

炒黃

詞炒

夏翹

葛根各五

枳

炒黃

陳炒

甘

炒各一分

來

炒

右和勻再就蒸

一伏時

曝乾蕪五厘搗一分水一盞同煎至七分食後通口服調順榮衛通利三焦開膈化痰和五臟此和劑之主治也

補肺湯

硃

分

桂

桂

苓

各一分

姜

汁

蜜

和蜜

右枣入水煎

古今錄驗續命湯

乾

桂

桂

歸

參

礦

乾

桂

各一分

甘

各三分

李

白朮

芎各一分

右九味水煎

是盃湯

貝乾珠陳夏柴桂

各分芩桑各量

各分芩桑各量  
各分芩桑各量

甘各二厘半

右一味加杏三厘  
姜煎熬服

桂枝湯

上編傷寒

小青龍湯

同五苓散

同小柴胡

同理中湯

同參蘿飲

感冒

芎蘆散

同五積散

同八解散

同金沸草散

冬溫竹葉石膏湯

時疫

涼膈散

同萎蕤湯

冬溫麻黃加木湯

見溫六和湯

暑益元散

同千金

麥門冬湯

同華氏湯

同防風通聖散

中風泻白散

火黃芩湯

同

獨參湯

中風二陳湯

痰導痰湯

同防風通聖散

中風泻白散

喘吼

三花神祐丸

同杏仁五味子湯

咳嗽

人參膏

同東垣泻白散

喘吼

寶鑑泻白散

同加減泻白散

同人參養胃湯

瘧七味清脾湯

同

補中益氣湯

內傷歸脾湯

虛勞保元湯

同四君子湯

同六君子湯

同

八物湯

同十全大補湯

同六味丸

同八味丸

同茯苓補心湯

同滋陰

降火湯

同五味異功散

同短氣分心氣飲

氣蘓子降氣湯

同逍遙散

同

犀角地黃湯

諸血

四物湯

調經

四七湯

下心痛

喘哮 補遺

喘哮

症上編

詳ナリ尚

補遺ノ諸方ヲ考ハ

病因自明ナリ

治法

喘證多寒包裏邪遇寒即發喉中作水雞聲積痰在肺絡中以小青龍  
湯探吐年高氣弱者忌吐

寇病喘息因時令而發者蘿沉九寶湯

喘息通用定喘湯

喘證發暑月者白虎湯

寒吼喘急痰盛者五虎二陳湯

因事忤意而氣困不得升降一旦氣逆發痰喘嗽者蘿子降氣湯

肺熱喘急泻白散

前證屬虛嘔吐者東垣泻白散

前證煩熱口渴宜考方後寶鑑泻白散常患喘之人因氣鬱發尿赤脉浮數加蘿子枳殼而安

前證痰甚或脇痛者加減瀉白散

喘急有水氣者五苓散加馬兜鈴、萊白皮○飲酒人喘哮合導赤散

風痰壅盛喘急欬嗽不寧者三陳湯加防羌星枳陳

氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也導痰湯加千緒湯

痰火喘急瓜薑枳實湯加桑菊心熱盛者加辰

而哮百藥不効者八解散加真莞花

治喘急氣虛四君子湯加枳夏殼或加曉

虛而火入於肺者先補氣生脈散的方有痰者六君子湯

本事方良方治欬氣急以人參為末新汲水調雞子清服一錢

陰虛喘者血虛則陽無所依附而上奔四物湯倍芍加參味

陰虛火動喘急者滋陰降火湯加華沉桑瀧

一等火鬱之證六脉俱濇甚至沉伏四肢悉寒甚至厥逆拂々氣促而喘却似有餘而脈不緊數欲作陰虛而按尺鼓指此為畜鬱已久陽氣逼遏不能營運於表以致身冷脉微而悶亂喘急當此時不可以寒藥下之又不可以藜藥投之惟逍遙散合左金丸之類宜通蓄熱得汗而愈愈後仍以六味丸養陰和陽可也。陰虛而火乘金不得卧者壯水為急此丸虛則合生脉散。一婦人患喘證月餘服破氣寬胸豁痰清火等藥不效發寒利水亦不應其疾轉急稍動則喘難

休息診之六脉細散而面赤戴陽用大劑此丸作湯加青鉑兩許服而緩二服而止。

喘急腎虛火不歸源八味丸

氣逆衝上火氣炎上故也此瘡治東垣二出テ六ヶ敷論ノヤウナレ氏畢竟喘息ノ療治ナリ經云逆氣象陽亢氣逆必證象陽盛而赤脉洪當以法降其逆乃愈若以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救失氣上衝咽不得息喘息有声不得卧調中益氣湯加吳觀厥氣多少用之如夏月有此證為太熱也宜以酒炒川連知藥少加肉桂為末酒丸服三錢仍多飲湯少時以養餌壓之使直至下焦以漏衝脈之達

正蓋逆者寒熱之氣逆而不順也當隨四時寒熱溫涼以制之厥  
別ノ子氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條参考ス戴復道  
云虛炎之證陰陽不降下虛上盛氣促喘急宜蘿子降氣湯下黑錫

丹王

藥方

定喘湯

麻三分桂三錢芩各一錢螺炒黃甘一分杏一枚芩分半蜜炒夏分

右水煎溫服

五虎二陳湯

陳一錢夏一錢茯一錢杏一錢麻各一錢膏三分參一分螺炒蜜七分

右水煎別水磨入

瀉白散

桑姜汁和蜜多豉各半錢甘五錢

右每服四五錢入粳米可

葉一把水煎服口陳桔名加味瀉白散有熟更加知芩甘草

水煎

東垣瀉白散

桑分豉半參分珠一錢

陳一錢桔一錢青一錢芩分半蜜粒

水煎

寶鑑瀉白散

桑分豉五錢知一錢陳一錢桔一錢青一錢

細一錢芩分半甘一分水煎

瀉白散

桑分桔一錢芩分半夏一錢杏一錢豉金甘七厘蜜水煎

蘿沉九寶湯上篇蘿子降氣湯同小青龍湯上篇傷寒五苓散同八解散感冒

二陳湯痰飲導痰湯瓜萎桔實湯同調中益氣湯內傷四君子上篇

四君子同滋陰降火湯虛勞六味丸同八味丸同四物湯調經

氣短

肺癰

肺瘡コウ病狀左記ス如レ此症ラ試ルニ生豆マロニ食テナヘグサキハ肺瘡ニ  
非スナヘグサクニキガ肺瘡方ハシサビ一粒二粒食シテハ知レヌモノ主々夢食  
テ云ニテ試コロニガヨシ肺瘡實病ナリ肺瘡、虚病ナリ肺瘡泻肺ノ薬ヲ主  
トレ肺瘡ハ補茶ラ至トス初二補肺湯タケアレド肺瘡初發ハ大抵  
桔梗カヨヒキ方アリ薑根根ホリ汗温服スル無上妙劑ナリ尤  
珍重スベシ

治法

吐膿血ツムクク實ニ非肺瘡如肺瘡狀口臭他方不應者宜消風散入男子髮  
灰清米飲下兩服可除

肺癰病コウ胸痛喘吸歎膿血腥臭異常的久則唾出如粥或口燥咽  
皆由肺氣不通以致痰血凝滯而管千金內托散去桂加補肺湯  
半貼煎服或金沸草散去麻加桔梗數枚或更加桑批仍用桔梗皮尖  
生研成膏入百草煎末丸如彈子大含化四和膏亦可也

半貼煎末丸如彈子大含化四和膏亦可也

閱之類

藥方

桔梗湯カヨウ桔カイ貝ガイ歸カミ勸カミ枳シ末マツ薏苡ヨウイ防バ各杏エド蛤カキ瓣ハタチ各量

桔梗湯薛氏加味鞭敲知

肺瘡效唾膿血咽乾多渴大小便不利桔梗湯薛氏加味鞭敲知

口鼻  
喘息加鹽

口燥加芩一方加彭

加彭散

右姜煎或去枳加參大便秘加虎小便閉加通  
消風散欬嗽補肺湯同金沸草散喉舌虛千金內托散瘻道  
下偏

肺痿

肺痿病狀左記又如外二異論ナレ

治法

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若服已渴者屬消渴医通曰肺痿涎唾多心中溫々液々者炙甘草湯主

之肺臺法也肺痿虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胸滿千金生姜甘草湯肺痿欬嗽有痰半後就并諸者古法用參養肺湯今改用紫菀散加附子姜棗○心火克肺傳為肺痿欬嗽喘嘔涎壅盛胸膈痞咽喉不利不口往來寒熱自汗煩渴者古法用知母茯苓湯今改用紫菀散加知母銀姜棗蓋欬嗽寒熱咽喉不利皆是火鬱痰滯必用生姜之辛以散之然須蜜制藉甘以潤之此標本兼該之義也

藥方

甘草乾姜湯上篇

傷寒

炙甘草湯 生姜溫中湯 生姜甘草湯

紫菀散

右四方見醫通纂要肺痿門

### 胃脘癰

胃脘癰ハ癰結聚於胃口而為癰其膿嘔或柏子シナノ子出ル或塊カタノ肉出ルカタハツタ痰ツタシムヲ吐ク胃ノ上脘ニアレバ膿上三嘔出ス胃脘中下ニアレバ膿大便ヨリ出ス治法左ニ記ス如レ

### 治法

膿カミコリ從大便而出輕則金匱排膿湯重則大黃牡丹湯涼膈散選用告膿自大而吐輕則金匱排膿散重則射干湯或犀角地黃湯加忍翫白濁即是胃脘發癰之候明眼辨之既候癰成而致莫救也。

### 藥方

犀角地黃湯下篇

吐血

排膿散 排膿湯 大黃牡丹湯

三方見  
金匱

涼膈散時疫八珍湯虛勞

射干湯書外治人迎逆而盛歟膿血營衛不流聚胃口成癰

射干 桑子仁 蔴升各兩 赤朮兩 赤朮半 白朮半

右每服五錢水二盞

煎去滓入地黃汁一合再煎溫日再服若日晡發熱每服加犀豉各

一錢甘二錢

太乙膏

治内外一切癰瘍

桔梗

歸

桂

虎

麝

桃仁

生地

芍藥

右切

為片

麻油

二觔

浸

春夏

三秋

七冬

十日煎

熬

去滓

淨

再熬

徐

下

導舟

不住手

搘滴

水不散

為度

內瘻可服之

腸癰

腸癰ハ腹中痛三日其始發熱惡寒必小腹滿痛小便淋瀝尿ガヘリ  
スルニ不自由ナルモノナリ服藥膿大便ヨリ下ルハヨシ臍中ヨリ出  
ルハムツカレキナリ膿今ニ成ラハ内挖散ニテ太乙膏ヲ下スベシ

治法

腸癰可下者人參敗毒散加翹翹

腸瘻大腸有瘀積死血而流注者桃核承氣湯加翹翹

若近於肝門

破傷而入風者難治

腸瘻為病不可驚驚則腸斷而死故患此證者其坐卧轉側理宜徐緩  
時少飲薄粥及保元湯固其元氣為主

藥方

人參敗毒散

時疫桃仁承氣湯

上扁

傷寒

保元湯

虛勞

普救附子敗毒湯

書外

大黃牡丹湯

書外

右二方見金匱

失音

失音ノ病因種々アリトイヘ此書小兒失音ノニ條アリ故只載二條  
夫、大人ノ失音ハ暴<sup>カ</sup>失音スルハ寒包<sup>カ</sup>熱邪久病ニシテ失音スルハ津液  
枯<sup>キ</sup>槁<sup>カ</sup>ナリ暴<sup>カ</sup>得<sup>カ</sup>之者ハ消風散ヲ姜汁ニテ調テ緩々ニ用之久病得  
之者、生脉散ト六味丸料ヲ合シ為煎湯、或生脉散合異功散用之此  
二法ヲ大矩トシテ諸書ヲ考ヘ施治スベレ一婦人年四十年許失音時  
發時止諸療不應。按古今医統氣高声沉者四七湯一名三因  
七氣湯加枳  
殼治之愈タリ右婦人ノ失音ヲ考ニ音ヲ失スルニアラズ音沉ムニヨヅ  
テ失音スルナリ故医統ノ治方ヲ以テ療之不十貼ノ愈タリ或膈内  
痛テ失音スルコトアリ瘀血ナリ代抵當丸ノ類ヲ用ヘシ

治法

小兒失音清氣不升者 小兒大人俱補中益氣湯 吐後或大病後  
雖有声而不能言又能瞞物者非失音乃胃氣不能上升地黃丸與  
此湯兼服

小兒稟賦不足與虛火傷肺者六味丸小兒若仰首歎吸肢休羸瘦目  
白睛多或兼解顧呵欠咬牙等證悉屬腎虛非此九加齡遠不能治

藥方

補中益氣湯內傷六味丸虛勞

附方治暴嗽失音語不出方

杏<sup>吉ミン</sup>泥<sup>研如</sup>蜜<sup>桑白皮</sup>糖<sup>桔梗</sup>蜜<sup>各末</sup>各<sup>三兩</sup>

通貝各來五西

右以前藥四味，汁煉後二味末，白湯送下。

七

舌瘡不能言者、新病ハ風瘻ナリ類中風トシテ治ス、ベン導痰湯ノ  
類若シ久病ノ後或失血ノ後舌瘻テ不能言ハ大虛夾寒ナリ温補ノ劑  
ヲ以テ可治之

治法

暴瘡不出者風熱實症防風通聖散每度經驗即効

藥方

防風通聖散中風

才氣

百病氣ヨリ生ストイハ一切ノ病氣ニ道ルコトハナシ矣ルニ別ケテ氣  
ト云「病ヲ立ツルハ如何トナバハツキリト氣病ト云目當ノアハ病ナリ其  
目當タル氣病ハ胸膈ノ痛ガ目的ナリ鬱病ハ寒熱虛勞ニ似タルガ目的  
ナリソレデ局方七氣湯ノ類ハ氣病ノ藥ナレバ痛ガ目的ユヘ心痛門ニ  
攝ヘルナリ此が此書ノ思ヒ入ナリ此書ノ氣門ニ載スル所ハ氣滯氣  
鬱ニテ痛ニテニ不及トイハ胸腹ニツカヘアツテ不食シ其外種々氣  
滯ニル病ヲ載スソレデ始ニ分心氣飲ラ拳ル氣病ノ目的ハ輕重トモニ  
脉ガ沉ナルモノゾ炎ルニ氣病ノ證ハ備テ脈ガ浮洪ナルアリ是ニ先輩ガ分心

氣飲ヲ用ヒ傳アリ此外氣病ノ脉ハイツテモ沉ナルヲ目的トスベン其證候左ニ拳ル各方ノ方下ニアリ詳ニ考ベシ氣病ハ未抱實性ナニノアル意得ベシソレデ氣門ノ藥ハ皆耗散ノ劑ナリ虛性ノ人患レバ虛勞内傷ノ病トナル氣門ニ攝スルヤウナ病ハナイモノサレビワウンタコトモ希ニハアルユヘ虛人氣滯ノ療治モ載スルナリ

治法

心胸痞悶 痰積ニ紛ル、胸肋虛脹脹滿ニ紛ル、噎塞不通脰ニ紛ル、吞酸嘔氣嘔噦惡心此四ツ食ニ紛ル、頭目昏眩眩暈ニ紛ル、四肢倦怠內傷色紛ル、面色痿黃氣虛ニ紛ル、口苦肝熱ニ紛ル、舌乾內熱ニ紛ル

飲食少脾虛ニ紛ル、日漸羸瘦虛勞ニ紛ル、氣塊升降積聚ニ紛ル、太便虛秘秘秘ニ紛ル、以上ノ証種々ノコトニ紛ルレモ咽ノ渴スルコトガナイモノ脉ハ右關ノ脉ガ亢ルモノブ 分心氣飲○加枳殼蜜飴氣百病最能升降陰陽調順三焦矣○多怒加芩食少加砂糖○胸膈緊加枳飴○上焦熱甚氣滯故加芩下焦熱甚心脾○烏方名分心氣飲者二首治證同此方後方也前方之分心氣飲者去姜芍加桔枳蜜殼蜜蘆荳是揚仁齋直指方之與分心氣飲同○氣逆上而腰足下寒冷五積散不効故與此湯切得竒效是乃氣鬱故也友松子批曰外感風寒濕症或脚氣喘氣等症而足冷者五

積散虛陽。挾痰氣而上攻。致下部冷者。燕子降氣湯。心氣拂鬱而氣不能升降。以致上熱下冷者。此湯有腎中真陽虛者水火不交者。清濁二氣相干<sup>ヲカス</sup>。犯者并似氣逆上而使腰足下焦冷者。豈可以五積此湯責効哉。

氣滯脈沉太便秘者。局方脚氣ノ治スル三脫散ナリ。三和散

咽喉有<sup>ノ</sup>炎竇吐嚥不下皆七氣所生四七湯

氣滯脉沉弦兼積聚者木香流氣飲

諸氣鬱滯在上則本香流氣飲在下則二十四味流氣飲

盛怒成疾面色青黃或兩脇脹滿沉香降氣湯木香調氣散或四七湯

### 枳蜜虛加參硝

婦人氣鬱血滯胸膈痛為的正氣天香湯此症七痛モノゾ

氣塞痞悶暴發者四磨湯或六磨湯

下切氣滯食積腹脹痛者宜消導上下分消導氣湯

男子氣不了々行步則呼吸短息腹脹者木香檳榔丸勿用虛人

氣滯之輕劑氣滯ハ輕ク氣鬱ハ甚シ參蘆飲加茯神

氣寒者五積散加吳○腹筋脹者如青

諸氣通用木抵此症通用最良法也二陳湯○上焦氣滯枳桔瓣砂

中焦加朴枳稜莪下焦加青蜜擴○因怒者加梔翻○痞滿加連枳

○痰盛加薑。○脇痛加青柴芍。○刺痛加枳。○氣實加歸附。○氣虛加參木蜜。○喜動心火加連。○怒動肝火加柴。○思動脾火加芍。○悲動肺火加芩。○恐動腎火加藥。○成鬱不解者煎吞交感丹。氣滯屬虛者八味順氣散。○二十四歲婦人素肥白上氣疼喘盛足常清冷于時頭痛感風寒則喘生氣鬱則暈食如常大小便順脉沉細四動此湯主之

婦女性執多偏屬陰氣易於動如痞悶脹痛上湊心胸或攻築脇肋腹中結塊月水不調或眩暉嘔吐往來寒熱一切氣候先用加味逍遙散或蘿子降氣湯沉香降氣四磨六磨選用。○氣惱加枳青附。

父患氣急諸藥不能開者服沉香化氣丸後以六君子湯調服降氣散。胸中氣壅滯補中益氣湯加青如氣促少氣者去之。男子虛勞失血及婦人產月後因氣者四物湯加蜜棗。一切久病危急不進飲食氣欲絕者返魂丹。

藥方

分心氣飲 桂枝 茯苓 夏通 各三分 陳青 茄腹各一分  
神散 甘六厘 右姜棗燈心水煎傳云或右分兩為二貼  
三柔散 沉蘿 腹羌各三分 蜜附陳甘各三分  
孤瘡 右姜煎溫服

木香流氣飲

陳

青

朴

蘿

斛

甘

各一通

八桂

莪

腹

夏  
庵

波

檳

菓

蜜

蘿

各

半

通軍

桂

莪

腹

沉香降氣湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

沉

分

通

軍

桂

莪

腹

各

半

量

正氣天香湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

正

氣

天

香

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

正

氣

天

香

丹溪有甘

一分○李仲梓分兩

鰐

六分

鰐

半

鰐

陳

蘿

乾

各

半

正氣天香湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

正

氣

天

香

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

正

氣

天

香

四磨湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

四

磨

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

四

磨

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

四

磨

六磨湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

六

磨

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

六

磨

湯

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

六

磨

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

加枳蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

加

枳

蜜

右姜枣水煎去菖藿加沉枳壳名二十四味流氣飲

鬱ニ六鬱アリトイヘ肝脾鬱結ヲ多シトス故ニ諸方ノ始ニ逍遙散ヲ載ス寒熱如瘧ト云カ的ナリ次ニ氣鬱湯ヲ載ス其證論ノ如シ六鬱ノ中氣鬱最優シサテ六鬱ノ別ハ越鞠丸ノ下ニ記ス越鞠丸六鬱湯皆良方ナリ虛人ノ鬱ニハ異功散ニテ越鞠丸用ベシ或本ト鬱證ニ非ストイヘ以久病ナレバ鬱トナルモノナリ間ニ本病ニ拘ラズ六鬱湯ヲ丁貼モ用テ利ヲ得ルコトアリ鬱證ノ療治ハ氣門ト參看スベシ

治方

鬱怒肝脾血虛寒熱似瘧者和劑逍遙散蘇巴去薄主肝經血少

前證有血熱加木通逍遙散

因求謀不遂或橫逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致心念太過皆為氣鬱其狀胸滿脹痛脉沉而濇者氣鬱湯

解諸鬱一鬱湯○氣鬱加葛根蜜棗蘿乾倍附砂○濕鬱加白芍○熱

鬱加連倍梔○痰鬱加星枳橘○血鬱加桃紅服○食鬱加楂曲芽諸鬱通用越鞠丸○氣鬱者胸脇痛脉沉濇濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則喘寸口脉沉滑熱鬱者督悶小便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食便紅脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食入迎脉平和氣口脉緊盛是也六鬱ノ病狀加減與六鬱湯同此方或為湯劑用亦得

婦人嘔氣胸緊，連十餘聲，不盡，愛出氣心頭略寬，不嘔即緊。破鬚丹  
婦人離於夫而面赤胸塞，寒熱時，妄語有乾嘔，順氣和中湯加柴芩。  
寡居獨陰無陽色，心膽而多，不遂是以惡寒發熱全類瘧者，柴胡抑

肝湯

鬚證陽虛以四君子湯加溫熱藥，陰虛以六味丸加溫熱藥，  
退諸般鬚疾，六經實火涼膈散加桔

藥方

和劑逍遙散 紺三分半 茯苓酒二分 歸芍二分 白芍二分 柴芩酒各 煙姜薄少許水煎  
薛氏加服梔名加味逍遙散

氣鬚湯 酿培蒼朮陳夏各一錢，貝茯芍芎蘆白芍炒各一分，甘密

檳榔

右姜煎

六鬚湯 陳夏蒼朮各一錢，砂仁二錢，甘草一錢，白芍一錢，白芍炒各半錢，白芍分

右姜煎

越麌丸 麌炒，酌蒼朮，梔炒等分

右為細末，水丸，米豆，

大每服五七十九溫水下，或水煎此又一法也

破鬚丹

酌醋煮梔炒各四錢，連姜汁各

枳殼

檳榔

莪朶

青

勸

藜各兩

右共為末，水丸如梧桐子大，每服三十九食

後滾水送下

柴胡抑肝湯 柴

桔梗各三

青三分

艘一分

半

蒼

翻

施

艘

甘各一分

麵八厘

芎七厘

翹

趾各五厘

右煎服

順氣

和中湯膈噎

六味丸虛勞

涼膈散時疫

附方 交感丹

治一切諸氣公私拂情名利失志抑鬱煩惱七情所傷

不思飲食面黃形羸胸膈諸證極有神効

香附米

一斤長流水浸三日  
撈起炒乾忌鐵器

白茯神

去皮木為淨末四兩

右二味攪勻煉蜜為丸彈子大每清晨細嚼十九粒白淡湯下陳皮湯亦可抑氣湯下尤妙

醫療手引草中編下終

醫療手引草中編方次

伊

萎蕤湯

上編 冬溫 伊伊三黃湯

火胃風湯 上扁 泄泻

胃苓湯 同茵陳蒿湯

時行

路

六乙順氣湯

時疫 六和湯

暑

六磨湯

氣

六鬱湯

鬱

波

八解

散感冒

八味順氣散

中風

破棺散

同白頭翁湯

上扁

傷寒

八物湯

虛勞

八味丸

同下半夏泻心湯

二扁 半夏枳木丸

飲食

半夏白朮天麻湯

眩暉

貝母湯 欚嗽

排膿散 腸瘻

返魂丹

氣

破瘀丹

鬱

下破瘀丹

防已黃耆湯

湿

麥門冬湯

耳

人參敗毒散時疫人中黃丸上編二香散霍亂人參白虎湯溫熱病時疫人參養胃湯瘧瘧人參截瘧飲同人參實衛湯同人參三生飲中風下人參散感冒人參養榮湯虛人人參益氣湯麻木二妙散瘽二陳湯痰飲二神丸泄泻人參膏咳嗽人參固本膏同二冬膏同人參養肺湯肺癆人參平肺湯同二十四味流氣飲氣

浦

補中益氣湯內傷防風通聖散外感中風補心丸顛振保元湯虛下保真湯同

補肺湯咳嗽寶鑑瀉白散喘吼本事一方同保和丸傷食

偏

平胃散上編

傷食

土

獨參湯中風獨活寄生湯痺導氣湯麻導痰湯痰東垣瀉白散喘

東垣海金沙散濕桃核承氣湯上編

傷暑

智

竹葉石膏湯時疫

竹葉黃耆湯同調胃承氣湯上編地黃飲子中風

傷寒

下

舒筋三聖散同沉香天麻湯同沉香化痰丸痰飲沉香降氣湯氣

下

調中益氣湯內傷下地黃前燥

理

理中湯上篇傷寒 理中安蛇湯傷寒上綠袍散下篇涼膈散時疫上六君子上篇短氣

龍膽瀉肝湯火同通用方同 利氣丹中風 劍川窓治泄泻方泄泻下

雄

王宇泰一方濕

和

黃耆建中湯上篇傷寒 黃連解毒湯火 黃連香薷飲上篇暑 黃連湯火

黃芩湯同 黃耆六一湯汗下篇 黃耆桂枝五物湯痺下

和中湯上篇病

知母茯苓湯肺癆下

可

香薷散感冒行氣 香薷散同 香葛湯同 加味益氣湯同 香薷薷散上編暑

乾姜附子湯中寒

加減導赤瀉湯中風 加味二陳湯同 加味大補湯同

加味豆淋酒同

加減除濕湯下 加減潤燥湯同 改定三補湯同 加味虎

潛丸瘦下

加味八仙湯下 麻木甘姜苓木湯瘦下 香砂六君子湯上篇 香砂養

胃湯同 香砂平胃散傷食

香砂二陳湯上篇 葛花解醒湯同 紅丸子同

香連丸上篇

後世八味丸見續 加減八味丸同 加減益氣湯虛勞下

半夏湯痰飲 加味柴胡湯欬嗽

加減瀉白散喘吼下 甘遂

甘草乾姜湯上篇

傷寒

加味逍遙散

餘

陽旦湯上扁薏苡仁湯下同銘方刺楊氏秦艽扶羸湯諸捷

冬溫薏苡仁湯下同銘方刺楊氏秦艽扶羸湯諸捷

多

大青龍湯上扁傷寒大黃黃連瀉心湯傷寒對金飲子瘧導赤渴心湯傷寒

大柴胡湯上扁傷寒

大順散

暑導赤散

大補地黃丸

火燥大補丸

大秦艽

湯中風

大省風湯同

大防風湯

脾下當歸粘痛湯

當歸龍鬚丸

當歸

補血湯虛勞

代灸膏同

當歸四逆湯

上扁傷寒

當歸建中湯

下扁產後

連

冷香飲子中寒上靈仙除痛飲下羚羊角散

同

楚

踈邪實表湯

感冒踈風湯

中風

蘿合香圓

同搜風順氣丸

踈經活血

湯下蘆木白虎湯

中暑

蘿沉九寶湯

喘亂

蘿子降氣湯

同雙和湯

虛勞

增損四物湯

同

通

通痺散

下

宇

溫經益元湯

傷寒

烏藥順氣散

中風

烏犀圓

同烏頭煎

病

運瘀丸

效軟

文書卷之二十一

口扁下

方次

百三十五

烏藥散

右歸飲

虛勞

久

瓜蒂散

傷寒

回陽救急湯

同

回陽返本湯

同

九味羌活湯

時疫

瓜葛根

湯

同

藿香正氣散

感冒

火鬱湯

火

藿香安胃湯

痞

九味清脾湯

瘧

瓜葛

枳實湯

痰飲

杏仁五味子湯

欬嗽

回黃芩湯

同

回二陳湯

同

瓜子仁湯

湯

下

腸癰

回交感丹

引

下

滿

麻黃加术湯

溫

麻黃杏仁薏苡甘草湯

同

麻黃復煎湯

痺

計

桂枝附子湯

濕

桂苓甘露飲

同

桂芍知母湯

脾

啟脾丸

泄泻

桂枝人參

湯

虛勞

還少丹

同

瓊玉膏

同

景岳王泉散

諸疾

景岳一方

痰飲

上

不

附子泻心湯

傷寒

附子理中湯

同

不換金

感冒

上

分心氣飲

氣

茯苓補心湯

虛

勞

巨

五苓散

上篇

傷寒

吳茱萸湯

同

五積散

上

感冒

芩連消毒飲

大頭

五飲湯

疼飲

下

滾疼丸

同

牛黃清心圓

中風

古今錄驗續命湯

同

虎潛丸

痞

芩連芍藥

湯

下

五味異功散

上篇

短氣

五虎二陳湯

喘吼

五膈寬中散

膈噎

下

益元湯

傷寒

益氣養神湯

同

益元散

暑

益中散

泄泻

越鞠丸

欒

上

下

益氣養神湯

同

益元散

暑

益中散

泄泻

越鞠丸

欒

天

天麻丸

中風

天王補心湯

虛勞

阿

或秘方

虛勞

佐

柴胡桂枝湯

上扁

柴胡桂枝乾姜湯

上扁

柴胡芎歸湯

瘧

柴胡湯

火

柴胡湯

火

三補丸

同

柴葛解肌湯

感冒

三黃巨勝湯

時疫

三黃石膏湯

同

三黃梔

子豉湯

同

三一承氣湯

同

三生飲

中風

三化湯

同

犀角升麻湯

柴芩

起

芎蘿散

感冒

金沸草散

同

既濟解毒湯

大頭

近制清暑益氣湯

中暑

羌活勝溫湯

溫

龔氏蒼朮膏

同

稀苓丸

中風

羌活湯

瘧

枳木丸

傷飲食

橘皮枳术丸

同

麴麥枳木丸

同

枳實導滯丸

同

枳實大黃湯

同

芎歸散

甲飲

瘧

歸脾湯

虛勞

龜鹿二仙膠

同

却効散

同

橘皮湯

痰飲

稀涎散

同

王竹飲子

同

杏仁五味子湯

效嗽

桔梗湯

肺癰

橘枳姜湯

同

王竹飲子

同

杏仁五味子湯

效嗽

桔梗湯

肺癰

志

梔子豉湯

傷寒

十乘湯

同

神效滋雪湯

上篇  
傷寒

惺冬散

同

小柴胡湯

同

四逆散

同

四逆湯

同

小建中湯

同

小青龍湯

同

十味人參散

感冒

十一味溫胆湯

同

升麻葛

根湯

時疫

十神湯

同

神木湯

同

漿水散

寒

十味香薷飲

中暑

消暑十全散

生地黃煎

燥

四順清涼飲

同

施子蘖皮湯

同

滋燥養榮湯

同

生料

六味丸

同

瀉青丸

火

瀉白散

同

升陽散

火

至寶丹

中風

小續命湯

同

資壽解語湯

同

秦艽升麻湯

同

升麻胃風湯

同

惺鬆飲

同

除濕觸痺湯

痺

芍藥補氣湯

麻木

升陽益胃湯

肉桂

升陽順氣湯

同

治中湯

霍亂

四桂飲

泄泻

四苓散

同

芍藥湯

下

真人養藏湯

同

四物苦練柴胡附子湯

瘧

秦艽鱗甲散

虛勞

十四味建中湯

同

滋陰至寶湯

同

滋陰降火湯

同

參苓白朮散

同

十全大補湯

虛勞

辰砂妙香散

同

參术膏

虛勞

四君子湯

虛氣

湯心痛潤下丸

下篇

痰飲順氣和中湯

下篇

膈喧消風散

欬嗽

小陷胸湯

同

天王

調中湯

同

紫菀散

肺痿

炙甘草湯

同

正氣天香湯

陳四磨湯

同

分消導氣湯

同

逍遙散

下篇

鬱定心丸

下篇

顛振

惠

越鞠丸

蟹

益元散

中暑

飛

白术附子湯溫 白虎湯時疫 白虎加人參湯 同 百合湯暑 上 批杷葉湯傷食

枇杷葉散痰飲 秘傳斗門散痢 下 秘傳降氣湯欬嗽

毛

木香枳术丸傷食 木香乾姜枳术丸 同 木香人參生姜枳术丸 同  
木香擴榔丸積聚 木香流氣飲氣 木香順氣散中風 木香散泄瀉

勢

星香湯中風 省風湯 同 清痰順氣湯 同 清熱導痰湯 同 清心牛黃圓 同

攝生飲同 正玄散同 千金附子散 同 千金一方 同 清熱瀉濕湯溫 千金

五味子湯燥 千金乘門冬湯 同 清涼飲 同 清燥湯下 旋覆花根 生津補  
血湯下 缪氏白朮散泄泻 錢氏六味丸虛勞 聖愈湯同 前胡半夏湯  
痰飲 青州白圓子同 清肺湯欬嗽 千金溫脾湯痢 節齋芩連芳菜湯同  
下 千金生姜溫中湯肺癆 千金生姜甘草湯同

病門目次

傷寒立 感冒八十二

陽毒陰毒百六

冬溫百七

中寒百八

中暑百九

霍亂百十五

濕百十八

燥百廿五

火百廿七

諸熱一百一

中風一丁

痺二十一丁

麻木二十九丁


痿三十六丁

痙三十四丁

掣辛 顫振 頭搖 手擦掉八十 內傷罕 不能食六十  
傷飲食四十八 傷飲酒五十三 泄瀉五十 痢六十 瘆六 李  
虛勞辛八 痰飲九十一 咳嗽百三 喘吼百十四 肺癰百十七  
肺癰百八 胃脘癰百十 腸癰九 挠失音百二 痞百廿二  
氣百廿 鬱百廿 ○上下凡四十門主劑凡三百八十一方  
醫療手引草中編目次畢

每部頤認

此圖記



明和八年

孟夏吉日

皇都書肆

風月莊左衛門

高橋權 兵八衛

山本長兵衛

梅村三良兵衛

額田正三郎

鳥飼市兵衛

高田清兵衛

淺野彌兵衛

浪華書肆

鳥巢先生著書目

傷寒通玄類證

刊行

方的

的効方二百方附六經證治綱領  
各病諸証古方括要 小本二冊

醫療手引草上編

刊行

金匱通玄類證

撰注

近刻一冊

同中編

刊行

病家示訓

增補附錄

近刻一冊

同下編

近刻

和韓蕩考

後篇附家授切紙傳  
未刻一冊

同續編 各門方旨

刊行

六冊

和韓人參考

刊考一冊

同別錄

未刻

張氏醫通纂要

禁中全卷近刻一冊

醫方捷徑

未刻

二冊

全部二冊刊行

衆方規矩大成

全部二冊刊行

本邦良医賢達ノシタレク病全ノアタハ治療ヲナシ覚ヘタル藥方ノ的  
不的ニ甚深ノ妙理アル事ヲ口受シテ筆記ナシ置ケレ考解今日  
療治ノ日約トスベキ書ナリ

合類衆方規矩大成

副古方後世方經驗叢書

濕毒一切經驗良方

全部二冊刊行

此書ハ鳥巢道人著述ニアラズストイヘ此引草ノ中ニ往々参考スベ  
キヨシラシルス療用深理ノ書ナリ又近世用イラル、丸散方ノ効驗著明  
ナルヲサグリ求テ是ヲシルニ梅瘡ノ治方諸名家ニ秘セラル、  
藥方下痢便毒或ハ古湿トナリテ百方治セサルモ是ヲ用テ治シ得タル  
湿毒一切ノ療治経験ノ良方ヲノス

中條流產書

村山林益著

旭山先生考閱

全部二冊刊行

產前產後治療ハ中條流ヨント手引草ニモ記セラル是ハ古書ニ抱  
ラス的然ニ產婦ノ治療シ覚ヘタル方法ナハウキタル事ニアラズ冥ニ

婦人科ノ良書タ、中世旭山先生校正アリテ改メ刊行ス

## 王機微義

明徐彥純劉宗厚著

全部五十冊

刊行

黃帝内經ヨリ仲景傷寒論。金匱要略等ノ經旨某方ヲ病門ニ悉引證シテ治術ヲ發明シナヨ後世ニ及ヒ孫真人千金方。張子和儒門事親。王毒外臺秘要。嚴氏河間東垣丹溪。其餘諸名家ノ書ニ至ル。テ方論ヲ折衷シテノス内經。傷寒論。金匱。其外諸子ノ方論病門毎ニ附スルニヨツテ古方後世方ニ貫通シテ大ニ治療ニ益アル書目ナリ。

## 刪補方要

好生子著

全部五冊發行

良医好生子世ニ行ル、回春等ノ雜駁ノ書ニテ治療ヲ誤ルトヲ歎シ仲景ノ方ニモトツキ輯メタラサルニ後世トイヒ深ク考究シテ是ヲ撰ミ病門ヲ百九ニワカチニ千有餘方ヲ附ス和漢名医ノ方考治論ヲノス本邦医道盛ニ良医矣アリ。又ノ偏見ナク古方後世方ノ療法ノ庫藏ニ納テ久ドシ世ニ流布リ故アリテ書林閣ヲ得テ題

名ヲ改メ發行ス

## 錦囊外療秘錄

全部壹冊刊行

腫物ヲ悉ク畠ニアラハシ治方膏藥ヲ詳ニ記ス附スルニ下疳便毒五痔梅瘻湿毒一切ノ治方ヲ載ス

本草滙清康熙帝朝欽蘭章著

全部二十冊刊行

本草和解

菜名いろは分畠入

全部八冊合本四冊刊行

菜性能毒本草ノ要ナルヲ折衷シテノせ菜ノ真偽弁正ヲ詳ニス

天文醫案

三喜齋稿本若山立意注加藤玄順校

全壹冊刊行

仲景全書正誤

醫宗金鑑拔書

全壹冊

藥種名寄帳

前後集有

三

錦囊妙藥秘錄

明王夢蘭著

全部壹冊刊行

單方古方疾病沉疴ヲイヤスト神ノ如ク的中ナルヲ撰アツム

本艸弁明

茶ノ能毒製法真偽等近年  
國手人說ニ紀シ簡便ニ書ス

全部壹冊

華佗中藏經

魏ノ世ノ名医古方ノ遺リテ  
ミツベキモノナリ

全部五冊合本壹冊

小兒活法

小兒療治本并秘方ヲ輯錄ス  
讚陽良医松下元真著

全部一冊

增補燈下集

啓迪院道三先生治療ヲナシテ効驗著明ナル  
茶方ヲ撰ニ用イ方加減法詳ニ記セラル、書ナリ

痘疹方論

痘瘡麻疹ノ療治本

全部五冊

浪速書肆

高麗橋壹丁目 藤屋

彌兵衛

心齋橋四丁目

吉文字屋

市兵衛

