

×

y 3-2

F
イ-136

古式新式
式
繇
劍

藥



富士川
1395

八
江
書

Vertical handwritten text on the left edge, including '八江書' and other characters.

十
下

4909

Ix-5

No 4150

18 Y 3-2

医心研究文書

藥方全書

古方後世方經驗

脈痛法

蒼朮

香附子

川芎

白芷

茯苓

山梔子

神麴

厚朴

陳皮

羌活

獨活

醫方類聚 引卷序

490,9

I

No. 4150

18 y 3-2

昔時漢京の御とらふ醫方あり其を以て
三河の國とやしんすふし正徳四年三月乃
比り利志毒祓ぐひよりて丑の日毎々
齋戒沐浴して

寛政十一年卯月廿一日

其の目ふあつては殊文猶ぬ彼翁の志は
候名書に透書とありてを境を部
録ふ多し交處の信ふ通しありて其の助
しなりんてはかろりさばひと一通りれ徹
る未めしてのあははち又とくならぬとて思

海正徳比より享保にむらまて宛宛
ず年の著書毎よ松梅の二本と注のかりに
極て初念をるん事法に志はあはれ又の
年の春彼翁身はより侍ぬらておましと止
おん事と哀と成血塘其父の志とほき今事

寛文唐己卯にありては幸い、つのだあつては

神徳と仰て瑞書と云ふ予辞と云ふこと
二夜あるふはうせ松梅院法印禅深
ふや成流るのこ

一医療ノ才引羊序



天下之水莫若於四瀆之大者爲
堯之時橫流任濫お中州神聖其
汝之九河危

可得而食也...
長沙氏於醫中推四續之大平其
浸鉅矣生得原其流遠而此僅
亦久矣吾 邦唱長沙之業者以
於丹水名復先生而令其述

長沙瀟傷寒者其甚也然而莫
有手爾者亦莫有手爾生也塘
加藤君夙受業於名復氏而研
精傷寒者手頭年昔手遊于
京師茲加...

茲君來任...
曰是先人謙翁翁送命而止才
之者也吾嗣其志念諸剗剗氏因
求序於足下余冀以此書為記以
國字於于傷寒終于瘧疾提綱

系額我然全傷豈非衛生之一助乎
夫惟長沙之於醫醇學之曰慶之大
為空行隘之後也筏之篙之抱歛
泫之之方者君也耶請為之業
尋積石解...
可...
...

得者吾全只一語云

寔曆亥未三月

及毒產飲負蒼禱識



醫療手引草上編方目

乾 傷寒附感冒 十六 三十八方

桂枝湯 麻黃湯 大青龍湯 小青龍湯 五苓散 桃仁承氣湯

甘草乾姜湯 葛根湯 大承氣湯 調胃承氣湯 小承氣湯

蜜煎膽導 小柴胡湯 大柴胡湯 小建中湯 桂枝加大黃湯

理中湯 麻黃附子細辛湯 麻黃附子甘草湯 四逆散 四逆湯

四逆加人參湯 通脈四逆湯 通脈四逆加豬胆汁湯 白通湯

茯苓四逆湯 白通加豬胆汁湯 附子湯 真武湯 桂枝人參湯

白頭翁湯 當歸四逆湯

申力欣靈

柴胡桂枝湯 三合湯

大頭溫病 七十一 六十二方

芩連消毒飲 清上養中湯

冬溫 七十一 二方

陽旦湯 葶藶湯

溫病 七十一 一方

黃芩湯

溫疫 八十一 溫毒 八十二 陽毒 同上 陰毒 同上 中寒 八十三 傷風 八十四

濕溫 八十一 以上無方

時行 八十一 八方

達原飲 人中黃丸 清熱解毒湯 六神通解散 三一承氣湯

白虎湯 涼膈散 茵陳蒿湯

瘧病 九十一 三方

括蕁桂枝湯 小續命湯 如聖散

中暑 九十一 七方

消暑十全散 近制清暑益氣湯 東垣清暑益氣湯 香薷飲

黃連香薷飲 十味香薷飲 大順散

霍亂 百一 一方

金屑丸

痢疾 百二 十五方

芍藥湯 和中湯 芍藥芍藥湯 真人養臟湯 參飯芍藥湯

香連丸 胃苓湯 參連湯 連理湯 參苓白朮散 柴苓湯

加味附子理中湯 消痞湯 秘傳消痞丸 逆挽湯

泄瀉 百十 十二方

田月苓湯 理中湯 四苓散 香薷散 五苓散 香砂平胃散

胃風湯 二陳湯 參苓白朮散 四神丸 六桂飲 八桂飲

坤 癰 初丁 八方

柴胡姜桂湯 柴胡桂枝湯 白虎加桂枝湯 九味清脾湯

七味清脾湯 柴白湯 十味不換金散 人參養胃湯

傷食 七丁 九方

平胃散 枇杷葉湯 保和丸 備急圓 香砂二陳湯 紅丸子

枳實導滯丸 木香導滯丸 葛花解醒湯

內傷 十五 四方

補中益氣湯 八解散 香砂六君子湯 香砂養胃湯

虛勞 二十 十方

人參養營湯 救陰理勞湯 滋陰至聖丸 通達散 反脾

金匱麥門冬湯 小青龍加石湯 參苓白朮湯 參朮膏

諸血丁廿九 九方

獨參湯 熊參湯 犀角地黄湯 三黃瀉心湯 芎朮膠艾湯

猪苓湯 清腸湯 麥門加石湯 飯脾湯

諸汗丁三十 八方

當歸地黄湯 桂枝加龍骨牡蛎湯 竹葉石膏湯 當歸六黃湯

人參養胃湯 保元湯 當歸補血湯 七味地黄丸

痰飲丁三十 九方

桂苓木甘湯 小半夏湯 小半夏加茯苓湯 外臺茯苓飲

十棗湯 同變方 控涎丹 滾痰丸 五飲湯

咳嗽丁四十 五方

小青龍湯 麥門冬湯 桂苓五味甘草湯 清肺湯 杏仁五味子湯

喘丁四十 四方

黃芩半夏湯 蘓沉九寶湯 括蕪枳實湯 蘓子降氣湯

短氣丁四十 少氣同上 逆氣同上 七方

四君子湯 生脉散 獨參湯 藳附湯 保元湯 杏子湯

越婢湯

脚氣丁五十 八方

小檳榔湯 大檳榔湯 腎氣丸 蘇子降氣散 木菜散 杉木湯 礬石湯 水陳湯

厥 五十 無方

痞滿 五十 四方

養胃湯 半夏瀉心湯 三黃湯 局方三黃圓

積聚 六十 十二方

三黃瀉心湯 小柴胡湯 柴桂湯 厚朴七物湯 瀉脾湯

寬中湯 大建中湯 桂枝茯苓湯 抵當丸 柴平湯

茯苓桂枝甘草大棗湯 大七氣湯

水腫 七十 十八方

越婢湯 厚朴七物湯 半夏瀉心湯 蕪子湯 小檳榔湯

桃花湯 桃人承氣湯 抵當湯 八味丸 真武湯 實脾飲

壯原湯 附理加桂茯苓方 益氣湯合五苓散方 濟生腎氣丸料

分心氣飲 分氣補心湯 導水茯苓湯

脹滿 八十 十方

補中消脹湯 寬中丸 寬胃湯 治寒脹一方 治熱脹一方

厚朴七物湯 十棗丸 實脾飲 壯原湯 參附理陰煎加白朮方

產前後 九十 十方

本味七味生氣散 補虛湯 安產名方

黑藥順榮散

安神散 失笑散 奪命丹 無憂散 芎藭調血飲 勝勢飲

揚梅瘡并結毒 九十 五方

消疳敗毒散 消風敗毒散 大元湯 和劑三黃圓 即驗丹

痘疹 百十九方

加味敗毒散 加味升麻葛根湯 加味參蘓飲 消毒飲 正氣散

十神解毒湯 温中益氣湯 近制清暑益氣湯 木香異功散

凡二百三十餘方

上編方目 畢

引用家書目

謙齋輯錄

古方正通考 八卷

金匱千金脉經拔書

同續通考 八卷

從本事方到宋元拔書

醫方拔粹 十七卷

從明初到崇禎拔書

醫方拔粹 十五卷

張氏通拔書

縱衡良方 二十六卷

以本草八百餘方為主方
以活方二千餘方為客方

日用類聚方 四卷

日用療方

古方活用 二卷

傷寒論方中後世活方
多者以五十方聚之

傷寒類證改輯 一卷

小刻

病家示訓 一卷

小刻刊行一名医者雀

本草精義 十二卷

綱目傳共 稻翁松岡翁物産録

六八本草 二卷

中山氏片玉本草頭書

本邦老醫傳 二卷

諸家和流傳

和漢經驗方 二卷

聚奇方妙薬

回春頭書 八卷

辨正

内經知要 全部

諸註用捨自見解

以上十五部藏書

以上十五部藏書目

凡例 此書ハ昔ス...

此書松梅院序文并題言ニ云ヘルゴトク辺鄙ノ医ニ乏シキ地ニ...

ケニナラニコトヲ思フテ假名書ヲ以テ先人口授アリシ書ナリ...

四十餘年ヲ歷テ療治ノ風ニ變リアルニヨリ予當時見聞シ...

又ハ經驗ニ及レコトヲ増補シテ當流施治ノ意得トスルナリ...

○藥方手近キ方ハ載セズ國字書ニ定榮堂板行ノ衆方規矩大成...

簡便也加減法モ詳ナレ藥方ヲ見ルニハ右ノ書ナドヲ參考スベシ...

此書ハ治法ノ論ヲ主トスレバハシリマハリノ手近キ...

藥方ハ拳ス畢竟大成論ナドノ通...

○此書ニ拳ル處ノ藥方ハ古方後世方ニテ家々ノ傳方又ハ妙方ノ類或方ニヨリ分量煎法ノ傳アリ或手近キ方ト云ヘ凡病ニヨリテ專用ノ方ハ藥品唐和ヲ選^ニ真偽ヲ詳ニ藥方ノ下ニ旁書ス
○脈ノ部位サシアタリ寒熱虛實ノ脈ニテ見レルヲ載セテ素難ノ今日用捨ノ大端ヲ書載ス

○此書上編病門四十餘條アリ病門ニヨリ諸流ノ療法ニ見識イヅレモアリテ一^ニ概^ニ偏ナラサルヤウニ或ハ用ヒ或捨ツ唯俗通シ安ク假素人ノヒヲ取ザル人ト云ヘ凡病家ノ意得ニナラシコトヲ思フテ此書ヲ著スモノナリ

方目

意

- 萎蕤湯 上七 十八
- 胃苓湯 上七 百
- 胃風湯 上六 百
- 茵陳蒿湯 上九 十四

路

- 六神通解散 上九 十三
- 六柱飲 上七 百

波

- 八柱飲 上七 百
- 麥門冬湯 下四
- 石湯 下五

半夏瀉心湯

下八五

白頭翁湯

十四

耳

人中黃丸

上九

二陳湯

上六二

浦

保和丸

八下

保元湯

下六三

補中消脹湯

下八八

補虛湯

下五九

寶丹

下七

本味七味生氣散

下九

遍

平胃散

下七

便毒下方

下百

七

桃仁承氣湯

上八四

桃花湯

下八

導水茯苓湯

下八

當歸四逆湯

上五六

當歸補血湯

下三

當歸六黃湯

下三

當歸地黃湯

下三五

痘科鍵木香異功散

下百

東垣清暑益氣湯

上

智

如聖散

上九

竹葉石膏湯

下三

治熱脹一方

下八

治寒脹一方

下七

滋陰至寶湯

下七

實脾飲

下八

十味不換金散

下六

十棗湯

下四

十神解毒湯

下百

十味香薷飲

上

參連湯

上

參朮膏

下二

參苓白朮散 上 百
參飯芍藥湯 十
參附湯 下 五

參附理陰煎加白朮方 下 九
調胃承氣湯 十 上 五

張氏近世清暑益氣湯 下 百
猪苓湯 下 三

理

六神通解散 上 九
六柱飲 上 七
涼膈散 上 九
理中湯 上 五
上 百 十五

雄

黃芩湯 上 八
黃連香薷飲 上 百
黃芩半夏湯 下 四

黃耆內托散 下 百

和

和解湯 上 六
和中湯 上 百
和劑三黃圓 下 百

黃芩湯 上 八
黃連香薷飲 上 百
黃芩半夏湯 下 四

當歸可血湯 下 六

香薷飲 上 百
香連丸 上 百
香砂平胃散 上 百

香薷散 上 六
香砂二陳湯 下 十
香砂六君子湯 下 二

香砂養胃湯 下 二
葛根湯 上 四
甘草乾姜湯 上 四

紅丸子 下 十
控涎丹 下 四
厚朴七物湯 下 六

痲瘡敷藥 下 百
加減敗毒散 下 百
加味參薤飲 下 九

加味附子理中湯 上 百
加味升麻葛根湯 下 九

加減藿香正氣散 下百十九
葛花解醒湯 四十一
寒脹 下八十七

陽旦湯 上七十八
養胃湯 下七十五

達原飲 上八十六
奪命丹 下九十七
導水茯苓湯 下八十四

當歸地黃湯 下三十五
當歸四逆湯 上六十五
當歸六黃湯 下三十五

當歸補血湯 下三十三
當歸活血湯 下七十八
桃花湯 下九十七

桃仁承氣湯 上八十四
大青龍湯 上七十四
大承氣湯 上五十五

大柴胡湯 上五十三
大順散 上百一
大欖榔湯 下五十二

大七氣湯 下六十五
大建中湯 下六十三
大元湯 下八十八

涼膈散 上九十四
連理湯 上百一

楚

蘓沉九寶湯 下四十七
蘓子湯 下五十二
蘓子降氣湯 下八十四

即驗丹 下百一
壯原湯 下八十二
搜風解毒湯 下百八

津

通脈四逆湯 上九十五
通脈四逆加豬胆汁湯 上九十九

紵

醫方類聚

熱脹一方 下七八

無真愛散 下七九

溫中益氣湯 下百

寬中湯 下三六

括蕞枳實湯 下八四

寬中丸 下八

括蕞桂枝湯 下七九

驅邪湯 下六

養胃湯 下七五

麻黃湯 上十四

麻黃附子細辛湯 上十五

麻黃附子甘草湯 上十五

桂枝湯 上十四

桂枝人參湯 上十六

桂枝茯苓湯 下六

桂枝加龍骨牡蛎湯 下三

桂枝加大黃湯 上十五

桂枝求甘湯 下四

杏子湯 下五

外臺茯苓飲 下四

杏仁五味子湯 下四

計

滿

上十四

上十五

上十六

下三

上十五

下四

下四

下七五

上十五

上十六

上十六

下三

下四

下四

下四

下七五

上十五

上十六

上十六

下三

下四

下四

下四

上十五

上十六

上十六

下六

下四

下五

下四

下四

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

下八

不

茯苓四逆湯 上十五
茯苓桂枝甘草大棗湯 下十六

附子湯 上十六
附理加桂枝方 下十八

分心氣飲 下十八
分氣補心湯 下十八

巨

苓連消毒飲 上十七
苓連芍藥湯 上十九
控涎丹 下十四

吳茱萸湯 上十六
黑藥順榮散 下十九
滾痰丸 下十四

五苓散 上十八
五飲湯 下十二
五皮散 下十八

厚朴七物湯 下十六

天

調胃承氣湯 上十五
抵當丸 下十六

安神散 下十九
安產名方 下十九

柴胡桂枝湯 上十七
柴胡姜桂湯 下十七
柴白湯 下十六

柴苓湯 上十七
柴平湯 下十六
三黃瀉心湯 下十三

三合湯 上十七
三黃湯 下十五
三一承氣湯 上十四

三聖湯 下十七
犀角地黄湯 下十三
仕原湯 下十八

仕

仕

濟生腎氣丸料 下八 杉木湯 下五 散血消脹湯 下八

搜風解毒湯 下百

芎藭散 上七 芎藭膠艾湯 下三 芎藭調血飲 下九

杏子湯 下五 杏仁五味子湯 下四 金屑丸 上二

救陰理勞湯 下七 近制清暑益氣湯 上二

枳實導滯丸 下二 玉丹 下七 飯脾湯 下八 逆挽湯 上二

熊參湯 下九

熊參湯 下九

美

蜜煎膽導 上二

志

四逆湯 上八 四逆散 上五 四逆加入參湯 上九

四苓散 上六 四神丸 上七 四君子湯 下四

小柴胡湯 上二 小承氣湯 上五 小建中湯 上四

小青龍湯 上七 小續命湯 上九 小半夏湯 下四

小半夏加茯苓湯 下四 小攢柳湯 下五 參連湯 上十

參苓白朮散 上十七 參飯芍藥湯 上十 參朮膏 下二

參附湯 下五
參附理陰煎加白朮方 下九

十味香薷飲 上五
十味不換金散 下六
十棗湯 下四

十棗變方 下四
十神解毒湯 下百
真武湯 上六

真人養臟湯 上九
七味地黄丸 下三
芍藥湯 上九

神効沃雪湯 上六
滋陰至寶湯 下二
瀉脾湯 下六

實脾飲 下八
失笑散 下七
勝勢飲 下九
如聖散 上九

消暑十全散 上七
消疳湯 上十
消毒飲 下九
生脉散 下五

趙婢湯 下五

趙婢湯 下五

飛

白虎湯 上九
白通湯 上六
白通加豬膽汁湯 上六

白虎加桂枝湯 下六
枇杷葉湯 下八
備急圓 下八

祕傳消疳丸 上十

毛

木香導滯丸 下十
木茱散 下五
木香異功散 下百

勢

清上養中湯 上七
清熱解毒湯 上九
清腸湯 下三

清肺湯 下四
消暑十全散 上
消疳湯 上十

理會シテ医学ノ暇ニハ儒席ニ徘徊シ經學歷史ヲド麓々の二
聞ナレ當時ノ時医ノ門ニ入り調合場ニ行テ其流義ノ方劑ヲ
記憶シ玄關へ來ル病客ノ病狀ヲモ見覺へ或代脈ニモ行キ略
病人ノ模様ヲモ耳目ニ觸ルトイへ凡其時医補茶ツカヒモア
リ瀉茶ツカヒモアリ或補瀉ニ偏ツカズ諸病六君子異功散ナ
ドニ家々ノ加減ノ使ヒ覺アリテソレヲ覺ルハカリニテ外ノ
流義ハ一向シテ素京師ニアツテ縉紳家又ハ町人ニテモ財主
ト呼ル者ノ療治ノミヲスル時医ナレバ此流義ヲ假國ノ後農
夫脚カタトノ形体ヲ働キ心氣ヲ苦シメサル者ニ施セバ往々害

ヲ招クトアリ假令害ナクモ某緩シテ効速ナラス勿論辺鄙ニテモ
人ノ虚實ヨリテ補瀉ノ用方ハカワラ子氏先和ヲカニツクシキ
藥ハカリニテ効ナシ其故正徳年間ノ医生五三年京師ニ學テ歸
國ノ後彼傳來ノ通ニテ療治シテ見レ思フマウニ働ラカサルニ往々
再ビ京師ニ來リ医学スル者多クアリ然トイへ凡一体医学ノ各込ア
シク療治方ノ立不吟味ナレバ愈學テ愈暗ク望洋トシテ取リシ
マリナシ一生半上落下ノ見解ニテ療治的當ノ處ヲ見取ル人希也
諸医書ヲ胡乱ニ見タホトニテ不濟事又少ク見テ濟テモナレ唯
肝要ノ處ヲ日用へ引アテ、學ガ眞ノ医学ト云モ子リ何程医

書ヲ見テモ療治下手ナレハ学文セヌヨリ劣レリ故ニ素人ノ謬ニモ
 学医ハ七ガ一ワラヌト云モイハレイワレヌコトナリ勿論氣轉ニ医者
 ノ第一ナレハ医学ヨリ出タル氣轉テナケレバテシホノメツタノト云
 モナリ其氣轉ガ即チ学文ノ事学文トハ氣轉ノ事ニテ氣轉
 ナキ学文ハ医書百部暗ジテモ何ノ役ニ立ヌナリ尤孟子所謂
 雖有智慧不如乘勢トアルゴトク時医ハ格別上手ノヤウニ外見ニハ
 アレハ思ノ外内證樂屋カラ見レバ鹿未ナルコト多シ又病功ト云モ
 ノニアノ子ハ療治ガ働カヌト云成程尤ナルコトナリ然レハ病功モ一休医
 学ノ仕立アシケレバ病功ニアタルホト愈下手功カイテ愚ハニス愚ニ

カヘリテ偶医学ノ本法ノ筋ヲ聽テモ吾愚見ニ敵レテ彼擔板
 漢ノ譏ヲ免レズ其故下手功ノ病功ハ所謂技究ニ至ルナリ
 正徳年間ニ先人書生等五六輩ヲ集メテ手渡ト此書ヲ名テ先
 一通リノ療治方ノ立ヲ口授アリシナリ當年ニテ凡五十年ニ
 及リ其節ハ京都ニモ今時ノヤウニ古方家ノ傷寒金匱カ專
 トスル流義希ニシテ名古屋丹水翁百年前ニ仲景ノ方ヲ始テ
 日本ニ弘メテ桂枝湯建中湯理中湯ヲ專ラ投セリソレ迄ハ本
 邦ノ醫者桂附ヲ容易ニ遣ハズ律義ナル療治方ニテ敗毒散正
 氣散三和散五積散香砂養胃湯トヲ專用シ至極ノ補茶ト云

補中益氣湯ナリ或假初ニモ滋補ニ眼ヲツケテ滋陰降火湯
 地黄丸ハ物湯太補湯ノ類ニテヘタツイタル藥カ世上ニ流行
 セシナリ此時ニ至リ丹水翁桂枝建中理中ノ温補ノ氣茶ヲ專
 ラ投ジテ天下ニ名譽ヲ顯セリ實ニ本邦ニテ始テ仲景ノ諸方
 ヲ施ス元祖ナリ其末流今ニ至リ諸國ニモ多シ然ルニ丹水翁
 ハ補瀉温涼トモニ病ニ應ゾ施セ凡末門ノ輩ハ白虎承氣ノ類
 妄リニ投メ誤ンコヲ恐レ醫方問餘医方規矩等ノ温補ヲ主ト
 シタル書ヲ家書トメ門人ニ傳ハレハ寒涼攻擊ノ劑妄用テ
 人ヲ誤ラシラ恐レテナリ今一病人アツテ補劑ヲ用ルコト二三

貼ニシテ病劇シキ者ハ瀉茶ヲ用テ即効アリ病家補茶ヲ用テ
 ル医者ヲ叱ルトイヘ凡末夕人命ヲ害セズ是病ニハヨレモ見
 定メタル事モナキニ胡乱ニ劈初頭アラキ事ハ用捨スヘ諸
 病ニ臨ミ此意得アルベキコト也然レ凡急ナル病ニサヤウナル
 不三不四ノ療治ハ仕カタク急ナル病ハ一貼半貼ノ内ニテ補
 茶ノ功ハ中ルカ不中カアラハレルモノ也補茶ヲ用リ相應ナ
 レバイヨクノ事若シ的中セサレバ病勢ガ増減スルモノナレ
 バ早速ニ瀉茶カ寒茶カ攻擊ニ改ムレバ一貼ホト用ルウチニ
 即効アリ又補茶ノ場へ寒茶瀉茶ヲ用レバ急病ナドハ忽害ア

ツテ最早取り返シカナラス俗ニ一貼ニテ見セツケタト云ハ
 是ナリ又補菜ノ證ナレドモアコリ虚脱セ又病ニ寒ヲ瀉菜ヲ用
 レバ忽ニ害ハナサズトイヘドモ病ニヨリ五七日ノ中ニアケモ
 オロシモナラスヤウニナリテ一向手ガツケラレヌヤウニナ
 ルモノ也殊ニ傷寒痢疾産婦ナドハ急ニ補フカ急ニ瀉スルカ
 手際モノナレバ別ノ精ク考ベシ近世古方專ラ行ハレ寒涼攻
 撃ノ劑エシヤクモナク用ヒ見事ナ手柄モアレバ又見事ナ仕
 損モアルナリ然レドモ今京都ナド一テハ素人モ功者ニナリテ
 病家ヨリソレクニ補菜ツカイ瀉菜ツカイヲ選テ擬コトナレ

ハ中々医者ヲ頼ニスル事ニラナシ故ニ瀉菜ツカイモ補菜ツ
 カイモ足モトカラ鳥ノ立ツヤウナル仕損モナク偏ナル流義
 ナリニ相應ニ通リテユク丁性々アレバ田舎ニテハ何事モ
 一医者ニ打任せオキ息引取テ医ヲ轉セザレバ生死ハ全ク医
 者ノ方寸ニアリ寔ニ審察明辨セズニバアルベカラズ爰ニ片
 鄙ノ夕々日本医道ノ傳來ヲ荒方左ニ記スモノナリ
 病家示訓云本朝医道の元祖ハ神代太巳貴命少彦名命のニ
 神ハ始は今の五條天神ハ即少彦名命の御鎮座なり其法術
 くらり上古の事かんば今にも傳つて此中古欽明天皇推古

天皇御宇百濟國より醫博士并採茶師と我朝に奉は我朝
 にも亦医術名譽の人相續て医博士典茶頭に備はる中ふ
 於て和氣清磨の長子和氣の廣世と申此八此道の妙を得て
 子孫相續て醫の名家より又丹波康頼と申名醫出ひて終
 に和氣丹波の兩家と以て代々典茶頭に備ふ廣世ハ茶經大
 素と申書と撰ひ康頼ハ醫心方と申書と著す其外菅原岑嗣
 の金蘭方五十卷安倍真貞の大同類聚方百卷出雲廣白の難
 經開委細川勝元の靈蘭集皆名高き書なり又朝野群載に見
 る承暦の頃百濟國王后風疾と患へ我朝の醫師丹波雅忠

と求め迎へられりるの朝廷僉議ありてはくまのふと
 小極て百濟へ返翰の中に雙魚猶難達鳳池之浪扁鵲豈得へ
 雞林之雲乎の句あり是等の事實と考る我朝名醫に乏し
 のる代々の名醫の撰とこころの書藉其數多しといふこと
 家々の秘傳として他小出す事なく其内は家相續るよりそ
 斷絶するものあり或火難ふかりて焼じするものありて書
 本今に傳る夏也惜きといふものも必ありあり今在る所
 々に奇妙とする和方の茶ハ其書傳らばといふも其方のみ
 ばふ傳へ残つるもの欵然とあり日本流の医道ハ名

有^ナか^カく^ク傳^ワる^ルこ^トれ^シし^テれ^ルゆ^ニ中^ナ頃^カ医^ノ道^ヲ衰^ハ微^クし^テ脈
 を^シら^フ病^ノ証^ヲと^シて^シ療^ス治^スを^ル人^もな^く家^々に^シ茶^方は^らう^覺
 へ^たく^く入^りて^テ何^ノの^病は^ハ何^トの^人茶^方は^らう^覺と^シて^シ田^舎の^妙
 業^者医^者の^如く^から^うら^う然^るの^寛正^天文^の間^に武^州河^越
 越^ス導^道講^ハ三^喜申^人大^明へ^渡り^て十^二年^の間^に彼^國に^在
 て^シ医^術と^学び^日本^へ歸^リて^シ名^医と^なり^其弟^子は^彼名^高三^道
 三^との^人出^て是^{より}專^ら世^上に^シ医^術廣^く弘^{まり}ぬ^此家^三
 三^代相^續て^シ道^三と^稱す^始と^一溪^道三^との^人是^道の^始也^也
 其^次は^玄朔^其次^は玄^鑑皆^道三^と號^と此^家れ^門流^天下^に弘^く

中^りて^シ上^手も^下手^も脈^を取^りて^シ病^症と^考て^シ茶^と合^せ医^者の^一
 一^体備^へる^此家^{より}始^まり^其後^此家^{より}玄^治法^印と^申
 各^名医^出て^シ一^家の^医術^をあ^らう^然る^とし^ても^是ま^の醫^術
 術^へ東^垣丹^溪の^書小^かき^りて^シ療^治本^は万^病回^春医^学正
 傳^のを^承り^其後^大坂^の見^宜医^学入^門小^{より}て^シ名^譽と^天下
 に^あら^う其^後薛^已が^十六^種は^らめ^て渡^りて^シ林^市之^進と^云
 人^此書^と見^て人^参を^多く^用ふ^て以^て仕^賞て^日本^薛已^流乃^祖
 祖^{なり}今^時は^らう^の藪^医者^も恐^るに^多く^人参^とは^は
 の^うの^市之^進小^始ま^り此^時分^小類^經と^いひ^て素^問靈^樞

の抄セウもよりりらるゝ以テ郷チヨウ庭テイ東庵トウアンと申マカ人ヒト此コノ抄セウよりりて素問ソモンの講カウ譯トクと始シめられ今イマ小コ至シりて日本ニッポン医書イセ讀ヨミと云イハひ皆ミナ東庵トウアンの末流マツライなり東庵トウアン以前イマムナシの素靈ソレイの書シヤク有アルかぎり濟スベぬニんナらズりてありしなり其ソノ後ノチ名古ナカク屋ヤ玄ゲン医イと申マカ人ヒト程チヨウ應オウ邦ハウ俞ユウ嘉カ言ケン等トウ書シヤクふよクるニ自ミヅカ仲ナカ景ケイ流リュウと稱ホウして附子ブシを恐オソれなくはうい出イされり也ナリ尤モト市シ之ノ進シンも薛セツ已イふヨリりて附子ブシとて餘程ヨホホはうるニれりかと玄ゲン醫イ以來イライ専センら附子ブシははうい覺オシし也ナリ此時コノトキ大坂オホサカ以北キタ山ヤマ壽ジュ安アンと申マカ人ヒトのり大博オホク学ガクの人ヒトめて医術イセの條理ジョウリに精ホウしき人ヒトなりナリ備ヒ此時コノトキ分マり於オキて世間セケン名高ナカクき医者イセ是コノ心ココロかきうウ山ヤマ脇ワキ道ミチ朝長アサナガ澤サハ道ミチ壽ジュ

武城フキジョウ小コ於オキて井関イセキ玄ゲン說セツ竹中タケナカ通庵ツウアンその外ソノト吳ウ雲ウン子シの門人カドエ名ナ医イ多タとスととも市シ之ノ進シン玄ゲン医イの療治リョウヂの風フウ乃ハカ寢ネまラの機キ會クワイに関人ニかりシよりりて別ベツしてシ友トモと記キし侍シるニ医道イセの道統トウテイを云イハふはわれず市シ之ノ進シン玄ゲン醫イ壽庵ジュアン此コノ三人サンニンよりりして日本ニッポンの医流イセ仔細シジヨつゝく向上カウジヤウになりぬ然シカれも療治リョウヂの上手ウヂテは古コ小コ及ヨクと此コノ医道イセのこといあらひ萬事マンジの手練テノレンは唯タカ古人コノリノヒトことをゆかりと侍シるニ日本ニッポン医術イセ中項ナカテウ斷絶タンゼツし傳デンらる事コトの心ココロもシかなクとシ事コトはありともや○道ミチ三家サンカの外ノト竹田タケノタ吉田ヨシノタ久志クシ本モト板坂イタサカ上池ウエノイケ院インは半井ナンイ瑞スイ策サクの和氣ワケの末孫マツソノ正親マサチカ町院チヨウイン御宇ギョウ又マタ院インの字ジと給タクハりて通仙ツウセン院イン野菴ノヤウと

號此又施茶院セヤクインハ和氣長成ワカチナガニ始ヨて代々有ヨ之天正年中豊臣秀吉トヨトミヒデ公江州乃全宗センソウと云名醫を進スめて施茶院とせり其外名家ミヤカありといへども道三を以て中古とせりハ天下此流多きと以てかり又療術リョウジュツも大やう道三家ミチサンカと同じき由ヨき及ぬ精クワき更ニトハあつた猶後日と俟マツりのかり

此書ヲ手引草ト名ツケシハ容易ナル書名ナレ氏究ウチキウメテ日用療術リョウジュツノ緊要キンヤウヲ採トテ先人初学ソウガクノ隨ス分理會リクワイシヤスキヤウニ口授クコアリシ書也手渡トハカリ其節セツ云シガ今歲寶曆戊寅ノ年寄宿キレシヨク醫生ノタメニ昔時ソノカミ口授ニ預アリシ人ヨリを請コヒテ医療手引草ト

名ツケテ指當サシタウリ捷徑セツケイニ治療ノ口訣クツケツヲ述ノベ又予カ見聞スル所ノ當世トウセノ諸流シヨリウヲ畧増補リョクゾウボスルモノナリ最初ソウゴニ傷寒六經シヤウカンロクケイノ治法ノ大要ダイヤウヲ拳ケンテ段々ダンダン雜病ノ口授クコヲ述ノルナリ

○丹水翁ハ傷寒金匱キンケイノ方中ニ於モテ專モツラ温補ウンポヲ主ヒトシテ陽氣ヨウキヲ貴タツズ昔時ソノカミ飯田棟隆イイダトウリウ子ハ丹水翁ノ門カドニシテ別ワカメ温補ウンポノミヲ諸病シヨウニ投ウメ京師キョウシニ鳴ルナ聊イハモ寒涼カンリョウ攻撃カウケンキハ用ヒズ是仲景チュウケイ流リウトハイハ氏仲景チュウケイノ補劑ボクザイハカリヲ用タルモノナリ此棟隆トウリウ子ノ門下諸國シヨクニモ多シシ今モ其末流シノヘリウニ偏ヒナリ爰コニ小松流コマツリウトテ万病マンビョウトモニ附子フシヲ用ルル流リウアリ中頃ナカゴロ京師キョウシニ鳴ルナ原ハラハ棟隆トウリウ子ノ

門ナリ元來温補ニ偏ナル流ナレバ一見識ヲ立テ附子ヲ水ニ
 數日浸シ其性スツヒカ又キ附子茯苓乾生薑ノ三味ヲ以テ扶陽湯ト
 名ケテ諸病ニ加味メ用ユ素リ虚寒ノ證ニハ一貼ニ附子八錢
 一テ用テ小劑モ一貼ニ附子八分ナリ其病ニ的中スレハ大劑
 ノ効愈ルコト速ナリ然レハ實火或痰火ナトハ大ヒニ障ル
 然ルニ今世間素人モ功者ニナリテ附子ノ相應シソウ大病ヲ
 大抵考テ擬ユヘ此亦偏ナル流義ナリニ今ニ一見識ヲ立テ按
 腹鍼治ヲ兼テ大劑ノ附子ヲ遣フ也是和漢トモニ據ナキ流義
 ナルベシ尤本草新編ニ陰熱陰寒陽熱陽寒ノ四ツヲ立テ附子

ヲ用ル四法ヲ立ツ是ハ滋補ヤ寒涼ノ劑中ニ附子ヲ監製シタ
 ルモノナリ勿論モチロシ醫書ナド講究セル人ニアラズ畢竟附子ノ性
 性ヲ又キ茯苓ヲ大ニ組シ小使シへ通ジサレ附子ノ障ラヌヤウ
 ニセシモノナリ熱症ニハ黃連ノ濃煎汁ニテ茯苓乾生薑ヲ浸
 シ用ルユヘニ火熱ノ証ニモ格別サハラヌ也ソレヨリ黃連ヲ
 直ニ加タキモノナレハ寒茶ハ加味セズ大抵唐ノ澤瀉ハ茶葉
 延胡索ソノ外四五味モ加味スル也凡茶品十二三味ハカリニ
 テ一切諸病ニ加味シテ療メ何病ニモ附子ハ離レズ是小松流
 トテ一見識タテシモ元來丹水翁ノ末流ナリ子夏ノ孫弟子ニ

莊子ノ出來シ如クアニリ温補ニ偏ナル弊ツイニ末流如斯ソ
 レハ文學ノ弊ヘ聖學ヲ害シ此ハ温補ノ弊ヘ火病ヲ害セリ
 〇後藤流ト云ヘルハ凡茶ニ寒熱温涼ト云コトナレソレクノ
 性ニヨリテ其効ヲ見ストイヘリ又茶ニ製法ナレ天地ノ物則
 ニ隨ヘレトテ何レノ茶ヲモ制セズ然レ凡此モ訣アルコト也
 制法ト云ハ土カラ掘出シテ唐和トモニ採茶師力水ニテ洗ヒ
 或晒シ乾カスル是製法ナリ其後京大坂ノ生茶舖ノ手ニ渡テ
 物ニヨリ亦制スル物アリソレヲ医者ノ手ニテイロクト制ス
 ルハアニリ制法ニ拘滞ト云モノナリサレ凡物ニヨリ水ニ浸

シ或洗ヒ或炙リ或炒ル等ノ制モアルナリ一向ニ医者ノ手ニ
 テ制ナレト云ベカラス又此流義ニ長病ニ服茶ナレトテ灸治
 湯治茶餌トクガラシ或蕃椒トクガラシヲ專ラ病ニヨツテ用ル也服茶モ此家四劑ト
 云ヲ立テ又ハ熊膽クマノシヲ多ク用ヒ諸病大抵四劑ニ加減指引メ用
 テ茶品ノ數モ餘計イラサル也然レ凡昔ヨリ和漢トモニ長病
 ニ服茶バカリニテ愈タルタメニ拳テ不可數トカク一流ヲ立
 ル者ハ其言弊アリテ後医ノ迷ヒニナル事多ク考ヘ察スベキ
 也此流義通例トハ格別ノ見識ニテスレチカヒタル事ユヘ
 他流ニテ治セ又病モ證ニヨツテ甚タ手際ナルコトアリ灸治

温泉茶餌熊膽ニテ効ヲ見ス丁後藤氏ヨリ始レリ此流義海内
 ニ弘ミリ諸國トモニ多シ彼家ノ黒丸子都鄙トモニ諸人ノ賞
 翫スルハ是後藤氏ノ功ナリ然レバ此流義モ亦偏ニシテ病ニ
 因テ的^{テキ}不^フ的^{テキ}アリ京師ニテハ偏ナリニ此流義ノ手合^{アヒ}ニアフ病
 フ擬^{アヒ}ユヘ^{カク}効^{カク}驗^{ケン}モ多ケレバ田舎ニテハ此流バカリニテハ中々
 療治ハナラヌ也其病ニ相應シソウナ証ニ此流義ヲモ施スベ
 シ病ニ因^{ヨク}テ灸治カ湯治カ茶餌テナケレバ不治病モアルモノ
 ナリ今京都古方家ノ療治ノ餘波モ此流ノ儒^{ジュ}医^イ一本ノ道ニシ
 語^コ孟^{モウ}子^シ據^コト^コ素^ソ靈^{レイ}ヲ捨^ステヨト云ヨリ古方ヲノミ專ラ用ニテ

熊膽吉野人參ヲツカイ 寔ニヤウニナリシモ元來ハ後藤氏ノ
 流義ヨリ幾^キヲ含^{カン}メリ

按^アルニ熊膽ノ効驗海内に弘^{ヒロ}まり一^ハは此流義ノ卓^{タク}見^{ケン}ニシテ
 吉野人參を韓人參の場へ用るは大害あり吉野參韓參花實
 莖葉同トといへども其味苦^{ニガ}ほく其効大^{オホ}小^{チホ}異^イなり同物な
 りといへども土地乃産^シに依^ヨテ唐^{カラ}より渡^{ワタ}る所の諸^{モロ}參^シ味^ミの差^サひ
 ある事と以てあると^ト吉野參ハ少^{オホ}く補^ホ益^{イキ}の品^シの^ノ一^{ヒト}人
 脾胃^{ロシ}虚^{キョ}弱^{ジャク}の者ハ嘔^ウ瀉^{セツ}を發^{ツク}と予^ヨ度^{タク}々^ク見^{ケン}聞^{ブン}し^ルり必^{カナラ}用^{ヨウ}べ^クし
 是其味甚^{タガ}苦^クこと以^ヨかり但^タし胸^{ムネ}膈^{カク}と開^{ヒラ}き心^{シン}下^カの痞^ヒと治^{ツク}る

かり諸くの補劑中に用ゝるに益かりて損あり尤右方
 家へ補ふこと不取ゆへよきものありて通例の時医の中
 にも動心益氣湯大補湯など直根を入るべしとせ
 吉野参を用て嘔瀉の多し是吉野参の害かり夏とあり
 哀哉吉野ハ竹節又ハ薩摩参信州より出る品直根の葉は
 まどきと同物なり近世の廣東参ハ日本數人参の類にして
 其効速かりすとも補劑中小入して害とならん然も
 猝病又ハ大補を乞ふ病ハ其効は然も補のめり証を用て
 忽障のめりハ補の功もよく有と知へし

○近來京師ニテ古方家仲景流ト云モノハ丹水翁ト背腹ニテ
 傷寒金匱ノ方中ニテ專ラ寒涼攻撃ノ劑ヲ用ルナリ或張子
 ガ儒門事親ニヨツテ汗吐下ノ三法ヲ主意トシテ甘遂芫花等
 ノ丸散ヲ投ス是仲景ノ十賈湯ヨリ變シ來ル峻烈ノ劑ヲ以テ
 伏飲ノ内痛ニタハ留飲經絡ニ結メイロク六ヶ數症ニ常抵ノ
 藥ヲ彼是用ルトイヘ厄効ナシ此時ニ右ノ峻ナル丸散ニテ立
 所ニ留飲ヲ下シ久シキ病モ早速ニ平愈スル者アリ是近來古
 方家ノツカヒ覺ナリ又風葉ニハ桂枝湯葛根湯柴胡湯ヲ用ヒ
 熱氣ニハ大劑ノ石膏ヲ投ジ或三黃瀉心湯ニテ瀉下スル療治

專ラナリ或近頃吐法モ用ルトイヘ凡是ハ偶ノ事ナリ原北國
 邊ヨリ傳來ナリ然レ凡其病可吐時節ニアラザレバ忽チ大害
 アリ是仲景流トイヘ凡寒菜瀉菜ノ三ヲ主トス又素人ヨリモ
 寒菜瀉菜ノ的中レソフナル病ヲ擬ユヘ自ラ寒菜瀉菜ノ三ヲ
 ツカヒ覺タリ勿論虚弱ナル病人ノ補菜相應スベキ者ニハ補
 菜ソカヒ和ラカナル流義ノ医者ヲ頼テ古方家ニハ見セス然
 レ凡病ニヨリ先ヅ瀉シテ後ニ補フ證アリソコラニテハ中々
 素人ノ了簡及又所ユヘ悠々ト和カキ菜ヲ用テ居ル中ニ段々
 指重リ其時一六ノ合点ニテ右ノ古方家ヲ頼ムトイヘ凡古方

家ハシニヒニカ、リ往々仕手見ソクノマウニナルハ是素人
 ガ古方家ヲ一向ニ恐レ又ハ彼是平生心易キ出入醫師鍼灸等
 ノ訣モカキ相談ニヨリテ療治最中ノ場ヲスカシ前廣ニ古方
 家ヲ頼メバ治ヘキ病モ遂ニ届ヌコト及リ此處能々考ベキコ
 トナリ尤古ノ妙手ハ古方ト云名分ハナケレ凡瀉スベキ病ハ
 丈夫ニ瀉シ補フベキ病ハ油斷ナク補テ虚實凡ニ能治ス是医
 術ノ哲匠ナリ然レ凡療治ニハ自分クノ得方ノ手辟ツキタカ
 ルモノナリ田舎ニテハ補瀉温涼トモニ遺ハ子バチ子凡京
 都ニテハ手辟ヲ病家アラカク知タルコトナレバ大身ナル者

ノ病ニハ病家ヨリ医者ヲ擬ナリ嗟呼近來ノ古方家ハ仲景ノ
方中ニテ瀉藥ガチニ用ルモノニシテ丹水翁ノ末流アルヒハ
薛氏流ノ醫師ト治法背腹ニシテ諸流多クバ彼是兼テ補瀉
温涼ノ術俱ニ備レリ

○儲醫學ノ次第ハ是ニテ日本ノ医者多シトイハル醫學ト療
治ト別々ノモノニナリ諺ニモ學醫ノ業ハ斂テトイヘリ諺
トイヘル實ニサマウニ有之ナリ此ハ醫學ノ次第ヲ不知ノ誤
ナリ儒學ニ次第アルゴトク醫學モ次第アリ昔時吉田意庵法
印入唐シ彼地ニ留ルコト十一年明醫ニ學テ歸朝シテ醫學ノ

次第ヲ立ラレシハ先初學ノ入門ハ藥品ノ能毒ヲ學ハシ此ヲ
學ヘバ醫術ノ十ノ中ニテニヲ知ルナリ其次ニ某方ヲ學フヘ
シ此ヲ學ヘバ醫術ノ十ノ中ニテ五ヲ知ルナリソレフカニシ
テ病論ヲ學トキハ此ニテ十ノ中ニテ八ヲ知ルナリ其次ニ古
人ノ醫按ト脈ヲ學テ十分ノ功ヲ遂ルナリ此所謂下學シテ後
上達スルナリ此ヲ療治ニ施ストキハ先ヅ脈ヲトリ病ヲ知り
方ヲ處スル醫學ノ次第ト療治ノ次第トハ前後ノ意得アリ怪
哉本邦ノ醫學初ニ素靈難經格致渾河ヲ學ヒ後療治ノ藝古ヲス
ル是ヲ以テ醫學ト療術ト別トナレリ此次第ヲ知ラス初學ヨ

リ素靈ノ聖言要語理屈推ノ用捨モ辨ヘズ了簡ナシニ安リニ
学シテ療治勸カサレバ遂ニ素靈ハ偽書ナリトス一向ニ取ラ
サルヤウニ近來ナリシモ医学ノ次第ナキユヘナリ天下ノ藝
術三ナ下学シテ後ニ上達スルナリ医術ハカリ外ナランヤ此
意庵法印ノ次第ニヨリテ医術ヲ学バ、學術人々ノタケノ、ニ
兼備シテ補泻温凉ノ偏見ノ弊ナラシテ生民ノ幸ナラシ乎

平安

盛塘識

醫療手引草題言

醫療手引草上編乾

三河 藤謙齋烏巢先生著

平安男

玄順懿之 校補

越前門人

尾崎正龍 校正

傷寒 附 感冒

傷寒

ノ一病

究メテ

大切ノ

モノナリ

傷寒ノ

外一切ノ

病ヲ

雜病

トイヒ

傷家ヲ

能意得ル

時ハソレ

カラ推テ

雜病ノ

療治モナル

病カラ

推テ

傷寒ノ

療治ハ

ナラザル

モノナリ

然レ

傷寒ノ

時

病

ノ

療治

モナル

雜

病

ノ

ト云ハ

未熟ノ

内ハナリ

カタキ

モノナリ

然レ

傷寒ノ

時

病

ノ

療治

モナル

雜

病

ノ

療治

會日

セ子ハ

感冒ノ

療治モ

ナラヌ

モナリ

奈何

トナレ

ハ感冒

ハ傷寒

ノ

療治

モナル

雜

病

ノ

桂枝湯

程 三二

芍 二

生 二

大 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

麻 二

耳 二

桂 二

ノ輕キ六テニテ同シモノナリソレユハ先傷寒ノ大要ヲ擧ルナリ夫
傷寒ニ六經ノ表裏ト云フアリ先差口ノウワカハヲ太陽ノ經ト
云ナリ太陽經ノ證ハ脈ガ浮テ頭痛惡寒發熱項強身疼腰痛
ノウチテ風ニ中レバ脈浮緩テ汗出ル是ヲ太陽中風ト云桂枝湯主之
寒ニ傷レバ脈浮緊テ汗不出是ヲ太陽ノ傷寒ト云麻黃湯主之其次
ヲ陽明經ト云此證ハ惡寒ハ無テ發熱バカリ寒ケアレ凡經ノコトニ
テ汗出目痛鼻乾不眠脈浮數コレヲ陽明ノ表證ト云桂枝加葛根
湯主之コレハ裏證ト云コトアリ表證ノ療治ヲ仕損ジ邪氣カ
裏ハ入テ陽明胃ノ府ノ實邪トナルカウナルト寒ケナレニ表一偏

ニテ其熱ガ蒸々ト氣味ワルノ内カタ外へ煩燥スルヤウニナ
リ手足カラジミクト子バキ汗カ出ル脈ガ洪大テ數ナリ嗑乾
キムレマウニ湯水ヲ好ム甚シケレバ手足ヲ抛テ狂乱レ一身
黃ニナルコトモアル大便止ス小便黃ナリ此證ニハ承氣湯ノ
中見合用ベシ其次ハ少陽經ノ證トテ表ト裏トノ間テ半表半
裏ト云熱ノ指引アリコレヲ寒熱往來ト云瘧ノマウニ寒ケガ
來リ熱ケガ來リスルナリ瘧ハ大ヤウ時刻キウマリ一日一夜
ニ一度ブ、來ル此證ハ二度モ三度モ指引アリ前ノ陽明經ノ
裏證ニ潮熱トテ日ニ一度ツ、時ヲキハメテ熱ノサスコトア

小柴胡湯
柴胡 三
黃芩 三
人參 三
甘草 三
芍藥 三
半夏 三
大棗 三
枳實 三

リ是トモ違テ紛レハ止又脈カ強數テ口苦ク耳ノ聾ルコトモ
アル胸ノウチ脇腹カ痞テ嘔ラナス或胸中ワクク熱シ或嗑乾
キ或咳シ頭痛ハ何レモアリ太陽經ノ頭痛ハカシラノ真中テ
スル陽明經ノ頭痛ハ額ノ内眉毛ノ間テスル少陽經ノ頭痛ハ
耳ノ上ノ鬢ノ内ニテスル舌ニモ薄ク胎ガカ、ルモナリ此
證ハ小柴胡湯主之ソノ次ヲ太陰經ト云是カ三陰經ノ初リナ
リ陽明カラ次第ニ裏ヘ落テ太陰經ヘ入ルト腹滿口乾口ノ中
カ乾ク故ニ唾ヲ吞込テ噎ニテ至ラサルナリ大便自利シ手足
アタ、カナリ桂枝加芍藥湯主之若シ噎ツヨク渴キ腹モツヨ

真武湯
芍藥 三
生薑 三
茯苓 三
白朮 三
附子 一
承氣湯
大承氣湯
芒硝 二
枳實 二
厚朴 二
甘草 二
四逆湯
乾薑 二
附子 一

ク脹リ腹イタミ大便秘結脈沉實ニシテカラアラハ桂枝加大黃
湯主之ソノ次ヲ少陰經ノ證ト云嗑乾キ口乾キ手足ヒ一草臥
唯寢ルコトノミヲ喜ミ大便自利シ脈沉細ニシテカナシ四逆
湯アルヒハ真武湯附子理中湯ノ類主之若シ又此證ニテ甚々
乾キ舌モユガレ大便モ秘結シ臍ノ下ハリ硬ク痛ミ脈沉實ニ
シテカラアラハ承氣湯主之ソノ次ハ厥陰經ノ證ト云涎沫ヲ吐
キ陰囊縮リ手足ヒ一煩悶スル脈ヲ推シ無力嗑乾クトイヘ凡
内ヘ飲コトハナラズ是虚寒ナリ四逆湯主之若シ嗑甚々乾キ
舌ユガレ大便不通コレニハ大承氣湯主之是ニテニテ傷寒ノ

二編

六經表裏ヲラニシスムナリ是ヲ冬ノ内ヲ正傷寒ト云冬ノ内
ト指カ九月霜降ノ節ヨリ二月春分ノ前ニテヲ云歳ノ寒暖ノ
遲速モアレバ綿入ニツ着ル間ノ内ト意得ベシ精シキコトハ
傷寒論ニアリ志アラバ熟覽スベシ
○儲アノ方ノ医書ニモアル通り北方ノ寒國ニハ正傷寒多ク
アレバ南方ノ暖國ニハ少キモノナリ京都ナドニモ根カラナ
キニテモナケレバ先ハ少キコトナリ唯感冒トテ世俗ノ云風
引タルト云コトノミナリ感冒ハ傷寒ト同シモノニテ輕キ分
ノ違ナリ然ルニ傷寒ハ冬ノ内ハカリアルモノナリ感冒ハ四

季トモニアルナリ此感冒ノ某ハ冬ノ内ハ桂枝湯ヲ用ベシ或ハ
丹水翁自製ニ和解湯トテ桂枝湯ニ加味ノ方アリ今此某海
ニ弘ニルナリ本方ノ桂枝湯ハ傷寒論ノ分量ニスレハ甘草余
計入ル日本ノ人ハ甘キ味ヲ好ミズソレデ一切ノ某方ニ甘草
ヲ少シ入ル、モ腹中ニアワザルカラナリ桂枝湯ハ殊外甘キ
藥ニテ胸ニ泥ムコトアリ儲又上戸ノフダン腹ニ酒ノ絶ヘサ
ルヤウナル人ニハアシ、此三ツノ障リアツテ桂枝湯用ヒニ
クキホトニ大抵不換金正氣散ガヨシ此三ツノ障リナキ巨ノ
ニハ桂枝湯ヲ用レバ元來補某ナルホドニ病サル前ヨリ元氣

二編 十九

不換金

原朴

凍及

霍香

羊日

蒼不

斗料

沃

蒼石木

乾善

斗

防風

乾鳥

芍

中

本草綱目卷之...

乾

ガ健ニナルモノナリサレモ今ノ障リアレバ大カタ不換金ガ
 ヨシ儲不換金ノ外ニ能キ葉ガアリ證治準繩ノ傷寒門ノ末
 神效沃雪湯ト云藥ヲ用ベシ桂枝湯ハ冬ノ内ノ感冒ニハ用シ
 氏春夏ハ功者デナケレバ用ヒガタキコトアリ不換金沃雪
 湯ハ四季ニ用テヨシ此ニ方ニテ風引タル葉ハ大カタニ均
 分アクモノナリ不換金デ發表ノカヒナシト思ハ紫蘇葛根
 ヲ加テヨシ或桔梗茯苓紫蘇ヲ加テ九味正氣散ト本邦老医ノ
 傳ニ名ク此九味正氣散ニ葛根ヲ加テモヨシ此ハ和蒼木ヲ用テ
 ハ解散女子ノ療治ト云ハ是ナリ本方ノ不換金ハ唐蒼木唐厚

朴青葉藿香ヲ用ルナリ和蒼木埋藿香ノ不換金ハ世上通用ナ
 リ然レモ發表ノカ劣レリ婦人小兒ナドニハ世上通用ノ方ヲ
 用ベシ○按ニ丹水翁ノ和解湯モ近來諸處ヨリ出テ本方ノ調
 合希ナリ埋藿香厚朴紫蘇陳皮ノ類アツテ桂枝ハ鹿藿ヲ用レ
 バ酒客嘔逆アルヒハ火ノ多キ證ニモアメリ障リモ三ヘズ本
 方ノ和解湯ハモト桂枝湯ト同レ意氣カタノ方ナレバ其ノ簡
 アルベキコトナリ○儲右ノ不換金沃雪湯ノ類ハ冬月ハカリ
 ニカキラス四季トモニ用ルト云ヘモ先輕キアシラヒナリ
 ○感冒發熱頭痛ヲ目當トシテ世ノ所謂風邪ト云ニ葛蘇散カ

感冒正面ノ劑ナリ尤春月多用ルノ劑ナリ内ニ柴胡川芎アレ
 バナリ加減ハ方後ニ精シク拵タリ能用ヒ覺ルト大方風邪寒
 邪凡ニ輕證ハ此方ニテ事スムナリ皆此場ヲ近來古方家ニテ
 ハ傷寒論ノ葛根湯ヲ四季凡ニ專用ルナリ此方桂枝湯ニ葛根
 ヲ大ニ組テ麻黃トニ味ノ加味ナリ夏月又ハ汗アル證ニハ麻
 黃ハ去コトモアリ即桂枝加葛根湯ナリ桂枝湯ヨリハ葛根ノ
 苦ミアリテ酒客嘔逆痞食ヲ兼ルモノニモ用ヨシソレユヘ近來
 ハアテリ桂枝湯ノ沙汰ハ無テ風寒トモニスベテ表証ニ用ル
 ナリ頭痛惡寒發熱脈浮盛ニ頸スレ拘急スルニ用テ即効アリ

トカク桂枝湯正面ノ證ハカリモナレ陽明ヲ兼ルモノ多シ又
 桂枝ハ緩シ麻黃ハ急ナリ葛根芍薬アルユヘニ桂麻ノ功ヤハ
 ラカナリ古方家ニ云ハ世間ニ此時參蘇飲正氣散類ヲ用テ
 汗出ルトイヘ凡熱カヘツテ解ス後ムツカレクナルト云ヘル
 ナリ是丹水翁ノ風邪咳嗽ニ參蘇飲ヲ久レク用レバ勞咳ニナ
 ル戒アリ小青龍湯アルヒハ和解湯ニ麻黃杏仁ヲ加味スル意
 ト同シ又或傳ニ桂枝麻黃杏仁湯ニ葛根湯ト小柴胡湯ト三方合
 シテ三合湯ト名ケテ無汗ニハ麻黃三合湯ヲ用ヒ有汗ニハ桂
 枝三合湯ヲ用ヒ太陽陽明少陽ノ薬ヲ三方合シテ或古胎有瀉

毛ノニハ加石膏知母去桂麻一切感冒時疫ニ專用ルノ傳アリ
 是埒明ナル仕方トイヘ凡三經凡ニヤラズノガサズノ合方ナ
 リ大ヒニ仲景ノ真ヲ乱ルト叱レ凡是柴胡桂枝湯ニ葛根杏仁
 ノ類ヲ加ルモノニシテ杏仁ハ咳ナキニハ去ルコトモアリテ即
 今古方家流行茶ノ柴桂湯ナリ傷寒論中桂枝湯柴胡湯ノ用法
 多ケレバ即効アルモ理リナリ是モ近來古方家ノ餘波ヨリ出
 タルモノナリ古方ノ柴桂湯ハ調和ノ劑ニシテ感冒時氣ノ後
 餘熱アリ或身タルク少シ頭痛又惡寒ナドアルニ用ルナリ少
 シ小便濁リ口中粘リナドスルヲ目當トスベシ又婦人諸病ニ

用テヨシ此方瘀血ヲメグラス意アリ婦人腰痛ニハ加石膏用
 ル尤ヨシ或トコニテモ痛コトニ用テ効アリ大抵外感發熱頭
 痛發熱強ク少シニテモ身タルキ氣味アルニ先此方ヲ用テ發散
 スルナリ是前醫發散ノ時ニ麻黃桂枝ヲ用テ汗ヲ發セズシテ
 後發熱強ク少シ耳遠クナリテ少シ頭痛ノ氣味アル時先此方ヲ
 用ベシイヨク熱強ク盛渴キナドスルモノハ小柴胡湯ダテノ
 茶ニスルナリ此時ニ世醫柴桂湯ヲ用ヒズシテ熱ノ強キヲ見
 テ始發散ノ手後ヲ知ラス解熱ニカハルユヘ病人イナダニナ
 リテ熱サメズ疲ルハナリ能々考ベシ或發表ノ劑ヲ用テ後小

便少シ濁リ未夕外證去スシテ熱アルモノニ用ルナリ柴胡湯
 和解ノ柴桂枝湯采衛ヲ和スル此ニツク合シタル意ニテ用ヘ
 シ故ニ氣血ヲメグテシ和スル良劑ナリ又婦人ノ病ハ多クハ
 氣滯ニ瘀血ヲ兼ルモノナリ肩背痛ニ腰痛ニ或足痛ニ或腹左
 ノ方ニ動悸アリ或積聚アルノ證スベテ柴桂湯ヲ用ベシ或瘀
 血ヲ下ス丸茶ヲ兼用ルコトモアリ乾漆カシニツ大黃カクシツニ味丸トシ見合
 テ用ベシ此柴桂湯ハ何病ニモ意ヲ以テ用カタ多ク産後ノ血
 ブルヒナドニ龍王湯フリカ擺茶ノ類ニテ効ナキニ此方即効アリ尤
 瘀血オクツヨキニハ大黃ヲ加ルナリ古方家專用ノ劑ナリ

婦人
 痛多
 瘀血
 氣滯
 肩背
 痛
 或足
 痛
 或腹
 左
 動悸
 積聚
 下
 丸
 茶
 兼
 用
 乾
 漆
 大
 黃
 味
 丸
 見
 合
 柴
 桂
 湯
 龍
 王
 湯
 擺
 茶
 龍
 王
 湯
 擺
 茶
 龍
 王
 湯
 擺
 茶

○儲世上オシナメテ用ル敗毒散參蘇飲藿香正氣散十神湯コ
 レ皆昔ヨリ用ヒ來ル感冒ノ茶ナリ然レ是ニハ各自當カヌ
 ツテ用ルナリ此目的ヲ知ル少シ輕キ感冒ハ先ハ不換金ニ加
 減シテ大方埒明モノナリ未熟ノ輩安リニ向上ナル茶方ヲ用
 ベカラズ雞ニカ割カニ牛ウシノ刀カタヲ用ルノ弊アリ今世ニハ素人ニテ
 モ唯シサヘラシキ茶銘ヲ好シ益氣湯トイヘバ古メカレク建
 中湯ガヨシト思ヒ六君子トイヘバアリフレタル方ノヤウニ
 外臺ゲ茯苓飲ガヨシト思ヒ理中湯ハリチギ夫リ四逆湯シ眞武
 湯ガヨシニ陳湯ニテヌムコトモ小半夏夏加茯苓湯トト云ヤ

疾
 心
 疾
 心
 疾
 心

ウナル方銘ヲ嬉シガルモ是古方流行スルニツイテ人ツバヘ
 ト云モノナリ又新醫師ノ方意モ得ト不知カ古方家モ学ハス
 傷寒金匱寒涼攻撃ノ劑ハ手ニイラス恐ロシカリ古方中ノ
 平和ナル方バカリヲ用テ動スレバ桂苓木甘湯或半夏湯心湯
 或金匱麥門冬湯或桂枝湯龍骨牡蛎湯ナド用レハ素人ハ某銘ノ珍
 ラシキニ功者ナヤウニ思ヒツキ療治モ物ズキノ器ノヤウニ思
 フコト近來何事モ上スベリニレテ實ハ吟味ハオシト見ヘタ
 リソレヲ如何ト云ニ近來感冒ノモツレ或時行人瘦ヲオシナ
 メ瘦證ト唱ルコトオシト不吟味ナルベシ瘦テニ瘦ニテスム

コトヲ證ノ字ヲツクルコトオカシ是人ノ氣ノツカサル處ナ
 リ假令傷寒證感冒證痢證虐證傷食證積聚證疝氣證トイハン
 ヤ瘦バカリニ證ノ字ヲツケルコトモ不審ナリ又癩證トオ
 ンナメ唱ルコトモ不審ナリ癩ハ俗ニ云クツチテンカンヤ三
 ナリ癩ハシヅカナル氣チガヒ狂ハヤカマシキ氣チガヒナリ
 癩癩狂ノ三ツハ紛レル病ニテ諸方書ニ三門合シテアル書モ
 アリ三門各門ニアル書モアリ然ルニ今世狂モ癩モ癩モオシ
 ナメ癩證ト云ハ狂モ癩癩ヤ三モ人々忌テ唱アレケレバ三
 ツ氏ニ癩證ト云テマキラカスハ尤ナレモ医ニヨリ何デモカ

テモ癩證ト覺テイルモアルカナリ又久病疲勞ノ後虚狂ヲ
 發シ口無倫ノ言ヲ出シ或高遠ヲ臨ンテ自辨智ナリトシ自高
 賢ナリトシ或婦人瘀血ニヨツテ狂トナルモノアリ是等ヲ方
 書ニ失心風氏イヘリ治方ハ朱砂安神丸或歸脾湯加減逍遙散
 或清心抑膽湯黃連解毒湯防風通聖散ナド種々ノ治方アリ何
 レモ癩證ト唱ヘンマ近世不取ナコロノ難經ニ重陰者癩重陽
 者狂トシツカナル狂トヤカニシキ狂トヲ陰陽ニテ説ク素問
 ニモ狂ヲ陽明ノ證トイヘリ是重陽ナリ今時疫麻疹ナドノ大
 熱ノ證發狂ノモノニ三黃瀉心湯或直根ノ熊參湯ニテ古方家

ニ即効ヲ取ルコト多シ或狂ニ金匱麥門冬湯ニ石膏ヲ五七錢
 モ加ヘ瀧ナドニウタセ効ヲ取ル是重陽ノ狂ニアラズレテ何
 ズヤ然レ氏近世オシナメテ癩證ト稱スルナリ又心氣鬱結ノ
 狂ニ歸脾湯ヲ父服ノ全快スルモノアリ是虚狂ニシテ苦寒ノ
 茶ニテハ却テ劇シクナリ遂ニ死ニ至ルモノアリ是等モ癩證
 ト云ベキヤ此傷寒門ニハ関ラヌコトナレ氏當世ノ意得ニナ
 ルコトユヘ序テニ記スモノナリ此癩ニ證ノ字ヲツケルモ剩
 語ナリ

癩證ニツキテハ
 紫蘇湯
 紫蘇湯
 紫蘇湯

○不換金正氣散 此方ハ四季感冒ヲ治ス感冒ト云ハ傷寒ノ

太陽經ヤ陽明經ノ表證ノ輕キモノニテ先ハ頭痛發熱惡寒身
 痛咳嗽ナドスル此ニ寒疫ト云コトアリ寒疫ハヤハリ感冒ト
 同シコトナリ然ルニ名ノ違タルハ假令感冒ハ薄着ヲ仕タリ
 夜冷ルト云マウナルコトニテ病ヲ云ナリ寒疫ハ冬ニテ別
 シテ寒氣甚シクオシナメ風ヲヒク春ハ餘寒夏モ給ラキルヤ
 ウナコトアリ秋ハ俄ニ寒シナルソレニ中ラレテ一統ニハマ
 リ咳氣ヲスル皆病ヤウモ療治モ感冒ト同シコトナリ不換金
 ハ温中ノ劑ナリ兼テ濕ヲ除フ中サへ温レバ外邪ハ自然ト散
 ズルフレラ近年此藥ヲ素人ニテ能ツカヒ覺シナリ感冒八十

人ニ六七人ニテ此藥ニテ治ルモノナリ證ニヨリテ少シツ、
 ノ加減アリ此方ハ指當リ加減ニテ大抵ノコトハ半井流ナド
 ニテ用ルニヨリ此方ノ加減バカリ荒増記スナリ是ニ拳タル
 加減ニ限リタルコトニテナシ。頭痛加川芎白芷トアレ元
 來風ヲ引タルウヘノ頭痛ナレバ風サへ發散スレハ頭痛ハ自
 然ト愈ルホドニ加減ニ及ヌナリサレト外ノ所ハ透ト快クテ
 頭痛バカリハ止ヌト云モノアラバー二三貼モ加味シテヨシ
 〇寒ニ感シ腹痛スル者ニハ加乾姜肉桂。潮熱ニハ加柴胡黃
 芩潮熱ハ陽明裏實ノ目當ナレバ大承氣湯ノ證ナリ不換金ナ

平胃散
蒼朮不分
陳皮
原朴各
加耳
藿香
八干

ドニテ治ルコトデナレ然ルニ此ニカフ云々ハ時ドツテ熱カ
サレテ潮熱ニ似タルモノハイカフ輕キコトノ意得ベシ○此
方ハ平胃散ニ藿香半夏ヲ加ルモノニシテ中焦ヲ開シ濕邪ヲ
發ス故ニ食傷ニ用エ腹痛ニハ加木香縮砂又小兒ノ諸病ニ多
ク用テ効アリ小兒ハ不時ニ食スルモノユヘ何レノ病ニテモ
多ク中焦塞ルナリ故ニ小兒専門ニ此方ニ加神麩麥芽香附縮
砂四味ノ不換金ト名テ風邪ニ專ラ用ルナリ或腹痛ニハ加
砂仁枳實白豆蔻○胸腹脹滿ニハ加枳實砂仁莪朮○咳嗽ニハ
加桔梗杏仁五味子○喘急ニハ加麻黃蘇子桑白皮○兩足浮腫

平胃散
蒼朮
陳皮
原朴
加耳
藿香
八干

濕ニ因ルモノハ加木瓜大腹皮五加皮○小兒泄瀉瘡ニハ加味
シテ用エ風邪ニハ加羌活防風泄瀉ニハ加芍藥○大人小兒凡
ニ濕熱積滯ノ痢疾ニ加黃芩枳殼芍藥檳榔腹痛アラハ加木香
筴ルニ小兒痢疾ハ食ニ傷ラレ先泄瀉四五行ニレテ痢トナル
多ク發熱アリ最初ヨリ油斷ナク附子理中湯ノ類ヲ用テ温補
スヘシ此不換金ノ加味ナド用レバ慢驚ニ變ジ或嘔逆ナド出
テ絶食難治ニ至ルモノ余數人ヲ見タリ此不換金ノ小兒痢疾
ノ加味ニテ小兒幾人ニシラズ夭歿セリ小兒ノ痢ハ大人ト違
テ濕熱積滯ノ痢ハ少キモノニテ泄瀉シテ痢ニ變ズルナリ又

毒 霍 瀉 諸 病

去毒 加茯苓 平田日教

疝痢ト云モノアレ此ハ病ヤウモ湿熱積滯ノ痢トハ違アリ
 精シキコトハ痢疾門ニ詳ナリ。小兒ノ瘧ニ加柴胡黃芩草菓
 儲此方ニ去半夏厚朴加茯苓名五味藿香湯小兒ノ諸病ニ加
 味シテ用ル傳アリ大抵輕キ證ハ是ニテ消ナリ加減左ニ記ス
 ○傷食加宿砂神麩山查○手足冷加乾姜肉桂○不食加麥芽宿
 砂白豆蔻○感冒加紫蘇葛根○欬嗽加桔梗杏仁菜白○大便不
 通加大黃桃仁厚朴○小便不通加猪苓澤瀉○赤痢加芍藥阿膠
 芩連○白痢加乾姜肉桂○後重加木香換榔○腹痛甚加青皮莪
 朮換榔○泄瀉加厚朴芍藥肉豆蔻○急驚加柴胡牡丹大黃○慢

驚吐瀉加肉豆蔻黃耆天麻或加人參○夜啼加黃連麥門○自
 生至三歲驚風去藿香茯苓加黃連生甘草各大黃芩肉桂桔梗各
 水煎或為擺藥○去藿香陳皮加桔梗天花粉細辛薄荷各大散
 感冒咳欬痰涎鼻塞發熱ノ兒ニヨロシ尤何レ片ニ和白木ヲ用
 ベレ○小兒疝ハ大抵乳バナレニテ俄ニ食シ或餅菓子ノ類ノ
 甘味ヲ喰フヨリ發ルナリ其證面黃肌瘦肚大ニシテ青筋アリ
 頭大項細シ其外オリニ熱アリ氣ムツカシク大便調ラズ小便
 濁リ眼中白翳睛ヲ遮キリ種々ノ證多シ去藿香陳皮加猪苓沢
 瀉莪朮黃栢炒天花粉山柎青皮山檀使君子芍藥各大黃連換榔各小

右十五味水煎或擺葉トシテ用ベシ一貼五七分ニ調合スベシ
 若シ思ノ元氣虛弱ナル者ハ參苓白朮散ヲ兼用ベシ又保童圓
 ガ、リノ丸葉肥兒丸消疳丸ノ類兼用ル事モアルベシ○癰疾
 胎毒ヨリ發モノ去藿香陳皮甘草加莪朮枳實使君子射金紅花
 擺葉トシ用ベシ五疳虫積ニモオシナク用テヨシ胎毒ハ出生
 ノ時母ノ穢物ヲ食フニヨツテ其物多クハ左脇ニ畜積シ時ニ
 ヨツテ發スルモノナリ是ニハ山蜜紅花鬱金ノ三味細刻擺シ
 用テヨシ若シ靛ツヨク面手足赤キモノハ右ノ三味ニ加
 大黃醋ニテ拌セ一貼五七分見合ニ用ルナリ大便下リテヨシ

○又食滯乳滯ハ多ク右ノ脇ニアリ又痰積ノ者ハ中脘上脘ノ
 間ニ痞ルモノナリ治方ハ乳食ノ滯ハ不換金ニ加香砂枳朮木
 香痰積ニハ香砂二陳湯ヲ見合用テヨシ○儲此五味藿香湯
 ニ加減指引シテ慢驚ニハ補葉ヲ用ヒ急驚ニハ汗下ヲ用レバ
 大抵小兒ノ治法ハ消ナリ然レモ虛實見訣ガタシ眼冲ト腹ト
 ニテ察ベシ腹ノ強弱ト薛氏ノ所謂眼テ晴ヲ見ス者ハ虛ナリ
 眠テ晴ヲ不見者ハ實ナリ其外眼ノ見張ノ強弱ニ意ヲツクベ
 シ精シキ事ハ專門ノ人ニ問ベシ○儲先年京都去ル財主ノ子
 感冒ヲ病三初發ノ療治ヲ仕損ジ邪熱裏ヘオチ以ノ外ニ弱リ

タルヲ其上へ補葉ヲモリカケ手足モ冷へ次第ニ弱ルホドニ
 其節京都ニ鳴ル飯田氏其外多ク聚リ虚寒ノ證ナリトテ參附
 ノ大劑ニナル次第ニ弱リ正氣モナクナリ脈モアルカナキカ
 ニアリ寂早助カラヌホドニ獨參ニテモ手前ニテモレトテ医
 者ノ分殘ラズ引タリ捨テモオカレズ原雲菴ニ見セタリ不換
 金ニ加大黄二三貼ニテメキくと快氣サセタリ是ハ眞熱假寒
 ノ證トテ眞ハ熱テ假ノ寒ト云コトナリ又眞寒假熱ト云コト
 アリ是ハ眞ハ寒テ假ノ熱ト云コトナリ傷寒ニ多キコトナリ
 雜病ニモ是ヲ知ラ子バ療治ハナラス是ヲ知ラ子バ人殺ラス

ルト云モノナリ此證ニハキハメテ手足モ冷自利ノアルコト
 古人クレぐ其コトヲ論シタレ凡其節ノ医者ガソコヘ氣ガツ
 カスレテ無調法ヲシタリトカク下スコトハ腹ヲ見ルベシ腹
 脹ストイヘ凡底堅キモノナリ臍下ヲ按レテ物アリコレヲ撫
 レバ肌膚カワクヲ目當トスベシ腹滿大便不通ハ見分ヤスシ
 泄瀉自利ノアルニ下劑ヲ用ルハ腹診第一ナリイカホト瀉ガ
 アソテモ臍下ニコダワルモノアリテ手ニテオヌニ底ニ堅キ
 モノアルハ下スベシ又少シニテモ表證アレバ下サレズ又大
 便秘シ謔語スル凡腹ヤワラカニテドコニモ堅マリナク脹ル

コトナキモノハ妄リニ下スベカラズ若シ大便日久シク不通
 モノハ蜜導ノ方ヲ用テ通シサスルナリ儲是ニハ大承氣湯ヲ
 モルハツヲ此不換金ニ大黃ヲ加タルハイナコトノヤウナレ
 此半井流ニテハ專ラ衆方規矩テ療治ヲスルユヘナリ原雲庵
 ハ半井流ナリ然ルニ今世ニハ中々カヤウノ証ニウカトト參
 附湯ヲ用ルコトハナシ病重ラヌウチニ大小承氣或大柴胡ナ
 ドヲ用テカヤウナ誤治ハ今ノ京都ニテハ希ナリ唯補菜ノ場
 へ妄リニ執ヲ解シ又ハ誤下スルコトハ多シ補菜ノ取カヘシ
 ノナルト云ハ此財主ノ病人ナリ近來古方ノ行ハル、奇特ニ

テ實熱ニ温補ヲ用テ誤ルコトハ希ナリ餘國ナトニテハ今世
 ニテモカヤウノ療治違ヒモアルベシ豫メ意得ベシ
 ○藿香正氣散ハ此方モ温中ノ劑ナリ不換金ニ比レバ温中
 ノカタハ不換金ヨリ少シヌルシ發表ノカタハ少シツヨシサ
 レ此發散ヲ強クセント欲セバ不換金ニ紫蘇葛根ヲ加ヘタル
 ガヨシ然レバ此方ノ目當ハ食滯ト外邪ト内外兼タル證ニ用
 ルカ此方ノ目當ナリ又霍乱吐瀉或中惡トテ墓原ナドヲ步行
 シ不正ノ氣ニ中ラレ絶ヘシ手足ナド冷ルニ少シ蘇合香圓ヲ
 用ヒテアトニ此方ヲ用ユ又海山ノ不正ノ氣ニ中ラレタルニ

ヨレソレユヘ正氣ト云不換金ハ他所ヘユキテ水ニアテラレ
 ルヲ水土ニ伏セズト云是ニ專ラ用ルナリ旅中ニ用ル某ト意
 得ベシサテ此方ノ大腹皮ヲ去リ腹皮湯ト云半并流ニテスル事
 ナリラウ勞證ヤイ口ノクノ夏ニ用ルコトナリ然レ正氣ノ用カ夕
 ハシヨク食前ノ感冒ノ劑ニテ夏月子寢冷風ト云ニ尤ヨシ發表ノ中ニ
 脾胃ヲスカス茶ユヘニ傷寒時疫ナド、云ヤウナ六經ノ證ア
 ルモノニ用レバ大キニ誤ル脾胃ヲスカシ邪ヲ引ハル傷寒時
 疫ニエキ葛藜散ノ類ハ用テ害ナシ古方ニハ此藿香正氣散ノ場ヲ
 金匱キキ厚朴七物湯ヲ用ユ邪氣アリテ腹脹或食傷ナドニ用ルナ

リ腹脹ヲ目當トス其方小承氣湯ニ加桂枝甘草大棗生姜或痢
 疾ナドニ古方家專ラ用ルト云ヘ凡未熟ノ輩ハ安リニ用ベカ
 ラズノ疎滌過テ害アルコト多シ其上此方金匱ニ痢疾ヲ治スル
 ト云コトナシ仲景ノ下利ト云ハ後世ノ痢疾トハ違フト見ユ
 ル日本ニ多キ病ニテ古來ヨリ痢ノ療治ハ日本ノ方ガ能手練
 シタリト見ヘタリレツ濕熱積滯ノ痢多シ此厚朴七物湯ニテ効ナ
 キニク苓連芍藥湯ニテ儘効アリ精シキ夏ハ痢疾門ニ詳ナリ
 ○敗毒散 此茶感冒輕キ時疫ノ初發又温疫トテ春ノウテ温
 暖ノ氣ニ中ラレテ衆人オシナメテ病ニ用ルナリ春ニ限ラズ

流行風ニ一般ニ同ジヤウニ病ニ用ユサレモハヤリ風ニ正氣
 散ノ證モ十神湯參蘓飲ノ證モアリ此方ノ目當ハ何ニモセヨ
 口鼻ノ息熱スルガ目的ナリ勿論脈ニテモ見ユレモ内熱ノア
 ルカナキカト云ヲタメスニ口鼻ノ息ニテタメスヨリ捷徑ナ
 ルハナシ是ハ敗毒散ノ證ニカギラス一切病ノ熱ノアルナキ
 ヲタメスニ臍ヨリ上ハ口鼻ノ息ニテタメスナリ臍ヨリ下ハ
 小便ノ色ノ清濁ニテタメスナリ是知ヤスキ夏ニテ百度ニテ
 モハツル、モノニテナシ至極端的ノ目當ナリ敗毒散ハ涼劑
 ニテ寒邪アルモノニハキハメテ難用茶ナリ兎角口鼻ノ氣熱

セザルモノニハ用ベカラズ又風引テ熱ツヨク目ニヒノアル
 モノアリ驚クベカラズ此茶ニ加天麻用ベシ

○參蘓飲 此茶世間テモルヲ見ニ風ヲ引キ咳ヲ兼ルニ用ユ
 然レモ咳ニモ肺寒ト肺熱トノ違アリ此方モ涼劑ノカタニテ
 肺熱ノ咳ニハヨシ肺寒ノ咳ニ用ルト反テアシ、世間ニテ咳
 ガ長引後ニハ勞咳ノヤウニナルモノ是參蘓飲ノモリソコナ
 ヒナリ肺寒ノ目當ハクサメヲシ清涕ヲ流シ脈ガ沉ナルガ目
 當ナリ元來此茶咳ニ目當ハナシタ、肌熱カ目當ナリ肌熱ト
 云ハドコモナフ皮膚ガホカクスル發熱ハハツクトスル蒸熱

ハムシくスルコノ熱ノイキカタヲ能意得ベシ

○香蕪散 此ハ快氣ノ薬トテ氣ヲメグラスル一偏ニテ氣

カメグレバ汗ガ出テ風モ發ヌルナリソレテ氣影ヲ兼タル感

冒ニ用ベシ氣ガメグラヌエへ必頭痛カスルモノナリソレテ

加川芎白止芎芷香蕪散ト名ツ氣影ヲ兼サル感冒ニハスキト

不効薬ナリキカ又逆ナシニ降氣ノ劑ニテ元氣ノタメニハ甚

害アル薬ナリ

○芎藭散 参蕪飲ハ肺熱ノ咳ヲ兼ル感冒ニ用ルナリ此薬

ハ咳ト頭痛ト兩方トモニ兼ルヲ目當ナリアフガチノ凉劑ニ

テモナシ四時感冒頭痛發熱通用正面ノ劑ナリ

○十神湯 此ハ芎芷香蕪散并麻葛根湯ト合方ニシテソレニ

麻黄ヲ加タル方ナレハ敗毒散ノ裏ニテ温劑ナリ敗毒散ト表

裏ノ薬ト意得ベシ偕今一ツノ意得ハ太陽經ト陽明經ト兩經

兼テ病ガ目當ナリサリナガラ氣實者ナラテハ用ヒ難キ薬

ナリ氣弱ノ人ニ用ベカラス偕今一ツノ目當ハ大抵感冒ノ熱ガ

朝サメトテ朝ハサマルモノナリソレニ朝サメモセサメソ

ウナル熱ガ三日モ四日モ引シロヒサメヌレハ痘疹カ麻疹

カ偕ハ風疹カ發斑カ何ゾ出物ガセントスル下地ナリ氣實ノ

者ニハ此茶ヲ用ベシサテ儲身ノ疼ト腰ノ痛トノニ色ガ強キ感冒
 ニハアルモノナリ痛ニハ敗毒散カ十神湯ノニ方主ツナサドルト云
 一凡敗毒散ハ腰ノ痛カタラ主ツカサトリ十神湯ハ身ノ痛カタラ主
 ドルサレ凡痛ハ目當ニハナラズ敗毒散ノ目當ハ口鼻ノ氣轂
 スルニ用ヒ十神湯ノ目當ハ口鼻ノ氣轂セズ陽明經ノ表證ヲ
 兼ルヲ目當トスベシ

○升麻葛根湯 此茶諸ノノ醫書ニ感冒門ニ載テアレ凡ア二
 リ感冒ニ効アル茶ニテナレ加減シテ發斑ナドニ用ル事アリ
 陽明經ノ表證ニ用ルトアレ凡是ヨリハ桂枝加葛根湯ガヨシ

此外升麻葛根湯加紫蘇小兒ノ感冒ニ用ルトカタノ如ク効ア
 ルナリ

○九味羌活湯 此ハ陶節庵ガ傷寒六書ニ麻黃湯桂枝湯ノ代
 リニ四時通用シテ傷寒感冒凡ニ用ルトアレ凡麻黃桂枝ノ代
 ニナル茶テナレ大抵ノ傷寒ニモ感冒ニモアメリ無テモスム
 茶ナリ春ノウチ温病ニ用ルコトアリソレハ温病ノ所ニテ記
 スベシサテ儲此茶風眼ノ輕キニ用テ効アリ暴カニ眼腫痛スルニ
 此茶ニテ毎々經驗セリ

○八解散 此方飲食勞倦ヲ目當トス畢竟少々食ノモタレモ

茶毒
 消一段
 入

人陳

手車

滿庭香

白木

生薑

多二

煎用

アリ或火シ外邪モアリテ草臥アル者ヲ治ス此方ズイブン輕
 キ感冒ニ去入參加桔梗用ルナリ即衆方規矩ニアル萬安湯ナ
 リ或不相應ナ茶ユキ過タル療治ノアトニ用テ一旦茶毒ヲ解
 スルニ用テヨシ然レモ勞倦アツテハ解散正面ノ證ニハ入參
 去ベカラズ白木唐ヲ用テ可ナリ萬安湯ナドハ輕劑ニテ和蒼
 朮ヲ用レバ畢竟不換金ニ桔梗茯苓ノ加味ニテ輕キアレラヒ
 ナリ或加羌活防風輕キ感冒ニ用ヒ不食ニハ加香附縮砂熱ニ
 ハ加柴胡黃芩痞ニハ加青皮香附又スベテ一切ノ時氣ニ中リ
 タルニ去入參白木加唐蒼朮桔梗川芎紫蘇香附羌活防風コレ

彼ハ解散ダチノ療治ナリ然レモハキ治法ニテ小刀細工ナ
 リ大匠ノナス事ニアラズ○儲是ニテ荒増感冒ノ茶方ハ濟ナ
 リ上ニ段々拳タル通用ノ方ハ何レモ茶方ハ記サス其内ニ用
 ヒツケノ要方ヲ末ニ記スナリ儲又感冒ニ兼ル事ト紛レ事
 アリ次ニ一々拳ルナリ

○感冒ニ食滯ヲ兼ルコトアリ藿香正氣散去大腹皮加蒼朮半
 井流去大腹皮ヲ家傳トスレモ元來唐ニテ蒼朮ト云事ヲ傳寫
 ノ誤テ大腹皮ト書キ違ヘタルナリ此茶ハ誰ニ始ルト云又ラ
 シラザレモ宋朝ノ和劑局方ニ出テ局方以前ノ古キ書ヲ穿議

大腹 白木 厚朴 半 年 各二兩
 桔梗 白木 厚朴 半 年 各二兩
 藿香 白木 厚朴 半 年 各二兩

陳皮 枳實 枳椇 木香 半多 紫蘇 乾葛 前胡 人參 芍藥 生薑

世ニ大腹皮ハ無テ蒼朮ノアルガ本方ナリ食滯ヲ兼ル加減
 ハ又不換金ニ食傷門ヲ見合テ加味シテヨシ
 ○痰ヲ兼タル者ガアル元來痰證カサナクテモ折節痰ノ指出
 ル事アリ是ニハ參蘇飲ガヨシ元來參蘇飲ハ痰ノ某ト意得ヘ
 シ然レモ胃中ノ陽氣不足シテ寒ノ方ニ屬スル痰ナラバ二陳
 湯ヲ主方トシテ紫蘇藿香ノ類ニテモ了簡ヲ以テ發表ノ
 蒸ヲ加ベシ必乾姜ヲ加テヨシ
 ○勞役ノ感冒アリ是ガ世間ニ多キ者ナリ今世間ニテ時疫ノ
 傷寒ノト云モノハ十二六ツモ七ツモ勞役ノ感冒ヲ療治ヲ仕

損ジテ大病ニナリタルモノナリ傷寒ニハ人參ノ附子ノトモ
 ルコトアレモ時疫ニ參附ヲ盛ルコトハ大方ハナキモノナリ
 然ルニ世間ニ時疫ニ大分人參ヲ盛テ快氣スルコトアルハ實
 ニ時疫ト云モノニテハナシ大方ガ勞役ノ感冒ノ仕損ナリ是
 ガ常ノ感冒ニ似タルモノニテ見分ガタキモノナリソレデ東
 垣カ内傷ト外感ノ分チヲ長々ト云テオカレテ回春ヤ正傳ハ
 門ニモ其外医書コトニ書テアレハ長々シキ事ニテ今此書ニ
 ハ記サレズ諸ノ医書ニテ内傷外感ヲ見分シ然ルニ畢竟ノ
 目當ハ外ノ所ニカニワス脈一ツが目當ナリ何ニモカニワス

醫書

二編

三

三十七

脈カ浮大テ按シテ見テ底力ガナクハ脇目フラスニ補中益氣湯ヲ用ヘシ補中益氣湯ハ内傷一通リノ葦ナリ内傷ニ感冒ヲ兼タルニハ加味益氣湯トテ太陽經ノ證アラバ羌活防風ヲ加ベシ陽明經ノ證ヲ兼ハ葛根ヲ加ベシ少陽經ノ證アラバ柴胡ヲ加ベシ今時ノ療治ニ大分イルコトナリ意ヲツクヘシ勞役トハ何ゾ情魂ヲ尽スカ骨ヲ折タルコトアルナリサヤウノ事ヲ病人ニトクト聞合スガ肝心ナリ勞役ノ病出シハ一通リノ時氣感冒ト違ヒ十日或十五六日モ前ヨリ催シアリテ不食スルカ惣体草臥アリテ手足タルキカノ催シアルベシ病ツキモ

一應ノ感冒時氣ナドノマウニ頭痛ナドスルトテモ劇レカラヌモノナリ此處隨分念ヲ入テ精シク問ベシ一通リノ時氣感冒ハ前日ニテ何ノ申ヘカモノナク俄ニ病ツクモノナリ脈ノ虚實モ初心ノ中ハ取リ覺ヘニクキモノナリ
 ○夾陰ノ感冒傷寒アリ是ハ房事ヲ過シタル上ニテ風ヲ引カ又ハ下地腎虚ノ上ニ風ヲ引カナリ此目當モ脈カ肝要ナレモ手近キ目當惣身ニ熱アツテ有無ニ足カ冷ルモノナリ足ノ冷ルハ必違ナキ目當ナリ此證ニ正氣散敗毒散ノ類ヲ用ルト必大病ニナルナリ黄耆建中湯小建中湯ニ方ノ中撰用ヘシ下

地氣分ノ強キモノハ五積散ニ枳殼厚朴麻黃ナトヲ去テ用テ
 モヨシ
 ○又同シ腎虚デモ火ノ亢リ頭痛モ少シツハシテ身カ乾キ足
 ナドモ冷ハセテ反テ熱スルナリ是モヤハリ腎虚テ前ノ夾陰
 ノ證トハ違タモノナリ此目當ハ夾陰ハ足ガ冷ル此證ハ足ガ
 熱スルタトヒ熱カ無テモ足ノ冷ルコトハナクドコ所ナフム
 シクシト心アシク身ニカナク日ニ向ヘバニバユキヤウニナ
 ル是ニハ何レノ医書ニモ證モナシ藥方モナレ然ルニ今日テ
 見レバ多クアルナリ此證ニハ大坂ノ見宜翁ノ弟子ガ傳ニハ

物湯ニ陳皮ヲ大ニ加ヘタルヨシ此傳エ得テ後此證ニ多ク用
 タルニカタノ如ク効アリ儲ソレカラ推テ理會スレバ此證ニ
 茯苓補心湯カヨシ參蘓飲ト四物湯トヲ合シタル方ナレバ四
 物湯ニテ血虚ヲ補ヒ參蘓飲ニテ發散ヲスル咳ナトアルニハ
 必茯苓補心湯ヲ用ベシ或ハ物湯ニ陳皮紫蘓類ヲ加ヘ用テ
 モヨシ若シ腰痛アラハ牛膝杜仲ヲ加ベシ此腰痛ハ劇シカラ
 スダルヤメニ痛ムモノナリ
 ○勞役ノ感冒ヲ前医ガ仕損テ熱カ反テ強ク時疫ノマウニナ
 リ謔語モアリ舌ナドモ黄ニナリ黒クナリタリ焦レテ咽モ渴

テクルソコデ時疫ト意得テサマクノ療治ラスルホトアレク
 ナツテ危キ證ニナルコトテ入参ヲ多ク用テ効ヲトルトクト
 病ツキカラ今一デノ次第ト脉トヲ考レバ紛レモノニ獨参湯
 ノ證ナリ若シ虚寒ノ脉證ガアレバ獨参湯ニ桂附ヲ加ルコト
 モアリ此段ヘナツテハサマクムツカシキ仕方モアレモ先大
 要ガ大補ノ蒸ヲ用ルト云ガ肝心ノ意得ナリ
 ○夾陰ノ感冒ヲ見損テ大抵ノ感冒ノ蒸發散劑或小柴胡湯
 ナトノ類ヲ用ルトベツタリト草臥ル勿論虚トハカリ意得テ
 補中益氣湯ヲ用ルハアレソレテ勞役ノ感冒ハ補中益氣湯夾

陰ノ感冒ハ黄耆建中湯ヲ主蒸トスル是カ紛レヤスキモノナ
 リ能々見分ベシ夾陰ノ感冒モ療治仕損テ發散解熱ノ劑ヲ用
 レバ殊外草臥ルカ偕ハ熱カ強クナツテ謔言妄語舌モ黑胎ア
 ツテメツタニ狂テ時疫ニ似タモノテ紛レルモノナリ大劑ノ
 参附ヲ用子バナラス若シモ時疫ニ参附ヲ用ルト大キニアレ
 シ是大事ノ見分ナリ初發ノ病ツキノ次第ヲトクト聞テ時疫
 ノ病ツキカ夾陰ノ證カト云コトヲ考ヘ見ヨ脉ハ沉遲ナル脉
 ガ變ジテ數カアルモノナリ其マウニ變ジテキテカラノ目當
 ハイカホト熱カアツテ躁々モ時疫ト違ヒトカク病マウカ底

ニ草臥カツヨイ假令謔言ナト云テモ声ニ底力ガナラフテ弱シ謔言
 ハカリテナヒ物体ニ草臥弱ニカ見ユルモノナリ此證ヲ世間テハ陰
 證ノ傷寒ト云ハ誤リナレモ世間テオレナメ日本ノ老医ガ皆ソ
 フ云ナラハセリ

○濕ニ中リテモ感冒ニ紛ル、夏アリ外ノ夏ハ大抵同シコトニテ身カ
 重イカ腰ヨリ下ガタルイカ偕ハ脉ガ沉細ナモノナリ不換金ニ加茯
 苓小便ナトモ澁リテ色モ黄ナラハ不換金十四苓散ヲ合スベ
 シ即チ白朮茯苓猪苓澤瀉ヲ加ヘタモノナリ

○疝氣テ寒熱カアルモノ感冒ノマウニ紛ル、必痛カトコソヘサ
 シコムカ又持病ニ疝氣ガアルカ吟味シテ疝氣門テ療治ススベシ大抵香
 薷散ニ偏墜ノ如味アリ憎寒壯熱ガアルモノナリ偏墜ハ陰囊カタ多腫
 レテサシコニ痛ムナリ

○夾氣ノ感冒ト云コトアリ氣鬱ノウニ感冒シタルモノナリ是ハ實性ナ
 ル人ニ多キモノナリ香薷散行氣香薷散類ヲ用ベシ此外夾血ノ冒雨
 ノナト、テサシコノ事アリ諸クノ医書ニアリ考ベシ寔ニ風ハ百病長
 トモ始トモ古經ニ言ルゴトク一切ノ病ノ司ナリ物語モノニモ風ノ意地
 ト候ヒテナド、昔ヨリイヘリ金匱要畧ノ開卷ニモ人ハ五行ヲ稟
 テ風氣ニ因テ生長スルナリ風氣能ク萬物ヲ生ズトイヘ用亦能ク

萬物ヲ害ストイヘリ傷寒ト云ニ意存セリ一ツハ冬月正傷寒或ハ
 四時ノ感冒モオシナメ通シテ云ナリ一ツハ百病皆風寒ニ傷ルヨリ
 發ルト云是長沙ノ微意ニシテ丹水翁ノ所謂仲景金匱要略ヲ著
 シテ雜病ヲ治シ傷寒論ヲ著シテ亦雜病ヲ治ストイヘリ是本邦
 ニテ桂枝湯ヲ始テ用ヒ弘メラレシ所以ニシテ古方ノ元祖仲景流ノ大
 先達ナラズヤ

ノ感冒復トテ感冒ノ病カヘシアリ先何ノ子細モナク又風寒ニア
 タリテ病カヘシタルニハ前ニ用タル茶ヲ又用テヨシ若シ勞役ニヨツテ
 病カヘシタルニハ補中益氣湯ニ加減シテ用ベシ或房事ニヨツテ病カヘ

シタルニハ八物湯ニ陳皮紫蘇類ヲ加ベシ若シ脈カ沉遲ナラ補中益氣湯
 ニ熟附子ヲ加ベシ若シ肉瞶筋惕シテ上ツリニナリ盜汗ナドアルモハ眞
 武湯ノ變方ヲ用ベシ即チ本方ニ當歸熟地黄麥門五味酸棗ヲ加ルモノ
 ニシテ房事ニヨツテ病カヘシタルニカギラス少陰眞武湯カヘリニ用テ
 茶峻カラス一切病後ノ調理ニ益氣湯ナドニテ上逆スルモ究メテ
 効アリ此方近來新刻ノ傷寒五法ニ出タリ此書何レモ古方ノ變
 方アリ陶節菴ガ變方ノ意凡亦違ヘリ傷寒論ノ方ヲ和ケテ
 今日用ヨキヤウニ平和ニセシモノナリ未熟ノ輩ナド古方ノ試ニ
 先變方ヲ用テ害ナカルベキ乎

○感冒活套 凡感冒ノ病人ニ望ミ先顔色ヲ見ルベシ顔色常ノ如キカ顔色アレキカト氣ヲツクベシ病人ノコトナバ大抵アレキハ理リナレ氏當分感冒ナドニスグレテ顔色アレクハ不審ヲ立テテ意ヲツクベシ前夜寢ザルカ或イカフ情ノツキルコトアツタカ何ゾノ訣アルベシ何ノ訣モナレニ勝レテ顔色ガアレキナラバ隨分意ヲツクベシ此ハ感冒ニカギラス何レノ病ニテモ同シコトナリ。此ニ病人ノ音聲ヲ聞ケ平生ノ音聲ナラバ其トオリ平生トカワリタル音聲ナラハ氣ヲツクベシ是亦諸病同前ナリ。此ニ容躰ヲ問ベシ風ヲ引タラバ惡寒スルカ發熱スルカ頭痛スルカ鼻カツルカ鼻水ガ出ルカ鼻ノ息ガ熱カ咳ガ出ルカ項アレハ肩背カタリ強ク拘急カト問ベシ此内ニテ一色モ二色モアルベシソレナラソレニツイテ精シク問テ考ベシ若シ右ノ惡寒發熱頭痛鼻塞或流清涕鼻息熱咳嗽項背強等ノ七色ハ色ノ内カ一ツモノクハ風引タリト云モ風引タルモノニテハナシト意得ベシ。此ニ脈ヲ取ベシ脈モ其人ノ平常ノ持脈サキアリトイヘ氏大抵浮テ洪ガアリ數モアルモノナリ若シ惡寒バカリアツテ發熱ナク脈モサホドニ浮モセズサホドニ數モナクハ寒邪ニ中リタル感冒ナリ若シ發熱ハカリアツテ惡寒ナク脈浮テ數ガアラバ風ニ中リタル感冒ナリ若シ惡寒シタリ發熱シタリ互ニ指引アルハ半表半裏ノ意氣方ノアル

カ項アレハ肩背カタリ強ク拘急カト問ベシ此内ニテ一色モ二色モアルベシソレナラソレニツイテ精シク問テ考ベシ若シ右ノ惡寒發熱頭痛鼻塞或流清涕鼻息熱咳嗽項背強等ノ七色ハ色ノ内カ一ツモノクハ風引タリト云モ風引タルモノニテハナシト意得ベシ。此ニ脈ヲ取ベシ脈モ其人ノ平常ノ持脈サキアリトイヘ氏大抵浮テ洪ガアリ數モアルモノナリ若シ惡寒バカリアツテ發熱ナク脈モサホドニ浮モセズサホドニ數モナクハ寒邪ニ中リタル感冒ナリ若シ發熱ハカリアツテ惡寒ナク脈浮テ數ガアラバ風ニ中リタル感冒ナリ若シ惡寒シタリ發熱シタリ互ニ指引アルハ半表半裏ノ意氣方ノアル

感冒ナリ。右ハ望聞問切ノ四診トテ肝要ノ法ナリ内經ニ始リ者
 くノ医書ニ出テアリ精シキコトノ類經ヲ見ルベシ李仲樞ガ願生
 微論ノ第二卷四要論ト云カ是ヲツグメテ能云々モノナリ内經
 中ニ今日治療ノ受用ニナル所ハカヤウノ格言ナルベシ。諸脈ノ
 コト素難王叔和カ脈經ニ精シクアレハ初心ノ輩容易ニ明メカ
 タシ一息五至ヲ平脈トスルトアレハ此モ医者ノ息ニテ脈ヲタメサン
 トスレハ息ガクルクテ遲速定メ難シ是ハ折々平人ノ脈ヲ所望メ
 自分ノ脈ト引合セテ考ベシ又脈ニ七表八裏九道ナド、テ其外サ
 べくノ事アレハ先ッ大抵張介賓カ六脈ヲ以テ立トシテ考ベシ其六

脈上六浮沉遲數虛實ノ六脈ナリ是表裏寒熱虛實ニテス諸病此六
 ツニハツルコトナシ浮病表ニアリ沉ハ病裏ニアリ遲ハ寒ナル病數ハ
 熱ナル病虛ハ按テミテ底カノナキ脈ヲワクトカサモアレハ按ノミテ根ニカ
 ノナキ脈ナリ實ハ指ヲチヨツトアツレバカサヒクニテ弱キ脈ノヤウナレハ
 按ノミテ根ニ底カアル脈ナリ浮沉遲數ハ診シマスシ虚實ハ診シ難シ隨
 分手續スベシ然レハ此脈モ病證ト引合セテ見テ虚實ヲ考ベレハ脈
 バカリ診テ虚實ヲ明ムル事大抵ノ指ノ練熟ニテナクハ明メ難シ先
 ツ此六脈サヘトクト理會スレバ足モトカラ鳥ノ立ツヤウナ仕損ハナキモノナ
 リ外ノ脈状ハ諸ノ医書ニ精シクアリ考ヘ見ルベシ

○當世脈位事ナドアミリ吟味スル人モナケレ厄抑此脈位ハ医術ノ天下國家
 ニ預ル肝要ノコトユ予ガ故人伊勢ノ州平宗安ガ生涯世話ヤセテ言合
 脈位真ヲ失スルコト尚レ今世間流布スル所心肝腎肺脾命ニ診末代不
 易定法トナレト可歎ノ甚哉其モトハ素問脈要精微論ニ尺内兩傍ハ
 季脇也ト云語ニ引ツキテノ論ガアルヲ古人見誤テ三部ノ脈ノコト
 ト思フテ此脈位ヲ建テ初タリ故ニ水戸ノ醫官藤宗伯脈位辨正ヲ著
 シ彼内經尺内ノ診ハ三部通例ノ脈ノ事デハナシ肉診ノ事ナリト云コト
 ヲ明カニ辨ゼリ然レ厄惜哉藤宗伯古來ヨリ人身ノ脈位ノ臆々トシテ
 アルヲ氣ノ毒ニ思テ脈位辨正ヲ著セシカレ十八難ノ扁鵲ガ本意ヲ據ト

セズ滑伯仁ガ本義ヲ以テ本文ノ經意トシテ第一滑氏カ脈位ヲ出シテ鏡
 トシテ殘ル九ノ脈位ヲ非トスルハ不吟味ナリ其上斯ノ如ク種々ノ脈位ヲ
 拳方カラ揚玄操ガ脈位モ拳テ辨アルベキ所ニ向ニ拳サルハ不審ナ
 リ如此前賢未發ノ大義ヲ思ヒ立レテモユキ届サルナリ滑氏十八難ノ
 本義ハサノミ悪クハナケレ厄外ニ於テ此意ヲ註スルガ悪シ既ニ高陽生
 カ脈訣ニ命門トスル右尺ヲ心包三焦トツケカヘタルハ大キニ悪シ滑氏
 尚後世ヲ迷スナリ王叔和モ脈要精微論ノ尺内兩傍ハ季脇也ト云
 語ニ引續キテノ論ガアルヲ見誤リテ三部ノ脈ノ事ト思テ肉診ト
 ルコトヲシラス脈經ト云書ヲ作レリ故ニ其後ノ先輩達モ尤ト思レ

テ立來リタルニ其中ニ高陽生ト云人難經三十六難三十九難ヲ以テ了
 簡ヲツケテ左右ノ尺部ニ左尺八腎右尺八命門ト立テ脈訣ヲ著ス
 是モト難經ニ六脈ニ建ヨト云コトニハアラス主意ノ違フタルコトヲ見
 誤テ建タルヲ後世皆尤トスル麗末ヨリ此語カ末代不易ノ定法ト
 ナリタルハ苦々シキコトナリ儲脈位ノ眞ハ左寸心左關臆左尺肝右
 寸肺右關脾右尺腎コレ難經ノ古註者揚玄操ガ十八難ノ扁鵲ガ本
 文ニ能ク註シテ此脈位ヲ定メシナリ是古今唯一人脈位ノ眞キヲ明カ
 ニセシト平宗安甚タコレヲ歎羨セリ寔ニ此眞ノ脈位ヲ普天ニ知
 ラレメテ彼心腹腎肺脾命ノ誤ヲ正サバ廣大ノ仁術ナルベシトイハリ

儲難經十八難ノ脈位左右ヲ言サル如シトイハレ左右ノ意ヲ含ムモノニ
 一應ニテハ左右トモ思レヌマウナレト云ノ文ノ論ニ於テ右脇ニ積アラ
 ハ肺脈結スヘシト云テ尚肺脈結セスト云レ右手ノ脈當伏ト云此文
 ヲ味フテ見レハ左右ノ文アルナリ肺ニ既ニ右ヲ論セハ肝モ亦左ナ
 ルベキコト言外ニアルナリ唯揚玄操ノ一人衆エト替リテ十八難
 ニ於テ部位ヲ能立テ分チ左右ノ議ヲ建テ王叔和ガ脈經ニモ從
 ハズ彼十八難ニイヘル右ノ字ナラヒニ內經刺禁論ニ肺ハ右ニ生ス
 ルノ意ヲ以テ交ヘ建ラレタルナリ今世難經ナリ信用ハストイハレ
 此脈ノ部位ノ事ハ医者タルモノ今日指下ニ於テ意得アルベキ哀

ユへ平宗安カ生涯世話ヤキシコトヲ荒増述ルモノナリ然レ在當世
ニテハ素難ノ配當理屈推治療ノタメニ益ニ立又事ヲト云ル人
ヤ多カラシ

○藥方

桂枝湯 太陽ノ中風頭痛シ項強リ齧々ト惡寒シ淋々ト惡風
シ滄々ト發熱シ汗出テ脉浮緩ニ鼻鳴リ乾嘔スルモノヲ治ス
桂枝分三 芍藥分三 甘草分一 生姜分三 大棗分三
右五味以水ニ盞煎ニ盞〇一貼壹錢四分ナリ是ヲ壹分劑ト
云此分量ヲ倍スレバニ錢八分ナリ是ヲ貳分劑ト云此藥ヲ服シ

テ軟稀粥ヲ啜リテ藥カヲ助クルナリ方後ノ加減服法ハ畧スルナ
リ或傳ニ凡何病テモ桂ヲ用ルハ藥動カ的ナリ

麻黃湯 太陽ノ傷寒頭痛シ項強リ惡寒發熱身疼ニ腰痛
ニ嘔逆シ脉浮緊ニシテ無汗喘スルモノヲ治ス

麻黃分三 桂枝分三 甘草分一 杏仁一分

右四味以水ニ盞煎ニ盞一貼八分餘ナリ一分劑ナリ或ニ錢
六分餘ニ修合シテ二分劑トモスルナリ服後粥ヲ啜ルベカラス

大青龍湯 太陽ノ中風脉浮緊ニシテ身疼ニ汗出ズシテ煩スルモノヲ
治ス若シ汗アルノ煩躁ノモノハ禁之

麻黄^{分六} 桂枝^{分二} 甘草^{分二} 杏仁^{分二} 石膏^{分三} 粳米^{分三} 枣^{分三}

右七味以水二盞煎一盞○一分劑ナリ合シテ二錢ノ余ナリ

此方喘及ヒ咳嗽シテ渴シ上衝シ或身痛ニ風寒ヲ患ムモニヨシ

小青龍湯 太陽ノ傷寒脉浮緩ニシテ身疼ニス但重クモチ輕キ時

アリ心下ニ停飲アレハ發熱シテ咳シ或乾嘔シ或渴シ或利シ或噎

シ或小便利セス小腹滿チ或喘スルモノヲ治ス

麻黄^{分三} 桂枝^{分三} 芍藥^{分三} 甘草^{分二} 乾姜^{分三} 細辛^{分二} 半夏^{分三} 五味^{分三}

右八味以水二盞煎一盞○合シテ二錢二分是一分劑ナリ○咳

喘上衝シテ頭痛發熱惡風或乾嘔スルニヨシ○此方發表下氣潤

燥開痰ノ四ツノ功此一方ニ備レリ尤和ノ五味子ヲ用テヨシ

五苓散 太陽ノ中風發熱シ六七日解セスノ煩シ表裏ノ證アリ

渴シテ水ヲ飲ント欲シ水入レバ即チ吐者ハ水逆ト名ク

猪苓 澤瀉^{各一錢} 朮 茯苓^{各一錢半} 桂^{五分}

右五味末トシ白飲ヲ以テ方寸匕ヲ和シ服ス日ニ三服ス凡此

方ヲ用ル證ハ何病ニテモ渴シテ小便不利ヲ的トスヘシ

桃仁承氣湯 太陽ノ病不解邪熱血ヲ搏チ膀胱ニ結シ沸瀦

シテ心火ヲ侮リ其人狂ノ如モノヲ治ス血自下ルモノハ愈示腹急

結スルモノハ血膀胱ニ畜ス外不解モノハ尚未ダ攻ベカラス先ツ外

ヲ解スベシ外解レバリ乃チコレヲ攻ベシ

大黃四分 桃人分 桂枝分 芒硝分 甘草分

右五味以水三盞煎之盞去滓内芒硝火ニ上セ微沸シ火ヲ下シ先ッ食シ小半盞ヲ温服スル丁日ニ三服ス利スベシ。合シテ一錢二分一分劑ナリ或倍シテ二錢四分トモスルナリ。血證小腹急結上衝スル者ヨシ或脈數ニシテ嗑渴キ小便頻數ニテ腹硬ク塊ノ如クナル物アルハ畜血ナリソレデ故ナクシテ湯水ヲ好ムハ腫物ノ催シト知ルベシ

甘草乾薑湯 傷寒始テ病ニ微ク惡寒發熱坐臥安カラズ胸

中煩ニ嘔セシト欲シ善饑脈弱陰陽未詳者先與此湯加葱白然後陽證ハ與表裏陰證ハ用温某

甘草 八分 乾姜 四分

右以水三盞煎之盞半温服。此方厥シテ煩躁シ涎津多キモニヨシ

葛根湯 陽明ハ經府別アリ身熱目疼鼻乾キ臥テ得ズ脈尺寸俱長ナル者ハ經ニアリ表證ニ屬ス中風ハ能食傷寒ハ食スルヲ能ハズ自汗脈緩ナル者ハ桂枝湯ヲ用ベシ無汗脈浮ナル者ハ麻黃湯ヲ用ベシ少陽證漸ク見朝發脈弦浮大ニ短長腹滿者ハ小柴胡ヲ用テ表裏邪ヲ分提スベシ頭項強リ凡々脈長ニシテ大ナル者此湯主之

葛根四 麻黄三 桂枝二 芍药二 甘草二 蜂蜜各三

右七味以水二盞煎一盞。合テ壹錢九分一分劑ナリ或倍シ

テ三錢八分トス。太陽陽明ノ合病ハ必下利ス此湯ニヨロシノ項背強

急ニテ發熱惡風シ或喘シ或身痛モニヨロシノ此方古方家發表專

用ノ劑ナリ桂枝湯ハ甘シ此方ハ麻黄葛根アリテ苦ニアリ用ヨシ酒

客嘔家ニモ障ラ子矢抵此方ニテ發表ニリ外ノ方モ不用ナリ或世間

ニテ瘡腫家ノ初起ヲ防敗毒散ヲ用ル場ヘ此方ヲ用ルニ物ニ體ニ參ニ燕ニ飲

十神湯九味羌活湯五積散ナド用ル所ヘ葛根湯ヲ用テ發表ニ手際

後世方ノ及フトコロニアラス或麻黄ヲ去ハ桂枝加葛根湯ナリ見合用

ベシ然レト人ニヨリ桂ノ痞ルモノアリ葛根アツテモ嘔逆シ又ハ上衝

スルトテ一向吞得サルモノアリ是ニハ不換金カ沃雪湯ノ類見合セ

用ベシ無理無体ニ古方ヲ投テモ障ルモノ吞ザルモノハ他茶ヲ用

子バナラスト此時ニ至リ古方家偏ナル處アリ未熟ノ者ハ別シテ

意得ベシ

大承氣湯 陽明ノ府證ハ太陽陽明アリ正陽陽明アリ少陽陽明アル

ノ辨アツテ其重キ所ハ尤能ク食スルヲ胃強シト為ナリ不能食ハ胃

衰フトス大都能食スル者皆攻下スベシ但緩急ノ殊アリ潮熱自汗證

語發渴衣被ヲ抱去リ手ヲ揚ゲ足ヲ擲チ班黃狂乱惡寒セズ及

テ熱ヲ怕レ大便實シ脈沉數ヲ見スモノハ陽明ノ府病トス三焦俱ニ傷ル者ハス大チ痞滿燥實堅全具ル者ヲ治ス

大黃 四分 厚朴 八分 枳實 八分 芒硝 八分

右四味以水二盞先煮枳朴取一盞半内大黃煮取一盞内芒硝更上火微一兩沸分温再服得下餘勿服。合シテ二錢八分ナリ煎法如此ナラサレハ効速カナラス。腹堅ク滿チ及ビ臭穢ノモノヲ下利レ及ビ燥糞アルモノニ用ルナリ凡ソ燥糞アルモノハ臍下ヲ按テ物アリ是ヲ撫レハ肌膚乾クヲ目當トスベシ

調胃承氣湯 邪中焦ニ在ル則燥實堅ノ三證アル者ヲ治ス

大黃 四分 甘草 二分 芒硝 二分

右二味以水三盞煎一盞内芒硝上火微煮令沸少々温服。合シテ八分或倍シテ一錢六分トス。此方痞閉シテ急ニ迫リ結スルモノニヨシ。中消渴ハ能食シテ瘦セ自汗大便硬ク小便數ナリ此湯ヲ用テヨシ。腹痛常ニ熱アリテ痛者ハ此積熱ナリ此湯ニヨロシ。歷年齒痛黑爛レ脫落シ冷水ヲ吸バ痛シバラク止者ハ膏梁濕熱ノ火ナリ此湯ニ加黃連用ベシ又牙齒實熱ニテ腫痛者加黃連去芒硝

小承氣湯 上焦傷レヲ受ル則痞實スルヲ治ス

大黃四分 厚朴二分 枳實二分

右三味以水四盞煎一盞二分分温二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之。清張璐云仲景本意大熱大實用大承氣湯小熱小實用小承氣湯實熱尚在胃中用調胃承氣湯以甘草緩其下行而去胃熱也。紫短舌下之大承氣湯主之。大陽中風桂枝湯ヲ用ベキニ反テ麻黃湯ヲ與ヘ汗出ルヲ過多ニシテ胃中ノ津液ヲ傷リ熱不解乘虛内陷リ裏熱ノ證トナリ熱勢蒸々トシ沸騰スルモノ調胃承氣湯主之。頭汗多者裏實ノ證ナリ頭汗出脇下滿大便硬大柴胡湯主之。傷寒六七日不大便頭痛

有熱小便清者病不在裏不可用承氣湯不能食者是胃弱乃有挾虛寒挾熱結之不同虛寒則自利發黃嘔噦而脈遲當用理中四逆熱結則腹滿譫語不大便而脈濇當用

蜜煎臍導 白蜜七合

右一味内銅器中微火煎之稍凝以飴狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以内穀道中以手急抱欲大便時乃去之。此方肛門中乾燥レテ大便堅ク澁ルモノニ用ベシ

小柴胡湯 少陽八頭痛目眩耳聾口苦脈弦脇痛寒熱往來ヲ治ス

柴胡分八 黃芩分三 人參分三 甘草分三 半夏分三 棗分三

右七味以水三盞煮取一盞半去滓再煎取一盞溫服日三服。

合シテ二錢六分一分劑ナリ煎法畧スベカラス如此煎スレハ吞ヨシ。

此方胸脇苦滿モ或寒熱往來或耳聾モ嘔吐カ肝要モ自當ナリ。此

方ハ口用方多キ方ナリ傷寒論中ニテ古方家ニカキラス此方

ハカリハ何シノウラテモ用ヒ覺テ傷寒時疫ニイカヤウノ處モ用

ルナリ勿論傷寒論ニモ桂枝湯柴胡湯ノ用法多シ然レモ分量ヲ本

方ニ修合せサレ其効速カラス。傷寒胃實ノ證脇下ト手足心ト

兩處ニ無汗モハ未結定ヤリ此湯ヲ用ベシ。舌上黒ク燥裂神昏譫

妄者此湯加知母石膏。往來寒熱呢者此湯ニヨロシ若不應ト

キハ加肉桂乾姜黃連。少陽ト陽明トノ合病咳シテ嘔シ腹滿モ

ノ此湯加葛根。陽明ノ證脇下鞭滿大便セズシテ嘔シ舌上白胎

アルモノハ此湯ニヨロシ上焦ノ津液下ニ通ス坐トヲ得テ胃和身

濈然トシテ汗出テ病解ス。陽明ノ病潮熱ヲ發シ大便溏シ

小便常ノ如シ胸脇滿モノ此湯主之。雜病ノ盜汗ハ陰虛ナリ

半表半裏者此湯ニヨロシ若脈浮緊潮熱盜汗者ハ柴桂湯ヲ

用ベシ若大陽陽明ノ合病裏實者ハ必盜汗出ルナリ。傷寒五

六日往來寒熱胸脇苦滿モ不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不

嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或下悸小便不利或不渴身有微熱或
 咳者此湯主之凡中風有柴胡證但見一證便是不必悉具。此湯諸病
 二用ル加減ノ方諸ノ古書ニアリ考ヘシ

大柴胡湯 太陽ノ病過經十餘日及三三旦之後四五日柴胡證仍在者

先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱々微煩者為未解此湯主之

柴胡分八 黃芩分三 芍藥分三 半夏分二 枳實分一

大黃分二 生薑分五 大棗分三

右八味以水三盞煮取一盞半去滓再煎取一盞溫服日三服。

合シテ二錢七分一分割ナリ煎法畧スベカラス。小柴胡湯證ニ

テ心下痞ヒセズ腹滿拘攣ヒキツリレ或嘔スルモノニヨロシ。陶節庵曰表邪尚未除
 而裏證又急不得不下又日外證罷謂無頭痛惡寒也脈見沉實不
 浮謔語惡熱口燥咽乾輕則此湯重則三承氣撰用の傷寒後脈
 沉者內實也下解之宜此湯。今時ノ傷寒、裏證ハ希ナリ表
 證ハ常ニアリ少重キト云ハ少陽ノ證ナルホトニ大小柴胡ノ
 療治ヲ能意得ベシ又陽明ノ府證モ希ナルモノ大形ハ感冒ノ
 仕モツレタルモノナリ大柴胡ニテス春夏ニ承氣湯ノ證アルハ
 溫熱病時疫ナリ

小建中湯 大陰ハ有中風無傷寒腹滿益乾下利而脈沉細ナルヲ治ス

桂枝 三分 芍藥 六分 甘草 二分 蜚 三分 棗 三分

右五味以水二盞煮取一盞內膠飴溫服或先膠飴ヲムクロジ

ノ大サ口中へ入レ其甘味ニ乘ジテ服スベシ如此スレバ吞ヤスレ甘草

少シニテモ減ジテ八建中ノ功ナシ○金匱要略曰虚勞裏急悸顛腹

中痛夢遺失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等證ニ用ルナリ方後

ニ嘔家八建中湯甜キ茶ナレバ用ベカラズトアリ○黄耆 一分 加ヘテ

黄耆建中湯ト云虚勞裏急諸不足ニ用ルナリ是後世ノ太補湯

人參養營湯ナドノ方祖ナリ精ニキ議ハ虚勞門ニ云ヘリ人參考ス

ヘシ千金方ニ人參二分ヲ加入スルナリ其主治云男女ノ積冷氣滯

或大病ノ後常ニ復セザルニヨツテ四肢沉重ヲ苦シ三骨肉痠疼ニ吸

吸トシテ氣少ク行動スレバ喘乏ニ胸滿テ氣急ニ腰背強ク痛ニ

心中虚悸ニ咽乾キ唇燥ギ面體ニ色少ク或飲食味ナク脇肋腹脹

頭重シテ拳ヲズ臥コト多ク起ルコト少ク甚シキモノハ積年輕キモノ

ハ百日漸ク瘦弱ヲ致シ五藏ノ氣竭ルトキハ常ニ復スベキコト難シ

六脉俱ニ不足シテ虚寒ノ氣乏シク少腹拘急シ羸瘠スル百病ヲ療

スルナリ此千金方ノ主治ナリ○腹滿者ニハ去寒加茯苓コレ今世流

行スル茯苓建中湯ナリ尤膠飴モ去テ甘草ヲ減スレバ吞ヤスレ故ニ

近來ハ多ク茯苓建中湯ヲ古方家ニ限ラス京師ノ時尚藥トナ

リ富貴奉養財主ナドニ先ツ茯苓建中湯ヲ投ズルナリ然レ在真ノ
 建中湯ノ功ハ甘草本量ノ通りニ減ゼズ膠飴モ入レ子ハ建中ニ功ナシ
 ト意得ベシ畢竟桂枝加芍藥湯加茯苓減甘草モノナリ桂枝加芍藥湯
 ノ主治ハ腹滿時痛者乃拘急シテ痛ナリ桂枝加芍藥湯加茯苓ト同
 シ意ニナルナリ然レ在茯苓建中湯ノ自當ハ小建中湯ノ證ニシテ
 心下悸スル者ニ用ルナリサレ在心下悸スルニ限ラス長沙方祖桂枝湯ヨ
 リ出タル方ナレバ諸病ニ臨ミ意ヲ以テサシクノ證ニ用ルコト多ク倍茯
 苓ト云モ之香川子ノ所謂顯オナフシテ陰德アリト云ハレシヲ戶田子
 モ此言ヲ稱羨セリ元氣ヲ順導シテ用ヒヤスキ藥ナリ然ルニ近世

ノ角刻ハ山ヨリ煮テ出スモノナレバ効ウスレ後藤家ニ用ル完茯苓
 ノウチ色白ク堅實ナルモノヲ撰用ベシ

桂枝加大黃湯 治若因誤下陽邪内陷而腹痛者

- 桂枝分三 芍藥分三 甘草分二 生薑分三 大棗分三 大黃分一

右以水ニ盞煎一盞溫服ノ本論ニ太陰ノ病腹滿咽乾脉沉ニシ
 テ有力者主之ノ桂枝加芍藥湯ノ證ニシテ停滯アルモノニ用ル
 理中湯 直中大陰ハ必ス内冷物ニ傷ルニ因テ所致ナリ胸膈滿チ手
 足冷ハ臍上痛ニ清穀ヲ下利シテ渴セズ或冬月寒邪ニ感レ内飲
 食ニ傷ラレ嘔逆泄瀉脉沉細或伏スル者主之

乾姜 半錢至一錢
人參 一錢至三錢
白朮 一錢至二錢
甘草 炙半錢至一錢

右四味水煎甚者加附子。太陽病二三日不得臥心下結脈微弱寒飲在胸中此湯主之。少陰不渴而吐或乾嘔去白朮加生姜。汗下後小便難者加厚朴茯苓不應則加附子。誤下始覺結胸之證急與此湯。大病愈後喜唾久不了了。胃上有寒此湯主之。或愈後無他證微熱未盡此湯加蜜一匙。理中湯方後ノ加減傷寒論ニ詳ナリ

麻黃附子細辛湯 少陰脈微細但欲寐也若始得之反發熱脈沉者乃兼太陽之表邪

麻黃 各二兩
細辛 各二兩
附子 一枚

右以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升溫服麻黃附子甘草湯 前證並當用

麻黃 各二兩
甘草 各二兩
附子 一枚

右以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服。此方分量大抵葱葉三味ニテ壹錢餘ニ修合スベシ。此二方ノ證ハ表邪ヲ兼ルニ偶アル證ナリ感冒ノ療治ニ敗毒散加肉桂合半コトアリ大抵似々意モチナリ。麻黃附子甘草湯ハ喘ニテ惡寒ニ急ニ迫リ或發熱無汗モニ用ル也

麻黃附子細辛湯ハ惡寒アツテ麻黃附子甘草湯ノ證ニシテ急迫
 ナラス痰飲ノ變アル者ニ用ルナリ。然レ傳經直中ノ別アリ先ツ
 表證ヲ見シ五、六日ニ至リ後變出脈細沉數中燥不得臥六七日腹脹
 不大便者傳經ノ熱證ナリ急下之宜大承氣湯或清水ヲ自利
 シ色純青心下必痛口乾燥者亦急下之大承氣湯
 四逆散 若四逆而或咳或悸或小便利或泄利下重者宜此散

甘草 枳實 薤白 芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服。四逆レテ泄利下
 重スルハ希ナルモノナリ虛寒ノ證ニアルベケレ熱證ニ是如クノ證

アルハ是實ニ傷寒ト云モノナリ

四逆湯 始テ病脈微細口中和レ但欲臥者直中ノ寒證トス宜此湯

甘草二兩 乾姜一兩 附子一枚生去

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人可大

附子一枚乾姜三兩。分量古方家大抵ニ幾日餘ニ修合スル也

○病急迫ニシテ四逆厥及ヒ清穀ヲ下利シ身疼痛及ビ小便清

利スル者ニ用ルナリ是甘草君芍藥ナリ甘草少ケレバ方ノ思ヒイ

違ナリ減スベカラズ。直チニ少陰腎經ニ中テ後世ノ中寒ト同シコ

トナレレ病狀ガ中寒ヨリ緩シ中寒ハ暴ナリコレニ先希ナル證

コレモ次ノ段ヨリハ段々危篤ノ證ニテルソコヘナツテハ中寒ノ重病ト
 同レ此ヨリ下ノ眞武湯ニテハ方皆大温補ノ薬ヲ極冷虚寒ヲ救
 フ重劑ナリ近世古方家ハ附子理中湯ナドハ不用ナリ大形コノ
 四逆湯ヲ用ルナリ尤附子モ唐ヨリ渡ルモノハ製ニテヌルレトテ
 河内州金剛山ヨリ出ル草烏頭ヲ其ニ刻三四逆眞武ハ味腎ノ氣ヲ
 ニテモ和草烏頭ヲ用ルナリ是近來古方家ヨリ附子代ニ草烏
 頭ヲツカヒ覺レナリ然レモ水ニ浸シ煨レテ川烏頭ノ代ニ用ベシ附
 子代ニ草烏頭ヲ用ルトイヘモ煎シ上ゲ煎湯ノ氣味唐ヨリ來
 ルモノト違ヘリ氣味スドニシブリムツクリトセズ補劑ニハヤハリ唐

ヲ用ベシ勿論古方家ニ一切病補フト云フハイハズ故ニ氣味烈ニキ薬ヲ
 以テ第一トス然レモ古來ヨリ和漢ツカヒ覺レ嚴用和方濟生方ノ參
 附湯ハ眞陽虚極ノ反テ執候ヲ見ス者ニ經驗著シケレバ此參附湯
 ハ三子野人參ト草烏頭ノ參附湯ハ如何醫俗ニテ了簡アルベキナリ
 四逆加入參湯 或脈微或下利或脈絶而復還元氣虚弱甚者

四逆湯 加入參 一兩

通脈四逆湯 群陰陽ヲ拒ニ脈微欲絶其人面赤久或腹痛乾嘔
 咽痛或利脈不出危殆種々倍乾姜回陽通脈當用此湯

甘草 二兩 乾姜 三兩 強人 可四兩 附子 一枚

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再其脉即出者愈○
面色赤者加葱九莖○此二方七分劑トスレバ一錢五分貼トス

通脉四逆加猪膽汁湯 治陰盛拒陽甚者

甘草二兩 附子一枚 乾姜三兩 猪膽汁半合

右以水三升先煮三物取一升二合去滓入膽汁

茯苓四逆湯 治太陽證發汗不解煩躁者

茯苓六兩 人參一兩 甘草二兩 乾姜一兩 附子一枚

右以水五升煮取三升温服○汗不出レテ煩躁スル者ハ大青

龍湯ヲ用ユ發汗後ノ煩躁此湯ニヨロシ○或汗出テ煩躁

若シクハ下レテ煩躁スルニ用ルナリ或心下悸スルコトモアルベシ○此方虛

寒ノ腫滿ニ用テ効アリ小松流ノ扶陽湯ト云ハ附子茯苓乾姜ノ三

味ナリモト此方ニ入參甘草ヲ去モノリ附子ノ性ヲ脱諸病ニ用

タモノニシテ久冷ノ證ニ何病ニテモ奇効アリ有熱モノニハ寒菜

ノ濃煎汁ニテ乾姜茯苓多製衣シ浸ス寔ニ流ナリ寒冷ニカル病

ハ四逆ノ大劑ニ効アルナリ然レハ實熱痰火ノ症ハ害アルベシ

白通湯 諸ノ四逆湯ノ證ニ比スレバ尚危急ナリ四逆湯去甘草

加葱白名白通湯或氣逆下利者此湯ニ宜シ

葱白四莖 乾姜一兩 附子一枚生

右以水三升煮取一升温服

白通加猪膽汁湯 少陰之病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉

乾嘔者此湯主之服湯脉暴出者死微續者生

葱白四莖 乾姜一兩 附子一枚 人尿五合 猪膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分温

再服若無膽亦可服用陽ヲ拒ハテ甚キニハ加猪膽汁嚮導トス

附子湯 其人素裏俱虛得病一二日背惡寒口中和唯欲寐

者直入陰寒之甚ナリ関元穴ニ灸レ此湯ヲ用ベシ

附子二枚 人参二兩 白朮四兩 茯苓三兩 芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升温服 一合六分 六分七釐

真武湯 少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重

疼痛下利者此湯主之

茯苓三兩 芍藥三兩 白朮二兩 附子一枚 生姜三兩

右以水八升煮取三升○此方大陽ノ初病ニ桂枝湯ノ類ヲ不用テ

大青龍湯ノ劇劑ヲ用ヒ發汗シテモ解せず却テ正氣ヲ傷リ發熱

心下悸眩暈身中カ蠕動シ振タトシテ地ニ擗シト欲者此湯主之○

偕此方近世古方家ニ限ラスオレナメ用テ流行リ茶ナリソレヲ

イカニト云ニ理中湯トス人參ヲ去テ其方意スニス人參入ルレ

病家ノ指引アリ方中茯苓芍薬アツテ附子理中湯ニ方意餘
 程ホトチカヘ人參ヲ沙汰サタニモ及バズ先ツツ都合ツツヨケレバ多ク此方ヲ用ルナリ
 虚寒ノ病人ニ參附ノ劑不用トイヘ先ツツ真武ヲ投ゼシトイヘ大切
 ノ病人ニモ人參オソチ違ハルトイヘ病家ノ思慮又後醫ヘ相讓ルニモ人々
 尤ト思フナリ人參ヲ加テ生姜ヲ去レバ附子湯ナリ然レ其主治
 迥ハルニ異ナリ真武湯ハ行水收陰オウヲ主リ附子湯ハ回陽峻補クハヲ主
 ルナリ蓋シ真武湯ノ中生姜ハ附子ニ佐トシ辛熱ノ勢ヲ取り經
 中チノ水飲ヲ走散スルニ過ズ附子湯ノ中人參ハ附子ヲ助ケ純ラ其
 温補ウノカヲ以テオシ煖散オシノ真陽オシヲ恢復ス且ツ附子湯ノ中ノ人參芍薬皆

真武湯ニ倍シテ其分兩ニタ自オソ同カジカラスト張氏カ續論ロニイヘ然レ
 バ附子理中湯四逆湯附子湯ノ三方ノ意ヲ辨別シテ證ニ臨ニ考ヘ用ベシ
 備カ此方意ハ白朮附子ハ脾ヲ健ニシ寒ヲ除キ茯苓生薑ヲ兼テ
 脾ヲ運シ水ヲ滲ス是人ノ曠ウシ易キ處ナリ芍薬ヲ用ルニ至テハ深
 キ意アリ此方少陰虚寒ノ證トイヘ若シ至極ノ虚寒ニ至テハ小
 便必清白ニシテ禁スルコトナク反テ不利ノ證アルベカラズ此證ハ真陽
 不足ハ不言シテ知レリ真陰モ亦虚ス故ニ陰證中ニ陽邪アリ故ニ
 芍薬ヲ用テ陰ヲ固ク護ルナリ是附子湯桂枝附子湯芍薬甘草
 草附子湯等ノ中皆芍薬ト附子ト并用ルモノハ此意ナリ

桂枝人參湯 太陽ノ證未除シテ數下之為協熱利利下不其心下痞
表裏不解者主之協合也合裏虛也

桂枝 甘草各四兩 白朮 人參 乾姜各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升
日再夜一服。常用ニハ桂枝甘草四分ヅ、人參白朮各三分
合シテ一錢七分ナリ水ニ盞半入テ四味ヲ一盞半ニ煎シ桂枝ヲ入
テ一盞ニ煎シ上ル也殊外甜キ煎湯ニ上ナリ大抵理中湯ニ加
桂枝ナリ甘草ハ見計タルシ理中湯モ四味等分ナレハ甘草ヲ
等分ニシテ日本ニテハ修合セス兎角甜キ煎湯ヲ嫌ハ本量

ニ修合ナリカタキ方彼是アルナリ炙甘草湯ナトモ用タキ方ナレ
凡本方ノ通りニテハ中々一口モ吞得サルナリソレハ傷寒五法ニ
モ變方アリアノ通りニ修合スレバ吞モノ多シ其變方左ノ如シ

炙甘草 一分 人參 八厘 生地黃 八厘 酸棗 一分
阿膠炒ハ 麥門一分 韓五味子 三厘 桂枝 一分 大棗 一分
生薑 一分 葱白 三分 麻仁 一分 右十三味合メ一錢五分余

ナリ水三盞ヲ二盞ニ煎ズ本方ハ酒水ニテ煎スレハ一口モ吞サル
ナリ日本ハ限ラズ唐人モ吞ヌカシテ阿膠ヲ炒テ玉ニシテ石ノ如
キ變方近世製成セシナリ凡煎湯ノ氣味修合時意得アル

へし何ヲ云テモ茶ヲ吞サレ病ハ不治ナリ此煎湯ノ氣味ノコトハ
 後仲介カ傷風約言ニモイヘリ然レモ古今制セシ茶ヲヒキリサリヤク
 不ヘカラス○儲此方少陰ノ中風ニ用ルナリ其證唯寒ヲ畏レ
 厥冷セス自云ニ八腹滿ト他人コレヲ按テ濡ナリ大便秘シ小便
 數ニシテ吐セシト欲シテ吐セズ臥テ起ント欲シ恍惚トシテ恐ル
 コト多ク心中懸テ饑ルガ如シ稍食スルトモ八痞脹寧カラズ舌上
 灰黑或淡紫ニシテ青黄ヲ帶ヒ脉來ルコト弦細浮弱ナリ風
 ノ性ハ上行ス故ニ手足ノ太陰ニ似タリ實ニ少陰中風ノ證ニ用
 ニ尤辨別シ難シ此湯ニ再加乾姜下虛甚シク面戴陽ノモノハ

加葱白附子此證富貴奉養ノ人ニアルモノナリ予ニ二人モ見タリ
 他医壞證ノヤウニ意得テ療セシ中ニ不治トナレリ一人ハ此湯ヲ用
 テ調理數十日ニシテ治セシナリ亦有餘富貴奉養ノ人ナリ
 ○夾食ノ傷寒消道ヲ茶太過ニシテ自利厥逆痞滿者此湯主之
 ○虛勞ノ病ハシメ表邪アリ發散不足シテ咳嗽ヲ致ス医者誤テ陰
 虛肺熱トシテ清肺降火ヲ茶ヲ用ヒ胃ヲ傷リ咳シテ寒ヲ畏レ
 大劑桂枝人参湯ヲ置貼用ヒ下血シ或積沫ヲ下シ小腹微痛
 温按ヲ喜フ邪自下泄ルナリ小劑ノ理中湯ニテ和之七日不止モハ
 難治ナリ

白頭翁湯 厥陰者有純陰無陽之證有純陽無陰之證有陽進欲
愈之證有陰進不愈之證太率陽脈陽證當從三陽經治法陰脈
陰證合用少陰經治法厥陰見陽為易愈見陰為難愈其陰陽錯
雜不分者必先溫其裏後解其表設見咽不利欬唾膿血則溫
法不可用仍當先解其表矣大汗出欬不去內拘急四肢痛厥逆
惡寒吐利或利止亡血脈微等證純陰無陽也四逆湯先厥後發
熱厥深者熱亦深下利止反汗出咽中痛便膿血熱利下重者純
陽無陰也此湯主之

白頭翁 二兩 黃連 黃蘗 秦皮 各三兩

右以水七升煮取二升溫服。熱少厥微指頭寒者不欲食煩
躁數日或厥而嘔胸脇煩滿便膿血者此湯主之。此方本論二
精之說トイヘ其熱利下重者二用之ナリ金匱要畧早利ノ劑ト
ス今時痢疾ノ藥劑ニ用ベシ但シ陰虛ノ痢疾ハ切ニ攻積ノ藥ヲ戒ム○
凡痢下五色膿血稠粘滑泄無度發熱煩渴臍下急痛至夜轉劇
而惡食或下鮮血者便屬陰虛急宜救熱存陰為主此湯加甘草
阿膠或駐車丸阿膠丸歸連丸阿膠梅連丸千金黃連湯黃連可
膠湯等方可選用 右丸方見張氏醫通

當歸四逆湯 治手足厥寒脈細欲絕者若其人有大寒者當飯四

上編 卷六十五

逆加吳茱萸生姜湯

當歸^三 桂枝^三

芍藥^三

細辛^二

甘草^二

通草^二

大棗^{二十}

右以水八升煮取三升溫服。○夫手足厥寒

脈細欲絕者、陰寒之證、如トイヘ、是傳經ノ陽邪流レテ厥陰
營血ノ分ニ入ルナリ、其人素虛寒ス、故ニ陽邪トイヘ、
脈ヲ鼓動スルコトナレ、肌表ノ陽モ亦虛ス、故ニ桂枝湯ヲ以テ其中ヲ和シ、加當歸以テ厥陰肝經ノ營血
ヲ和ス、通草ヲ用ヒ太陽ノ本ハ膀胱ノ府小便ヲ通ス
ルナリ、細辛ヲ以テ少陽ノ原ヲ清スルナリ、畢竟厥陰證傳經熱邪其

人虚スル故發熱せず、反テ手足厥冷シテ陰寒ノ證ニ紛ルニ用ルノ劑也

元來陰寒ノ四逆ヲ治スル茶ニアラス、故手足厥寒ストイヘ、
乾姜附子ヲ用ス、故ニ本論ニ久寒アル者ハ當歸四逆加吳茱萸生姜湯ニ互シ

トイヘリ、久寒ハ素リ寒邪ヲ畜ノ證ニシテ、
乾姜茶ヲ用ル證ナリ、
トイヘ、此證傳經ノ熱證ナリ、故ニ乾姜附子ヲ不用シテ、
加吳茱萸生

姜如此名ルナリ、
厥陰證劇シキ下劑ニヨツテ下利腸鳴者、
此湯主之、
腸鳴ハ水飲停留スルナリ、
方中ノ通草水ヲ利スルナリ、
宿食アルニ

ヨツテ汗ヲ禁ズ、
キ證、
誤テ發汗レ吐血スルアリ、
炙甘草湯主之、
若

レ厥冷ヲ兼ル者、
此湯主之、
舌色紫燥者、
傳經熱證アリ、
此湯主

之。少陰經ノ證八九日ニ及ビ一身イッレニ盡ク熱シ九少陰ノ證ハ厥冷シ易ク
 熱ヲ得ルコト難シ八九日ニ及ビ多クハ厥寒ノ證ヲ見ス然ルニ此證一身
 尽ク熱スル者此臟ニ在ル邪氣腑ニ轉ズ是吉兆トス腎熱ヲ膀胱
 二移ストキハ膀胱熱ノタメニ迫ラレ小便血ヲ爲ス此湯ヲ以テ和之也
 〇厥陰經ノ證腹痛シツテ顛頂シツテ頭角ニ引痛三脈シツテ沉弦細手足厥冷
 者此湯主之。厥陰傳經ノ熱證舌卷囊縮者大抵下劑ヲ用ル也
 然ルニ脈實便秘者下劑ヲ用ルナリ若脈浮下利者此湯主之

吳茱萸湯 治乾嘔吐涎沫頭痛者

吳茱萸 一升 人參 三兩 生姜 六兩 大棗 十二枚

右以水七升煮取二升温服。此方傷寒用之有三證其一厥陰
 證乾嘔吐涎沫頭痛者用之是下焦濁陰ノ氣胸中カクニ上リ清陽ノ
 氣反テ下ニ在テ清陽ノ氣時々升ラント欲スレト濁氣ノタメニ抑ラレ
 升ルトトアタハス故ニ乾嘔涎沫ヲ吐スルナリ頭痛ハ厥陰ノ脈カク督脈
 ト顛ニ會ス此經ノ頭痛ナリ吳茱萸ハ專ラ胸中濁氣ノ逆ヲ開キ
 人參生姜大棗ハ胃中清陽ノ氣ヲ助ク厥陰ノ逆氣ヲ除クトキハ
 頭痛自愈ルナリ其二陽明ノ經證食穀ヲ嘔セテ欲スルモ此方
 主之是寒濁ノ氣胃ニ鬱スルユヘナリ其三少陰證吐利手足厥
 冷煩躁欲死者用之是腎肝ノ陰氣上逆シテ危候トス此湯寒濁

八逆氣ヲ下レ脾ヲ補フ右ノ三證各異ナリトイヘ凡皆此方ヲ用テ
治之其意ハ一ナリ

右古方三十三方傷寒論六經證治ノ大要ナリ此外ニ合病併病

結胸痞滿動悸怔忡厥過經不解差後諸復等ハ本論ヲ考究スレ

副方 古方後世方用ニ感冒時氣ニ日用切緊ノ方ヲ記ス

和解湯 是桂枝湯ノ變方ニシテ虛人ノ感冒初發ニ用ル茶ナリ

表氣ウスキモノニ見合ニ加減シテ四時通用スレ勞役ノ感冒

モ用テヨシ此茶海内ニ弘ル名古屋丹水翁ノ自製ナリ

人参 蘇證去之或以 桂枝 折各 芍薬 真七 半夏 粒五
弦沙參代之

茯苓 完七 乾姜 完干 甘草 少 蒼朮 唐嫌香者
和七分

右姜朮水煎○初感咳嗽加麻黄杏仁貝母倍乾姜桂枝○泄瀉

食味不寔加附子倍蒼朮茯苓乾姜○泄瀉數加澤瀉肉豆蔻砂

仁○頭痛甚加麻黄白芷○老人瘦實者頭痛加紫蘇薄荷○肥

人者只加麻黄○常用發表去人参茯苓○倍此茶ヲ用ルト頭痛

發熱下地ヨリ甚シキコトアリ二三貼モ用レハ明日却快ヨシ如斯

療ズルトキハ假令勞役夾陰ノ證トテモ格別ニ障ルコトナレ又風邪

後ノ咳嗽ヨリ勞咳ニナルコトナレ風寒ノ初發ニ用ル良劑ナリ

丹水翁醫方問餘ニ凡風寒ニ侵サレ陽氣不盛モ唯鬱蒙覺ニ發熱

頭痛清涕數出無食味亦甚スレモタ愛ヒ此時ニタリ必敗毒散ヲ蘇飲
 正氣散等ヲ用レ以テ彌氣ヲ耗レ陽ヲ散レ邪氣獨居ル此レ和解湯ヲ用ル
 トキハ天陽ニ發ス時ニ忽シテ頭痛發熱口乾コアリ是レ元氣邪氣ヲ攻テ衝上
 シテ胃腕ニ聚リ食味衰不進是佳兆ナリ防風羌活杏仁等ヲ疏散ノ
 類ヲ加ベ和解湯應使セズト云テ涼解ノ劑ヲ不可用今感冒虛人ナル
 者ハ補内溫表風寒ヲ去レ以テ安リ以テ疏散涼解スベカラズ是亦時世ノ不同
 耶抑季世稟賦異耶未可知也仲景設方皆溫表ノ劑ナリ感冒又
 傷寒ノ輕者ナリ何レ異方アラヤ夫風寒傷人ヤ陽氣虛スルニ因テ
 ナリ陽氣ハ何レ元氣ナリ元氣何レ處ニ在リヤ内ニ在ル命門心肺外ニ

テハ腠理也腠理即三焦是也故二人寒氣ニ傷ルハ上心肺ノ中ル
 トキハ咳嗽吐息煩ス下命門ニ包絡ニ中ルトキハ奔豚動悸並遺便ス三
 焦六腑ニ中ルトキハ泄瀉腹痛水腫脹滿等ノ證生ス是寒ニ腠理ニ中リ
 元氣虛弱ニシテ邪氣ト相擊ツ多ハサルトキハハ射未發熱セ身未疼
 痛セス食味亦未衰ナリ偶天陽發時ニ逢トキハ虛陽助ケテ得テ邪氣ト
 相搏ツテ身體強急頭項痛食味亦衰又此時ニ妄リニニ醫隨テ治之
 腠理ヲ疏泄スル防風羌活紫蘇薄荷等川芎白芷ノ類ヲ用レ以テ助ケテ得
 ノ陽氣ヲ彌ス虛又退ク故已上ノ諸證咸退ク病者モ醫者モ共ニ命ヲ守ル
 云テ復發スレハ復治シ以テ彌虛ヲ終ニ内ニ三焦ニ入テ水腫泄瀉刮腸等ノ

證生救レサルニ至ル故ニ能治者ハ病處ヲ不治ノ唯虚ヲ治ス其力足
 テ諸證自除經曰不能治其虚何問其餘ハ是ナリ此医方問餘ハ序
 ノ趣ニ丹水翁ノ陽氣ヲ大切トスル主意ナリ愚案スルニ此施治趣合
 時中人以上ト夕財主ナト心ヲ苦クカク形ハ勞セス酒肉淫事自由ナルモ
 ノ當分ニ感冒ト云ハ此意ヲ以テ施治スベシ農夫脚力ノ輩ハ涼解ノ
 劑敗毒散九味羌活湯ノ類ニテ即効アリ是先輩ノ所謂富貴貧賤
 病ヲ異ニスナリ薛巳ノ張子和ノ病者貴賤強弱ヲ以テ補泻ニ偏ナ
 ルヲ以テ考ベシ也
 神効沃雪湯 治傷寒感冒陰陽ニ證未辨時行疫癘惡氣相傳

蒼朮唐或和

乾姜

甘草各六兩

厚朴

眞防風

芍藥眞

葛根各四兩

加半夏亦好

右水煎。證治準繩ノ方ナリ感冒時疫辨シ難キトキニ咽渴
 クハ此湯ニヨロシ不渴ハ芍藥散ニヨロシ又人ニヨリ桂枝ノアワヲ証
 アリ此方ヲ用ベシ最初ニ云通り不換金カ此湯ヲ用ベシ不換金
 モ唐蒼朮青葉藿香ヲ用レバ發表ノ功速ナリ大抵ハ埋藿香若
 根蒼朮モヨシ紫蘇種葛根ヲ加ヘテ發表ノカイヨク速ナリ此沃雪
 湯ハ甚々吞心ヨキ煎湯ナリ

葛根湯

桂枝加葛根湯

産後

此二方發表甚速ナリ古方家専ラ用ルナリ然レモ是モ桂枝
アラス證ニ用ヒ難シ方ハ前ニ見ヘタリ

芪胡桂枝湯

本論曰傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩痛微嘔

心下支結外證未去者。太陽少陽併病主之

桂枝

黃芩

人參

芍藥

生姜

甘草 一兩

柴胡 四兩

半夏 二合

大棗 六枚

各一兩半

右九味以水七升煮取三升去滓温服。此方最初ニ述ルゴトク
甚ダ効アル方ナリ傷寒論中桂枝湯柴胡湯ノ用法多キヲ以テ
知ベシ前ニ精シク主治ヲ挙タリ。此方去桂枝加橘皮陶節庵

三合湯 通用

系柴胡湯ノ變方ナリ柴桂湯ヲ用タキ證ニ桂枝ノハ又昔用
テ且シ儲人參ハ古方家ニ限ラス皆吉野人參ヲ用ルナリ邪ヲ
補瀝セスンテコレ本論心下支結ト云ニ用ルニ堪タリ然レモ日數
ヲ歷テ草臥モアルニ此湯ヲ用ントナラハヤハリ韓參カ唐參
ヲ用ヘシ長沙ノ時代ニハ何レノ參ヲ用ヒ玉ヒシヤ此方當世用ヒ
覺レハヤハリ吉野參ナリ輕證ハ或去參或弦沙參ヲ用ベシ若シ
韓參ヲ以テ修合モ古方家ノ思慮ノ主治ト差ヘルコトモナルヤ乎
三合湯 太陽陽明少陽ノ三經ヲ兼治故各三合湯四時ノ傷寒
時疫通用ノ便方ナリ

三合湯

桂枝 芍藥 黃芩 葛根

三合湯 各一 柴胡 甘草 半錢 生姜 各一分 大枣 各二

右水煎之。分量隨宜增損之。或麻黃杏仁與桂枝芍藥同之。大抵一錢三分也。病劇者倍之。去麻黃名桂枝三合湯。有汗去麻黃。無汗加之。白胎或黃胎者。加石膏湯亦加。裏熱無惡寒去桂枝。麻黃葛根杏仁加石膏。知母半夏。裏熱虛弱者加人參。咳嗽去桂枝芍藥葛根杏仁加乾姜五味子半夏。此古或傳之。桂枝麻黃各半湯。葛根湯。小柴胡湯。三方相合。以出入加減。用之。究之。効入り時。疲外。ト世ス。此一方。三入。大便結者。矢

黄一味。凡トシ兼用。埒明ナル。施治ナレ。東武ノ時。醫傳ナリ。方組ヲ見ル。柴桂湯ニ葛根ナド加ヘタルモノ。テ何レ効アル。之ニ彼是諸方ニ未熟ノ輩ハ迷ク。ヨリ此一方ニテ大抵片付タルモノ。ナリ。然レモ如此手廻レ過レハ。妙茶医者ノマウニナルナリ。医ニ志アルモノ。意得ベシ時ニヨリ用捨アルベキナリ。効アル方ナルニヨツテ記之ナリ。芍藥散 此茶ハ感冒初起中人以下。用ヒ通便ノ良劑ナリ。參蘓飲香蘓散モ加味ニヨツテ通用スレ。此方ハ加減ナシニ感冒通。用ノ茶トスベシ。若シ食滯ナドヲ兼ハ消導ノ茶ヲ加ヘシ。第三頭痛ヲ目當トシテ用ベシ。皆此茶ノ重宝ナルハ感冒ノ初メ發熱強キ

八時疫ニ紛^ニルモチリソレニ大抵敗毒散用テ感冒^目テモ時疫^テモ
ヨイヤウニスレ^レ敗毒散元來時疫初發ノ其ホナリ感冒^目ニモ用レ^レ
感冒通用ノ其ホトハシテ^レス此ヤウナ時ニ其ホ^ナリ感冒^目ニモ用レ^レ
胡ヲ餘茶ニ倍シテ發表涼解ノ効參^參蘓飲香蘓散ヨリ強シ故ニ
感冒時疫疑似ノ間ニ必用ル茶ナリ其時ハ黄芩ヲ一味加味スル^テ
モアルベシ^レ熱ノ輕重ニヨルベシ

蘓葉 柴胡各ニ 川芎 葛根 枳殼
桔梗 橘皮 半夏 茯苓各一 甘草七分
右生姜大棗入水煎^煎熱服覆取微汗^汗○此方ハ感冒風^風ニ傷^傷レ^レ

モ寒ニ傷^傷レ^レタモ治スル^ルナリ^ニ惡寒發熱ニツナカラ^ラ一度ニアルコトモアリ或^或
惡寒バガリアルコトモアリ發熱ハカリアルコトモアリ或^或忽^忽惡寒^寒ニツテ^テ脈
忽^忽發熱^熱シタリ指引アルコトモアリ大抵惡寒發熱一度ニアツテ^テ脈
モ浮^浮テ洪^洪カアリ數^數モアルモノナリ若シ惡寒バカリアツテ^テ發熱^熱
々脈モ并ホ上^上浮モセスホトニ數^數モナクハ寒邪ニ中^中リタル感冒ナリ
若シ發熱ハカサアツテ惡寒ナク脈浮^浮テ數^數ガアラハ風ニ中^中リタル
感冒ナリ若シ惡寒シタリ發熱シタリ互ニ指引アルハ半表半裏
ノ意氣カタナル感冒ナリ○頭痛ノアルコトモアリナキコトモ
アル大形ハアルモノナリ最初傷寒ニ云ク額ガ痛ハ陽明經ノ

頭痛ナリ頭^{カウ}ノ真^{ニシナカ}中カラ後^{ウレロ}ノカタムケテ痛ハ太陽經ノ頭痛ナリ
耳ノ前後ノワキノカタガ痛ハ少陽經ノ頭痛ナリ。感冒鼻^{フセリ}塞
鼻ノツルハ大形風ニ傷ラレ熱ニ属スルナリ又寒邪ニ傷レテツルコト
モアリツレハ脉デ見分ヘシ大抵冬ノサムキ時節ハ寒ニ傷ルガ多
ヒモノ春暖^{ダシキ}氣ナ時ハ風^{ボラ}ニ傷ルガ多イモノ夏ヤ秋ノ残暑^{サン}ノアルトキ
ハ寢^{ナド}冷^ヘデ寒ニ傷ルモ多イモノ九月ハドチラモアルモノナリ。
鼻流清涕鼻水ノダラク出ルハキハメテ寒ニ傷レタト知シ又感冒
ノ鼻^{ハチイキ}ツソリタルガ解^ゲセントテ鼻水ガ出ルコトモアリ。鼻息熱
鼻臭^{ハチイキ}ツキハキハメテ風ニ傷レテ熱ノカタト知ヘシ口中ノ息

今ツキモ同前ナリ寒ニ傷レテモ風ニ傷レテモ顔ヤ鼻ノアタリカム
レツレト氣味アレキモノナリ。咳嗽^{カイソウ}咳^{ヒキ}出ルハ風デモ寒デモアル
モ脉ト外ノ證ニテ見分ケヨ。項強^{コウナウ}ハボンノクボカコワリタリ肩ノ
ニワリカスクミタリスルハ是モ風デモ寒デモアルモノ其中ニ寒ノ方
ガ多イモノナリ。身痛腰疼身イタニ又腰ノ痛ハ寒ニ傷ラタル
ナリ風ニ傷レタモノデハナイ然レモ風ニ濕ヲ兼テ風濕ニテ痛ム
コトアリ風濕ハ汗ガアル寒湿ハ汗ガナレ風濕ハ脉カ浮ナリ寒
湿ハ脉ガ沉ナリ身ノ痛ハ大形湿ト意得ヨ若シ冬月其邪バ
カリテ身ノ痛ハ餘程^{ホト}ツヨキ感冒ナリ傷寒ト云テモツルレカ

醫方類聚 卷之七十四

二方。○無汗有汗汗ノ無キハ寒邪汗ノ有ルハ風邪コレ肝心ノ目當リテ
 リ右感冒ノ證大要斯ノ如シ治方ハ大抵昔ノ蘇散ガヨレシ。○惡寒
 發熱トモヨリ或寒熱往來アルモ本方ヲ用テ皆ヨレシ。○惡寒ハカリ
 アリテ發熱ノ無キニモ本方テヨレシ若シ惡寒コト外ニ甚シクハ桂
 枝生姜ヲ五片モ七片モ入サセヨ。○發熱ハカリアリテ惡寒ノ
 無キニモ本方テヨレシ若シ發熱ガコト外甚シクハ加黃芩ソソレテモ
 軟モサノス口渴キ咽乾キ湯茶ヲ好ムナラバ春夏秋ハ温病時疫
 三ハナイカト氣ヲツクベシ冬ナラバ時疫ノ氣ツカヒナヒ程ニ
 カコト 軟ガツヨク咽ノ渴キガツヨク凡加黃芩倍昔白根大形ニ

三日ノ中ニサレルモノチリ春夏秋サウニアルナラハ温病時疫テハナイカ
 氣ヲツクテ丸味羌活湯ヲ用ヨノレテモ軟ガサズハ温病カ時疫カ暑
 氣少時分ハ暑邪^{キワニ}究ルホドニ時疫門マ暑門ヲ見テ療治スベシ。○頭痛
 ニ本方テヨレシ本方テ止ミカヌラハ陽明經ノ頭痛ニ加細辛白芷
 陽經ノ頭痛ニ加藁朮蔓荆子少陽經ノ頭痛ニ本方テヨレシ。○鼻塞
 タルニ本方テヨレシ。○鼻水流ルニハ桂枝乾姜。○鼻ノ息熱スルニ本
 方テヨレシ。○無汗ニ本方テヨレシ本方テ効ナクハ軟キ粥ニテモ喰セ本
 方ヲセリツケテ用テ衣服ヲ厚ク覆テ汗ヲサスベシ。○汗ガアリ過ル
 ナラバ桂枝芍薬。○項強肩ニハリガスクムヤウナラハ本方テヨレ

紫 前 核 原 花 生
梅 為 牛 耳 毒

甚シク冬ハ加麻黃春夏秋加羌活防風の腰カ痛ナズ加獨活身
モ痛ニ腰モ痛ニ加羌活獨活の咳嗽ニ加前胡ソレテイヨク咳嗽カ
甚ク參蘇飲ニ加蘇白皮杏仁或加麻黃杏仁若シ脉ガ沉遲ナズハ
小青龍湯ヲ用ベシ感冒咳嗽ハ外ノコトハ愈テモ咳嗽ハアトデモ
殘ルモノナリヨク療治スベシ又持病ニ痰ノアルモノハ感冒後ニ痰ヲ
引出シ痰咳スルコトアリ是ニハ痰閉ヲ見テ痰ノ藥ヲ用ルコトアリ
此ニテ感冒一通リハ濟ナリサレ兼ルコト、紛ルコト、虛弱ナ人デ
違ヒカアリ其療治ノ仕方ハ前ニ段々述ル如シ
右傷寒感冒治方古方後世方甚増テ記メ未熟ノ輩手引スル也

大頭温病

此モ時疫ノ類ニテ平常澤山ニアル病ナリ頭ノ腫レル病ナリ風熱
風湿ナリ輕キハ大抵ニ腫レルモノ重キハ赤色ニ大キニ腫レルモノ先ツ頰
ヲ腫レルガアリソレカラ段々ニ腫カ増シテタル片頰、腫ルモアリ
俗ニ江戸挾管ト云本名蝦蟆瘟ト云頭カラ腫レルアリ此ハ大頭病ナ
リ耳ノ後カラ腫レルアリ頰カラ腫ルト頭カラ腫ルニハ參連消毒飲
カヨシ耳ノ邊カラ腫ルニハ小茈胡湯加羌活防風薄荷荆芥ニタ
輕キハ荆防敗毒散カヨシ大形頭痛ガ強キモノナリ右ノ劑ニテコレ
咽ノ痛ニラ兼ルモノナリ右ノ藥方ニ倍桔梗加牛房子玄參類

小紫胡湯
紫胡
黃芩
人參
車
干薑
錢東

八解散
人多
年夏
月竹
香
白木
茯苓
厚朴
及

○此證八脈が浮大ナルモノチリ然ルニ脈が沉遲ナラハ病上及スルホニ早速
ハ愈^{テオラ}又モノト病人へ先へ云キカセテソロクト療治スへハ解散加羌
活防風柴胡薄荷荆芥此大抵ノ療治ナリ或回春咽喉門ニアル清上
養中湯ヲ用へレ若モ虚寒ノ證ニテ脈が沉微虚細ナラハ桂枝湯
加羌活防風ノ類ゴトアリ若又勞役虚證ノモノコレヲ病テ脈モ浮
虚ナラハ補中益氣湯加羌活防風荆芥薄荷ノ類或此證ニ蘭室
秘藏ノ調中益氣湯ヲ用ルコトアリ勞役ノ者尤ヨロシ本方ニ去
白木當飯加蒼朮酒黃蘗ナリ脾胃論ノ調中益氣湯ニ去白木當歸
加蒼朮木香ナリニ方トモニ東垣ノ方ニレテ補中益氣湯ノ原方ナリ

此黃蘗ト木香トニ味違ヒノ意ヲ考ヘシ
其連消毒飲

- 柴胡
- 甘草
- 桔梗
- 川芎
- 黃芩
- 荆芥
- 黃連
- 防風
- 羌活
- 枳殼
- 連翹
- 射干

右姜煎入牛房子一撮再煎一沸槌法入竹瀝姜汁一方有白芷
○或加大黃利去一二次後依本方去大黃加入參當飯調理ス
清上養中湯 治咽喉腫痛或頰腫等證屬表虛弱者

- 甘草
- 桔梗
- 各二
- 玄參
- 當飯
- 黃芩
- 各一
- 陳皮
- 白木
- 茯苓
- 麥門
- 連翹
- 各八
- 人參
- 防風
- 金銀
- 各五

醫藥手引草

七編 冬温

七十七

右水煎○痰加貝母

冬温

此八歳ニヨリテ冬殊外アタカナルコトアリ是不正ノ氣ナリ此氣
 ニ中^{アテ}之^テ初ハ少シ寒ケアリテ後ハ熱ハカリニテ汗ガ出^セ勿^レ論
 咳^{セキ}モ頭痛モアルモチリ大抵感冒ト同レヤウニテ目當^ハ咽ガ強
 ク痛ミヤガテ腹ガ下ルモノナリ此ニ感冒ノ療治ヲスルトイカ
 フ六^ツ敷ナルモチリ大抵ノ冬ニハナキコトナリモヌケテアタ
 カナル冬感冒ヲ見ルナラハ冬温テハナキカト氣ヲツクベシ
 若シ右ノ目當アラハ陽旦湯加^ハ萎蕤桔梗用ベシ萎蕤ハ^ハ茶肆

テ黄精ト云ガ萎蕤ノコトナリ或ハ萎蕤湯主之
 陽旦湯 治冬温發熱咽痛或自利而效者

桂枝湯

於本方内 加黄芩 三兩

萎蕤湯 治風湿效嗽及冬温發熱頭眩舌強

萎蕤 一錢五分

石膏 二錢

白薇

麻黄

川芎

葛根

羌活

甘草

杏仁

清木香 各三錢

右十味水煎

温病

温病ト云ハ冬ノ内寒邪ヲ腎經ニ受テツレガ即時ニ發せず内ニコ

モリ居テ彼岸スギノ頃發ノ來ル此ハ傷寒感冒トハ違ヒ寒ケナレ初
 發ヨリ熱ツヨク大分ニ咽ガ渴クモノナリコノガ傷寒トハ違ニテ外ハ
 同シヤウニ病モナリ傷寒感冒ハ外カラ内へ入ル病ナリ温病ハ内
 カラ外へ出ル病ナリソレユへ療治ハ大ニ違ナリ仲景ノ黄芩湯主之
 コトノ外輕キハ敗毒散モヨシ九味羌活湯モヨシ諸オリクニ組合
 テ外風寒ヲ受テ内外一度ニ病コトガアルナリコレニハ惡寒モアルモ
 ノナリ但シ傷寒トハ違ハ初カラムシヤウニ渴キカツヨイナリ此ヲ風温
 トモ云傷寒論ニハ温病ヲ仕損レテ汗ヲ發スレバ風温ニナルト云ヘリサ
 レレソレバカリニカキラズ外風寒ニ中リレ時ヨリレテ内ニアル温病ヲ

引出レ内外一度ニ病ヲ風温ト云ハ柴胡湯ヲ主方トシテ太陽經ノ證
 カ多クハ加羌活防風陽明經ニハ加升麻葛根少陽經ニハ本方ヲ用ベシ
 三陽トモニ見ヘハ右ノ加味ヌノコサス加ヘシ諸重裏熱カ強クハ涼膈散
 承氣湯雙解散白虎湯トヲ用ルコトカアリ
 ○諸斯アレレ温病ト云モノハ今世ニナキモノナリクレテ見タコトモ
 療治シタコトモナレ右ノ某方皆古書ニアル通りヲ記スモノナリ
 此邦ハカリテモナレ唐ニモナイト程應邦ガ後條辨ニ云テアルサレ
 氏ドフシテナイト云訣ハナシ其ナイト云訣ハナセナレハ古ノ人ハ皮膚
 カ厚ク冬病ヲ受テ其時ニ不登春ニテ持越タモノカアルユヘナリ今

世ノ人ハ体カ弱キホドニ冬寒ニ中ルト其ノ病ヲ春ニテ持越コトナラズ
 此理ニテ今ハ分レサレ凡百人ニ一人モアルニシキコトニテナレ兼テ意得ヘ
 シ此ニ似タル病ヤウハアルサレ凡冬カエ持越タル病ニテハタテ春ノ温
 氣ニ中リテ病ナリ敗毒散九味羌活湯并麻葛根湯表皆冬ノ内腎經
 ニ中ルト云冬ノ内ニ淫事ヲ犯シ陰虛スルニヨル邪氣虛ニ乘リ陰分
 ニ病カコモルサレ凡陽氣ハ強キホトニ春ニテリ陽氣ト邪氣ト戰フテ
 温病ニナルト見ヘタリ今人ニ是ニ似タル證アリ冬陰分ニ寒邪ヲ
 少シ受テ邪少キ故ニ春ニテ持越コトガアルサレ凡元來陽氣トモ
 ニ弱ケレバ邪氣トハリ合コトモナラス春ノ温ナル天ノ陽氣ト内ニ合

タル少シノ邪氣ト戰テトコトモナウ氣色アレク少シ熱モアリ少シカ
 ワキモアリ食モ少シ喰ニクフテ草臥タルマウニテブラク氣色アレシ此
 ヲ常抵ノ風引タルト意得テ不換金ヤ藿香正氣散參蘇飲敗毒散ノ
 類ヲ用レバ一應愈ルモアリ此レハ病ノ愈リタルテナクシテ天ノ陽氣ヲ
 カリテ我身ノ陽氣ノ少シ邪氣ト張合タル陽氣ヲ擊テユニ病ハナオ
 サテ味方ヲ擊ツレユ味方ノ張合モノカナキホトニ二兩日モ三三日モヨ
 キコトアリソウシテハ又温ナルニツイテハ亦發スル亦風ヲ引復レタル
 ハトテ右ノ藥ヲ用ルホドニ愈スタヒニアシクナリテ遂ニ勞咳ニナ
 ルモノナリ今ニテ勞咳ト云モノ十人ニ五六人ニテ皆此證ナリソレテ

温蒸ヲモレ元來ハ寒邪ナレ今ハ凌シテ熱ニテハ温蒸用ヒ難シ用
 レハ必アタルシナラハ寒涼ノ藥ヲ用ヒニカトイハ元來カ寒邪ナレハ冬
 本復スルヤウニテ果ニハ死スレデ何トモ仕様ノナキ病ナリ初發ノ時ニ
 和解湯ヲモ用レハ早速快氣スル初發テ仕損ジテ勞證ニテハ扁鵲
 モ愈スコトナラヌソレデモ見殺ニハアラスホトニ中ルニモカニナク麻
 黄附子細辛湯麻黄附子甘草湯ヲモリテ十人三人ハ生ルコトモアルモノ
 ナリ是古ナクテ今アル病ナリ温病ハ古アツテ今ナキ病ナリ
 黄芩湯

黄芩 二兩
 甘草 二兩
 芍薬 二兩
 大棗 十二枚

右水煎嘔者加半夏半升生姜三兩

麻黄附子細辛湯

麻黄附子甘草湯

二方見傷寒

○或此勞咳ニ古方家ニテ小青加石湯麥門加石湯ヲ專投ジ痰血
 ナドアルニ生地黄ナドヲ加ルナリ然レモ多クハ難治ナリ其効驗アル
 モノハ右件ニ云所ノ風邪ヨリ來ル勞咳ニアラス肺熱ノ咳嗽アルハ火
 逆上シテ口乾キ大便結燥スルモノニ効アリ又勞嗽ニ人參養營湯
 加阿膠愈ルハ虚勞嗽ニテ滋補ノ薬アルハ人參著ノ類相應スルモノ
 ナリ勞咳ニハ補劑一向不相應ナルモノナリ冬治サド却テアタル
 ナリ亦冬治ニテ効アル勞ハ右件ノ風邪ヨリ來ル勞咳ニテハナシ

多ク積塊ヲ兼タルモノナリ傳尸勞瘵ハ至テ治シ難シ初發ノ内ニ
 懶肝丸ヲ用ヒテ崔氏ガ四華ノ穴ヲ隨分灼艾スベシ灸ノ跡カハイテ
 少シモイボウ気味ナク黒蓋才チルハ多ク難治ナリ數万ノ灸ニテ
 少タイボイカレバ快復スルコトモアルナリ積氣鬱ヲ兼テ勞瘵
 ニ紛ルニ後藤流ノ二行通ノ灸法大イニ効アリ然ルニ灸治ノ相
 應スル者ハ燥熱ノ気味火シ血虚勞ノ乾キアルモノニ灸スレバ
 チチ障ルモノナリ尚虚勞門ト参考スベシ

溫疫

溫病ノ上ニ時疫ヲサシアハセテ病ヲ溫疫ト云然レ氏今ハ溫病ハ

ナキホトニ溫疫ト云モナキハツナリ若レアルトキハ熱証ヲソロヘテ
 病ベシ茶ハ涼膈散黃連解毒湯雙解散類ナリ

溫毒

此ハ冬ノ中不正ノ溫氣ニ中リソレヲ持越テ春ニイタリ又溫氣
 ニ感シ發斑大熱ノ證ナリ然レ氏兎角冬カラ春へ持越ス病ハナシ
 サレ氏冬ノ中冬溫ノ療治ヲ仕損シテ發斑イツルコトアリ此ハナル
 ホトアルコトナリ何ニモセヨ熱證ヲソロヘタテ、其上ニ發斑ガ出
 ル茶ハ皆寒劑ヲ用ベシ又陰證ノ發斑アリ此ハ理中湯類甚
 シケレハ四逆湯モ用ルナリ陽證ノ發斑ト治方大キニ違フナリ

陽毒升麻

人參

升麻

射干

黃芩

斗

名

審ニ考ベシ

陽毒

此ハ前 温毒ノ療治ヲ仕損シテ陽毒ニナル頭痛大熱大渴悶乱
發狂咽痛吐膿血オソロシキ熱證ヲソロヘタテ、病ムナリ温毒ノ療
治ノ仕損バカリニカキラス天ノ毒氣ニアテラレテ自然ニナルコト
ナリ茶ハ白虎湯ノ類ノ大寒茶ヲ用ベシ仲景ハ此證ニ陽毒升麻
湯ヲ用ヒラシタルナリ金匱要畧ニ詳ナリ

陰毒

此モ陽毒ト同シク大熱證ナリニ陽經ニ中ルヲ陽毒トイヒニ陰經

ニ中ルヲ陰毒ト云同シ熱證ナレバ陽毒ハ劇シク病ム陰毒ハ杖ニテ打ル、
如シトアレバ草臥ナリニ病ムサレバ熱證ナレバ茶ハ陽毒ト同シク陽毒升
麻湯ニ加減シテ用ヒラシタリ後世ニテ云陰毒ハ大寒證ヲ云仲景ノイハレ
シ陰毒トハ違フナリ後世ニテイヒシ陰毒ハ直入ノ陰證ノ傷寒也中寒
ノカウシタルモノナリアリ虚寒甚タ陽ヲ拒ムニ内ハ寒ニテウツラハ
大熱證ノ如ク無上ニ湯水ヲ好ム湯水ヲ擬ヘバ飲コトナラス熱ヲ苦ニテ
井ノ中ハハシラントロニハイヘバソウイヒナガラ衣服ヲ取レハ吾シラス引覆ル
ヤウニスル茶ハ薑附湯。四逆湯。附子理中湯ノ類ナリ

中寒

中寒ハ下地脾腎虛寒スルモク寒邪ニ中リテ手足冷面青ク息ツメタク
 脈沉微大寒ノ證ナリ棊ハ乾姜附子カ主方ナリ大急證ナルホトニ外
 ノ棊ハ屈ヌコトカアル乾姜附子ノ二味ヲ姜附湯ト云コレニ人參白朮ヲ
 加レバ附子理中湯ナリ大方ハ附子理中湯ニテヨケレ庄時ニヨツテ人參白
 朮トモニ邪魔ニナルコトカアルナリ殊外元氣草臥テ見ユラハ人參ニ
 テハ加ベシカヤウノ處見合ナリ少シ陽氣復シタスハ附子理中湯モヨシ或
 肉桂ヲモ加ヘシイヨク陽氣復共附子理中湯ニ肉桂當飯ト加ヘシ○サ
 テ姜附湯デモ屈スハ丹田ニ灸ラスベシ三百壯ニテハスベシ三百壯テ姜
 カスハ死證ナリ方書ニ中寒ニ五積散トツケテアルハ眞ノ中寒ト云モ

ノテナレ内々冷タルト云ニテコトナリ此中寒ト云ハ傷寒ノ直ニ少陰經ヲ
 傷ル直入傷寒ト同ジモニテ療治モツコトナリソレニテセニ中寒ト
 云ナレバ傷寒ハ冬ガリアルモノ中寒ハ夏ニテモ大分ニ水ヲ吞ニ或瓜西
 瓜ノ類ニアテラレ下地虛寒ノモノハ此證ヲ病ハ春秋トテモ大キニ冷トア
 ルモノナリソレデ別ニ中寒ノ病門ヲ立ツ仲景ノ書ニ中寒ト云病門ハ
 ナレ仲景以後ニ立タル病門ナリ○此證ニ附子理中湯類ヲ用ルニ
 棊ヲ受カ子テ吐スルコトアリ其時ハ生姜ヲオロシ舌ニベツタリト塗リ
 其上ニ棊ヲ吞スレハ生姜ノ辛味ニギレテ棊ヲカハサヌモノナリ如
 此療治レテ脈モナリ手足モ温ニ出ルナラハ温補ノ棊ヲ見計ニ用

疝氣加
 木香
 茴香
 青皮
 積ノ一味
 殺ノ味
 青皮
 香附子

テクロク療治スベシ右急證ナリ油断スヘカラス茶ノ貼ノ大小人參ノ多少
 小時ノ見計ナリ。此證ト食厥ノ證カギル、食傷門ヲ見ヘシ食物
 ラ穿議シテ傷食ナラハ食傷ノ療治ヲスヘシ。此證ニ持病ノ疝氣
 ヤ痞積カツイテ出ルコトアリサレモコレニカニハス先、中寒ノ療治ヲ
 スヘシ姜附湯附子理中湯暹湯ナトヲ用テ後疝氣ニテモ積ニテモ温
 補ノ茶ニ其加味ヲスベシ附子理中四逆ニ疝氣ナラハ木香茴香青皮
 ノ類ヲ加ベシ積ナラハ莪朮青皮香附ノ類ヲ加ベシ

傷風

傷風トテ仲景以後ニ病門ヲ外ニ立ツ能々見レハ少シハ訣モアレモ

ドフ見テモツル處ハ感冒上ツコトナリ是等分ニ枝ノ咲キスキ
 タルコトナリ

濕温

此病下地ニ濕ヲ受テ其上ニ暑ニ感ズル然レバ暑濕ト云マウ
 ルモノナレモ濕温ハ濕痺ノ持病アルナリ痺ハ痛ムコトニテ其上暑
 ニ傷ラレテ頭痛發熱シテ胸ノ股ヨリ足ヘムケテ冷ルナリ是ヲ寒
 濕ニ意得テ温茶ヲ用ベカラス蒼朮白虎湯主之若、腹脹小便不
 利ハ五苓散加茵陳カウシタルハ中寒ニ紛ル、然レモ中寒ハ手足
 冷ル濕温ハ肘ノ手ノト云ハ別ノコトナレニ第一ニ股力冷ルナリサテ

傷風 濕温 八十五

敗毒散 茯苓 薑 橘 柴 桑 穀

傷風濕温

傷風濕温

車

中寒ノ目當ハ小便カ清白ナリ小便カ清白ナラハ寒證ト意得ヘシ
時行

時疫ハ天地不正ノ疫氣口鼻ヨリ入テ募原ト云所ニツク是レハ背
中ノ表ト裏ト間ナレ先ヅハ裏ヘ近キ所ノ胃ノ府ノ近キ所ナリ
素問 瘧論ニ横サニ募原ニ附ト云モノ是ナリ傷寒ハ表ヨリ
裏ニ入り温病熱病ハ裏カラ表ヘ發スル是ハ左モナクテ只口鼻ヨリ
募原ニ至齒季トニアレ冬ハ天地ノ氣サユルニ不正ノ疫氣ヲ吹拂テ
ナキモノナリ大方春ノ末ヨリ秋ノ初濕熱ノ盛ニ行ル時分エア
リ其病ニツク頭痛發熱惡寒傷寒ト同レヤナルモノナレト

十神湯

川 升 陳 紫
芍 香 耳
藥 方 耳

寒ケモ凜マト各別ハケシク熱モ表裏ウチヌイテイラト各別ハケシキ
モノナリ頭痛モ刻ルマウニ痛ムモノナリ假令頭痛惡寒發熱輕キトテ
モ傷寒トハ違ヒトコヤラ氣味ワロスサレシム大抵輕キハ敗毒散主之
若シ汗ナクテ無上ニ身ヲ悶ルニハ六神通解散頭痛破ルガ如キニハ
十神湯此ニ方ニテ療治スベシサレト是ハ輕キ時疫ニテ舌ノ色ノ別ハ
フトナキモノニハ是ニテモヨシ舌ノ色変ズルニ至リテハカマウノ療治ニテハ
ユカヌモノナリ舌ノ色真白ニ米ノ粉ヲフリカケタルマウナルハ敗毒散類
ニテハ効ナレ敗毒散ナドニテ効アルハ口鼻ヨリ疫氣ヲ引込トイヘ氏首等
ハバリツキハ世ヌアリ募原ニ付テカラ有無ニ募原ヲ放ス療治ヲせ子

傷風濕温

傷風濕温

八十六

バナラヌナリ募原ヲ放レヌ中ハ假令大勢ノ證ニイカホト大寒茶ヲ用
テモ餘所ノ事ヲスルヤウシテ微塵モキクモノニテナレ又一身冷キリタル證
大勢茶ヲ用テモ餘所ノコトヲ少シモアタニルモノニテテレ發散スル表
ニナレ下サントレテモ裏ニアラス只募原ヲ放レバ其後フルヒカ來テ入
イニ汗出身涼シクナリ愈ル其募原ヲ放ス茶秘傳ナリ

達原飲 時疫初起通用

栝柳 二錢 唐厚朴 一錢 草菓 五分 知母 一錢

真芍藥 一錢 唐黃芩 一錢 甘草 五分

右用水ニ鍾煎ハ分温服○若シ太陽經ノ證專ラナラバ加羌活

陽明經ノ證ニ加葛根少陽經ノ證ニ加柴胡三經並見ハ三味トモニ加
レレサテ時疫ノ脈ハ浮ナラス沉ナラス只數ナルモノナリ

達原飲ヲ用ヒテ後脈が浮大ニナリ大イニ咽ガ渴キ汗出バ邪氣カ
募原ヲ放レナリ是ニテハ白虎湯ヲ用ベレサテ募原ヲ放レギハニ

汗出テ愈ハセズ反テ裏へ入ル此時ハ下サ子バナラヌサレハ舌色黄
ニテラ又サキニハムサト下スバカラス大便モ不通下スヘキ證備リテ舌色

モ一ダ白キナラバ此湯ニ大黃ヲ加ヘシ或此湯ニ加大黃葛根羌活柴胡
各三消飲是レ内消外消不内不外ヲ消スル劑ユ一三消飲ト名クル

ナリ是レ疫ヲ治スルノ全劑ニシテ毒邪表裏ノ分募原ニ傳ヘ尚餘

内消外消
不内不外
消スル

三消飲

大黃

葛根

羌活

柴胡

大柴胡湯
柴胡 芍薬
芍薬 大黃

結アルモノ宜シサテ舌ノ色黄ナラバ疑モナク下スベシサレモ先小
承氣湯類ヲ用ベシ表證ガ残りテアラバ大柴胡湯ヲ用ベシ熱
ガ強クハ涼膈散ソノ外三一承氣湯見合ニ用ベシ舌ノ色黒シナラバ
急ニ下サ子バナラス見合ナシニ大承氣湯ヲ用ベシ傷寒ト違ヒ大便
人下ルモ舌ノ色黄ナルガ黒キナラバカヒナレニ下シ茶ヲ用ベシ若
シ黄疸ノ如ク身モ目モ黄ニテラバ茵陳蒿湯ヲ用ベシ又發斑ノ
出ハ大方ハ吉事ナリ發斑カ出ルハ人參白虎湯此外イロクノ指
引ハアレモソレハ悉クハ記シ難シル時疫ニ補茶ヲ用ルコトハ
ナキコトナリ補茶ヲ用テ愈ル時疫ハ元來時疫ニテナレ外ノ勞

役ノ傷寒カ中暑病ガは損シテ時疫ノマウニ大切ニナルツレニ大補
ノ蒸ヲ用テ効アレバ時疫ガ補茶デナヨルト意得ル大キナル違
ナリ本方ノ時疫ト云モノハ先ツハ少キモノナリ

○時疫活套 時疫ハ春夏秋ノ三時行ルモノ別シテ夏秋ニ

多キモノナリ其病体ハ感冒ト大抵類シテ紛レヤスキモチリ初
發ハ感冒ノ如クニ病テ發ツヨキモアリ發ノスクナキモアリ感冒
トノカワリハ病ノカツカウヨリハイカウ氣色ガアレキモノナリ
病ヨリハトコマラ顔色ガムツカシソフニ氣カ爽カニテフテ恍惚ト
脈モサノニ劇シクモナイ又或初發ヨリ寒クモ發ケモ各別甚シ

醫書手引 上編 八十八

九味羌活湯

羌活

蒼朮

芎藭

茯苓

白朮

生薑

細辛

甘草

羌活

蒼朮

桃仁

雙解散
辣桂
大黃
澤瀉
亭午

醫方類聚

卷

章

少頭痛モ強ク感冒ト同ジ病ヤウナレニ劇シク或譫言ナド云モアリ
世間ニ流行ル時モアリ世間ニハヤライデモ一人カ二人デモ病トキモテ
リ初發ハ敗毒散ナリ或九味羌活湯加柴胡用ベレ又重クナリ
テハ勞役ノ感冒目ニ紛ルホトニ能々其見分ラズベシ
○又初發敗毒散ヲ用テ一旦發散シテモ熱モサメヌ熱ガ次第ニ
裏ヘ入テ口渴咽乾舌胎謔言ナドアラハ九味羌活湯加石膏知
母用ベレ小便赤澁ラハ四苓散ヲ合スベシ。右ノ證其人實證
ナルニハ雙解散去大黃甚硝用ベレ舌ナドモ黃ニナリ或黒クナ
リタルニモヨレ即雙解散ニ滑石ヲ減ズバ防風通聖散ナリ。右雙

解散ヲ用テ熱モサメ舌ノ色モナラリ渴ナドモ止ムラハ雙解散ニ甚硝
大黃石膏荆芥麻黃少五味ヲ去リ用ベシ五味ヲ去ハ平和ノ薬ナルナ
リ。○大抵重キ時疫ニモ雙解散ニテ能モノナリ唯此證ニ仕損ア
ルハ勞役ノ感冒ト紛レヤスキモチリ此ガ專一ノ目利ナルホトニ隨分油斷
スヘカヲ先少勞役ノ感冒ト温疫トハ病ツキノ初發カ違モノナリ勞役ノ感
冒ハ初發カラ劇シキコトハナシ温疫ハ初發カラ劇シキモノナリコレモ
輕キ證ハソレ程ニ劇シクモナケレドトコマラカ劇シキ軀ガアルツレテ初發
ノ病ツキノ容軀ヤミヤウ次第サテ前医ノ見タテ又只今ニテ用ヒ来リニ薬
次第ヲ問テ考ヘシ大抵時疫ニ分リ感冒ノ脉ト大違ハナキモノナリ

醫方類聚

上編

卷八十九

勞役ノ感冒ト時疫ノ脈ガ各別違フタモナレ此亦療治ニ任損ハ脈カ
 變レテキテ勞役ノ感冒ヤラ時疫ヤラ紛レテクルサレ能ク診テ見ル脈
 ニ底力カアルトイフカアル勞役ノ感冒ハ底力カナレ其外舌モ黒ク乾キ
 謔言モイフ似タモノナリ温疫ノ脈ハ底力アリテ物体熱モ臭ク病マツカ劇
 シキ氣味アリ勞役ノ證ハ熱ガ何程アリテモ臭キ氣味ハナレ其外虛寒
 伺ヒヤラ隨分審ニ考ヘシ是レ補瀉ノ某ノ分ルハ大切場ナリ感冒門モ
 云テアリ互ニ相參考ベシ

○勞役ノ上三時疫ニ感シタルハ中テモ見ニクイモノナリ初カラ草卧アリテ
 脈モ弱クサテ病證ハ舌焦レ大便モ結レ謔言モイフ是ガ勞役ノ感冒ヤ

ラ勞役ノ時疫ヤラ知レ又是ガ見訣ニクハ先ツ補中益氣湯ニ麥門五味子ナドヲ
 加テ二三貼用テ見ヨ勞役ノ感冒トハ驗ガアル勞役ノ時疫ナレハ某ガ相應
 セヌモノナリソレナズ人ノ中黄丸ヲ小料ノ獨參湯カ或生脈散カ或四君子湯ナド
 ヲ見合ニ吞汁ニシテ用ベシ人中黄丸ハ丹溪ノ方ニテ至極時疫ニ妙方ナリ勞役
 ノ時疫モ形體ヲ勞役シテ時疫ニ感シタルハ治方ハ右通りニテ効アリ又心氣
 ヲ勞シ或氣ヲウチ或公事ナドニテ謀慮多ク怒或腎虛モ兼タル上ニ時疫
 ニ感シタルハ多ク難治也脈初発ヨリ細數或沉瀯等ノカサヒクニ小刻ニシ
 テ陰脈ヲアラハス病ニヤウハ汗モナク惡寒モナク惡熱或靜ニ謔言レ古
 色赤ク或縮リ舌胎モノノ物体陽證ヲ見ル兼食ニハカク數好ニス大便或

二日二行或不通小便赤澀置目或六首中二死不補劑寒涼攻擊性ニ効ナ
 レ是傷寒論ニ所謂陽病見陰脈死、此證ナリ予屢コレヲ見タリ
 ○正面時疫上云モノハ初發ヨリ惡寒發熱キヒレクコタヘルモノナリアチガ
 チ惡寒發熱カツヨイト云テモナケレ假令少レニテモ底カラ氣味ア
 シク感冒ノ惡寒發熱トトコヤラガ違テ氣味アシキモノナリフレガ敗
 毒散ナドニテヨイ夏多アリ發散シテモ次第ニアレクナリ大抵ノ茶ヲ
 フラク用テ居ルウチニ邪熱ガ裏ヘ入り熱ツヨク大便不通舌モ黒
 ナリ或謔言シ其外サニノアレキ夏ガアルシカト時疫ト見付タラ
 バ人中黃丸ヲ清熱解毒湯ノ吞汁ニテ用ベシ

人中黃丸 此方有補有散有降經驗良方治瘟疫諸熱毒

大黃三兩 人中黃 蒼朮唐 桔梗 滑石各二兩

人參韓 黃芩 黃連各一兩 防風真五錢 香附一兩五錢

右為末神麴糊丸以清熱解毒湯送下二三錢

清熱解毒湯治瘟疫大熱

黃連 黃芩 芍藥真 生地黃若無乾地黃

人參韓各三錢 石膏 羌活 知母各二錢

升麻唐 葛根各一錢 甘草一錢五分 生薑二兩

右水煎右正面時疫而大便如常通者此湯分り用ルモヨシ

○時疫ニ大便が瀉スルナラハ柴苓湯ニ清涼ノ薬ヲ加ヘテ用ベシ大便
 不通ヨリ瀉スル方ハ療治カ仕ヤスキナリ小蘇胡ニ合五苓散ノ方ナリ加
 減シテ時疫ニ泄瀉ヲ兼シテ用ルナリ

○右正面時疫ト云リ是ニテノ數件ノ時疫ノ紛ナキ證ナリ此通り
 ニ療治シテニセハ快氣スルナラハ先ツ茶ヲ休メテ食食其外養生ヲ隨
 分大切ニカケテ病ニカヘサヌマウニスベシ少シテモ食カ過ルカ或厚味鳥
 魚ノ類ニテ復サシ發ルモチナリ勞役ノ感冒ナドニハシカトカノ付並
 茶ヲ用ヒタルガヨシ

○時疫快クナツテ食ノ爲ニ再發シタラハ傷食門ヲ見テ輕キ茶ヲ用
 ヲ風寒ニ中リテ再發セハ熱キ粥ナトクサイク啜ラセテツロク温ムレハ愈
 ルナリ勞役ニヨツテ再發スルナラハ隨分身モ志モ靜ニモタセテツロク養
 生サセヨ此デムサト補茶ヲ用ルアシキナリサレ氏草臥ガ甚シクハ補
 中益氣湯ノ類ヲ用ベシ

○温病時疫ノ熱甚シク熱ノ勢ハ退キナカラ兎角變サメガ子テ乾キナ
 ド強キハ邪熱ノ爲ニ腎水ガ乾キテ陰火ガ亢ルエテリ四物湯ニ知母黃
 蘗麥門天門類ヲ加ヘ用ベシ或滋陰降火湯ヲ用ルモアリ是ラハ功
 者ノイルコトナリ

○時疫感冒ニテモ病後ニ夜ノ不寢コトガアル竹茹温膽湯ヲ用ベシ

○是齋方ト云茶アリ一名ハ破證奪命散トモ云ナリ是ハ十錢煎
ノ獨參トナリ是ヲ冷シテ用レバ鼻ノ尖ニ汗出テ愈ルトアル此張子
和カ傷寒壞證ニ人參一兩ヲ煎シテ悉ク服サシテ止頃アリテ病
人鼻ノ尖ヨリ消々ト水ノ如ク汗出テ愈ルトイヘリ近來ハ儒門事親ノ
峻ナル茶バカリヲ張子和ハ用ヒラルト云ナリ覺テイルカヤウナ大劑ノ參湯
ヲ用ヒラレシモ考ヘ見ルニ是モ時疫ノ茶ニテ分レ壞病ト云テ外ノ
時疫ニ似タル病ノ療治ヲ仕損シテ十死一生ニ成タルニ用ルナリ若シ眞ノ時
疫ナレバ是レテモ治セヌナリ若シ下地虛證モ重キ時疫ヲ請取り承氣
湯ヲ用テ下スレハ脉モ微細ニナリ中々下劑ノ用ラレ様子ニテナシ然トモ

黃連湯
積ト
黃連
人當
身

人參ヲ用レバ才死スル下劑ヲ用テモ死スル仲景ノ七葉モ叶ハヌナリ夫故
ヤムコトヲ得スレテ陶節庵カ黃龍湯ト云茶ヲ典ハタリ是ハ大承
氣湯ニ人參當歸甘草ヲ加ヘタルモノナリ是レテモ生ルモノニテハナケ
レ生捨テモ才カレズハ此方ヲ可用ナリ若モ最初下劑ヲ用ベキ證ナレト
虛證ニ踏込下劑ヲ用ヒズ下劑オクレバセニ最早用ヒカタク證ナトニ
間ニ効アルベシ者一旦愈テ又発リ又発リスルコトアリ食ハ喰過サ
ヌカト吟味スベシ食ユヘ発ルナレバ各別サモナクテ発ルハ餘邪カ下
盡シテ幾度モ發ルナレバ幾度ニテモ下劑ヲ用ベシ
○傷寒ニ食ヲ扣ルト云コト昔ヨリ唐ニテモイハ傷寒ニ扣ルコト

八ノ時疫ノ愈口ニ十分ニ喰セヌモノナリツレモ初發ヨリ能食テ始終食
 カ落ヌナレバ是ハ邪氣カ胃ノ府ヘアタラヌト云モノナリ敗毒散カ達原
 飲ニテ愈レモノナリ上向ハ熱ト見ヘテ内虚寒ト云コトハ傷寒ニハアルコ
 ト時疫ニ根カラナキコトナリ是レ真寒假熱ノコトヲ時疫ニカッ
 テナレト意得ヘシ

六神通解散治時疫無汗悶乱

麻黄 石膏 滑石 黄芩各二兩 蒼朮四兩 甘草半兩

右姜煎或加羌活川芎葱白豆豉

白虎湯 治温熱病時疫入於胃不惡寒反惡熱有汗作渴

石膏十二錢 知母六錢 甘草二錢 粳米五升

右水煎待米熟温服加人參名入參白虎湯前證氣弱者主之

大柴胡湯 見傷寒

涼膈散 治三焦實火煩渴舌生瘡小水赤大便結一切有餘之火

薄荷 甘草各八分 連翹 大黃半錢 芒硝一分 桔梗半分
 山施 黄芩各一分

右水煎〇如防風當飯川芎芍藥麻黄石膏白朮荆芥滑石生薑
 各双解散是表裏邪熱ヲ雙ビ解スルノ劑ナリ

三承氣湯 治消渴胃中有積

大黃 芒硝 厚朴唐 枳實各半 甘草一

右姜煎○是劉氏劉宗素宣明論宣明論大小承氣調胃承氣三方ヲ合スル也

茵陳蒿湯 治濕熱發黃大便結實

茵陳六兩 山梔十四 大黃二兩

右水煎或加枳實厚朴滑石各等分甘草減半燈草

右方外此門方ニ敗毒散九味羌活湯滋陰降火湯竹茹溫胆湯ナトハ

吉文字屋板行ノ衆方規矩大成ニ加減法モ委クセテ詳ナリ

參考スヘシ此各ハ中古ヨリ行テ療治方ニ先楚忽ナキ各也

瘧病瘧ノ字ヲ書クハ中古ノ誤ナリ 瘧病瘧ノ字ヲ書クハ中古ノ誤ナリ 瘧病瘧ノ字ヲ書クハ中古ノ誤ナリ 瘧病瘧ノ字ヲ書クハ中古ノ誤ナリ 瘧病瘧ノ字ヲ書クハ中古ノ誤ナリ

産後風

畢竟表證ニ風濕ヲ受タルモノナリ其證頭痛發熱項強リ傷寒ノ如

クニシテ身ガ反リ仰向ニ寢テ背セナカ中カ蒲團ニツカヌモノナリ或搖擗アキ

中風ニ似タル夏モアリ傷寒ニ似タル夏モアレバ背ソリ中ノ反カ目當ナ

リ仲景括蕞桂枝湯ヲ用ラレタリ後世ニハ小續命湯ヲ用ユ是ニ太陽

少陽ノ經ニ分ツ古夏ガアルナリフレドチヒ能ヤウニ陶節ヒツツ奄カ如聖

飲ト云ラ與アタハタリ未熟ノ内ハ先ツ是ヲ用テ様子ヲ見合テ後ニ

トクト考ヘテヨシアヒリ澤山ニハナキ證ナリ又三陰經ノ瘧病アリ

是レハ背カクニツテ背虫セムシノヤウニナル面ガ膝ヒサノ血ササヘツク是ニハ脈様子

ニヨリ大承氣湯ヲ用ル夏モアリ又白朮附子湯ヲ用ル夏モアリガレ

凡三陰經，痙病，大方死，スルモノナリ

括薑桂枝湯 太陽病其證備身體強凡凡然脈反沉遲此為痙

括薑根二兩 桂枝二兩 芍藥二兩 甘草二兩 生姜三兩 東枝十二

右六味水煎汗不出啜軟粥發之

小續命湯 治中風有外邪而頭疼身軟脊強等證

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 芍藥 川芎

防風 人參 黃芩各一分 防已二分 附子七分

右姜枣前○金匱有右膏當飯無附子防風防已

如聖飲 傷寒重感寒濕則成剛柔二痙頭面赤項強直手足搐頭

搖口噤背張與癱瘓同治法

羌活 防風 川芎 白芷 柴胡 芍藥

當飯 烏藥 半夏 黃芩 甘草

右生姜水煎臨服入薑汁竹瀝溫服。有汗是柔痙加白朮桂枝

○無汗是剛痙加麻黃蒼朮。口噤咬牙者大便實用大黃利之

大承氣湯 治痙心膈臥不着席脚攣急斷齒万見傷寒

○此證半產後二日鄙ナトニ多クアリニ三ヶ月ニテ流産シテ痙ヲ

發シ口噤背反張スル元氣ニ各別草臥モノトイハ凡反張ママス口噤ニテ

湯藥外一粒穀氣モ通ラス遂ニ四五日内ニ餓死同前ニナル其時衆

湯

黃連香

陰

桂香

醫產後調血劑妙方類方數方典ルトイヘ一入モ助ルモノナシ此證金
 匱ニ等ル處大承氣湯ノ證ナリ金匱ノ痙病ニ大承氣湯ヲ用ルハ
 濕熱ヲ目當トシテ用ルトイヘ半產後ノ痙病ニ的中ノ劑ナリ產後
 ノコトニハ大承氣ハ衆醫不用ナリ此等ハ近來ノ説ノ病因ニ不拘ニ
 テサレアタリ證ニ隨テ可治モノナリ此金匱痙病ニ用ル大承氣湯ノ
 主治考へ見ベシ

中暑

潔古東垣ヨリ云出シタル下ニ暑氣ヲ深堂大厦ニ避テ風寒ニ中リタ
 ルヲ中暑ト云直テ天ノ熱氣ニ傷レタルハ中暈ト云然レハ暑ヲ深堂大厦

二避テ風寒ニ中リタルハ直チニ夏ノ感冒ト云モノナリ暑氣ニ中テラレタ
 ルモノニテハナシ中暑トイワレヌ暑ナリ是ハ東垣ノ意得違乎ソレエハ
 後世ノ醫書ニ東垣ニ痙ヲ付ミジキトテ色々ニ説ヲ立テ、云訣スレハ鬼
 角一理アルヤウニテツリハキコヘヌナリ寢冷ラスルノ或涼ニ過シノ風寒
 ニ中ラレ頭痛惡寒發熱ヲ病ハヤリ夏ノ感冒ナリ大方不換金アルハ
 藿香正氣散ニテモヨケレハ夏ノコトニハ暑邪ノ手當ニスルナリ消暑者十全
 散ヲ用ベシ仲景ノ金匱要略ニ中暈ノ中熱ト云ハ皆暑病ノ通名ニテ
 中暑中暈中熱ハ皆一ツコトナリ此中暑ト云カ天ノ熱氣ニ中テラレ發
 熱咽渴ニ面垢自汗出テ脈浮虚ナリ是ニ香薷散渴ヲ強クハ益元散

ヲ合スベシ熱甚シクハ黃連香薷飲ニ夏感冒ノ療治ハ違ナリ諸天熱
ノ氣ニモ強ク中ラレテ下地虚證ナルモトコトモナク暑氣ニ中ラレヤハリ
前ノ香薷散證同シヤウニ病メハ香薷散ノ證ハ病ガ劇シキナリ此證
ハ劇シカラスシテフラクト病ナリサレハ香薷散證ハ病カ重クテ此證輕
キト云ニハフズ動イテ病ヲ得ルト静シテ病ヲ得ルト違ナリ是ニハ張
三錫醫學六要ノ近制清暑益氣湯ガヨシ其證手足草臥身心トモニ
弱リタルヤウテ精カナル胸中サツハリトナク息遠シキヤウニテ身熱シ胸
イキレ或咽モ渴キ口モ乾燥スルヤウニアリ古書ニ暑ハ食氣コレ暑邪ニ
ヨツテ氣ヲ食レタモノナリ此證ニ近制ノ清暑益氣湯ガヨシ右ノ證ニテ

小便ガ澀ルハ黃連ニハ暑ニシツテ兼タルモノナリ此ニハ東垣清暑益氣湯ガヨシ
濕ヲ不兼モノニハ近製ヲ用ベシ○夏月外へ出テ暑邪ノ中ハ胸ガワクムト
熱シムカトシテ吐逆シソウニモアリ口燥キ咽渴ク湯水ヲ好ム或頭ガ重ク
目ガクタクトスル黃連香薷飲ニ貼用ベシ香薷ハ暑邪ヲ發散シ小便ヲ
利スル茶ニテ暑病ノ主茶ナリ黃連ハ心熱ヲサニス暑熱ハ心ヲ傷ルモノ
ナリ厚朴ハ胸中ニ結スル處ヲ散スル白扁豆ハ脾胃ヲ和スル若シ此證ニ草臥
ツヨク或素リ稟賦虚弱ナルカシテイカフ弱手ニ見ユルナラハ干味香薷飲
ヲ用ベシ右ノ證ワクムカククタクカ甚シク吐逆シタリ泄瀉シタリ目ニ
カツヨク氣ヲ取リ失フコトアリ此即チ霍亂ナリマハリ右ノ味香薷飲

テヨシ此レ暑者ニ因ル霍乱也但心霍乱ニ分クノ品ガアル霍乱門ニ記ス。
 又此病ニ風寒ヲ兼テ多クハ味香需飲用ヘシ清暑益氣湯下地ナド虚
 證カリタルガ目當ナリ偕百姓ノ飛脚ノト云モ良者其キ時外ニカクフシ
 大熱氣ニ中ラレ大熱大渴甚ク劇シク病息是ニ白虎湯ヲ用ベシ是カ熱
 病ト紛ルモナリ熱病ノ脉ハ無上ニ盛盛ニノ嚴シキモノ也中暑ノ脉ハ
 虚ナルモナリ是ニカ見分ナリサレ熱病ニシテモ中暑ニシテモカヤウノ
 時ハ茱ハ白虎湯ナリ又熱病ト中暑トサレ合セ病トアリ其時モ白虎
 湯ナレバツミリハ見損シテモ苦シカクナリ偕時疫トギルモナリ時疫
 ノ脉ハ強ク浮ニモナク沉ニモナシ唯數ナルモノナリ其上頭痛寒クナ

トモアリテ少シ病ニヤウカ違フニノリ偕右ノ中暑ノ證ニ發班ヲ吹
 出スコトガアルツレニ白虎湯加人参一名ハ化班湯トモ云又途中ニテ大暑ニ
 中リ真黒ニナリテ氣ヲトリ失ヒ無性ニナルコトガアル此療治ハ何レノ
 医書ニモアル通り道端ノヤケキニ臍ヲ慰シ又熱土ヲ臍ノ上ニ敷
 其上ハ小便ヲ仕カケル是レ無上ノ療治ナリ偕一度ニ生姜ト蒜トヲ
 摺リテ其絞汁ヲ少ナリトモ吞スレハ忽チ甦ルナリ。偕中暑ニ五苓
 散カ主薬ナリ是ハ暑邪裏ヘ入り外ハ少シ風寒ニ中ル時ニ猪苓茯苓
 泻茯苓ニテ裏ニアル暑邪ヲ小便道ヨリ通シテサニス外邪ハ肉桂ニ
 テ散ズルヲ外邪ガナクテ暑熱ノ裏ニアルバカリナレハ肉桂ヲ去リテ四

百病考

上編

九十九

苓散ヲ用ベシサレ凡大方ハ肉桂ヲ去ガヨシ暑邪ヲ表ニアルカ裏ニ入テモ
 病ノ初發ナレバ香薷散ニヨシニ三日ニ歷テ病カ裏ニシツキタルトキ
 ニ小便カニ反イタガヨシ是ニカギラス一切ノ療治ガ初發ナレバ表テサニ
 ス裏ヘシニ付テハ二便カラヌヨリ外ナシ假令傷寒ノ表ニアルトキハ
 汗ヲ發シテヨシ胸ノ内ニアルトキハ吐サスルガヨシ熱邪ノ裏ニシツキタル
 トキハ承氣湯ヲ大便カラ下スト一ツノ行方ナリ又瘡毒ノ疥癬ト
 云類モ一タレキ時ハ發散ヲスル病ガコジケテハ二便ヨリヌカ子ハナラヌ山
 飯來ハ惡毒ヲ小便ヨリ通スル茶ナリ偕ハ發散ノ能モアリテ外ヘモ
 追出スニツノ能ヲ持タル茶ナリサレ凡小便バカリヨリ拔テハ毒氣ノ

深キハ不足ナルユハ山飯來ノ方ニ大黃ヲ組合タルモ此意ナリ。暑ヲ苦
 シニ無上ニ水ナド吞テ腹下リ或ツヨク嘔ラセキ痰ヲ吐クコトアリ是ニハ
 大順散主之。伏暑ト云コトハ内ニ連々ト暑氣ニ中リ表ニモ暑邪
 ヲ含ミテ其上ニ風寒ニ中リモ穴ヲシメテチツト暑ヲ含ミテ尻ヲ伏
 暑ト云是ニモイロク茶アレト消暑十全散カヨシ

消暑十全散

- 香薷 二錢
- 白扁豆
- 唐厚朴
- 唐木瓜
- 甘草
- 橘皮 一作 半夏
- 茯苓
- 藿香 青葉
- 紫蘇 各一
- 右水煎

近制清暑益氣湯 主治見諸方書

人參 白朮唐

麥門

五味子韓三粒少用

橘皮各五分 甘草炙

黃蘗炒少

黃耆蜜炙 當歸

右姜東煎

東垣清暑益氣湯 主治且加減悉衆方規矩大成也

黃耆炙 人參 白朮 蒼朮唐 升麻唐 神麴真

橘皮各五分 甘草 當歸伊吹 麥門 黃蘗各三分 五味九粒

葛根 沢瀉 青皮各二分

右水煎

香薷飲 同上

香薷二兩 唐厚朴 白扁豆炒 茯苓各二兩

右水煎熟以涼水沉冷服

黃連香薷飲 同上

前方 去白扁加黃連 夾痰加半夏南星虛加人參黃耆

十味香薷飲 同上

香薷炙 黃耆 人參 白朮 茯苓

陳皮 木瓜 厚朴 白扁豆 甘草各半

右水煎

小承氣湯
桂枝湯
加減

藿香白朮散
大腹
茯苓
白朮
紫蘇
橘皮

桔梗
白朮
厚朴
半夏
藿香
消食劑
蒼朮
陳皮
厚朴
芍藥

大順散 治夏月冷飲過多嘔吐瀉利

甘草 乾姜 杏仁 肉桂

右為散白湯送下。此方寒飲冷ノ主劑ナリ夏月ニ涼氣ヲ
恣ニ冷死モノヲ喰ヒ嘔吐瀉利ニ或鼻清涕ヲ流シ嘔スルニ用

霍乱

霍乱ト云モノ内チ食ニ中ラレ外邪ニ感ヒ吐瀉スルヲ霍乱ト云是レ傷寒
又ハ中暑ニテモ吐瀉スルコトアリ然レモ霍乱ノ違ハ吐瀉シテ身ヲ悶ヘ手
足ヲ振廻スマウナルヲ揮霍擦乱ト云テ病ニマウノ貞チニツイテ霍乱ト
云ナリモト病名ニテ分ラテ病ノ貌チニツイテ各付ル病名ト思ベシ吐瀉

世子バ霍乱ト云モノニシテ又吐瀉シテモ其身ヲ悶ヘ子バ霍乱ト云モノニ
テハナレ畢竟食傷ト外邪ト兼タルモノナレバ冬ノアルニシキモノニテハ春
秋モ本ヨリノコトナレモ夏多キモノナリソレユヘ中暑者病ト同シマウニ
世間テ意得テイル内チ食ニ傷ラレ外風寒ヲ感シタラバ藿香正氣
散外暑熱ニ中ラレタラバ香薷散ソウチ食滯ガ重ク消食ノ薬ヲ專
ラ用ベシ且清熱ガ強ク消暑ノ薬ヲ專ラ加ベシ楮乾霍乱ト云モノア
リ大腹痛ニ欲吐ニテ吐スルコトモオラズ瀉セシテモ瀉スルコトモオラズ
手足ヲモガキ一時ノ内ニモ死スルモノナリ是ニモイロクノ療治アレモ病
ガ臍ヨリ上ニアルト見バ山科ノ金屑丸ヲ用ベシ端的ニ吐スルモノナリ

醫方類聚 卷之百二

或塩湯ヲヌルコトシテ茶碗ニツモ吞スレバ胸ガ悪クナル其時鳥ノ羽ニ

テモ又ハ指ニテモ咽ヲサスリ吐サスルナリ此鹽湯ヲ吐スルハ乾霍乱ニ

シキラス一切ノ吐方ナリ諸病ガ臍ヨリ下ニアルナラバ備急圓ヲ用テ下ス

金屑丸

鷹ノ目トテ黄色ニ透モリ
山危子ノ汁ニ三度浸シテ

寒米 黒米ノ三年
モノ寒晒トス

右兩品等々分煮氷餅為丸以金箔為衣

痢疾

痢病ハ内經ニ腸辟ト云仲景ハ下痢ト云是ガ今ノ痢病ナリト云ハ凡鬼

角トクト符合セズ内經ヤ仲景ノ時ニハアナキ病ト見ヘタリ漢ノ末アタ

リヨリ始リタル病ト見エルソレユヘアノ方ニモシテノ療治ノ仕方病

ノ見ヤウモアレヒニチクニテ何レモ寄カタシ是ハ日本ニテ能ク仕覺

ヘタ方ニ寄ベシトフシテモ唐ヨリハ日本ニ多クアル病ト見ヘタリ

凡ソ痢病ニ三通リアリ先ツ一色ハ大便ガスキト不通腹痛シ則ニ

行ヒ此カカリ通シテ又ハ行キクスル是ニ芍薬湯ヲ用ベレ芍薬湯

内ニ大黃アルユヘナリ然トモ是ハ少キゾ又一色ハ隨分後重シテモ

餘程ツ通スルナリ色ハ何色ニモセヨツレニカハス衆方規矩ニ先味

和中湯ヲ用ベシ此方道三翁ノ始テ組レタル方ナリ至極効ノア

ル方ニシテ十人ニ八人迄ハ大方此方ニテ前後仕立ルナリ又一色ハ温

醫方類聚

卷二

痢疾

百三

補ノ藥ヲ用ルコトアリ是ニハ訣ノアルコトナリ初發泄瀉二十行或
 十二三行ニテモ七八行ニテモ行テ後膿血ヲ下シ裏急後重スルモ必
 温補スベシ丹水翁自制ノ逆挽湯ヲ用ベシ若シ虚甚シク虚陽浮
 散ノ候アルニハ附子理中湯加肉桂用ベシ下地下部中焦虚シタルモノハ
 泻ニ依テ弥腎脾虚ス是大虚ノ痢病ナリ參附ノ別煎ヲ兼
 用ルコトモアルナリ偕小兒ノ痢病療治違ニテ死スルモノ多シ或
 慢驚ナドノヤウニナリテ不届コトアリ多クハ食滯ヨリ起リテ泄
 瀉五六行ノ後青色或黒灰色赤白兼下ル熱甚シク舌ナドモ白胎アリ
 不食ノ半日程内ニ急ニ草臥ルモノナリ油断ナク最初ヨリ參朮

姜桂附甘ヲ以テ温補スベシ尋常ノ濕熱ヲ疎滌スル劑ハ一口ニテモ禁用
 ナリ大人ニテモ元來脾胃弱キモノハ同ジ治法ナリ必泄瀉ノ後痢ニ變
 ズルヤ最初ヨリ膿血ヲ下シ大便通シカ子後重スルヤ精レク問テ某ヲ
 用ベシ不應ノ某ヲ用ンヨリ先ツ半日モ一日モ見合テヨシ其ウチ疎
 滌ノ劑ヲ用ル場へ逆挽湯ノ類ノ温補ヲ用レバ一旦病増劇ストイ
 へ氏苓連芍薬湯ナドノ疎滌ノ劑ヲ用レバ早速効アリ少シモ害ヲ
 ナサズ若シ温補ノ劑ヲ用ベキ痢ニ疎滌ノ劑ヲ用レバ損アリテ害
 ヲナシ甚シケレバ救ハレス爰ニ於テ丹水翁逆挽湯ヲ製シテ一切ノ
 痢病ニ先ヅ用ルトイヘルコトハ愈嘉言ガ見ニヨツテ逆挽ノ劑ヲ自

制せしハ仲景ノ微意ニシテ諸家ノ見ト本ニ懸隔せり。○温補ヲ用ベ
 キ證ハ熱アリテ食氣ナク脈モ浮大ナモノナリ或浮大ニシトイヘ
 沉實ニカサビクニ分キモノナリ度數モ多カラズトイヘ是最初ヨリ殊
 外草臥ルモナリ熱アルニ医俗ニ温補ノ劑ヲ斟酌シ寒涼疎滌ヲ投
 ヲ誤ルコト多シ精ク考ヘシ。○泄瀉後ノ膿血ハ濕熱凝滯ノ惡物ニアラズ
 腸胃ノ脂膏血液トシテ是ヲ疎滌スベキモノニアラス至極大切ノ物ナリト
 景岳全書ニイヘリ其書門人張謙菴ノ作乎偽書底ニ見ユレ其書
 全編ノ旨ハ張景岳ノ意アリ精ク考ヘシ

○正面ノ痢病ハ是モ時疫ノ一色ニテ濕熱ノ氣脾胃腸胃ノ内ニ感ジテ
 内ニアル食滯ニモセヨ何ニモセヨ滯リ下ル物ノ下ル也赤キハ熱白キハ寒ト
 丹溪カイワレタレトモニ熱ナリ又其後明朝ノ名医トモ五色ハ五藏
 ノ色ヲ下スト云辨ライヘ是モ役体モナキ説ナリ畢竟濕熱ニテ腹ノ
 内皮カ爛レ或臟腑ノ上皮カ爛レ臟腑ノ外ニ何ゾ腐リタルモノタレテ下ル
 ホドニ何色カ下ルベキヤラ不知ナリ其内血ノ多キハ病重シト意得ベシ
 レガ強キユヘニ血ヲ下スナリソレユヘ和中湯ニテ可下モノヲ疎滌シテ惡物
 ヲ去シ其内熱強ク其タメニ痢ノ通シカヌルハ傷寒ノ實熱ノ裏證ニ承
 氣湯ヲ用ルト同ジコトナリソレテ芍薬湯カ或小承氣湯ニ加藿香芍
 薬茯苓用ヒテモヨシ是カ痢病正面ノ療治ナリ

療治ヲ仕損シ大切ニナリ脈モ引落チ元氣モ疲レタルニハ補茶ヲモラ
 子バナラヌツ其療治仕損ト云ハ和中湯ヲ盛ルベキ證ニ芍薬湯ヲ盛
 ルト必惡レキモノナリ下地虚證ナルモノニアラシ度數モ減リタルナ
 ラバツロト補茶ニナオシ盛ルハツナリ或和中湯ニ人參白朮ヲ加
 ヘ用テモヨシツレライツ迄モ加減ナシニ盛ルト踈滌ガ過テ草臥ガ
 クル其外方モ多ケレバ何薬ニテ仕損ベキヤラ不知ナリ何ニモセヨ此
 ニナツテハ補茶デナケレバナラヌツ證ニ随ヒ温補平補見合ニ用ベシ
 其内踈滌カ過ギテ大便ガシラヌマウニナリタルニハ眞人養臟湯
 用ベシ熱多ク血ノ下ルニハ參歸芍薬湯虚寒ニハ附子理中湯或ハ肉桂

茯苓ヲ加ヘテヨシ

痢病ニ香病ナトシテ其カフレニテヤムモノアリ下地虚證ナルモ人參
 少病ニ五味異功散ニ香連丸ヲ兼テ用ベシ此香連丸ハ痢病ノ本薬ニ
 テ何レノ痢病ニモ可用ナリ

○痢病ハ大方春ノ末秋ノ初ニテニアルモノナリ時ナラズ十月カラ正月
 ニテハ間ニ病ニハ寒痢トテ温補ノ薬ヲ意得ニテ用ベシ

○腹痛ニ窘迫少ク痢ノ多ク通シテ餘程度數モアリ是ハアメリ
 毒氣分クテ湿熱ニ偏シ痢病ナリ泄瀉ニ色ノツキタル迄ナリ是ニハ

胃苓湯ガヨシ痢タツフリト通シ窘迫ノ少キカ目當ナリ

○禁口痢上云モアリフツト食ムナラヌモナリ是ニハ參連湯或參苓白
 朮散連理湯ナド用ルコトナリ然レハ難治モノ多シ予一小兒禁口痢ヲ
 治ス黃連一分香石蓮肉若無通用右二味合シテ三分世ウシ小料ノ獨參湯ニ
 分或五分煎汁ニテ右三味ヲ攪シ用ヒテ食ヲ望ム氣味出來テ三日ハ
 カリニシテソノ食付テ快氣シタリ是參連湯ノ類ナリトイヘハ黃連
 ヲ本方ニ用ルトキハ苦シテ一向吞ズ故ニ二味炒リ香シテ韓參チヂシノ煎湯ニ
 テ攪シ用ヒ効ヲ得タリ是古來ヨリ用來ル參連湯ナリ近世又禁口痢
 流行ノ吉野人參參連湯ニアラス
 ニ參苓白朮散參連湯ノ類ニ竹葉加テ効アリトイヘリ然レハ醫者
 ニモ見ヘス手前ニ仕覺モノナシ何サニ尤ナル治方ナリ

○毒疫痢上云モノアリ是ハ恐ロシキ病マウヲシテ色々ノ初發ヨリ惡證ア
 リ實證者ニアルトナリ是ニハ三妙湯上云傳來ノ茶アリ即チ活幼
 心法シシラノ方ナリ當飯芍藥檳榔木香青皮厚朴黃連黃芩枳殼山楂桃仁
 紅花地榆甘草干四味ナリ水煎ジテ用

○瘧痢ギヤリトテ瘧ト痢ト一度ニ病コトアリ先、痢病ヲ愈シタルカヨシ痢
 病カ愈レバ大方瘧モ截ルモノナリ若シ截テハ跡ニテ瘧ノ療治ヲ世ヨ是
 ニモヤハリ和中湯ヲ用ベシ或柴苓湯ヲ用モアリ見合ニスベシ仕廻シニハ
 補中益氣湯ナドカヨシ元來疫邪カ内ニ中レハ痢病ニテハ表へ中レハ瘧ニテ
 ル大根オノ一ツモト見ユ痢病ハ疫邪エキデナクテモ獨リ病ムトアレハ今世間ヲ

見ルニ大方ハ流行病ナリ

○時疫ト痢病ト一度ニ病ニトナリ是ハキハメテ大切ナルコトナリ達
原飲ヲ用ベシ大方是ニテヨキモノチリカヤウニイハ公痢病ノ療治ハイロ
ク六分數ナレモ右ノ通り自當ハ能クカレテアルモノチリ此通りニ合点ノ
療治スレバアテリ仕損ナキモノチリ此外ニイラクノ病ニヤウ云テアル
凡畢竟ナキモノト意得ベシ

○小兒ノ痢疾ハ多クハ食滯ニテ六七行モ泄瀉シテ膿血ヲ下シ痢トナルコ
トナリ是ハ稟ノ虚實ニ拘ラス油断ナク最初ヨリ温補スベシ下地外ノ
荊菜ヲ一貼モ不吞モノハ附子理中湯ニ肉桂茯苓多加ハ炙甘草ヲ等

分ニ入レ或大連ナトモ加ヘ乾姜ハ炮シ修合スレバ味甘キニ小兒ニテモ
立カケ吞モチリ即効アルハ人参ニモ及ヌモノナリ此予ガ屢試用ヒ
テ數人ノ小兒ヲ治セシテ勝テ數ヘカクニ世医ノ不換金加味又ハ疎滌
ノ劑ヲ投ジ不食嘔ヲ發シ不救モノ見聞モ亦數人ニ及ヘリ世間ノ小兒
痢疾ノ爲ニ斃スルモノ千ニ八九モ誤治ニ依ルナリ殊ニ仲景ノ書ニ下利
ト云ヘル今ノ痢疾ト符合セザレバ古方家ナト厚朴七物湯ナド無理ニ
痢疾ノ某ニ引付テ用ルト云ヘモ聊虚分ナルモノハ大害アリ又濕熱積滯
ノ痢ニモ害ナレト云ヘモアリラレタ茶連芍薬湯ヲ用テ即効アルヤウニ
手際ヨカラス古方家毎々虚痢ニ承氣ニ黃厚朴七物湯ヲ投シ人ヲ誤リ

巴ヲ誤ルト多シ此議素人ト云ハ深ク考ベキコトナリ。小兒ノ痢ニ濕熱積滯ヲツテ疎滌スヘキ證ハ乳ガナレトシテ飯餅菓ノ類ヲ次ニ食シ疳痢ト云モノニナルナリ此ハ實ナル小兒ニ多シ最初ヨリ水瀉モナク大便ニルニ赤白交リ裏急後重スレ度數ハ晝夜ニ二三行モキテ食モアミリ減ゼズ發熱モナク腹少シ脹リ或項細ク手足瘦テ氣ムツカシクヤハリ疳ノ病ナリ是ニ殺虫ノ丸茶ヲ消疳湯ナトニ兼用スヘシ此病ニマウブラト長引モチリ殊外肉脫ニ及ヘ疳却テ補茶ナトハ禁用ナリ熊膽ノ丸茶ナト別ニテ効アリ其外五疳ノ丸茶諸方アリ考ヘ用ベシ唯カヘスモ疳損タルハ泄瀉五三行ニテモアレ急瀉ニテ膿血

ニ變ズル痢疾小兒ハ勿論ノコト大人トテモ油断スベカラス是最初ヨリ温補ノ茶ヲ用ルノ證ナリ大人ニモ下地脾腎ノ弱キ性ニ四季ニ拘ラズ病モナリ通例ノ痢疾ノ茶ヲ用レ必誤ル審ニ考ベシ

芍薬湯 初起壯實者宜之

芍薬一兩 信州 當歸 黃連各半 兩 檳榔 木香

甘草各二 錢 大黃三錢 黃芩半 兩 肉桂二錢

右水煎食後温服清如血痢則漸加大黃如汁臘毒加黃蘗和中湯 痢疾不甚實不甚虛不偏寒偏熱不問赤白通用

芍薬大真 或信 枳殼唐 厚朴唐 青皮 藿香各中 青葉

縮砂

木香

乾姜各小

甘草

右九味水煎。

傳云至疎滌可用信州芍藥至平穩可用真芍藥餘方倣之

芍藥湯

初起屬濕熱者通用

黃芩

芍藥

各二錢信

黃連

木香

枳殼

枳殼

甘草

右水煎

小承氣湯

方見傷寒

真人養臟湯 治痢日久虛寒滑脫或邪去而後重仍在者

肉桂五分

人參

當歸

訶子

甘草

木香

肉豆蔻

芍藥

白朮

粟殼

右水煎食前溫服。臟寒者加附子一錢

參飯芍藥湯

治痢久一二十日痢去多不止用此調氣血自愈

當歸二錢

茯苓

芍藥真

白朮

縮砂七

人參

山茱

陳皮

甘草五分

右九味烏梅一箇燈草一團蓮肉七箇水煎溫服

香連丸

黃連

木香

右糊丸空心米湯下

胃苓湯 暑痢泄瀉通用

蒼朮 厚朴 陳皮 猪苓 沢泻

白朮 茯苓各一 肉桂 甘草各二

右姜枣煎。暑痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加木香枳殼黃連

參連湯 治禁口不食胃熱甚者

韓人參五錢 黃連一兩

右水煎加石蓮肉尤効

連理湯 理中湯加黃連茯苓 治禁口痢通用

參苓白朮散 赤水玄珠為補脾之主藥

白扁豆 人參 茯苓 白朮 甘草

山茱萸各二 蓮肉 薏苡仁 縮砂各一

右東煎。傳云此方無故而不好食者用之奇効

柴苓湯 治瘧發寒熱作渴病在表裏陰陽不分者

小薤胡湯合五苓散

附子理中湯加肉桂茯苓方 治大人小兒虛痢之總司也虛痢

因瀉而腎脾虛憊也若誤投疎滌則多到不救慎之慎之

消疳湯 小兒疳痢通用

山楂子 芍藥信州 茯苓 黃連

白朮和 沢泻各一 青皮四分 甘草三分

右姜枣煎或加神麴麥芽。或加使君子檳榔。或加莪木檳榔
兼用消疳丸

秘傳消疳丸 五疳癖疾虫積屬濕熱痢疾通用

黃連 五錢 使君子 實計 四錢 莪木 三錢 木香 二錢 熊膽 琥珀手 二三錢

右糊丸黍米大。或去使君子加合歡皮霜大人小兒諸積通用

逆挽湯 痢病泄瀉之主方也先與此方可試虛實

蒼朮 一錢唐或和 肉桂 一錢辛味好 茯苓 八分生完干 乾姜 八分完干

枳殼 五分唐古渡 生姜 一錢 甘草 一分 人參 六分素虛弱者倍之

右水煎裏急後重甚者加檳榔木香倍乾姜。風證多者加酒制

芍藥倍肉桂。若人ニヨリ肉桂ノ不相応ナルモノハ權者ニ代ヘ用ベシ

然レ凡大方ハ肉桂ヲ去ルベカラズ平常桂ノ不相應ノ人モ此時ハ障ラヌモ

ノナリ此方ヲ用テ病勢増劇キモノハ是疎滌ノ劑ヲ用ベキ證ナ

リ芍連芍藥湯ノ類ヲ用ヘシ此藥最初虛實トモニ用テ實ニ此

人參ハ時ノ宜シキニ隨ヘシ大抵ニ好弦沙參ヲ代藥ニ用ヘシ實ニ此

藥痢疾家萬世不窮利ニ痢藥ノ總司ナリ

泄瀉

泄瀉ハ回春ガ全体ヲキナリ回春ノ意ヲ和ケイハハ一番ニ胃ニ湯ヲ

載タリ泄瀉ノ總ニクナリ何ニモセヨ泄瀉ハ脾胃ニ濕ヲ受テノコト

六レハ胃苓湯ニテ湿ヲ除クヲ總ニクナリニ番ニ寒瀉ハ腹痛ニ急ニ強クハ痛ニ子氏ソウト長ク痛ニ泄瀉モ定格ニ止タリ増シタリセ又モナリ面ノ色青ク脉沉ニナリ某ハ理中湯或ソレニ加味シテ十味ホトニナル是ヲ回春ノ理中湯ト云ドレナリ氏見合ニ加減ノ用ベシ惣ジテ加減ハ何レモ回春ノ通リニテヨシ又火瀉ハ腹カ痛ニ其ニ下ス下スタヒニ腹痛シ腹痛スル度ニ下ス是ヲ一陣一瀉ト云咽乾キ脉數ニシテ下ストキ大便ガ熱ク覺ルナリ四苓散主之ナリ又暑瀉ハ暑氣ノ比急ニ立下シニ永ノ如キモノヲ引續ケテ大分下スナリ面垢ツキタルヤウニテ咽乾キ自汗スル香薷散ノ加味主之ナリ又湿瀉ハ水瀉タ多クシテ腹痛ナシ五苓

散主之ナリ風瀉ハ是ハアメリ澤山ニハナレ血ヲ下スモノナリ或大便ニ血ヲ一ジヘルコトモアリ痢病ニ紛ルレ後重ガナレ是ガハキトシタル邊ナリ某ハ胃風湯主之ナリ又食積瀉ハ下ルト腹痛ガ止ム是ガ目當ナリ其外食滯ニ目當ノアルモノナレ強キ腹痛テモ下バ其ニ一旦止ムモノナリ某ハ香砂平胃散主之ナリ又痰瀉ハ或多或少少ク一日二日モ止マテハ又下ル大方痰ガ下ルモノナリ某ハ二陳湯主之ナリ又虚瀉ハ飯ヲ喰ト其ニ下ル大方生テ下ルガアルモノナリ脉微ニシテ弱ニ某ハ参苓白朮散主之ナリ是ニハ家傳ニヨキ散某アツテ道三翁ノ益中散ニ加減シタルモノナリ白朮茯苓山茱萸乾姜甘草古細末シテ白

疝海、
乾姜、
白朮、
茯苓、
沢瀉、
木香、
百子朴

同方
金匱耳聾
腎著湯合方
木香、
耳聾、
茯苓、
桂枝、
木香、
白朮、
沢瀉、
木香、
良姜

湯ニテ用テ又腎瀉ト云フトアリ下元ノ眞陽不足アハカキコロ四五度下スモノ
ナリ是ヲ五更瀉ト云四神丸主之ナリ先ツ是ヲ大抵スムナリ其外ハ
回春ノ餘論ガ皆ヨレ泄瀉ノ療治ヲセバ回春ヲ能考テ療治ヲナス
ベシ回春ニアル通りナレバ委ムシク記サズ

○回春ニモナレ切ノ医書ニイダ見アタラヌ泄瀉アリ疝氣ニテ下
ルコトアリ疝瀉ト云是ハ腹ニ疝氣強ツヨクシテ水瀉ノ内へムクロジノヤウニ
硬リタルモノヲセテ下スナリ是ガ目當ナリ何レノ医書ニモナケレ
バ治方モシレ子シ今時チヨツクトアルコトナレバ治方ハ乾姜白朮ノ
ヤウナルモノニテ脾胃ヲ温補シ茯苓沢瀉ノ類ニテ水道ヲ通ツシテ

木香厚朴ノ類ノ疝氣ノ薬ヲ加ベシ病ニ臨テ方ヲ組ニ用ベシ

○回春ニアル通り大虚寒ノ泄瀉ハ八柱飲ハツチウイノ類ノ大温補ノ薬ヲチケル

バナラヌナリモト人參一兩茯苓附子木香各半ノ四味ヲ四柱飲ト云テ

古方ニアリ準繩ビシビシヨクニモ見ヘタリソレニ二味加ヘテ六柱飲ト云茶モアリ回

春ニ四味加ヘテ八柱飲ト云四柱飲カ根本ナリ何レナリトモ見合用ベシ

○借右ノ通りニテ指當リテノ意得ニハ寒瀉熱瀉ヲ分ツベシ熱瀉ハ

小便赤ク或澁リ煩瀉ハシカクシ腹中熱シ大便ノ色赤シ或化セズ故ニ生ニテ下

ルコトアリ邪熱セツクヲ消化セザルナリ寒瀉ハ小便清白ニシテ不渴腹中

冷ル穀亦化セズ便色黄白シ變瀉ハ不換金キヨクス黄芩芍薬ヲ加ベシ或

半夏湯

寒熱アルモノハ柴苓湯ヲ用ベシ發強キモノハ肉桂ヲ去テ黃連ヲ加ベシ古方家ニハ黃苓湯ヲ用ルナリ黃苓芍薬甘草ノ三味ナリ寒瀉ニハ胃苓湯ニ乾姜ヲ加ベシ或理中湯モ又可ナリ古方家ニハ白朮附子湯ヲ用ルナリ白朮附子甘草ノ三味ナリ或ハ腹痛シテ瀉スルニ附子粳米湯ヲ用ルナリ附子半夏甘草大棗粳米ノ五味ナリ亦大抵泄瀉腹痛リ心下痞リ痛ニ或嘔シ不食スル半夏瀉心湯ヲ專ニ用ルナリ心下痞スルト云ラ目當トスシ其方半夏五分乾姜黃苓各四分黃連一分甘草一分直根參一分大棗一分右水二盃半入二盃半煎シ滓ヲ去リ一盃ニ煎ス此薬心下サレ込フサガルヲ目當トスルナリ腹痛不食或

ハ積痛泄瀉ハ勿論泄瀉セザルニモ用テ甚ダ妙ナル薬ナリ又久瀉アツテ不止モノ參苓白朮散ヲ散薬トシテ煎スノ煎湯ニテ用テ効アリ參苓白朮散散薬ノ功格別煎湯ヨリ勝レリ或ハ久瀉ニ肉豆蔻訶子ヲ加ルトモアリ古方家ニハ桂枝人參湯或ハ真武湯ヲ用ルナリ桂枝甘草各四分白朮人參乾姜各三分ノ五味ナリ吉野人參ヲ用ルニヨツテ乎甘草五兩トアルナリ韓人參ヲ用ヒハ此分量ニテハ甘草多シ隨時意ヲ以テ増減スベシ真武湯ハ寒瀉久瀉ニ用ルナリ茯苓芍薬各三分生薑各三分白朮二兩附子一兩右五味ナリ亦曉毎ニ瀉スル脾腎瀉ノ四神丸ノ證ニ古方家ニテハ金匱腎氣丸ヲ甚者類ニテ丸ジ用ルナリ又

回春腎虛久瀉不止者六味丸加破故紙五味子吳茱萸肉豆蔻各一兩為蜜丸用テ効アリ子試用此右四味ノ加味一兩ヨリ多トキハ苦三強ニ充蜜丸ニ丸吞スベシ甚ダ効アリ

理中湯 治寒瀉

人參 白朮 乾姜 肉桂 甘草 各一分

陳皮 藿香 茯苓 良姜 各七分

右生姜三片棗二枚烏梅一箇燈草一團水煎温服

胃苓湯 泄瀉不分清濁者湿多而為五瀉也

方 見痢疾

活却法 四苓散 茯苓 通

四苓散 治火瀉熱瀉

茯苓 白朮 猪苓 蒼朮 澤瀉

山藥 芍藥 山柰 陳皮 甘草 各一分

右烏梅一箇燈草一團水煎

香薷散 治暑瀉

依本方加參朮茯苓陳甘草炒米一撮烏梅一箇燈草一團煎服

五苓散 治濕瀉

茯苓 白朮 猪苓 澤瀉 山柰 陳皮

肉豆蔻 蒼朮 縮砂 訶子 肉桂 炙甘草 各五分

右生姜三片烏梅一箇燈草水煎

胃風湯 治風瀉

當歸

川芎

芍藥

人參

白朮

茯苓

肉桂 各等分

右粟米一撮入同煎溫服

香砂平胃散

治食積瀉

香附

蒼朮

陳皮

藿香

本方去枳殼加白朮茯苓

縮砂

木香

斗

不

二陳湯

治痰瀉

茯苓

白朮

蒼朮

陳皮

半夏

茯苓

白朮

蒼朮

山棗

縮砂

車前

木通

厚朴

甘草

右等分生姜三片烏梅一箇燈草一團水煎服

參苓白朮散

治虛瀉

人參

白朮

茯苓

山棗

縮砂

藿香

陳皮

乾姜

蓮肉

訶子

肉豆

甘草

右等分生姜三片燈草一團水煎服

四神丸

治脾腎瀉

破故紙 四兩

肉豆蔻

吳茱萸

五味子 各二兩

右以東肉為丸如梧子大每服五十九鹽湯下

醫療手引草

六柱飲 治滑脱不止泻利完穀

四柱飲加訶子肉豆蔻減半

八柱飲

四柱飲去茯苓加訶子肉豆蔻薑粟穀甘草

右為末每服四錢入生姜五片棗一枚煎如稀糜入塩一字調服

醫療手引草上編乾

文政三年
大正三年

當用書札大全 長玄海堂筆

ナク書翰ノ法式万異名モノ、數等ニテ集メ載セ申候

千字類合 貝原先生著

日用ノ文字ヲ同字ナシニ千字ヲ集ム是ヲ熟讀或ハ習ハシメハ大ニ書生ノ便

長雄文章雙魚

漢文尺牘ナドヲ當用ノ書狀ニ取扱ルヤウニ引直シ手本トス是ヲ見テ書通ヲ認ルハ學文ナクシテ万事ニ通ズ

書翰初學抄

草書石摺日々ニ用ル所ノ文章漢文上中下ノ書分ヲ記ス書狀ヲ認ルニ此書ヲ見レハスベテ用ヲ達シ不足ナ

手習仕用木抄

笹山梅庵作。入木道ノ口傳秘密悉クアラハシヌレガ

日東尺牘

祐齋先生書 人論草木魚都テ異名其外書翰ノ要取ヲス

日東入款 新編養生書 山崎闇斎撰 和漢書目録 卷之三

半信書目録 大越 山崎闇斎撰 和漢書目録 卷之三

書翰 大越 山崎闇斎撰 和漢書目録 卷之三

身軀文章 雙魚 山崎闇斎撰 和漢書目録 卷之三

十字 巖合 貝原安生撰 和漢書目録 卷之三

當用書目大全 長玄軒堂撰 和漢書目録 卷之三

和漢書目録 卷之三 山崎闇斎撰 和漢書目録 卷之三

