

富士用文庫

490.9

Ir-6

1



5

F 490.9  
Ir-6  
1

二册



3636

積七十九

痛  
十七

十五  
少敗  
毒

醫癘手引草續編序

瀨尾玄弘藏書

江川藏書

昔時吉田意庵法印。入于異域。見於名醫劉純彥。留學有年矣。歸乎我邦。而後著醫小學。以教學之次第。其大意以謂初學先宜講習藥性。詳氣味溫涼升降浮沈。而某藥以治某病。某證則不宜焉。於是乎知病證什之二矣。次宜攷求方劑。審寒熱補瀉緩急標本。而可用乎某病。不可用乎某病。如斯則知治法什之五焉。因其所既知者。益明病論。覈其所患之因與狀。則所識之者。至什之八矣。次體玩古人之案。以觀病變精脈學。以窮其微。是乃下學上達也。迨用之時。則揀發診法。以察病。辨折藥性。以處方。此所學與所用。次第不同。本末先後。

醫癘手引草

續編序

烏巢卷之三

所以不可紊也。愚謹思焉。至哉此言也。行遠升高必由卑且近。天下之藝術皆如此。而醫豈外焉。常怪業此業者。負笈擔簏。以詣于京師。見其所學。則始臨素靈難經之席。聞格致滌洎等之講焉。此是皆上達之事也。欲上達而後為下學耶。未知其可矣。愚雖未揀之。艸醫也。而欲微意菴法印之意。以由學之次第矣。是以集徒弟五六輩。講切近之藥性二百種許。弟等記以成一書。名六八本艸。次撰良劑七百餘首為主方矣。加減進退之。則得二千八百有餘。以為客方矣。蓋藥之要有二。曰某病治用某方者。則縱也。某方治某病者。衡也。明縱則知病。極衡則識方。弟等復記為帙。名縱衡良方。重說素靈難經。而

僭踰乎上達之事矣。豈以此為法乎。試循次第耳。或問吾子之言。既是矣。而藝術各有師傳。吾子之師者誰也。曰。愚始受業於名古屋丹水先生之門人小山臨節者也。家書口密。大抵傳焉。然其術以偏乎溫補。故棄而不學。自患莫適。從而自名家時流之徒。逮曲巷小師之技。搜乎彼。索乎此。終得二先生。學仲景之書於張璐路玉先生。聞東垣之術于北山友松子先生。路玉先生者。清康熙中之人也。友松子先生亦不辛不贊。謁俱雖不有半面之識。而其書存則有吾師矣。宋之林億。校正傷寒論金匱要略。其書固非全書。然後朱奉議成無己。輩註解論擇者數十家。未復仲景之舊。曷及方有執之著條辨。以序例。

為非仲景之言。乃削去之。雖愈喜。蓋其明敏。蹈襲以省除矣。於是乎愈詳愈暗。造程應旄之後條辯。張隱庵之集註出。畔經背理。七顛八倒。四分五裂。卒以鑿聖之經。為塗炭矣。微路王先生。則仲景之書。殆幾乎烏有矣。是以論路王先生恢復之功。而比之於王霸之業。則歷代英雄。可屈指而數也。范公所謂良相之任。豈空言哉。東垣之書。含畜甚深。而得意者稀矣。丹溪薛立齋之輩。未窺其室。況其餘乎。非本邦友松子先生者。有究心精思。而後得。則和漢何人。開示其蘊奧哉。嗚呼。仲景東垣者。聖也。賢也。路王先生者。長沙之復肉。南陽及魂。而友松子先生者。鑿門之哲匠也。愚因或問。姑雖託師名於二先生。而

其實者妄言耳。不堪自罪。唯俟能學二先生者而已矣。享保癸卯孟冬甲子三河烏巢道人謙齋加滕順謹書



續編引

是享保年間、烏巢道人謙齋會於諸州之醫生五六輩、編輯縱衡良方二十六卷之自序也。今此續編就良方衡法十三卷、舉全編各門、每方之意、記以國字者、口授之草稿也。或本證主用例、他病活用例、依諸方書載之、惟恐有差謬、已博洽君子幸訂之矣。  
明和戊子孟夏

平安

盛塘誌



續編凡例

一 全編各門ノ每方ノ方意ヲ詳ニ述ス即藏書良方中ノ衡法也蓋  
レ其ノ證ニ其ノ藥方ヲ用ルハ縱ナリ其ノ藥方ハ其ノ證ニ用ルハ衡ナ  
リ古今ノ方八百餘方ヲ撰ニ國字ヲ以テ方旨ヲ記ス縱衡ノ二法錯綜  
ノ間活方幾千餘首ナリ名テ縱衡良方ト云夫方某ニ拘定スル者ハ先  
輩株ヲ守リ鬼ヲ待ノ謗リアリ然レ凡其謗ル者モ古今ノ方ヲ未用ト  
云コトナシ用テ要ヲ得レバ活方ナリ拘定スレバ死方ナリ豈待鬼徒ト  
センヤ上編題言中ニ云ヘル如ク初學某品ノ能毒ヲ學ニテ其次ニ某方ヲ理會  
スレバ醫術ノ中ニテ五ヲ知ナリ其方ニテ病論ヲ學ベハ十ノ中ニテ八ヲ知

ルナリ其次三古人ノ医按上脉ヲ学テ医術十分ノ功ヲ遂ルナリ

一方後ノ論初学ノ理會シ難キモノハ國字ヲ以テ細書ノ解ス

一分兩後世修合ニ便ナラシメシカ為メ古方ノ分兩水ノ升合俱二本論

本方ノ割合ヲ記シ亦今時ノ分兩煎法ヲ記ス

一每方本證主用ノ例ハ主方ヲ云ナリ

一每方他證活用ノ例ハ活方ヲ云ナリ

一每方活用ノ例此限ニアラスト云ヘ庄諸書并本邦老医ノ治驗先人

目撃スル所ノ例ヲ以テ盡ク輯メ儘予ガ近世見聞ノ古方者流ノ治

法ヲ補記ス

平安

盛塘識

里雙

醫療手引草續編方目

卷之一

發表

桂枝湯<sub>一</sub>

疎邪實表湯<sub>二</sub>

麻黃湯<sub>三</sub>

升麻發表湯<sub>四</sub>

小青龍湯<sub>五</sub>

大青龍湯<sub>六</sub>

三拗湯<sub>七</sub>

葶藶散<sub>八</sub> 參藶飲<sub>九</sub>

香薷散<sub>十</sub>

行氣香薷散<sub>十一</sub>

藿香正氣散<sub>十二</sub>

不換金正氣散<sub>十三</sub>

神朮散<sub>十四</sub>

人參養胃湯<sub>十五</sub>

羌活沖和湯<sub>十六</sub>

神効沃雪湯<sub>十七</sub>

葛根湯<sub>十八</sub>

升麻葛根湯<sub>十九</sub>

柴葛解肌湯<sub>二十</sub>

香葛湯<sub>廿一</sub> 神湯<sub>廿二</sub>

解表升麻湯<sup>廿</sup> 治頭風疼嘔吐方<sup>廿</sup> 川芎茶調散<sup>廿</sup> 人參敗毒散<sup>廿</sup>  
 陽旦湯<sup>廿</sup> 葶藶湯<sup>廿</sup> 麻黃附子細辛湯<sup>九</sup> 麻黃附子甘草湯<sup>十</sup>  
 八鮮散<sup>卅</sup> 加味益氣湯<sup>卅</sup> 苓連消毒飲<sup>卅</sup> 牛蒡苓連湯<sup>卅</sup>  
 半夏蒼朮湯<sup>卅</sup> 選奇湯<sup>卅</sup> 消毒犀角飲<sup>卅</sup> 葛根橘皮湯<sup>卅</sup>  
 驅風觸痛湯<sup>卅</sup> 惺惺散<sup>卅</sup>

表裏

五苓散<sup>卅</sup> 五積散<sup>卅</sup> 防風通聖散<sup>卅</sup> 雙解散<sup>卅</sup>  
 羌活導滯湯<sup>卅</sup> 人中黃丸<sup>卅</sup> 桂枝加大黃湯<sup>卅</sup>

攻裏

小承氣湯<sup>卅</sup> 調胃承氣湯<sup>卅</sup> 大承氣湯<sup>卅</sup> 桃核承氣湯<sup>卅</sup>  
 三乙承氣湯<sup>卅</sup> 加味承氣湯<sup>卅</sup> 大柴胡湯<sup>卅</sup> 枳實大黃湯<sup>卅</sup>  
 六乙順氣湯<sup>卅</sup> 涼膈散<sup>卅</sup> 十棗湯<sup>卅</sup> 禹功散<sup>卅</sup> 瀋川散<sup>卅</sup>  
 三白散<sup>卅</sup> 半硫丸<sup>卅</sup> 三花神祐丸<sup>卅</sup> 三物備急丸<sup>卅</sup> 三化湯<sup>卅</sup>  
 瓜蒂散<sup>卅</sup> 梔子豉湯<sup>卅</sup> 稀涎散<sup>卅</sup> 三聖散<sup>卅</sup> 一方<sup>卅</sup>

湧吐

和解

小柴胡湯<sup>一</sup> 柴胡桂枝湯<sup>二</sup> 柴胡桂枝乾姜湯<sup>三</sup>

卷之二

風

三生飲<sup>四</sup> 星香湯<sup>五</sup> 攝生飲調蘓合香<sup>九</sup> 小續命湯<sup>七</sup>  
大藜花湯<sup>八</sup> 加味大補湯<sup>九</sup> 踈風湯<sup>十</sup> 省風湯<sup>十一</sup> 大省風湯<sup>十二</sup>  
滌痰湯<sup>十三</sup> 藜花升麻湯<sup>十四</sup> 正舌散<sup>十五</sup> 資壽解語湯<sup>十六</sup>  
地黃飲子<sup>十七</sup> 升麻胃風湯<sup>十八</sup> 犀角升麻湯<sup>十九</sup> 舒筋三聖散<sup>二十</sup>  
參歸三聖散<sup>二十一</sup> 沉香天麻湯<sup>二十二</sup> 天麻丸<sup>二十三</sup> 搜風順氣丸<sup>二十四</sup>

牛黃清心圓<sup>五</sup> 清心牛黃圓<sup>六</sup> 至寶丹<sup>七</sup> 蘓合香圓<sup>八</sup>  
治中風不語舌不能言方<sup>九</sup> 加味豆淋酒<sup>十</sup> 羚羊角散<sup>十一</sup> 葛根湯<sup>十二</sup>  
痺

除濕觸痺湯<sup>十三</sup> 羌活湯<sup>十四</sup> 靈仙除痛飲<sup>十五</sup> 通痺散<sup>十六</sup> 三痺湯<sup>十七</sup>  
加減除濕湯<sup>十八</sup> 加減潤燥湯<sup>十九</sup> 踈經活血湯<sup>二十</sup> 大防風湯<sup>二十一</sup>  
獨活寄生湯<sup>二十二</sup> 清濕化痰湯<sup>二十三</sup> 犀角散<sup>二十四</sup> 羚羊角散<sup>二十五</sup>  
麻黃復煎湯<sup>二十六</sup> 防已黃耆湯<sup>二十七</sup>

寒

醫方類聚 卷之... 經絡... 小兒... 補...

四逆湯<sup>八</sup> 四逆加人參湯<sup>九</sup> 茯苓四逆湯<sup>十</sup> 通脈四逆湯<sup>一</sup>

通脈四逆加豬膽汁湯<sup>二</sup> 當歸四逆湯<sup>三</sup> 當歸四逆湯<sup>四</sup>

白通湯<sup>五</sup> 白通加豬膽汁湯<sup>六</sup> 附子湯<sup>七</sup> 吳茱萸湯<sup>八</sup>

高良姜湯<sup>九</sup> 桂枝附子湯<sup>十</sup> 乾姜附子湯<sup>一</sup> 白朮附子湯<sup>二</sup>

甘草附子湯<sup>三</sup> 理中圓及湯<sup>四</sup> 附子理中湯<sup>五</sup> 丁香理中湯<sup>六</sup>

藿香安胃湯<sup>七</sup> 真武湯<sup>八</sup> 桂枝人參湯<sup>九</sup> 甘草乾姜湯<sup>一</sup>

回陽反本湯<sup>二</sup> 回陽救急湯<sup>三</sup> 溫經益元湯<sup>四</sup> 治中湯<sup>五</sup>

大順散<sup>六</sup> 冷香飲子<sup>七</sup> 漿水散<sup>八</sup> 二神丸<sup>九</sup> 薏苡附子散<sup>一</sup>

青娥丸<sup>十</sup> 木香散<sup>十一</sup> 益中散<sup>十二</sup> 閱甫驅邪湯<sup>十三</sup>

暑

香薷而散<sup>十四</sup> 十味香薷飲<sup>十五</sup> 六和湯<sup>十六</sup> 益元散<sup>十七</sup> 生脉散<sup>十八</sup>

清暑益氣湯<sup>十九</sup> 近制清暑益氣湯<sup>二十</sup> 消暑丸<sup>二十一</sup>

濕

羌活勝濕湯<sup>二十二</sup> 除風濕羌活湯<sup>二十三</sup> 神木湯<sup>二十四</sup> 升陽除濕防風湯<sup>二十五</sup>

除濕湯<sup>二十六</sup> 四苓散<sup>二十七</sup> 胃苓湯<sup>二十八</sup> 淡濕湯<sup>二十九</sup> 腎着湯<sup>三十</sup> 滲濕湯<sup>三十一</sup>

消熱滲濕湯<sup>三十二</sup> 當皈粘痛湯<sup>三十三</sup> 清熱除濕湯<sup>三十四</sup> 茵陳蒿湯<sup>三十五</sup>

醫方類聚 卷之... 方目 八 烏巢...

茵陳五苓散<sup>頁</sup> 桂苓甘露飲<sup>頁</sup> 經驗白朮酒<sup>頁</sup> 二妙散<sup>百七十九</sup>  
劉草窠方<sup>百八十八</sup>

燥

五味子湯<sup>頁</sup> 麥門冬湯<sup>頁</sup> 地黄煎<sup>頁</sup> 生地黄煎<sup>頁</sup> 通幽湯<sup>百五十五</sup>  
潤燥湯<sup>頁</sup> 清涼飲<sup>頁</sup> 四順清涼飲<sup>頁</sup> 滋燥養榮湯<sup>頁</sup> 纒絲湯<sup>頁</sup>  
清燥湯<sup>頁</sup> 生津補血湯<sup>百九十二</sup> 當歸養血湯<sup>頁</sup> 麻仁丸<sup>百九十四</sup> 潤腸丸<sup>百九十五</sup>  
豬膽導<sup>百九十六</sup> 蜜煎導<sup>百九十七</sup>

火熱

伊尹三黃湯<sup>頁</sup> 金花湯<sup>百九十九</sup> 黃連解毒湯<sup>百</sup> 三黃丸<sup>百一</sup> 三補丸<sup>百二</sup>  
金花丸<sup>百三</sup> 瀉青丸<sup>百四</sup> 三黃石膏湯<sup>百五</sup> 三黃巨勝湯<sup>百六</sup> 三黃梔子湯<sup>百七</sup>  
梔子蘘皮湯<sup>百八</sup> 大黃黃連瀉心湯<sup>百九</sup> 附子瀉心湯<sup>百十</sup> 既濟解毒湯<sup>百十一</sup>  
龍膽瀉肝湯<sup>百十二</sup> 四逆散<sup>百十三</sup> 芍藥湯<sup>百十四</sup> 芍藥連芍藥湯<sup>百十五</sup> 同銘雜著方<sup>百十六</sup>  
左金丸<sup>百十七</sup> 當歸龍薈丸<sup>百十八</sup> 瀉黃散<sup>百十九</sup> 香連丸<sup>百廿</sup> 白頭翁湯<sup>百廿一</sup>  
瀉白散<sup>百廿三</sup> 東垣瀉白散<sup>百廿三</sup> 寶鑑瀉白散<sup>百廿四</sup> 加減瀉白散<sup>百廿五</sup> 大補丸<sup>百廿六</sup>  
滋腎丸<sup>百廿七</sup> 升陽散火湯<sup>百廿八</sup> 當歸六黃湯<sup>百廿九</sup> 滋陰降火湯<sup>百三十</sup> 清肺湯<sup>百卅一</sup>  
柴胡湯<sup>百卅二</sup> 黃芩湯<sup>百卅三</sup> 清火安神湯<sup>百卅四</sup> 清神化痰湯<sup>百卅五</sup> 導赤散<sup>百卅六</sup>

設醫藥手引草 土實編一方目 九 烏真丸

醫方類聚 卷之三 補中 補上

火鬱湯世百 甘梨漿世百 白虎湯世百 白虎加人參湯世百 如神白虎湯世百

竹葉石膏湯世百 竹葉黃耆湯世百 清熱解毒湯世百 括蕁根湯世百

金鈴子飲世百 玉竹飲子世百 麥門冬飲子世百 蘭香飲子世百 甘露飲子世百

連附六一湯世百 清熱解鬱湯世百

卷之三

補上

四君子湯世百 異功散世百 六君子湯世百 黃耆建中湯世百 小建中湯世百

內補當歸建中湯世百 金匱大建中湯世百 樂令建中世百 十四味建中世百

黃耆桂枝五物湯世百 保元湯世百 補中益氣湯世百 調中益氣湯世百

升陽順氣湯世百 升陽益胃湯世百

補中

參朮調中湯世百 補肺湯世百 濟生飯脾湯世百 當歸補血湯世百

和劑逍遙散世百 滋陰至寶湯世百 三因茯苓補心湯世百 機要八物湯世百

十全大補湯世百 人參養榮湯世百 雙和湯世百 聖愈湯世百 加減益氣湯世百

保真湯世百 百合固金湯世百 清心蓮子飲世百 辰砂妙香散世百 益元湯世百

參苓白朮散世百 參胡三白湯世百 參胡芍藥湯世百 酸棗湯世百 人參散世百

醫方類聚 卷之三 補中 補上 續編 方目 十 烏集堂

藜朮鼈甲散<sup>九二</sup> 獨參湯<sup>九二</sup>

卷之四

補下

人參飲<sup>九三</sup> 參附湯<sup>九四</sup> 耆附湯<sup>九五</sup> 參耆湯<sup>九六</sup> 黃耆六一湯<sup>九七</sup>

人參實衛湯<sup>九八</sup> 芎朮鼈甲飲<sup>九九</sup> 錢氏白朮散<sup>百</sup> 參朮芍藥湯<sup>百一</sup>

真人養藏湯<sup>百二</sup> 四桂飲<sup>百三</sup> 六桂飲<sup>百四</sup> 溫脾湯<sup>百五</sup> 加味柴胡湯<sup>百六</sup>

益氣養神湯<sup>百七</sup> 參朮益元湯<sup>百八</sup> 四君子湯<sup>百九</sup> 柴胡芎朮湯<sup>百十</sup>

人參截瘧飲<sup>百十一</sup> 參朮養營湯<sup>百十二</sup> 參朮鼈甲飲<sup>百十三</sup> 參連湯<sup>百十四</sup> 開噤湯<sup>百十五</sup>

溫脾散<sup>百十六</sup> 六君子湯<sup>百十七</sup> 安胃湯<sup>百十八</sup> 當朮補血湯<sup>百十九</sup> 參耆湯<sup>百二十</sup>

四君子湯<sup>百二十一</sup> 補中益氣湯<sup>百二十二</sup> 滋陰健脾湯<sup>百二十三</sup> 加味八仙湯<sup>百二十四</sup>

養血清心湯<sup>百二十五</sup> 四物安神湯<sup>百二十六</sup> 益氣安神湯<sup>百二十七</sup> 當朮地黃湯<sup>百二十八</sup>

參朮升麻湯<sup>百二十九</sup> 黃耆益氣湯<sup>百三十</sup> 調中益氣湯<sup>百三十一</sup> 補中益氣湯<sup>百三十二</sup>

補陰湯<sup>百三十三</sup> 參朮養營湯<sup>百三十四</sup> 黃連地黃湯<sup>百三十五</sup> 千金調經湯<sup>百三十六</sup>

大補經湯<sup>百三十七</sup> 加減八物湯<sup>百三十八</sup> 芎朮補中湯<sup>百三十九</sup> 補氣養血湯<sup>百四十</sup>

人參膏<sup>百四十一</sup> 參朮膏<sup>百四十二</sup> 地黃膏<sup>百四十三</sup> 人參固本膏<sup>百四十四</sup> 瓊玉膏<sup>百四十五</sup>

五味子膏<sup>百四十六</sup> 二冬膏<sup>百四十七</sup> 白朮膏<sup>百四十八</sup> 兎龜鹿二仙膠<sup>百四十九</sup> 崔氏八味丸<sup>百五十</sup>

錢氏六味丸<sup>三</sup>後世八味丸<sup>五</sup>加減八味丸<sup>三</sup>加減金匱腎氣丸<sup>五</sup>

左飯飲<sup>三</sup>右飯飲<sup>三</sup>還少丹<sup>三</sup>朱砂安神丸<sup>五</sup>大補陰丸<sup>六</sup>

虎潛丸<sup>三</sup>加味虎潛丸<sup>三</sup>三才封髓丹<sup>三</sup>天王補心丹<sup>六</sup>九龍丹<sup>三</sup>

固睥丸<sup>三</sup>縮泉丸<sup>三</sup>滋營養衛湯<sup>六</sup>醒脾散<sup>三</sup>啟脾丸<sup>三</sup>

氣

七氣湯<sup>三</sup>四七湯<sup>三</sup>大七氣湯<sup>三</sup>深師七氣湯<sup>三</sup>分心氣飲<sup>三</sup>

三和散<sup>三</sup>蘓子降氣湯<sup>三</sup>沉香降氣湯<sup>三</sup>秘傳降氣湯<sup>三</sup>烏沈湯<sup>三</sup>

木香流氣飲<sup>三</sup>二十四味流氣飲<sup>三</sup>嘉禾散<sup>三</sup>勻氣散<sup>三</sup>勻氣散<sup>三</sup>

五膈寬中散<sup>三</sup>香砂寬中湯<sup>三</sup>分氣紫蘇飲<sup>三</sup>正氣天香湯<sup>三</sup>

建中散<sup>三</sup>木香調氣散<sup>三</sup>木香調氣散<sup>三</sup>木香順氣散<sup>三</sup>

木香順氣湯<sup>三</sup>分氣補心湯<sup>三</sup>四磨湯<sup>三</sup>六磨湯<sup>三</sup>加味四七湯<sup>三</sup>

十六味流氣飲<sup>三</sup>烏藥順氣散<sup>三</sup>八味順氣散<sup>三</sup>舒筋湯<sup>三</sup>

氣鬱湯<sup>三</sup>六鬱湯<sup>三</sup>解鬱調胃湯<sup>三</sup>柴胡抑肝湯<sup>三</sup>平肝流氣飲<sup>三</sup>

烏苓通氣散<sup>三</sup>疎肝飲<sup>三</sup>推氣散<sup>三</sup>神效湯<sup>三</sup>神效七疝湯<sup>三</sup>

和氣養血湯<sup>三</sup>天台烏朮散<sup>三</sup>開鬱道氣湯<sup>三</sup>上下分消導氣湯<sup>三</sup>

調肝散<sup>四</sup>紫蘊和氣飲<sup>四</sup>越麴丸<sup>四</sup>破鬱丹<sup>四</sup>小安神丸<sup>四</sup>

止痛捷法<sup>四</sup>反魂丹<sup>四</sup>

卷之五

血

四物湯<sup>四</sup>芎歸膠艾湯<sup>四</sup>芎歸湯<sup>四</sup>海藏八物湯<sup>四</sup>桂枝桃仁湯<sup>四</sup>

補中芎歸湯<sup>四</sup>却勞散<sup>四</sup>當歸芍藥湯<sup>四</sup>涼血地黄湯<sup>四</sup>安胎飲<sup>四</sup>

增損四物湯<sup>四</sup>鱉甲地黄湯<sup>四</sup>四物補心湯<sup>四</sup>神秘加味芎歸湯<sup>四</sup>

熟乾地黄散<sup>四</sup>加味道遙散<sup>四</sup>四物調經湯<sup>四</sup>芎歸調血飲<sup>四</sup>

犀角地黄湯<sup>四</sup>天門冬湯<sup>四</sup>茅花湯<sup>四</sup>止衄散<sup>四</sup>三黃補血湯<sup>四</sup>

黑神散<sup>四</sup>地黄散<sup>四</sup>鬱金散<sup>四</sup>四物苦練柴胡附子湯<sup>四</sup>柴胡青肝散<sup>四</sup>

人參飲子<sup>四</sup>團參丸<sup>四</sup>白芨枇杷丸<sup>四</sup>當歸散<sup>四</sup>治血淋方<sup>四</sup>

黃土湯<sup>四</sup>和中益胃湯<sup>四</sup>胃風湯<sup>四</sup>連蒲散<sup>四</sup>十灰散<sup>四</sup>香殼散<sup>四</sup>

花藥石散<sup>四</sup>復元活血湯<sup>四</sup>復元通氣散<sup>四</sup>一方<sup>四</sup>當歸活血湯<sup>四</sup>

代抵當湯丸<sup>四</sup>秘傳斗門散<sup>四</sup>逐瘀湯<sup>四</sup>秦芫蒼木湯<sup>四</sup>紅花桃仁湯<sup>四</sup>

秦芫蒼活湯<sup>四</sup>涼血清腸散<sup>四</sup>奪命丹<sup>四</sup>清魂散<sup>四</sup>

痰

二陳湯晉道導痰湯晉清熱道導痰湯晉加減道導痰湯晉五飲湯晉

橘皮湯晉橘枳姜湯晉前胡半夏湯晉枇杷葉散晉甘遂半夏湯晉

瓜蒌枳實湯晉溫膽湯晉三因溫膽湯晉加減溫膽湯晉加味溫膽湯晉

十味溫膽湯晉青州白圓子晉滾痰丸晉沉香化痰丸晉運痰丸晉

消痰餅子晉潤下丸晉指迷茯苓丸晉杏仁五味子湯晉消風散晉

金沸草散晉貝母湯晉加味二陳湯晉清痰順氣湯晉五虎二陳湯晉

蘇沉九寶湯晉定喘湯晉二陳湯晉二陳湯晉茯苓半夏湯晉

清胃保中湯晉小柴胡湯晉黃連竹茹湯晉茯苓半夏湯晉二陳湯晉

星半湯晉清鬱二陳湯晉清鬱豁痰湯晉治吐清水晉化痰清火湯晉

二陳湯晉清心抑膽湯晉二陳湯晉二陳湯晉半夏白朮天麻湯晉

清暈化痰湯晉芎朮姜施二陳湯晉二八臂痛湯晉參合湯晉順和湯晉

食

平胃散晉對金飲子晉香砂平胃散晉香砂六君子晉養胃湯晉

香砂二陳湯晉枇杷葉湯晉葛花解酲湯晉和中湯晉九味清脾湯晉

七味清脾湯晉枳朮丸晉保和丸晉枳實道滯丸晉紅丸子晉

卷之六

痞滿水腫

消痞散<sup>五</sup> 養胃湯<sup>五</sup> 加減補中益氣湯<sup>五</sup> 大消痞丸<sup>五</sup> 實脾飲<sup>五</sup>  
 加減胃苓湯<sup>五</sup> 五皮散<sup>五</sup> 加味五皮湯<sup>五</sup> 分氣香薷散<sup>五</sup> 木香氣湯<sup>五</sup>  
 消導寬中湯<sup>五</sup> 調胃白朮澤瀉散<sup>五</sup> 白朮木香散<sup>五</sup> 疏鑿飲子<sup>五</sup>  
 導水茯苓湯<sup>五</sup> 導滯通經湯<sup>五</sup> 當歸散<sup>五</sup> 實脾飲<sup>五</sup> 理苓湯<sup>五</sup>  
 復元丹<sup>五</sup> 沉香琥珀丸<sup>五</sup> 香砂和中湯<sup>五</sup> 厚朴七物湯<sup>五</sup> 沉香散<sup>五</sup>  
 木香散<sup>五</sup> 中滿分消湯<sup>五</sup> 中滿分消丸<sup>五</sup> 經驗大橘皮湯<sup>五</sup> 忿氣飲<sup>五</sup>  
 補中治濕湯<sup>五</sup> 索氏三和湯<sup>五</sup> 紫蘊子湯<sup>五</sup> 平肝飲子<sup>五</sup> 強中湯<sup>五</sup>

參香散<sup>五</sup> 溫胃湯<sup>五</sup> 參朮健脾湯<sup>五</sup> 啟峻湯<sup>五</sup> 壯原湯<sup>五</sup> 當歸活絡散<sup>五</sup>  
 散血消脹湯<sup>五</sup> 和血通經湯<sup>五</sup> 琥珀人參丸<sup>五</sup> 柴胡湯<sup>五</sup> 化積湯<sup>五</sup>  
 加味補中益氣湯<sup>五</sup> 高良陰陽攻積丸<sup>五</sup> 天仙藤散<sup>五</sup> 溼瀉湯<sup>五</sup>  
 木香檳榔丸<sup>五</sup> 消痞飲<sup>五</sup> 淨府湯<sup>五</sup>

利水

八正散<sup>五</sup> 五淋散<sup>六</sup> 必效散<sup>五</sup> 猪苓湯<sup>五</sup> 通關丸<sup>五</sup> 清肺飲子<sup>五</sup>  
 加味五苓散<sup>五</sup> 括蕁瞿麥丸<sup>五</sup> 生附子散<sup>五</sup> 參苓琥珀散<sup>五</sup>  
 海金沙散<sup>五</sup> 地髓湯<sup>五</sup>

面

升麻黃連湯<sup>十一</sup> 升麻附子湯<sup>十二</sup> 清上防風湯<sup>十三</sup> 鼠粘子散<sup>十四</sup>

耳

桂星散<sup>十五</sup> 滋腎通耳湯<sup>十六</sup> 犀角飲子<sup>十七</sup> 蔓荊子散<sup>十八</sup> 治耳風方<sup>十九</sup>

梔子清肝散<sup>二十</sup>

眼

洗肝散<sup>二十一</sup> 大明散<sup>二十二</sup> 養心明目湯<sup>二十三</sup> 泻火升陽湯<sup>二十四</sup> 四物龍膽湯<sup>二十五</sup>

東垣瀉熱黃連湯<sup>二十六</sup> 消毒飲<sup>二十七</sup> 羌活勝風湯<sup>二十八</sup> 人參補胃湯<sup>二十九</sup>

沖和養胃湯<sup>三十</sup> 加味十全大補湯<sup>三十一</sup> 龍氏日日晡<sup>三十二</sup> 一方<sup>三十三</sup>

助陽和血湯<sup>三十四</sup> 益氣聰明湯<sup>三十五</sup> 參茸湯<sup>三十六</sup> 久服不愈<sup>三十七</sup> 夜明散<sup>三十八</sup>

除風益損湯<sup>三十九</sup> 夜明橘皮湯<sup>四十</sup> 年少雀目<sup>四十一</sup>

鼻

麗澤通氣湯<sup>四十二</sup> 辛黃散<sup>四十三</sup>

口

涼膈散加減<sup>四十四</sup> 甘露飲<sup>四十五</sup> 綠袍散<sup>四十六</sup> 王損庵日<sup>四十七</sup> 龍氏日上焦<sup>四十八</sup>

舌

玄參升麻湯六音 清痰化痰湯六音 薛立齋日六音

牙齒

清胃散六音 加味清胃散六音 清胃保中湯六音 甘露飲子六音 定痛散六音

當歸連翹湯六音

唇

薏苡仁湯六音 王損庵日六音

咽喉

甘桔湯六音 清咽利膈湯六音 清涼散六音 利膈湯六音 滋陰降火湯六音

加味益氣湯六音 王損庵日六音 奇方六音 礪砂丹六音 烏龍膏六音

虫

理中安虻湯六音 椒梅湯六音 大七氣湯六音 烏梅丸六音 集效丸六音

膠艾箱飯湯六音

癰疽

癰疽初發六音 荆防敗毒散六音 內疎黃連湯六音 五香連翹湯六音

托裏榮衛湯六音 活命飲六音 飯香飲六音 四順清涼飲六音 參耆內托散六音

千金內托散六音

潰瘍

潰瘍膿潰而<sup>六音</sup>清熱消毒湯<sup>六音</sup>潰瘍十宣散<sup>六音</sup>千金內托散<sup>六音</sup>

竹葉黃耆湯<sup>六音</sup>補中益氣湯<sup>九音</sup>托裏溫中湯<sup>九音</sup>托裏清中湯<sup>九音</sup>

托裏和中湯<sup>九音</sup>托裏建中湯<sup>九音</sup>托裏定痛散<sup>九音</sup>九癰疽兼<sup>九音</sup>一法<sup>九音</sup>

癰疽秘方<sup>九音</sup>九癰疽一切<sup>七音</sup>

疔

追疔奪命湯<sup>七音</sup>一方<sup>七音</sup>拔毒方<sup>七音</sup>九疔瘡<sup>七音</sup>

九疔瘡有<sup>七音</sup>疔瘡熱甚<sup>七音</sup>一法用<sup>七音</sup>

瘰癧馬刀氣腫痰核

十六味流氣飲<sup>七音</sup>木香流氣飲<sup>七音</sup>山錫杖湯<sup>七音</sup>一方<sup>七音</sup>一方<sup>七音</sup>

流注

夫流注<sup>七音</sup>十全大補湯<sup>七音</sup>

風毒腫

人參敗毒散<sup>七音</sup>

下疳

消疳敗毒散<sup>七音</sup>龍膽瀉肝湯<sup>七音</sup>敷方<sup>七音</sup>

楊梅瘡結毒

消風敗毒散<sup>七百</sup> 二十四味風流飲<sup>七百</sup> 搜風解毒湯<sup>七百</sup> 瘡毒後狂亂<sup>七百</sup>

瘡毒後一身<sup>七百</sup> 因遺毒<sup>七百</sup> 遺毒下血<sup>七百</sup> 瘡毒或遺毒<sup>七百</sup>

便毒

便毒痛甚<sup>七百</sup> 黃耆內托散<sup>七百</sup> 一方<sup>七百</sup> 入方<sup>七百</sup> 敷方<sup>七百</sup> 又方<sup>七百</sup>

又方<sup>七百</sup> 一法<sup>七百</sup> 便毒血虛<sup>七百</sup>

疥瘡

升麻和氣飲<sup>七百</sup> 疥瘡因誤治<sup>七百</sup> 一法<sup>七百</sup>

癬瘡

敷方<sup>七百</sup> 神授衛生湯<sup>七百</sup>

癩瘡

敷方<sup>七百</sup> 癩瘡先用<sup>七百</sup> 一法<sup>七百</sup>

癩風

敷方<sup>七百</sup>

疥瘡

敷方<sup>七百</sup> 防風通聖散<sup>七百</sup>

附骨疽

附骨疽者七百

八物湯七百

多骨疽

多骨疽者七百

八味丸七百

囊癰

囊癰者七百

龍膽瀉肝湯七百

懸癰

懸癰者七百

龍膽瀉肝湯七百

腎癰

腎癰者七百

內托羌活湯七百

陰瘡

婦人陰瘡七百  
加味道遙散七百

傷寒發願

傷寒發而又七百  
十全大補湯七百

雜方

和漢經驗方 百餘方

醫方類聚

續編一方目

二十

烏集堂藏

烏集堂藏

總八百餘方

醫療手引草續編卷之六方目 畢

醫療手引草續編卷一

江川藏書

男 平安 玄順懿之 按補

門人 越前 尾崎正龍 再按

南部 前田元常 全

大和 伊藤元春 全

阿波 渡邊玄立 全

同州 堀 順伯 全

三河 滕謙齋烏巢先生著

發表

傷寒

桂枝湯一

桂枝三

芍藥三

甘草二

生姜三

大棗十二

右五味咬咀以水七升微火煮取三升仲景ハ後漢人ナリ漢時一兩ハ今日本ノ秤三

醫療手引草

續編一 發表

烏巢先生著

芟三分ナリ大棗モ日本ノ棗ヨリハ一倍ホドモ大ナリ約ス  
ルニ二十五枚ホドナリ五味合テ和ノ秤三十七枚目ナリ外  
二大棗二十五ホド此ヲ四分煎シ減シ三升ヲ取用漢ノ一升  
ハ和ノ一合五六タナリ然レバ七升ハ和ノ棗茶碗一合五六  
タホドヅ、七杯ナリ此ヲ四杯煎シ減シ三杯ヲ取用和升四  
合ハタナリ和常例ノ煎法ナレバ棗茶碗二杯二葉目十枚余  
棗四ツ入レハ九合二煎去滓適寒温服一升服已須更飲熱稀  
シ減ス甚々濃キ煎法也

粥一升餘以助茶カ温覆令一時許遍身熱々微似有汗者益佳  
此ナレバマスキヨシサレモソレ不可令如水流漓病必不除  
ヨリ多ク出ルコモアルベシ不苦若一服汗出病差停後服不必  
ナガレシタビルヨウニ多ク汗若一服汗出病差停後服不必  
スルハアシ、病必反テ不除若一服汗出病差停後服不必  
盡劑俗ニ一度用ルト云フ濃キ茶ヲ一度ニ一合五六タモ用  
ルホドニ大方一度ニテ差ルソレナレバアトハ用ルニ

不及若汗更服依前法

ノアンバイガ違フモノ今デモ感冒ニ茶ヲ用テ三ヨ此アン  
バイナリソレナラバ更ニ服セヨソレデモアンバイヨク汗  
セズ又汗後服小促役其間半日許令三服盡

ヨ大抵ハ半日ニ二若病重者一日一夜服一劑一升三合和升  
度用ルト三ユル也若病重者一日一夜服一劑一升三合和升  
ヲ一日一夜ニ用ル大抵ナレバ周時一劑一升三合和升  
一劑ヲ二日ホドニモ用ルナリ周時一劑一升三合和升

劑盡病證猶在者更作服

テモアンバイヨク汗ガ出テ禁生冷粘滑肉麩五辛酒酪臭惡  
不差二三劑モ用ルコモアリ若汗不出者乃服至二三劑レソ  
等物此ガ茶ニ反スルモノデモ無レモ此類  
ヲ飲食スレバ茶ノ功ガナイモノナリ

破酒藥手引草 續編一 發表 二 烏巢堂

張璐曰此方專主衛受風邪之證以其衛傷不能外固而自汗所以用桂枝之辛發其邪即用芍藥之酸助其陰然一散枝一收藥又須甘草以和其胃况發汗必須辛甘以行陽故復以生姜佐桂枝大專佐甘草也又曰按桂枝入心血藥也而仲景用以治風傷衛之證麻黃走肺氣藥也而仲景用以治寒傷營之證皆氣病用血藥血病用氣藥故許學士有脈浮而緩風傷營浮緊兼瀼寒傷衛之誤殊不知風傷衛則衛受邪衛受邪則不能內護於營故營氣不固而自汗必以桂枝血藥透達營衛又須芍藥護營固表營衛和而自汗愈矣寒傷營則營受邪營受邪則不能外通於衛故氣鬱而無汗必以麻黃氣藥開通腠理又須桂枝實營散邪汗大泄而鬱熱散矣

此藥冬月正傷寒表證太陽膀胱經中風頭痛項強發熱惡風汗出瀼々惡寒漸々惡風翕々發熱鼻鳴乾嘔者主之

○服法如本書此後漢ノ分量ナリ後世ハ異邦モ段々違テクル况ヤ日本ヲヤ時代土地風俗ニテサマクノ遠アリ一定ノ法ナシトイヘ臣仲景ハ方祖ナリ卷首ニ載ル方ナレバ如是詳ニ記メ上代ノ方ヲ見セ令ルナリ

○此方意ヲ考ルニ桂枝ハ發汗解表ノ藥ナリ芍藥ハ補助陰收

欵スル一散一收ノモメヤヒニテ微汗ニツレテ風邪去ル此症  
モトヨリ汗出ルト云ヘ凡ハツミナシニ汗ノ出夕計ニテハ邪  
ハ不去モノナリ一散一收ノモメアフハツミニテ汗ニツレテ  
邪去ルナリ甘草生姜大棗ヲ佐トスル訣張璐ノ説ノ如シ  
○上ニ挙ル營衛氣血風寒ノ論許叔微ガ誤ヲ云ヌ又麻黃湯ノ  
下ニモ此議ヲ論シ汪石山李瀕湖ガ説ヲ載スル右ノ論イカフ  
ムツカシキ論ニテ傷寒論デ無レバスマヌ故略之予竊ニ説ア  
リアノ如クムツカシク論ノハ未熟ノモノ意得ガタシ先何ノ  
ヲナシニ麻黃桂枝ノ二味凡ニ辛溫發汗ノ菜ナリ麻黃ハツヨ  
ク發汗シ桂枝ハヤワラカニ發汗ス麻黃ハ瀉菜桂枝ハ補菜也  
營衛ノ差別ナシニ皆發汗ノ菜ナリ桂枝湯ハ芍薬ト同用ノ解  
肌ノ菜トスルナリ麻黃湯ハ瀉劑ナリ桂枝湯ハ補劑ナリ虛弱

ノ人ニハ麻黃湯ヲ用ベキ症ト云ヘ凡桂枝湯ニ加減ノ可用也  
凡小建中湯黃耆建中湯當歸建中湯等ノ補劑ハ皆此方ヨリ來  
レリ後世氣血兼補ノ劑ハ皆建中湯ノ意也仲景此方ヲモツテ  
傷寒開卷第一ノ主劑トスル微意自ラ存ス仲景ハ百世ノ方祖  
ナリ桂枝湯ハ仲景ノ方中ニ於テ亦方祖ナリ

此方本證主用例

此湯ヲ與ヘテ風邪不解反テ煩熱スルニハ風池風府ノ穴ヲ刺  
テ督脈ヲ通ズレバ差若シ茶ヲ加減セバ羌活細辛薑本ヲ加テ  
刺法ニ代ルナリ○麻黃湯其外發汗ノ菜ヲ用テ一旦解シテ後  
半日計スギテ復脈浮數煩熱セバ重子テ強ク發汗スルヲハア  
シ、用此湯補フナリニ發汗スベシ○汗吐下ノ後身疼不止表

證不解此湯ヲ與ヘテ營衛ヲ調和スベシ再ビ麻黃湯ノ類ハ不  
可用○大汗出テ後脈ナホ洪大ナルモノニハ復此湯ヲ與フベ  
シ○若如瘧一日ニ二度計發スル者ニハ桂枝湯ニ貼麻黃湯一  
貼合劑ニノ與レバ汗出テ瘧ユ此ヲ名桂枝二麻黃一湯○病人  
煩煖汗出レバ解ス又如瘧午後ヨリ發瘧スルバ陽明ノ症トナ  
ル脈實ナルモノハ府症ナリ下劑ヲ用ベシ脈虛スルモノハ經  
証ナリ此湯ヲ與ヘテ發汗スベシ○病人身太寒衣ヲ近ケン  
ヲ不欲ハ其人素リ熱ヲ畜ヘテソレヲ寒邪デ閉テ内ニ鬱スル  
ナリ寒ハ皮膚ニアリ熱ハ骨髓ニアリ此湯加黃芩○風傷衛之  
證中ニワヅカニ陽明ノ一症ヲ見サバ此湯加葛根寒傷榮之證  
中ニワヅカニ陽明ノ一症ヲアラハサバ麻黃湯加葛根○傷寒  
六七日不大便頭痛有熱モノニハ承氣湯ヲ與フ若小便ガ清ム

ナラバ表証ナリ可發汗若頭痛ノアルモノハ必衄血スルモノ  
ナリ可用此湯○發汗ノ藥ヲ用テ後惡風シ小便難ク四肢スク  
ニヒツハルニハ此湯加附子○三陰轉ノ肌表ニ出ル丁アリ太  
陰ノ証轉ズルハ脈浮ナリ此湯ニテ發汗ベシ○少陰ノ中風ト  
云丁アリ噤寒ヲ恐レテ厥冷セヌ病人自云ハ腹ガ滿ルト云  
レヲ按シテミレバマハラカナリ大便秘シ小便頻數吐セント  
欲ソ不吐卧ノ起ント欲ス恍惚多驚鑿ル様ニテ食スレバツカ  
ヘル舌上灰黑或淡紫帶青脈弦細浮弱此ガイカフムツカレキ  
症ナリ傷寒論ニハ無レ凡此ヲ少陰ノ中風ト云ナリ桂枝人參  
湯ニ葱白生附子ヲ加ルナリ

此方雜病活用例

**感冒**

凡冬月ノ感冒通ノ此湯ニ加減シテ用ベシ

**風濕**

一身重着痛楚不能轉側風濕ナリ此湯加附子

**頸項痛**

**邪三陽經ニ客スレバ頸項強ク痛ム寒邪ナレバ筋急ナリ風邪ナレバ筋弛ル此湯加葛根然レ疔痰疔ニ此ガ多キモノナリニ**

**陳湯加酒黃**

腰痛兼外邪ニハ用此湯表邪ヲ解スレバ裏氣カ疏通シテ痛三少シ緩ル寒邪ニハ加附子

**芩羌活紅花**

**腰痛** 感風欬嗽スルハ脉浮惡風自汗或身熱發熱鼻塞リ或清涕

**欬嗽**

ヲ流シ語未竟ノ欬又此湯加淡豆豉細辛然ルニ火嗽モ又

**流清涕語未竟ノ欬又但シ風欬ハ**

酒後風ニ中リ汗多ノ欬ス

**痰潤ヒ火欬ハ急ニ欬ノ痰無シ**

此ヲ漏風ト云此湯加澤瀉

**白朮麻**

惡風ノ欬嗽スルニハ此湯加人參杏仁五味子喘

**黃根**

ニハ此湯加杏仁嗽ニハ加五味子渴ニハ加人參

**火動ノ人客邪アツテ欬嗽者此湯加牡丹皮牡丹皮ハ陰虛**

ノ瀉火ウチニ辛味アツテ解表ヲ兼子極メテ良法ナリ

**下焦虛ノ精滑遺精ナド**

宋龐安常云桂枝湯ノ病症ハ常ニ自

**スルニ此湯加竜骨牡蛎**

汗出テ小便不數手足温和ニ手足ノ

**指外へ露ルレバ少シ冷ル此ヲ覆へバ温ニナル渾身熱シ微煩**

ノ又憎寒ス始メテ可用此湯○謙云此虛寒ノ疔ナリ如此ノ病

**疔ナレバ誰ニテモ桂枝湯ヲ用ベシ隨分タシカナル云分ナリ**

此疔アツテ始テ此湯ヲ用ヨト云ハアミリ用心深キヤウナレ

**疔渾身熱シ微煩スルト云ニ若シ熱疔テハナイカト疑アツテ**

不用トモアルベシサレ疔熱症ニ

**テハナイホドニ無疑可用ナリ**

利止テ身痛不止モノハ

**此湯ヲ小劑ニシテ用ユベシ**

婦人陰腫

**婦人陰腫**

婦人陰門腫痛スルハ風

**霍乱**

冬月或初春暮秋霍乱吐

**利止テ身痛不止モノハ**

此湯ヲ小劑ニシテ用ユベシ

熱陰經二客タリ此湯加羌  
活防風荆芥當歸細辛木通  
**惡阻** 婦人惡阻ニ此湯  
ヲ用ルコトアリ  
**小兒傷寒** 小兒  
發熱

時ニ遍身痒キハ此表虚ノ中風  
寒也此湯加黃耆防風白芷蟬脫  
**小兒陰腫** 小兒強啼テ不止陰器  
ヲ動シ結聚ノ不散

凡腫レ大イナル者ハ此  
湯加細辛當歸木香蠅尾  
**痘瘡** 痘瘡身面起發ノ四肢不  
同 痘瘡可痴  
トキ發熱

惡寒身痛面青瘡不收モノハ風ヲ引タ  
ルモノナリ此湯加防風荆芥淡豆豉

**此湯不可用例**

其人素多濕熱モノニ此湯ヲ用レバ吐スルモノナリ後ハ吐膿  
血丁モアリ若不濕熱シテ此湯ヲ用テ吐スルナラバ加半夏ト  
載元禮ガ云ヘリ○酒客ニハ不可用此湯酒客ハ不喜甘故ニ嘔

**傷寒**

吐スルモノナリ謙云甘キライヤガル計テモノナシ酒客ニ用レ  
ハ嘔吐せずト云ヘレ胸ガ  
トキくスルト云モノナリ

疎邪實表湯ニ 治冬月正傷風頭痛發熱惡寒脊強脈浮緩自汗

為表證此足太陽膀胱經受邪當實表散邪無汗者不可服

桂枝 芍藥 甘草 防風 川芎 羌活 白朮

水一鍾姜三片棗二枚槌法 六書中 殺車槌 加膠飴二匙煎之溫服○如

汗不止加黃耆○喘加柴胡 疑前 胡歎 杏仁○胸中飽悶加枳殼桔梗

此方陶節菴ガ仲景ノ桂枝湯ニ加味シタルモノナリ回春等ニ  
ハ陶氏桂枝湯ト稱ス陶氏ガ意ハ方下ニ云如ク正傷寒ノ藥ナ

發熱編一發表  
七  
烏巢堂

レ正傷寒ニハ原方ノ桂枝湯デヨヒ此様ナ雜駁ノ藥ハ用ヒ  
 ラレ又畢竟感冒ノ藥ト意得ベシ故ニ此書ニハ感冒門攝入ス  
 ○方意此方桂枝湯ニ加味羌活防風川芎白朮丹水子纂言方考  
 云肝風恐傳脾土加白朮助脾土太陽惡風頭痛不可無川芎羌活  
 防風ト云ヘリ予云此方考少シアラク見ユル羌活川芎ト同用  
 スレバ太陽厥陰ノ頭痛ヲ治ス防風ハ足太陽ノ治風去濕ノ仙  
 藥ナリ白朮燥濕補脾凡此藥陶氏ガ意ハ傷寒ノ藥ト云ヘ氏今  
 活ノ感冒ニ用ヒシナラバ風邪ニ兼濕症ニ用ベシ羌活防風ハ  
 除風濕藥川芎モ又除濕治頭痛藥ナリ白朮ハモトヨリ燥濕ノ  
 藥ナリ叔桂枝湯ニ加減ノ用ヒシナラバ此方ニ限ル丁ニテハ  
 ナシ臨時因症種々ノ加減アルベシ詳ニ升麻發表湯ノ下ニ論  
 ス考ベシ丹水子桂枝湯ニ加味ノ和解湯ヲ制セラレタリ上編

ニ見ヘタリ然レ氏此俱ニ一定ノ法  
 ヲ定ルハアメリ好ム丁ニテハナシ

**感冒**

麻黃湯<sup>三</sup>

麻黃

杏仁

各一分

桂枝

八分

甘草

四分

右四味以水二盞四分先煮麻黃減二分去上沫入諸藥煎六分

溫服覆取微似汗不須啜粥 此モ本方ノ刻合ノ分兩ナリ四味合ノ三々六分ニ水ニ合四勺入六

勺ニ煎シ減スレバ桂枝湯ニ比スレハ尚々濃キ煎湯ナリ此  
 モ時方ニ隨ヒニ貼ニ分チ一々八分トメ水四杯入一杯ニ煎  
 シ三度ニ用ベシ此湯發汗強キユヘ熱粥ヲ啜テ藥力ヲ助ク  
 ルニ不及ナリ餘ハ桂枝湯ノ服法ノ如シ本論ニ詳ナリ

張璐曰夫寒傷營則營血受病而見骨節煩疼 營血寒邪ヲ受凝テ不流故ニ骨節煩疼

ス尤當矣其苦ノ何反腠理閉密無汗而喘耶衛ニ病ハナイニ  
ナリ腠理ガ閉密ノ喘スル蒸鬱既受傷於内必無衛氣獨和於外之理  
ナリ蒸鬱既受傷於内必無衛氣獨和於外之理衛氣カニヒナシニ外ニ  
和ノ有ルベキ道理ナレ所以用麻黃發汗必兼桂枝以和營用  
杏仁者所以散氣除喘用甘草者所以助陽和衛營衛流行始能  
作汗也按時珍云仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代名  
醫未有究其精微者夫津液為汗即血也在營即為血在衛即為  
汗寒傷營營血不能外通於衛衛氣閉固故無汗發熱惡風是麻黃湯  
傷衛衛氣不能內護於營營氣不固故有汗發熱惡風是麻黃湯

雖大陽發汗重劑實為發散肺經火鬱之藥

正氣内ニ鬱閉スレバ熱トナツテ火邪

肺經ニ鬱

スルナリ桂枝湯雖大陽解肌輕劑實為理脾

補劑ナレバナリ救肺之

藥也又汪石山云辛甘發散為陽

此甘草ヲ用ル意ヲ説ク

仲景發表藥中必

用甘草以載住邪氣不使陷入陰分也若邪既入重裏則

モハヤ裏ニハレバ

表ヲ發スル

内臍脹必無復用甘草之理試觀五苓抵當承氣大

柴陷胸十棗輩並不用甘草也惟調胃桃核二湯

此ニ方ハ重症ノ藥ト云ヘ凡

甘草ヲ用ユル訣ハミタ太陽ノ表邪ヲ兼ルナリ以其尚兼太陽部分之表邪故不得不

用也當知發汗藥中之甘草必不用少

兔角發散ノ案ニハ必甘草ヲ少クト云フハナシ

此湯麻黃湯也須脈證全在於表方可用之脈毛証毛病力全ク表ニアルモノニ於ニ可用之

若脈微弱自汗者不可用也麻黃湯ヲ用ベキ症ナレドモ令人但執一二日在

表並宜發汗設尺中弦數虛大此麻黃湯ヲ不可用ノ脈ナリ為陰虛多火汗之

則亢陽熱厥而死尺中遲弱足冷為陽虛夾陰夾虛寒汗之則亡

陽厥逆而死可不慎歟

此茶冬月正傷寒太陽膀胱經ノ證頭痛項強リ惡寒發熱身疼腰痛嘔逆脈浮緊無汗喘者主之此即麻黃湯正面ノ的證ナリ

○方意張璐說ニ詳ナリ寒邪營ヲ傷リ營血凝テ不流衛氣ト不和然ルニ内營血ガ傷ル、カラハ衛氣モ邪ヲ受ズカマヒナヒ

十云理ナシ衛氣モ又寒邪ノ為ニ鬱閉セラレテ邪熱トナルソレカ内ニ攻テ肺氣ガ沸鬱ス麻黃ハ發汗皮毛ノ氣ヲ温メ去邪泄寒實故ニ麻黃ヲ主トシ桂枝ト同用ノ營分ノ邪ヲ引出シ肌表ニ達スニ味臣ニ發汗ノ要薬ナリ切用甘草和之佐スルニ杏仁ヲ用ユ杏仁ハ潤下ノ性喘逆ヲ止ル甘草ハ助陽氣和衛衛氣流下メ始メテ能汗ヲナスナリ

此方本證主用例

此湯ノ證ニノ病八九日マデ不解凡病仍太陽經ニアルホドニ用此湯發汗ノ愈ユ若此湯ヲ服シ已テ煩熱目瞑シ劇モノハ血ス病欲解ナリ○太陽陽明ノ合病喘ノ胸滿ルモノ表ニ属ス此方ヲ用テ發汗メヨシ○病人身大熱反テ衣服ヲ近ケン丁ヲ欲スルハ熱皮膚ニアリ寒骨髓ニアリ此素リ虛寒ノ人邪ニ感メ

皮膚熱スト云へ凡寒骨髓ニアリ用此湯發汗スベシ○小兒ノ傷寒發熱效ハ頭面熱者

千金方用此湯加石膏

此方雜病活用例

**濕** 濕家身煩疼此湯加白

木四兩名麻黃加木湯

**戰慄**

凡人陽虛ハタゞ畏寒又陽鬱スレバ振寒戰慄スルモノナリソレデ

戰慄ハ大抵熱ニ属ス若又暴ニ寒邪ニ中テ脈伏ハ戰慄セバ此湯ヲ用テ發散スベシ

**衄血**

太陽ノ衄血及ビ服桂枝湯衄

血スルモノハヨキナリ邪自ラ解セントスルナリ衄ノ血流ル、モノハ少刻ノ間ニ解ス若點滴ノ不流モノハ邪氣經ニアツテ不解脈浮緊身疼發熱無汗者ハ用此湯汗之若三時ノ感冒ナラバ香薷散加葱白淡豆豉或參薷飲ニテ汗之若脈浮緊ナラ

ズ身無熱モノハ不可發汗

**風毒腫**

盧廉夫云一人形實シ色黒ク背ニ生紅腫解骨ノ下ニ近シ痛甚ク脈弦數ニノ洪緊

正冬ノ月ナリ麻黃桂枝湯加酒黃柏生附子括蕒仁甘

**痘**

李挺云痘初起

草節着活人參青皮黃耆半夏生姜六貼ニシテ消ス

**中風**

老医傳云一男冬日行長途六七日歸家渾身壯熱疼痛

手足攣瘳惡寒頭痛胸膈疼痛喘滿面赤大便不通小便澁滯脈緊

有力用此湯四貼汗出病症減脈浮煩渴引飲微熱用升麻葛根

湯ニ貼煩渴微熱止頭微痛微效加川芎白芷謙按此

症初用麻黃湯者喘滿脈浮緊有力ヲ目アテトス

**感冒**

升麻發表湯陶

治冬月正傷寒頭痛發熱惡寒脊強脈浮緊無汗

醫藥手引草

續編一 發表

十一

烏巢堂

為表證此足太陽膀胱經受邪當發汗以頭如斧聲身如火熾者

宜用此湯 麻黃 桂枝 甘草 杏仁 升麻 川芎

防風 白芷 羌活 水二鍾姜三片葱白二莖槌法加汗

西荳豉一撮煎之熱服取汗如神宜厚被覆首九中病即止不得

多服多則反加別病矣○本經發熱惡寒頭痛無汗而喘者本方

加乾葛升麻ヨリ乾葛ガ去升麻○本經發熱惡寒身體痛者本

方加蒼朮芍藥去杏仁身ノ痛ハ兼濕ユヘニ蒼朮除濕ノ薬ナ

ノ出ルヲ好ニズ○本經惡寒發熱身痒面赤者以其不得小汗出故也

本方去白芷升麻杏仁加柴胡芍藥此三味ヲ去ルニレヒテ思

汗鬱ノ身痒面赤加○本經頭痛發熱惡寒忽然飽悶者本方

芍藥涼血柴胡解熱加枳殼桔梗枳殼快○本經感寒深重服湯不作汗者宜再服至

二三劑而汗不出者死○本經汗後不解者宜再服量證輕重用

麻黃升麻分多寡為當麻黃ハ太陽ノ薬升

方意陶氏力意ハ傷寒ヲ治スト云ヘ凡今按スルニ冬月感冒ノ

重キ症頭痛スグレテ甚シク熱熾ルガ如キ症ニモチユベシ

○丹水子云此麻黃湯ニ加味シタルモノナリ邪太陽經ニアレ

ハ川芎羌活不可無惡寒アルモノハ必惡風アリ防風不可無升

及通經二劑 貴編一發表 十二 烏巢堂

麻白芷ハ陽明經ノ薬ト云ヘ氏能散邪達外又頭痛スル  
 ノハ必陽明經ノ頭痛ヲ兼ルモノナレハ用ト云  
 ○疎邪實表湯升麻發表湯ノ二方ハ陶節庵カ即仲景ノ桂枝湯  
 麻黃湯ニ加味シタルモノナリ是ニツイテ丹水子纂言方考ニ  
 論ヲ設テ為説友松子其説ヲ評議ノ其非ヲ格ス纂言方考ノ頭  
 書ニ詳ナリ謙兩子ノ説ヲ熟覽スルニ丹水子ノ説旨ハヨシト  
 云ヘ氏語ニ病アリソレユヘ友松子ノ為ニ非トセラル友松子  
 ノ説ツマニル所感冒ノ薬トスルニ似タリ尤サモ有ベキナリ  
 謙重子テ謂ヘリ陶節庵ガ仲景ノ方ニ加味ノ改名テ一方ト立  
 ルト此ニ方ニ限ラズ小柴胡白虎理中湯ノ類皆如是仲景ハ大  
 匠ニシテ其本ヲ治スレバ標ハ不治ノ自ラ愈ルタトヘバ太陽ノ  
 症桂枝湯麻黃湯ヲ用テ其風寒ヲ去レバ頭痛發熱等ノ症自ラ

除クナリ陶節庵ガ細工ニ標本兼治ス傷寒ハ重病ナリ其本計  
 ヲ治メモ仍薬カノトミカザルヲ恐ル標ヲ兼治スルニ暇ア  
 ラズ然レバ陶氏ガ方ハ傷寒ノ輕症ニ可  
 用故此ニ方ヲ感冒門ニ攝入スルナリ

傷寒

小青龍湯五寒

麻黃

芍藥

乾薑

甘草

桂枝

細辛

五味子

半夏

右八味以水二盞先煮麻黃減二分去上沫入諸薬煎六分去渣

温服之

若微利者去麻黃加薤花一錢二分

本方ハ發熱

水藥薤花ハ利水ノ薬ナリ

若渴者去半夏加栝藹根三分

若噎者去麻黃加附子三分炮水寒ノ氣裏ニ相搏○若小便

不利小腹滿去麻黃加茯苓四分○若喘者去麻黃加杏仁三分

此モ本方割合ノ分兩ハ味合ノ三枚ヲ水ニ合入六勺ニ煎ス  
ヤハリ時方ニ隨ヒニ貼トノ一枚五分ヲ水三杯入一盃ニ煎  
シ三度ニ用ルナリ麻黃ハ後世上沫ヲ去リ制スレバ先ツ麻  
黃ニ味ヲ煎シ二分ヲ減シ上沫ヲ去ルニ不及下皆做之

此藥太陽ノ正傷寒脈浮緩自汗身不痛但重ク乍輕キ時アリ少  
陰ノ症無ク或乾嘔或欬或渴或利或噎或小便利腹滿或喘心下  
有水氣者此湯主之此即此湯正面ノ的症ナリ蓋シ仲景風ト寒  
トヲ辨別スルト究メテ嚴密ナリ間ニ不容髮中風ニハ桂枝湯  
ヲ用井傷寒ニハ麻黃湯ヲ用ユ此卷首此二方ヲ以テ風寒ノ邪  
ヲ治スル兩大門ナリ筈ルニ風寒相交テ邪ヲ受ルモノアリ此

青竜湯ノ立ル所以ナリ其中寒多風少キモノアリ大青竜湯主  
之風多寒少キモノアリ小青竜湯主之此湯ハ風寒ノ為ニ營衛  
凡ニ傷レ風多寒少キモノニ用之其症脈浮緩身不痛ハ風ナリ  
身但重キハ寒ナリ乍輕キハ風ナリ此風多寒少ノ候ナリモ一  
ツソコニ念ヲ入レテ少陰ノ證無キモノト云ハ少陰ノ証モ身  
重ナリ但シ少陰ノ証ハ身重ノ但欲寐晝夜凡ニ身重ク但欲  
ナリ此湯ノ症ハ重キ片モアリ乍輕キ片モアル欲寐トハモト  
ヨリ無シ此指シ極々此湯ノ本証ナリ此外或乾嘔シ或欬ス或  
或ノ証ハ此内ニ一二三証モアルヘシ不殘ソロヘテアルトデ  
ハナイ此内ドレガアルト定リタルトモナイソレユヘ或々ト  
云ナリ水ト寒ト相搏テ其肺ヲ傷ル人身ニ積蓄ル所ノ水飲ガ  
或升リ或降り或熱シ或冷ヘ種々不同ト云ヘ凡肺ヲ惣司トス

發表  
十四

ルナリ病本風寒多寒少証ユヘニ桂枝湯ヲ用テ散風邪加麻黃治  
寒邪水飲ガ滯テ欬嗽スルユヘニ用半夏治水飲ヲセニ水飲ガ  
滯ルナレバ人ノ肺ノ藏ハ常ニ水液ヲ停ル其肺液ガ升レハ清  
涕トナリ降レバ心下ニ留テ水飲トナル其上此症鬱熱ニ因テ  
咽ガ乾ク必湯水ヲ多ク飲ムモノナリ細辛干姜ヲ用テ水飲ノ  
結ヲ散シ加五味子欬嗽ヲ治ス尚加減ノ法本文ニ詳ナリ

此方本證主用例

水飲ハ肺ノ液ナリ肺金ハ水ヲ生スルヲ主トス皮毛ハ肺ノ合  
ナリ風寒皮毛ヲ傷レバ肺先受之其水液ヲ下焦腎へ行ル丁能  
ス中脘ニ停留ノ欬喘乾嘔種々ノ症トナル用此湯風寒ヲ發散  
ス○表証熱アルニヨツテ水飲心下ニ滯リテ喘欬自利ス此湯  
ニ加減ノ用之輕キモノハ五苓散ニ加減ノ佳ナリ○上ノ條ハ

肺自生スル所ノ水此條ハ水飲心下ニ滯ルナレバ胃水ナリ○  
本証小便不利者ニ

ハ去麻黃加茯苓

此方雜病活用例

**感冒** 房事ノ後中風其面<sup>附</sup>腫然トムツケタ顔色ニテ欬者此湯  
去麻黃加杏仁甚ニキ片ハ加附子先去客邪次ニ真武湯ヲ

用テ治本後八味丸ヲ用テ調理ス或曰

脉浮緊ハ小青竜湯沉緊ハ用真武湯

痰飲

内經所謂溢飲ハ渴  
ノ暴飲スソレガ流

レテ肌皮腸胃ノ外

欬嗽

欬嗽倚息不得卧ニハ此湯主之  
倚息ハ俗ニ云肩テ息ヲスル丁

同

上氣  
ノ水

雞ノ声ヲナスモノハ此湯主之此藥發表下氣潤燥開痰右ノ四

ツノ功此一方ニ備ル水

**同**

痰逆勢甚キ者此湯加石膏稟

**喘哮**

症

雞ノ声トハ蛙ノ声ナリ

氣モト虚者炙甘草湯ニ宜シ

**脚氣**

脚

多少寒包熱邪寒ニ遇ヘバ即發ス喉中水雞ノ声ヲナス

**脚氣**

氣

積痰肺絡ノ中ニアリ以此湯探吐ス年高氣弱者忌吐

**水腫**

腫

肺ニ迫リテ喘嗽

**肺脹**

肺脹欬ノ上氣シ煩躁ノ喘シ脈浮

**水腫**

腫

者此湯加攢柳

者心下ニ水氣アリ此湯加石膏

**水腫**

腫

病暴ニ發シ脈浮喘滿欬逆煩熱者此湯主之若上

**痿厥**

秋濕ニ傷

熱戴陽下虚足冷者此湯去麻黃加熟附子減半

ラレ上逆

ノ欬シ發シ痿厥トナ

ル此湯去麻黃加羌活

**傷寒**

大青龍湯六寒

麻黃

石膏

各一分

桂枝

甘草

各四分

杏仁二分

生薑

大棗

各六分

右七味以水一盞八分煎六分去渣温服之取微似汗出多者温

粉粉之一服汗若停後服

汗多止陽遂虚惡○此モ本方ノ刻合

合ノ四匁六分半ヲ水一合八勺入六勺ニ煎ス此モ時方ニ隨

ヒ二貼ニ分チ二匁三分餘ニ水三杯入一杯ニ煎シ三度ニ用

麻黃上沫ヲ去ニ不及ナリ温粉ノ方明理論ニ見ヘタリ

此藥太陽ノ証脈浮緊發熱惡寒不汗出ノ煩躁者主之此方モ亦  
風寒ノ為ニ當衛氏ニ傷レテ寒多風少モノニ用ユル藥也脈浮  
緊發熱惡寒身疼痛ハ皆寒邪ナリ然ルニ本經太陽ノ中風ト云  
ハ難意得ヤウナレ凡不汗出ノ三字ニ氣ヲ付テ見ルベシ無汗  
ト不汗出ノ語意不同無汗ハ始カラ汗ノナイト不汗出トハ元

來微汗アリソレカ寒邪ノ為ニ閉ラレテ汗ガ不透内ニ鬱閉シ  
營熱甚シソレユヘ麻黄桂枝ノ二方ヲ合シ去芍藥ハ收飲ヲ忌  
ムナリ麻黄ヲ倍用スルハ發散ヲ急ニスルナリ加石膏ハ煩躁  
ヲ解スルナリ此方無汗ノ煩躁ヲ解スルナリ若有汗ノ煩躁  
躁ニ大イニ忌ム勿用有汗ノ煩躁ニハ眞武湯ヲ用ユベシ

感冒

三拗湯 七局

治感冒風邪鼻塞重語音不出或傷風傷冷頭痛目

眩四肢抱倦欬嗽多痰胸滿氣短

麻黄 不去節

杏仁 不去皮尖

甘草 生用各等分

右為麤末每服五錢

水一盞半姜五片同煎至一盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微

汗為度

按方下主治風邪ニ感冒スト云ヘ其方ヲ見ルニ風寒ニ感  
冒スル藥ト意得ベシ鼻塞重ハ風寒ニ此候アリ語音不出  
ハ寒邪鬱閉ノ肺ニ火邪アリ頭痛目眩以下ノ候皆風寒ニ感冒  
スル的症ナリ此茶局方ニ載スル仲景ノ麻黄湯去桂枝多ク用  
甘草夫傷寒ハ邪深ノ營血ヲ傷ル故ニ桂枝ヲ用テ營血ノ邪ヲ  
引出ノ肌表ニ達ス感冒ハ膚淺ノ邪風寒但肌膚ヲ閉テ無汗正  
氣鬱セラレテ右ノ諸症ヲ見スト云ヘ其營血ニハ無傷故ニ但  
麻黄ヲ用テ衛氣ヲ發スル片ハ不及用桂枝生甘草ヲ等分ニ用  
テ瀉火其上麻黄慄悍ノ氣ヲ恐レ  
テ以甘草麻黄辛烈ノ氣ヲ和ク

此茶多ク甘草ヲ用ヒ麻黃ト等分ニスル然ルニ本邦ノ人甘  
キヲ不喜常ニ甘草ヲ少計用ユ若シ此茶甘草ヲ減スルハ制  
法ノ意ニ不遂異邦ノ先輩此方ヲ用ルヲ考ルニ丹溪景岳ニ氣  
實ノ人誤テ服黃耆ニヨツテ發喘スルニ用ユ又医通ヲ按スル  
ニ風寒傷肺效嗽スル者ニ誤テ五味子瓜蒌仁五倍子ノ類ヲ用  
テ收斂スルニ因テ肺氣壅リ喘嗽スルモノニ用ユ今テ此方ヲ  
用ルナラバ此例ニ從フテ用ベシ或先輩感寒ノ效嗽ニ參蘓  
飲ニ麻黃杏仁ヲ加ルモ又參蘓飲ト此湯合方ニスル者ナリ

此方他病活用例

夜效

風寒鬱熱夜效嗽甚  
久嗽年月ヲ經テ不愈此風寒ノ邪  
者此湯加黃芩知母  
久嗽  
久シク肺胃ノ間ニ客ス勞嗽ト不

同用此湯佐スルニ以テ諸湯瘦人多火ニ用ユルコト勿レ

感冒

治非時感冒  
蘓葉 柴胡各二 川芎 葛根

枳殼 桔梗 陳皮 半夏 茯苓各 甘草七 生薑三 大棗一

右水煎去滓執眼溫覆取微汗  
紫蘓柴胡倍餘茶  
專發表解熱之功  
○本方去川芎

柴胡加入參前胡木香名參蘓飲  
○按此為治非時感冒之首劑

非正傷寒藥也方中蘓葉葛四味為通治三陽經外感葉而獨

推蘓蘓二味名方者其重在於邪傷血分也更合之以陳治內

傷飲食加枳殼寬膈利痰誠為總司外內之良方而無引賊破家

之虞宜乎世所共推也其參蘓飲方即此湯去川芎柴胡而易人

發表 十八

參前胡木香之制其臣在於氣分也昔人有用芎藭散不解用參  
藭飲即解之說意在人參有兼補之功殊不知其為氣血兩途也

按此為治此論傷寒緒論二出ス感冒ノ首劑トハ凡感冒ハ膚淺  
ノ邪ナレバ至極不當ト云ヘ凡愈ルモノナリ若シ的當ノ劑ヲ  
云バ此方ナルユヘ首劑トスルナリ論中芎藭散參藭飲ノ二湯  
ニ於テ傷氣分傷血分ノ論アリト云ヘ凡今感冒ノ症ヲ見ルニ  
某ノ症ハ血分ノ傷レ某ノ症ハ氣分ヲ傷ルト指シ示ス所アラ  
バ尤ナレ凡ソウ云丁ハナクテ此方名川芎紫藭ノ二味ヲ推ノ  
芎藭散ト名クルト云意ヲ以テ血分ノ茶トスルト云々計ニテ  
ハ今受用ニ成難シ昔人芎藭散ヲ用テ効アラザルニ參藭飲ヲ  
用テ効アルハ人參補助ノカト云ヘ凡ソレニハ非ズタ、氣分

血分ノ意アリト云謙思ヘリ此說一理アルマウナレ凡病状ニ  
ツイテ氣血ノ分ヲ別タザレバ此又何ト云丁マラ知レ又恐ラ  
クハ昔人ノ説是ト為ベシ蓋シ芎藭散參藭飲ニ方ノ別ハ芎藭  
散ハ頭痛ヲ主トシ參藭飲ハ欬嗽ヲ主トスナセナレバ川芎ハ  
頭痛ノ主茶ナリ前胡ハ風寒ノ欬嗽ヲ治ス如是辨別ノ可ナル  
ベシ○更合之以二陳医通内傷門ニ此方ニ消導ノ藥ヲ一二味  
ヲ加ヘテ停食ノ感冒ヲ治ス若シ食滯頗ル痞悶噯氣スルニ及  
バ、藿香正氣散ト云ヘリ枳桔ヲ用テ寬膈利痰此故ニ感冒ノ  
總司外内ノ良方トスソレユヘ柴胡少陽ノ茶葛根陽明ノ茶ア  
リト云ヘ凡引賊破家之虞ナシ故ニ  
世上推ノ感冒ノ首劑トスルナリ

此方他病活用例

**腫滿** 脹滿ノ人外邪ニ感シモ  
ト熱証ニ屬者可用此湯  
**積聚** 積聚ノ症ニ有  
表邪者宜此湯  
**咳嗽** 風寒ノ效  
嗽鼻塞声

重キニハ  
 宜此湯

**感冒**

參蘘飲九 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節關節凝滯兼以為熱  
 井宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法被ヲ以テ蓋ヒ白粥  
 以被蓋卧連進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐々服之自然平  
 治因痰飲發熱但連日頻進此茶以熱退為期不可預止痰飲ト  
 ガ紛ル、モノ俱ニ發熱ス幾日モ佳感冒ト  
 ツミケテ熱ノ退クマデ用ユベシ雖有前胡乾葛但能解肌耳

此二味微寒ノ茶ナレモ不苦  
 解肌マテニテ冷劑テハナシ  
 既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈

不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心此皆痰ノ開胃進食無以

踰此此茶ニ踰ル母以性涼為疑此方微冷ノ劑ナルヲ以テ寒

恐ル、コトハナシ一切ノ發熱一切發熱皆能取效不必拘其所

病因ニ拘ルコトナク皆効アリ  
 因也小兒室女亦宜服之  
 木香半 蘘葉 乾葛 半夏

前胡 人參 茯苓各七 枳殼各半 桔梗 甘草 陳皮各半

右咳嗽每服四錢水一盞半薑柒片棗一箇煎陸分去滓微熱服  
 不拘時候易簡方不用木香只拾味○初效嗽加杏仁桑白本○

發表 二十 烏集堂

久嗽加五味烏梅本症或痰 ○口乾加麥門天本症 ○嘔逆加藿

香砂仁本症或痰食 ○頭痛加川芎細辛本症 ○惡寒無汗欬嗽喘促傷

風無汗鼻塞重欬嗽并加麻黃杏仁本症寒邪強 ○肺多有熱加杏

仁黃芩桑白烏梅本症肺熱欬嗽 ○心下痞悶或胸煩熱或停酒不散或

饋雜惡心加黃連枳實倍用葛根陳皮痰火 ○胸滿痰多加葶仁痰燥

○心盛發熱加柴胡黃芩本症熱強 ○妊娠傷寒去夏加翻大抵忌半夏

此方前方芫蕪散加人參前胡木香去川芎柴胡治感冒功能大抵

同レ芫蕪散ニ比スレバ人參ノ補アリ故ニ虛人小兒妊娠ノ感

胃ニ宜用之前胡ハ下氣治欬喘感冒有效モノ尤宜シ木香ハ順

氣ノ某ニノ衛氣ノ凝滯ヲ行ラズ王節齋明醫雜著孫東穀醫家

必用去人參木香此ヲ先輩ドレモ苦口ニ非之尤ナリ然ルニ今

人モ亦常ニ去入參不用皆効ヲ得ナリ此方ノ意ニソムクト

云ヘバツラク思フニ此方去人參片ハ芫蕪散ニ似タルモノナ

リ芫蕪散ハモトヨリ感冒ノ首劑ナレバ効アルモ又尤ナリ然

レ凡體虛ノ人ニ本方ヲ用ベシ

此方本症主用例  
戴元禮云傷風既汗ノ後身熱不退ハ此湯加桂枝敗毒散ニ加ル

モ又可ナリ○又云先壅熱アルニヨツテ涼身一旦快シト云ヘ

凡外邪ニ中ラレテ風寒モアリ壅熱モアルニハ此湯倍桔梗

此方他病活用例

**發熱** 方下二云因痰飲發熱者 又云一切發熱不  
連日用此茶以熱退為期 **同** 拘其所因用之 **效嗽** 時行嗽惡  
寒頭痛鼻

塞氣急連欬不止始テ病ヲ得テ即枕 **中風** 友松子云胸滿痰多心  
二卧ス一兩日在テ亦輕此湯加細辛 下痞日久少不快後  
ハ類中風トナル者ナリ陳良甫用此方 **同** 一老婦卒中風不省人  
治之龔雲林モ亦以此方中風門ニ入ル **同** 事半身不遂口眼喎斜  
發熱痰喘醫者更ル々雜治功ナシ脈浮數ニノ滑與此方未應大  
劑トナシテ頻用十餘貼ニ至テ熱退キ喘止人事ヲ省ル此八十  
貼始瘳後用茯苓補心湯 感冒血血二ハ  
兼三合湯調理ノ收功 香蕪散加葱白

**喘欬** 氣促喘嗽本方 加知母貝母 **血血** 香蕪散加葱白

**效血** 效血加升麻生 地黃牡丹皮 **胸痛** 效嗽風痰  
胸痛宜此

**水腫** 本邦老醫傳云水腫諸醫無効  
ニ此方加木通大汗出テ愈

**急驚** 急驚風初發痰氣  
ノツカヘタルヨシ **妊娠** 妊娠ノ傷  
寒必用半

**泄瀉** 發熱下利用此湯或此  
湯加蓮肉白扁豆白朮

**疝** 小腸疝氣初發頭痛身熱  
憎寒壯熱此湯加木香

夏胎ヲオトスモノニテナシ按スルニ參蘇飲方中ニ半夏アリ  
ト云ヘ凡隨胎ホドノ害ナシ惡阻ニ古方家小半夏加茯苓湯或  
ハ金匱乾姜半夏人參丸ヲ用テ隨胎セ **悸** 胸悸ニ用胸中ニ痰ア  
シ丁屢見聞セリ此單方ナルユヘナリ **悸** ルカ水氣アルカ或積

カイヅレニテモ **虛煩** 病後虛煩ニ此湯去紫蘇倍人參加麥門或  
脈結スルヲアリ 煩發時ニ惡寒身不痛頭不痛但煩發スル

豆豉或此湯ニテ汗ス百二十  
方云此湯加烏梅麥門茅根

積痛一發表 二五二 烏巢

Kitasato Memorial Medical Library

此モ虚煩也又此湯去紫  
蕪倍人参或更加石膏

**傷寒**

傷寒裏症可下ノ症備テ表忘一ツ  
モ残テアラバ先典此湯表ヲ解ス

ベシ脉浮或胸項以上有

**同**

傷寒七八日小柴胡ノ類ノ寒涼ヲ用  
テ不効邪熱裏へ入

汗ハ表証ノ目ツケナリ

**同**

毒湯涼膈散ナド用ニカト思フ症ニ此方ヲ用テ表ヲヒラキテ  
ヨシ脉數謔言口乾口敗レナドスルサレモ脹滿モ世又ゾ熱ヲ

強クサケサントセバ加柴胡黃芩黃

**勞役感冒**

老醫傳云勞役人ノ感冒可用補中

連若大便難ハ大柴胡湯ヲ用ユベシ  
益氣湯症ニノ喘效氣促スルモノニ此湯加杏仁棗白或茯苓補

心湯ニ加味ニ并ニ小劑ニ修合シ人参倍用或合半ヲ加ル丁ア

リ此ハ此湯ニ宿ヲ借リテ人参ヲ可用意得ナリ右ノ症ニ中焦  
不行モノニハ八解散ノ類ニ宿ヲ借リテ人参ヲ多用スル丁ア

此奇效經

**臂痛**

壯歲ノ婦人湯治ノ後發熱效痰帶血右肩臂甚  
痛不食脉弦細而六動一方加五味即此湯加羌

活歲靈仙貝母芍藥山危此症湯治ノ後ナルホドニ濕氣ガアラ

ントバカリ意得テモ惡シ、湯治ノウチニテモ亦後ニテモ同

事モアラフゾ臂痛モ湯ナドガタ、リテ痛丁アルナリ此症敗

毒散正氣散ヲ用テモヨケレモ效疾又不食ハ胸ノ氣ヲ下ス意

ガヨキブ切芍藥貝母ニテ血痰ヲ治シ羌活歲靈仙ニテハ痛ヲ

止ルナリ山危子ニテ焚毒ヲ解ス又蒼朮防風モ大事ナケレモ

其味多ク其上モハヤ風濕ハ羌活ニテ拂フ故餘

其ハ入又ブ病症ノ大抵ヲヨク見ガ專一ナリ

氣飲香蕪散

**勞熱**

勞熱ノ輕症  
久ク潮熱ヲ患テ午後ヨリ夜

**潮熱**

半ニ至テ腰冷ルニ秦艽鱉甲

及首條ナリ

續編一 發表

二十三

烏巢

飲清脾湯ヲ用テ不効ニ用此湯効アリ發斑ナドノ証ニモ用ル  
 丁アリ又解毒湯加茱白皮用ル丁モアリ敗毒散ハ脉浮ニメ大  
 ナルニ用ユ此湯ハ脉沉ニシテ  
 アミリハヤクナキニ用ルナリ  
 一男肥熱疹血盜汗不食脉五  
 動有力用此湯加芍藥貝母  
 湯加羌活葳靈仙  
 貝母芍藥山柅

**感冒**

香薷散 十局 治四時溫疫傷寒

香附子 四兩

甘草 兩

紫蘇葉 兩

陳皮 兩

**同**

**寒熱**

寡婦寒熱如瘧此湯加  
 黃芩經驗ノ妙ナリ

**效血**

壯婦湯治之後發熱效痰帶血右  
 肩臂甚痛不食脉弦細而六動此

右為釐末每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時候

ヒヤウ多本邦古代ノ書ニ傷寒ニコノ某日ニ服若作細末只

服一錢入塩點服○頭痛加川芎白芷

加石膏連須葱頭

陽穴痛加荆芥穗石羔

風無汗加麻黄并乾葛

退加柴胡黄芩

痞塞加枳殼

**熱頭**

○傷風自汗加桂枝

○太

**痛**

○傷風惡寒加蒼朮

○傷風發熱不

**本症**

○傷風咳嗽不止加半夏杏仁

○傷風胸膈

**本症**

○傷風鼻塞声重咽膈不和加苦梗旋覆花

○傷風

**本症**

○傷風

傷風痰涎壅盛加白附子天南星証本 ○傷風鼻內出血加茅花

木 ○傷風氣促不安加大腹皮茺白皮症本 ○傷風鼻塞不通頭昏

加羌活荆芥症本 ○傷風不散吐血不時加生地黃症本 ○傷風不解

耳內出膿疼痛症本 ○傷風不解咽喉腫痛加苦梗症本

○傷風中脘塞不思飲食加青皮枳殼症本 ○傷風嘔吐惡心不止症本

加丁香半夏症本 ○傷風頭暈眼花顛倒支持不任加熟附子症本

傷風時作寒慄症本 ○傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋伏

花半夏症本 ○傷風後時々作虛熱不退加人參症本 ○傷風飲食不

能消化症本 加砂仁青皮症本 ○初感風頭痛作熱鼻塞聲重加羌活川

芎症本 ○感風腰疼不能屈伸加官桂桃仁症本 ○感風揮身痛不止

加赤芍茺紫金皮症本 ○感風頸項強急不能轉頭加羌活官桂症本

○腹肚疼痛症本 加木香腹肚疼刺不可忍症本 加姜黃茺萸症本 ○小腹痛

疼痛無時不可忍症本 加木香姜朮症本 ○婦人被氣疼所苦症本 加木香

砂仁婦人 ○傷風嘔吐泄瀉腹痛症本 加乾姜木香症本 ○心卒痛者加

延胡索酒一盞症本 ○飲酒太過忽遍身發疽或兩目昏黃症本 加茵陳

山柅發 ○婦人經水不行先作寒熱症本 加蘇木紅花症本 ○脾寒症本 加良

續編一發表 二十五 烏巢堂

姜青皮草菓瘧 ○感風寒發熱頭疼不換金 ○婦人產後風

脚キク手疼痛生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金心氣散加生

地黃川芎同煎後 ○虛熱不退加人參本症別不 ○潮熱加人參如用補劑

黃芩本 ○欬嗽加桔梗五味本 ○欬嗽不止加半夏杏仁本 ○鼻

塞聲重咽膈不和加桔梗本 ○胸膈痞塞加枳殼半夏本 ○飲食

不化加縮砂青皮本 ○腰痛不能屈伸加肉桂桃仁本 ○腹肚痛

加木香本 ○身疼加芍藥肉桂本 ○心氣痛或疝氣痛加延胡索

烏藥茴香心 ○風濕脚氣加檳榔木瓜疎通氣道名之檳蘇散脚

○春夏氣溢腫而痛加五加皮木瓜檳榔川練子時 ○濕氣周遊

脚膝痛加忍冬木香芍藥本 ○疝氣偏墜疼痛初發憎寒壯熱甚

効加茴香木香三稜莪朮木通疝 ○小兒傷寒夾食夾驚四時瘟

疫癘疾加青皮葛根名香葛散濟世小 ○婦人足冷上氣或娠婦

四五ヶ月而腰下浮腫皆與本方得奇驗腫 ○鼠咬而發熱腫痛

加黃連黃芩山柈雜

此藥感冒ノ輕症ニ用ルナリ局方ヲ按スルニ此方ノ始リ白髮

老人一人ノ富家ニ教テ疫癘ヲ治ス然レバ時疫ノ某ナレト今

テ此藥ヲ頼ンデ治時疫了ハナイサレト芳ノ某春時氣温疫

ノ輕症ニ用ユ畢竟利氣ノ輕劑加味ノカヲ以テ其功ヲトグル  
 ソレテ古各ニモ随分加味ノ多キ菜也氣滯テ胸膈不快或頭痛  
 不爽症通ソ此湯ヲ主トス又能ク食毒ヲ消解ス食傷ト食毒ト  
 ハ必シ違アリ食傷ハ医者モ病家モ皆常ニ知ル所ナリ食毒ハ  
 或魚腥ノ毒饌中ノ食毒其外一口ノ食物ニ因テ忽然一悶乱ハ  
 胃脘大二痛ム等ノ暴症ハ食毒ナリ此方主之  
 ○友松子云來食來氣ノ感冒常ニ用之甚効アリ衆方規矩云春  
 月用之探病恐ラクハ愚者聞之不論  
 氣乏血虛用之害人丁多カルベシ云

此方他病活用例

**脚氣**

脚氣血虛芫芷香蕪散  
 加木瓜羌活赤芍藥

**癰**

癰毒初發頭痛腫痛乍寒乍  
 熱芫芷香蕪散加防風當歸

**產前**

月產

脚赤腫俗名雞脚此  
 湯加木瓜檳榔木香

**妊娠**

本邦老医傳妊婦四  
 五月腰下腫氣必用

**腫滿**

本邦老医傳腫  
 氣ノ病人風ヲ

引頭痛耳  
 鳴ニ用ユ

**溺水**

暴怒悲號川投身入井ナドニタルヲ引上テ後利  
 氣ノ劑ヲ肝要トス此湯加川芎木香烏菘若シ打

身ナドアラバ  
 更加當飯杏仁

**痰火**

痰火因風寒  
 發宜此湯

**畜血**

畜血兼傷寒輕則小建中  
 湯香蕪散重則五積散

**淋**

**濁**

淋病濁症因  
 氣者宜此湯

**泄瀉**

積聚アリ兼氣滯  
 填ニ瀝者宜此湯

**心痛**

食生冷傷ラレテ食熱  
 物ニバラク痛成者此

湯加生姜石菖蒲半夏枳殼或  
 人參養胃湯加肉桂吳茱萸

**番沙**

此湯加薄  
 荷荊芥

**積聚**

積聚兼表證小  
 建中湯合香蕪

**散**

**頭痛**

氣虛ノ頭痛ヲ除キテ其外ノ頭痛ハ此湯加川芎  
 羌活薄荷又頭風ニハ加芎藭細辛荊芥大黃人參

**遺補**

傷寒

三位法眼傳云傷寒脈中按之則數動重按之則不數動者府有熱而藏無熱香薷散二山施子一捻り加テ晝夜二十服モ與フベシ施子ハ府ノ熱ヲサメスモノナリ但裁木按柳ヲモ加テ畏ノ手當ラスベシ蟲ノ脈ハ兩寸ノ脈ニテ覺ル血ナドノ上ニ纏ラヒツハリ其上ニ撮ノ大豆ヲオトスヤウナ氣味ゾ○肺ニ有熱ニハ此散ニ塩ヲ加テ二十貼モ一日ニ用レバヤガテ下ル如此四五度モ下シテ本方ニ蟲ノ加味ヲシテ用○藏ノ熱ヲ下スニ大黃バカリニテ不可トキ加黃芩妙ナリ變ニヨリテ桂心カ乾姜ヲ加テ能下ルナリ○汗サスルモ此散ニ塩ヲ入ル夫レデモ不應ハ加麻黃

**頭痛** 壯男過酒之人心下左邊積氣微熱頭痛  
**癰疽** 十四歲婦全不食服麩果雜穀如常

枳朮丸送下全愈

**熱** 大熱アリテ何圧不知病ニ此湯加大黃黃芩施子入參荆芥多入テ下スベシ

**脚氣**

四十餘歲肥前之男十餘年以來患脚氣

自每年五月入小專之日定時而自足大指痛發而至膝腫自腫短少發熱食少減時々大便結脈素細沉弱發則浮五動羌活導滯湯當故粘痛湯或三和散不効如右每年五月入小專之日定而痛發而五十日或六十日而雖不用某諸症退如故此散加按柳小木瓜中蒼朮大牛膝狂乱トナラントスル病ノ下地ニ此散ヲ用膝少黃蘗悉愈テ數年度々効ヲ得タリ大抵此散ト分心氣飲加茯神狂乱一旦愈ルトイヘ疔膏

**眼目** 俗ニヤ三日ト称スル二人參敗毒散ニテイ育ノ灸ヲ世子バ根不拔ルモノナリ

ツモ神効ヲ得ル又香薷散ニテモ得効鬱症ノ眼ニハ敗毒散ニテイカ又ニ此散ニテヨキアリ○棘味噌ハ眼ノ毒ナリ効アリ

リ不 **感冒** 本邦老医傳云上焦ノ風邪ニ用ル茶ナリ風熱上衝ノ  
可食 目赤微頭痛スルニ尤佳ナリ赤目痛ニハ此方デナク

レバナ **同** 頭汗必用此上 **傷寒** 傷寒裏熱ニ表ヲ發メサニスハ釜  
ヲ又 焦ノ傷風ナリ ノ湯ノタギリタルニ蓋ヲ取テサ

ニス意ナリ當流ノ秘ナリ謙云此 **鬱** 婦人氣鬱ノ病サニ **同** 婦人  
是正傷寒ニ非ス時疫ノ輕症ナリ くノコアリ先思之 **同** 病ム

一三年發則上氣面赤口乾カク医アミリ深ク治 **胸痛** 脇痛脈實ナル  
テ不効ニ予用此方二三貼ニシテ効アリ ニ用ルコアリ

**雜** 有馬湯治ノタ、 **補益** 補茶血茶或烏附ノ類ノ茶久シク用ル  
リニ用之有効 トキハ間々ニ此方ヲ用テ氣ヲメグラ

世茶氣 **痛風** 痛風カ風毒カニ此方ヲ丸茶ニメ三五十  
ヲ發ス 粒ツ、用テ愈下焦ナル故ニ丸茶トスル也 **加減** 感風  
寒發

熱頭痛合不換金○感寒頭痛壯熱惡寒身痛不能轉動合五積散  
或敗毒散○濕氣周遊脚膝痛加忍冬南容○疝氣偏墜疼痛初發

憎寒壯熱甚加苗香青木香三稜莪朮木通○小兒傷寒夾驚四時  
瘟疫瘧疾加青皮葛根名香葛湯○傷濕自汗時行暴瀉加車前蒼

朮○感寒濕日久腰脚疼行步難加蒼朮酒煎服○濕氣久留脾疼  
身體與手足倦怠腹脹滿或有氣上衝有類虛損實非虛損加蒼朮

○傷風一向不解作潮熱白晝經日中不退日々如此加地骨皮柴  
胡人參○脾胃不和中脘不快加麥芽神麩○傷食嘔吐泄瀉腹痛

加木香乾姜○卒心痛者加延胡索酒一盞○飲食太過急偏身發  
疽或兩目昏黃加茵陳山柘○中酒嘔吐惡心加丁香烏梅○婦人

忽然大便痛腫不能下地加木瓜萊菔○婦人被性所苦胸膈痞疼  
脇肋刺痛小便急痛加殼南○婦人被氣疼所苦加南省砂○婦人

經水將行先作寒熱加蘓木紅花○婦人產後作虛熱不退加苦苈  
○產後腰痛不已加官桂○本方加木香檳榔五加皮名濟世檳榔  
子湯治一切  
脚痛順氣壅

**感冒**

行氣香蘓散十一 治內傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛

冬感風寒濕氣頭疼身熱憎寒遍身骨節麻木疼痛七情惱怒相  
冲飲食不下心腹氣痛

- 紫蘓 陳皮 香附 川芎 羌活 枳殼 烏藥 麻黃

甘艸 右劉生姜三片水煎温服○因濕加蒼朮○外感

風寒加葱白三根○內傷飲食如山查神麩傷飲食

此菜回春ニ出タリ本ハ三山陳氏ガ方ナリ香蘓散ニ順氣化滯  
ノ品ヲ加味シタルモノナリ感冒夾氣夾食ノ症ニ用之此方菜  
品ヲ見レバサシテ奇妙モナイ菜ナレバ甚タ効アル方ナリ七  
氣腦怒因鬱滯ツカヘサシ上セ飲食難進生冷厚味中焦ニ鬱  
不化肚腹脹滿疼痛シ外風寒ニ感冒スルモノニ必用ノ菜ナリ  
右ノ症卒中風ニマギル、モノナリ意得ベシ

○此菜有餘ノ氣滯ノ者ニ用ル菜ナリ然ルニ氣滯菜甚多可撰用  
○感冒氣滯ノ症遍身麻木疼痛スルニ用ユ或感冒ニ氣ガ滯テ  
俗ニ肩ガツマルト  
云ニ此方ヲ用テ効

没酒煮平川丸 賣扁一 發表 三十一 烏巢堂藏

此方他病活用例

疝氣

疝氣偏墜ノ初發疼痛憎寒壯熱スルニ加莪朮三稜小茴香  
青木香木通友松子ノ治ニ一人年五十許瘦衰病狀如虚ト  
云ヘ凡脉沉弦ニノ神アリ少年小腹一小塊アリ今又陰囊偏墜  
又此疝積ナリ本方加蘇梗莪朮三稜小茴香青木香山柅山查二  
百貼ニノ半愈ヘ五  
百貼ニノ全ク愈エ

感言

藿香正氣散

十二局

治傷寒頭疼憎寒壯熱上喘欬嗽五勞七傷八般

風疹五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍乱藏府虚鳴山嵐瘴

瘧遍身虚腫婦人産前産後血氣刺痛小兒疳傷並宜治之以上局方

以下傷寒大成治四時不正之氣夾食及瘴濕霍乱

廣藿香葉 一握 五分

白朮

霍乱轉筋 換木心

厚朴 薑制

白芷

痰食氣滯 換木香

陳皮

各八分

半夏

一握五分 口湯去之

茯苓

桔梗

各一

大腹皮

姜湯泡服 脹用之

蘇葉

各一握 汗去之

甘草

炙五分 吐去之

右用生料作一劑加生姜三片大棗二枚

水煎去滓熱服無時○熱多加黃連寒多加乾姜寒甚少加附子

此本不換金正氣散而立方中腹皮乃傳寫之誤當遵古方用蒼朮

爲是專治一切不正之氣非正傷寒也太陽病可用麻黃惡寒桂枝症

發熱頭疼骨節痛用之先虛正氣外邪不去而先虛正氣雖汗出亦不解故

元氣虛人并夾陰傷寒發熱脉沉足冷者禁服加減霍亂轉筋加

木瓜霍亂○腹痛加芍藥本症○寒痛加官桂本症○冷甚加乾姜本症○

飲食不化心下痞悶加香附砂仁本症○米穀不化加神麩麥芽同

○肉食不化加山查子同○心下痞加枳實青皮同○中暑冒風

加香薷扁豆中暑○時氣憎寒發熱加柴胡葛根本症○發熱加麥門

竹葉口渴小便不利合五苓散心腹痛加木香本症○若煩欲登圍

不通加枳殼痢○寒濕相搏霍亂轉筋煩渴亂合黃連香薷飲

名之二香散霍亂○感風寒內傷飲食霍亂轉筋吐瀉合五苓散同

○轉筋不止男以手挽其陰女以手牽其乳此千金妙法同夏

時受涼傷外又飲食生冷傷內頭痛身熱惡寒或腹痛吐瀉若外

感重去白朮加蒼朮羌活若內傷重加縮砂本症○尸厥飛尸卒厥

此即中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足冷肌膚粟起頭面青

黑精神不守或錯言妄語牙緊昏不知入頭旋暈倒此卒厥客忤

鬼擊吊死及入廟登塚多有此疾以蘓合香丸灌之俟甦以此湯

加南星木香殊驗中惡○按霍亂主方兼內外有輿也殊治出風瘴

段西原手訂章 去賣扁一發表 三十二

氣之第一也。○霍乱嘔逆去白芷加半夏姜汁最霍乱吐泻腹痛者必用之。霍乱。○四時感不正頭運鬱冒惡寒發熱專用之。症本。○夏

月泄泻或傷食濕泻俱以兼腹痛者亦宜。泄。○七情過極逆氣運

倒此名中氣亦宜。中風。○渾身拘急憎寒喘嗽頭目昏重加五味子

杏仁塩梅得奇効。症本。○出遠方治心腹脹滿此方專調榮衛利三

焦行痞滯消膨脹。水不伏。○腸胃受濕下血不止加黃連烏梅有奇

妙。血下。○瘧疾初發無汗用之則必發汗而愈。瘧。○傷寒感冒頭痛

發熱而無汗亦可也。症本。○寢間風入於口鼻中大陰則咽痛多此

方主之咽痛。○飲酒而傷風發熱吐逆亦宜。傷酒

方下圈点ヲ加ルハ此湯ノ的症ナリ批点ヲ加ルハ主劑ト云ヘ

氏未為必処アリ点不為モノハ主能ニアラス或活法ニ因用ユ

角点ヲ加ルモノハ此湯ヲ用ベキ症ニアラス

○此某方下大成ニ所謂治四時不正之氣挾食及瘴濕霍乱コレ

此方正面ノ的症ナリ李仲梓云甘草桔梗紫蘓ノ辛甘ハ外邪ヲ

發散ス厚朴大腹皮ノ苦辛ハ其内滯ヲ通ズ藿香ヲ君主トノ中

ヲ和スベシ表ヲ解スベシ諸劑ヲ統領ノ功ヲ成スナリ

○医通云大抵非時感冒ニハ參蘓飲苧蘓散香蘓散神木散皆撰  
用ベシ兼食滯ニハ宜此湯太陽ノ症見ハ加羌活防風陽明ノ症  
見ハ加葛根葱白少陽ノ症見ハ加柴胡半夏若シ天氣未熱ニハ

及方集并刊其 續編一發表 三十三 烏巢堂藏

加桂枝羌活トス  
○又云東南ノ國稟氣孱弱ニノ氣常ニ泄ルノ地ナリ但瘡瘍ノ毒アツテ絶テ傷寒ノ患ナシ或他處ニ客遊ノ風寒ニ感スルモノニハ僅ニ藿香正氣散ノ類ニテ王<sup>ツ</sup>之麻黄青竜ノ劑不可用  
○冬月寒邪ヲ犯シ肚腹疼痛スルモノ  
ニハ加乾姜吳茱萸名加味藿香正氣散

此方他病活用例

**暑** 医通云伏暑太熱外受寒邪内傷凉水生冷之  
物腹痛泄瀉霍乱肢逆此湯養胃湯可撰用  
**霍乱** 又云世上皆  
不論虚實用此方此方ハ胃氣不和陰陽錯乱或夏秋ノ霍乱寒熱  
飲食冷熱合食シ及不伏水土ノ吐利霍乱スルモノニハ尤宜シ

若シ厥逆冷寒虚煩喘噦面赤戴陽脉虚微細無力脾腎二虚シ  
火衰不能生土虚陽失守此等ノ症此方ヲ用ル片ハ忽チ變ヲ生  
ズ可 **同** 又云霍乱頭痛眩暈ハ風 龔氏云霍乱有熱加姜炒黄連  
恐 **同** 痰攻メ上ルナリ宜此湯 **同** 寒甚キハ加乾姜腹痛加肉桂  
痛甚ハ去藿香加吳茱萸小使不利ニハ **中風** 医通云食厥ニハ姜  
去茯苓乾霍乱ニハ加枳殼茯苓肉桂 塩湯ヲ煎シ探リ吐  
シ風寒ニハ藿香正氣散 **同** 中風醒メテ後氣未<sup>コト</sup>尽順痰未<sup>コト</sup>  
氣滯ニハ八味順氣散 **同** 尽除ハ調理劑宜藿香正氣散 **腹痛** 腹  
不問何症此湯加水香或此湯 **同** 此方加水香延 **胸痛** 本邦老医傳  
ニテ藿合香圓ヲ調化シ用之 **同** 胡索治心腹痛 云氣鬱胸膈  
痛不食者 **心腹痛** 又云心痛腹痛氣痛種々ノ療治ニテ無効  
宜用之 **痢** 赤

血色鮮紅或蛇蟲ノ形ノ如ニノ其  
間血鮮アリ此湯加黑豆三十粒  
香砂仁 瘡加換御青皮柴  
良姜 瘡 胡常山宜用之  
秘結 大便結喜熱惡冷此湯  
加肉桂枳殼飲半碗圓  
調血經水  
先期來ルハ氣多ク血虚ナリ此  
湯加當飯川芎香附勿用冷菜  
ハ加 友松子治一農民背ニ瘡ヲ發ス大サ茶碗程ナリ求醫治  
大黃 之一瘡ヲ治シ了レバ又一瘡ヲ生ズ如此了五六發二至  
ル其脈緩中ニカアツテ滑ニ似タリ此瘡ニハ非ス濕痰ナリ此  
菜與二十四貼其膿將尽テ為瘡補中益氣湯加陳皮半夏全愈

水腫 中年ノ男平日過酒肌浮腫微頭痛脈浮濡此湯愈タリ此  
方ハ外感内傷ヲ兼タ方ナリ腫氣ニ用ル了アリ風濕ガ表

二在ルナリ熱氣在表腹下リナトスルニヨシ肌浮腫ト云ハ肥  
タカ腫タカト云ヤウナリ此方ハ酒毒ヲ發散スル方ナリ香薷  
散モ苦カラズ酒毒ニ用ユレハ汗ニ出ダス五苓散ハ酒毒ヲ小  
便ヨリモラス是酒病發汗利

小便本邦老医ノ經驗ナリ  
又云氣鬱ノ病ニ加木香宿砂  
名増減順氣木香散見得効方  
ソツトシタ拍子ニ風ヲ引了ア  
リ其邪不去ノ夜々驚ク了アリ  
中卒頭痛發熱面色變黎  
黑頰渴脈弦數用此湯愈

感冒 感冒咽痛  
ニ宜用之

本證 二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

腹滿 本邦老医傳云腹脹腫氣ノ  
輕忘ニ加木通澤瀉猪苓

鬱 又云大人小兒夜夢驚キヤスキ  
ニ用ル了アリ晝可驚了ニアヒ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

二十五六歳ノ男常ニ嗜  
酒強壯肥滿能食旅途ノ

不換金正氣散十三局 治四時傷寒瘧疾時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐山近瘴氣海近寒熱往來五膈氣噎欬痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉藏府虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴 藿香 陳皮 半夏 蒼朮 甘草各等分

右為劉散每服參錢水一盞半生姜三片棗子二枚煎至八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃養飲食加減。頭痛加川芎白芷症本。感寒腹痛加乾姜肉桂症本。潮熱加柴胡黃芩症本。嘔逆加丁香砂

仁症本 ○口燥心煩加柴胡葛根症本 ○氣塊加三稜枳殼檳榔茴香

積聚症本 ○冷瀉不止加木香訶子肉豆蔻泄瀉 ○熱極大便不通加大黃

芒硝症本 ○瘧疾加常山檳榔草菓瘧 ○腹脹加香附枳殼白豆蔻

症本 ○痢疾加黃連枳殼去甘草痢 ○胸脇脹滿加枳實砂仁莪朮

症本 ○欬嗽加桔梗杏仁五味子症本 ○喘急加麻黃紫蘘子桑白皮

症本 ○兩足浮腫加木瓜大腹皮五加皮腫足 ○身體痛加麻黃桂枝

芍藥症本 ○濕症声啞加石菖蒲音失 ○寒症声啞加肉桂同 ○腸胃

受濕下血加黃連烏梅血下 ○小兒感冒風濕頭目昏重時發壯熱

宜此湯本 ○傷濕重著骨節疼痛洒淅欬加木瓜痺 按平胃

散加藿香半夏之方也是乃辟瘴之劑故遊官四方水土不伏或

旅途中可服未病之先也辟瘴 ○旅行後瀉痢帶血腹痛心張加酒

芍藥酒黃芩木香枳椇血下 ○旅後憎寒發熱上吐下瀉兩腿痺四

肢末冷無汗口渴去半夏甘草加葛根丁香砂仁乾姜本 ○四十

餘日下血不止加芍藥黃芩黃連五貼而愈血下 ○暑濕諸瘧加柴

胡黃芩青皮茯苓澤瀉枳椇草菓烏梅

方下ノ圈点批点角点藿香正氣散ノ例ノ如シ此方ノ主治圈点

批点ヲ考ヘ用ベシ温中ノ劑ナリ藿香正氣散ニ比スレバ藿香正氣散ハ此湯ヨリ發散ツヨシ紫蘇アレバナリ此湯ハ除濕ヲ主トス蒼朮アレバナリニ方ニ方外ノ殊功アル葉ナリト考ヘ用ベシ此方モト平胃散ニ加味ス專ラ傷食除濕ノ葉ナリ故ニ吳氏方考ニ此方ヲ中濕門ニ攝入シ藿香正氣散ハ感冒門ニ攝入ス今此葉ヲ感冒門ニ入ルハ此葉モト感冒ノ葉ナリ其上加白朮茯苓名除濕湯ナリ除濕湯ハ濕門ニアリ考ベシ

此方他病活用例

**水腫** 感寒腫者此湯加 婦人崩漏 崩漏因風寒者 加川芎肉桂 乳病 吐甚片ハ毒

氣上リ攻テ咽喉ヲ妨ゲ痛ム寒熱スル者ハ膽胃 瘰癧 瘰癧夾ム

ノ風熱或寒邪ナリ此皆表症ナリ此湯加天花粉 所種々ア

醫家手別草 續編一 發表 三十七 烏巢堂載

其内夾風夾氣夾食モノ此湯加川芎木香風多ケレバ痒シ加  
 祛風茶氣多ケレバ痛ム加調氣茶食多ケレバ寒熱ヲ發ス加消  
 積茶濕多ケレバ同不喜食者加茯苓等痘外感アルニハ春時ハ  
 腫ル加滲濕茶分人參木香減半此湯加川芎白芷防風  
 一男常ニ好魚網一日漁泥川及黃昏連濕衣飯路一二里夜  
 半發熱煩悶ニ便澁一身尽痛首如物蒙脉沉細而濡此湯加  
 羌活枳殼傷食此湯ハ能食積ヲ治スル方ナリ然レ食積下焦ニ  
 茯苓木通有テ此方ヲ多用レハ却テ亦腹痛スルアリ其  
 時ハ治中湯ヨシ此方能汗ヲ出ス方ナリ敗毒參蘓十神  
 湯ノ類ニテ汗不出ニ香蘓散此湯ニテ汗出ルアリ腹痛壯  
 ノ男俄然而腹痛兩乳下痞不瘡足ニ如斑小瘡ヲ生シ  
 能屈伸手足冷脉細此湯主之頭痛ナドスルニ用之

時疫

神木散十四局

治四時瘟疫頭痛項強發熱憎寒身體疼痛及傷寒鼻

塞声重欬嗽頭昏并皆治之

- 藁朮 羌活 細辛 白芷 川芎 甘草 蒼朮

炙各 一兩 蒼朮 五兩

右為細末每服三錢水一盞生姜三片葱白三寸煎七分温服不  
 拘時如覺傷風鼻塞只用葱茶調下

此方医通ニ芎藭參蘓正氣散ナド、并ニ感冒ノ茶トス感冒頭  
 痛ニ用ベシ謙局方ノ方下ヲ按ズルニ治四時温疫頭及傷寒ヲ  
 治スルト云ヘリ本時疫ノ主方ナリ故ニ蒼朮五兩餘茶各一兩  
 蒼朮除濕發汗散惡氣餘茶各一兩ハ皆頭痛ノ茶ナリ然ラバ温

發熱表

續編一

三十八

烏巢堂

瘧

人參養胃湯 十五局

治外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏眩肢

疫頭痛二用ル茶ト意得ベシ然ルニ医通ニ感冒ノ茶トスルハ譬  
バ敗毒散ハモトヨリ時疫ノ茶ナレハ傷寒感冒ニモ用ル意ト  
同シ○此外ニ羅太無ガ神木散アリ同名異方ナリ即不換金玉  
氣散去半夏代石菖蒲此又温疫ノ茶ニノ感冒ノ茶ニアラズ丹  
溪纂要ニ紺珠ノ心印ト云ヘバ羅太無ガ方ト云ヘハ元來ハ紺  
珠經ニ出ルト見ユル至テ古方ナリ大抵局方ノ神木散ト同ク  
温疫ノ茶ナレハ羅氏ガ神木散ハ山嵐ノ瘴氣ヲ治スル妙劑ナ  
リ医学正傳此方ヲ温疫門ニ載スル或ハ去石菖蒲加香附子此  
又一方  
ナリ

體拘急不問風寒ニ證及内外之殊均可治療先用厚被蓋睡連  
進此數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗灑々然サツト又俟  
汗乾則徐徐ヲ去ル破去被謹避外風自然解散若元有汗亦須  
温潤以和解之温順スル或有餘熱以參蘓飲欸々調之始ハ温  
テ後ハ必ス微涼ノ或尚頭疼則濃煎生姜葱白湯下聖餅子三  
劑ヲ用ルアリ證憎寒壯熱頭目既除不必服茶但節其飲食適其寒温自然平  
治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黄能開腠理用或不能  
得宜則導泄真氣因而致虛變生他證此茶乃平和之劑上能温

中解表而已不致安擾也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴 蒼朮 半夏 藿香 草菓 茯苓 人參 甘草

橘紅 右為咬咀每服四錢水一盞半姜七片烏梅一箇

煎至七分去滓熱服兼治飲食傷脾發為痰瘧或脾胃中脘虛寒

嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒疫及惡寒者並加附子名十味

不換金散

此藥本感冒ノ劑所謂温中解表ノ藥ナリ方後ニ治寒瘧ト云故  
ニ先輩用テ治瘧ノ藥トスルナリ此方不換金心氣散ニ加入參  
茯苓草菓烏梅ノ方ナリ不換金トハ解散ト出入加減ニタルモ

ノナリ外感風寒内傷生冷ヲ治スルノ藥ナリ然ルニ此証ヲ治  
スルニ於テハ不換金トハ解散ノ二方ニテ事足ル此方ハ無テ  
モ濟ムサレバ用テ惡イ丁ハナシ但此方中ニ草菓アル片ハ宜  
ナル哉先輩ノ瘧ノ藥ト為ル丁草菓ハ多ク瘧ノ藥ニ用ヒ來レ  
リ加減ニ加附子十味不換金散ト為ル片ハ温補ノ力益々專ナ  
リ用感冒片ハ中焦ヲ温補シ消食  
解表其功ハ解散等ノ藥ニ勝レリ

治瘧加減 百二十方云寒多加肉桂熱多加柴胡汗多去蒼朮藿香  
加黃耆白朮飽悶去人參加青皮縮砂渴加麥門冬知母

友松子云有痰渴而不 瀉加芍藥白朮瀉不止去厚朴草菓加肉

飲水者雖渴尚宜半夏 豆蔻嘔噦去草菓厚朴蒼朮加縮砂白朮  
炒米痰多去半夏草菓加貝母竹瀝友松子云濕痰ナラバ半夏要

醫藥手引草 續編一 發表 四十 醫藥堂藏

菜ナリ燥痰ナラハ半夏ヲ去ル。肉熱盛ナラハ去半夏加黃芩ノ三ニ非ス此湯モ宜シカラス。暑熱盛ナラハ去半夏藿香加

香薷白扁豆。準繩治瘧加減。脈弱無力或多寒者加乾姜附子脈洪有力熱多者加黃芩黃連柴胡此方蒼朮厚朴藿

香ハ發散シ半夏藿香茯苓陳皮ハ劫痰ナリ人參ハ只虛人尤宜シ

此方他病活用例

腹痛 全不食其人虛弱腹痛者此湯ニ以白朮代蒼朮仍加肉桂吳茱萸各半錢木香三分 欬嗽 百二十方云欬嗽惡寒發

熱用參蘓飲敗毒散不效ニ此湯去人參加五味子桑白皮奇効ヲ得タリ謙云此症モト寒欬嗽ナリ參蘓敗毒ハ辛涼ノ菜ナリ効アラガルハ尤ナリ此湯ニテ得効ヲ不思議ナルヲニテハナイゾ

帶下

又云婦人赤白帶下惡寒發熱欬嗽無汗或潮熱ニ與逍遙散下血多シ此湯加川芎當歸即効ヲ得タリ謙云此証外感風寒然ルニ發表ヲ用ヒズノ用逍遙散タラバ下血其外憂症アル

ベシ此湯加川芎當歸得即効コト此又不思議ナルヲニアラズ又云產後三十日計惡寒發熱面青不食自汗脈數用逍遙散

產後 不効與此湯全愈謙云此亦前症ト同シク外感ノ症ナリ與此湯愈ル

又云諸病ノ後酒々憎寒シ或潮熱スル必可用此方甚ダ佳ナリサレバ病後虛甚タシキモノニハ

純補ノ菜ヲ用テ此湯本症 瘧初發ノ際風寒在表雖寒熱過後而身體常ニ自疼常ニ自畏風宜草

菓飲或此湯每服加川芎草菓各半錢。他病遺補 水腫 初起多寒濕暑瘧此湯下貼香薷飲一貼和勻作二服 自利者加香

附砂 壯男瘡愈後時々微寒一身甚麻痺肌浮四

仁 肢不能舉食少進脈細數此湯加川芎當飯 **發熱** 壯年ノ婦 發熱至十

餘日不止或少惡寒頭痛氣惱不食尿赤脈五動如有力此湯至之

此方ハ氣弱虚熱ニ用氣惱ナド力目的ナリ此症ニテモ初メ病ツ  
テモヨシ此方ハ八解散加草菓モノナリ此症ニテモ初メ病ツ  
キナレハ敗毒散藿香正氣散ヲ用又此症ニ草臥ツヨキハ補中  
益氣湯ヨシ小柴胡ナトヲ **汗** 壯男盜汗久不止顔色蒼々食減脈  
用レバ反テ熱氣増コアリ 緩弱用六黃湯不効用此湯而安

**附痰**

羌活冲和湯 十六 即九味羌活湯以代桂枝麻黃青 治春夏秋

非時感冒暴寒頭疼發熱惡寒脊強無汗脈浮緊此是太陽膀胱

經受邪是表證宜發散不與冬時正傷寒同治法此湯非獨治三

時暴寒春可治温夏可治熱秋可治濕治雜症亦有神効秘之不

與庸俗知此奇妙耳本方自有加減法備開于後

羌活 防風 蒼朮 黃芩 白芷 甘草 生地黄 各

細辛 川芎 水二鍾姜二片棗二枚煎至一鍾搥法

加葱白搗汁五匙入棗再煎一二沸如發汗用熱服止汗用温服

如胸中飽悶加枳殼桔梗去生地黄。夏月本方加石膏知母

名神木湯如服此湯後不作汗本方加蘘葉喘而惡寒身熱本方

續編一 發表 四十二 烏藥堂藏

加杏仁生地黃汗後不解宜再服汗下兼行加大黃釜底抽薪之法。其春夏秋感冒非時傷風亦有頭疼惡寒身熱脈浮緩自汗宜實表本方去蒼朮加白朮汗不止加黃耆即加減沖和湯再不止以小柴胡加桂枝芍藥一錢有神。此近來專用之。○赤水玄珠曰本湯不獨解利傷寒治雜病亦有神。○中風行經者加附子。○中風秘澁者加大黃。○中風并三氣合而成痺等症各隨十二經上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之煉蜜作丸尤妙。此系春夏秋治非時感冒代麻黃湯桂枝湯之類其功奇妙ナリ故

先董傷寒ノ治ヲ云モノ無不稱此方亦水玄珠加柴胡頗贊其妙然ルニ張氏續論緒論等ニ於テ一言不及此湯醫通全編ニ此方ナシ不知所以然ナリ謙竊案ニ冬月正傷寒ニハ仲景ノ正方アリ春夏秋ノ感冒ニハ芍藥香薷正氣散等ノ藥アリ此方効驗アリト云ヘ氏の症ノ可頼方ニアラス雖無此方可ナリ然ラバ無此藥而可乎曰此時疫ノ藥ナリ時疫之說上編中編ニ詳ナリ殊傷寒溫熱病并ニ時疫ノ論古代ノ名醫未詳タトヘバ劉河間論傷寒云古ハ小柴胡湯ヲ用ユ今ハ防風通聖散ヲ用ト云夫小柴胡湯ト通聖散ト異ナル及論豈一病ニノ古今用藥ノ不同如是雲泥ナランヤ蓋シ劉河間ノ傷寒ト云モノハ溫熱病或時疫ナリ劉氏通云傷寒論此方者多ク不知之其間溫熱病時疫ノ論往々出ルト云ヘ氏一定ノ確論ナシ張路玉ニ至テ其論明白ナ

リ然レモ不用此方謙今此方ヲ以テ時疫ノ薬トスルモノハ温熱病ハ今時希ナリ但時疫ハ不別四時表アリ裏アリ表裏兼ルモノアリ或感冒ト相混ズルモノアリ或諸病ト混ズルアリ其症紛々ノ似無定候此方發表アリ除濕アリ涼熱アリ治頭痛和中氣尚加減ノ方ナリ内外表裏此ニ進ル、所ナレ故ニ時疫門ニ攝入ス非時感冒ノ重症通用ノ可ナリ

○李挺云風寒兩傷通用此湯加入參大棗謙云此是方加入參例也不拘風寒兩傷臨症加之可ナリ

○又云太陽少陽ノ合病ハ麻黄湯合小柴胡湯通用ハ此湯加后膏知母枳殼謙云此必合病ニ非ズ此加味ノ症ニ臨ンテ用之ヲ

此方他病活用例

中風

方後赤水玄珠云本

冬温

冬温ノ治法春温ノ表症ト同シ葶藶湯九味羌活湯入裏モノハ加大黄重キモノハ

雙解

血血

血血點滴不流者表猶未解此湯加赤芍薬或升麻葛根湯加黄芩

同

寒症色黯黑鼻血點滴出者此湯或麻黄

升麻

破傷風

破傷風ニハ少シク細辛ヲ用并加當皈芍薬等分太便秘加大黄

下疳

下疳初發宜此湯

風熱赤眼宜

小兒外感

小兒傷寒大擬大陰症見加枳實厚朴少陰症見加桔梗知母厥陰症見加川芎柴胡

加減

無汗者倍羌活○有汗者減羌活倍防風去蒼朮換白朮○太陽症加羌活藁本○陽明症加升麻葛根○少陽症加柴胡黄芩半夏○太陰症加蒼朮厚朴○少陰症加桔梗知母燈草○厥陰症加川芎柴胡○夏月加石羔知母○服此湯後不作汗加紫蘇○惡風自汗

感冒

加桂枝夏月去桂枝加芍藥○欲止汗去蒼朮加白朮再不止加黃  
耆芍藥○汗後不解加大黃嘔逆加姜汁有痰去生地黃加半夏○  
肌熱加柴胡葛根○喘而惡寒身熱加杏仁生地黃○虛煩加知母  
麥門竹茹○胸中飽悶加枳殼桔梗○本方去蒼朮生地黃白芷甘  
草加桔梗枳殼柴胡名八味羌活湯治傷寒傷風四時感冒頭  
疼發熱惡寒身體痛疼此方解表妙方平和當勝於九味羌活湯  
神效沃雪湯十七 治傷寒陰陽二證未辨時行疫癘惡氣相傳服  
之如湯沃雪此藥功力不可具述

蒼朮

乾薑

甘草

厚朴

防風

白芍藥

乾葛

各四

右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓熱服之不拘時少頃取

生薑作羹投之避風坐臥身體微潤即愈如瘵氣正相傳染清  
晨進一服為佳常服每用二錢水一盞煎至八分服

此四時感冒ノ藥ナリ方下ニ陰陽ニ證未辨トハ陰寒陽熱ノ二  
證ヲ未辨別ナリ三陽經三陰經ノ証ヲ未辨ト云ニハアラズ或  
時疫邪氣表ニアルモノ用之其功方下ニ記スゴトシ

○此方本出百一選方有當飯共八味準繩無當飯七味謙按感冒  
溫熱病時疫難分必用之

○感冒其人素有濕痰却テ半夏不應者アリ可與此藥或藿香紫  
蘇ノ香ヲ熯フ者アリ亦宜此湯此方多少甘草ヲ用ト云ヘ本  
邦ノ例ニ任セテ少計用ベシ煎湯ノ氣味ヨク吞心ヨキ藥ナリ

傷寒

葛根湯 十八

葛根 四兩 麻黃 三兩 桂枝 二兩 芍藥 二兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大枣 十二枚

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及

禁忌

此陽明經症ノ薬ナリ陽明ノ經證ハ身熱自疼鼻乾不得卧頭痛脈長ナリ有汗者ハ桂枝湯加葛根無汗者ハ麻黃湯加葛根若夫太陽陽明ノ合病ハ前症ニ兼泄瀉自利スル者ハ與此方經中ノ表邪ヲ散ズレバ泄瀉不治ノ自治ス上編ニ詳ナリ參考スベシ

升麻葛根湯 十九

治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及

瘡疹已發及未發疑似之間并宜服之

升麻 十兩 白芍藥 十兩 甘草 十兩 葛根 十五兩

右爲麤末每服三錢用水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不計時候日二三服以病氣去身清涼爲度小兒量力服之○頭痛加

葱白 本 ○ 欬嗽加桑白 症 本 ○ 上膈熱加黃芩薄荷 症 本 ○ 無汗加麻

黃 本 ○ 咽痛加桔梗甘草 痛 咽 ○ 發黃丹毒加玄參 丹毒 ○ 癰疹者

紅點如登蠶之狀宜此湯 疹 癰 ○ 小兒傷風身熱頭項強自汗表不

醫藥手引草

續編一

發表

四十六

馬藥堂

和加黃芩 太陽ノ症アリト云ヘ其吟味ナシニ陽明經ノ菜ヲ用ユルト云ヘ 疔瘡表ノヨシ引賊破家ノ虞ナシ

アミツサヘ加黄芩ハ如何ト思ヘ疔瘡驗スルニナルホド苦カラザルヨシ兼ル所アラバ此ニ加減スベシ無汗ニハ加紫

蘓テ小兒 ○瘡疹一見苗不可服慎之 疹 ○冬月加紫蘓ハ四肢

厥冷加桂枝 一棧同 ○腰痛當知是痘加桂枝 一棧同 ○時氣發

熱太甚乃毒氣盛加牛蒡子 一棧同 ○按治癰疹最上方也 ○八

九年已前六七月間天下人民多患紅斑摩之則當掌不痛不痒

頭痛發熱惡寒合藿香正氣散二三貼而皆愈尔以來逢此證則

立得奇効矣 ○當世人多患小瘡甚痒故合藿香正氣散而與

之則俄沒然發痰喘心腹強須更而死矣遇與不遇勿履履轍

此方モト温疫ノ菜ナリ先輩目痛鼻乾不眠等ノ感冒ニ用故ニ

令感冒ノ菜トス或寒煖不時乍暖カニ脱衣乍寒ク重衣邪氣ニ

感冒シ或ハ痘疹初起ノ通劑トス若又舊ニ因テ温疫ニ用ルハ

ハ胸前熱スルヲ目的トスベシ涼所ニ酔臥ノ夜氣ニ感冒シ發

熱腹痛スルニ香蘓散ヲ合ノ効ヲ得タリ

○友松子陽明ノ經症ニ医者誤テ敗毒散補中益氣湯ノ類ヲ用

テ秋ヨリ冬ニ至ルマデ不治病ナホ本經ニアリ用本方五七貼

ニテ愈タリ謙按スルニ此ハ陽明ノ感冒ナリ病輕キユヘ二月

ヲ經テナホ在本經若傷寒陽明ノ志ナラハ仲景ノ方

此方他病活用例

**温病**

温病發渴飲冷水二因之  
發呃逆者此湯加茅根

**温毒**

冬暖二感温氣至春風氣相搏  
于癰疹之發之多痒初起此湯

**加玄**

**班疹**

內傷痰熱升于攻頭面者此湯  
加玄參貝母黃芩麥門生地黃

**同**

癰疹至春發者八傷寒  
二有于尤重之此湯加

**牛旁子荆**

友松子云熱疹極痒遍身  
爛目痛此湯加香薷黃連

**丹毒**

丹毒此湯加白木茯苓  
木香枳殼通用

**芥防風**

**同** 癰疹甚赤名丹毒木方加黃

**痘**

痘八陽明病身熱目赤便秘  
其瘡肌肉周出不快者加紫草

**同**

苓玄參冷者加黃耆白芷

**痘**

其瘡肌肉周出不快者加紫草

**同**

便血或下腸垢身熱

**同**

灌膿前脚根紅紫者屬

**面熱**

手陽明氣盛二身

若此湯加黃連生地

熱此湯加酒黃芩連翹

頭面熱者此湯加黃芩黃連白芷犀角川芎荆芥薄荷名升麻黃連

**湯**

**同**

風熱上衝面獨熱者先以調胃承氣湯加黃連  
犀角次以此湯加黃連川芎薄荷黃芩地黃

**面寒**

身前皆寒  
一面不堪

風寒者此湯加附子或去芍藥加人參黃耆附子

**面腫**

虛風面腫下  
關急搐目內

草豆蔻或先用附子理中湯温內次此湯加附子

**面腫**

關急搐目內

蠕動此湯去芍藥加蒼朮麻黃羌活蔓荆子柴胡藁

**雷頭痛**

雷頭風  
寒熱及

本乾姜白芷當故白豆蔻黃芩川芎名升麻胃風湯

**雷頭痛**

雷頭風  
寒熱及

面腫痛者此湯

**血血**

衄血面黃眼淚多眩此湯加小兒

**吐血**

兒吐血加黃

加蒼朮荷葉

**血血**

黃耆羌活名黃耆芍藥湯

**吐血**

兒吐血加黃

**連如**

**口舌**

口舌心脾熱者此湯  
加薄荷黃芩桔梗

**牙齒**

小兒治牙齒痛甚兩頰  
腫痛此湯加白芷連翹

**咽喉**

友松子治一婦人無故咽痛脈浮數

**聰耳**

此湯加人參黃耆蔓荆

**水**

此湯加桔梗天花粉荆芥牛旁子

**明目**

子黃柏名益氣聰明湯

**水**

發表

續編一

四十八

烏集堂

腫 尋常感冒腫者

麻疹

麻疹初起呵呻發熱惡寒效嗽噴嚏流涕  
此湯加蒼朮 頭眩此湯加紫蘇葱白解肌又忌大汗

熱 久病陽氣鬱之惡寒者此湯去五心五心煩熱者此湯  
芍藥加入參白芷草豆蔻蒼朮煩熱加防風柴胡葱白 破傷風

自汗甚キニ加白朮用之此理ヲ考テ濕邪自汗不 痛 肩背 肩二重キ

止ニ加白朮用之胃中ノ湿ヲ燥ノ汗ヲ止ルナリ

項重痛スルヲ俗コレヲケ ンヘキト云加肉桂効アリ

感冒

柴葛解肌湯 二十

即葛根湯本湯 自有加減法

治足陽明胃經受證目痛鼻

乾不眠微頭疼眼 眶痛脈來微洪宜解肌屬陽明經病其正陽明

府病別有治法

- 柴胡 乾葛 甘草 黃芩 芍藥 羌活 白芷 桔梗

水二鍾姜三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服○本經無

汗惡寒甚者去黃芩加麻黃冬月溼加春溼少夏秋去之加蘼葉

○本經有汗而渴者治法開在如神白虎湯下

此方陽明經感冒ノ薬ナリ細註葛根湯ノ本湯ニ加減スト云ハ  
在葛根湯ノ本湯ハ麻黃力桂枝力無レバ葛根湯トハ云ハレヌ  
此ハ錢仲陽ガ升麻葛根湯ニ加味シタルモノナリ升麻葛根湯  
ノ名先輩稱スルニ升麻葛根湯或升麻湯ト云葛根湯トハ云ハ

又葛根湯ト云バ仲景ノ方ナリ此何<sub>レ</sub>意得ガタシ此ハ右云通  
リ升麻葛根湯ニ加減シタルモノナリ物惣ノ陶氏ガ傷寒ノ方仲  
景ノ方ニ各加減ノ是デヨカラウト道理デ推テ立タモノ本力  
ヲ經驗デ制スルトハ見ヘ又尤何<sub>レ</sub>ノ方ト云ヘ<sub>レ</sub>藥性ヲ考ヘ  
君臣佐使七方十劑ノ法ニヨリ制スルモノナレバ皆道理デ組  
タモノナレ<sub>レ</sub>其中ニ心融妙達思議ノ不可及モノアリ又道理  
推量デ組タモノモアリ或此方ト彼方ト合ソ<sub>レ</sub>ニ何ヲ加ルト  
云方モアリ自優劣アリト知ベシ

○方下ニ所述ノ病候皆陽明ノ經証ナリ陽明ノ府症ハ治法別  
ナリ此方太陽少陽ノ藥モアリ汗ニハ麻黃ヲ加ル例モアリ  
法ニハ石膏ヲ加ルトモアリ混雜シタルモノナレ<sub>レ</sub>モ病人ニ臨  
ンデハ此ヤウナ藥ガ用ヒタキ<sub>レ</sub>ガアルモノ其上陶節庵ハ功  
者ナル<sub>レ</sub>医ト先輩モ云テアル人ノ某ナレバ心ニ掛テ不可捨サ  
レ<sub>レ</sub>氏規矩ニナル藥方デハナシ

感冒

香葛湯 二十一

治感冒頭痛咽乾或胸腹脇痛

香薷散合升麻葛根湯加蒼朮○或加川芎白芷 減半

此方感冒ノ某極テ効アル某ナリ胸腹脇痛ト云ガ此湯ノ目的  
ナリ其中ニ山嵐ノ瘴氣ニ兼用ベシ去蒼朮不加羌活枳殼名神授  
大乙散傷風身痛腹痛スルニ用ユ

此方他病活用例

胸痛 丁婦人歲四十餘三月ノ末ヨリ胸痛膏肓ノ邊微痛胸中虫  
衝上而鳴食則胸中滿而不通息則鳩尾邊塞痛全不食常有

感冒

塊發則吐黃汁大便常結二三  
日一行脈紫此湯加神麩黃連  
此方即 **藥毒** 脾胃中ノ濕熱ヲ去ル  
奇方 ノ為ニ惱サル、**頭痛** 頭痛シテ湯  
スルニヨシ **胸痛** 胸脇腹痛ノ何  
ベシ胃中ノ濕熱ヲ去ル故  
霍亂吐瀉ニモ用ルアリ  
二脇痛ニテモ胸痛ニテモ腹痛ニ  
テモ此方ノ類ヲ用表ヲ解テヨシ

十神湯 二十二

治時令不正瘟疫妄行人多疫病此茶不問陰陽

兩感或風寒濕痺皆可服之

川芎 甘草 麻黃 紫蘇

白芷 升麻 陳皮 香附 赤芍藥 乾葛

右為細末每服參太錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓熱服

不以時候如發熱頭痛加連翹白芍藥如中滿氣實加枳殼數

片同煎服雖產婦眼兒老人皆可服餌如傷寒不分表裏證以此

導引經絡不致變動其功效非淺加減 此方ハ瘟疫ノ茶ナレバ  
寒ノ茶ト意得テ加減シタルモノナレバ此 百二十方等ノ加減ハ傷

二本症ト云ハ傷寒感冒ノト意得ベシ ○發熱頭痛加葱

白 **本** ○中滿氣實加枳殼 **本** ○心腹脹滿加枳實半夏 **本** ○潮熱

加黃芩麥門 **本** ○欬嗽喘急加桑白桔梗半夏 **本** ○大便閉加大

感冒察辨別草

續編一 發表

五十一

烏藥堂成

黄芩硝本此症ハ若シ傷寒ナラバ承氣湯大柴胡湯ヲ用ベシ  
志感冒熱結如是表裏混雜ノ症アルベシ詳ニ考ヘテ

可用  
○嘔吐加藿香半夏本症  
○泄瀉加白木茯苓本症  
○瘧疾加草

菓栝柳瘧本志ノ候ヲ疾兼ルモノト  
○痢疾加枳殼黃連痢外感疾甚  
○腹痛加芍

茶本志  
○發熱頭痛加細辛石膏本志  
○飲食不進加砂仁白豆蔻本志

○嘔逆加丁香草果本志  
○衄血不止加烏梅葛根血外感ニ因ル者  
○疹

毒加肉桂人參茯苓疹  
○按此方芫芷香蘇合升葛湯加麻黃故

專要在麻黃一味矣○感冒風寒者發熱惡寒欬頭痛甚而無

汗者宜此湯○傷寒否熱久不退且汗不出口乾頭痛是班可出

之證即與此湯間班出而熱退也是乃醫術有功者所為矣予蚤

歲頃見一病人其證肌熱久不退且無汗口乾頭痛故與人參白

虎湯則一二貼而死天刑難遁者也此按燈下集ニ出タリ此ハ文章惡キニヨツテ聞ヘ惡

シ燈下集デ見レバ能キコユル此字面デスム大抵感冒ノ熱ハ

ハ必朝ハ熱ガサメルモノ俗ニ朝サメト云痘疹ナドノ熱ハ

朝サメガ為ヌモノカヤウナドヲモ考○東井療婦人項筋強

急而腹脹去麻黃加蒼朮即神授太乙散得奇妙ル以來有數奇批曰即

香葛湯也老醫曰東井史當時治婦人項強腹脹去麻黃加羌活

枳殼三貼而奇効又治一人頭痛咽乾心腹痛加蒼朮而大驗

此方時疫ノ初發頭痛甚強ク如破モノニ用ナリ或感冒頭痛甚  
キニ用ベシ氣實ノ人ニ用テ氣弱ノ人ニハ斟酌スベシ

此方他病活用例

斑疹

疹ハ風邪皮毛ニ落ス輕キ者ニハ荆芥防風前胡桔梗蟬退  
重キ片ハ用此湯班ハ熱毒肌肉ニ蘊ム輕キ片ハ升麻葛根  
湯加黃連犀角玄參ノ類重キ片ハ人參白虎湯主之疹ハ發散ス  
ベシ苦寒ノ藥ヲ用テ其發散ノ勢ヲ留ルコトヲ大ニ忌ム誤テ班  
ヲ治スル法ヲ以テ  
疹ヲ治スベカラズ

痺

解表升麻湯 二十三

治遍身壯熱骨節疼痛

麻黃 防風

- 柴胡 升麻 藁本 羌活 蒼朮 陳皮 當歸 甘草

右剉一劑姜葱水煎熱服出微汗

方下ニ述ル如ク痛風ノ藥ナリ風寒濕ノ三氣ニ因ル故解表除  
濕ノ藥ヲ用ヒ加當歸一味潤血行痺良方ナリ此方兼テ感冒有

熱身痛

ヲ治ス

頭痛

治頭風疼甚嘔吐方 二十四

醫統

川芎 一

薄荷

白芷

防風

- 甘草 細辛 羌活 荆芥 藁本 辛夷仁 各等分

右水盞半細茶一撮煎七分食後溫服

主治如方下嘔吐ヲ  
兼ルヲ目的スベシ

頭痛

川芎茶調散 二十五

治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼

鼻塞声重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻

注太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

薄荷 八川芎 荆芥 羌活 甘草 白芷 防風 細辛

右件為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

此方傷風頭痛ノ茶ナリ亦傷風解ノ後風氣ナオ上部ニ留リテ  
頭痛スルニヨシ此症常ニアルモノナリ若寒痰ノ症解ノ後頭  
痛バカリ跡ニ殘ルハ此方ニ宜シ若寒邪ニ感冒シタル後ノ頭  
痛ハ此散ニ宜シカラズ皆風痰ヲ發散スルノ藥品ナリ○篤云

此散近來東武ニテ諸風散ト銘シ賣茶シ海内ニ弘ミル茶ニテ  
用ルユヘ擺茶ヨリ用ルニ便ナル故ナリ然レモ寒邪ニハ禁用  
○一方 此方惣茶各一兩童便香附加二兩為散食後茶調服ス  
偏正ノ頭風或産後ノ頭痛ニハ豆淋酒ニテ服ス  
○右一方ニ更加酒黃芩酒黃連山梔石膏胃熱火炎ノ頭痛動作  
スル片ハ痛三煩渴引飲便秘スルモノ用之  
○偏正ノ頭風久不愈痰喘ヲ夾ミ熱者此散加細辛石膏菊花  
○偏正ノ頭風痰ヲ夾ミ久不愈モノニ此散ニテ探リ吐ス  
○風熱眩暈シ頭痛スルニハ此散ニ宜シ  
右三症此散ノ本症ナリ

此方他病活用例

赤目爛<sub>レ</sub>風淚下<sub>ル</sub>者<sub>ハ</sub>何<sub>レ</sub>熱淚<sub>ハ</sub>肝腎中<sub>ノ</sub>  
ト云<sub>フ</sub>ヲ不論<sub>シ</sub>此散<sub>ニ</sub>宜<sub>シ</sub>同<sub>レ</sub>伏火<sub>ナリ</sub>宜<sub>シ</sub>此散

時疫

人參敗毒散<sub>局</sub> 二十六

治傷寒時氣頭痛<sub>強壯</sub>熱惡寒<sub>身體煩疼</sub>

及寒<sub>瘧</sub>欬<sub>嗽</sub>鼻塞<sub>聲重</sub>風痰<sub>頭痛</sub>嘔<sub>噦</sub>寒熱<sub>並皆治之</sub>

柴胡 甘草 桔梗 人參 芎藭 茯苓 枳殼 前胡

羌活 獨活 右拾味各三拾兩為<sub>鹿末</sub>每服二錢水<sub>下</sub>

蓋入<sub>生薑</sub>薄<sub>苛</sub>各<sub>山</sub>許<sub>同煎</sub>七分去<sub>滓</sub>不拘<sub>時候</sub>寒<sub>多則</sub>熱<sub>服</sub>熱<sub>多則</sub>溫<sub>服</sub>加<sub>減</sub>傷<sub>寒</sub>頭<sub>疼</sub>身<sub>痛</sub>項<sub>強</sub>壯<sub>熱</sub>惡<sub>寒</sub>口<sub>乾</sub>心<sub>中</sub>溼<sub>熱</sub>加

黃芩<sub>感</sub>傷<sub>風</sub>鼻<sub>塞</sub>聲<sub>重</sub>欬<sub>嗽</sub>吐<sub>痰</sub>加<sub>半</sub>夏<sub>杏</sub>仁<sub>同</sub>頭<sub>目</sub>眩<sub>暈</sub>

屬<sub>風</sub>熱<sub>加</sub>半<sub>夏</sub>天<sub>麻</sub>同<sub>レ</sub>眼<sub>目</sub>腫<sub>痛</sub>因<sub>風</sub>寒<sub>所</sub>感<sub>加</sub>防<sub>風</sub>荆<sub>芥</sub>當

歸<sub>赤</sub>芍<sub>藥</sub>去<sub>人</sub>參<sub>茯</sub>苓<sub>同</sub>酒<sub>毒</sub>發<sub>熱</sub>渴<sub>加</sub>葛<sub>根</sub>黃<sub>連</sub>傷<sub>酒</sub>瘡<sub>疾</sub>

不<sub>問</sub>先<sub>寒</sub>後<sub>熱</sub>先<sub>熱</sub>後<sub>寒</sub>頭<sub>疼</sub>身<sub>痛</sub>加<sub>蒼</sub>木<sub>葛</sub>根<sub>草</sub>果<sub>棋</sub>榔<sub>瘡</sub>

風<sub>熱</sub>濕<sub>毒</sub>腰<sub>痛</sub>加<sub>續</sub>斷<sub>天</sub>麻<sub>薄</sub>苛<sub>木</sub>瓜<sub>腰</sub>風<sub>熱</sub>入<sub>大</sub>腸<sub>下</sub>血<sub>不</sub>

止<sub>加</sub>菜<sub>白</sub>皮<sub>薄</sub>苛<sub>烏</sub>梅<sub>生</sub>姜<sub>兼</sub>有<sub>血</sub>血<sub>加</sub>麥<sub>門</sub>若<sub>因</sub>酒<sub>毒</sub>者<sub>加</sub>黃

連<sub>下</sub>血<sub>足</sub>三<sub>陽</sub>經<sub>受</sub>熱<sub>毒</sub>氣<sub>流</sub>注<sub>脚</sub>踝<sub>上</sub>喉<sub>赤</sub>腫<sub>痛</sub>寒<sub>熱</sub>如<sub>瘡</sub>自

汗<sub>惡</sub>風<sub>或</sub>無<sub>汗</sub>惡<sub>寒</sub>加<sub>蒼</sub>木<sub>瘡</sub>皮<sub>膚</sub>瘡<sub>痒</sub>加<sub>蟬</sub>退<sub>同</sub>熱<sub>而</sub>紅

汗<sub>惡</sub>風<sub>或</sub>無<sub>汗</sub>惡<sub>寒</sub>加<sub>蒼</sub>木<sub>瘡</sub>皮<sub>膚</sub>瘡<sub>痒</sub>加<sub>蟬</sub>退<sub>同</sub>熱<sub>而</sub>紅

腫加木瓜蒼朮同。大便實加大黃同。風熱上壅咽喉窒塞或痛或不利生瘡或如肉變痛妨悶加黃芩半夏連翹倍加桔梗喉咽

○時行瘟疫下利赤白發熱口乾身痛加陳倉米黃連生姜大棗名倉廩散痢。噤口痢加陳倉米蓮肉同。痢後手足痛加木瓜

枳殼同。腎痛冷起手甚難遂合五積散各交加散加木瓜牛膝

生姜大棗腎痛。諸般瘡毒腫痛或癰疽疔腫發背乳癰癩瘡等憎

寒壯熱甚者頭痛拘急似傷寒加荆芥防風連翹忍冬人參各荆

防敗毒散疔癰。身生瘡膿血壅腫極痛且痒或風熱積毒發於面

頭手足如胭脂色加葛根赤芍葉升麻天麻蟬退薄荷麥門生地

黃名平血飲瘡。小兒急驚風初起發熱手足搐搦上竅天吊角

弓反張並一切感冒及瘡疹欲出發搐加天麻全蝎蚕蠶白附子

地骨皮驚風。按病人氣實者去人參若氣弱難運茶力者加人參

本。四時不心瘟疫熱毒鼻塞舌重頭面腫痛加人參薄荷生薑

同。頭痛甚者加荆芥本。如心經蘊熱口舌乾燥加黃芩同。

傷寒頭痛發熱惡寒半表重半裏輕者宜用之感冒。無名腫物赤

而痛處有發熱世俗謂之風毒腫若熱甚加黃芩可也風毒腫。外

科腫物貼茶故毒氣不出周身浮腫者宜用此湯瘡。一、脚患刺

世俗謂之腹疫病加粳米蓮肉刺熱痢與詞子肉豆蔻則雖痢止

而熱不退此湯加三黃或黃芩宜解散其毒痢。腸風下血及

近血赤得驗血下。○風眼目赤多血者用之若甚腫痛加三黃湯或

黃芩黃連亦可眼。○下湯風呂等風中浮血故赤班出甚痒加當

歸薄芎或白朮防風荆芥蒼朮若茶生地黃亦宜正傳曰謂之加

味敗毒散此方宜用癩疹疹班。○痛風因風濕者百節痛者脚氣痛

處煩熱者俱得奇効痺。○瘡氣在內難發出與此湯則悉發出又

因加減內消亦可楊梅結毒。○木頭瘟病項面腫及咽痛加牛旁子黃

連大頭病。○小兒急驚風加白附蚕蠶驚風。○小兒啼則口眼喎斜頤

少腫與此湯得數奇小兒雜病。○痘疹序病甚發熱與升麻葛根湯其

熱不去故此湯加紫草有奇効痘疹。○一人冬月患痢無熱腹痛與

芍藥湯不効故慮感風濕為痢與此湯得奇効冬月無熱痢疾若

及評甚夕。○或曰鼠咬加貝母雜。○凡欲與此湯者先試口氣

熱或骨節痛而可也此即的甚效。○常二此感

此方時疫初起ノ茶ナリニ因方云本道藏ヨリ出ス異入傑出ス

發表 五十七 烏巢堂藏

相傳フ活人書衆人ノ病一般ナルモノ加葛根妙夕リ羌活獨活散表邪柴胡前胡川芎行陽氣清不正之氣桔梗枳殼胸中活濁ノ氣ヲ下シ人參茯苓補中培土ノ邪氣ニ勝ツ甘草和諸藥邪ヲ緩フス時疫ニ用ル片ハ人中黃ヲ以テ甘草ニ代テ益ヨシ

○舌純紅色ナルハ時疫ノ邪熱初テ内ニ畜フ此湯ニ加減シ或升麻葛根湯ナドニ宜シ

○医通云温病熱病時行疫癘ヲ病テ素陰虚ノ人治シ難シ家大人嘗云崇禎辛巳年飢饉ノ民時疫大ニ行レ凡發表攻裏ノ藥ヲ服ノ皆死ス夕、敗毒散補中益氣湯ヲ用テ多少得生モノナリ

○時行疫癘ノ片患頭重モノ

此湯加蒼朮藁本桂ナリ

此方他病活用例

**感冒**

活人書方後云嶺南烟瘴或卑濕ノ地脚氣痿弱此藥不可少ト云ヘリ

同 感冒汗後不解モノ宜

疫ノ初發寒疫ノ汗メ後不解モノニ用云云謙云方中有人參時疫ノ初發ニ用ルハ正氣ヲメ邪氣ニ勝シム寒疫ノ後ニ用ルハ補之故ナリ然レバ人參不可少ト必セリ然ルニ令皆去人參不用フレニテモ効アルハ病輕キ故ナリ医通云虚人發散ノ後熱不止ハ此湯ニ傷風疫ノ有汗者此湯加桂枝謙云

同 下人感冒宜シト云ヘリ

此症脉沉細數者加桂枝合半ナリ

同 頭痛甚ク終夜ニ才ヒウナル

風濕熱ノ身痛煩渴者此者此湯加麻黃即愈

同 湯去人參柴胡加瓜薑根

風濕ノ症去レ凡濕殘ル者此湯

温毒

温毒癰疹此湯加紫草芍藥

瘧病

瘧病風痰盛者此湯加防風天麻黃

疫癘

讀編一 發表

五十八

烏巢堂

芩全蝎生 **頭痛** 上焦熱し頭痛者此湯去柴胡加菊花

明經ノ熱毒ナリ用此湯不 **班疹** 外感ハ此湯加紫草或升麻葛根湯加玄參

者此湯或小柴胡湯加防風連 **腰痛** 風傷腎腰痛或左痛或右痛無翹或補中益氣湯加羌活防風

ノ以テ顧ルコナラ **脚氣** 脚氣發熱不退者此湯加木瓜或此湯合五積散加木瓜

加蒼朮 **牙齒** 腸胃積熱ニ因テ牙齒痛口氣甚臭不可近者此湯加荆芥防風升麻石膏

大黃 **同** 喉痺ノ病一般流行スルアリ此ハ時疫ナリ荆防敗

毒散ニ加 **類痘** 因風熱類痘瘡者此湯加升麻葛根白芷 **丹毒** 丹毒通用此湯加紫蘊

ラレ身痛無汗者宜此湯虛症ニハ逍遙散去白朮加桂枝 **小兒驚熱** 小兒上焦熱し驚惕瀉不

常者此湯加 **小兒張** 小兒強直發熱ノ不搐 **痘** 痘毒大便堅少發熱甚者消毒飲和此湯

當皈木香 **疔瘡** 疔瘡表症多キ者 **疔** 疔瘡表症多キ者此湯加蟬退強蚕

ノ痛ハ邪裏ニアリ清熱解毒湯ニ加白蜜 **疔** 疔瘡不可下者此 **疔** 疔瘡不可下者此

花 **同** 疔瘡背ニ發者此湯 **腸癰** 腸癰不可下者此 **疔** 疔瘡不可下者此

裏急後重便膿血腹痛頭痛熱甚脈弦數此湯加芍藥桃仁大黃 **疔** 疔瘡不可下者此

發毒表

疔瘡

五十九

烏巢堂藏

用テヨイコモアルナリ是ニ加黄芩テモヨケレモハヤ柴胡  
 大黄デハタラカス程ニ入ヌグ傷寒ノ初發ノ如ク壯熱アルニ  
 黄芩大黄ヲ加テヨキコアリ其レハ黄芩ハ大  
 腸ノ熱ヲ醒シ大黄ハ疎滌ソヨイコモアルグ  
 同 一人常過酒  
 疔出腰脚腫大便虚坐一日四五行通只一  
 同 外熱ヲ的ニス  
 二次脈細數此湯加黄芩黄連葛根當飯桃仁  
 アルガ又的ナリ又頭痛モアリ腹痛フヨキアリ其レハ加青皮  
 ナリ惣ノ腹痛ニフシクニ忘テ見分テ茶ヲ用テ一旦治メ又痛  
 ム痛ンダリ止ンダリシテ諸葉不効ハ休  
 息腹痛ト云木方ニ加青皮用ルト効アリ  
 中風 中風諸症愈テ手  
 足不遂ニ此湯加  
 木香木瓜青皮 中風表症ニ此湯加防風荆芥獨活白朮忍冬  
 枳實枳椇愈 同 木瓜烏棗 夏去烏棗 枳椇入參茯苓有熱更加大黄

本邦老医傳云淋病莖中痛ツヨク百葉

不効ニ五淋散ニ合シテ用屢効アリ

**揚梅瘡**

瘡毒後一  
身疼ニ用

**眼目**

眼風

身熱頭痛自汗甚臍上塊上下如梁

諸医不効日々羸瘦加薄荷黄芩効

本方ニ加當歸芍藥防風荆芥

蒼朮白朮生地黃名加味敗毒散

**風濕**

表ノ血熱ヲ涼スル葉ナリ  
 亦風濕ヲ治スナリ身ノ痛

か目的

**下血**

血風ニ用ル葉風邪  
 アル下血ニ用ユ

**眼目**

目ニ血ノサシタ  
 ルニ加三黄用ユ

**揚梅**

瘡毒  
ノ外

ニ発シカタキ

**大便閉**

大便秘結ニ通葉バカリ用テ内ヲクツ口  
 ゲルコナイユヘニ不効ニ用此方効ヲ得

夕淋病莖中甚痛膿血出ルニ

**疥**

肥前瘡ノ類ヲ熱湯ニテタテ  
 コメテ腫氣トナルニ用ル升

冬温

陽旦湯 二十七

治冬温發熱咽痛或自利而效

- 桂枝 三錢
- 芍藥 酒焙
- 甘草 炙各
- 黃芩 三錢
- 生薑 三片
- 大棗 三枚

右水煎去滓温服無時日二三服○本方加乾姜名陰旦湯治内  
 挾寒食者

冬温トハ冬非常ノ煖氣行レテ其温氣ニ傷ラレ其症心煩ノ嘔  
 逆ノ咽痛身熱頭痛或欬嗽自汗頭重面腫其初メ咽痛後必下利  
 ス此湯加桔梗姜蕤若寒食停滯或寒凉ノ業ヲ服シ寒邪外ニ鬱

シ濕邪内ニ結セバ  
 更ニ加乾姜黃芩

此方他病活用例

瘰癧血痢身熱  
 脉浮者用此湯

風温

姜蕤湯

活人 二十八

治風温欬嗽及冬温發熱頭眩咽乾舌強

- 姜蕤 一分
- 白薇
- 麻黃 去節
- 川芎
- 葛根
- 羌活
- 石膏
- 甘草 炙
- 杏仁 去皮
- 青木香 各
- 右水煎日三服

此藥冬温或温病誤テ發汗シ其症脉浮自汗出身重ク多眠ル鼻

皮膚癢牛引草

續編一發表

六十一

鳥巢堂藏

息如鼾語言難出此湯主之

此方他病活用例

**欬嗽**

冷熱欬ハ衣服ヲ増タリ減タリスルニ因テ寒熱在ニ感シ  
作寒乍熱シ脈浮風重キモノニハ金沸草散若シ脈數或潛

ナル者ニハ熱重シ此

**同**

先風ニ傷レテ欬嗽ノ後亦熱ニ傷レテ  
欬嗽スルハ熱寒邪ヲ包ム声嘶スル者

湯去川芎加淡豆豉

ニハ此湯ニ  
加減スベシ

**傷寒**

麻黃附子細辛湯

二十九

麻黃 二兩

細辛 二兩

附子 一枚  
炮

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫内其葉煮取二升去滓

溫服一升日三服

此茶傷寒少陰ノ證太陽ノ兼表邪モノニ用ルナリ夫太陽ノ表  
證ハ發熱頭痛脈浮ナリ此證ハ脈沉ニシテ發熱シ無頭痛太陽ノ  
症ナラバ脈浮頭痛スベキニ反テソウナイカラハ少陰ノ表志  
トシ可汗之以麻黃細辛發表邪以附子溫少陰經ソレテ本經ニ  
少陰病始得之及發熱脈沉者麻黃附子  
細辛湯主之云云反ノ字ニ意ヲ付ベシ

**傷寒**

麻黃附子甘草湯

麻黃 二兩

甘草 二兩

附子 一枚  
炮

段醫濟手引草

續編一 發表

六十二

烏真堂

右三味以水七升先煮麻黃一兩湯去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

此藥前湯ト同症ナリ前症ハ日數無ソ只タカ及テ發熱脈沉ト云此症ハ得之コト二三日ト云病ナホ輕シ故ニ可微汗去細辛代甘草ナリ本經少陰病得之コト二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也云

感冒

八解散三十一局治四時傷寒頭疼壯熱感風多汗及癆勞傷過度骨

節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘急面色痿黃怠惰少力欬嗽

寒熱羸弱自汗胸膈不快嘔逆惡心

人參 茯苓 甘草 陳皮 白朮 藿香各二兩 厚朴二兩 半夏一兩

右為細末每服二錢水一盞生姜三片棗子一枚葱白三寸同煎

至七分溫服不拘時候。欬嗽桔梗前胡桑白皮杏仁之類臨時

加味。頭痛壯熱無汗加羌活去人參木。瘧後調理加草薺青

皮瘧。婦人妊娠外冒風冷而毫毛寒立カ或汗出カ加當歸川芎木

香本症。婦人欬嗽身體疼痛加五味杏仁白芷婦人。婦人血

風加川芎風。本方去茯苓半夏加木香香附子名調氣散治

小兒變蒸吐瀉不乳多啼小兒

改舊藥手引草

續編一發表

六十三

烏巢堂藏

此茶不換金正氣散ニ以白朮代蒼朮加人參茯苓倍厚朴虛人ノ感冒方下ニ所述症ヲ治ス畢竟溫補中焦邪自去ル

○感冒素其症重ク或療治不應ノ時疫ノヤウニナリ熱ノ指引モアリ或舌ナドモ焦レ其外彼是兼ル病症モアツテ何レ見分

難ク感冒ヤラ時疫ヤラ不知ニ近代本邦ノ醫師ブラクトンタ療治ラシテ愈ルコトアリ此方ニ加柴胡黃芩減厚朴ブラク用テ

居ル中ニ即効モ無レ凡少ヅ、快方ニナリテ遂ニ本快ス是茶的中ニテハ無レ凡病カラ愈テクル症ナリ去ニヨツテ京師ノ

老醫高盛子何病ニテモ此茶ヲ隨分小貼ニ調合シ柴胡青皮芍藥香附木香縮砂麥門枳殼ノ類或附子ヲ加ルコトモアリ其見合

ニ加味ス又藿香厚朴ヲ去レバ六君子湯ナリ是ニモ右ノ意得ニテ加味シ茶一貼五六分ホドニ調合ノ見合ノ居ル中ニ自然

ト愈ルコトアリ此ハ不器量ナル療治ナレ凡カヤウナ病人カタニクアルモノツレニハ此療治ヲスベシ假令不器量ナル任方

ニテモ鬼角愈ルガ能程ニ是モ味ガスルコト意得ベシ去人參コトモアリ不去コトモアリ必宛用コトモアリ或始去後加コトモアリ

此方他病活用例

**内傷** 百二十方云此茶補中益氣湯ノ輕症ニ用云謙云此茶ヲ用ルト不用ハ以輕重云ベカラズ元來茶ノ筋ガ違テアリ

補中益氣湯ハ勞役ヲ主トノ用ヒハ解散飲食勞倦ニ因テ内傷ノ諸症ヲ見ス者ニ用是ガ食滯ト云テハ無レ凡饑飽無時ナド

ト云テ脾胃ノ持チナレガ惡サニ草卧又云去人參加桔梗名夕コナリ此症ニハハ解散ガ的當ナリ同万安湯此加減器量ア

ル者ノヲカシガルコトナレ凡ソウデナイ成程効アル茶ナリ其

段馬寮手引草 法賣編一 發表 六十四 烏巢堂去載

目録 卷之三 雜考 類中風

目的ハ此加減ハ中焦ノ不運故ニ生ズル病ニ用ルナリ内傷外感氏ニ此意味ニテ用ベシ前段ニ人參ヲ不去ニ用ルハ飲食勞傷ニ因テ中焦ノ草臥ヲ主トス此段ハ中焦ノ不行ヲ主トス

**類中風** 又云頭痛發熱體倦舌強不能言語是則傷寒カ中風カト云ニ疑アリ可用之謙云外ノ所ニ疑ハナイ舌強不能言語

**咽痛** 又云頰頰及咽腫津唾難吞者加桔梗羌活升麻友松子云是濕痰或因風濕者アリ

**泄瀉** 又脾胃虚而泻セバ除厚朴 謙云此外種々治方アリ

**欬喘** 此湯加佛耳草 類勞證 倦レ或兼鬱滯或氣

**痢** 一人二十餘歲泄痢之後 中氣虚弱食後即眠上氣

脉細弱此湯加黄耆當飯升麻柴胡

**哮喘** 哮喘急ニ此湯加羌活コソレハ百葉不効モ 傷寒 四十餘歲之 男思慮耗氣

之後患傷寒發熱及十日不止甚譫語耳聾舌乾不知苦久脉數弱 無倫次用補中益氣湯及寒涼之劑而不効此湯加芍藥思慮耗氣

後此 本邦老医傳云感冒頭痛少有汗足微冷脉微弦無力ニ 本證 與二三貼後宜用益氣湯此症正氣散ノ類ヲ用ルト甚

症多 アシ、謙按ニ右ノ症夾陰ノ症ニ紛ル、夾陰ナレバハ解散不

可用只宜用建中湯ナリ夾陰ハ脉大而虚按之微也以脉可辨之

**感冒** 加味益氣湯 三十二

即本方加羌活防風冬月春寒更加桂枝

後遺察手引草 續編一 發表 六十五 烏真堂

此方勞役感冒ヲ治ス中編ニ詳ナリ加味ノ茶少異同アリ證ニ從フテ用ベシ何レニモ羌活防風ハハツレ又其外極々ハナシ

大頭病

冬連消毒飲 三十三

治天行大頭病發熱惡寒頭項腫痛脈洪取

作痰火治之其喉痺者亦照此方治之

- 柴胡 甘草 桔梗 川芎 黃芩 荆芥 黃連 防風
- 羌活 枳殼 連翹 射干 白芷

先加大黃利去一二欵後依本方去大黃加人參當飯調理の水  
二鍾生姜三片煎至一鍾鼠粘子一撮再煎一沸槌法入竹瀝姜

汁調服

此方天行大頭病ノ茶ナリ東垣ノ普濟消毒飲ト云茶アリ此方ト茶味異ナリト云ヘ凡其効ハ一ナリ故此方ヲ載スル程ニ此方ヲ用ベシ喉痺ハ此方ヲ照セトアルハ此症必咽ガ腫塞ルモノツレモ是テヨイ亦大頭病デナレニ喉痺ハカリ病ム者モアリツレニモ此方ヲ照メ用ベシ枳大頭病ニ荆防敗毒散ヲ用ル症モアリ小柴胡ニ加味メ用ベキ症モアリ上編ニ詳ナリ

○李挺云大頭病凶荒勞役宜用安裡  
虛者普濟消毒飲加參飯便秘加大黃

大頭病

牛旁冬連湯 三十四

治積熱在上頭頂腫起或面腫多從耳根上

起俗曰大頭瘟并治煙瘴

黃芩酒炒 黃連酒炒各 桔梗 石膏各一 荆芥表半 防風 羌活各三

右剉一劑生姜一片水煎食後細々カク呷温カク每一盞ナシテ做二十次服常レニ

冷藥在上勿令飲食在後也

此方前方ト同シク大頭病ノ菜ナリ此モ咽喉痛ヲ兼治ス但シ并ニ煙瘴ヲ治ストアレバ不正ノ氣ニ中リタル症ニ用又時疫ニモ用ベシ然ルニ冬連消毒飲モ不正ノ氣時疫ニ可用菜ナレバ畢竟同シクナリ但シ症ニ臨シテ病ト菜ト考合テ此方ヨリハ是ガニシト云フカ自然ニ出テクルモノ考ヘ可用ナリ

頭痛

半夏蒼朮湯三十五

治素有風證目眩頭痛眩暈胸中有痰兀々

欲吐如居煖室則微汗出其證乃減見風其證復行當先風下日

痛甚 升麻 柴胡 藁本各五分 茯苓 神麴姜汁炒 蒼朮酒制

半夏各 生薑十片 甘草炙 水煎食遠稍熱服此方即柴胡半夏湯

此方ハ痰症ニ因テ持病ノ頭痛ニ用ル菜ナリ痰症ノ頭痛多キモノ此菜ノ目的ハ持病ノ頭痛サレ起テ欲吐ガ目的ナリ  
○眩暈眼クヲ三惡心見風亦發ス此湯主之

頭痛

選奇湯三十六

治眉棱骨痛不可忍或風熱上壅眩暈

續編一 發表 六十七 烏巢堂藏

羌活 防風各 甘草夏 酒黃苓一錢五分冬不用 加半夏姜制

右水煎

方下ニ云如夕眉稜骨痛ノ方ナリ眉稜骨痛ハ風熱上ニ壅ルニ因テ此忘ヲ生ス此藥ハ右ノ病ニ随分奇効アル藥ヲ選テ制スル故ニ名選奇湯極テ効アル藥ナリ服法食後ニ稍熱シ緩々服之冬月ハ去黃苓加淡豆豉葱白

○赤目ニハ加菊花ノ鼻塞ニハ加細辛○夏月火ニ近ケハ痛ハゲシキハ伏火ナリ加石膏三錢○頭風疼熱不止加石膏麻黃不應ハ血病ナリ

加川芎牙茶

○薛已治一婦人眉稜骨痛後及太陽面青善怒此肝經風熱也此

斑疹

湯合逍遙散加山梔天麻黃耆半夏黃苓愈コノ症失治則多損目若シ兩耳ヨリ膿出ルニ及バ、危シ

消毒犀角飲三十七

治癰及癩疹

牛蒡子四錢 荆芥一錢 甘草一錢 犀角一錢 黃苓一錢 防風一錢 右水煎

此藥熱ニ屬スル斑疹ニ用ベシ吳昆云無熱不斑無濕不疹云牛蒡子ハ風濕ノ癩疹ヲ治ス故ニ以之君トス餘藥皆散風熱ノ藥ナリ方下ニ治斑トアレ凡疹ノ方ガ主治ナリ或斑ト疹ト相交リ出ルコアリ此方尤宜之

葛根橘皮湯三十八

冬月肌中癰爛效而心悶主之

葛根 橘皮 杏仁 知母 麻黃 黃芩 甘草各等分

右水煎

此藥冬月ノ發班ヲ治ス其証方下ニ云ガ如シ然ルニ此方モト  
 傷寒溫要ニ出冬月非常ノ溫氣ニ傷ラレ即不疾シテ春ハ餘寒  
 ノ氣ニ才サヘラレ毒氣未發三月時分燄氣行ニテ溫毒トナリ  
 テ發スル始メ發スル片肌肉錦紋ノ如ク效ノ心悶清汁ヲ嘔吐  
 スル者錢之謙按スルニ溫要ノ用法ト方考ノ主治トハ冬月ト  
 春月トノ違アリ寒氣ノ時分ニ用ルトハ各別ナリナレ能ク  
 考ヘ見レバ此藥品ニテハ冬モ春モ通用ノ用ヒ可然ナリ但冬  
 テモ春テモ嘔吐清汁スルト  
 云ヲ目的ニシテ用ヘキナリ

頭痛

驅風觸痛湯三十九

治諸般頭痛

夾門二 黃芩酒一 羌活 獨活 防風 白朮

當歸 川芎 白芷各 蔓荊子八 藁本五 細辛 甘草各

右ハ姜煎服○下方去藁本加菊花○左痛加紫胡生地各 紅花

龍胆各 右痛加黃耆一 葛根八 正額上眉稜骨痛甚者食積痰壅子

加天麻五 半夏山查枳殼各 當頭頂痛加大黃一 藁本五 風入腦

髓而痛加荆芥木瓜葶藶子各 氣血兩虛有自汗加黃耆一 人參

白朮生地各

此方上ノ意味未會得ナゼナレバ本方多味其上分量ノ多少未  
審也アリ但頭痛ノ總司トノ時ニ臨テ意ヲ加ヘ用ベシ眉稜骨  
痛ハ選寄湯ノ下ニ云如ク風熱ノ上壅ナリ此方ノ加減ニハ食  
積痰壅ト云此亦時々見及ビタルコナリ兼テ意得ヘシ  
○友松子云按雲林此方治諸般頭痛類聚風寒者總其大體而制  
之也高嶺之上唯風可到故味之薄者陰中之陽自地升天散其壅  
纏也然亦有二陰三陽之異用某者知之則有準的矣太陽經頭痛  
惡風寒脈浮緊川芎羌活為主少陽經頭痛往來寒熱脈弦細柴胡  
黃芩主之陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實升麻葛根白  
芷主之太陰經頭痛必有痰射重或腹痛為痰癖脈沉緩者半夏南  
星主之少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脈沉細麻黃附子細辛湯主  
之厥陰經痛項痛或吐痰沫冷厥脈浮緩吳茱萸湯主之若風甚疏

散太過而頭痛服辛散某反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈御米  
殼乳香赤芍某之類此外因之活法也

小兒

惺惺散四十  
活人 治外感風寒鼻塞痰嗽發熱

人參 白朮 茯苓 桔梗 細辛 甘草 薄荷

瓜蒞根 各ホ  
分 右水煎服

小兒感冒ノ葉ナリ大人ノ感冒ト大抵同シ此方バカリ小兒ニ  
限テ用ル方ナリ虛弱ノ小兒風熱甚ク咽乾或少ク擗擗ナドス  
ルニ用ナリ方中四君子湯ハ補元氣桔梗細辛薄荷ハ散風寒天  
花粉ハ除渴擗擗ヲ止ム故ニ瘧疹ノ初發ニ用ベシ○一方加芍

皮膚病ニ用ス 賣角一發表 七十

葉子り令小兒專門去  
人參感冒痰嗽ニ通用

表裏

五苓散 四十一

猪苓 澤瀉 茯苓 桂枝 白朮

右五味為末以白飲可為散湯ハ和服方寸匕日三服

此兩解表裏之藥故云覆取微汗茯苓猪苓味甘所以燥脾逐濕也桂也澤瀉味鹹所以泄腎止渴也白朮味甘所以燥脾逐濕也桂

枝味辛所以散邪和營也欲兼此藥モト表裏ヲ兼治治表必

用桂枝專時ニ因テ水道ヲ利ス用利水則宜肉桂妙用在肉全

在乎此若辛熱ノ藥ヲ恐以其辛熱而去之則何能踈肝肉桂伐

腎腎ノ邪水ヲ伐テ津通津利水乎肉桂通利小便ノナリ小

○此逐内外水飲之首劑利水ノ藥多シトイヘ金匱治心下支

飲眩冒五飲ノ一ナリ心下ニ支用澤瀉湯此散去猪治嘔吐思

水用猪苓散猪苓白朮茯苓隨意取用二二味成方總不出是

湯也祖劑云未詳五苓散治傷寒温熱病表裏未解頭痛發熱口燥

咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止

者宜服之本症又治霍亂吐利躁渴引飲霍亂并治瘦人臍下有動悸

吐涎沫而顛眩此水也諸如此者咸屬水飲停蓄津液固結便宜

取用但須增損合宜耳動悸加減熱甚去肉桂加黃芩何病ヤ○中

暑煩渴身熱頭痛霍亂泄瀉小便赤少心神恍惚宜此湯或為末

熱湯調下愈妙加滑石甚奇暑○喘欬煩心不得眠加阿膠喘○

恍惚加辰砂上ノ加減○伏暑身熱大渴未解合人參白虎湯暑

○濕熱所傷身熱煩渴小便赤少宜此湯濕○身腫無汗倍加羌

活水腫○黃疸發倍加茵陳疸○水腫從腰以下俱腫加木香茵陳

腫水○虛寒小便不通加當歸枳殼牛膝木通甘草燈心小便○小

便虛弱不禁者合回物湯加五味子山茱小便○男婦赤濁合妙

香散名香苓散用天麥二兩煎湯而下濁○濕瀉者瀉水多而腹

不痛腹響雷鳴脈細加薯蕷陳皮蒼朮肉豆蔻訶子砂仁甘草生

姜烏梅燈心泄瀉○傷寒三四日往來寒熱自利者本方合小柴胡

湯入姜枣名柴苓湯一切發熱憎寒者邪在半表半裏宜此湯感冒

○瘧發寒熱病在表裏陰陽不分亦然無汗加麻黃有汗加桂枝

寒多加肉桂熱多加黃芩瘧。去桂名四苓散。小便不禁有熱加黃連黃柏五味子山萸小便不禁。飲酒伏暑鬱發為疽煩渴小便不利加茵陳瘧。

此藥ノ本昔ハ太陽ノ中風有汗ノ症桂枝湯ヲ用ベキニ此症有汗故解肌ノ藥ヲ不用凡巳ト解スベキト意得テ桂枝湯ノ類ヲ不用程ニタゞ汗計出テ風邪ハ不除津液ヲノヒ傷テ病ハ不去六七日モゴブラクノヲルウチニ風邪ガ膀胱ノ府ニ陷テ煩渴ノクル此ヲ續論ニ風傷衛犯本ノ症ト云故ニ表裏ノ症アリ煩渴スル程ニ水ヲ飲バ即吐出スナゼナレバ府ニ入ル処ノ熱邪ガ其人ノ素リ停ル処ノ水飲ヲツレテ上逆スル程ニ外ヨリ入ル

ノ水ヲ捨テ受ツク又此ヲ水逆ノ症ト云府ニ入ル処ノ府ハ膀胱ノ府ナレバ小便不通トハ知レタゞ此藥ヲ用テ表裏ヲ兩解スル茯苓猪苓滲水滌飲澤瀉腎邪止渴白朮燥脾逐濕桂枝散風邪和營藥ヲ服ノ後多少飲温湯覆取汗表裏ノ邪ヲ兩解スベシ兩解スル合点ナレバ用桂枝タゞ欲通小便セバ可用肉桂

○吳山甫ガ説ヲ按スルニ茯苓澤瀉猪苓白朮性異ナリト云ヘ凡均レク利水ノ功ハ一ツナリ桂ハ辛熱能和氣氣和スレバ小便自ラ利小便便利スレバ熱小便ニ從テ弛ル、咽渴ハ不治ノ自ラ除ク熱汗下ノ後津液七テ小便不利モノニ強テ利之則重子テ津液ヲヒノ益ク其陰ヲ虧クト云謙云此説甚ヨレ上茯苓猪苓等ノ五味ノ方考ハ医通ニ從フサレ凡医通ノ説ハア一リ向上ニテキコヘニクシ此方考ハ此吳山甫ガ説ニ從フベシ

○吳氏又云傷寒小便不利ノ渴者此方主之謙云此一云此方ヲ用ル端の目的ナリ本論ニ所云ノ水逆ノ症ハ其人モト水飲儼ヘル水飲ナキ者ハ水逆ノ症無ルベシ渴ノ小便不利ト云モノハ必定ノ候ナリイワデモ寔ラ又此茶ノ的候ナリ

此方本證主用例

本論ヲ按ズルニ桂枝湯ノ解肌ヲ可用ニサハナクテ麻黃湯ノ類ノ發汗ノ茶ヲ用ル程ニ邪ハ不除ノ胃中清陽ノ氣ヲ傷テ素ヨリ停ル所ノ水飲ヲ發メ水逆ノ症トナル必中滿ヲ致ス若シモ猶發汗ノ茶ヲ用レバ惡シク此症ニ此散ヲ用ベシ  
○右ノ痞津液ガヒテ燥ク程ニ煩躁不眠渴スル故ニ水ヲ飲タガル者アリソレニハ少々與ヘテ飲セヨ胃ノ氣和ノ病愈ル水

與ヘテモ不愈外ニ變リタ症ナク脈浮ニノ小便不利宜此散  
○病有表バ解表ノ茶ヲ可用ニソレハ不用ノ水ヲ與フル程ニ水ガ其邪ヲ劫メ肉伏スソレガ少陰經ニ入ルモアリ或大陽ノ府ヲ犯スモアリ少陰經ニ入ルナラバ文蛤散ヲ用ベシソレヲ用テ愈サレバ太陽ノ府ヲ犯ス程ニ宜用此散文蛤ハ渴ヲ止ムルノ聖茶ナリ

○頭痛發熱身疼ハ外感ナリソレニ水ヲ飲ミタガ  
ルハ熱邪裏ニ入ルナリ此散ヲ用テ兩解スベシ  
○病ヲ得テ無熱夕々狂言煩躁不寧顔  
色不常ハ此熱膀胱ニ結ス此散ニ宜シ  
○誤テ汗シ虛陽擾亂氣上リ或眠リ或吐シ心煩  
惡寒スルモノニハ此散去白朮多ク加酸棗仁

舌根赤少舌尖白少不惡寒身熱之煩渴者

邪太陽之本ヲ犯ス用此散兩解スベシ

病人身體發熱頭面汗出頸以下スベテ無汗咽乾キ小便不利

身燥無汗此熱外ニ不越内ニ蓄ヘテ為黃疸茵陳ノ煎湯飲此散

小便堅其色赤黃此陰血不足

陽盛ニノ小便堅シ此散加滑石

此散他病活用例

時疫 濕疫大行 時疫下疔未全備者宜白虎湯汗後不得

此散主之

同 眠微捷ノ渴者此散去桂合益元散宜用

發熱自利脈浮者

陽毒

陽毒此散去桂加升麻芍藥若

濕 春夏ノ

此散去桂加黃芩

狂言乱語者更加辰砂酸枣仁 間交リ

自汗肢體重痛難轉側小便不利ハ風濕ナリ用此散利小便若シ

無煩渴小便利者ニハ邪猶

外微汗ノ經絡ヲ通ス

同 風濕身

在經羌活勝濕湯ノ類ナリ

同 無汗者ハ此散加蒼朮

同 痛拘急

者加 傷濕症備リ小便秘シ大

暑

中暑脈洪大發熱煩渴重キ者

麻黃 便溲者此散去飲戊巳圓

ハ瘡潰不省人事似熱病暑病

ハ乍輕ク乍重キヲ異ナ

暑病熱甚ノ身痛三重ク脈微弱ナリ

リトス此散減桂加香薷

同 此多冷水ヲ飲ムニ傷ラレ水皮中ヲ

行ク此散加葱白

暑氣攻裏熱不解心煩口渴或腫者ニハ辰砂

淡豆豉探リ吐ス

同 五苓散若シ腹中刺痛小便不通者ニハ此散

加木香若シ酒熱ト暑氣ト相合シ發熱大渴小便不利其色如血

ナルニハ此散去桂加黃連若シ大汗不止甚キ片ハ元氣虚ス急

可止汗此散倍

同 中暑心神恍惚タルニハ此散加燈心

霍亂 霍亂

肉桂加黃耆

同

煎湯トナシ加辰砂未有汗者加黃耆

霍亂 轉筋

二八此散加 **泄瀉** 泄瀉遍身浮腫スル者 **同** 濕瀉二八四苓散加蒼  
藿香木瓜 二八此散加升麻柴胡 **同** 木火瀉二八四苓散加

木通 **同** 暑瀉腹痛積滯アル者二八此散合藿香正氣散若之積滯  
黃芩 **同** ナレト云へ凡腹痛甚キ者二八此散加木香或六和湯加

木香或此散ト六和湯ト **同** 火瀉二八此散 **同** 熱瀉ハ糞色赤黃  
煎シ蘇合香圓ヲ調下ス **同** 加黃連芍藥 **同** 有響痛ヲナシ糞

門熱ノ如湯煩瀉小便不利者二八此散ニテ用者連九或傷暑氣  
泄瀉スルモノ暑熱瀉ト **同** シ胃冷湯或此散加車前子少許

**水腫** 大病ノ後腰ヨリ足ニ至テ腫ル者ハ水ナリ **同** 足輕浮腫  
牡蛎沢瀉湯救之輕キ者ハ此散加大腹皮牡蛎 **同** 小便不利

二此散 **同** 乾癢ノ菜大二早ク身腫ル上半身甚キニハ羌活勝濕  
加防已 **同** 湯加紫蘊升麻白芷下半身甚キニハ此散以白朮代蒼

朮加木瓜 **同** 瘡久不愈クタブレ臥テ腫ル者ニハ此散 **同** 水下  
大腹皮 **同** 加陳皮木香換柳滑石甘草枳殼大腹皮縮砂 **同** 二滯

リ斐ノ附腫トナル者 **同** 陰寒ノ濕腫痿弱ス **淋** 淋病熱甚ク莖中  
ニハ此散去桂加人參 **同** ルニハ此散加茴香 **同** 痛者ニハ此散減

桂加滑 **同** 淋病水氣アリト云へ凡腹中不冷 **同** 小便急滿不通者  
后木通 **同** モノハ此散ノ意ニ倣テ可用肉桂 **同** コレラ癰閉ト云

燈心ノ煎湯 **同** 小便瀉痛常ニ急ニ欲尿點滴通ノ莖中痛甚ク不  
ニテ用此散 **同** 可忍若ハ此散加阿膠或此散加車前子少許或此

散和益元散等分或小便小便數ニノ少キ者ハ實小便效以遺溺  
此散ニテ飲火煎丹數 **同** 熱ナリ此散加滑石甘草不禁若ハ屬膀胱

此散 **同** 小便不禁屬實熱者此散合黃 **同** 小便急ニ出テ難保サレ

此散 **同** 連解毒湯虛者ハ此散合四物湯 **同** 凡小便少ク出テ不多又急

女醫家三才集 土賣扁一表裏 七十六 烏真

二出テ瀉リ不痛ハ淋病ニ非ス或小便ニ終テ間亡ナク已十出  
 ルコアリ此尿リヲ忍ビ或忍尿行房事此散加阿膠用加減八味丸  
 身體下躰痛者ハ小便ヲ分利ス **同** 身體痛暑濕相搏面赤尿赤  
 痛 **同** 此散ニ二妙散ヲ加ベシ **同** ハ合敗毒散加當歸芍藥  
 身體痛ニ及ビ重キ者ハ濕ナリ此散ニテ可汗●或風濕相搏脊  
 子一身體盡ク痛者ニハ此散加羌活防風升麻柴胡藁本蒼朮  
 脊此忘脈沈緩者ハ風濕ナリ此散 **腹痛** 小便不利ノ腹  
 痛ノ以白木代蒼朮以桂枝代肉桂 **腹痛** 痛者ハ宜此散 **小腹痛** 小  
 不通小腹痛ニ按之甚夕不堅コレヲ彈テ声アリ脈數 **心痛** 心痛  
 有力煩渴引飲ス書甚者ハ此散夜甚者ハ猪苓湯 **心痛** 心痛  
 引脊樞樓スル者ニハ沉香降氣湯或此散 **頭痛** 頭痛ニハ加  
 倍桂韭汁ニテ丸トシ茴香湯ニテ下ス **頭痛** 頭痛ニハ加  
 羌活川芎 **瘧** 瘧暑

ハ渴甚ノ汗多ク出ス用加味 **疝** 小腸不問何疝此散加茴香或大  
 香薷飲其間ニ服辰砂五苓散 **疝** 小便不通者ニハ此散倍桂青木  
 香圓ヲ下ス或逆上心下ヲ攻メテ痛者ニ **同** 水癩外腎腫レ其ノ  
 ハ用生韭汁和此散為丸茴香湯ニテ下ス **同** 大甘如斗如升不痛  
 不痒者ニ加茴香 **脚氣** 脚氣小便不通者ハ此 **黃疸** 暑濕ノ忘ハ色  
 非汁ニテ丸トス **脚氣** 散ト合除濕湯加木瓜 **黃疸** 黃ニノ帶赤此  
 散加 **同** 黃疸通用宜此散濕多者倍加茵陳食積ニハ加莪朮三稜  
 茵陳 **同** 砂仁神麩煑ニハ加黃芩黃連龍胆小便不利ニハ加山色  
 子胃弱キニハ合平胃散去厚 **痰飲** 腹脇ノ間ニ結聚積聚ノ形類ニ  
 朴加茵陳黃連山梔防已枳實 **痰飲** ルアリ但ニ按之甚不堅時々  
 吐涎沫六君子湯 **同** 痰多者加 **同** 有痰有熱者ハ加  
 合此散加枳實 **同** 陳皮半夏 **同** 桑白皮人參前胡 **欬** 膀胱ノ欬  
 二ハ此散

加人 欬嗽ニハ加 喘急ニハ此散加 哮喘ニハ此散ト合導

参 桔梗五味子 喘急 馬兜鈴素白皮 好飲酒ノ哮喘

赤 短氣 水滯心下短氣ニ小 嘔吐 夏月嘔吐不止 動悸 脐下動悸又

散 便難キニハ宜此散 傷酒ハ此散 傷酒湯者葛

陵スル也此 積聚 氣塊ニハ此散 傷酒 加葛花草麤 根ノ煎湯ニ

散加辰砂 吐血暑氣甚キ時節ニアツテ口渴渴キ面垢 吐血 吐血 吐血

テ用 此散 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血

此散 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血 吐血

抱子 尿血 痛著ヲ血淋トス不痛ハ尿血トス尿血ニハ此散ニ和

烏梅 鹿茸圓ヲ飲ム或ハ味丸若シ小便自清テ後血數点アルモノハ

此散加芍薬○砂石ノ如クニノ色赤ク却テ石淋ノ痛ナキ者ハ

此散ト和膠艾湯或辰砂妙香 暑月酒ニヨツテ尿血ス

散ニテ并鹿茸圓八味丸吞ム 此散去桂加黃連 交腸

ノ病ハ大小便位ヲ代テ出ルナリ是氣故道ニ不從 消渴 無病人

ニヨツテ清濁道ヲ代ル 此散ト合調氣散加阿膠 帶下 帶下通用

或病後ニ渴スル者ハ四君子湯宿脾飲或七珍散加水瓜皆擇ヒ

用ベシ此散加人參名春澤湯或此散ト四君子湯ト合スルヲモ

春澤湯 心熱ニハ加 五心熱シ勞症ノ如キ 帶下 帶下通用

ト名ク 火熱 黃連蓮肉 此散加桔梗柴胡 此散合四

物 臨産 夏月熱甚キ片産スレバ氣散ニ血 痘 報痘炎暑ノ時煩渴

湯 湧ク此散加冬葵子或三退六一散 昏冒ノ不能發出者

ニハ生地黃麥門冬ノ煎湯 他病補遺時疫 壯歲ノ男子旅行五六

ニテ辰砂五苓散ヲ用ユ 里歸家大煩狂言躁動

...

...

...

...

...

渾身疼痛便瀉脉洪大與此湯  
 二貼畢平愈微熱同方減肉桂  
 效嗽 一婦人二十餘歲感冒效嗽日  
 無寸効予用貝母湯二三貼效嗽減而却熱甚貝母湯合香薷散五  
 貼而全愈○又一婦人五六年毛咳喘或夜甚二陳湯加減  
 愈○又久咳ノ何某ニテモ  
 止又二抽帶一味ヲ用テヨシ  
 眩暈 二十餘歲ノ男去夏食果瓜飲  
 水過多寒熱往來頭微痛他医  
 治而病愈退及于今眩暈倒臥而難起夾臍有大筋至胸下大如寸  
 竹雖與數方無効氣力日々衰脉浮弦大便秘小便赤澁于時足冷  
 則眩暈甚此大小無言大小便不通與此湯二貼小便來自巳刻至  
 散合二陳湯便閉于午刻二升餘至于申酉刻脉復知人事如平人  
 諸人稱羨其奇妙于時頭微疼  
 動悸 誤テ不可汗者汗動悸心中煩  
 不食用藿香心氣散二貼全愈  
 眩暈欬嘔或漏ノ或骨節痛

八此散去白朮  
 倍挂枝茯苓

濕

五積散 四十二  
 局

調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛

胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛  
 肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹

提痛經候不調或閉不通並互服之  
 此方主治一途ナラス故二

途ナラス衆病ヲ拳ル用ル者意ヲ以テ了簡ニ故ニ諸  
 病ニ本邦ノ老医專用テ意外之効アリ古代ノ流行薬ナリ

- 白芷 三
- 陳皮 六
- 厚朴 四
- 桔梗 五
- 枳殼 六
- 川芎 三
- 甘草 三
- 茯苓 三

蒼朮二十當歸三麻黃六肉桂三芍藥三乾姜四半夏三

右除肉桂枳殼二味別為麤末外一十三味同為麤末慢火炒令

色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻所謂糝料五積散也如是下為

每服三錢水一盞半入生姜三片煎至一中盞去滓稍熱服如冷

氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛及胃嘔吐泄痢清穀及疫癘癰疽

脫小腸氣痛即入煨生姜三片鹽少許同煎。如傷寒時疫頭痛

身疼惡風發熱項背強痛入葱白三寸豉七粒同煎。若但覺

惡寒或身不甚熱肢身拘急或手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少

許同煎。如寒熱不調咳嗽喘滿入棗煎服。婦人難產入

醋一合同煎服之並不拘時候。加減胃寒用煨乾姜挾氣

加吳茱萸氣。足浮腫加五加皮大腹皮腫。遍身疼加乳香沒

茶細辛痺。已成風痺加羌活獨活防風同。四肢濕痺合烏茱

順氣散同。手足攣拳加搯柳木瓜牛膝同。腰痛加桃仁茴香

腰痛。欬嗽加杏仁桑白皮欬。婦人調經催產加艾醋經調。難產

加麝香肉桂臨。腹痛綿綿無增減因寒者宜治痛。腰痛感寒

濕脾胃氣閉加桃仁痛。寒濕傷腎經腰痛不可俛仰加乾姜桃

仁同○感風寒濕臂膊痛或遍身麻木者用之痺○遍身壯熱四

肢骨節痛因風寒者加羌活獨活穿山甲同○秋冬脚膝腫滿疼

痛因寒濕流注經絡加木瓜牛膝枳榔吳茱萸脚○醉飽後色慾

不節觸傷小腹成疝氣其疝自小腹痛連腰膝下心頭吊痛額上

汗出加延胡索疝○又虛弱人中寒疝氣作痛亦宜同○婦人遇

經行時身痛手足麻痺或寒熱頭疼目眩去乾姜加羌活獨活牛

膝生姜葱白經調○欬嗽加杏仁五味子嗽效○泄瀉去枳殼加肉豆

蔻白朮泄瀉赤白帶下屬虛寒加香附茴香吳茱萸下帶○新產後

以此湯除敗血生新血無寒熱之患去麻黃後○熱加黃芩同○

瘰癧天時嚴寒不能起發或紅斑初見者除肉桂枳殼外十三味

慢火炒令攤冷入二味加生姜水煎熟服則為膏膿瘰○夏至後

去麻黃此方除寒濕故有痛者必用症本○頭疼臂疼腹痛脚氣痛

風等皆有發熱而足冷則與此湯可也此諸症發熱アツテ足冷

的トスベシ症ニモ以是目疼○寒滯脾腎肝三陰而四肢百節痛有奇效

○因滯氣而腹筋張加青皮氣○寒疝加吳茱萸疝○因打撲而

血滯冷痛立得効打撲○冬月腰不立上氣面赤下冷又腰已下冷

如氷面上火熱背憎寒並宜下○婦人兩股痛甚有汗足稍冷加

附子三貼安痛股○婦人淋病加車前木通可秘淋○婦人身冷經

水不來者可閉經○赤白帶下屬虛寒有加吳茱萸香附下帶○難產

腰腹甚痛時寒天加附子得妙又腰腹痛破水下未產經宿亦得

臨○產後餘血攻心或有冷塊攻心上氣則取驗若無驗則正氣

天香湯有大奇後產○死胎腹痛大熱脈數加乾姜附子二貼而立

下○躄虛作瘧寒多無汗加枳柳葶藶瘧

此方治寒濕ノ其疾大抵脈沉緩惡寒無汗骨節疼痛手足

拘攣ス王海藏云此方桂麻各半湯平胃散桔梗半夏湯等ノ此數

方ヲ相合ス小青囊云麻黃湯桂枝湯二陳湯四物湯平胃散ノ五

方ヲ聚メテ一方トス故名五積散醫通云十餘方ヲ類聚ソ一方

トナス謙按ズルニ先輩ノ說何レモ如是ト云ヘ凡難意得丁ア

リ其味ニ於テハ合方ト見ユレ凡分量ヲ考ルニ蒼朮二十四兩

桔梗十二兩ニノ當飯芍藥川芎茯苓肉桂等ハ三兩ニ不過然レ

ハ此藥ヲ制スルモノ始ヨリ合方スル合点トハ三ヘ又皆跡ヨ

リ云タ了簡ナリ但如是ノ一方ヲ制ノ解表温中内外ノ病ヲ治

スルナド、思議按排ノ非所及故ニ方下方後ニ云如ク種々ノ

病ニ用テ各効アリ此制方ノ妙ナリ若シ夫龔氏ガ方ハ肉桂乾

此八寒濕一途ニ用ル合点ト見ヘタリ又医家必用ニハ枳殼麻  
黃芍薬各四錢餘薬各三錢甘草一錢半酒水各半ニ煎ス此テハ  
又思入カ違フ但医家必用ノ五積散ト意得ベシ又友松子家傳  
ノ方ニハ諸薬各等分甘草減半ノ治寒邪ノ薬トス龔氏カ方医  
家必用ノ方友松子ノ方ナレバ成程合方ト見ユル局方ノ原方  
ハ合方トハ三ヘ又五積散  
ヲ用ル人此意得アルベシ

此方他病活用例  
風寒俱ニ傷レテ難辨疑候ノ間此  
同 麻黃附子細辛湯ノ症  
湯半貼敗毒散半貼合ノ名交加散  
同 此湯加熟附子用アリ

傷寒 傷寒夾食ニハ藿香正氣散或ハ五  
同 夾食ノ傷寒胸滿痞悶嘔  
傷寒 積散去當飯麻黃加入參紫蘇  
同 逆氣麗キニハ冬ハ五積

散餘時ハ芎 夾食ノ傷寒氣口ノ脈反テ瀼滯伏結或始メ浮大

藜散正氣散 同 ナリト云ヘ凡次第ニ虛小ニナリ其忘身熱足冷

或腹痛或頭痛但胸膈滿悶レ或煩燥レ其人必元氣素リ虚レ堅

硬ノモノ腹中ニ結ノ陽氣下ニ不行故ニ只足冷テ手ハ不冷用

此湯加減スベシ若シ頭痛セバ陽邪上ニ鬱スルナリ甘草乾姜

湯加葱白豆豉腹痛セバ陰氣下ニ結スルナリ枳實理中湯加熟

附夾血 雜人負重折骨人外感風寒内傷飲食其人素リ畜血アリ

子傷寒 其忘渾身壯熱頭痛骨節疼三胸脇痞滿或痛三六脈洪盛

重ク按セバ反無力或弦緊嘔逆不食或泄瀉レ或便秘ス解表ノ

薬ヲ用テ發散スレバ正氣イヨク衰ヘ温補ノ薬ヲ以テ理脾片

ハ邪氣イヨク盛ナリ并ニ此湯ノ加減ニ宜シ大抵此類ノ人食

積瘀血中腕ニアリ慎ンテ不可用白朮朮仁當飯等ノ薬ヲ加ル

二宜レ六七日モ大便不通モノハ用大柴胡湯微利シ若小腹痛  
テ小便能利セバ畜血下焦ニアリ桃核承氣湯或宜代抵當湯

產後産後感風寒兼瀉兼温病春病ムヲ温ト云此痺裏症ニハ五  
感冒吐者ニハ宜用此湯湯加石膏知母升麻積交加散加

大同痺風寒多キニハ同歷節風毒骨節疼痛發作不定者虚邪  
黄同此湯加天麻附子ニハ烏菴順氣散不應用此湯轉筋

ハ筋急ニヒキ臂痛睡臥ノ為風濕傷レ或睡臥ノ手被ノ外産後  
ツル宜此湯ニ出テ為寒邪襲レテ痛者ニハ宜此湯中風

産後中風手足癱瘓スル腰痛腰痛見熱片ハ減レ見寒片ハ増ス  
ハ敗血入經絡宜此湯此湯加吳茱萸若シ痛ニ或左或右

引兩足痛者此同打撲閃挫勞役ノ痛者同夾風寒温腰痛セバ五  
湯加防風全蝎同生料五積散加桃仁同積交加散加全蝎同炒

過シ去全同打撲閃挫因瘀血痛者此湯同寒傷腎又天寒ニ遇テ  
蝎煎服ス同去麻黄加茴香木香枳榔同連背脊痛拘攣シ脈沉

弦緊ナル者加吳同形寒飲冷ニヨツテ腎氣乘心腰痛スルハ心  
菜黄杜仲桃仁同如懸旗或如饑津利下重セバ宜此湯便閉ニ

ハ加心痛婦人瘀血入心脾心痛甚者此湯加莪朮三稜經水未盡  
大黃同血衝心痛者此湯加桃仁紅花經水止テ痛者七氣湯加

當腹痛大抵感冒卒ニ腹痛吐利シ以熱湯喜同腹痛脈沉足冷或  
飯同慰腹者此湯加吳茱萸木瓜煨葱白同臍下疼痛者此湯

加吳脇痛脇痛虚者ハ肝血虚スルナリ痛ニ悠々トノ不止脚氣  
菜黄同耳目憊々トノ善恐ル此湯去麻黄加木香青皮同

脚氣發ノ兩足痛不可忍同脚氣或鶴膝風  
若此湯加全蝎以酒煎服同此湯加木瓜同

杉木 鶴膝風寒熱者五積 寒疝心痛筋縮り食スル片ハ吐ス

節 同 交加散加烏藥殭蚕 疝 此湯加吳茱萸茴香食塩或施附湯

四制菜 痿 痿疝夾寒者此湯 泄瀉 肝虚忿怒ニ傷ラレ木尅土 瀉 白

莫丸 合獨活寄生湯 八氣分ノ濕熱清心蓮子 婦人臨經水過食生冷物或冷テ以

飲或五積散合四君子湯 瘀血 瘀血トナル者ニハ此湯去麻黃加 牡丹皮 臨產氣弱者此 友松子云局方發揮ニ產婦ニ此湯

紅花 臨產 湯加麝香一厘 同 ヲ用ル丁ヲ甚タ非トスルト云ヘ 凡古ヨリ此湯ニ催生五積散ノ名アリ予此湯ヲ以テ產前後ヲ

治スルニ用得テ遇宜片ハ不的中云丁ナシ產婦ニ用ルニハ去 麻黃其餘藥等分或姜桂ヲ減半シ或生料或熟料ヲ用ユ死胎不 下ニハ本方ニ加杏仁七粒木香順流水ニ磨シ姜朮煎百草霜ノ

末一錢ヲ調服ス未ダ破 產後 產後食滯寒熱心腹 水ヲ不經モノニハ勿用 痛者此湯加莪朮 帶下 經脈ニ寒 濕滯テ帶

下ヲ生スルコトアルモノナリ此湯ニテ下 他方補遺 腰痛 跌撲 焦ノ寒濕ヲ去ルベシ上気盛ナルガ目的也

墜隨以致痲腰痛日輕夜重宜行血順氣又者補 疝 疝氣夏不發冬 陰丸桃仁紅花或此湯去麻黃加茴香木香枳榔 發ト云ニハ此

湯加延胡枳榔木瓜ナリ冬不發夏發ト云ニハ五苓散加延 枳木瓜寒氣ニテ發ハ加吳茱萸積氣アラバ加莪朮吳茱萸 同 疝 氣

大便ヨク通ニハ加石榴皮枳榔大便結ニハ加杏仁桃仁。主治 晝大便難通ハ杏仁コレ気分陽。主治夜大便難通ハ桃仁コレ

血分 中風 本邦老医傳云中風ト五積散ノ忘トガ紛ルモノゾ 陰 五積散ノ忘ナレハ寒濕ナリ寒濕ハ筋ヲ緩クシ唇シ

續編一 表裏 八十五 烏巢山室成

ミラス必出加減遺補婦人調經加醋當歸。○躄薄有汗去蒼朮麻黃ルコトアリ。○氣虛去枳殼桔梗加人參白朮。○若產後餘血流入遍身肢節脚腰疼痛去麻黃加人參木瓜桃仁小茴香。○此方味辛温散表温中開鬱行氣有殊功去寒湿之聖藥也。以防風通聖散為治燥熱茶以生料五積散為治寒湿之藥也。

中風

防風通聖散四十三 宣明

- 防風 川芎 當歸 白芍 大黃  
 芒硝 連翹 薄荷 麻黃各分 石膏 桔梗 黃芩各分 白朮  
 梔子 荆芥各分 滑石二分 甘草一分  
 右細切作一服加生姜三

片水二盞煎至一盞温服日再服。○勞汗當風汗出為鼓鬱乃瘰

去芒硝倍加芍藥當飯瘰。○或生癰疹或赤或白倍加去節麻黃

鹽豉葱白發汗罷依前方加回物湯黃連解毒三藥合而飲之日

二服癰疹。○小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎調木香末一錢淋閉

○腰脇走注疼痛加硝石當飯甘草煎調車前子末海金沙末各

一錢腰脇痛。○破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以泄之

用此以兼散之汗下後通利血氣驅逐風邪加荆芥穗大黃煎調

全蝎末一錢七羌活末一錢七破傷風。○諸風潮搐小兒急慢驚風

大便秘結邪熱暴甚腸胃乾燥癯汗咬牙目睛上竄睡語不安轉筋驚悸倍大黃梔子煎調茯苓末一錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢匕小兒驚風○風傷於肺欬嗽喘急加半夏桔梗紫苑欬○如打撲損傷肢節疼痛腰中惡血留滯不下加當歸大黃煎調乳香沒藥各一錢匕解利打撲○四時傷寒加益元散半兩加葱白鹽豉生薑水一大碗煎至五七沸溫服一半以鵝翎探之即吐吐後更服一半汗出立解時疫○如飲酒中風身熱頭痛如破加黃連葱白煎服立愈本症○頭旋腦熱鼻塞濁涕時下加薄荷黃連煎服淵鼻○

內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不已也如氣逆者本方煎調木香末一錢匕同○此方最治痢後鶴膝風良驗モットモ鶴

膝風○大頭病太陽證甚者加牛蒡子玄參大頭風

劉氏方原方如是方後二嗽二ハ加半夏半兩トアリ○吳氏方考分兩ナシ小青囊ニ劉氏方真方ト云モノオツ所ノ原方ト少ク異ナリ○一方有縮砂無芒硝○一方無芒硝

○此方中風風熱甚シク脈實大便閉表裏氣血ノ菜ナリ吳氏云防風麻黃ハ解表ノ藥ナリ風熱在皮膚モノ汗ヨリノ泄ル荆芥薄荷ハ清上ノ菜ナリ風熱鼻ヨリノ泄ル大黃芒硝ハ通利ノ菜ナリ風熱後ヨリ泄ル滑石山梔ハ水道ヲ通スル菜ナリ風熱濁

コリ泄ル風胸膈ニ滯スル片ハ肺胃受邪石膏桔梗清肺胃連翹  
 黄芩諸經ノ遊火ヲ去ル風ノ為患肝木主之川芎當歸芍薬和肝  
 血甘草白朮和胃健脾云云謙云此中風ヲ主トメ云トイヘ此  
 理ヲ推メ三焦實熱表裏ノ症盡ク皆可用之方下ノ主治方後ノ  
 加減并ニ他病活用ノ諸法皆吳氏力方考ノ意ニ不出ナリ王宇  
 泰ガ所謂一切ノ風毒積熱癰腫脈弦洪實數浮緊ニノ氣血實盛  
 ナルモノ不可缺之胃氣弱キ者當審察大滿大實ニ非ズンバ不  
 可用○大黃芒硝麻黄ノ三味症ニ從フテ可進退或減ズル丁ア  
 リ或去リ不用丁アリ或進ル丁アリ欲發汗加麻黄去大黃芒硝  
 欲泄去麻黄進大黃芒硝其  
 外千變万人ニ因ルベシ  
 此方他病活用例

**時疫**

時氣發熱晚ニ至レバ腰脊痛頭項強リ身重シ輕  
 片ハ涼膈散重片ハ雙解散并ニ加葱白豆豉用之  
 同 温熱病

毒内ニ盛ニ脈大腹滿大便秘シ狂乱スルモノ承氣湯合黃連解  
 毒湯若シ脈浮ニノ兼表証モノハ涼膈散双解散三黃石膏湯ニ

宜 時疫汗出不解脈浮者属表証白虎湯見裏  
 同 絞腸瘟 兩感

証承氣湯解毒湯表裏不分涼膈散雙解散  
 同 可用此湯

三日少陽ト厥陰ト俱ニ病ム片ハ耳聾温熱病躁熱不知人輕片  
 囊縮テ結ス雙解散主之此症重裏アリ  
 同 時疫 八涼膈散重片ハ

雙解散表裏俱熱  
 邪在半表半裏者古方用小柴胡  
 同 有客邪通

者亦此治ト同シ  
 湯今用雙解散去麻黄加柴胡  
 同 用雙解散

去大黃芒硝  
 同 夾寒片ハ關脈滑盛声如鼙涼膈散雙解散内傷氣

加葱白豆豉  
 同 虚夾痰片ハ氣口脈滑ニノ濡吐涎飲者ハ二陳湯

續編一表裏  
 八十八  
 烏巢堂藏

加生白朮虛人二八六同 灰色重暈舌二八急二涼膈散  
君子湯加香附縮砂同 雙解散解毒湯承氣湯ヲ與フ **麻痺** 風熱走注

疼痛麻痺二八防 **大便閉** 大便閉テ盜汗咬牙上竄睡後轉筋驚悸  
風通聖散去之同 二八此湯加增同 大黃山梔調服茯苓末

**瘡** 暴瘡声不出同 腸風痔漏二 **眼** 目病腫腫二兩臉如挑 **鼻** 肺經  
二八宜此湯同 八用此湯同 痛不可忍二八用此湯同 風熱

鼻塞不通不聞香臭或感 **同** 鼻鼈ハ鼻内生ス肺氣盛ナリ用枯礬  
風寒熱シ濁涕出宜此湯同 和麩脂綿二包數日塞鼻片ハ自消ス

又瓜蒂ヲ綿二包用テモ可ナリ或木通細辛熟附子ヲ蜜ニ和シ  
綿二包鼻中ニ入レテモ可ナリ又防風通聖散加三稜山茱萸海

藻酒浸炒末ト **同** 膽移熱於腦流濁涕涕 **同** 鼻痔ハ肺氣熱極日久  
シ每服一錢半 臭シ此湯加薄荷黃連 **同** 凝り濁結ノ生息肉甚

者名鼻鼈此湯同 鼻痒キハ此湯 **便癰** 便癰ハ内熱包毒外夾寒  
稜海藻為末調服同 加白附子強蚕 邪或房中強テ忍精不通

鬱結シテ便癰 或人最骨痛三用風菜飲酒一年許不止此湯  
トナル宜此湯 **瘡瘍** 去大黃芒硝加犀角浮萍百余貼ヲ與ヘテ

疽トナル膿出 **同** 天泡瘡ニ用此湯及ビ蚯蚓泥ヲ少シ炙リ蜜ニ  
テ愈ヘタリ **同** テ調ヘ敷ル又野菊花棗木根ヲ煎シ洗ヒ黃蘗

滑石ヲ末ト **同** 準繩云一外科ノ秘方ニ此湯加人參黃耆蒼朮赤  
シテ敷ル **同** 茯苓金銀花名消腫托裏散表症多者此方ニ從フ

**腦疽** 腦疽ニハ此湯ヲ **楊梅瘡** 此湯加土茯苓  
酒製ニ用ベシ 大劑ニ用ユ **小兒雜病** 小兒癩頭

酒ニ拌セ除大黃別ニ酒炒シ俱ニ末トナシ再ビ酒ニ拌セ乾カ  
廿每服一錢水煎シ服ス外治ハ炭ノ火ヲ以テ長流水ニ淬ケ令

及馬藥并引直 賣編一表裏 八十九 烏巢堂藏

熱頭ヲ洗ヒ葫荑子伏龍肝梁上ノ塵黃  
連白礬ヲ末トナシ酒ニテ調ヘ敷ベシ **厥症** 氣虛ニハ四君子湯  
厥ニハ承氣湯外感ニ **耳** 因鬱耳聾者ニハ通聖散ノ内大黄丁味

ハ雙解散加酒姜汁 **耳鳴** 耳鳴因酒者此湯加枳殼柴胡大黄甘草桔梗青  
ツニノ又酒 **耳** 皮荊芥大劑トナシ用不愈者ハ四物湯加玄參

炒シ煎服ス **癰疥** 五癰經久未汗下者ニハ只用 **瘰癧** 瘰癧病風痰盛者此  
此湯去大黄甚硝加浮萍皂刺 **瘰癧** 湯加人參柴胡 **發熱** 久病  
熱菜反惡寒者先探リテ痰ヲ令 **狂** 龔廷賢治狂乱此湯加  
吐テ後ニ此湯加生地黄當飯 **杏仁牡丹皮生地黄**

**雙解散** 四十四 本方加益元散一錢葱白豆豉生姜

**加減** 此加減ハ防風通聖散ノ加減ナリ此加減ニ **硝大黄** 本症ト云モノハ中風ノナリト意得ベシ **自利去甚**

皮天南星荊芥 **耳** 癰疹通治如身疼加蒼朮羌活 **癰疹** 癰疹加  
半夏 **嗽** 一切大風癩狂加桃仁生地黄牡丹皮 **癩** 癩者  
厚味動胃火加酒煨大黄 **耳** 頭項偏腫連一且如半壺其脈洪

大此風乘陽明經氣血俱多風腫去甚硝大黄加生姜葱白豆豉  
煎服取汗以草莖刺鼻中出血其腫立消 **大頭** 治風熱瘡疥癰  
久不愈 **癰疥** 癰頭瘡用本方為末酒浸焙乾九三次食後白湯調

九十一

賣編一表裏

烏巢

九十一

九十一

九十一

服日三服至頭有汗效瘧頭 ○小兒身常發熱風班及脚指紅腫

去芒硝大黃加牛旁子酒黃芩為末服疹班 ○按此方雖古法用表

裏客熱三焦實火而其實火用黃連解毒湯腸胃實熱用大承氣

湯風熱症專用此湯謙云此按甚好實熱ノ病ヲ治スル條方

○或語云春夏專用通聖散秋冬專用五積散是乃時令表裡之

方也此語楊仁齋が説ニ因ル凡天下ノ病寒湿ト燥熱ノ二ツ

故大法如方意 ○狂乱症解毒湯不效則用此湯若不效則備急圓

可也打撲者倍當飯大黃加紅花沒菜 ○疥癬楊梅瘡

良方者用此湯間有驗疥

雙解散ハ温熱病時疫ノ專劑ナリ即防風通聖散ニ加增滑石甘

草故ニ通聖散ノ下ニ附録ス下ニ至テ雙解散ト稱スルモノハ

通聖散ノ加味ナリ凡通聖散ヲ用ル中風ハ今時希ナリ温熱病

時疫ニ雙解散ヲ用ル志ハ僂多シ故ニ通聖散ハモト中風ノ菜

ナリト云ヘ凡今ニ至テハ時疫ノ菜ノヤウニナルハ時疫温熱

病ニ通聖散ヲ用ユルコト多キガユヘナリ

此方本症主用例  
熱病在半表半裏モノハ雙解散  
去麻黃加柴胡脉弱ニハ加人參  
此方他病活用例

**胎前** 胎前風熱者去小兒小兒傷寒有表復有裡及驚風症  
硝黃麻黃石膏外感見如羌活天麻強蚕白附子蟬退

羌活導滯湯四十五濟生 治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻

隔先以此菜道之後用當皈粘痛湯

當皈一枳實一羌活一獨活一防己炒大黃酒浸

水煎空心服

此方濕熱脚氣初發用ル菜ナリ外ノ病ニ用ルハナシ羌活獨活防己身軀肢節ノ腫痛ヲ治シ防己下焦ノ濕熱ヲ去リ小便ヲ通スル專菜ナリ枳實大黃便溺ノ阻隔ヲ主リ當皈血ヲ和ス病

初起先此菜ヲ以テコレヲ導テ後ニ當皈粘痛湯ヲ用ルナリ粘痛湯ハ濕熱ヲ除ク主劑ナリ

人中黃丸四十六丹溪 治瘟疫諸熱毒

大黃三兩尿浸 人中黃如無坑瀝代之 蒼朮去皮腐油炒 桔梗 滑石各二兩

人參 黃連酒洗 黃芩酒洗生各一兩 防風五錢 香附姜汁拌勿炒一兩五錢

右為宋神麴糊丸清熱解毒湯送下二三錢

丹溪氏云衆人病一般ナルモノ是天行時疫ナリ其治三法アリ宜補宜散宜降氣虛ニハ四君子湯血虛ニハ四物湯痰多キニハ二陳湯ニテ下ス熱甚キ者ハ加童便謙云此數品ノ藥補アリ散

傷寒

アリ降アリ此經驗ノ良方ナリ時疫ノ治法詳ニ上中編ニ述ル  
如シ其中ニ於テ此菜ハ用ヨキ方ナリ先木抵輕キ療治シテ不  
應トキ此菜ヲ用ベシ輕症重症トモニ効アル方ナリ方後ニハ  
清熱解毒湯ニテ用ヨトアル丹纂ニハ四君子四物ニ陳ニテ用  
ヨト云カ様ナルヲニ定リタルハナシ時ニ臨ンテ見計ラヒ  
ニ可用ナリ

桂枝加大黃湯四十七

桂枝三兩

芍藥三兩  
酒洗

甘草二兩  
炙

生薑三兩  
切

大棗十二枚

大黃二兩

右六味以水七升煮取三升去滓温服下升日三服

此方ハ本ト太陽ノ病ニノ發表スベキニ医反下之因テ腹滿有  
時ハ太陰ノ證トナル桂枝加芍藥湯ヲ用ルナリ然レ有<sup>レ</sup>時痛ハ  
非大實滿若シ大實滿ハ痛ヅメニ痛ム可用下劑以此湯下之或  
自<sup>リ</sup>太陰輕シテ入胃府アリ用此湯下之

攻裏

小承氣湯四十八

大黃四兩

厚朴二兩  
炙

枳實三枚  
炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分温二服初服湯當更衣  
不爾者盡飲之若更衣者勿服之

傷寒

調胃承氣湯四十九

大黃四兩  
浸酒

甘草二兩  
炙

芒硝半斤

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸  
少少温服之

張璐曰承氣者用以制カク九極カクキョク之氣使之承順而下也

九極ノ氣ヲ承ケ順シ傷寒秘要曰王海藏論云仲景承氣湯有  
メ下ス故ニ名承氣湯

大小調胃之殊令人以三一承氣後人ノ方ナリ不分上下緩急用之豈

不失仲景本意仲景ノ本意ヲ失フ大熱大實用大承氣小熱小

實用小承氣實熱ナホ尚在胃中用調胃承氣以甘草緩其下行而祛

胃熱也實熱ガマダ胃中ニアリテ下ヘ下ラ子バ調胃承氣ヲ用并甘草ヲ以テ急ニ不下ソロクト胃熱ヲ去ルナリ

若病大用小則邪氣不伏若シ病大ニソ重ク甚キニ小承病小

用大則過傷正氣病小ニソソレホド重クモナイニ病在上而

用急下之劑則上熱不除病胃ノ中焦ニアルハ下焦ニ對ノ上

世ハ藥ガ上ニ留ル間ガト云ソレニ大小承氣ヲ用テ急ニ下ナイ程ニ上熱不除ナリト云ソレニ大小承氣ヲ用テ急ニ下豈可ト云ソレニ大小承氣ヲ用テ急ニ下一槩混治哉如此ノ別有ルニ三

節庵論小承氣曰上焦受傷去芒硝恐傷下焦血分之

真陰此カラ陶節庵ガ正誤小承氣ノ論ニ上焦傷ヲ受テ下焦ニ邪ガナイ故ニ去芒硝下焦ノ真陰ヲ傷ランコトヲ恐ル

論調胃承氣曰邪在中焦不用枳實厚朴恐傷上焦虛無氤氳之

元氣邪ガ中焦ニアルユヘ枳實厚朴ヲバ不然此湯獨可用芒

攻裏

續編一

九十四

烏巢堂

硝以傷下焦乎 此カラ節庵ガ誤リヲ云フレナラバ上焦ノ元氣ヲ傷ランヲ恐レテ枳實厚朴ヲ去ルナラハ

下焦ニ邪ガナイカラハ甚硝モ去ルハツソレニ用ルハ下焦ヲ傷リテモ苦シフナイカト不審スル 吾未聞承

氣湯有至上焦者 其上調胃承氣ニ枳實厚朴ヲ去ルハ上焦ヲ傷ランヲ恐ルハト云ヘ 臣物ノ承氣湯ガ

上焦ヲ主ルト云フハキカ又上焦ニカニヒナイ 未聞調胃承

茶ナレバ枳朴ヲ用テモ上焦ノ恐ハアルマイ 氣之證至於堅而燥也 調胃承氣ノ証ニ大便堅 仲景調胃承氣

湯證八方中並無乾燥 傷寒論ニ調胃承氣ノ症ガ八所有ル中

ナ 不過曰胃氣不和曰胃實曰腹滿則 胃ノ氣ガ和セ又ノ胃實

レ 知此湯專主表邪悉罷初入府而欲結之證也 表症ガ皆罷テ初陽明ノ府ニ入テ

大便ガ結セン 故仲景以調胃承氣收入太陽陽明而 調胃承氣

トスル症ナリ 明ノ部ニ收メ 大黃註曰酒浸是太陽陽明去表未遠其病在上

入レラル 不當攻下故宜緩劑以調和之及 太陽陽明ハ表症カ去テ未タ

ルホドニ急ニ攻下スベカラズ酒ニ浸シ 至正陽陽明則皆曰

テ藥性ヲ緩シ甘草ヲ用ルカ故緩劑ト云 急下之而大承氣湯大黃註曰酒洗是洗輕於浸 陽明ノ經証ヨ

ルヲ正陽陽明ト云此ハ急ニ下ス症ナリ大承氣 微升其走下

ハ急下ノ劑酒洗ト浸スハ洗フ方ガ酒力ガ輕シ 之性以和其中 大黃ノ下ヘ走ル性ヲ微シク升 至少陽陽明則

去正陽而逼太陰其分在下故用小承氣大黃不用酒製也 正陽

續編一 攻裏 九十五 烏巢堂裁

經ヲ去テ少陽經ヨリ傳ヘテ太陰ニ逼リ近クカラハ其邪氣ノ分カ下焦ニアル小承氣ヲ用テ下スヨリ外ナシ小承氣ハ大承氣ホド急下ノ劑デハナケレモ兎角下ス合点ナレバ生大黃ヲ用テ酒制ハ不為ナリ

大承氣湯 五十 寒 大黃 四兩 厚朴 半兩 枳實 五枚 芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分温再服得下餘勿服

傷寒傳ヘテ陽明ノ府ニ入ルハ必大便燥結シ潮熱手足熱々トノ自汗シ腹滿不惡寒惡熱シ煩渴ス或譫語揭去衣被擗手擲足發斑發黃發狂脈沉數ヲ見ス於是大小調胃ノ承氣ヲ用テ邪熱ヲ下ス然ルニ右三方ニ於テ各分別アリ陶節庵云痞滿燥實堅

ノ五症備ル者ニハ大承氣ヲ用井痞滿實ノ三証アツテ燥堅ナキ者ニハ去芒硝小承氣ヲ用ユ去芒硝下焦血分ノ真陰ヲ傷ラシテラ恐ル燥實堅ノ三証アツテ痞滿ナキ者ニハ去枳實厚朴加甘草調胃承氣ヲ用ユ去枳朴上焦ノ元氣ヲ傷シテラ恐レテナリ汪昂ガ医方集解ニ詳之云痞ハ胸悶不食ナリ滿ハ胸腹膨脹ナリ燥ハ煩渴ノ大便燥ナリ實ハ腹滿痛不大便ナリ堅ハ按腹鞭硬ナリ節庵ガ此說甚タ詳ニメ吳崑方考徐春甫ガ医統ソノ外先輩皆從之然ルニ仲景ノ本旨ヲ考ルニ陶節庵ガ說非ナリ其訣ハ拳ル所ノ續論ニ述ル如シ仲景ノ本旨ハ凡右述スル所ノ陽明ノ府症アソテ其病輕ク不甚者ニハ小承氣ヲ與ヘ重ク甚キ者ニハ大承氣ヲ與フ邪太陽ヨリ來テ邪熱中焦胃ニアリ大便結定シ或欲結定モノニ其結定ヲ候ニ調胃承氣ヲ用ユ

大黃芒硝ハ泄實消熱潤燥更堅ナリ用甘草藥性ヲ緩シ胃中ニ  
藥ヲ暫留メ邪熱ヲソレテフロクト下行セシムルナリ甘草カ  
無レバ其勢ガ急ニ下テ熱ガ胃中ニ殘ル物ノ甘草ト云モノガ  
下ル藥ニ加レバ急ニ不下寒藥ニ加レバ寒勢ガ緩クナリ熱藥  
ニ加レバ熱勢ガ緩クナル何ニ加ヘテモ此合点ナリ此即仲景  
ノ本旨三承氣湯ノ分別ナリ凡陽明ノ症ニハ陽明ノ經症アリ  
陽明ノ府症アリ府症ニ三ツアリ所謂太陽陽明正陽陽明少陽  
陽明ノ異アリ大抵續論ニ述ル如シ詳ナルトハ可見傷寒論  
右三方本證主用例

○陽明ノ病潮熱大便硬キ者ニハ可與大承氣不硬モノニハ不  
可與若不大便六七日ナラバ恐クハ燥屎アラントヲ試ニ少シ  
小承氣ヲ與ヘテ見ヨ腹中轉矢氣スルモノハ有燥屎大小承氣

ヲ見合ニ用ベシ

○陽明ノ病譫語潮熱ヲ發シ脈滑ニ疾キ者ハ小承氣主之

○病太陽少陽ノ症ナク煩躁心下硬キハ正陽陽明ノ症ニ下

スベキニ疑ナシサレバ其人脈弱キ者ニハ能食スト云ヘ小

承氣ヲ與ベシ大承氣ハ扣ヘテ不可與

○太陽ノ病汗吐下ノ後微煩シ小便數大便硬ニハ可與小承氣

○陽明ノ病多汗譫語スルハ急ニ可下症ナリサレバ其人汗出

ルト甚多ケレバ津液虛スルホドニ與小承氣其胃ヲ和スベシ

○下痢譫語スル者ハ必燥屎アリ小承氣主之

○下ノ後一日二日ノ中ニ夕喘滿スル者ニハ用小承氣復下也

○傷寒六七日不大便頭痛有熱モノ其小便清メルモノハ病不

在裏承氣湯ヲ用ベカラス

又西醫手引草 續編一 攻裏 九十七 烏巢堂藏

○手足澀然トシ汗出ルモノハ大便既ニ堅シ大承氣主之謙云  
大便硬キモノハ手足ノ汗ニテ試ル調胃承氣ヲ用ル症ノ大便  
結定スルカセヌカト云ハ手足ノ汗ニテ意ヅク手足ニ汗ガ有  
ルナラバ大便ガ硬キカ當分硬フナクテモヤガテ結定スルト  
合点スベシ扱此症ニ大承氣ヲ用ヨト有レバ先ツ小承氣ヲ用  
テ轉矢氣スルカセヌカヲ試テ大承氣ヲ用ユベシ  
○陽明ノ病譫語潮熱不能食モノハ胃中ニ燥屎アリ大承氣主  
之謙云陽明ノ症ニノ譫語潮熱スルナラバ食ハ相應ニ食モノ  
ソレニ不食スルナレバ燥屎ガ有テ内ガメグラヌト知ルベシ  
ソレテ大承氣ヲ用ルナリ  
○病人小便不利大便乍硬タチチカク乍安チ時ニ微熱アリ喘冒不能卧ゼンバウ  
モノハ燥屎アリ大承氣主之謙云小便不利ハ大便ガ秘スルト

小便ガ利セヌモノナリ常ニ二便閉ノ証ニ大便ガ通ズルト小  
便ハ自ラ通スルナリソレテ此モ燥屎アリト云サレバ小便ガ  
利セヌ計テ燥屎アリト極メラレハセヌ其上一ニ乍硬チ乍安チク  
喘アツテ不能卧ナレバ燥屎アルニ究ルナリ  
○發汗不解腹滿痛ハ急ニ下之チ大承氣主之謙云陽明ノ餘症ア  
ツテ如此ナレバ急ニ下スベキ症ナリ  
○太陽陽明ノ併病潮熱手足有汗大便硬ク譫語スルモノハ大  
承氣ヲ用テ下之  
○陽明少陽ノ合病ハ必ズ下利ス脈滑ニノ數ナル者ハ宿食アリ  
大承氣ヲ用テ下之  
○汗吐下ノ後不大便五七日ヨリ十餘日ニ至テ潮熱ノ不惡寒  
獨語如見鬼狀不知人循床摸床微喘チ直視チ是危難治ノ証

外書素問引草 續編一 攻裏 九十八 烏巢堂藏

ナリ脈弦者ハ生ク瀯者ハ死ス微者ハ唯發熱譫語スルニテナ  
リ大承氣主之

○少陰ノ病清水ヲ自利シ色純青ニテ心下必痛三口乾燥スル  
モノハ急ニ下ス大承氣主之

○少陰ノ病六七日腹脹不大便モノ急ニ下之大承氣湯ニ宜シ  
謙云承氣ノ症ハ皆陽明ノ府忘ナリ然ルニ少陰傳經ノ症ニ用  
ルニアリ上ノ二條ハ俱ニ少陰ノ忘ナリサレバ少陰ノ症ニ用  
ルハ夕ニサカナコトナリ

○紫短舌大承氣下之

○太陽ノ中風可用桂枝湯反テ用麻黃湯汗出ルハ過多ニノ胃  
中ノ津液ヲ傷リ熱不解乘虛内ニ入り裏熱ノ症トナリ蒸々ト  
熱勢内ヨリ外ニ沸騰シ只熱胃ニ在リ調胃承氣主之

○陽明ノ病吐下ニヨラスノ心煩スル者可與調胃承氣謙云陽  
明ノ病症アツテ如此ナルモノニ可與之

○陽明熱蒸ノ頭痛ハ必小便黃赤ニ短數ナル者ニハ調胃承  
氣主之

○頭汗ハ多ク裏實ノ症ナリ頭汗出テ脇下滿大便硬キハ大柴  
胡湯主之頭汗出テ譫語スルハ調胃承氣主之

○邪熱胃ニ入ル片ハ三陽明ノ原ヲ詳ニシ三承氣ヲ與ヘ緩急  
ヲ別チ結定ヲ俟ツ片ハ邪熱皆盡ク胃ニ歸スルナリ然後下之

右三方雜病活用例

温病

温病太陽少陽ノ合病ハ黃芩湯少陽陽明ノ合病ハ大柴胡湯主之

同

温病下利脈

合病ハ承氣湯三陽ノ合病ハ大柴胡湯主之

達ニシ滑ナ

ル者ハ宿食内實ナリ利未欲止モノハ宜大承氣腹中滿痛ノ者

モ又宿食ナ熱病甚キ者ニハ大熱病大抵調胃承氣合黄  
リ宜大承氣熱病柴胡湯合大承氣湯同連解毒湯用ルコトアリ

**同** 大熱極メテ深ク屢下ノ不利死症トナ温毒温毒日久ク發渴  
ル者ニハ大承氣ニ甘遂ノ末ヲ調服ス腹滿大便硬キ者

ハ調胃承氣加黄連赤時疫邪血分ニ留リ斑可出ノ不出不下同  
芍薬生地黃牡丹皮不出小承氣ヲ用テ緩々ト下之同

舌純紅色兼テ見裏症者ハ此邪同舌黑色ニ變ジ刺ヲ生シ鼻ス  
既ニ裏ニ入ル承氣湯ノ症ナリ同ケタル者ニハ大承氣主之

**同** 肉食ト病ト指合ノ胃中ニ停蓄スルニ大承氣ヲ用同愈テ後  
テ連下スレバ臭水稀糞出テ病不退者ニハ加人參同脉忘凡

ニ平ニメ大便二三十日モ不行或時々嘔吐スル者ニハ調胃承  
氣ヲ熱服スレバ宿垢頓ニ下リ嘔吐立止ムアハテテ勿用

補茶。○右温病熱病時疫瘧瘧病口噤卧テ不着席足變急シ必  
大抵通用ノ意得ヘシ齒齒ギリヲスルニハ大承氣ニ宜シ戰

**慄** 寒慄火盛ニメ似水モノアリ泄瀉下痢愈テ後其年月日ニ  
寒氣ニ非ス大承氣ニテ下之痢至テ發スル者ハ可下之同

一人患痢甚タ逼迫ス其症承氣湯ノ症ナリ然レバ氣口ノ脉弱  
キヲ以テ先ツ參朮陳皮芍薬ヲ用ルヲ十餘貼ニメ三日ノ後胃

氣漸完シ承氣湯腹痛腹痛常ニ有熱痛者ハ此同腹痛脉弦ナル  
ニ貼ヲ用テ安シ積熱也用調胃承氣下之同ハ肝血受傷大

承加腹滿腹滿ハ邪氣裏ニ入ルナリ發熱スル者ハ陽氣外ニ達  
肉桂ナリ十日計モ病ムト云ヘ凡邪猶皆盡クハ不入裏ナ

リ殊ニ能食スル者ハ胃ノ氣ニ權アリ小積聚積聚癥瘕熱スル  
承氣合桂枝芍薬湯即厚朴七物湯ナリ積聚者ニハ大承氣加

黃連芍藥川芎乾  
 姜甘草可用之  
**水腫** 膏梁厚味二因テ水腫太便大小濕熱痰火  
 閉ル者ニハ大承氣加肉桂便閉結滯レ脈  
 洪盛ニメ大小便秘閉レ肢節煩疼ス  
**溺血** 溺血實症ノ者ハ  
 大承氣加當版  
**消渴**  
 ル者ニハ涼膈散或小承氣ヲ撰用ユ  
**實熱腫痛**ニハ調胃承氣  
 中消ハ能食ノ瘦セ自汗大便  
**牙齒** 加黃連東垣用テ去甚硝  
**同** 歷  
 硬ク小便數調胃承氣主之  
**齒痛** 齒痛黑爛脫落必口吸冷水片ハヤ、痛止モ  
 ノハ膏梁濕熱ノ火ナリ調胃承氣加黃連  
**產前** 產前ノ疫瘧毒  
 盛ニ勢劇レキ  
 者ハ急ニ涼膈散承氣湯  
**產後** 產後日久ク外感熱結實邪燥屎ア  
 ル者ハ急ニ承氣湯大柴胡ヲ用テ  
 黃連解毒湯ヲ用テ救之  
 下  
 乏

傷寒

桃核承氣湯 五十一  
 寒 桃仁 五十  
 桂枝 二  
 甘草 二  
 大黃 四  
 芒硝 二  
 右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸溫服五  
 合日三服當微利

太陽ノ傷寒寒傷當犯本之證ノ藥ナリ表邪裏ニ入テ膀胱ノ府  
 ヲ犯シ搏血膀胱ノ府ニ結シ邪熱沸騰ノ侮心火故ニ其人狂人  
 ノ如クニ見ユル然ルニ血自ラ下ルモノハ邪熱膀胱ニ不留故  
 ニ自ラ可愈若シ血不下ノ小腹急ニ結スル者ハ血不行ホドニ  
 下劑ヲ用テ可攻サレ表症未解ンバ不可攻先ヲ表邪ヲ解ス  
 ベシ表邪ヲ解シ終テ後可攻之其攻法調胃承氣ノ内へ桃仁ヲ  
 増入テ瘀血ノ所ニ達シ加桂枝外邪ヲ解スル此兩解ノ方子ヨ

攻裏 百一 烏巢

フド五苓散ニテ風傷衛犯本ノ痞ヲ治スルト同意ニテ皆太陽ノ犯本痞ヲ治スル療治ナリ

此方本痞主用例

心下滿テ微シ硬ク按スレバ痛三不可按其人善テ物忘レノ小便ハ能利スルモノハ血膀胱ニ結スルナリ此湯主之

○小腹急ニ痛ニ身黃唇焦レ水ニテ口ス、クユトヲ好ニ小便自利スル者ハ畜血ナリ此湯主之

此方雜病活用例

諸血 準繩云犀角地黄湯ハ上血ヲ治シ吐血衄血ノ類ハ上血ナリ桃仁承氣湯ハ中焦ノ中血ヲ治ス中焦ノ畜血膿血ヲ下

利スルノ類ナリ抵當丸ハ下血ヲ治ス血塊 丹溪云羅太無一病僧ヲ治フ治ス血疰狂ノ如キノ類ナリ 血塊 ス黃瘦倦怠コレ母ヲ念フ

二因テ病ヲナスナリ先ツ牛肉猪肉等ヲ煮テ令食半月計ニノ稍快シ與此湯下之者血塊痰積ナリ以粥調理シテ好シ

心痛

平日熱物ヲ好シ食フニヨリ死血トナリ胃口ニ留リ痛ヲナス者用此湯下之 麻木 一塊痛痒ヲ知ラス陰寒ニ遇

ヘバ益甚シ書輕ク夜重シ脉潛ニシ或弦此痰死血ヲ夾ムニ屬ス活血行氣ベシニ陳湯加當歸川芎桃仁紅花牛膝薑汁ノ類若シ大便黒ノ不瀉ハ小劑 畜血 痰血内ニ滯テ頭汗目黃小便清利大便瀉黒小腹痛或左脇中脘ノ桃核承氣ニテ微利之

痛所有脉必關尺弦緊或帶芤 同 虚人瘀血アリト云ヘ凡脉芤必桃核承氣湯犀角地黄湯主之 一邪帶弦補ヲ兼テ以其血ヲ去

ベシ此湯ニ加人参大緩ク攻之片八十人ニ二三人ハ可治又中氣虚スル人胃脘ニ死血アリ椒姜湯ヲ用ル度ニ必ず呃逆ス人

參白朮各二兩末トレ桃仁一兩乾漆ト同炒去乾漆  
 細末レ蜜ニテ彈子ノ大サニ丸レ朝夕酒ニテ送下  
 小腹急痛スルニハ此湯或代抵當湯痛ノ從高下撰用ベシ大黃  
 ハ二方凡ニ童便制ニメ又其上ヲ韭汁ニテ制レ用ユベシ虛人  
 ニハ少シ桂附ヲ加ベシ若シ血色瘀  
 晦ニメ不鮮者ハ用温菜佳アリ  
 用井血迫リ上行メ衄血ヲナス必一升餘リ医者上實下虚トメ  
 丹劑ヲ用テ墜之滑伯仁云今血氣俱ニ壯ニメ溢レ上ル可下之  
 用此湯三四下瘀積既去  
 テ與既濟湯二十貼愈  
 ク加熟附子痛者ハ可  
 治不痛者ハ不可治  
 頭汗 頭汗小便不利ノ渴シ反テ不能  
 飲此膀胱ノ畜血ナリ此湯主之  
 黃疸  
 腰痛 腰痛三屈三僂瘳ス此熱邪深クハ  
 血脉閉之此湯ニ多ク用肉桂少シ  
 下血 内傷瘀  
 血胸脇

傷寒

瘀血ニ因テ發黃疸大便必黑レ腹脇ニ塊アリ或脹ル脉沉或弦  
 大便不利脉稍實ノ甚々不弱者ニハ用此湯黑物ヲ下シ盡メ愈  
 ヲ  
 腸癰 腸癰ハ大腸ニ痰積死血アリテ流注ス此湯加連  
 リ 翹蒼朮若シ肝門ニ近ク破レテ風ノ入者ハ難治  
 打撲 打  
 腹痛スル者ハ瘀血ナ  
 リ此湯加蘇木紅花  
 三一承氣湯 五十二  
 直格 大黃 芒硝 厚朴 枳實 各  
 半錢 甘草 一  
 錢

右細切作一服水一大盞薑三片煎七分熱服

此方三承氣ヲ合メ一方トスル友松子云仲景ノ三承氣湯各主  
 ル所アリ不可紛毫髮河澗此方ヲ制ノ乱仲景之方云 謙云仲  
 景ノ方毫髮ヲ不可乱ハ傷寒ニ於テハ嚴ナリ河澗ノ時代傷寒

時疫

加味承氣湯五十三 龔氏

治瘀血內停胸腹脹痛或大便不通

大黃 芒硝各

枳實 厚朴

當歸

紅花各

甘草五

右酒水各

煎服病急者不用酒按承氣之類可用壯盛人不可用

虛弱人若不辨虛實則誤多對證窺下風而與之則得卒效

傷寒

大柴胡湯五十四 寒

柴胡半

黃芩三

芍藥三

半夏半升 洗

枳實四枚 炙

大黃二

生薑五兩 切

大棗十二 枚 擘

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

續論曰此湯治少陽經邪漸入陽明之府表未除重表或誤下引邪

內犯而過經不解之證少陽ノ症ニ下故於小柴胡方中除去人

本草綱目卷之三十三 經絡一

參甘草助陽人參戀胃甘草之味而加芍藥枳實大黃之沉降以滌除

熱滯也與桂枝加大黃湯同義彼桂枝加大黃湯以桂枝甘草兼大黃兩

解太陽誤下之邪此大柴胡湯以柴胡黃芩兼大黃兩解少陽誤下之

邪兩桂枝加大黃湯不移易之定法也

此方ノ正面ハ誤下ノ為ニ設ル藥ナリ按本論少陽篇云太陽ノ

病過經十餘日ニ及ブ此太陽ノ証傳少陽少陽ノ症トナリテ未

罷ソレヲ不知ノモハヤ裏忘カト意得テ及テ下劑ヲ用テ下之

引邪内ニ入り病變種々アリト云ヘ凡尚小柴胡湯ノ証アラバ

先與小柴胡湯其邪ヲ提出ノ後此湯ヲ用ルヲ合法トスルナリ

方後續論ヲ考ヘ見ベシ然ルニ後世ハ誤下ノ療治ハ少シ故ニ

吳氏カ此湯ノ方考ニ表証未除裏証亦急也ト云ヘリ寒熱往來

脇痛口苦キハ表証尚アリ大使硬クノ燥實ナルハ裏証急ナル

ナリ仲景ノ本意ハ誤下ノ為ニ設ク吳氏ガ意ハ誤下ノ穿鑿ハ

ナシニ少陽ノ証ガ陽明ノ府ニ傳ヘテニ夕少陽ノ証モアリ既

ニ陽明ノ裏証モ急ナル者ニ用ナリ此傷寒ニ多ク有ル所ノ症

ナリ仲景ノ意トハ少シ異ナリト云ヘ凡ソニル所ハ一致ニ落

ルナリ儲テ陽明ノ府証承氣湯ヲ可用証也凡先試ニヒカヘテ此

湯ヲ用井ヨト先輩ガ云テアルソレヲ又先輩ガ裏症ニ究マリ

テ表証ハスキトナイニ左様ナ窺フ夕療治ハ目利ノ定ラヌ不

器量ナ療治ナリト叱タモノモアリ謙按ニ仲景サヘ大承氣ヲ

用ベキニ小承氣ヲ用テ試ヨト云テ置レ夕然レバ試ルト云丁

無イ丁ニテナシ未熟ノ者ハ此試ミヲスマジキ丁ニアラス然

後百病手引草 續編一 攻裏 百五 烏巢堂

レ凡必試ヨト云フデハナイ時ニ依テ  
不及試的當ノ方ヲ可用コトアルベシ

此方本證主用例

少陽寒熱往來六七日十餘日ニ至リ大便不行腋下汗出者主之  
傷寒外邪不解熱裏ニ入り心下痞硬嘔吐下利者此湯ヲ用テ  
表裏ヲ兩解スルナリ  
○下證盡ク備テ微惡寒及下利惡寒時々自ラ煩スル者ハ陽邪  
内伏スルナリ宜此湯  
○少陽ノ証寒熱小柴胡湯ヲ服メ不解其脈反テ浮ナル者ハ柴  
胡桂枝湯若シ脈數ヲ加ル者ハ宜此湯  
○陽明少陽ノ合病日晡寒熱如瘧宜此湯  
○傷寒發熱汗出不解心下痞悶嘔吐ノ下利スル者ハ宜此湯

○陽明ノ病腹滿微喘シ口燥不大便或讞語スル者此湯主之若  
此症清水ヲ下利スル者ハ陽熱極ル大承氣湯主之

○白舌色微黃ニ變ズル者ハ宜此湯○白胎根黃ナル者宜此湯

○白胎尖灰刺舌此湯主之

○白胎雙黃舌ハ此湯主之

此方雜病活用例

時疫 温熱病時疫合劑ヲ用テ熱不  
退者ハ此湯合黃連解毒湯

瘧 瘧狂悶讞妄スルニハ涼膈散加  
同 瘧痰停リ胸滿熱多ク寒少  
草菓寒熱便秘ニハ此湯主之

同 二十餘歳ノ男子瘧疾ニ發大熱煩渴間日トイヘ凡餘熱大半  
頭痛脈弦數汗甚出大便不通小便順用此湯三貼大便通瀉熱

醫藥手引草 讀編一 攻裏 百六

傷寒

去頭痛煩渴止脈微弦手足冷食如故因用對金飲子而諸症盡愈怒肝藏血有餘ナレバ怒氣甚生鐵落飲大柴胡小柴胡疎肝散并二諸氣ノ劑主之頭搖不大便ノ頭搖スルハ陽明ノ府症ナリ此湯主之

枳實大黃湯五十五

治胸腹有食積大便不通者

- 枳實 厚朴 大黃 枳實 甘草

右剉一劑水煎空心溫服以利為度不可再服。腹痛甚加木香

此方食傷ノ藥ナリ回春ニ積熱ニ屬スル者ニ宜シト云小承氣湯ニ加枳實甘草大便不通ヲ目アテトス此症必腹痛甚キモノナリ方後ニ腹痛甚キニ加木香ト云ヘリ

時疫

六乙順氣湯五十六

以代大承氣小承氣調胃承氣大柴胡三乙

承氣湯大陷胸湯等之神菜也舉世無人知此奇妙耳秘之莫與俗人言本方自有加減法備開。此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬カタクメカリ繞臍疼痛等証悉皆治之效不盡述

- 大黃 枳實 黃芩 厚朴 甘草 柴胡 芒硝

右將水二鍾瀝三沸後入藥煎至八分槌法臨時服入鐵秀水三匙調服立效取鉄性沉重之義最能墜執開結有神此千金不傳

之秘若非吾之子孫承繼焉肯泄露玄机故戒耳。○潮熱自汗譫

語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄班黃大便實者俱屬正陽明胃

府病依本方。本此症傷寒ニ在テ正陽陽明ナ。○口燥咽乾大便

實者屬少陰依本方。本此症計ニテハ未ダ。○下利純清水心下

硬痛而渴者屬少陰依本方。本少陰傳經實熱。○怕熱發渴譫妄

手足乍冷乍温大便實者陽厥證屬厥陰依本方舌卷囊縮者難

治須急下之。本傳經厥陰ノ。○譫語發渴大便實達臍硬痛者有

燥屎依本方。本達臍硬痛ハ燥屎。○熱病目不明謂神水已竭不

能照物病已篤矣權且急下依本方。本投極。○轉屎氣者謂下泄

也有燥屎焉當下之依本方如更衣者止後服不必盡劑不更衣

者宜再少與大便通者愈。本試ル。○結胸證心下硬痛手不可近

燥渴譫語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗。本此温熱病時

也加甘遂桔梗大陷胸湯ヲ合スル意也。○凡傷寒過經及老弱并血氣兩虛之人或

婦人產後有下證或有下後不解或有表證尚未除而裏證又急

不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐轉某硝性燥急故有

此戒大凡傷寒邪熱傳裏結實須看熱氣淺深用某令之庸俗之

攻裏 百八 烏真堂

醫不分當急下可以與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投  
湯劑下之因茲枉死者多矣本此辨去芒硝ハ緩々ト。余謂傷  
寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷者則痞滿燥實堅  
全俱宜大承氣湯厚朴苦溫以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒  
以潤燥軟堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦則有燥  
實堅二證故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不  
用枳實厚朴恐傷上焦虛無之元氣調胃之名自此立矣上焦受  
傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒

硝不傷下焦血分之真陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有  
表證尚未除而裏證又急不得不下者本此辨調胃承氣湯  
症ノ下ニコトハル。只  
得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用  
此故經云轉柴孰緊有芒硝者緊也大承氣最緊小承氣次之大  
柴胡又次之其大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方為轉柴蓋為病  
輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸散不可不  
知也

此柴傷寒ノ柴トイヘ凡傷寒ニハ用ラレ又時疫ノ柴ト意得ベ

其辨防風通聖散ノ下ニ詳ナリ其藥品ヲ考ルニ温熱病時疫  
ニ用テ然ルベキ方劑ナリ  
○回春ニ痢赤白相雜ヲ不問肚腹痛ニ裏急後重渾身發熱口  
乾キ發渴ス  
ル者ニ用ユ

時疫

凉膈散五十七  
河澗

治膈熱便秘胃實癰疽表裏俱熱

連翹 梔子 黃芩 薄荷 大黃酒洗 芒硝各二 甘草五分

右大東一枚葱白一莖水煎去滓温服無時○東垣加桔梗治諸  
般鬱熱退六經實火鬱熱  
實火 ○肺金邪熱嗽痰加半夏嗽  
效 ○咽喉腫

痛涎嗽加桔梗荆芥喉咽 ○效而嘔加半夏生姜嗽  
咳 ○鼻衄嘔血加

當歸芍藥熟地黄鼻衄 ○淋閉加滑石茯苓閉淋 ○風眩加川芎防風

石膏眩暈 ○酒毒加葛根黃連名清心湯用蜜竹葉同煎 ○班疹

加葛根荆芥赤芍川芎防風桔梗疹班 陽毒發班加當歸陽毒 ○效

嗽加桑白皮杏仁桔梗嗽 ○結胸心下滿加桔梗枳殼結胸 ○言語

發狂踰垣赴井皆陽熱極盛加黃連黃柏赤芍藥狂 ○眼生翳障

赤澁流淚加菊花木賊生地黃眼 ○本方合四物湯名雙和散能

益血泄熱熱血 ○一婦譫語發狂晝夜不眠不能坐臥飲食與則食

疫癘編 一 攻裏 百十

不與則不食大使秘脉細緊而數合四物湯加連四十餘貼而愈

**狂** ○按除積熱實火之劑

此方劉河澗制方ノ主意ハ廣クニ焦實火ノ為メニ設ク故吳崑  
方考火門ニ攝入ス然ルニ先輩ノ用方ヲ聞スルニ多クハ温熱  
病時疫ノ病ニ用ルナリ故ニ此書ニハ時疫ノ主方トスルナリ  
黄芩梔子ハ中焦ノ火ヲ治シ連翹薄荷ハ上焦ノ火ヲ清シ大黃  
芒硝ハ一切ノ實火ヲ泻ス先輩此方ヲ用ル例下ニ記ス如シ夫  
凉膈散通聖散大柴胡ノ三方ハ表裏兩解ノ劑ナリ其ウチ凉膈  
散ハ裏ヲ下ス方ガ專ナリ通聖散ハ熱ヲ解スル方ガ專ナリソ  
レユヘ此書ニハ通聖散ヲハ表裏ノ劑ニ入レ凉膈散ハ攻裏ノ  
劑ニ入ル只病ニ臨ンデ時ノ見ハカラヒニヨルニ初ヨリ緩

急ハ定ラレヌナリ原方ノ凉膈散ハ大黃芒硝ノ分量山梔黄芩  
薄荷ニクヲブレバ一倍多シソレガアミリ強キ方組ユヘ準繩  
ニ大黃芒硝ノ量ヲ減メ黄芩梔子ト等分ニスルナリ

此方本證ニ用例

熱病風寒暑濕ヲ問ハズ凉膈散天水散合煎表熱多ク裏熱少キ  
ハ天水散一凉膈散半裏熱多ク表熱少キ者凉膈散一天水散半  
○時疫汗出不解脉浮ナルハ表証ニ属ス白虎湯裏証ニハ承氣  
湯解毒湯表裏不別ハ此湯雙解散謙云此一條治時疫ノ太要不  
過之如此療治ノ雖不中不遠平日意得ヘシ

○時疫ニハ此湯加人中黄生地黃

○時疫舌胎焦枯唇口裂不大便者ニハ此湯加黄連石膏人中黄

○白胎ノ中小班点乱生スルニハ此湯承氣湯

○舌尖白少根黃ナルハ表邪少少裏邪多シ天水散此湯二宜シ  
○温疫二三日舌根灰黑急ニ此湯雙解散ヲ用ベシ紫中紅班下  
忘アルモノハ  
此湯二宜シ

此方他病活用例

**中風** 口噤不開大實証ノ者 痰心竅ニ閉塞シ不語熱者 痰飲 熱  
ニハ此湯加犀角黃連 同 此湯加黃連或牛黃清心丸 痰 熱

脉浮洪面赤煩熱心痛唇口乾キ喜笑多 夏月ノ效嗽ニハ小  
ク其痰硬ノ塊ヲナス此湯加茯苓半夏 效嗽 柴胡加石膏知母手

足ノ心熱シ外發熱セザルモノハ瀉白散加桔梗陳皮不應此湯  
去硝黃加 同 火熱嗽声唾痰濃カ 頭痛 火鬱ノ頭痛可下モ  
萎蕤蜂蜜 同 ナル此湯加桔梗 同 心痛 夏月

心痛大便秘シ心腹高 汗 火氣上蒸胃中ノ湿 産前ノ瘧脉實煩  
起者此湯ニテ下之 亦能作汗此湯主之 渴シ大便六七白  
不通陽明府實ニハ此 瘴瘧山溪燕毒冷人迷因發狂或啞  
湯去硝黃加鮮何首烏 同 作寒作熱作有作無加柴胡枳榔 麻疹  
麻疹譫語甚者加桔梗地骨皮泄瀉合四苓散便血合犀角地黄湯  
吐衄加炒梔子小便赤加木通 〇吐血衄血輕者黃芩湯加生地山  
梔重者此散加 同 大便閉者倍 實火蘊熱積毒煩渴二便  
生地山梔童便 同 大黃下之 咽喉 閉澀加黃連荆芥石膏 耳

濕蘄因雨水浸漬必内腫痛此散加羌活防風 鼻 風寒鼻塞肺伏火  
俱用酒炒或五苓散加陳皮枳殼紫蘊生姜 邪鬱甚則喜熱惡  
寒加荆 芥白芷

百十二 爲其堂

傷寒

十棗湯 五十八

芫花 熬

甘遂

大戟

大棗 十枚

右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取

八合去滓內藥末強人服一錢七羸者服半錢平旦溫服若下少

病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

此藥ノ正面ハ傷寒痞症ノ某ナリ夫病陽ニ發シ誤テ下之結胸  
トナル病陰ニ發シ誤テ下之痞トナル陽ニ發シ陰ニ發ルノ分  
チハ傷寒論太陽篇首條ニ見ヘタリ此痞大抵心下痞シ種々ノ  
痞ヲナスモノハ瀉心湯主之此痞ハ胸腹ニ在テ胃ニ在ラズ其  
痞心下痞滿シ腹下ニ引テ痛シ乾嘔短氣汗出不惡寒モノハ心  
下ニ水氣アリ乃熱邪水飲ト搏テ如此ノ諸痞ヲナス故ニ芫花

ノ辛ヲ以テ逐飲甘遂大戟ノ苦ヲ以テ泄水大棗ノ甘キヲ以テ  
脾ヲ助ケテ水飲ヲ胸脇ノ間ニ去ルナリ然ルニ今時ハ誤下ノ  
痞ナシ只用テ以テ雜病ノ藥トス凡何病ニ因ラズ心下ニ水氣  
アツテ脇下ヘ引痛ノ病皆此方主之但シ峻駛ノ剛劑其人虛ニ  
屬スル者ニハ決メ不可用有故無殞ト云ヘ凡補劑ヲ前後ニ用  
ルカ見計ヒアルヘシ此某右ノ意得ニテ用ベシアミリ外ノ  
ニ用ル丁ハナイ只心下ニ水氣アツテ腹下ニ引痛ト云カ此湯  
ノ目的ナリイツニテモ脇下痛ムナラバ此湯ノ痞テハナイカ  
ト先ツ氣ヲ付ベシ脇痛ハ色々ナリニテ痛メ凡脇痛トキカバ  
若シ此湯ノ痞テハナイカト意ヲ付テ吟味メ見ルベシ借此方  
ヲ本トメ張子和ガ禹功散濟川散控涎丹ナドヲ制メ利水便秘  
ノ某トスル極メテ峻劑ナリ

此方雜病王用例

痰飲

金匱云脉沉弦懸飲内痛此湯主之懸飲ト云ハ痰飲  
流レテ脇下ニ在テ欬唾引痛スルヲ懸飲ト云ナリ

水腫

丸此菜各等分枣肉ヲ煮熟シ皮核ヲ去リ搗キ爛シ丸トシ梧桐  
子ノ大サ每服四十九清晨熱湯ニテ下ス水氣浮腫上氣喘急太  
小便不通  
ヲ治ス

水腫

禹功散

五十九  
子和

治陽水腫便秘脉實初起元氣未傷者

黑牽牛 頭末 四兩

茴香 炒

木香 各一兩

爲散每服二錢加生姜自然汁調如稀糊服

水腫

濟川散

六十  
子和

治水腫脹急大便不通大實大滿證

大黃

牽牛 頭末

郁李仁 各一兩

芒硝

甘遂 各半兩

木香 三錢

爲散每服二錢入生姜自然汁和如稀糊服○此乃下水積之峻

茶火熱沸鬱水液不能宣通停滯而生濕熱在陽不去則化氣而

化生ス 爲脹在陰不去則化積成形

此藥陽水腫濕熱甚ク太實太滿ノ症ニ用ル菜ナリ故ニ大陷胸湯ニ加牽牛郁李仁木香下劑ノ峻菜方下ニ記スカコトシ

水腫

三白散 六十一 良方

白牽牛 頭末 二兩

桑白皮 姜汁 炒

白朮 生 用

陳皮

木通 各 兩

為散每服二錢空心淡薑湯送下

此方牽牛ヲ君トシ白朮陳皮ハ燥濕利氣除痰ノ品ナリ桑白皮木通ハ利水ノ菜ナリ牽牛ニ佐トメ此症ヲ治ス前方ニ比スレバ穩當ナリト云ヘ凡此亦水腫初起ニ便不通元氣未衰モノニ用ユベシ但シ陰囊腫脹スルモノモツトモ此方ノ的候ナリ

大便閉

半硫丸 六十二 局方

治高年冷秘虛秘及瘧瘵冷氣

硫黃 醋煨 柳木 槌碎 研

半夏 湯泡 晒 乾 為 末

右二味等分用生姜自然汁調蒸餅糊杵數百下丸如梧子大每

服十五丸至二十九丸空心無灰酒或生姜湯任下婦人醋湯下

此菜攻裏ノ菜ニ非スト云ヘ凡此書大便閉ノ門ヲ不立故ニ攻裏ニ入ル寒門ニ入ル、凡又可ナリ大便冷秘ノ菜ナリ冷秘ハ六脉沉遲面白ク或黒ク凝陰固結シ胃氣閉塞腸内氣攻腹中喜熱惡冷藿香厚朴乾姜肉桂枳殼陳皮生姜ノ煎湯ヲ用テ此丸ヲ服スベシ凡熱菜多クハ大便ヲ秘閉ス只硫黃ノ性緩ノ大便ヲ通スルナリ

痰飲

三花神祐丸

六十三  
河澗

一切濕熱沉積痰飲變生諸病者主之

甘遂

麵裹煨

大戟

拌温炒

芫花

各半兩炒

輕粉

四分

大黃

一兩

黑丑

二兩取頭末

前菜為末滴水為丸如小豆大初五丸每服加五丸温水下日三服以利為度服後痞悶極甚者此痰涎壅塞頓攻不開轉加痛悶即初服五丸每加二丸至快利即止

此某方下二記ス如ク痰飲憂ノ諸病ヲ生スルニ用ルナリ故ニ仲景ノ十棗湯ニ加輕粉大黃牽牛十棗湯ハ逐飲ノ駭劑ナホ黑牽牛ヲ以テ逐水ノ佐トス大黃燥結ヲ潤シ積滯ヲ通ス輕粉諸竅ニ入テ風痰積熱ヲ逐ヒ頑涎沉積ヲ驅リ其主治定功ナシト

云ハ凡只燥熱鬱痰沉積ノ生ズル所ノ病ヲ治スル藥ト意得テ其合点ニテ諸病ニ用ベシ故ニ吳氏方考ニ痰飲門ニ入ル仲景ノ十棗湯ハ棗ノ煎湯ニテ用ル故ニ此某ホド峻ニハナシ此ハ棗ヲ用ス輕粉大黃等ノ某ヲ益メ強剛劑ナリ非大實病不可用此方他病活用例

麻痺

風熱鬱燥ニ因テ四肢麻痺疼痛ノ氣血壯實ノ者主之

欬嗽

痰嗽氣血壅滯スルモノ用之  
憂思思想積藏府二鬱

結シ積塊トナリ生諸病  
モノニ用之凝滯ヲ瀉ス

經閉

婦人滯氣鬱積ニ因テ經閉  
或赤白帶下等ノ症主之

腹痛

三物備急丸

六十四  
金匱

見千金司空裴秀為散用亦可先和成汁乃傾口中令從齒間得入至良驗

大黃

一兩

乾姜

一兩

巴豆

一兩去皮心熱

傷寒論卷之九 辨少陰病脈證并治法第九

右藥各須精新先搗大黃乾姜為末研巴豆內之莫令歇○金匱  
要略云主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺  
氣急口禁停尸卒死者以緩水若酒服大豆許三四丸或不下捧  
頭起灌令下咽須臾當差如未差更與三丸當腹中鳴即吐下便  
差若口禁亦須折齒灌之

此茶方下二所謂卒暴ノ病ニ用ルト云ガ最ナリ此丸ノ專トス  
ル所アリ就中心腹脹滿卒痛是の候ナリ此方下劑ト云ヘ凡若  
不下必吐ス吐下ノ功アル茶ト知ルベシ傷寒論ノ誤治ニ誤テ  
温茶ヲ用テ下之ト云ハ此類ノ藥或紫圓ノ類ナルベシ

中風

三化湯 六十五 機要

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治  
之內有便溺阻隔復以此藥利之

- 厚朴 大黃 枳實 羌活 各等分

右細切每服三兩重水三升煎至一升半終日服之

此方小承氣湯ニ加羌活中風ノ下劑トス此藥峻ナル故後世ニ  
搜風順氣丸ヲ以テ代之宜シク考ベシ

湧吐

傷寒

瓜蒂散 六十六 寒

瓜蒂 一錢 炒黃

赤小豆 二錢

傷寒論卷之九

續命湯

百十七

傷寒論

右二味各別搗篩為散已治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少々加得快吐乃止

此茶本論ヲ按スルニ胸中ニ有痰モノ其證傷寒ニ類ス然ルニ頭痛項強等ノ候ナレ其候ヲ詳ニメ此茶ヲ用テ吐之本論又云宿食在上脘者當吐之云畢竟痰ニモ世ヨ食ニモ世ヨ形アルモノガ胸中ニアルニ用ル茶ナリ瓜蒂赤小豆ノ茶性ガ云テアレ何ノ穿鑿ナレニ只吐劑ト意得タガヨレ本論所々ニ此方ヲ用又雜病ニモ用テアレ凡胸中ニ在ル所ノ形アルモノヲ吐スル茶ト意得レバ用方此意ニ不出ナリ或寒溫頭中ニ中リ頭痛鼻塞外ニ苦ム所ナク能食ノ腹中和スルニ此茶ヲ鼻中ニ吹テ鼻ヨリ黃水ヲ出ノ愈ル此症ニ煎茶ヲ用ルナラバ羌活勝濕

湯ナドニテ頭中ノ濕ヲハラフテモヨレ瓜蒂ノ子ズニマクハノヘタナリ早ク採リ青キ者曝シ乾シ用ルナリ氣味苦ク欬上氣黃疸ヲ主ル外用テ鼻中ノ塞肉ヲ去ル第等按ニ此近來ノ傷寒金匱茶性辨ノ發明ノ説ナリ

外ニ越前府中ノ苦瓜蒂ヲ不及求

此方雜病活用例

〔癘〕十六七歳男瘧疾ニ發頭痛手足節痛甚ク煩渴引飲胸悶不寧脉弦數結促用茶一貼而愈如神此方主之

傷寒 梔子豉湯 六十七 梔子 八分 香豉 二

右二味以水一合六勺先煮梔子得一合內豉煮取六勺去滓分

本草綱目 卷之八 湯吐 百十八

為二服温進一服得吐者止後服○梔子湧膈上虚熱香豉散寒  
熱惡毒能吐能汗為汗下後虚煩不解之聖藥若嘔則加生姜以  
滌飲少氣則甘草以緩中心煩腹脹則去香豉而加枳朴邪在上  
而不在下也丸藥傷胃則去香豉而加乾姜湧泄而兼安中之意  
也故欲湧虚煩必先顧慮中氣所以病人舊有微瀉者有不可吐之戒  
汗吐下ノ後餘邪胸中ニ窒リツコリヨス不安懊懣無可奈何ノ狀トハ  
胸中氣味アシク俗ニドウモ云ニ云ハレ又ト云様ニ寐テ見テ  
モ起テ見テモ氣ガワルイト云フ症ニ用之吐セシムレバ胸中  
サツハリトシテヨイ此前方瓜蒂散ト同シク吐劑ナリ瓜蒂散

ハ形アルモノ、吐劑ナリ此湯ハ汗吐下ノ後ノ餘邪無形ノ氣  
ヲ吐スルニ此菜ヲ用畢竟胸中ニ物アツテ苦ムニハ瓜蒂散物  
無シテ苦ムニハ此湯ト意得ベシサレモ二菜凡ニ用ラレヌ  
アリ氣弱虚人ニハ瓜蒂散不可用本論不可吐之證ヲ述ル條ヲ  
見ルベシ又病人舊脾胃虚寒大腸不硬少シニテモ泄瀉スル者  
ニハ不可用ト云戒アリ加減方後續論ニ詳ナリ加甘草加枳朴  
加乾姜本論ニハ別ニ一方ト立レモソレニ不及此加減ニテ佳  
ナリ續論ニ丸菜傷胃ト云ハ強イ下シ菜ノ丸菜ヲ用テ胃ヲ傷  
ルナラバト云フナリ仲景ノ時代ニハ丸  
菜ノ下劑ガイロク有リツト見ユルナリ

此方雜病活用例

**眼衄** 此湯加犀角秦皮  
牡丹皮赤芍藥

**痰飲** 稀涎散 六十八  
陳氏

能吐痰涎壅盛此藥不大嘔吐但令涎微々自口  
角流出而自甦

明礬 一兩  
牙皂 五匙

為末每用一錢溫水調下

此茶通用湧吐ノ劑ナリ其ウチ卒中風ナドノ痰涎壅盛ノ不省  
人事モノニ用外ノ吐劑ト違フテ一度ニ大ニ嘔吐ト云ヘ  
此茶ヲ用レバ痰涎ガ口ヲキヨリ少シク流レ出テ甦ルナリ  
サレバ此症ニ元氣弱キ者ニハ吐劑ヲ禁ズルヲアリ其訣ハ中

編中風門ノ  
下ニ詳ナリ

**痰飲**

三聖散 六十九  
子和

防風 二兩  
去芦

瓜蒂 二兩  
炒微黃

藜蘆 聖惠方減用之或一  
兩或半兩或三匙

右各為麤末每服約半兩以蘆汁三茶盞先用二盞煎三五沸去

蘆汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去渣

清放溫徐徐服之以吐為度不必盡劑

張子和ハ汗吐下ニ長シタルモノナリ此方ヲ以テ吐劑ノ專方  
トス故ニ載之然ルニ今真ノ藜蘆ヲ得ル丁難成若シ藜蘆ヲ得  
バ此方モヨシ又人參藜蘆ノ二味ヲ合用ノ古來奇方トスル也

後百病手引草

續編一湧吐

百二十

烏巢堂

痰飲

一方

七十  
景岳全書

此方可代瓜蒂三聖散之屬

用蘿蔔子碎以温湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃即吐出即有

不盡者亦必下行之

此方古来ヨリ用來リテ不珍ト云ヘ凡景岳此方ヲ以テ吐劑ノ  
總司トノ瓜蒂散三聖散ノ類ニ代ルト云テ全各ニ表章之此方  
簡便ニメ用井安シ故ニ載之若シ吐ノ不尽モノ有レバ必下行  
メ瀉スルト云ヘリ然レバ吐下ノ二ツヲ兼々某ナリ凡吐劑此  
五方ニ限ラズ種々ノ方アツテ諸書ニ出ル或症ニ因テ何某ナ  
リ凡用テ鳥ノ羽ニテ探リ吐スレバ何ヲ用テモ吐スルナリ

傷寒

小柴胡湯 七十一

和解

柴胡 八分 黃芩 各三分 人參 甘草 各三分 半夏 六分

生薑 大棗 各三分 右七味以水二合四勺煮取一合二勺去滓

再煎取六勺温服之日三服○若胸中煩熱而不嘔去半夏人參

加枳實 瀉飲 四分 〇若渴者去半夏加人參 生津 合前成四

分半枳實根四分 〇若腹中痛者 陽邪 去黃芩 胃中清陽ノ加

芍藥三分 陰邪陽ニ傳ルヲ主ル陰中伐木故ニ 〇若脇下痞

鞭去大棗加牡蛎四分 痰飲脇下ニ結ス大棗ノ甘壅ヲ 〇若

續編一和解

百二十一

烏巢堂

烏巢堂

心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四分水心下二停几黃本

若不渴邪未入裏外有微熱者去人參加桂解表三分溫覆取微汗愈本

○若欬者去人參大棗生薑加五味子肺飲六分乾姜辛二分○小

便難潮熱腹滿加茯苓三本○下後陰虛生熱脈微惡寒去黃芩

加芍藥六分腹痛亦然本○嘔而發熱胸脇滿小便不利去黃芩加

茯苓五本○飲水過多成水結胸去大棗加牡蠣結ヲ軟五分本

○往來寒熱欬胸脇痛去人參大棗加五味子乾姜一分本

渴甚去半夏加入人參一分括蕞根三本○身熱不渴去人參加桂

枝一分本○心中飽滿加枳殼桔梗本○心下痞滿加黃連枳實

本○夜靜而晝發熱者熱在氣分加山梔黃連知母地骨皮本

晝夜發熱者熱在氣血之分合四物湯加黃連山梔本○下痢身

熱夾外感者必惡寒發熱煩渴身首俱病此在表去人參大棗加

蒼朮木川芎陳皮赤芍藥生薑得微汗愈本○傷寒陽證欬逆潮熱

加陳皮竹茹生薑本○伏暑發熱汗渴暑入心胞不語加茯苓本

○瘧熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾宜此湯去半夏加入人參瓜

蒞根本○瘧發寒熱作渴病在表裏陰陽不分者合五苓散本名柴

續編一和解 百二十二 烏巢山

苓湯同 ○無汗加麻黃瘧ノ ○有汗加桂枝瘧ノ 寒多加肉桂瘧ノ 加味 ○

熱多加黃芩瘧ノ 加味 ○口酸而苦者瘧ノ 肝膽有實熱加龍胆青皮甘草瘧ノ

口酸 ○如膽熱而口苦者瘧ノ 謀慮不決也去黃芩加酸枣地骨遠志瘧ノ

口苦 ○由醉飽房勞而後大怒觸動榮血致吐血者加二門冬瘧ノ 吐血 ○

灸後發熱煩悶加菴骨牡蛎瘧ノ ○產後惡露下忽然斷絕寒熱往來瘧ノ

來晝靜暮劇語言狂亂如有鬼神此熱入血室而顛狂加生地黃瘧ノ

熱入血室 ○產後虛羸寒熱飲食少腹脹加陳皮川芎生姜大棗瘧ノ 產後 ○

小兒感寒發熱或作瘧宜此湯瘧ノ 小兒感冒 ○痘疹出不快身熱甚者加

生地黃瘧ノ ○傷寒百合病加知母百合竹茹粳米瘧ノ ○本方去

人參甘草加芍藥大黃瘧ノ 枳實瘧ノ 入姜朮煎服名之大柴胡治

傷寒十餘日不解大便不通身熱煩燥譫言妄語此乃攻裏劑故

以利為度如身體疼痛者表證未解不可服之瘧ノ 本前ノ大柴胡ノ

○倍加芍藥大黃名熱利湯治腹痛大便結小使澀喜飲冷以手

按之痛轉甚手不可近或兩手按腹脾熱瘧ノ ○按大柴胡數和宜

實證不宜虛證小柴胡傷寒和解之劑也 ○夏月發熱煩渴小水

不利兼傷寒陰陽不分疑似之間者去半夏加麥門五味黃連瘧ノ 暑

百二十三 烏巢

○下痢赤白腹痛身熱加黃芩芍藥痢病ニ此湯ヲ用ル

如兼惡寒亦得同即的鼻燥ケ黒シ ○欬

嗽煩熱加麥門同 ○欬嗽嗜臥減食加白朮同 ○欬而寒熱往來

去人參加五味子乾姜同 ○寒熱不調作腹痛去黃芩加芍藥腹痛

○俄耳聾而頭鬱ニハカニ合香薷散百發百中耳クニニ ○灸後發熱煩悶加

黃連山施得奇妙熱 ○陰囊陰囊濕痒陰囊加茯苓子青皮此乃通肝經故

也陰囊 ○男婦口苦兩眼脹或痛加黃連山施苦 ○大飢發熱太

食傷胃已成黃疸其候食則腹滿眩暈或心中佛鬱不安加枳實

厚朴山施黃疸 ○婦人傷寒經水適來適斷發熱惡寒夜則譫語此

為熱入血室故寒熱如瘧宜此湯熱入血室 ○少壯人發熱惡寒入夜

譫語亦宜

此茶傷寒ノ邪少陽經ニ在ルモノ和解ノ劑ナリ少陽經ハ陽經  
既ニ終テ陰經ニ傳ヘントスル所ナリ故ニ半表半裏ト云其症  
往來寒熱之胸脇苦滿之脇下痛三或鞭滿之嘔ノ口苦之或渴之  
或不渴耳聾目眩之目赤之默々不欲飲食心下痞滿心下悸小便  
不利心中煩之或欬之頭痛頭汗腹痛身微熱アリ手足温或手足  
心冷へ脉弦或弦細然ルニ此症ガ盡ク在ルニアラス人ノ気体  
ニヨソテ同ジカラズ此中ノ忘ガ一二三色モ見ルナラバ即此

湯ノ症ナリ柴胡ハ少陽經ノ某ニノ專ラ往來寒熱ヲ至ル黄芩  
ハ風熱ヲ去ル專功アリ半夏ハ痰飲清痰人參甘草ヲ用テ以  
テ少陽ノ氣血ヲ助ケ姜枣和胃半表ノ邪肌表ニ從テ散ズ是此  
藥ノ正旨ナリ

此方本証主用例

陽明中風ノ症脈弦浮大短氣腹滿及ビ心痛鼻乾キ不得眠嗜臥  
及面目尽ク黄色小便難ク潮熱アリ時々乾嘔耳ノ前後腫レ病  
十餘日ニ及フト云ヘドモ脈ツビイテ浮ナル者ハ宜此湯  
○陽明ノ症ニノ腸下鞭滿不大便ノ嘔レ舌上白胎アル者ハ此  
湯ヲ與ベシ上焦ノ津液通ルコトヲ得テ下リ胃和シ身灑然トシ  
汗出テ病解ス  
○陽明ノ病潮熱ヲ發シ大便澶タタシ小便ハ常ノ如ク胸膈滿ルモ

ノ此湯主之

○本太陽ノ病不解轉クノ少陽經ニ入ル者胸下鞭滿乾嘔不能食  
往來寒熱脈沉緊ナルモノ此湯主之

○傷寒十三日胸膈滿テ嘔レ日晡潮熱シ終テ後微ク大便利ス  
此本小柴胡ノ症ナルヲ医者九葉ヲ以テ下之如此ノ症トナル

先ツ此湯ヲ用テ外ヲ解シ後ニ柴胡加芒硝湯ヲ用ベシ  
○婦人ノ外感經水適來テ其儘斷ヘ七八日ニメ胸脇滿チ鞭カクク

痛三結胸ノ狀ノ如ク謔語スルハ瘀血裏ニ結スルナリ即此熱  
入血室ノ實症ナリ此湯去人參加桃仁牡丹皮當飯尾穿山甲

○右ノ症折節經水來テ經水不殘不下メ斷ル血結メ瘡ノ形ノ  
如シ此始メノ症トクラブレバ始メノ症ホド實症デハナイナ

ゼナレバ始メノ症ハ經水來ルト其二、斷ル故血大分殘テ結

スルユヘ實症ナリ此症ハ經水大方行テ令少シ殘ル其殘リカ  
結スルユヘニ瘀血ガ少イ此湯加當飯牡丹皮生地黃涼之ヲ  
○婦人經水來ル最中ニ患傷寒晝ハ常ノ如ク夜ハ譫語ノ鬼狀  
ヲ見ル如シ用此湯經水ガ皆下リテシニハ右病自愈ルナリ  
○血弱ク氣盡テ外邪ト相搏チ脇下ニ結シ默々不欲食邪高ク  
痛ニ下ノ嘔スル者ハ本方主之右ノ四症婦人熱入血室ノ症也  
○陽明ノ症ヲ病ンデ下血ニ譫語ス此男子ノ熱入血室ナリ多  
ク頭汗ガ出ルモノナリ此湯ニ合犀角地黄湯若シ熱甚ク神昏  
キ者ニハ生地黃黃連湯ニ加酒大黃右婦人男子熱入血室ノ  
症其脈血滯テ不行脈乍濇乍數或沉或伏ソレニ血熱ガ交レバ  
脈洪盛ナリ血虛スレバ芤ナリ若シ虛中ニ瘀血ヲ兼レバ芤脈  
ノ中ニ帶弦此一定ノ方ナリ

○外感咽喉乾燥此湯或小建中湯

○太陽ノ病胸滿腹痛ハ此湯ニ疑ナシ但脈浮者宜麻黃湯

○傷寒四五日身熱惡風頸項強リ脇下滿チ手足温ニメ渴スル

モノハ此湯主之

○太陽少陽ノ合病此湯或柴胡桂枝湯主之

○傷寒愈後又發熱スルハ此湯主之脈浮ハ汗ノ以テ解之脈沉

實ハ下メ以テ解之

○婦人經行ノ時外感セバ此湯ニテ和解ス加當飯川芎牡丹皮

不然トキハ熱入血室ナリ

○產後傷寒遽テ、不可用此湯方中ニ黃芩アレバナナリ產後傷

寒時疫ハ柴胡四物湯ニ加減ス

○傷寒胃實ノ症脇下ト手足ノ心ト兩處無汗ハ未結定尚此湯

ニテ和解ニ結定ヲ待ツ

○雜病ノ盜汗ハ責メ陰虛ニ在リ傷寒ノ盜汗ハ半表半裏ニ在リ宜此湯若シ脈浮緊潮熱盜汗ニハ柴胡桂枝湯若シ太陽陽明ノ合病裏實ハ必ズ盜汗出ヅ

○結胸未經汗下ハ此湯加枳實桔梗或更ニ加桂枝

○舌上胎黑ク燥烈神昏譫妄ハ此湯加知母石膏

○陽明脈浮發熱スルハ表未盡宜此湯

○往來寒熱ノ嘔スル者ハ宜此湯不應ハ加肉桂乾姜黃連

○少陽陽明ノ合病欬ノ嘔シ腹滿ハ此湯加葛根

○傷寒厥ノ心下悸ニハ與茯苓甘草湯先治厥次ニ與此湯

○食復脈弦大此湯加葛根黃連烏梅

○滿舌白滑尖反テ鮮紅少陽經ナリ此湯ニ加減ス

○白胎中紅舌少陽經ノ症ナリ此湯ニ加減ス

○舌尖白ク其症寒熱耳聾口苦ク脇痛ニハ宜此湯

○舌根白ク尖黃ナルハ宜此湯

○藍紋舌ハ即胃土ノ氣衰フ此湯去黃芩加乾姜或附子理中湯

大建中湯

○積聚動悸兼傷寒者和方此湯ヲ不出○食復ハ此湯加大黃

此方雜病活用例

○溫疫多渴ハ此湯去

半夏加石膏知母

○熱病汗ノ後餘熱未尽者此湯ニ加減スベシ

○同 熱病欲下之表未解

○同 溫熱病時疫脈弦脈痛ハ此湯去人參半夏加枳殼橘

○同 皮脈弦盛有力加石膏知母弦小無力可用人參嘔者可用半夏生姜又慎三可用溫病溫病面赤ク煩燥引水此湯去

半夏加同晚發大抵此大頭病蝦蟇瘟ハ顛倒ノ下腫ル此湯去入  
葛根湯加生地黄參半夏加羌活防風荆芥薄荷桔梗

馬勃荆防敗毒散モ亦可ナリ夏暑温熱ニテ腫ル温瘧温瘧ハ  
二ハ消暑十全散加荆芥防風馬勃方見上編暑門夏月ノ

温瘧トハ少シ違フ傷寒論序例ニアリ其症胸脇滿煩寒熱寒熱  
渴ノ嘔ス微ク惡寒ス此湯去入參半夏加括蕁根石膏如瘧

モノハ此湯ヲ主茶トス夜轉瘧暑瘧ハ但熱ノ不寒此同春夏伏  
夕暮ニキ者ハ加牡丹皮山梔湯加香薷黃連竹葉同氣ノ温

瘧ハ但熱ノ不寒春ハ用此同勞瘧太渴者此湯同瘧疾此湯加常  
湯夏ハ用白虎加桂枝湯同去半夏加括蕁根同山栝榔草菓

同瘧大渴大熱者去半夏瘧痢瘧痢ハ此湯合四君子脇痛脇痛肝火  
夏加知母麥門黃連四物加黃耆名三分散動スル者

ハ此湯加黃脇痛吐血ハ熱傷肝此腹痛二ハ此湯身體痛  
連牡蛎枳殼同湯加當歸川芎生地黃腹痛加肉桂乾姜

身體痛ニハ此湯痛風痛風忽痛モノハ此湯去半夏加頭痛產後  
加麻黃桂枝芍藥防風當歸生地黃大黃黃連滑石煩熱

頭痛因外感潮熱潮熱虛羸五心煩熱ニハ道欬嗽熱嗽ニハ此同  
者宜用此湯遙散此湯ニ加減スベシ湯加桔梗

夏月嗽發熱ニハ同膽欬此湯加蘆根同寒熱交作リ此湯加知母  
此湯加石膏知母同胆欬ノ狀見素問同之類或加芍藥五味子桑

白嘔吐嘔ノ發熱也同嘔逆ニハ此湯同胃口痛テ嘔吐又熱ノ  
皮嘔吐ハ此湯主之同加丁香砂仁同者此湯加竹茹同嘔吐ヲ

治スルニ膽逆口苦脇痛吐血ハ此熱傷肝此湯同風呂  
モ加竹茹口苦キ宜此湯吐血去黃芩半夏加牡丹皮鱉甲同二ハ

此湯主之同加丁香砂仁同者此湯加竹茹同嘔吐ヲ  
百二十八

リテ俄ニ吐血下血スルアリ初發ナラハ此湯加芍藥傷寒裏証ニ脈數實ナルハ血ヲ下スモノナリ

肝火動スルニ汗出邪熱アル産後汗出大便硬ク嘔ノハ此湯加山梔汗ニハ此湯加桂同不能食ニハ此湯主之喘急

喘急ニハ此湯加積聚氣塊ニハ加枳榔苗香三稜大便閉熱極不大便此湯加大黃芒硝腹脹

麻黃蕪子桑白皮胸脹胸脹脹滿ニハ此湯加枳實莢木砂仁痢痢疾ニハ加黃同身熱

腹脹ニハ加香附附子腹滿加枳實莢木砂仁痢連枳殼去甘草同夾外

感モノハ不惡寒此湯去人參惡寒發熱身首痛ハ表症ナリ微寒和解スベシ用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜泄瀉下痢瀉或發シ或止ニ患泄瀉医理中湯ヲ與フ悶厥ノ漸ク甦ル脈濇長按ノ弦數丹溪云是下痢ノ深重ナルモノナリ與當歸龍

蒼朮去麝香四貼ニシテ利減シ又此湯去半夏加黃連芍藥川芎生姜數貼ニシテ安シ盜汗温熱病時疫汗吐下ノ後盜汗スル

ニハ此湯去人陰汗湿熱陰汗ニハ此湯去人參加茯苓龍胆黃柏頭搖卒然トノ頭搖キ項背強リ痛ムハ

少陽經ナリ此湯去人參加防陰痿陰縱ハ前陰受熱此湯加酒消風不大便ハ陽明ノ府症ナリ陰痿黃柏湿熱ニハ龍胆瀉肝湯

消渴ニハ去人參火熱氣分虚熱久シキ者ハ陽ヲ升呃逆汗吐合四物湯加天粉足腫二テ以テ散之此湯合四君子下ノ

後呃逆スルハ茯苓足腫兩脚浮腫ニハ此湯加大腹皮木瓜五加皮虚煩傷寒過經

ナリ此湯加陳皮竹茹赤膈赤膈ハ胸膈赤ノ疼痛發熱身痛熱未解屢下ノ熱不解脈虚數ニシテ

煩スル者ハ此湯ニ加減ス赤膈三或胸脇痞ヲ發ス少陽ノ風熱

二属ス荆防敗毒散加黄芩黄连犀角若シ表症既ニ退キ大便燥結スルハ凉膈散半表半裏ハ此湯去人参加枳殼桔梗

**破傷風邪半表半裏** **耳瘡** 耳瘡寒熱為痛者肝經ノ風熱ニ属ス此湯加山梔川芎 **便毒** 入房忍精

**風** ニアルハ宜此湯 敗精凝滯ノ痰トナリ腫痛跨腹ノ間ニアリ先ツ五苓散ヲ用并

敗精ヲ利去シ大便結スルニハ加大黄寒熱アル者ニハ此湯加

山梔澤瀉若シ躰弱ク大便易小便澁ル者 **陰瘡** 陰瘡濕熱腫痛寒熱スル者ハ此湯

ニハ此湯加川芎當歸知母黄柏澤瀉 **陰瘡** 熱スル者ハ此湯

加龍胆黄 **陰囊痒** 陰囊痒加 **産後** 産後不語ニハ **黄疽** 酒毒熱スル者ハ此湯加

連青皮 **陰囊痒** 蒼朮用之 **産後** 此湯加釣藤鈎 **黄疽** 者ハ此湯加

茵陳白朮豆豉 **同** 黄疽陽經ニ発スルモノハ **同** 風症色黄帶青者

葛根黄連澤瀉 **同** 必寒熱アリ此湯加山梔 **同** ハ此湯加茵陳

**同** 小兒黄疽大人ト同シ熱アル者 痘出ルトキ咳嗽脇痛吐食

ニハ此湯加麥芽枳實山梔茵陳 痘 不下モノハ半表半裏ノ邪

ナリ此湯加五味子枳殼桔梗小便赤キ者ハ加山梔赤茯苓

便血糞黒キハ毒天腸ニアリ犀角地黄湯或此湯加生地黃 **感冒**

一男寒熱ノ虫衝上痰多尿黄大便結脉弦實此湯加青皮枳榔

香附木香生姜ノ傷寒脉屋漏ノゴトクナルニ此湯ヲ用テ愈

**傷寒**

柴胡桂枝湯 七十二 柴胡 八分 桂枝 芍薬 二 生姜 大棗 各三分 半夏 六分 甘草 二分 人参

芍薬 生姜 大棗 各三分 半夏 六分 甘草 二分

右九味以水二盞四分煎取一盞二分去渣温服四分 此本方ノ

量ナリ九味合ノ三五四分ニ水ニ杯四分ハ二合四分ナリソ

レヲ一合ニ勺ニ煎ス此モ時方ニ隨ヒ右三五四分ヲニツニ

分チ一々七分トノ水ニ杯入一杯ニ煎シ三度ニ用ベシ一杯ハ大抵一合入りノ茶碗ナリ

此方本論ヲ按ズルニ太陽少陽併病ノ茶ナリ傷寒ニ合病併病ト云フカアリ此ハ餘程ムツカシキ一ニテ傷寒論ノ上デナケレバスマヌナリ畢竟ハ太陽ノ症モアリ少陽ノ症モアル症ニ用ル茶ト意得ベシソレナゼナレバ桂枝湯ト小柴胡湯ヲ合方ニシタ茶ナリ傷寒モ感冒ニモ此方ノ用タキ症ガ太分アルモナリ前ノ小柴胡湯ノ條ヲ見ヨ小柴胡湯ニ加桂枝或加麻黄桂枝方ガヒタモノアル皆此方ヨリ出タルモノナリ小柴胡湯半表半裏ノ症ニ太陽經ノ表症モ兼テアル病ニ用ル茶ト合点ノ少シヅ、ノ加減ハ極タル一ハナシ近世ノ流行茶ナリ金匱ニモ外臺ヲ引テ心腹卒中痛者ヲ治スト云本論ニハ發熱微

寒微嘔支節疼心下支結ニ用ル其外用井方上編ニ述ル如シ参考スベシ

傷寒

柴胡桂枝乾姜湯

七十三

柴胡 八分

桂枝

乾姜

黄芩

牡蛎 各三分

瓜蒌根 四分

甘草 二分

右七味以水二盞四分煎取一盞二分去滓再煎取六分温服二

分本方刻合ノ分量ナリ七味合メニ幾六分ニ水ニ合四勺入一合ニ勺ニ煎シ去滓再煎シ六勺ヲ取り三度ニ用コレモ時方ニ隨ヒ二貼二分チ一幾三分トノ水三杯入一杯半ニ煎シ去滓再煎シ一杯ヲ取り三度ニ用ユベシ

此亦傷寒併病ノ茶ナリ本太陽少陽併病ナレバ前方柴胡桂枝

湯ヲ用テ和解スルハツナリソレヲ医者ガ誤テ發汗ノ薬ヲ用  
テ太陽ノ邪ハ發散シテハ少陽ニ邪ガ殘テ皆マデハ不解  
ホドニ此ハ裏ヘ入ツカト重子テ意得違ヘテ亦下劑ヲ用テニ  
度誤ルソレデ微邪ガ上焦ヘ聚テ胸脇滿微結シ肺氣壅テ小便  
不利ノ渴スサレ氏邪ガ輕キ故嘔逆ハセザルナリ只頭汗出テ  
寒熱往來シ心胸煩熱スルナリ柴胡桂枝ヲ以テ太陽少陽ノ邪  
ヲ去リ黄芩甘草内外ノ熱ヲ除キ乾姜ハ胃中ノ寒飲ヲ主ル括  
蕪根ハ脇上ノ熱渴ヲ治シ牡蛎ハ脇下ノ結ヲ散ズルナリ此傷  
寒誤治ノ薬ナレ氏誤治デ無テモ此ヤウナ病症ガ平生得テア  
ルモノナリ如此ノ症アラバ考ヘ用ベシ右前方ト此方トノ二  
方ハ瘧ニ能クアルモノナリソレデ先輩ガ瘧門ニ撮ノアル元  
來ハ瘧ノ薬ニテハ無シト意得ベシ

此方雜病活用例

**瘧** 金匱ニ瘧寒多ク微熱アリ或但寒不熱モノニ  
ハ柴胡桂姜湯主之即柴胡桂枝乾姜湯ナリ

嘉永七年  
寅八月吉日

醫百療手引草續編一之卷終

江川藏書

醫入自告白  
癸卯年