

丁世汚

早治

血氣

中風

醫癘手引草續編卷二

三河 滕謙齋 烏巢先生 著

三生飲 七十四 易簡

治中風 癘中 不知

人事 口眼 喎斜

半身不遂 咽喉作

聲痰氣上壅 無問外感風寒內傷 喜怒或六脉沉伏 或指下浮盛 並宜服之 兼治痰厥 飲厥 及氣厥 氣虛眩暈 悉有神効 但口開手



富士川文庫
490.9
Ir-6
2

同	同	同	同	門男
同	阿波	大和	南部	越前
堀	渡邊	伊東	前田	尾崎
順伯	玄立	元春	元常	正龍
全	全	全	全	校補
1396				

江川藏書

F 2
1-137

散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

天南星 一兩 川烏 去皮 生附 各半 木香 二錢

右入姜煎温服或口噤不省人事者用細辛皂角為細末以苧草吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進茶痰涎壅盛者每服加全蝎薛立齋每用加人參神妙異於他三生飲一兩加人參一兩

此茶方下二述ル所詳ニ考ヘテ用ベシ中風蘇テ後表症アラバ小續命湯ニ加減痰涎壅盛ノ脉數有熱モノニハ省風湯痰涎嘔逆ニ脉沉厥冷スル者ニハ大省風湯ヲ用テ効アラズ頑痰イヨク盛ニ或轉夕増困重モノニハ此湯主之謙云此ハ中風醒メテ

後用ル合点ナリ卒中風ニモ用ルナリ

○卒中風陰中ハ面色青ク或白ク或黒ク痰喘昏乱シ眩暈多汗甚シキ者ハ手足厥冷ス此症危キ者ハ多ク脱症ヲ見ス此湯ニ倍加人參加竹瀝姜汁詳ニ中編ニ見ヘタリ

此方他病活用例

破傷風

破傷風甚シキ片ハ瘡ヲ發ス此湯加天麻為細末黑豆淋酒ニテ調服ス

中風

星香湯 七十五 治中風痰盛服熱茶不得者

天南星 捌錢 木香 一錢

每服肆錢水一盞姜十片煎七分不拘時温服

此茶方下ニ述ル如ク中風痰涎壅盛ノ茶ナリ畢竟三生飲ノ煙
キ劑ト意得ベシ

此方他病活用例

痰飲

此七中風ニ非スト云ヘ元來痰飲ノ茶ナル故ニ古
下多ク痰涎ニ用井來ル證ヲ考ヘ此ヲ用テ可ナリ

暑 暑途

一症アリ虚人此

肩背痛

本痰飲流注ニ因テ肩背痛ヲナス者ハ
此湯或導痰湯ニテ五苓丸ヲ下スベシ

癩

癩疾此湯加全蝎
三箇下酥角圓

心風

心風者精神恍惚喜怒不常言語時或錯
乱有癩之意不如癩之甚亦痰氣所為也

宜此湯加石菖人參
各半錢下壽星圓

瘧

風痰加
全蝎

攝生飲調蘇合香圓

七十六

治一切卒中不論中風中寒中濕中暑

中風

中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去皮弦細辛生

南星半夏為末吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥ハクイシメル茶者中テアテテ點南

星半夏細辛末并烏梅肉ヲ類ニ茶ヲ自開

天南星

南木香

蒼朮

細辛

甘草生用

石菖蒲各一錢

半夏

百沸湯炮好
類一錢半

右件剉散分二服水一盞半生姜七厚片煎取其半乘熱調蘇合

香圓半丸灌下痰盛者加全蝎二枚灸

攝生飲八星香湯ニ加味ゾ此亦中風痰涎壅盛ノ藥ナリ蘇合香

中風

丸八局方氣門ニ入ル中氣卒倒ノ藥ナリニ方合メ一切卒倒ノ
茶トス此亦一法經驗ノ茶ナリ方下ニ述ル如シ醫門法律ニ出
タリ法律ヨリ前ノ出處未詳愈氏詳ノ謂ヘリ風寒濕暑氣疼飲
ヲ不論一概ニ用之ト云ハ難意得謙云中氣卒厥痰涎壅盛ナル
モノニ可用之若シ陽熱ノ證牛黃圓ノ類ヲ可用症ニ此茶ヲ用
井バ不宜若シ脫症人參三生飲ノ類ヲ可用症ニ用レバ難故

續命湯 七十七 千金 治中風外有六經形證及風痺脚氣

麻黃去根節泡 桂枝 甘草炙 杏仁去皮尖炒研 芍藥酒洗 川芎

防風 人參 黃芩各一錢四分 防已二錢酒洗 大附子炮七分

右作二劑每劑加生姜五片大棗一枚水煎溫服方下ノ主治右從緒論雜方

正傳曰金匱要畧本方金匱古今錄驗 有石膏當飯無附子防風

防已愚按本方金匱ノ古今錄驗 石膏當飯固不可無而附子防風

防已尤不可缺此恐傳寫者之胡簡耳多カンニモ

百二十方加減

精神恍惚加茯神遠志本此ヨリ雲岐子 骨節痛有熱倍芍藥

去附子本症 心煩驚悸加犀角羚羊角本症 骨節痛有寒濕倍加

肉桂附子本症 嘔逆腹脹倍人參加半夏本症 燥悶大便澁去附

子倍芍藥入竹瀝本症 臟寒下痢去防已黃芩倍附子加白朮本証

○自汗去麻黃杏仁加白朮本 ○脚膝弱加牛膝石斛本 ○身疼

加藜朮羌活本 ○腰痛加桃仁杜仲本 ○失音倍杏仁本 ○易老

經云開則漸然寒閉則熱而悶須知暴中。此曰り張易水如減

風邪也宜先以加減續命湯隨症治之。ノ法ナリ開則一開ハ

皮膚ナリ閉モ皮膚ナリ此中風ノ大綱ヲ云。○中風無汗惡寒易水 ○麻黃續命湯主

乏倍加麻黃防風杏仁本 ○中風有汗惡風易水 ○桂枝續命湯

主之倍加桂枝芍藥杏仁易水云已上二症本 ○中風身熱無汗

不惡寒白虎續命湯主之加知母石膏倍甘草去附子友松子云

附之本 ○中風身熱有汗惡風加葛根桂枝黃芩易水云已上二

言本 ○中風無汗身涼附子續命湯主之倍附子甘草加乾薑此症

經中本 ○中風有汗無熱桂枝續命湯主之倍加桂枝附子甘草太陰

風也本 此症少陰本 ○中風之少陽厥陰肢節痛痺不仁

續命湯主之加羌活連翹原用小續命八女羌活則柔二瘧之通

用也瘧 ○產後中風脚氣最為要藥然手足搐搦者當去附子產

中風 ○按不可用多汗者木抵身冷或四肢厥冷而拘急不仁者宜

本 ○一婦二十餘歲產後三十有奇日腰足冷腹痛甚膝屈不伸

脉沉遲加附得奇効

烏巢堂

續命湯

此方方下ニ述ル如ク中風外六經ノ形症ヲ見ス者主之千金方
ニ出タリ然ルニ此ニ載スル所ハ千金方小續命湯ト稱スルモ
ノ三方アリ其中ニテ始ノ一方ナリ方後ニ載スル所正傳ノ考
ハ本方ト指スモノハ金匱要畧ノ古令録驗續命湯ナリ此ニ載
スル小續命湯ト合ノ一方トスル合点ナリ尤理ニ於テ至極セ
リト云ヘ凡金匱古令録驗續命湯并ニ千金方ニ載スル所ノ續
命湯大續命湯西川續命湯ノ類方下ノ主治各異ナリ先ツ大抵
方下ノ主治ト病症ヲ考ヘテ用之之恐ラクハ古人ノ意ニ不背ベ
シ其上ニ自分ノ意得ニテ正傳ノ方ナリ凡其外先輩ノ説ニ從
テ可ナリ凡千金ニ奉ル續命湯ノ類方十方斗アリ参考スベシ
○吳氏方考ヲ按スルニ麻黃杏仁ハ麻黃湯ナリ桂枝芍藥ハ桂
枝湯ナリ中風ノ病太陽ノ外邪ヲ兼ル者宜用之人參甘草ハ四

君子湯ノ二ナリ芍藥川芎ハ四物湯ノ二ナリ氣虛血虛ノ者必
用之風淫ニハ用防風濕淫ニハ用防已陰淫ニハ用附子陽淫ニ
ハ用黃芩蓋シ病單ニ不來雜揉ノ至ル故ニ其藥ヲ用ユルモ亦
如此兼子該ルナリ方考加減熱者去附子用白附子筋急語遲脈
弦者倍入參加薏苡當歸去黃芩芍藥以避中寒煩燥不大便去附
桂倍加芍藥竹瀝日久大使不行胸中不快加枳殼大黃語言蹇澀
手足攣掉加石菖蒲竹瀝口渴加麥門瓜蒌天花粉身痛發熱加羌
活煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃舌燥加石膏去附桂
○此方中風外來ノ邪ニ因テ六經ノ症アルニ用ユ然ルニ後世
中風ハ皆內傷ヨリ起ル類中風ニテ續命湯ノ症ハ希ナリ故ニ
此方ヲ中風ノ首ニ奉ルト云ヘ凡用ル丁希ニノ痰ニハ痰藥ヲ
用井氣ニハ氣藥ヲ用井火ニハ涼藥ヲ用井氣血ノ虛ニハ補藥

ヲ用ユ此方ハスキト不用ヤウニナリ來レ此方元來中風ノ
妙方六經ノ邪雜ノ中リ内ニ人參當飯桂附アテ補内尚雲
岐子等カ加減ノ法アリ臨症考ヘ用ベシ

○萬全保命歌括云予主以小柴胡合桂枝湯以代續命湯者小柴
胡乃足厥陰少陽之藥桂枝湯又治中風自汗之症藥也

○張璐云中而口眼喎斜先燒牙皂烟薰之以逐外邪次燒乳香薰
之以順血脉若前症多怒此風動肝氣宜小續命加羚羊角煎湯去

附子加藜朮恍惚錯語加茯神遠志不得睡加熟棗仁不能言加竹
瀝脈虛無力去麻黃加茯苓

○又云肥人舌根強硬作濕痰治瘦人舌根強硬作心火治雖病久
正虛不可純用補藥壅滯經絡中之痰火若飲食如常但失音不語

俗呼啞風小續命去桂附加菖蒲真中心經啞不能言口開面赤者

必死勿治

此方他病活用例

瘧

瘧病頸項強リ頭換面赤ク目赤足冷ハ腰寒ク頭搖背
反張口禁交牙手足攣縮通用剛瘧去附子柔瘧去麻黃

黃耳

瘧

八耳中痛三耳輪黃色交然トノ惡寒發熱脊強リ背直瘧病ノ狀
ノ如シ此太陽ノ類傷寒ナリ荆防敗毒散去人參甚キ片ハ此湯
去附子加白附子蔓荆殭蚕天麻外ニ苦參或

腰痛

風痛ハ脈浮或
左或右痛三定

瘧

骨碎補ヲ以テ水ニ磨ノ耳中ニ入ル、ナリ

同

風虛ニハ此
湯加桃仁

欬

換嗽此音多ク服寒藥
声イヨク不出七ノハ

古今錄驗續命湯輕キ片ハ消風散去
強蚕蟬脫加桔梗薄荷以姜汁調服ス

同

欬逆只伏ノ不能卧上気
面目浮腫ニハ古今錄驗

續命湯氣盛二脉
滑實者二ハ勿用

脚氣

日久少枯細或寒或痰或痛ニ或痺ニ或一
脚偏患如偏風此湯加木瓜或獨活寄生湯

眩暈

頭風眩暈用補劑イヨク甚ク外ニ失血ノ
症ナク亦病後ニ非ズンバ此湯加全蝎

大便閉

其人本有
風症モノ

ハ亦多ク秘結ス此湯
去附子倍芍藥入竹瀝

中風

大養花湯七十八
機要

治中風手足不能運動舌強不能言語風邪散見

而不拘一經者ハハラ

秦艽 石膏生 當歸酒洗 芍藥酒炒 羌活 防風 黃芩酒炒 生地

熟地 川芎 白朮酒炒 白芷 白茯苓 獨活各 細辛 甘草炙 五分

右加生姜二錢水煎服

此方法法機要ニ出タリ方下ニ主治云中風外無六經之形證内無
便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜
養血筋自榮云今此ニ載スル方下ノ主治ハ吳崑方考ノ主治ナ
リ方ハ同ノモト治ハ異ナリ此ハ原方ノ主治ヲ吳崑變易ノ方考
ニ載スルナリ是ニツイテ面白キ意味アリ先ツ活法機要ノ主
治ノ意ハ中風外六經ノ症アレバ小續命湯ノ類ヲ用ユ内便溺
ノ阻隔アレバ三化湯ノ類ヲ用ユ然ルニ表症モナク裏症モナ
ク只血虛ノ不能養筋ソレユヘ手足モ不自由ニアリ言語モソ
レデモノ云フナラス者ニ用テ其血ヲ養ヘバ筋自榮テ右ノ
病ヲ治スト云合点ナリ此意ハヨケレ所方ヲ考ヘテ見レバ不

マ又コアリ俞嘉言此方ヲ評議云養血筋耐ヲ采スルト云サ下
ニ方中ヲ見レバ風燥ノ菜ヲ用ル丁多シ血ハ静ナルヲ以テ養
フモノナリ何ゾ以風菜動之然レバ方ト方下ノ主治ト悖レリ
信用成難シ此湯亦愈風湯三化湯ノ三方ハ通慎子ガ撰ブ所ト
云ヘリ通慎子不知其姓名無名ノ下士ト見ユルト云此不審尤
ナリケ様ナレバ此方ハ信用難成方ト思ハル、然ルニ吳氏方
考ヲ見レバ此書ニ載スル如ク方下ノ主治ヲ變易シタリ中風
手足不遂舌強不能言ハ風邪散見ノ不拘一經者主之ト云テ血
弱不能養筋ト云主治ハナシ此ヲ友松子評云吳氏ガ方下ノ主
治ヲ變易スルハ此方ヲ制スル人ノ骨折ヲ惜ンデ其方ヲ助ケ
テ方下ノ主治ヲ變易シタルモノナリト云謙云此評至極至當
ナリ此古來經驗ノ方ナリ故ニ諸書ニ載之然レモ活法機要

ノ主治ニ從ヘバ方ト方下ノ主治ト相違ノ難用吳氏方考ノ主
治ニ從テ用レバ成程ヨキ方ナリ手足不遂言語不自由ナルハ
風邪ガアメリツヨイ丁テモナク微邪ガ諸經ニ散在ノ此經ニ
在ルト極リモナイツレユヘ補血ノ菜ニ風菜ヲ加味シタルモ
ノナリ此合点ニテ此方ヲ用ベシ本邦老医ノ傳ニ血虚ノ中風
脈浮大數ナルモノニ用之トアリ謙云脈浮大數ハ發症ニ屬ス
方中ニ石膏生地黃ノ寒菜アリ尤ナル丁ナリ脈浮大數ナラサ
ルモノニハ用ル丁ナカレ

○先輩云古大秦苳湯ヲ用并今十全大補湯ヲ以テ代^{カフ}之ト云此
說諸書ニ載ス医通ナドニモ如是アレモ此說ハスキト信用成
難シナセナレバ此方ハ冷補ノ劑ナリ大補湯ハ温補ノ劑ナリ
何ゾ冷補ノ藥ノ代ニ温補ノ菜ガナルベキ様ナシ不可用

此方他病活用例

眩暈 老医傳云時々眩暈スルハ中風ノ前兆ナリ用此湯可防之
云ヘリ謙云眩暈ノ症外ニ中風ノ目當以シテモ有テ脈浮
大數ナル者ニハ可用之只眩暈アル程ニ中風ノ前兆
トノ此湯ヲ用ヨト云ハメツホウカヒナルナリ
加味大補湯 七十九

中風 黄耆蜜炒 人參 白朮 茯苓 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒
熟地各 沉香 附子 木香各 烏藥 牛膝酒洗 杜仲酒炒
木瓜 防風 羌活 獨活 薏苡各 肉桂 甘草各
右劉劑 姜枣煎服 ○中風手足癱瘓口喎語澀等症属血虚而

火盛者宜清補也 當作温補

此方回春中風門ニ出タリ主治回春ヲ宜考老医傳云此方ハ本
方ニ附子ナドヲ加テ用ベキ症ニ此方ヲ用テヨシタトヘハ本
方ヲ用テ茶ナヅミズト云凡此方ヲ用ベシナゼナレバ本方ニ
順氣疎風ノ茶ヲ加味スルユヘ其効本方ヨリ勝レリ經驗ノ方
ナリト云ヘリ成程尤ナリ雖然虚甚キ者ニハ本方或本方ニ加
附子用ベシソウメ後此方ヲ養生茶ノ様ニソロク用テ効ヲ取
ルベシ若シ虚甚キ者ニハ最初ヨリ此方ヲ用テハ補力不足ナ
リ症ニ臨ンデ了簡スベシ

中風

疎風湯 八十 治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春初夏宜

- 服 麻黄三 杏仁 益智各 甘草 升麻各

續編二風 烏巢堂

中風

右每服五錢水一小碗煎至六分去渣温服但冬月忌服
 此方温菜ヲ用ベキ症ト云ヘ氏時節季春初夏ノ時分ナレバ桂
 附ノ類ヲ用ラレヌ又丁ガアルモノ其時此方ヲ用ベシサレ氏症
 ニ因テ不可拘之友松子治一老人夏月納涼一夜檐外ニ卧シ外
 邪ニ中テ中風ヲ発ス小劑ノ十神湯ヲ一晝夜ニ貼餘リ用テ
 得効謙謂ヘリ此小續命湯ヲ用ベキ症トイヘ氏夏暑ノ時節故
 十神湯ヲ用テ續命湯ニ代ルナリ小劑ヲ用ルハ老人故大劑ニ
 不堪ヲ恐レテナルベシ即此湯ノ方下ニ季春初夏ニ用テ冬月
 ハ不可用ト云意ニ倣フモノナルベシ
 省風湯八十一 治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉
 抽搐疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭自眩重胸膈煩滿左癱右瘓手

中風

足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤應一切風證可
 預服之 防風 南星 半夏 黃芩 甘草 右咬咀
 每服四大錢用水二大盞生姜十片煎至一中盞去滓温服不拘時候
 此方主治方下ノ如シ痰涎壅盛脉數有熱モノニ用ベシ
 大省風湯八十二 治中風痰厥涎潮昏運手足搐搦半身不隨及
 歷節痛風筋脉攣急並皆治之

南星 防風 獨活 附子 全蝎 甘草
 右咬咀每服四錢重水二大盞生姜二十片煎至八分去滓温服

不拘時候日進二服

此方主治方下ノ如シ痰逆嘔泄ノ脈沉厥冷スル者宜用之按ニ省風湯ハ寒劑ニ屬ス大省風湯ハ熱劑ナリ全蝎ノ性下ノ正舌散ノ辨ニ見ヘタリ

中風

滌痰湯 八十三

治類中痰迷心竅

導痰湯加菖蒲人參竹茹

此方痰迷心竅トハ痰ガ心藏ノ竅ニ塞リ迷テ昏憤ト心ガクツクラニナリ口噤不能言語モノニ宜用之熱アルニハ加黃連黃芩竹瀝姜汁

中風

秦艽升麻湯 八十四

治中風口目喎斜

升麻湯即升麻加秦艽人參桂枝白芷防風葱白

此方ハ手足陽明經ノ虛風ニ乘出ラレテ口眼喎斜不能言語風寒ニ遇ヘバ四肢拘急脈浮ニノ緊ナル者ニ用之或云何ノ故モナキニ口ノ喎ムトアリ外ニカハリタルトモナキ者ニ此方ヲ用ベシ惣ノ外ニ何ノ病モナクテ口ノ喎ムトサイクアルモノナリ此モ中風ノ類ト見ユル大方ハ某ヲ用テ愈ルモノナリ面ニ灸ナドスルモヨイゾ但シ二十ヨリ内ノ者ガフト口ノ喎ム者アリ此ハ死又ルモノナリ兼テ知ルベシ

中風

正舌散 八十五

治驚痰堵塞數墜肝熱生風舌強不正

蠅尾 去毒滾醋 泡炒三錢

茯苓 一兩 姜汁拌曬

臣等奉旨... 續編二風

為散每服二錢温酒調服并擦牙觀日三度○面赤倍蠟尾加薄
荷半兩每服四錢水煎熱服取汗効

此方舌強不能言語者二用方下二驚痰ト云(下字)意ヲ付へ
シ全蝎ハ厥陰風木諸風掉眩及小兒ノ驚搐ニ用ル要茶ナリ左
半身不遂口眼喎斜言語澁リ手足抽掣スル者用之

中風

資壽解語湯 八十六 醫通

治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風 天麻 煨切姜 附子 炮各一 東仁炒研二
汁拌焙 各五分

羚羊角 鑊 觀桂 羌活 各八分 甘草 炙五分

水煎入竹瀝半杯姜汁數匕服無時脉虛加人參

此方諸書ニ載ス出處未詳主治方下ニ云如少脾緩舌強不語半
身不遂者ニ用ユ或中風ノ漸ニ言語アレキヤ又中風後ドコモ
カモヨケレモノイヒアレキト云ニ用テ利ヲ得ルナリ外ノ
一二用ル藥ニテハナイ一味クニ考ヘハ入ラ又其上一方ノ取
合せ通例ノ方ニテハナイ一味ツ、穿議スル藥トハ三ヘ又方
中ニ桂附ガアレバ温劑ト意得テ用ベシ羚羊角ガ一味寒劑ナ
レバ惣体テ温補ノ劑ナリ隨分經驗ノ方ト三ユル舌モツレ半
身不遂症ニ
ハ必用ベシ

中風

地黃飲子 八十七 宣明

治腎氣虛弱舌瘖不能言足痿不能行

熟地 巴戟 山菜 酒 肉蓯蓉 酒 洗 石斛 附子 炮 五味子

續編二風 十三 烏集堂

白茯苓 石菖蒲 遠志 官桂 麥門各等 右姜煎服

此方方下ニ云如ク腎虛ニ因テ不能言語足痿テ步行セザルニ
用ル菘ナリ腎脉ハ舌本ニ至ル一味ツ、穿鑿ノ見レバ皆補腎
ノ菘ナリ麥門五味子遠志石菖蒲ハ心肺ノ菘ナリ河澗ノ制ハ
多クハ寒涼ノ劑ナリ此方斗温補ノ菘經驗ノ方ナリ故ニ諸書
ニ無不載之ヲ

中風

升麻胃風湯

醫通 八十八

治胃風能食手足麻瞽目瞶面腫

升麻 當皈 白芷 葛根各分 蒼朮制八分 麻黃 藁本

羌活 草薢研 蔓荊研各四分 柴胡 黃蘗姜制各三分 甘草炙五分

右生姜三片大棗一枚水煎食遠服

按風入胃府大便清血四射用人參胃風湯之桂芍祛之內散風

入胃經目瞶動而腫者用升麻胃風湯之升葛麻黃輩祛之外

散不可不辨

此方風胃經ニ入テ手足シビレ目ビクツギ面腫ル者ニ用ユ
方後ニ風胃府ニ入ルト胃經ニ入ルトノ訣ガ云テアル能々考
ヘ見テ方下ニアル病ニ用ベシ此亦切々アル症也兼テ可意得

中風

犀角升麻湯八十九 医通

治風熱頭面腫痛頰上如糊咽喉不利

犀角鎊五分 升麻二分 防風 羌活各一分 白芷 黃芩 附子各一分 甘草炙

水煎食遠服

中風

此方亦前方ト似タル茶ニテ陽明經ノ風挾面腫ニ用ユ
此方ハ腫レテ痛ミ頰上ガ糊シタヤウニ強ルトアルガ前方ト
異ナリ兼テ咽喉不利ヲ治ス

舒筋三聖散九十
医通

治口眼喎斜左急右緩血脉受邪者

當歸

肉桂

延胡索

各等分

為散每服五錢水煎去滓早暮各一服

此方中風口眼喎斜左へ引キツケ右ハ緩ムニ用ユ此症風血脉
ニ中リ營血不行モノニ用ユ當皈肉桂營血ヲ温補シ且ツ行ラ
ス延胡索血滯ヲ運ラス九榮血冷滯ノ症ニハ中風ニ非ズトイ
へ氏此方ヲ用ベシ病ニ臨ムノ活法加減ハ医者ノ意ニアリ

中風

參歸三聖散九十一
医通

治風中血脉左半肢廢口目左喎

舒筋三聖散去延胡索加人参○風中血脉急需流布營氣營

行脉中便不當泛用風茶所謂血行風自滅也至於左半肢廢氣

血不能運行延胡耗血胡敢輕試必藉人参引領當皈肉桂何慮

虛風之不散乎

此方左半身偏枯シ口眼左へ引ツクルニ用ユ方意大抵前方ト
同シ其中ニ延胡索ノ耗血ノ藥ヲ去リ人参ヲ用テ當皈肉桂ヲ
引ツレテ榮血ヲ温補ヌ方後ノ按ヲ詳ニ熟覽スベシ或前方ト
合方トナシ或先ニ用前方次用此方モ有ベシ活法時ニヨルベシ

中風

沉香天麻湯 九十二

寶鑑

治因恐懼發癇病搐搦痰涎有青目多白睛

強項背一時許脉沉微而急方醒後每見皂衣人即發多服犀角

牛黃龍腦麝香鎮墜之茶已四年餘此證尚在又添行步動作神

思如痴先灸兩躡各二十七壯次服此茶

羌活五錢獨活四錢天麻 防風 半夏 附子各沉香

川烏頭各當皈 白姜蠶 甘草各一

右入姜煎服○百二十方曰救癲癇壞證之劑○一人足厥冷則

有小腹羞上心胸物怔忡或膈塞而心中沉困煩悶如欲絕或食

遲則無力生眩暈心如乘舟車久與此湯而安○男子下血或痢

婦人產後脫血多失血後有此證四物湯不効則與此湯而可若

蟲出加川練子棋榔

此方羅謙甫時小兒モノ驚キノ癇症ヲ發レソレヨリダシク

方下ニアル如クノ癲癇病トナルニ謙甫此方ヲ制メ用テ愈エ

癲癇通治ノ茶トハ三ヘヌソレヨリ先輩癲癇ヲ治スル主方ト

ノ諸書ニ多ク載之友松子此方ハ癲癇通用ノ方ニ非ズ然ルニ

一擬ニ此方ヲ以テ癲癇ノ主方トスルハ誤リナリレテ寧ニ辨

之尤至極ノ義ナリ然ルニ百二十方ニ癲癇ノ壞症ニ用ルルハ

何様用ル_レモアルベシ能キク薬ト三ツルサレ_レ壊症ニモ
口_レア_レハ此亦一概ニ可用ト云モ非ナリ

○本邦老医傳云此方ヲ中風ニ用テ宜シト云ヘリトツテモ方
イ_レノ様ニ思ヘ_レ茶味ニ意ヲ付テ見レバ成程中風ニ用ベキ
方ナリサレ_レ目當ナシニハ用ラレ又方下ニ癩症神志如痴ト
アリアホウノ様ニナリタル症ニ用ルト見ユル中風ノ目當モ
此ト同シ中風ニテアホウノ様ニナリタル壊症ニ用ベシ故ニ
癩癩門ノ薬ト云ヘ_レ此書ニハ中風門ニ攝入スルナリ

此方他病活用例

癩

右ニ記_ス又如ク癩癩_ノホウノ
様ニナリタル壊症ニ用ベシ

風痰

友松子云予ガ蚤年ノ学業
ノ師此方ヲ用ルニ枳實南

星茯苓連梔子ノ六品ヲ加ル_レアリ其所以_レ問ヘ_レ巴苕云乃

風

啓迪翁ノ法ナリ沉香天麻湯ハ治風痰清心導痰湯ハ治痰火若
シ風痰ニ失_フ兼テ潤熱者ハ合_シニ方_ヲ以_テ投_之此用權ノ法ナリ
天麻丸九十三 治腎藏虚熱生風

天麻 二味酒浸 牛膝 二味酒浸 川草薺 黑參 羌活 各 杜仲 酒炒

附子 炮 當歸 十 生地 酒浸焙 為末煉白蜜丸侵晨沸湯臨臥

温酒送_ス七十九 ○方中雖以歸地補養陰血為君其妙用全在天

麻與牛膝同浸同焙俾風痰濁濕咸從下趨而不敢上逆得力又

在附子之雄引領歸地直入下焦填補其空使風邪無復_レ之慮

草薺杜仲以祛_レ在裏濕熱羌活黑參以疎_レ在表風熱標本合法育

法斂散各得其宜此方具矣

此方潔古家珍二出夕リ奇方ト見ユルソレ故諸書ニ皆載之方
下ニ所謂腎藏ノ虛熱生風ト云ハ病因ナリ其病狀ハ云ズ諸君
ヲ考ヘ見ルニ病因ハ言テ病狀ハ無シテ様ノ病狀ニ用ルト云
了知レ子バ目當ナニ衛生寶鑑ヲ按スルニ預防中風ノ茶トア
リ凡預防中風ノ茶ハ此ニ不限愈風湯ナドデモ中風總司ノ茶
ナリソレデコニカニ脉症モ云テナイ此茶モ預防中風ノ茶ト
アレバ中風總司ノ茶ト意得ベシ方後ニ医通ノ發明ヲ載ス脉
症ハ云テ無レ凡濁痰濕熱ヲ利シ下焦ヲ補フ茶ト云ヘリ此ヲ

中風

搜風順氣丸 九十四
目當トスベシ
聖惠

治腸胃積熱大便結燥小便赤澁此藥先通

氣血清熱潤燥通利大小便

車前而檳榔 麻子微炒去牛膝酒山藥 枳殼土防風

獨活各山茱萸酒郁李仁去壳大黃各五錢蒸

右為極細末煉蜜梧桐子大每服二十九丸温酒下如覺大腸微動

以羊肚肺菱補之膏梁之人大便結燥者常宜服之庶免風秘老

人虛秘最宜○保命歌括曰予主以小柴胡合桂枝湯以代續命

湯者小柴胡乃足厥陰少陽之藥桂枝湯又治中風自汗之症葉

也經云肝病者大小便難搜風順氣丸以代三化湯者所以治風

痺之病也以十全大補湯代大秦花湯愈風湯者取其養血益氣收大補十全之功也

方下ノ主治ニ云如シ他病ニ用ル丁ナニ中風ノ膏劑ナリ方後ニ保命歌括ヲ載ス詳ニ見テ参考スベシ其ウチ大補湯ヲ以テ大秦花湯愈風湯ニ代ルト云ハ非ナリ其訣大秦花湯ノ下ニ辨ス

中風

牛黃清心圓九十五 治初中痰涎壅盛昏憤不省語言蹇澀瘳不

遂一切痰氣閉塞醫通 牛黃 羚羊角物經火 白朮生 茯苓

桂心 當歸 甘草各 麝香各 雄黃鍊水飛 龍腦詳人參

犀角各 右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十九

金箔為衣待乾蠟護臨用開化沸湯養湯任下原方尚有防風黃芩麥門白芍柴胡

桔梗杏仁芎藭阿膠大豆黃花蒲黃神麴白薇 乾姜薯蕷大棗一十六味因大冗雜故去之

牛黃清心圓清心牛黃圓至寶丹蘇合香圓中風卒倒ニ用ル辨別各施ス所アリ中風初起痰涎壅盛昏憤不省人事語言蹇澀瘳痰不遂一切痰氣閉塞者用牛黃清心圓此忘口角流涎煩熱氣急熱痰甚者用清心牛黃圓右ノ二方ハ痰閉ノ証ニ用ル茶ナリ若寒痰互ニ結シ痰氣壅盛スルニハ至寶丹前ノ牛黃圓ノ二方ハ寒劑ナリ至寶丹ハ寒痰互ニ用ル方ナリ已上三方ハ中風閉症ノ禁ナリ又中氣ノ忘卒倒昏迷不省人事有痰無痰俱ニ用蘇合香圓利氣則痰自去ル蘇合香圓ハ溫劑ナリ痰疾ノ忘ニハ不可用之然ルニ令時此忘ニ用圓茶者多クハ無此辨任手用之或只

用蕪合香圓一棊救之謙按二今時見卒中人中氣者多二故用蕪
合香圓一方救之トイヘ氏誤不多况ヤ上ニ述ル攝生飲ニテ調
化ニ用之則一切卒厥ノ症皆以治之法アリ雖然此方誤ニ扱
ニ用之則取誤必セリ如脫症則參耆附子ノ外諸ノ香竇ノ劑不
可用ト令更不及言ナリ右所舉ノ四方ノ辨ハ中風ニ用ル意得
ナリ他病ニ用ルニハ一方ノ主治有之各方下ニ記ス

○喻子容續醫統ヲ按ニ牛黃清心圓ノ原方ハ黃芩麝香龍腦麝
羊角犀角雄黃蒲黃牛黃金箔ノ九味ナリ局方所載ハ二十九味
ナリ右九味ヲ除テ殘ル二十味ハ局方補虛門ノ山芋圓ナリ誤
テ以ニ方為一方モノナリ是老醫ノ傳也ト云ヘリ此說ニ從ヘ
バ原方ハ右ノ九味ナリ今此書ニ所載ノ方ハ從醫通與金箔共
ニ十三味ナリ殘ル十六味ハ以張碩碩之意去之ト見ユル續醫

統ハ老醫傳來アリト云張碩碩ノ方ハ傳來ナシ然レバ續醫統
ニ從ベシト云ヘ氏續醫統ノ九味ヲ按ニ黃芩蒲黃火ヲ清シ牛
黃羚羊角風ヲ驅リ犀角雄黃毒ヲ解シ龍腦麝香開キ金箔
鎮固ス其棊純ニノ峻ナリ其功モ疾カナリトイヘ氏元氣充實
ノ人一時暴邪ニ中リタル者ニ用テ可ナリ元氣虛弱ノ人ニハ
難用トアリ不知原方者ハ受局方ノ誤ニ方合スル方ニ從フ也
和漢數百年ノ間用來テ相應ニ驗アリト見ユル原方ノ峻ナル
ニ山芋圓補虛ノ棊ヲ合メ棊勢和緩ナルハ過チノ高名ト云モ
ノナリ本邦亦用之ヲ尚矣竹由ノ牛黃圓或初ヨリ去牛黃用井
ス名ハ牛黃圓ト銘スル傳アリ何モ相應ニ効アリ以此考之ニ
牛黃羚羊角犀角龍腦麝香金箔雄黃ハ無クテ叶ヌ棊ト見ユル
其外ハ定タラハ無レ氏若シクハナイ也見ユル碩碩ノ此方ハ

中風

右七味ノ外ニ白朮茯苓桂心當歸甘草入參アリ續醫統ノ方ハ
 右七味ノ外黃芩蒲黃アリテ九味ナリ碩頑ノ方ヨリハ峻ニ見
 エル二十九味ノ方ハ緩過キテ病甚キニハ難用然レバ碩頑ノ
 方傳來ヲ云ズトイヘ凡中正トメ從ヒ用ベシ次ノ方清心牛黃
 圓モ其傳來知ラズ又他書ニテモ未タ見ズ碩頑ノ此ニ方共ニ
 傳受スル所アリト見ヘタリ然レバ弥信ノ可用之
 ○此方卒中風一切痰氣閉塞小兒ノ驚癇ニ用之
 ○此方俗云氣ツケニ用ユ其
 ウチ有痰喘ヲ目的ニスベシ

清心牛黃圓

九十六
醫通

治暴中神昏不語痰塞心包口角流涎煩熱急

急一切痰熱閉過證

西牛黃

陳膽南星

黃連

中風

此方出處未詳ト云ヘ凡傳來ノ方ト見ヘタリ比前方トキハ又
 ヲ峻劑ナリ前方ノ證暴卒ニノ熱痰甚シキ者主之

當歸 炙各三 辰砂 五錢 為極細末蒸餅和勻分作
 五十九丸金箔為衣候乾蠟護臨服音開生薑湯薄荷湯人參湯量
 虛實選用調化服

至寶丹

九十七
醫通

治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交錯者

生烏犀角

硃砂

雄黃

生玳瑁

琥珀

麝香

龍腦

金銀箔

西牛黃

安息香

中風

飛過瀝去沙土約取淨一兩微火
熬成膏如無以蘓合香油代之
勻將安息膏重用湯煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護臨服
剖開參湯調化二丸卒中山嵐瘴氣
入姜汁化服 產後惡血攻心
瘴氣 及產後惡血攻心童便

此方方下二述ル如之寒痰相交ル閉症二用之其外他病二用ル
例諸書ニ出ス今今ク不知覺
他日詳ニ考ヘ副書スベシ

蘓合香圓 九十八 治傳屍瘞瘵心腹卒痛僵仆不省一切氣閉屬寒

證 蘓合香 別研白 安息香 無灰酒熬飛去 薰陸香 別研
色者 砂土各二兩

龍腦 別研 丁香 麝香 別研勿經 青木香 白木

沉香 別研 香附 炒 烏犀角 鈔屑研 右十一味為末逐

一配勻諒加煉白蜜和劑分作五十九別以硃砂一兩水飛為衣

蠟護臨用剖開并范水生薑湯温酒化下一丸 原方有白檀香草

太濇燥故去之。蘓合香圓取諸香以開寒閉僅用犀 李士材曰

角為寒因寒用之嚮導與至寶丹中用龍腦桂心無異

牛黃圓蘓合香圓皆中風門中奪門之將而功用迥異熱阻閉竅

用牛黃圓開之寒阻閉竅用蘓合香圓開之若夫口開手撒眼合
聲軒自汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘓

合之菜入口即斃也

此二載ル所ハ張碩頰加減ノ方ナリ然レ此方ハ不限中風他病
ニ用テ多シ局方ノ原方ニ從テ可ナリ卒中寒閉ノ症ニ用ル方
ナリ丹溪纂要云中氣身冷渴ノ無痰涎者許學士以此丸灌之又
戴元禮云能治風者利氣氣順則痰自消先以麻油調此丸用之或
姜汁或小續命湯ノ煎湯ニテ用之或五積散加麝香少許以用此
丸小青囊云此丸合青州白丸子服之然レハ中風中氣俱ニ用此
丸之例從先輩有之元來痰痰甚者用之則即時ニ害アルベシ急
ナル場ニテ見分ニクキナレレ隨分意ヲツケ見分ベシ先ツ
木抵面色赤息麤ク手足ヲ握リ搖擲ノ氣味アリテ痰涎ツヨキ
ハ痰痰ト知ベシ其外臨時色々ノ目當アリ中氣ナレバ脈ハ動

急ナルモノナレバ中風ノ寒熱ハ脈斗ニテハ知ヌモノナリ

此方他病活用例

破傷 破傷風角弓反張ニ防風散ヲ下之防風藜朮独活麻黃半夏

風 各二兩升麻防己白朮石膏芍藥黃芩甘草當歸遠志人參各

一兩名 破傷風ハ因皮肉曾有破傷處風從瘡口入其証項強牙

防風散 同 閉緊狀如發瘧不似中風又似產後角弓反張用藶合香

圓進防風 傷暑自汗手足厥 中暑為証面垢悶倒昏不知人冷

散玉真圓 暑 冷者六和湯下之 汗自出手足微冷或吐或瀉或喘

或滿切不可以冷水及用十分冷劑 瀉瀉兼作未 霍乱 六和湯倍

以來復丹末同藶合香圓用湯調灌 透者宜上法 藶香調下

之 泄瀉 泄瀉腹痛有積或無積 積聚 氣作痛心腹ノ間ニ遊走或

五苓散加水香下之 雷鳴或已成積或未成聚者

以全蝎四枚為
煎湯下此圓
三小烏沉湯計
下此圓トアリ
小兒吐此圓合
瀉黃疸平胃散
驚風
小兒畜痰因氣鬱驚風搖擲
者薄荷煎湯入姜汁下此丸
大便大便不通此
閉圓加巴豆炒
合青州白丸子
隔噎二八此圓二

因跌撲損傷吐血者黑神散合小烏沉湯加童
便送下此圓痰血入腹吐血者亦宜此法醫通

脚氣脚氣衝心痛六此圓
加草麻子足心張ル
隔噎合青州白丸子

小兒吐此圓合
瀉黃疸平胃散
驚風
小兒畜痰因氣鬱驚風搖擲
者薄荷煎湯入姜汁下此丸
大便大便不通此
閉圓加巴豆炒
合青州白丸子

治中風不語舌不能言九十九
遠志甘草水泡
不拘多少為末鷄

清調敷天突咽喉前心三處効
如方下

加味豆淋酒百
摘要治一切中風中氣中濕手足癱瘓瘰癧及產後血
少筋不榮身體疼痛等證
黑豆擇大者一
升炒香
當歸
川芎

中風

中風

蒼朮 紅花 牛膝 薏苡仁 羌活 防風

姜蚕各八
右鹿剉與黑豆同入瓶內無灰酒二升拌浸封
固置于密室春夏五日秋冬七日取出去渣每服一小鍾自然有
功效○愚按此方先師家傳之方也老人腰膝疼痛產婦血弱孳
痛等亦用之而穩當
如方下

子癩
羚羊角散百一
治姪娠冒悶角弓反張名日子癩風癩
羚羊角獨活
酸棗仁炒五加皮
薏苡仁炒
防風

當歸酒
川芎
茯苓
杏仁各五
木香
甘草各二分

子癩
羚羊角散百一
治姪娠冒悶角弓反張名日子癩風癩

當歸酒
川芎
茯苓
杏仁各五
木香
甘草各二分

續編二 風 二十四 烏巢堂裁

子癩

右姜水煎服

主治如方下子癩ノ症下編ニ詳ナリ

葛根湯百二治妊娠臨月因發風痙悶憤不識人吐逆眩倒小醒復

發名曰子癩

葛根

貝母

牡丹皮

木防己

當歸 川芎

茯苓

桂心

澤瀉

甘草各二兩

獨活 石膏

人參各三兩

右細切以水九升煮取三升

分三服日每令人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻菘菜酢

物

主治如方下

痺

痺

除濕蠲痺湯百三治風濕相搏身體煩疼手足冷四肢沉重

當歸

赤芍藥

黃耆

片子薑黃

羌活各錢半

甘草一錢

生姜三片

紅棗二枚

一有防風

水煎服無時

此方着痺ヲ治ス着痺ハ麻木不仁ス營氣虚スル片ハ不仁ニ衛氣虚スル片ハ不用營衛俱ニ虚スレバ不仁ノ不用當歸芍藥黃耆ハ補營衛羌活ハ去風濕薑黃ハ入手臂止痛方下ノ主治ト猶考ヘ合メ用ベシ痺病ノ補藥ナリ

此方他病活用例

臂痛

臂痛或腫或不腫者痰飲ニ因ル證ノ外ハ一切ノ臂痛宜此湯若シ寒邪ニハ宜五積散

痺

羌活湯百四 治痛風症

羌活

蒼朮

黃芩

當歸

芍藥

茯苓

半夏

香附

木香別研

陳皮各七

甘草分三

右剉一劑姜三片水煎服○風痛加防風木○濕痛倍蒼朮同○

熱痰痛倍酒黃芩加瓜蒌枳實竹瀝同○血虛痛加生地同○上

痛加白芷葳靈仙同○下痛加黃柏牛膝同○痛甚加乳香同○

發熱加柴胡同○小水短潛加木通同○手臂痛加薄桂手○

大抵骨節疼痛加寒熱發腫塊者是濕痰流注經絡與痛風同治

法若醫遲不散則成膿矣外用敷藥痰○一切痛風肢節痛者痛

屬火腫屬濕不可食肉肉屬陽火能助火食則下有遺溺內有痞

塊雖油炒熱物魚麵切宜戒之所以膏梁之人多食煎炒炙燂酒

肉熱物蒸臟腑所以患痛風惡毒癰疽者最多肥人多是濕痰瘦

人多痰火遍身壯熱骨節疼痛者是風寒也痛風

此湯痺症初發二宜之痺症ハ風寒濕ノ三氣ノ雜合スル症ト云

ヘ凡其中ニ此湯ハ風濕熱ニ宜シ加減ヲ考ヘ用テ殊外能効ア

ル薬ナリ方後一切痛風肢節ト云ノ一條此薬ヲ用ル目的ナ

リ此薬初起ル症ニ用ル薬ト云ヘ凡元來此湯ヲ用ベキ症ニイ
口クノ薬ヲ用テ愈カ子ル凡三四十日ニモ及タルニ此方ヲ用
テ愈タル丁アリ一概ニ意得ベカラズケ様ノ丁ハ諸病ニアリ

痺

ア一リ深ク念ヲ入過テ療治ノイヨク重クナリタル症ニ老医
ガ輕キ薬ニテサラリト愈ル丁アリ此傳ヲ受タルモノサイク
アル丁ト意得テ病ノ輕重虚實ヲ不論イツモ輕キ薬ヲ用テ療
治スルモノアリ甚ダ笑ベシサリナガラ此様ナ事アリト兼知ヘシ
此方他病活用例

眼 此方眼病ニ用ル
丁アリ意得ヘシ

靈仙除痛飲 百五 治肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發
動於經絡之中濕熱流注於肢節之間而無已也

麻黃 赤芍 錢各一 防風 荆芥 羌活 獨活

白芷 蒼朮 歲靈仙 片黃芩 枳實 桔梗 葛根

川芎 各五分 歸尾 升麻 甘草 各三分

右劉一劑水煎服○在下焦加酒炒黃柏○婦人加紅花○腫多
加攢柳大腹皮澤瀉沒藥○一云鯀澁數者有瘀血宜桃仁紅花
芍飯及酒大黃微利之

此方痛風肢節ノ痛ヲ目當トスヘシ

痺

通痺散 百六 治風寒濕三氣襲於足三陰經腰以下至足冷如冰

不能自舉

醫方類聚

續編二

烏巢堂藏

天麻三獨活 藁本 當皈 川芎 白木各二

為散每服二三錢熱酒調晨昏各一服○右方用川烏一兩酒煎

製天麻中蒼朮一兩黃檗半兩酒煎製白木中深得二氣襲於陰

經之旨○此方如方下腰方強久冷腰又々ナリタル病ヲ治スル也酒煎

天麻汁二烏頭二兩浸酒煎白木汁蒼朮二兩黃栢半兩浸用ル

痺

三痺湯百七 醫通

治風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣

人參 黃耆酒 白朮 當皈 川芎 白芍 茯苓各一

甘草炙 桂心 防己 防風 烏頭炮各五分

細辛三 生姜三 紅棗二

右水煎不拘時熱服○此方改定三合保元湯 四君湯 內補建中

湯 防己黃耆湯 防己茯苓湯 千金防己湯 等方但加防風以搜探

同氣分之風川芎以搜血分之風細辛以搜骨髓之風於原方中

古方三削去生地牛膝杜仲續斷秦艽獨活增入防己白朮烏頭

痺湯 以祛除風濕則參附湯 蒼附湯 木附湯 桂附湯 真武湯 等法俱在

其中彼參附蒼附湯 用附子之雄壯以播揚真陽此藉烏頭之烈

以祛痺著著痺 蓋雜合之氣風寒濕ノ三氣 須雜合之方方為合

醫方類聚

續編二

痺

二十八

烏巢堂藏

目録二

痺

劑歎古方ノ三地黄牛膝輩陰柔之藥難振迅掃早之威是

不得不稍為裁酌ヤ、サレヒキ用方者毋以擅改成方為妄也

後ノ方ヲ用ル者ハ、カリナク成就シタル藥方ヲ改メテメツタナクヲスルナト云フナリ

此方古方ノ三痺湯ヲ改メテ改定ノ三痺湯トスタレ人ガ改メラレタヤラ知レヌ大方張碩頑ノ定ノラレタルモノト思フ此方ヲ用ル目當方下ノ如シ手足拘攣スルモノニ用ルト云目當也

此方他病活用例

腰痛

風濕ニ因テ脚ニツヅイテ冷ヘ痛ムニ此湯主之

加減除濕湯百治中風右半身不遂カハ手足癱瘓及筋骨疼痛

人參去 川芎 桔梗 防風各八分 白茯苓皮

當歸酒洗 赤芍 陳皮去 半夏姜製 蒼朮米泔

烏藥 枳殼麸炒 黃連酒炒 黃芩酒炒 羌活各一

白朮去蘆一分 白芷九分 甘草五分

右劉一劑生姜三片水煎溫服本身痛加姜黃本脚痛加牛膝

防已歲靈仙

此方回春右半身不遂中風ニ用ル方ナリ然ルニ其藥駁雜ニノ不純中風ハ重病ナリ此等ノ藥ヲ以テ其効難取只痛風ノ方ニシタル症ニ用ベシ故ニ此書ニハ痺門ニ撮入スルナリ其方ニ

後漢書

續編二

痺

二十九

烏藥

痺

考ル二人參白朮茯苓陳皮半夏甘草八六君子湯ナリ或當歸芍藥
川芎四物湯ノ三ナリ蒼朮ハ除湿ノ專薬ナリ方除湿ト名クハ
ハ湿痰風熱ヲ去ルヲ主トスルナリ故ニ黃連黃芩羌活防風
リ桔梗烏桕殼ハ利肺順氣下痰此陰氣不虧陽氣充實ノ者用之
加減潤燥湯百九 治中風左半身不遂手足癱瘓及語言費分手間ノ
呵欠噴嚏面目口眼喎斜寬弛ユルユル也 頭目眩暈痰火熾盛筋骨
時痛頭或痛心悸

- 當歸 一匙 二分
- 川芎
- 白朮 去
- 白茯苓 去
- 南星 薑汁炒
- 半夏 薑汁炒
- 天麻 各一
- 白芍 酒炒
- 陳皮 塩水洗
- 生地黄 酒炒

- 熟地黄 薑汁炒
- 酸棗仁 炒
- 黃芩 酒炒
- 牛膝 去苳酒洗 各八分

- 薄桂
- 桃仁 去皮
- 羌活
- 防風 各六分
- 黃栢 去皮酒炒 三分

- 紅花 酒洗
- 甘草 炙各四分

右剉一劑水煎入竹瀝薑汁少許温服本 手不遂倍黃芩薄桂共

手ノ臂本 足不遂倍黃栢牛膝二入ル

此七亦中風ノ薬ト云ヘ凡此書痺門ニ撰入ス夫左半身不遂為
血虛若半身不遂為氣虛此ハ丹溪杜撰ノ段先輩此ヲ辨ズル今
更云ニ及バズ左右ノ別無ク血虛痰火盛ナルニ因テ痺忘
トナリ方下ノ諸症ヲ見スモノ宜用之

痺

云へ凡其害モ亦不急此其一也具眼ノ医者其目當^ラ知^ルハ少
ノ庸流ノ輩キ、モアタリモセ又^ク業^ヲ用テ病自^ラ愈ルヲ待^ツ
此其二ナリ如是雜合ノ劑ヲ建立スル^トハ龔廷賢カ得物ナリ
得物ト云モノハ推量ノ外ニ應スルモノナリ回春ノ方思ノ外
埒ノ明又^モ業ノ様ナレ^ニ推量ヨリ効アルモノナリ此其三ナリ

大防風湯 百十 祛風順氣活血脉壯筋骨除寒湿逐冷氣又治患

痢後脚痛痿弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯腊但
存皮骨拘攣跽卧不能屈伸名鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生
自然行履如故

熟乾地黄 二兩 白朮 二兩 羌活 一兩 人參 一兩 川芎 一兩

附子 一兩半 防風 二兩 牛膝 一兩 川當皈 二兩 黃耆 二兩

白芍藥 二兩 甘草 炙 一兩 杜仲 二兩

右為麤末每服五錢水一盞半入姜錢七片大棗一枚同煎八分
去滓温服空心食前

此方王治方下二詳ナリ詳ニ考ベシ○虞天民曰此方用^レ版芎芍
藥熟地而補血用^レ參朮白朮甘草以補氣用^レ羌活防風散風湿以利
關節用^レ牛膝杜仲以補腰膝用^レ附以行^レ參耆之氣而走^レ周身脉絡蓋
治氣血兩虛扶風湿以成痿痺不能行者之聖藥也觀其治^レ痢後風

可知也然可以治不足之痿弱而不可以治有餘之風痺也

此方他病活用例

中風

左右手足皆癱瘓スルニ此湯ニ加木香烏

鶴膝

茶木瓜獨活薏苡仁肉桂名加味防風湯
痢後感寒濕脚膝腫痛スルヲ名鶴膝風
此湯ニ加防己草薺名ニ防飲

痺

獨活寄生湯百十二千金

夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷湿地當風得

之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛攣脚重

痺宜急服此方

獨活三

寄生古今錄驗

杜仲用統斷

牛膝

細辛

秦艽

茯苓

桂心

防風

芎藭

乾地黄

人參

甘草

當飯

芍藥各二

右十五味咬咀以水一斗煮取三升分三服温身勿冷風虛下利

者除乾地黄服復取蒟藳葉火燎厚安席上及热眠上冷復燒之

冬月取根春取莖熬卧之佳其餘薄尉木及蒟藳蒸為愈也諸虛

風濕亦用此法新產竟或患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈

伸痺弱者宜服此湯除風消血

肘後有附子一枚大者無寄生人參甘草當飯

此藥方下二云如少素リ腎虛スル人風濕ニ中リテ偏枯冷痺ヲ

病ムモノヲ治ス千金方ニ出テ奇驗ノ古方ナリ桑寄生真物難
 得統斷ニ代ヘ用ベシ。白虎歷節風ハ痛風ノ劇キモノナリ虚
 二屬スルモノ此湯主之。

此方他病活用例

腰痛 腎虚重子テ風湿ニ感冒シ 天陰ニ遇フ片ハ腰痛シ或ハ
 腰痛スルモノ此湯主之。 同 久坐ノ痛ムハ湿也此湯主之。

脚氣 足三陰風湿ニ犯サレ脚膝 痛ミヲナスモノ此湯主之。 中風 此方中風癱瘓ニ用ユ
 ル丁アリ考ヘ用ベシ。

痺

清濕化痰湯 百十 治周身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒

熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一
 點

如冰冷鹹滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也。

- 南星 去皮 半夏 姜製 陳皮 茯苓 去皮 蒼朮 米泔浸 羌活
- 片苓 酒炒 白芷 白芥子 各一錢 甘草 三分 木香 五分 別研

右剉一劑入竹瀝姜汁同服 **本** 骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰

痰塊加乳香沒藥海狗頭 **頭** 頭項痛 濕痰ニ因テ 加川芎葳靈仙

手 手臂痛加薄桂 諸菜ヲ引テ 引南星等菜至痛所 **足** 脚痛加牛

膝黃柏防已龍膽草木瓜

此方濕痰ニ因テ痛風様ナル症ヲ患ルヲ治ス方下ノ主治極メテ詳也宜考用

痺

犀角散 百十回 千金

治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角 鎊二

羚羊角 鎊一

前胡

黃芩

枳子仁

大黃

升麻 五味並姜 汁拌炒

射干 酒炒黑 各四兩

豉 一升

右九味為末每服五錢水煎食後熱服

此方脈痺ヲ治ス脈痺ハ即熱痺ナリ藏府熱ヲ移シ其上ニ外邪 經絡ニ留テ不行方下ノ如クノ症ヲ患フ患ル処必熱ス或皮膚 鼠ノ走様ニ思ハル、唇ソリカヘリ裂皮膚變色此方主之ヲ

痺

羚羊角散 百十 五

治筋痺肢節束痛

羚羊角 鎊二

肉桂 世本作 薄荷誤

附子 炮各 半兩

白芍 一兩 五錢

獨活 防風 各七 各半

川芎 一兩

當歸 一兩 五錢

右為散每服四五錢入生姜三片水煎食遠抗服

主治方下ノ如シ束痛ハシメヨセル様ニ痛ム丁右犀角散羚羊 角散ノ二方方意主治未審他日宜考只方下ノ語ニ從テ考ヘ合 ノ用ル片ハ雖無疑方意ニ於テハトクト難會得犀角散ハ寒茶 羚羊角散ハ温茶トハ云ニ及ズ知レタリナリ

痺

麻黃復煎湯 百十六蘭 室秘藏

治風濕倦怠常汗微出

麻黃 去節 一匙

右用水三盞先煎令沸去上沫至二盞入下項藥

黄耆二 白朮 人参各半 柴胡 防風 羌活 黄栢姜汁炒褐色

生地黄各一 甘草生二分 杏仁五箇去皮尖研

右十味入麻黄湯中煎至一盞卧時半饑熱服不可飽服後微汗

為度不可過汗則若汗過熱不止而煩擾不寧也梔子豉湯解之

此方蘭室秘藏腰痛門ニ出ルト云バ身尽ク痛ムノ某ナレバ

痺門ニ入レル也本書ニ方意詳ナリ然レ在東垣ノ語ハ含蓄多

ノ未熟ノ医ハ卒ニ通曉難成故ニ医通東垣ノ意ヲ酌テ身体痛

ニ撮入ス方ノ分料本書ト少シク異ナリ令医通ニ從フ凡人外

風湿ニアタリ風湿相搏テ身尽ク痛ニ陰室ノ中汗出言語モ

ノウク四支困倦無力痛ニ走注レ下焦ニ伏火有テ不得泄燥熱

微汗出テ熱不解モノ此方主之謙云此方ハ内傷勞倦風湿ヲ兼

テ一身尽ク痛ムモノニハ補中益氣湯ニ加羌活防風藁本蒼朮

用ル症ト此方ヲ用ル症ト大抵相同シヤハリ益氣湯ニ右ノ加

味ニテ可用モノナルニ此方ヲ用ルハトコノ違ト云ハ常ニ汗

出ルト燥熱アルガ違ナリ然ルニ益氣湯ノ症モ自汗出ルモノ

熱モアルモノニギラハシケレ在此方ノ症ハ下焦ニ鬱伏ノ火

カ有ル故ソレガ泄ルコガナラヌユヘ浮テ燥熱トナレバ益

氣湯ニ加味ノ症ノ發熱トハ違ノナリ常ニ微汗出ルト云ハ内

痺

ヲ主トスルト黄栢生地黃ヲ用ルトニツノ術ガ此方ノ目當ナ
リ黄耆人參白朮柴胡甘草ハ補中益氣湯ノ過半ヲ用井タルモ
ノナリ本書ニ云況正值季春之月脈緩而遲尤宜發汗令風濕去
而陽升以此困倦乃退氣血俱生旺云云此等ノ語意宜考

防己黃耆湯百十七金匱 治風濕相搏客在皮膚關節痠痛腰以下疼重

脈浮自汗惡風

防己酒洗 黃耆各鈔半 白朮一分 甘草一分 生姜四片

大東二枚

右六味水煎熱服後當如異行皮中腰已下如冰後坐被上又以

一被遶腰下腰ヨリ下ヲ衣服蒲團ノ類ニテツミマハス也 温令微汗差喘加麻黃胃

氣不和加芍藥氣上衝加桂枝下有陳氣加細辛陳氣久積之寒氣也

此菜方下ノ圈シ目當ニ用レバ無疑症也○此方防己ハ滲利
濕熱ヲ去ル峻菜ナリ黃耆ハ行表自汗惡風ヲ除ク白朮健脾去
濕蓋レ防己ノ寒菜アリト云ヘ凡黃耆白朮甘草甘温ノ上品也
更ニ生姜大東アリ寒劑ノ恐レ有ベカラズ○方後ノ加減此方
ノ的症ニテ兼ル処有ル片ハ此加減ヲ用ベシ麻黃ハ除喘ノ專
菜ナリ胃氣不和加芍藥トハ芍藥白朮ト同用スレバ脾胃ヲ和
スルモノナリ氣上衝加桂枝トハ水氣衝上スルヲ桂枝ヲ用テ
腎邪ヲ伐ツタトヘバ傷寒論奔豚トナラントスル症ニ桂枝加
桂湯ヲ用ル意ナリ細辛ハ辛熱ノ菜久積ノ寒氣ヲ去ナリ

傷寒

四逆湯 百十八

寒

甘草 二兩

乾姜 一兩

附子 一枚 生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服強人

性強

可少陰ノ主方トイ大附子一枚干姜三兩續論曰此湯

少陰ノ主方トイハ此畢竟三陰通

治通治三陰脉沉惡寒手足逆冷之證故取附子之生者上行頭

項生附子ナレバナリ外徹肌表以温經散寒乾姜亦用生者以內温藏府

炮姜モ亦藏府ヲ温ムル此ニ乾生薑ヲワケテコフ云ハ不審

甘草獨用炙者以外温營衛內

補中焦也其云強人可大附子

此テハ常ノ分兩ヨリ附子干姜ヲ増シ用ル甘草ハモトノ如ク

ナレバ茶勢ガスルドナ一枚乾姜三兩者則知平常之人附子

不必全用也本方附子一枚トイヘ凡常ニハ減况宋以前人不

善栽培重半兩者即少大者極是難得宋以前ハ附子ノ裁ヤウ

ノ重サ五錢目アルモノ希所以仲景仲景ノ時ハ有一方中用

二三枚者非若近時附子大ニノ一枚ノ重西附所ノ之多重一

兩外也然川中地名ナリ此所ヨリ産所產求一兩者亦不易得

近世畢竟仲景ノ時ノ一枚ハ用二三錢一劑即與仲景時二三

漢書卷之九

續編二

寒

三十八

烏巢堂藏

枚分三劑相等耳。○此湯與麻黃附子細辛湯之用麻黃發散經絡之寒邪，熟附溫補少陰之真陽，細辛發越腎肝之陽氣，似異而

意實同。異ナルヤウデモ，蓋彼以麻黃治表邪，附子溫裏虛，細辛

通其陰經之邪，此以附子治表邪，干姜溫裏虛，甘草和其胃中之

陽嗣真。趙嗣真所謂生附配干姜，同補中。干姜有發子，熟附配麻

黃，同發中。麻有補熟附是也。

此方ノ正面ハ少陰直中ニ用ル薬ナリソレ少陰ノ証ハ色々アリ先直中ト云テ寒邪ガ腎ノ藏ヘ直ニ中テ陰寒ニ属スル証アリ又陽經ヨリ陰經ニ傳テ少陰經ニ至テ傳經ノ熱症トナルア

リ少陰ノ表証アリ又傳經ノ熱証カ後ニ變メ未傳寒中トナル

アリ此外ニモ有トイヘ凡何ニモセヨ少陰ノ証ノ道レ又目ア

テハ本論云為少陰之病脉微細但欲寐也云此一句カ少陰經

ノ物躰ヘアヅカル直中ノ寒症ニモセヨ傳經ノ熱症ニモセヨ

表症ニモセヨ未傳寒中ニモセヨ脉カ微細ニテ但欲寐ナリサ

レ凡トツクリト寐入ルヲハナラヌモノゾ少陰ノ症ナレハ必

ス此症ヲ見ハス此症ガ無レバ少陰ノ症デハ無キト知ルヘシ又本論云少陰病脉沉者急ニ温之宜四逆湯云是レガ四逆湯ヲ用ユベキ症ナリトイヘ凡但欲寐脉沉也トバカリニテハ分カラヌ右云通り少陰ノ症ハ傳經直中凡ニ此脉此症アリ是レヲ直中ト見キハメテ此薬ヲ用ル目アテハ先キニ表症ヲ見ハシ後五六日ヲ経テ脉寢ノ沉細數ニナリ口中燥テ不得卧者ハ

傳經ノ熱症ナリ可用承氣湯此湯ハ不可用始ノ病ニツキヨリ
脈細ニシテ口中ノ燥キモ無ク但欲寐ハ直中ノ寒症ナリ此湯主
之○此方ノ分量仲景ノ時トハ附子一枚ノ重ガ違フニヨツテ
分量シカト難定シ医通ノ祖方ヲ按ズルニ生附子一枚乾姜五
錢甘草六錢トアリ謙云附子一枚ト云ハ今茶肆ニ云三十掛ノ
附子一枚五錢目ホドアル附子ナリ大附子一枚ト云ハ十掛ノ
附子一枚十五六錢目アルモノナリ此合點ニテ分量ヲ意得ヨ
此方本證主用例

○厥陰純陰無陽ノ症太汗出テ熱不去内拘急シ四肢痛ニ或ハ
其上ニ泄瀉厥逆惡寒ナド加ヘアルニハ急ニ用テ可回陽○同
症吐利發熱惡寒四肢拘急手足厥冷スルニハ此湯ヲ用テ温之
○同症ステニ吐シ又清穀ヲ下利シ大ニ汗出内寒外熱シ脈微

欲絶者ハ此湯主之○太陽ノ症咽中閉塞スル者ハ不可發汗若
發汗スレハ陽氣愈虚シ血依飯スル処ナクテ吐血シ氣欲絶者
ナリ手足厥冷シクタビレ欲寐スルニハ此湯ニアラサレハ温
經回陽ヲナラサルナリ○太陽ノ症發熱頭痛スルハ太陽ノ症
ナリ脈却テ沉ナルハ其人陽虚スルナリ此症ニ桂枝湯ノ類ノ
鮮肌ノ菜ヲ用テ不愈身体疼痛スルハ陽虚陰盛ナリ此湯主之
○陽明ノ症脈浮ニシテ遲表熱シ裏寒エ清穀ヲ下利スル者ハ此
湯主之○自利不渴者ハ屬太陰其藏有寒ナリ當温之四逆理中
ノ菜主之○少陰陰寒ノ諸症アツテ少腹痛ハ真陽ノ不足ナリ
宜此湯或此湯ニ加肉桂○其人素ト有痞積テ痛ニ陰筋ヲ引ク
者ハ四逆ニ加吳茱萸肉桂○病人自ラ云フ腹滿スト他人按之
スレハ腹不滿是屬陰症此湯温之○膈上ニ有寒飲乾嘔スルニ

醫方類聚卷之四十一
實編二 寒
四十
烏集堂藏

ハ此湯ニ加呉茱萸生姜。直中陰經之症咽喉驟痛不腫不渴或渴ノ不能飲ニハ此湯或ハ附子湯急ニ温之。○白胎双灰色舌是レ冷食ヲ挾ムナリ七八日ノ後此ノ舌ヲ見ハス有津液者ハ理中此湯選用無津液者ハ不治乾キ厚ク見裏症者ハ用下劑。○純灰色舌ハ挾冷食ナリ理中湯此湯撰ビ用ユ。○淡紫帶青者直中腎肝ノ陰症也呉茱萸湯四逆湯主之。○脉沉自利四逆恐寒テ小便難キハ津液竭テ氣化不行然レ凡黄赤澁痛セサルナリ此湯ニ合生脉散。

此方雜病活用例

霍乱 吐瀉不止元氣耗散病危篤水粒不入口燥喜冷或惡寒戰慄手足逆冷或發熱煩躁搗去衣被是内虚陰盛也理中湯或此湯加食鹽少許。**黄疽** 肢躄逆冷嘔悶自利胸中氣促舌上胎滑脉

沉細而緊是陰黄疽也此湯ニ加茵陳有

痢 下痢身軀疼痛スルニハ急ニ温裏諸ノ

温茶与之理中

厥 凡ソ厥症足指ノ裏ニヲコルハ陰厥ナリ表ニヲコルハ陽厥ナリ惡寒手足冷ル者ハ寒厥ナリ此湯

主之 **翻胃** 嘔ノ脉弱ク小便モ亦利シ身有微熱テ見厥者ハ難治ナリ此湯主之 **呃逆** 若シ氣自臍衝キ上ホセ嗝ノ間ニテ呃逆スル者ハ肝腎虚寒ノ至極ナリ其

脉沉細此證不在胃在下焦附子理中湯ニ加枳實姜汁重キ時ハ此湯ニ加

煩躁 躁ハ身躄躁擾或ハ裸躄不欲近衣或投井中為無丁香沉香 根之熱ナリ急ニ附子理中湯四逆湯姜附湯ノ熱

菜主 **面** 面戴陽ハ下虚ナリ傷寒ニハ **勞證** 此方ヲ勞瘵ニ用ル丁四逆湯雜病ニハ地黄飲子 アリ陽虚ノ瘵ニ用ル

ハ其箸ノヲナリ陰虛ノ症ノヤウニ見エテアナガチ陰虛トモ見エズ滋陰ノ薬ヲ用テ不應此湯ヲ用テ得驗アリ同ジナカラ附子理中湯ヲ用レバ大キニ惡シ、其仔細ハ理中湯ニハ白朮デ燥此湯ニハ無白朮附子乾姜甘草三味ノ内甘草ガイツチ太分入ル甘草ニテ附毒ヲウスクシ乾姜ノ辛ニモ消シイカフムツクリトナル甘草ニ補陰ノ能アリソレテ理中湯ナドヨリハ思ノ外効アルヲアリサレモ其味ガ甚甘キユヘ甘キ味ヲイヤガル病人ナラバ不可用甘草ヲ少辛ニ減シテハ此薬ノ思ヒ入レハヌケルゾ時ニ因テ此湯ノ本方ニ加味スルハ有ルベシ甘草ヲ減スルハナラヌゾ此思ヒ入レアリ唐ニモ云タコヲ見アタラス病至極不重ルトキハ附子理中湯至極重キ片ハ四逆湯ト何レノ医書ニモ云テアレトモ此合点テ見レバ

理中湯ト四逆湯ハイカフイキカタノチガフタ葉ト思ハル、巧者ニ談合シテ能々可考ナリ

医通云甘草得干姜之辛不滯干姜得甘草之甘不燥○傷寒下利清穀手足四逆其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛此湯倍干姜面赤者加葱一根腹痛加芍薬一錢半嘔加生姜咽痛加桔梗一錢○若四肢厥逆腹中痛泄利下重而咳四逆湯加北五味乾姜各半錢

傷寒

四逆加人參湯 百十九 寒

- 甘草 二兩
- 乾姜 一兩
- 附子 一枚
- 人參 一兩

右四味咬咀以水三升取一升二合去滓分温再服

此方四逆湯ノ証而汗出テ厥シ脉微或下利或脉絶ノ復還ル是
危篤ノ症ナリ加人参以保其津液且漸得之得力故ニ加人参為
此湯或ハ誤テ汗シ戰慄スル症用之畢竟四逆湯ノ症ニノ元氣
弱者ニハ加人参テ為此湯白虎湯ニ加人参テ白虎加人参湯ト
云ト同意ナリ

此方雜病活用例

嘔逆 產後ノ嘔逆ハ惡候ナ
リ灸氣門宜服此湯

傷寒

茯苓四逆湯 百二十

- 茯苓 六兩
- 人参 一兩
- 甘草 二兩
- 乾姜 一兩
- 附子 一枚

右五味以水五升者取三升去滓温服七合日三服

此方ノ正面ハ太陽ノ症發汗或下之其病不解煩躁スルモノ
夕メニ用ル茶ナリ四逆湯ニ人参二兩茯苓六兩用ニ煩ハ心煩
スル意躁ハ腎躁スルナリ乾姜附子ハ入腎以除躁人参茯苓入
心ニテ以解煩スルナリ茯苓ヲ三倍用ル意ハ茯苓ハ緩キ茶ニテ
多少用子バ功ノナキ茶ナリ茯苓ハ補心ノ茶人参ト同ク
用テ解心煩原方ノ四逆湯ヨリハ茶ガ和力ニシテ峻ニ無キ茶
ナリ凡ソ無汗ノ煩躁スルニハ大青龍湯尤宜之有汗煩躁スル
ニハ此方ヲ合劑トス此發汗スル後ト未發汗前トガ大青龍湯
ト此方トノ別ナリ是
極メテ肝心ノ意得也

傷寒

通脈四逆湯百二十一

甘草二兩

乾姜三兩強人

附子一枚

右三味以水三升者取一升二合去滓分温再服

此茶ハ原方ノ四逆湯ニ加倍乾姜シタルモノナリ大ニ温其裏
群陰拒陽脉微欲絶其人面赤或腹痛乾嘔咽痛或利シ脉不出危
殆ノ症種々ヲ見ハスニ倍乾姜ノ回陽脉出ル者ハ生ルナリ故
ニ名通脈四逆湯○面色赤者ニハ加葱白九莖謙云面色赤ハ陽
拒於上也故ニ加葱白テ通陽氣○腹中痛者ニハ去葱白加芍薬
二兩謙云腹中痛ハ真陰ノ不足也故ニ加芍薬テ斂陰○嘔スル
者ニハ加生姜二兩謙云生姜ハ嘔家ノ聖薬ナリ○咽痛ニ去芍

傷寒

通脈四逆加猪膽汁湯百二十二

甘草二兩

附子一枚

乾姜三兩

猪膽汁半合

右四味以水三升先煮三物取一升二合去滓入膽汁分温再服

菜加桔梗一兩謙云桔梗利咽スルナリ○痢止三脉不出者ニハ
去桔梗加人参二兩謙云人参補元氣也○此方四逆湯トサノ三
ノ違ハナイ加減ノ方ヲ能可考但シ本方ニ此加減ヲ用テモ好
シ時ニ臨テ活法ヲ用ベシ
此方本症主用例
○四逆湯ノ症ニノ小便自利スル者此方主之○陰寒ノ症ニノ
發斑ヲ生スル者其症甚シキ者ニ可用此方

傷寒

此方大抵前方ト同シ加猪胆汁ハ嚮導也陰盛ニノ拒陽ユヘニ猪胆汁苦寒ノ品ヲ加テ用寒因寒用之法ナリタトヘハ理中四逆ノ大熱劑冷服サスル法ト同事ナリ陰寒極レハ拒陽温茶ヲウケ付ヌコトアリ其時ハ温茶ヲ冷シテ用レバ病ニサカラハヌホドニ一旦ウケテ其アトハ元來熱茶ナルホドニ病ニ應ズルナリ此湯ニ加猪胆汁モ此法ト同前ナリ

當飯四逆湯百二十三

當飯三兩

桂枝三兩

芍藥三兩
酒洗

細辛二兩

甘草二兩
炙

通艸二兩

大棗二十五枚
擘

右七味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服○如素有寒

氣加吳茱萸倍姜○寒甚此加減與本旨違未審加附子脉不至加人參

此方ハ意得ノアル方ナリ本論云手足厥寒脈細欲絶者主之手足厥寒脈細欲絶トイヘバ陰寒ノ症ノヤウニキコユレトウテナイ傳經ノ陽邪流テ厥陰營血ノ分ニ入ルナリ其人素トヨリ虚寒スルユヘ陽邪トイヘバ熱ヲ發スルコトアタハズフレテ脈細欲絶ナリ陰氣内ニ衰ヘ脈ヲ鼓動スルコトアタハズ肌表ノ陽モ虚スルユヘニ用桂枝湯ヲ和其中外加當飯以和厥陰肝經之營血用通草通太陽之本太陽ノ本トハ膀胱ノ府小便ヲ通スルナリ細辛ヲ以テ少陽ノ源ヲ清ス畢竟厥陰ノ症傳經ノ熱邪其人虚スルユヘニ不發熱却テ手足厥冷シ陰寒ノ症ノヤウニニギル、病ニ用ル茶ナリ元來陰寒ノ四逆ヲ治スル茶ニハ

アラズフレテ手足厥寒ストイヘバ乾姜附子ヲバ不用ナリ其
デ本論云久寒アルモノニハ宜當飯四逆加吳茱萸生姜湯ト云
久寒トイヘバ本ヨリ寒邪ヲタクハヘテアル症ナレバ熱某ヲ
用子バ叶ハヌナリサレバサシアタツテ病ガ傳經ノ熱恣ナル
ホドニ乾姜附子ハ用ラレズ故ニ吳茱萸生姜ヲ加味シテ如此
名ツクルナリ

此方本症主用例

○厥陰ノ症強テ劇シク下劑ヲ用ルニ依テ下利シ腸鳴スルニ
ハ此湯主之腸鳴ハ水飲停留スルナリ方中ニ通草アツテ水ヲ
利スル也○少陰傳經ノ症其人元氣素ヨリ虚シ汗下ノ劑大過
ニノ末傳寒中トナリ虚寒ノ候ヲ見ハス者ニハ此湯主之○少
陰ノ經症及八九日一身尽ク熱ス凡ソ少陰ノ症ハ十カク厥冷

レタガル熱ヲ得ルコトハ難シ八九日ニ及テハ多ク厥寒ノ症ヲ
見ハス然ルニ此症一身分ク熱スルハ是在臟ノ邪氣府ニ轉ジ
テヨイ方ヘ向フナリ腎藏ノ熱ヲ膀胱ノ府ニ移スナリ膀胱熱
ノタメニセメラレテ小便血ヲナスナリ用此湯和之○宿食ア
ルニ依テ汗ヲ禁ズヘキ症ニ醫誤テ發汗スルコトヘニ吐血スル
コトアリ炙甘草湯主之若シ厥冷ヲ兼子バ此湯主之○厥陰經症
ノ頭痛顛項ヨリ頭角ニ引テ痛ニ脈沉弦細手足厥冷スル者ニ
ハ此湯主之若シ厥陰裡症ノ頭痛ハ乾嘔涎沫ヲ吐ス吳茱萸湯
主之○厥陰傳經ノ熱症舌赤キ囊縮ニル者ニハ木底下劑ヲ用
ユルナリ然ルニ脈實シ便秘スル者ニハ可用下劑若シ脈浮ニ
シ下利スル者ニハ此湯主之○舌色紫ニノ燥シハ厥陰傳經ノ
熱恣ナリ此湯主之

此方雜病活用例

腹痛

小腹痛傷寒傳經ノ症ヲ兼ルトキハ此湯主之寒ニハ加吳
茱萸丸ノ小腹痛ハ傷寒ヲ兼ストモ一切ノ小腹痛多クハ

此湯

項背惡寒シ腦戶極メテ血痢血色瘀晦ナ
冷ハ痛ニハ此湯主之

ノ症嚴寒ノ時節寒熱頭痛甚ク自汗ス是風寒入厥陰熱ナリ用
此湯テ覆フテ汗スレハ熱除クナリ

疝氣

當飯四逆湯

百二十四
寶鑑

治厥疝脇下久寒結痛

當飯半

附子炮

肉桂

茴香

延胡

柴胡各一錢

芍藥

茯苓各八分

澤瀉

川棟肉各六分

右水煎空心稍涼服

此方疝氣ノ藥ナリ藥名前ト同キエハ此ニ載スル厥症ニ用エ
厥氣上ツテ心腹ヲ衝ク是肝經本ト有火邪寒氣外ヨリ内ノ火
邪ヲ包テ鬱スルエハ脇下結痛スルナリ故ニ桂附茴香ノ熱藥
ヲ用柴胡芍藥川棟肉ハ寒劑ナリ如此寒熱合用シ厥疝ニ用井
キハメテ効アル藥寶鑑ノ當飯四逆湯トテ名高キ藥ナリ

傷寒

白通湯

百二十五
寒

葱白四莖

乾姜一兩

附子一枚生

延壽堂手引草

續編二

疝氣傷寒

四十七

烏巢堂藏

傷寒 卷之四 附子湯

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

此湯四逆湯ニ去甘草倍干姜加葱白タルモノナリ四逆湯ノ症ニ比スレバ危急ノ候アリト見ユル故ニ去甘草甘草ハ葉勢ヲ緩クスル者ナリ加葱白通其陽スルナリ

白通加猪膽汁湯 百二十六 寒

葱白 四 莖 乾姜 一 兩 附子 一枚 生 人尿 五 合 猪膽汁 一 合

已上三味以水三升煮取一升去滓内膽汁人尿和令相得分温再服

傷寒

傷寒

此方ハ前方ニ加猪膽汁モノナリ猪胆汁ハ嚮導ノタメナリ即通脉回逆加猪胆汁湯ト同意ナリ此湯ノ症前方ノ症ニ比スレバ益甚シ脉微利不止或厥逆無脉乾嘔ノ煩ストイハバ陰極ツテ拒陽ムリ甚シ故ニ嚮導ノ品ヲ用ユ服此湯シテ後脈暴ニ出ルハ却テ死ス脈ソロクイツトナク生スルハ不死ナリ

附子湯 百二十七 寒

附子 二枚 生 人参 二 兩 白朮 四 兩 茯苓 三 兩 芍薬 三 兩

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服○或問附子湯与真武湯只互換一味真武湯ハ此湯ニ無何真武湯主回陽

續編二 傷寒 四十八 烏巢堂藏

峻補耶蓋真武湯內生姜佐發附，不過取辛熱之勢以去散經中
 之水飲附子湯中人參助生附純用其溫補之力以恢大復渙散
 之真陽且附子湯中參朮皆倍於真武其分兩亦自不同所以主
 治迥異豈可比例而觀乎

本論云少陰ノ病得之一二日口中和シ其背惡寒スル者ハ當灸
 之此方少陰直中ノ症其人素ヨリ表裏俱ニ虚ニ寒邪中ノトキ
 太陽經ノ表ニライテ一丈ヘモスルコナラズ無人城郭ニ入ル
 如ク直ニ少陰ノ裏ニ入ル脉微欲寐ハ少陰ノ總症ナレバ不言
 シテ知ルベシ口中和スルトハ不渴不燥也無裏熱可知故始
 病ム一二日ノ中チ灸關元穴如此大温補ノ菜ヲ用ルハ月ハテ

父マ 取 腹 表ニ 盛ナ 陽氣 ハ熱 見ソ カ潤 ノツ 陰偏 ル食

咳

真武湯

此方少陰直中ノ症其人素ヨリ表裏俱ニ虚ニ寒邪中ノトキ
 太陽經ノ表ニライテ一丈ヘモスルコナラズ無人城郭ニ入ル
 如ク直ニ少陰ノ裏ニ入ル脉微欲寐ハ少陰ノ總症ナレバ不言
 シテ知ルベシ口中和スルトハ不渴不燥也無裏熱可知故始
 病ム一二日ノ中チ灸關元穴如此大温補ノ菜ヲ用ルハ月ハテ

スルト 陰背陽 風寒在 寒ノ氣 不足シ ノリ是 別是ヲ ハ口中 無キモ 亦テ助 力カア 食カ

醫書卷之... 續編二... 烏巢堂...

峻補耶蓋真武湯內生姜佐發附不過取辛熱之勢以去散經中
 之水飲附子湯中人參助生附純用其溫補之力以恢大復渙散
 之真陽且附子湯中參朮皆倍於真武其分兩亦自不同所以主
 治迥異豈可比例而觀乎

本論云少陰ノ病得之二一日口中和レ其背惡寒スル者ハ當灸
 之此方少陰直中ノ症其人素ヨリ表裏俱ニ虚レ寒邪中之トキ
 太陽經ノ表ニライテ一支ヘモスルコナラズ無人城郭ニ入ル
 如ク直ニ少陰ノ裏ニ入ル脉微欲寐ハ少陰ノ總症ナレバ不言
 シテ知ルベシ口中和スルトハ不渴不燥也無裏熱可知故始テ
 病ム一二日ノ中チ灸關元穴如此大溫補ノ菜ヲ用ルハ一ハテ

父マウナ療治ナレレトコトノ外危急ノ症ニテ手ヌカリスルト
 取復シノ成リ難キ症ナリ証治準繩謂ヘリ人身ノ陰陽陰陽陽
 腹トス陽氣不足陰寒ノ氣盛ナレバ背為之惡寒ス若シ風寒在
 表テ惡寒スル者ハ一身背脊惡寒トシテ一陰寒ノ氣
 盛ナルコト可知シ但背西
 陽氣内ニ陷テ陰中ニ入
 ハ熱症ナリ白虎加人參
 見ソコナヘバ生死在反掌其陰陽寒熱ヲ見分クル肝要ハ口中
 カ潤ホフカ燥クカト此ニツニテタメセ見ソコナヒハ無キモ
 ノ少此方先用附子テ回陽茯苓白朮人參甘草補陽加芍藥テ助
 陰偏勝ナカラシム謙云背惡寒スルニ令一ツニキレモノカア
 ル食滯ヲ兼々感冒アナカチ食滯レ不覺腹痛頭痛モ無ク食カ

際。適。歷。

設西養子別註 續編二 傷寒 四十九 烏巢堂載

峻補耶蓋真武湯內生姜佐發附不過取辛熱之勢以去散經中
之水飲附子湯中人參助生附純用其溫補之力以恢大復渙散
之真陽且附子湯中參朮皆倍於真武其分兩亦自不同所以主
治迥異豈可比例而觀乎

本論云少陰ノ病得之一二日口中和シ其背惡寒スル者ハ當灸
之此方少陰直中ノ症其人素ヨリ表裏俱ニ虚ニ寒邪中_ニ之トキ
太陽經ノ表ニライテ一_支ヘモスルコナラズ無人城郭ニ入ル
如ク直ニ少陰ノ裏ニ入ル脉微欲寐ハ少陰ノ總症ナレバ不言
シテ知ルベシ口中和スルトハ不渴不燥也無裏熱可知故始
病ム一二日ノ中チ灸關元穴如此大溫補ノ業ヲ用ルハアハテ

又マヴナ療治ナレトコトノ外危急ノ症ニテ手ヌカリスルト
取復シノ成リ辨キ症ナリ証治準繩謂ヘリ人身ノ陰陽陰背陽
腹トス陽氣不足陰寒ノ氣盛ナレバ背為之惡寒ス若シ風寒在
表テ惡寒スル者ハ一身皆惡寒ス只背惡寒スル者ハ陰寒ノ氣
盛ナルコト可知シ但背惡寒スルニミギル、コアリ陰氣不足シ
陽氣内ニ陷テ陰中ニ入ル表陽新ニ虚ノ背惡寒スル者アリ是
ハ熱症ナリ白虎加人參湯主之太溫補大寒葉ヲ用ルノ別是ヲ
見ソコナヘバ生死在反掌其陰陽寒熱ヲ見分クル肝要ハ口中
カ潤ホフカ燥クカト此ニツニテタメセ見ソコナヒハ無キモ
ノ少此方先用附子テ回陽茯苓白朮人參甘草補陽加芍藥テ助
陰偏勝ナカラシム謙云背惡寒スルニ令一ツマキレモノカア
ル食滯ヲ兼々感冒アナカチ食滯凡不覺腹痛頭痛毛無ク食カ

ス、ニ腹少シツカヘタルヤウニテ背ハカリジロク寒キコ
 トアリ是食滯ナリサレモトガ感冒ノコナレハ此症ナト、
 ハ格別ノ輕重大キニ違フタルモノナリ不換金正氣散ナドニ
 消導ノ菜ヲ加テ用ユベシ謙又云續論ステニ真武湯ト此湯ノ
 辨別アリ四逆湯ト此湯ト同陽ノ峻劑ニノ藥品大ニ異ナリ四
 逆湯ハ附子干姜ヲ主トシ多ク用甘草以テ其方温潤和緩ナラ
 シム此湯ハ多ク用白朮無甘草由逆湯ニ比スレハ和緩ノ意味
 少シトイヘ凡有人參芍藥テ亦一方不烈白朮ハ燥瀉ノ者ニ忌
 トイヘ凡有芍藥和陰ニ方凡ニ互ニ相和スルヤウニクニ合ス
 ルトイヘ凡其ノ方ノ思ヒ入レハ格別ニ異ナリ此方雜病ニ用
 ヲベシ若シ雜病ニ用ル片ニモ理中湯四逆湯三友ノ意ヲ辨別
 シテ臨症テ可考用ナリ

傷寒

吳茱萸湯 百二十八

吳茱萸 一升

人參 三兩

生姜 六兩

大棗 十枚

右四味以水七升者取二升去滓温服七合日三服

此方傷寒ニ用ルニ三症アリ一者厥陰ノ症乾嘔吐涎沫頭痛者
 用之是ハ下焦ノ濁陰ノ氣上胸中テ清陽ノ氣鬱ノ反テ下ニ在
 清陽ノ氣時々サラントスレ凡為濁氣ニ抑ラレテ升ルナラ
 ス故ニ乾嘔吐涎沫スルナリ頭痛スルハ厥陰ノ脈ハ督脈ト巔
 ニ會ス此經ノ頭痛ナリ吳茱萸專ラ胸中濁氣ノ逆ヲ開キ人參
 生姜大棗胃中清陽ノ氣ヲ助ケ厥陰ノ逆氣ヲ除ケハ頭痛ハ自
 ラ愈ルナリ一者陽明經ノ症欲嘔食穀者此方主之是ハ寒濁ノ

心痛

高良姜湯

百二十九
千金

氣胃二鬱スルユヘナリ一者少陰ノ痞吐利手足厥冷煩躁欲死者用之是ハ腎肝ノ陰氣上逆ノ為危候此湯寒濁ノ逆氣ヲ下シ補脾土右三症各異ナリ皆用此方テ治之其ノ意ハ一ツナリ

此方雜病活用例

嘔吐

金匱要略云嘔ノ胸滿スル者此方主之

同

久寒胸膈逆滿之不

乾嘔

胃虛濁氣上逆ノ乾嘔ス

ル者此方主之

苦嘔

胃ノ氣逆スル片ハ苦ヲ嘔ス此湯主之謙云嘔苦ハ大抵肝胆ノ氣逆スルナリ胃ノ氣逆スルニモ苦ヲ

嘔スルト

頭痛

頭痛乾嘔吐涎沫スル者此湯主之

痢

痢病發嘔逆吐蛇虫者四逆湯參附湯此湯主之

高良姜

厚朴姜製

當歸

桂心各二錢

生姜三片

右五味水煎温服。若一服痛止不須更作。虚人加芍藥半夏

甘草人參乾姜蜀椒黃芪

此藥寒症ノ心痛ニ用ユ心腹絞痛如刺兩脇脹滿スル者此方主之謙云心痛屬陰寒者ニ此方ノ温熱ヲ用ルハ勿論ノコトナリ其ウチニ良姜ハ心痛ヲ治ノ有妙効故ニ君薬トスルナリ

風湿

桂枝附子湯

百三十
寒

桂枝四兩

附子三枚炮去皮破八片

甘草二兩炙

生姜三兩切

醫方考手引草

續編二

心痛 風湿

五十一

烏巢堂

大棗十二枚 擘

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

此茶ハ風濕ニ用ル茶ナリ風濕ノ治方種々アリトイヘ凡此湯風濕相搏身煩痛シ不能自轉側不嘔不渴脉浮虚ニシテ瀼スル者主之此症風濕トイヘ凡異竟虚寒ノ症ナリ不嘔不渴ト云ラ目當ニスヘシ

此方他病活用例

傷寒

汗多止陽汗不止者宜此同 同症漏風咽痛脉却テ沉緊ナル湯小便少キ者ニ加茯苓ハ是陽虚ノ陰氣上ニ乗スルナ

リ此湯或白朮附子湯主之

中寒

乾姜附子湯百三十一

乾姜一兩

附子一枚生去皮破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

此茶ハ傷寒太陽ノ症誤下シテ後復々發汗シ晝ハ煩躁ノ不得眠夜ハ安靜ナリ不嘔不渴無表症脉沉微無大熱者晝煩躁シテ夜静ナルハ陰不病シテ陽病ムナリ謙云今時ハ此ノヤウナ誤治ハナイ若シ有ラバ可考用晝躁夕夜静ナルハ陽虚ト云目アテハ何レニシテモハツレハ世又扱コノ茶ハ傷寒論誤治ノ茶トイヘ凡後世ニハ中寒ノ主方トスル故一中寒門ニ攝入ス中寒ノ方理中四逆アリトイヘ凡症ニヨリテ乾姜附子ノ外ハ人

段圓泰二列第

續編二 中寒

五十二

烏巢

濕

參白朮ノ類モ邪魔ニナルコアリツレテ後世ニハ姜附湯ト稱
ノ中寒ノ薬トスル其ノ用井ヤウ医門法律ニ詳ナリ中編ニ記
○中寒漸甦身体廻暖稍能言語須更問其別有何證挾氣攻刺此
湯加木香半錢○挾氣不仁加防風一錢○挾濕而腫痛者加白朮
一錢○筋脈牽急者加木瓜壹錢
○肢節疼痛加桂二錢

白朮附子湯 百三十二 寒

- 白朮 四兩
- 附子 三枚炮去皮破八片
- 甘草 二兩
- 生姜 三兩切

大棗 十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服

風濕

此方寒濕ノ菜ナリ湿家ノ病ト身尽ク痛ニ身色如薰黄者王
凡ノ湿ニ因テ發黄色者寒熱表裏ノ辨別アリ湿熱在裏者茵
陳蒿湯在表者梔子栝皮湯是レ用寒菜ノ例ナリ寒濕在表ニハ
麻黄加朮湯在裏此湯主之是レ用温菜ノ例ナリ○寒濕ノ症誤リ
下セバ額汗出ヅ額汗出ルハ陽氣逆スルナリサレバ小便如常
手足自温ナル者ハ陽氣逆ストイヘ陰氣暴脱ニ至ラズ雖危
症用此湯救之○風濕ノ症内不渴外不熱小便自利スルモノ此
方主之

甘草附子湯 百三十三 寒

- 甘草 三兩
- 附子 二枚炮去皮破
- 白朮 二兩
- 桂枝 四兩

西京手引草 續編二 濕 風濕 五十三 烏巢堂

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為妙。○
風傷衛氣湿流關節風濕相搏邪亂經中故主周身骨節諸痛風
勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣湿勝則水气不行小便
不利或身微腫故用附子除湿温經桂枝祛風和營白朮去湿實
衛甘草輔諸藥而成斂散之功也

此茶風湿二用風ハ上ヨリ受ケ湿ハ下ヨリ受ク風濕相搏聚ル
ニ至テハ經絡關節骨体軀殼ノ間處トシテ流レ至ラザルヲ無
シソレテ處トシテ無不痛此症汗出ルヲ多ケレバ自ラハ陽ス

霍乱

ハ陽スルユヘニ短氣スルナリ湿勝フトキハ水氣カ不行ルホ
ドニ小便不利ナリ陽虚スルニ因テ惡風不欲去衣或ハ身微腫
スルヲアリ陽虚ノ症ト知ルベシ此湯主之

- 人参 白朮 甘草 乾姜 各三兩

右四味搗篩為末蜜和丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸研碎
温服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以
四物依兩數切用水八升煎取三升去滓温服一升日三服○若

臍上氣築者腎氣動也去壅滯シテ氣塞ルモノナリ朮加桂四兩吐是モ多者

設西奈手引草

續編二

霍乱

五十四

烏巢堂裁

去朮加生姜三兩下多者還築嘔アリト云ヘ用朮停者加茯苓二兩渴欲得水者加朮足前人參ト同用ス成四兩半腹中痛者陰加人參補足前成四兩半寒者加乾姜足前成四兩半腹滿陰者去朮加附子一枚服湯理中湯ノ服法後如食頃飲熱粥一升許微自温勿發揭衣被

此湯冬月外感風寒內傷冷物鬱遏停滯而不化嘔逆泄瀉脉沉細或伏スル者ハ屬大陰是霍乱之症也裏寒ユヘニ食滯不化用干姜温内散邪參朮甘草扶陽益氣甘キ得辛不滯辛得甘テ不燥此方本ト外感寒邪内傷冷物為霍乱者設ク後世活用メ温補ノ

芎ノ總司トスルナリ厥逆惡寒ニハ加藜附子附子理中湯ト名ク見于下○霍乱轉筋ニハ此湯ニ凍膠ヲ對ニ炙リ加一錢必用云加火燒石膏

此方他病活用例

傷寒 大病愈後喜テ唾シク久ク不同直中太陰ノ症胸膈滿手足冷了々胃上ニ有寒此湯主之同臍上痛三下利清穀シテ不渴

是内傷冷物致此症同傷寒誤テ下之始テ覺同太陰經ノ症腹痛宜此湯甚則加附子同結胸之症急與此湯同無熱脉沉ナル者

ハ宜此湯不同太陽ノ病二三日不得卧心下結シ脉同傷寒汗下驗用五苓散同微弱ナルハ寒飲在胸中此湯主之同後小便

難者ハ加厚朴茯苓同傷寒少陰不渴ノ吐シ或ハ乾嘔同病愈後別苓不應ハ加附子同スル者ハ此湯去白朮加生姜同無他症只

醫藥手引草 續編二 霍乱 五十五 烏巢堂藏

微熱未盡ルハ其人脾氣久ク
虚スルユヘナリ此湯加蜜毛

傷飲酒

傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏
冒眩暈頭痛如破ハ此湯ニ

加葛 **痢** 蟲注毒痢血色如雞肝心煩腹痛スル者ハ
苗根丸主之虚人ニハ此湯ニ加黃連烏梅 **同** 痢渴ノ食冷

スル者ニハ此湯 **同** 痢血色紫黯數服冷茶ニテ下スト口愈多
ニ加丁香柿蒂 **同** ハ此湯ニ去人參加肉桂木香肉豆蔻烏梅

泄瀉 素ト虚冷ノ泄瀉墮躁引飲轉々泄瀉スル者 **同** 傷酒ニ因テ
ニハ參附湯或此湯ニ加黃連茯苓名連理湯 **同** 每朝泄瀉又

ル者ハ此湯ニ加葛 **同** 寒瀉ハ惡寒身痛腹脹切痛雷鳴鴨漉生
根用酒煮黃連丸 **同** 冷丸穀不化四肢冷此湯ニ加茯苓厚朴 **同**

似痢非痢寒熱不調ノ症或ハ熱積内テ以冷茶冷物冷之或寒積
内以熱茶熱物テ温之寒熱相搏或ハ瀉リ或ハ瀉リ裏急後重又

ル者ハ香連丸或理

腹滿

腹滿時ニ減シ按之而不
痛者ハ虚トス此湯温之

腹痛

内傷生冷
腹痛嘔吐

泄瀉者ニハ此湯

咳嗽

咳嗽呻熱湯テ暫止ム者ノ
ハ冷嗽ナリ此湯加五味子

嘔吐

汗下ノ後
関上ノ脉

遲緩而吐者胃寒

同

寒吐ハ熱ヲ喜ヒ惡寒四肢冷脉細而 **同** 嘔吐
トス此湯主之 **同** 滑此湯加枳實或二陳湯加丁香乾姜 虬厥

ヲナス者此湯炒川椒五粒楸
榔半錢ヲ加ヘ烏梅丸ヲ飲ム

噯氣

胃寒噯氣ハ此
湯加吳茱萸

吞酸

中氣虚弱
而吞酸者

此湯加 **惡心** 胃寒惡心ハ此湯

吐沫

胃中虚寒津液ヲ約束スル
不能故涎沫ヲ吐スルハ六君

子湯加益智生薑

呃逆

雜病呃ヲ發者多屬虚寒此湯
加枳殼茯苓半夏不應更加丁香

吐血

胃虚不
能食化

其氣逆上吐血衄
血者此湯加木香
飲酒過多或熟食二傷ラレ衄血者先用
芽花湯血愈甚則此湯加葛根川芎

吐血 內生冷ニ傷レ血乱
者此湯加葛根川芎
黃疸 寒証ノ色黄而黯ヲ帶者此湯加
茵陳青皮枳實無汗者加麻黃

氣 久癥瘕トナリ腹痛氣
積如臂此湯ニ加阿膠
口舌 口瘡冷菜ヲ服ノ不愈者中焦ノ氣
不足虛火汎上無制此湯ヲ用ニ甚

者附子或ハ肉桂ヲ加フ婦人帶下ハ水ヲ燥脾ヲ健ニ
コレヲス、リ又妙ナリ帶下スベシ此湯加陳皮半夏
產後 產後
霍乱

吐瀉煩渴四肢冷者加陳
皮麥門冬厥冷加附子
痘 痘瘡
初起

吐瀉內傷ニ因者ニハ
此湯去人參加厚朴
虛勞 十有五歲熱甚朝發熱夕醒咽乾腹微
痛起則眩暈心腹雍滯不食脉弦細瀉

傷寒

ナルモノ
此湯主之
則亦損小皆陰脉ナリ先緩治而後急ニスベシ先緩ルニハ此
湯ニ加黃耆芍藥名黃耆湯若大便秘結者此湯加茯苓九朮十
又後急ニスルニハ本丸ヲ用ユ
本丸トハ此方九朮煎菜俱用ユ

附子理中湯 傷寒
治下焦虛寒火不生土泄瀉嘔逆

理中湯加熟附子

按方中用參三錢僅可用附一錢若峻用温補用參一兩方可加

附三錢如尋常小劑用參一錢止可用附三分設不審此而附過

設尋常小劑用參一錢止可用附三分設不審此而附過
續編二 傷寒 五十七 烏巢堂藏

於參下咽之後壯火食氣反招竭澤之殃製劑不可不講此方治藏
厥其人陽氣素虛腎藏真陽衰極者用此症蛇厥ニ似タリ其辨別
ハ唯膚冷テ躁ニ暫クモ無安時跌陽ノ脈ナキ時ハ藏厥也蛇厥
ハ時ニ煩シ時ニ止是以可別藏厥ニハ用此方用灸法ソウニテ
モ厥逆不回者ハ死証也謙云仲景ノ方有理中湯無附子理中湯
理中湯ノ加減ニ加附子ト云丁ハ有レ氏イニ夕附子理中湯ノ
名ハ不立ソレ理中湯ハ内外ノ邪ヲ理スル某也理字ト補字ト
チガヒアリ理中湯本ヨリ温補ノ某ナレ氏仲景ノ霍乱ニ用ラ
レタハ外風寒ノ邪内外ノ邪ヲ理スル為ニ建立立レ
ラレタル方ナリ理ハ治ト同ク内外ノ邪ヲ治ムル合点ニテ指
出テ補中ノ意ニテハナシ然レ某ハ至極ノ補某ナレバ後人用
テ温補ノ物司トス後人加附子名附子理中湯何ニ用ル某ト云

ニ傷寒藏厥陰藏厥ノ証ニ仲景証ヲ云テ某方ナシ藏厥ノ証ハ腎
藏虛寒衰極ノ脾土ヲ不能生治方此方ニ不出故ニ後人用此方
藏厥ノ主方トスル也然レバ理中湯ハ霍乱ノ某附子理中湯ハ
傷寒藏厥ノ某立方ノ本意ハ各別ナリトイヘ氏今日用ルニ於
テハニ方氏ニ温補某附子理中湯ハ温補ノ重劑ナリ畢竟同方
ニ落レ氏立方ノ本意ハ各別ノ某ナリト意得テ居レハ用ルニ
臨テハタラキカチガフ程ニ兼テ可知凡舌中黑ク邊リ白ノ滑
表裏氏ニ虛寒脈必微弱証必寒ヲ恐ル宜此湯

此方雜病活用例

中寒

夏月中寒ハ大順散冷香飲子附子理中湯冷服ス冬月ノ中
寒ハ輕則附子理中湯甚則白通湯通脈四逆湯劇則霹靂散
火焰散救之陰毒陰毒ノ証ニ有二仲景ノ所謂陰毒ハ邪熱中陽

大陰寒ノ證ヲ陰毒此證ニ可用此方其証陰寒極甚ノ証却テ熱

証ヲ見ニ脈モ至極數ニノ裸ニナリテ井中ニ入ト云上編

記ス如シ菜ハ此方或附子散或人參三白散ニ合四逆湯

食滯久ク太便色白ク腸鳴切痛脈沉遲身

冷不渴小便清或綿々腹痛此湯加肉豆蔻

嘔逆惡心如挑膠不臭物ヲ下シ右関ノ脈沈細而緊厚朴木

香乾姜肉桂吳茱萸等ノ菜ヲ可用虛人ニハ此湯主之ナリ

虛冷滑脫脈細皮寒少氣畏食不能言語

或時發虛熱此湯加肉桂肉豆蔻訶子

モ亦不應唯此湯赤石脂ノ

泄瀉

痢

痢

痢

痢

痢

痢

痢

痢

痢

痢

嘔吐

テ吐ス後去乾姜唯參附ニ加丁子木香煎沉香ヲ磨シ入吐立処
ニ定ル是虛寒ト痰氣ト凝結ノ如此附子丁子太温佐ルニ沉香
木香ヲ以通スルノ三乾
若脾冷甚ノ食不進者ハ宜
理中湯不効則此湯加砂仁
面風
寒
姜白朮ハ即泥ムノ三
上逆則面不耐寒先此湯數貼ヲ用テ後升麻葛根湯
ニ去芍藥加入人參黃耆附子益智草豆蔻白芷葱白
丁香理中湯百三
治冬月胃虛中寒不食而嘔吐者○即理中湯

加丁香 ○主治如方下寒吐ニ用

嘔吐

藿香安胃湯百三
治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待腐熟

藿香一錢 丁香人參各二錢 橘紅五錢 每服二錢水二盞

傷寒

生姜三片同煎至一盞涼服

○主治如方下寒吐二用

真武湯 百三十 茯苓 三 芍藥 三 白朮 二 附子 一枚炮去 生姜 三

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服○若效者加

五味子半升細辛乾姜各一兩若小便利者去茯苓若下利者去

芍藥加乾姜二兩若嘔者 此方去附子無溫藥醫通二辨アリト

去附子加生姜足前成半助

此湯ノ正面ハ太陽病麻黃湯桂枝湯ヲ見合ニ可用ニ誤テ大青龍

湯ヲ用テ劇ク發汗スル程ニ汗出ルトイヘ凡病不解反テ大ニ

正氣ヲ傷リ其人發熱シ心下悸シ眩暈シ或身中アチコチカヒ

ククト蠕動シ振々トフラクノ地ニ群ントスルニ用ル菜ナリ

惡寒ニハ去芍藥增附子惡熱ニハ附子ヲ減シ芍藥ヲ倍ス○火

陰ノ病二三日不已四五日ニ至テ腹痛小便不利四肢沉重疼痛

自下利者此有水氣陰寒甚ノ水ヲ制スル丁不能脾ヲ生スル丁

ナラス故ニ右ノ証ヲ見ス小便或利スル丁モ有リ不利丁モ有

リ陰寒ノ氣水ヲ行丁ナラス故ニ小便不利又虛寒故ニ小便ヲ

通シ過ル丁モアリ或咳シ或ハ嘔シ皆水ノ泛濫スル故ナリ○

此方意白朮附子健脾除寒茯苓生姜ヲ兼テ脾ヲ運シ水ヲ滲ラ

ス是人ノ合点シ易キ丁ナリ芍藥ヲ用ルニ至テハ有深意此方

以陰虛寒ノ証トイヘ凡若シ至極ノ虛寒ナレバ小便必清白ニ

ノ禁ナシ反テ不利ノ証不可有此証真陽ノ不足ハ知レタコト

傷寒論

去賣編二 傷寒

六十

烏巢堂

テ陰ヲ固ク護ルナリ此附子湯桂枝附子湯芍薬甘草附子湯ノ
中ニ皆芍薬ト附子ト并用ルハ此意ナリ

此方本證主用例

○夾食ノ傷寒過汗傷血小便秘澀スルニハ枳實理中湯加當皈
芍薬或此湯加當皈

○陰疝ノ傷寒初起自覺小腹滿ト云腰腹痛手足厥冷スルモノ
ニハ此湯主之

○太汗下之後惡寒厥逆水菜不得入口身體痛自利此湯加半夏
下黑錫丹

○陰疝喘唯少陰有之若四肢沉重疼痛小便如常大便自利而嗽
者此湯去芍薬加北五味子乾姜各半錢細辛三錢

傷寒

桂枝人參湯 百三十九

- 桂枝 四兩
- 人參 三兩
- 白朮 三兩
- 甘草 四兩
- 乾姜 三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升温服一升

日再夜一服 謙云此方理中湯加桂枝世間常用之未稱此湯之名

此方ハ太陽ノ証未除ノレバく下レ協熱利トナル協ハ合ナリ
裏虛ニ合スルナリ

此方本證主用例

少陰ノ中風ハ唯寒ヲ畏テ厥冷セス自云腹滿トコレヲ按スレ
ハ濡ナリ大便秘レ小便數ク吐ント欲ノ不吐卧ノ起ント欲シ恍

惚多恐心中懸ツテ如饑稍食スレバ痞脹不寧舌上灰黑或淡紫帶青黃脈來弦細浮弱風性ハ上行スル故ニ手足太陰ニ似タリ實ハ少陰中風ノ証ニ用ユ尤辯別シ難シ此湯加乾姜下虛甚而面戴陽スルニハ加葱白生附子〇夾食ノ傷寒消導菜太過ニノ自利厥逆痞滿スルニ此湯主之

此方雜病活用例

虚勞

始有表邪發散不足ニノ咳嗽ヲ致ス医者誤テ陰虛肺熱トナシ清肺降火ノ菜ヲ用胃ヲ傷テ咳シ畏寒傷食氣口ノ脈緊細沉弦也大劑ノ桂枝人參湯ヲ四五貼モ用并下血スルカ或積沫アリ小腹微痛温按ヲ喜ハ邪下ヨリモル也小劑ノ理中湯ニテ和之七日不止者難治

傷寒

甘草乾姜湯百四十

甘草 四兩

乾姜 二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服此即四逆湯去附子也辛甘合用專復胸中之陽氣其夾食夾陰面赤足冷發熱

喘咳腹痛便滑外内合邪難於發散或寒菜傷胃合用

理中湯ヲ用ベケレ

凡參朮ノフサハヌト云コトカ但シ價貴キ菜ユヘニ調カタキカト云フニ見ルソレニハ并ニ可服此湯理中不便

參朮者並宜服之真胃虛挾寒之聖劑也若夫脈沉畏冷嘔吐自利雖無厥逆仍屬四逆湯證ソレ屬ストイヘバ此湯ヲ用テ矣

此方ハ太陽ノ榮衛凡ニ傷ルノ壞証ニ用ル茶也方後ニ此方ノ所詮ヲ取テ其用法ヲ云是ニ從テ可用然ルニ其味大ニ甘茶ニテ本邦ノ人ニハ全方ハ難用但方意ヲ用テ加減進退ノ可也○傷寒始病微少惡寒發熱坐卧不安胸中煩ニ欲嘔善饑脈弱其症陰陽未詳者輕發表ノ茶ヲ用ユル丁ナカレ先與此湯加葱豉与テ後陽症ヲ見者ニハ用表茶陰証ヲ見者ニハ温茶ヲ用ユ若陰症或夾陰ノ症ナドニ表散ノ茶ヲ用則必誤ル故ニ此湯ヲ以テ試之

此方雜病活用例

吐涎沫而不飲者其人不可不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以温之若服湯已渴者屬消渴

肺痿

傷寒 回陽反本湯

百四十 一陶

此湯治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤欲坐

卧於泥水井中脈來無力或脈全無欲絕者宜用

熟附 乾姜 甘草 人參 門冬 五味子 臘茶

陳皮 面戴陽者下虛也加葱七葉黃連少許用澄清泥漿水

二鐘煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

方下ニ云フゴトク陰寒極リ却テ格陽所見咸ク熱症也即后世云虛寒陰毒ノ証候也故ニ人參四逆湯ヲ用テ的忘ノ劑トス門冬五味子兼テ救陰臘茶ノ苦寒為嚮導仲景四逆湯加猪胆汁之意也戴陽ヲ見ハ加葱白通陽氣加黃連少許亦不過嚮導之意又

入蜜五匙ハ諸菜ノ和セン為ナリ但シ本邦ノ人不及用之也陰盛格陽ノ証ハ皆用冷服

傷寒

回陽救急湯百四十二 即四逆湯本方自有加減法○治寒邪直中

陰經真寒症初病起無身熱無頸疼止則惡寒四肢厥冷戰慄腹疼吐瀉不渴引衣自蓋踏卧沉重或手指甲唇青或口吐涎沫或至無脈或脈來沉遲而無力者宜用

熟附 乾姜 人參 甘草 白朮 肉桂 陳皮

五味 茯苓 半夏 嘔吐涎沫或有小腹痛加塩炒茱萸

○無脈者加猪胆汁一匙○泄瀉不止加升麻黃芪の吐噎不止加姜汁○水二鍾姜三片煎之臨服入麝香三厘調服中病以手足温和即止不得多服多則反加別病矣如後止可用前理中飲加減治之無妨

此方ハ仲景四逆湯加味ノ方ナリ陶氏常ニ仲景ノ方ニ加味ノ改名テ用之麻黃湯桂枝湯柴胡湯白虎湯等ノ加味ト同シ方下ノ証皆直中三陰ノ候也四逆湯ノ方下ニ詳ナリ故ニ方下ニ四逆湯ノ本方ト云トイヘ凡イマデ此方ヲ見レバ六君子湯ニ加肉桂乾姜附子五味子者也然レバ一定ノ法ニモアラズ方後ノ加減モ一定ノ法ニアラス医者以意加減スヘシ無脈者加猪胆

女醫方考卷下 賣編二 傷寒 六十四 烏巢堂主裁

汗下是此加味ハ仲景ノ通脈四逆加豬胆汁湯ノ例ヲ以テ猪胆
汁ヲ加ルトイヘ氏元來仲景ノ通脈四逆加豬胆汁湯ノ通脈ハ
在甘草此ヲ通脈四逆湯トスサヤウナル証ハ多陰盛格陽ノ証
アル故ニ加猪胆汁名通脈四逆加猪胆汁湯於猪胆汁通脈ノ功
ハナシ然ルヲ陶節庵此方ニライテ無脈者加猪胆汁ト云者ハ
仲景ノ方意ヲ不知元來文盲ナル医者ト見ユルアナガチ理ニ
徹ノ經驗シタル者トハ見ヘ又然レバ陶節庵ガ方ニ功者ラシ
キ加味アリトイヘ氏深意ハナシト可意得臨服麝香三厘ト云
モ猪胆汁ノ合点ニテ見レバ深意ハナシトミユル本邦ノ人多
ハ香竈ノ品ヲ忌ム不可用之

傷寒

溫經益元湯 百四十三

治因汗後太虛頭眩振々欲擗地并肉瞤

筋惕及因發汗太多稊虛亡陽汗不止或下後利不止身疼痛者併
皆治之

- 熟地黄 附子 人參 白朮 黃耆 甘草 芍藥
- 當歸 生地黄 白茯苓 陳皮 肉桂

如飽悶加枳殼去地黄○如瘦人有熱去芍藥去附子○利不止加

炒白朮升麻陳壁土去當歸地黄嘔者加姜汁製坐夏○渴者加天

花粉麥門冬○汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地加桂枝膠飴

右水二鍾姜三片棗一枚槌法加糯米一撮煎之溫服

此方十全大補湯ノ加減ニタルモノナリ然レハ可入補益部此部ニハ不可入トハイヘ凡方下ノ主治ヲ見レバ皆仲景真武湯ノ主治ト同シ故ニ此部ニ攝入ス真武湯ト参考スベキタメナリ夫レ汗多ハ陽ノ証ニ用直武湯ト此方ヲ用ルト各有主真武湯ハ附子生姜ヲ以テ補陽用芍藥温補中救陰此湯ハ熟地黄生地黄當歸芍藥ヲ用テ補陰滋潤補陰中ニ以肉桂温補下焦陽一則補陽中存補陰一則補陰中存補陽医者臨病致用ベシ真武湯ハ用茯苓泄水此湯ハ以人參保元氣直武湯ト互ニ考索スベシ

霍亂

治中湯 局百四

霍亂吐瀉

理中湯加青皮陳皮

此方本證主用例
壯男霍亂吐瀉虫衝上心下手足冷脈遲此湯加良姜此方ハ理中湯加青皮枳殼者乾霍亂用之云虫衝上心下故加良姜也

此方他病活用例

傷食

傷食之証頭痛發熱惡寒病似傷寒但身不痛耳此湯加砂仁一錢○食過多而傷停留中脘聞食氣則嘔此湯加砂仁一錢

丁香

同 挾傷飲食生冷嘔

反胃

反胃人胸膈多為冷氣所痞此湯加枳殼砂仁各半錢半夏一錢入米

十粒

同 逆積痛者加水香

生薑

痢疾

噤口痢者有得病即不能食者或因冷乘并某過多不食者却不可拘於赤痢難用熱藥之說當以温中進食為先

宜此湯

加水香半錢或縮砂一錢

水腫

初起多寒濕自痢不食者加丁香

暑

大順散 百四十

治暑熱引飲過多霍亂嘔吐

甘草

乾姜 各五

杏仁 去皮

肉桂 各三

右先將甘草用白砂炒次入姜却下杏仁炒過篩去砂合桂為末
每服三錢沸湯調下

此方暑月冷飲過多二因于泄利嘔吐霍亂中寒ノ病ヲ致ス宜用之杏仁下逆氣ヲメアテニスベシ

中寒

冷香飲子 百四十

治中寒夾陰腹痛瀉利

附子 生

草果

橘紅

甘草

炙各

生姜

五片

右水煎冷服

此方中暑ノ菜トイヘ凡畢竟中寒ノ菜ナリ凡夏月ノ中寒ニ理中四逆ノ類并ニ此方皆用ベシ其辨別ハ臨病ノ間在医者意預辨別ハナシ冬月ノ中寒ニモ可用此方症アルベシ草菓ニ意ヲ付テ考フベシ

中寒

漿水散 百四十

治暑者中太陰少陰泄瀉身冷汗出脈弱

附子

乾姜 炮

甘草 炙

肉桂 各五

良姜

半夏 醋製各二

各五分

右用漿水煎去滓冷服○虛熱喘乏加人參汗多加黃耆五味子

緒論曰泄瀉而兼身冷汗出脉弱其為胃虛陽氣欲脫之兆最急是
 不得不用桂附二姜甘草半夏辛温以理其脾之冷滯也其妙用尤
 在漿水之酸飲以收欲脫之陽氣惜乎世咸漿水ヲ用ルヲ忽ニスルヲ忽之○
 合大順冷香消暑生脉清暑益氣及此方觀之大順用白礞炒甘草
 乾姜杏仁冷香用水浸冷服消暑用醋者半夏生脉清暑之用五味
 子此用酸漿水煎總是因夏月陽氣在外容易耗散之故此ホドニ
ルハ以ノ外ノ誤也ト戒ムルナリ其無故好暖香需飲者可不
 鑒歟

此方亦暑月ノ中寒ヲ治ストイヘ凡必暑月ニ用ト云ニキハ
 リモセズ四逆湯ニ加肉桂良姜半夏者也醋製ノ半夏ヲ用ルハ
 消暑丸ノ意ナリ消暑丸ト考索スヘ緒論妙在用漿水ト云漿
 乳酪ニ點スル淡醋トイヘ凡本邦ニテハ常ノ水ニ少シク醋
 ヲ交ヘ用ベシ是稻若水傳也

泄瀉

二神丸百四十
八本

治脾胃虛弱不思飲食泄瀉不止

破故紙四兩 肉豆蔻二兩

右為末以大肥東四十九枚生薑取東肉搗膏入棗和丸如梧子
 大每服五十九鹽湯下一方飛霞子加木香二兩名三神丸○師

日二神丸之加木香幹旋氣機不如砂仁行氣尤為善運

此方ハ治五更瀉五更瀉ハ五更ノ時必洞泄スル一二三次此腎氣ノ虚ナリ病状中編ニ詳ナリ方後ニ所謂加木香為ニ神丸然レ行氣ノ為ニハ木香ヨリハ縮砂ヲ優リトスナレバ縮砂ハ腎ニ入り行氣ノ内ニ瀉ヲ止ルノ功アリ○加吳茱萸木香減半名四神丸此モ燥ヲ惡ムモノニハ去木香五味子ニ易ベシ

胸痺

薏苡附子散 百四十

薏苡 五兩 大附子 一枚

右二味杵為散服方寸匕

腰痛

青娥丸 百五十

治腎虛腰与季脇痛

補骨脂 炒

杜仲 鹽酒炒斷

此菜胸痞ニ用エ胸痞ハ即胸痛ノ忘治方種々アリトイヘトモ胸中ノ陽虚ニ因テ經脈痞ノ或ハ緩リ或ハ急ナリ薏苡仁經脈ノ痞ヲ舒附子胸中ノ陽氣ヲ復ス故ニ此方主之

右二味為末連皮胡桃肉三十枚青鹽去砂土淨一兩同搗成膏稍入煉白蜜和丸彈子大每服一九空心温酒化下
方下ニ記スル如ク腎虚ノ腰痛ヲ治スル經驗ノ方ナリ腎虚ノ腰痛ハ季脇ト俱ニ痛ム季脇ハ腎ノ部ナリ此モ一ツノ目當トス按ルニ此菜近來賣菜ニ胡桃子圓ト云ハ是ナリ

醫藥考引註

續編二

胸痺 腰痛

六十九

烏集堂

泄瀉

木香散 百五十

治虛寒滑泄不止

甘草 乾姜 各二兩 附子 丁香 木香 肉蔻 藿香

訶子 赤脂 各一兩

右為散每服三錢陳米湯下 世本無乾姜 多當飯 如方下良方ナリ

泄瀉

益中散 百五十

大人小兒俱治妙方

白朮 茯苓 陳皮 各三錢 芍藥 五錢 蓮葉 二錢 乾姜 一錢

右細末白湯送下

此方道三翁ノ製方ナリ經驗ノ方ナリ大抵泄瀉通用或煎湯下

兼子用ルナリ蓋シ泄瀉ハ煎湯ヨリハ散薬ガ能ク應スルモノ
ノグ

瘧

關甫驅邪湯 百五十三

桂枝 三錢 乾姜 一錢 蒼朮 一錢半 半夏 一錢 附子 七分
甘草 柴胡 各一錢

生姜煎服○膈脇衝逆加枳榔一錢○小便短少加茯苓倍桂枝

○大便不鞭加白朮砂仁肉豆蔻各一錢○寒去熱獨發者腎水

虛脾陰弱加鼈甲知母

此方名古屋丹水子ノ制スル所ナリ寒瘧ニ用テ經驗アリ惣体
ヲ寒瘧ト見ツケタラバ脈ノ浮數ナルニモカミヒナク用ベシ
却テ脈數モナホルモノゴ加減ノ法甚ヨレ考ヘ用ベシ

暑

暑

香薷散 百五十
四局

治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度

或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣敏於三焦傳
於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令直邪相干腸胃虛弱飲食
變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐
者有腹痛而先利者吐利俱發者有發熱頭痛體疼而後吐利虛

煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出
或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能治

香薷 去土
介

白扁豆

厚朴

去廉皮姜汁塗
炙令黃各半斤

右麩末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沉冷連喫

二服立効不拘時

活人書方不用白扁豆加黃連四兩劉生薑

汁同研勻炒黃色名黃連香薷散○吳氏方考用扁豆亦名黃連

香薷飲

此方局方二出ストイハ臣局方方下ノ主治未夕信用ニ難キモ

ノアリ其信用スベキモノニハ黒圈ヲ加フ其信用スベカラサルモノニハ黒批ヲ加フ一定セサルモノニハ圈批正ニ加ヘス
○此方夏月傷暑伏暑ニ用ユ暑熱ニ夕へ難ク喉咽乾或吐或利或吐利正ニ起ルモノニ用ベシ香薷暑邪ヲ温散ス暑邪ヲ温散スレバ暑乃涼ク脾ヲ醒マ又能ク小便ヲ通利ノ暑邪ヲ表ヨリ發シ水道ヨリ泄ス暑邪胸中ニ鬱結シ或此症多ク食滯アリ厚朴ヲ用テ散之白扁豆中ヲ和ス蓋シ暑ハ常ニ湿ヲ兼子挾ム此方暑濕ヲ除ク良劑暑病ノ專劑トノ古來經驗ノ菜ナリ暑邪内ニアレバ食ニ傷レ易ク或滯リ易シ故ニ霍乱吐利腹痛嘔逆アリ此方一二劑ヲ煎シ水ニ冷シ服スベシ若シ散菜ナラバ冷水ニテ用ベシ若シ熱服シ或熱湯ニテ用レバ血ヲスルノ恐レアリ○方後ニ記スル如ク活人書ニハ白扁豆無ク黃連アリ暑

邪犯心トキハ心煩大熱水瀉脈數ナリ此症ニハ活人書ノ黃連香薷飲ヲ用ベシ然ルニ右ニツノ症兼子發スルモノアリ故ニ吳氏方考ニ局方活人ノ二方ヲ合シ一方トス臨時テ考ヘ用ベシ

加減

中暑復傷風搖擗不省人事加黃連羌活○伏暑頭痛小便澀濁加茵陳車前○霍乱吐利加藿香木瓜生姜○藏府積熱便血加枳殼黃連赤芍烏梅○小便血加瞿麥穗車前子○壯熱大渴或五心熱加麥門冬淡竹葉根燈草○脚氣作痛行步艱辛加木瓜羌活蒼朮炒枳殼陳皮生薑○中風加防風羌活○手足搖擗加羌活白芷○挾痰加南星半夏○腹痛小便赤加枳殼木通甘草○腹痛加枳子

此方本證活用例

暑者忘黃連香薷飲ヲ用并挾痰ニハ加半夏南星虛加入參黃芪
 傷暑嘔而渴者浸冷ノ香薷飲力或五苓散ニテ飲消暑丸○傷暑
 自汗手足時ニ搖擗スル者謂之暑風此湯ニ加羌活○暑熱ハ膝
 理開テ汗出ツ此湯ニ加藜根○惡心ハ胃中ニ痰飲アリ此湯ニ
 下消暑丸○中暑甦テ後復射香少許○中暑甦テ後醫者冷劑ヲ
 過用レ吐利不止外熱内寒煩躁多渴傷寒陰盛格陽忘ニ似タリ
 此湯ニ加附子冷服

此方他病活用例

痢 暑氣ニ感ノ痢病トナリ甚入自汗發熱面垢嘔逆渴ノ引飲腹
 痛小便不通血痢ヲナス黃連香薷飲ニ五苓散ヲ兼子用ニ

瘧 暑瘧ハ黃連香薷飲
 二加大黃青皮烏梅
頭痛 暑症ノ頭痛ニハ
 此湯加茵陳葱白
水腫 水腫暑ニ因テ
 脹レニ便不利

者ニハ此湯ニ加
 滑石枳殼黃連
瘧疾 痧氣暑ニ因テ小腹脹急
 小便濇ニハ加瞿麥木通

暑

十味香薷飲 百五十五
 百一選方

香薷 二
 人參 黃耆 酒
 白朮 茯苓 甘草 炙
 扁豆

陳皮 醋 厚朴 姜 制 木瓜 各一
 芩

右水煎欲令作汗熱服欲利小便冷服○緒論曰伏暑去黃芪人
 參加黃連藿香澤瀉

前方香薷飲ノ証ニ同クノ虛弱ノモノニ此方ヲ可用此方考諸

醫藥學手引草 續編二 暑 七十三 鳴集堂藏

アリ或發水泡此湯二加蒼朮荆芥防風甚トキハ加肉桂
 若シ身熱頭痛躁乱不寧或身如鍼刺傷熱豆白虎加人參湯鼻
 清涕或鼻口ノ气熱咳感暑咳嗽スルモノハ自汗煩渴又痢
 此湯ニ加川芎羌活或滯寒面垢ク此湯ニ加五味子
 暑痢腹痛甚ク食不進モノニハ此痰喘痰喘氣急痞塞茶不得入
 湯半貼藿香心氣散半貼合用之七ノ二ハ急ニ此湯ヲ煎
 シ麝香少許ヲ入ル

暑

益元散 百五十七傷寒直格
 即天水散俗名六一散

滑石 六錢

甘草 一錢

治暑濕熱蒸小便不利

右為極細末用清水調服。緒論曰發汗加葱豉安神加辰砂止
 泄加炮姜消斑加青黛

此方中暑身熱煩渴小便不利者用藥也暑着心故煩熱而小便不
 利吳氏方考云滑石性寒而味淡寒清六府淡利膀胱用甘草滑
 石性大寒恐傷中气故用甘草和之謙云下盛之熱阻隔而小便澹
 者主之○凡平人中暑身熱背惡寒面垢自汗大渴引飲煩躁悶乱
 痰逆惡心胸膈不快或吐瀉轉筋小便秘澹者此內外皆熱或昏憤
 困倦指頭微寒此證皆并二五苓散二合此散謙云此合方暑病之
 總司トスベシ○風中濕ト爵之自汗過多或渴之或不渴小便黃
 色此散ニ加葱豉

此方他病活用例

温熱病

非時暴寒惡寒頭痛脈浮緊者此散二加葱白香豉方後所謂發汗加葱豉ト云ハ是ナリ此証重キ片ハ源膈散ニ去

大黃

芒硝加葱豉脈兼弦緊重子テ客邪ニ感スレ表發汗後探リ吐シテ取汗同

探リ吐

此散ニ加葛根石羔葱白類同餘熱未退此散小柴胡湯ノ加減ニ宜シ或ハ躁メ不得熱茶ヲ用テ汗

眠微熱

渴スルモノハ五苓散ニ去肉桂合此散同不出モノニハ

此散

ニ加舌紅色ニメ舌中ニ紫色ノ瘡生シ燥クハ温疫此

薄荷葱豉

同舌多シ黃連解毒湯ニ加弦參薄荷并ニ此散主之嗽而心煩スルニハ此散ニ加辰砂方後

嗽

ニハ安神ニハ加辰砂トハ此證ノ類也同了甚ク數日ノ後脈

大ニメ

不數參朮湯ヲ以テ此散ヲ調服ス數日ノ後倦怠甚ク咳逆ヲ發ス此下焦陰虛ナリ前方ヲ用并以煉蜜為圓某典ハ咳逆

逆ヲ發ス

此下焦陰虛ナリ前方ヲ用并以煉蜜為圓某典ハ咳逆

止三利

夏月泄瀉或兼嘔吐生姜汁ヲ以テ此散ヲ調服ス止ム也泄瀉方後ニハ所謂止泄ニハ加炮姜ト云ハ此類ナリ

淋閉

ニハ此散ニ加山梔子木通夏月ニハ茴香ノ煎湯ヲ以テ此散ヲ調服ス同

八茴香

ノ煎湯ヲ以テ此散ヲ調服ス同ハ此散ニ加木香茴香

柳同

急痛ニハ前ノ濁小便數甚中痛ニハ宜此散不寐煩メ不得

散ニ加

痛風氣虛表實骨節痛者ニ婦人暑月崩漏ニハ此

牛黃

痛風氣虛表實骨節痛者ニ婦人暑月崩漏ニハ此

臨月

ニ加當歸川芎黃芩陳皮白朮香附子各一錢同乾瀼瀼下

五分

甘草三分煎シ此散一錢ヲ調服ス虛人加人參同乾瀼瀼下

ルコト

不能ニハ此散七錢冬葵子五錢末トシ毎服二錢ヲ熱湯ニテ服ス

產後

熱ニ屬スルモノニハ

錢末

トシ毎服二錢ヲ熱湯ニテ服ス

產後

熱ニ屬スルモノニハ

熱ニ屬

スルモノニハ

此散二加枳殼枳榔木
通麻仁冬葵子煎服

產後

產後泄瀉挾熱二八腸垢有テ大便瀉
リ痛三一陣瀉一一陣口乾クモノハ

此散小兒小兒尿血二八甘草升麻ノ

痘疹

痘疹初起渴ノ飲
水此散ノ類主之

主之尿血煎湯ヲ用テ此散ヲ調服ス

小兒

大暑ノ後吐瀉身熱或乳

麻疹初起譫語二八此散二加辰砂

吐瀉

食ニ傷ラレ大使色黃白

咳セバ加麻黃杏仁麥門冬石羔
ナルモノ二八食前二用

暑

生脈散

百五十八
千金方

治暑傷元氣喘促煩渴

人參 五錢

麥冬 去心 三錢

五味子 二錢

右用長流水煎温服無時

孫真人云人參用
井水煎服之無効

緒論曰孫甫人令人夏月常服生脈散則百病不生東垣云夏月

服生脈散加粳米甘草令人氣力湧出劉宗厚若脚膝痿弱者更

加酒黃柏則筋力倍常

此方ノ主治方後二記ス如ク畢竟夏月ノ養生茶ト意得ベシ

此方他病活用例

傷寒

舌色中黒ク乾燥此

同

津液枯竭舌胎燥黒胎厚ニテ小便盛
乾二八此湯二合黃連解毒湯赤暑

汗多膀胱閉塞スル

小便

夜二至テ發熱スルハ

八此湯二合五苓散

難

當飯補血湯二合此湯濁
濁二八減桂

醫方類聚

續編二

暑

七十七

烏巢堂藏

五苓散
二合此湯

加減

○一方加灸黃耆炙甘草黃柏夏月服之氣力湧出○本方加黃芪當飯生地黃名清肺生脈散治暑邪入肺咳嗽及脾胃虛弱氣喘促○本方加杏仁陳皮姜東名加味生脈散治手足厥冷之病脈伏喘息者危姑以此救之○本方加陳皮白朮甘草姜東名解暑補氣湯治人遇勞倦辛苦用力過多即服此藥二三貼免內傷發熱之病

暑

清暑益氣湯

百五十
九東垣

治長夏濕熱蒸人煩熱喘滿小便赤

黃耆一錢
酒炒

人參

白朮姜製

蒼朮

泔浸去皮
麻油炒

升麻醋洗

神麴炒

陳皮各五分

甘草炙

當飯

麥冬去心

黃檗

鹽酒炒
冬三分

五味子九粒
研

葛根酒煨

澤瀉

青皮各二分

右水煎徐徐服

○緒論曰本方去青皮葛根加黃連茯苓柴胡名

清燥湯

本方見燥門

○暑令行於夏至長夏則兼濕令矣故此方兼而

治之暑熱蒸炎表氣易泄而中氣

者又為諸氣之原黃耆所以

實表而固易泄之氣即兼當飯以統養脾之血白朮神麴甘草所

以調中而培諸氣之原酷暑橫流肺金受病人參五味麥冬以補肺

人一以清肺門以收肺子此三物名為生脈也以氣虛則脈虛傷暑之

證未有脈不虛者故用補氣之藥以復脈經所謂扶其所_肺不勝也
火盛則水傷故又以黃柏澤瀉清其化原液以則口渴故又以葛根
升其胃液清氣不升升麻可升濁氣不降二皮可理蒼朮之用為兼
長夏之濕也

此方考方後緒論ニ詳ト云ヘ凡北山氏口訣ノ頭書ニ述ル処ノ
方考極メテ的實也從之受用スベシ其大意凡元氣虛乏ノ人暑
濕ニ傷ラレ兼ルニ食滯アルモノニ此方ヲ用ベシ人參白朮黃
耆升麻當歸陳皮甘草ハ補中益氣湯ニ去柴胡者也麥冬五味子
人參ハ生脈散ヲ兼テ救肺蒼朮澤瀉除濕泄濕神麴青皮化食滯

黃柏去濕熱葛根止渴若シ暑邪ニ傷ルト云ヘ凡無濕熱小便
赤澀ナラス亦食滯ヲキモノハ此方非合劑意得用ベシ
○傷寒論太陽ノ中暍發熱惡寒脈弦細抗溼ノ條ニ證有テ治方
ナシ徐春甫此方ヲ以テ充之此癸子古之秘ト先輩何レモ褒美
ス然リトイヘ凡北山氏ノ方考ヲ按スルニ此方未右ノ證ニ的當
ナラス謙ニ云傷寒論ニ證ニ的當スルハ張三錫ガ近世清暑益氣湯右
ノ證ニ合劑トス故ニ近制清暑益氣ヲ以テ此方ノ後ニ記ス

此方他病活用例

虛勞 百二十方按ニ云一女子十七八歲夏ノ末羸瘦骨立四肢倦
怠食少肌熱晝夜嗜臥形如虛怯脈細緊ニノ數他瘵不効加

地骨皮黃連三十四貼ニシテ為全人謙云此證虛勞ニ似テ實ハ
虛勞ニ非ス故ニ如虛怯ト云脈七陰虛火動ノ脈ニ似テ元來陰

續編二 暑 七十九 烏集

虛火動ニ非ス此證内傷勞倦ニ暑氣ニ中リテ草臥タル證ナリ
此証常ニ有ルナリ羸瘦骨立ハ注夏病ノ類ナリ四肢倦怠食
少肌熱ハ内傷ノ本証ナリ声嘎ハ肺金暑邪ノ火熱ニ傷ルナ
リ嗜卧ハ物休ノ草臥ナリ脈細緊而數ハ陰虛火動脈ノ如シト
云ヘ凡大抵十七八歳ノ女子ニ陰虛火動ハ少キモノナリ尤決
メ有ルニジキコニハアラ子ドムサト腎虛ハセヌモノナリ其
上此脈精ヲ取テミタラバ脈ニヨヒ処ガアルベシ其ナハ此案
ニ書落シタルトミヘタリ此内傷病ノ陰虛火動ニニギルノ症
ナリ加地骨皮肌熱ヲ解ス加黃連補劑ノ内ニ直ニ心火ヲ清ス
ルタメナリ能々考ベシ

頭痛

一男半歳患頭痛痛甚而晝夜不寐少モ中頭於枕則氣上於
氣衝而欲絶故常不側卧倚節息捧兩手抱頭他治不効予六

月初試脈細數無力加芎細本酸五六貼而全愈謙云此病人半
年頭痛スルナレバ正月比ヨリ頭痛トミユル此内傷補中益氣
湯ノ症ナリ然ルニ其時節ノ医者誤テ不與ソレユヘ不愈ソ六
月ノ初二至ル此時ハ暑氣最中ナレバ時ニ從テ此湯ヲ用テ愈
ルナリ加川芎細辛薑朮頭痛ノ加味ナリ加酸棗仁晝夜不寐故
也サレ凡此加味 **脱肛** 一男大腸頭破四形如錠甚腫痛下血時六
ニ限リハセヌツ 月中旬加黃芩桑白杏仁核柳得奇妙其後
再三發每發皆得謙云脱肛ニ補中益氣湯ヲ用ル丁常ニアリ然
ルニ暑氣ノ時節ナレハ此湯ヲ用タルモノナリ **本証補遺挾暑**
熱則腠理開而汗泄於外加木香

暑

近製清暑益氣湯 百六十
六要

醫家手引草

續編二 暑

八十

烏巢堂藏

人參 白朮 麥門冬 五味子 陳皮 甘草

黃柏炒 黃芪蜜炙 當歸身

右隨人加減姜枣煎

太陽中暈者發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細其遲小便已灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前肢齒燥若發汗則惡寒甚加溫鍼則熱甚數下之則淋甚。謙云傷寒論二如是アワテ治方ハ不載故ニ先輩東垣ノ清暑益氣湯ヲ以テ此證ニ充然レトモ清暑益氣湯ノ條ニ云如ク此證ニハ清暑益氣湯ハトクトアハズ醫學六要ニ此湯ヲ載ス六要ニハ此湯ガ此證ニ合劑ト云テハナケレモ新ク此湯制シタルハ證ニ此湯ヲ以テ此症ニアツル

ト三ユル傷寒論太陽ノ中暈ト云ハ表証ナリ脈ハ浮ナルベキニフウハナクテ弦細其遲ナルハ元氣虛ノ脈ヲハリダスカ力無ゾ小便シ終テブズトスルハ内ニ伏スル火ナリ手足逆冷ハ陽氣虛スルナリ前板齒燥クハ此證ノ本症ナリ此方補元氣涼時火若シ病他忘ナリ且元氣弱ク暑邪ニ傷ラレタル計ノ證ナラバ此方ヲ用ベシ若シ濕ト食滯トヲ兼子小便赤澀心下痞脹セバ本方ノ清暑益氣湯ヲ用ユベシ

暑

消暑丸 百六十局

治傷暑發熱頭痛瀉痢煩渴

半夏丁勅米醋 五升煮乾

甘草生

茯苓各半

續編二 暑

八十一

烏巢堂藏

烏巢堂藏

右為細末姜汁和丸無雜生水每服二錢不拘時沸湯送下

○續論曰消暑在消其濕故於二陳湯中除去橘皮而倍用半夏為

君也又以半夏性燥故用醋煮以檢酸味其性而使之性下行性且

其不耗收斂スル津液矣其用生甘草茯苓各ガチキニ滌痰ノ其

上レバ滌痰ノ其トナル今ニ陳湯ヲ壹ノ此丸トスレトモ元來

二陳湯ガ滌痰ノ其ナレバ如是壹メ此丸トナリテモ本ニ陳

湯ノ滌痰消濕ノ本意ヲ生甘草茯苓者不忌滌痰消濕之本意

忌レヌト云コトナリ也去橘皮者惡其上升耗氣也夏月之氣易於耗散一切破氣藥

皆當禁用不獨此方之橘皮耳

濕

羌活勝濕湯百六十二

治風濕上衝頭痛項似拔腰似折

羌活 獨活 防風 川芎 藁本 蔓荊子 研

甘草 各一錢 生薑 三片

古水煎熱服緩取微似汗過汗則風去濕不去也如無頭痛去薑

此方秋暑瀉利此方主之○中暑伏暑惡心スルハ胃中ニ痰飲アリ局方ノ香薷飲ニテ飲此丸○伏暑煩渴而多熱痰者於此圓内每兩入黃連末二錢名黃連消暑圓或二陳湯或小半夏茯苓湯並可加黃連一錢

濕

荊子換蒼朮

此方ハ治風濕之藥也其證如方下述方考ハ次ノ除風濕羌活湯ノ下ニ載医通此湯与除風濕羌活湯之ニ方ソキ合セテ論ス詳考ヘシ凡論濕病虽有傷濕中濕之辨サヤウニ意得ル寸ハイカフ入組テムツカシクナル只濕在上在外在內在下ヲ分別シテ療治セヨ此湯ハ濕在上ヲ主トス次ノ除風濕羌活湯ハ濕在外ヲ主トス

此方本證主用例

風濕自汗肢体重痛渴而小便不利者五苓散不渴而小便不利者邪在經此湯或除風濕羌活湯選用○傷濕兼テ感風片ハ眩暈嘔逆煩熱不欲去衣被或額上有微汗或身体微腫汗漬衣當風坐卧

多有此證麻黄杏仁苈子甘草湯或此湯ヲ用テ少發汗

此方他病活用例

水腫

因患瘡乾瘡ノ某太早ノ身腫上半身甚者此湯加升麻白芷紫蘇下半身甚者五苓散ニ用蒼朮加木瓜大腹皮

腰痛

腰痛夾濕熱者

脊痛

太陽經脊痛項強ニハ此湯主之服浮緊ナルハ傷寒也麻黄湯主之沉緩為風濕五苓散蒼朮ヲ換桂

木ヲ換桂

肩背足太陽經ノ氣不行故也此湯主之謙云百

汗

枝加羌活痛

二十方以此湯名通氣防風湯治肩背痛

盛ニ雨濕ノ氣ト相合ノ汗出不止

臃腫

属風熱者葛根甘草桔梗升麻薄荷属濕熱者麻洪

大也此湯加甘

草桔梗黄芩

黄芩

賣編二濕

八十三

為集卷

濕

除風濕羌活湯百六十 治風濕相搏一身盡痛日晡發熱

羌活 防風 柴胡 藁本 蒼朮 甘製各一分 升麻 八分

生姜 一片

右水煎空心熱服覆暖取微汗○按醫通曰羌活勝濕湯與除風

濕羌活湯同源立方異派方ノ此羌活勝 治頭項之濕故用羌防

芎藭一派羌活勝濕湯ノ芎藭以祛上盛羌活勝濕湯ノ症之

邪熱雖熱上ニアリト云ヘ凡濕ハ本下ニツクモノユヘ獨活

主ル 上浮濕本下著所以復用獨活透達少陰之經其妙用羌活勝濕

湯ノ尤在緩取微似之汗故劑中加用甘草ハ諸藥ノ氣ヲ緩ス

ノ性ヲ緩ノ濕邪モ亦緩ク去ルヤウニスルナリフヨク汗孔

ヲ開テ急ニ風邪ヲ去レバ肌膚腠理ガ弱クナリテ濕カ次第

ニ内ヘクトシニマフテ風計去テ湿 甘草以緩諸藥辛散之性

ハ不去ヤウナリトナルト云フナリ 則濕著之邪亦得從之緩去無藉大開汗孔急驅風邪之法使肌

腠餒弱無方濕邪因之内縮但風去而濕不去也其有腰以下此

リ寒濕ニ中ルモノ 重寒濕之邪雷於陰分也本方羌活勝加防

二ハ加味スルコト云 已以逐濕必兼生附以行經或此ヨリ濕熱見身重腰沉沉然濕

熱之邪遍於陽分也本方羌活勝加蒼朮以燥濕必兼黃柏以清

續編二 濕 八十四 烏集堂藏

熱非洞達トコオリナ長沙仲景木附湯桂附挂枝附梔子梔子

栝皮栝皮等方右ノ方傷寒不能論ノ方ナリ效用羌活羌活勝濕湯ハ右云傷寒湯論ノ方ヲ能クナラヒ用

ヒタルモノナリ其法此ヨリ除風濕羌其餘活湯ノ方考ナリ風濕羌活湯治外淫濕湿外

テ上二無レバ頭項ノ痛ム之濕ノ痛ム而無上衝頭項之痛則川芎二味頭痛

無レバ此菜ノ痛ム二蔓荊無預也亦無濕著腰疼之患與獨活腰痛尤

預ルコトナシノ菜無交涉獨活ニ交リワタ故但除風濕羌用羌防藁姜益入升柴

蒼木開提外へ發散周スルコト身周閉スルコト膝周則スルコト濕スルコト邪周自スルコト無スルコト所スルコト容スルコト而スルコト外スルコト散スルコト矣スルコト

此方ノ主治方下ニ詳ナリ方考ハ方後ニ詳ナリ

下血

神木湯百六十四局方

治風木之邪内于濕土泄利下血

蒼木油浸炒

藁本各一川芎各一羌活各一

白芷各一甘草各一

細辛各五

生姜二莖葱白連鬚

右九味水煎熱服○鑿通曰按神木湯純用風菜與羌活勝濕相

去不遠如何可治泄利下血蓋火淫陽明之血則燥金受傷祇合

清涼最嫌風燥若風乘太陰之血則濕土被鬱法當升散切戒寒

涼當知陽明來者色必鮮明太陰來者色必清稀其源各異故其治

亦迥乎不侔究其旨不越風能勝濕之義蒼木專主木邪乘土故

能治外内諸邪以風木之邪内于土藏故用羌活止辛等風柔兼
 川芎以引入血分甘草以調和氣胃敷布有權泄利下血自止蓋
 汗即血之液奪其汗則血中之濕熱邪氣悉從外泄而無内滯之
 患矣

此方ノ主治如方下方考ハ方後ニ論有テ詳ナリアレデ殘ル
 ハ無レ氏未熟ノ者ノタメニ方後ノ論ノ大意ヲ述フ此大意ヲ
 ノミコメバ方後ノ論モヲノレト合点ユクヅ此方ハ羌活勝濕
 湯ト近ク似タル方ニモ羌活勝濕湯ハ上ニ在ルノ濕ヲ治シ此
 湯ハ泄利下血ヲ治スルト云ヘバ上ト下トノ大違ヒアルヤ

濕并下血

ウナレモ火熱淫ノ下血スルニハ可用清涼藥風藥ハ大ニ忌ム
 ツノ見分ケハ下血ノ色ガ鮮明トハナリト赤シ因濕下血ス
 ルハ血ウスクメ濃カラズ色不鮮明療治ハ風勝濕道理ナレバ
 用風藥也ソレデ此湯ヲ泄利下血ノ藥トスル蒼朮ハ除濕ノ本
 藥ナリ羌活藁朮白芷細辛ハ風藥ナリ濕ニ勝ツベシ川芎ハ諸
 藥ヲ引テ血分ニ入ル如此ニモ發汗スレバ濕邪ガ外ニ發出シ
 テ内ニ滯ル丁無クノ下血自止ムナリ

升陽除濕防風湯 即升陽防風湯百六十五

治風濕殭泄及腸風滯下便血

防風 二 蒼朮 煎浸去皮 飯上蒸

白朮 土 茯苓 白芍 各一

生姜 一 片

續編二 濕

八十六

烏集堂藏

Kitasato Memorial Medical Library

本草綱目卷之二十一

右水煎熱服取微汗。○醫通曰陽陷於下則成飧泄濕犯於上則令頭痛清濁倒置而然故用風葉以勝濕也然風木之病稍加湯常二是ヲ加味スルガヨシ桂枝甘草監制其功尤健スルガヨシ

此方ノ主治方下ノ証ニ用蒼朮白朮除濕健脾茯苓滲濕芍藥伐風木之邪多ク用防風テ君藥トスルハ濕氣ヲ散シ鼓舞上提ノ飧泄腸風滯下便血ノ患皆愈ユ右ノ神木湯ト此湯ノ二方ハ除濕ノ藥ナレ氏下血ニ多用ルユハ諸血ノ部ニ入ルベケレ氏元來カ除濕ノ藥ナルユハ二濕門ニ攝入ス故ニ方ノ上ニ濕并ニ下血ト記スナリ

除濕湯 百六十六 百一選方 治寒濕所傷身體重着腰脚酸痛大便溏泄小

濕

便或澁或利

- 半夏麴炒
- 厚朴姜製
- 蒼朮米泔製
- 藿香
- 陳皮
- 白茯苓
- 白朮生
- 甘草炙

右姜東煎食前服去白朮茯苓即不換金心氣散治瘴氣山ニ近キヲ山嵐ト云海ニ近キヲ瘴氣ト云共ニ不正ノ氣ナリ濕傷之要方也

此方ハ濕着脾四肢浮腫不能屈伸太便多溏是醇酒厚味水濕等ノ物ニ傷ラレ濕内ヨリ中ル此方主之○謙云濕在上在外羌活勝濕湯除風濕羌活湯主之濕在内ハ此湯主之濕中下躄腎著湯主之然ルニ按證治準繩風寒暑濕皆能中人唯濕氣積久留滯關

醫藥手引草 續編二 濕 八十七 烏巢堂藏

節不如風寒暑暴中濕ノ證關節重痛浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人其脈必沉而緩或沉而微細除濕湯主之ト云如此ナレバ此一方諸濕通治ノヤウニ聞ユル此方元來不換金正氣散ニ加味ノ方ナレバ風寒濕ノ三ツニ用テ無所道痰食氣滯皆此方ノ主治ナリ雖然濕之中人大率在上則嘔吐頭重ク胸滿在外則身重ク浮腫按之如泥在下則足脛浮腫大便溏泄ス在內則腹脹中滿痞塞ス是上中下內外ノ辨ナリ治方此意得アルベシ一緊ニ此一方ニ拘泥スベカラス

此方本證主用例

此方四君子湯理中湯桂枝湯合劑ノ用ルコトアリ証ニヨルベシ○傷濕テ兼感風レハ惡風不欲去衣被額上微汗或身體微腫此湯ニ合桂枝湯發微汗

濕

此方他病活用例

水腫

腫病不一有陽水有陰水并先此湯ニ加木瓜大腹皮一全身之間只與足面ト浮腫ス朝ハ面ノ腫レ甚ク晚ニハ足ノ腫甚面腫ヲ為風足腫ルヲ水トス是則風濕ノ所致ナリ此湯ニ加木瓜大腹皮白芷テ通用ス或ハ蘇子降氣湯ト此湯ト合劑ニノ用之風寒暑濕足常踏之為脚氣不問遠近

脚氣 乾濕等之事此湯加木瓜檳榔白芷

同 濕勝則腫ル此湯ニ加防己檳榔

四苓散

百六十七

五苓散去肉桂

此方五苓散ノ變方後世ノ方ナリ濕熱者宜之サレハ五苓ノ妙

肉桂ニアリ此意得アルベシ

此方他病活用例

水腫

玉莖腫脹健裂不休者濕熱小便實熱乃膀胱火動合三黃下流者如山拖木通金鈴子不禁湯加五味子山茱萸少許

同

虛熱合四物湯
如山拖升麻

泄瀉

胃苓湯百六十八

治飲食停積浮腫泄瀉脉證俱實者

平胃散合五苓散生料煎服

醫通曰平胃散

本平胃氣之燥卓若胃ノ氣ノ燥卓ニテハ無テ脾土ノ力虚ノ食ヲ消シ運

ラスコナラザルニハ因脾土之虚不能消運又須稍籍參苓如人參茯苓ノカラヲ籍テ

養胃之類

養胃湯ノ類宜シ

然復有土衰不能分利而

脾土衰テ水穀ヲ分利スルコトナラ

又ニハ理中湯ヲ合スベケレト人參ヲ用レバ氣塞テ悪キ症アリソレニハ五苓散ヲ合メ脾ヲ健ニス正氣散ノ紫菀藿香ノカラカリテ客邪ヲ散スルト此兩ツハ後世アチコチト移シ易ルコトナラ又例ナリ成腫脹且氣雍不

勝參朮難合理中者乃合五苓以健運水土與正氣散之假種霍

以散客邪兩不移易之定例也

本

氣虚加人參同虚寒加乾姜同

同水瀉加滑石

謙云小便赤澀甚者可加味

同食積加神麩麥芽山查同痰

多加半夏同濕勝加防風升麻痢暴痢赤白相雜腹痛裏急後重

加木香檳榔

本

久瀉加升麻同腹痛加肉桂

黃胖

黃胖者飲食無

味四肢無力行步倦怠脉濡而濡是也減肉桂加藿香半夏大腹

山查蘿蔔子三稜莪朮青皮腫水脾胃不和而黃腫去芍藥黃連加

肉桂如小便赤澁加滑石本按此方五苓散與三胃散等分故傷

食之泄瀉專可用焉謙云可若瀉不止加訶子本夏月之泄瀉去

肉桂加芍藥黃連子常肉桂生減用之何者肉桂大腸之引經也

本夏月謙云痢病テハ無キカ雖先瀉下而後澁滯當用此湯本

夏月謙云濕熱甚キナ瀉下身冷咽乾不欲衣按伏熱在內故也

合解毒湯而安風痛夏月患痛風按因暑濕而身體骨節痛故用此

湯而愈腫水水腫小便澁少大便結是乃食滯與濕熱所為也加枳

榔神麴山查砂仁大腹皮香附入姜燈煎服而安。或語云此方

四五月至八九月專用之何者暑濕之故也

此方濕瀉小便赤澁二用ル藥其妙在肉桂

此方他病活用例

水不伏水土而腫ル脹脹滿初起多寒濕自利スル者瘧身體重痛

腫者ハ此湯主之滿加山查麥芽謙謂可有食積肢節煩疼

寒熱而嘔逆スル者ハ温痢白痢初起裏急後重頻上廁或所下少

瘧也此湯加羌活紫蘇キハ温熱凝滯ノ所致此湯加木香宿

殺菌素引草

續編二

泄瀉

九十

烏巢堂藏

四肢重着或大便泄瀉不食スルハ是濕勝也此湯主之四肢重
脈緩四肢重ク泄瀉スルハ是亦濕勝也此湯主之黃疸黃疸
急脾胃不和食少ハ宜此湯小便赤澁ハ加滑石同并年平素過
酒面目一身黃色不食尿如麩汁口渴脈五動餘如有力與此湯愈
加山梔葛根黃柏嘔吐脾經濕痰鬱滯上中ノ二焦時々惡心吐出
清水或如豆汁者ハ此湯加半夏枳椇小兒吐瀉小兒吐瀉小便不
清者ハ此湯加肉豆蔻為丸米飲ニテ下ス暑傷暑瀉而渴者生
料此散和生料五苓散各半貼名胃苓飲間進來復丹

濕

滲濕湯 百六十
九局

治濕滯經絡腰下重者而痛

理中湯去人參加蒼朮茯苓橘皮丁香姜枣

醫通曰然病有傷中之不白傷濕者足太陽膀胱經也中濕者足

太陰脾經也或足少陰腎經傷膀胱則煩渴引飲小便不利而腫

脹五苓散著脾則不能屈伸大便多澀此醇酒厚味水濕等所傷

濕從內中也除濕湯著腎則腰疼身重小便不利此醉卧湿地或

下體濕衣所傷濕從外中也腎著湯濕盛身疼小便不利體重五

苓飲加羌活

此方理中湯ヨリ変レ來ル大抵中焦ノ湿ヲ去ル葉ナリ腰重痛

ニ用ベシ丁子ガアレバ平胃散ナドヨリハ温劑ト意得ベシ嘔
噦ナトアルニヨシ

腰痛

腎著湯

百七十
三因方

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

○方後医通曰云云此論ハ此方ニ預ル丁ニテハナシ傷濕中濕ノ辨ヲ述テ治濕ノ物體ニ預ルノ丁ナリ字面ノ如シ傷濕ハ足太陽膀胱經ナリ其證煩渴引飲小便不利ノ腫脹ス濕外ヨリ傷ラル、五苓散主之五苓散ハ足太陽膀胱經ノ表裏ノ劑ナリ故ニ至之羌活勝濕湯除風濕羌活湯モ外ヨリ傷ラル、ノ濕ニ用ル其内濕上ト外ニ在テ一向ニ發散スル藥ナリ五苓散ハ發散ト利小便トニツラ兼テ表裏ニカ、ル中濕ハ足太陽脾經ナリ其症不能屈伸大使多溏濕内ヨリ中ルナリ除濕湯滲濕湯ノ類主之或足少陰腎經ニ中レハ腰痛三身重小便不利腎著湯主之是治濕ノ大抵ナリ濕盛身疼三小便不利體重者五苓散加羌活

乾姜炮

茯苓各四兩

甘草炙

白朮各貳兩

每服四錢水一盞煎七分空心温服

是即金匱要略ノ甘薑茯苓湯ナリ濕少陰腎經ヲ傷リ腰痛身重小便不利是レ醉臥湿地或下体濕衣ニ傷ラレ濕外ヨリ中ルナリ方下ニ腎虛傷濕トアリ濕腰ニ中ルハ腎虛ナレト云モ腎ノ外郭ニ中リテ内真陽ニ傷レハナシ腰冷如坐水中トハ虚寒ノ甚キ故ナリ或腰ニ五千錢ヲ帶ルガ如シト云ヘルモ腰重キト甚キナリ小便自利スルハ虚寒甚キナリ大抵ハ小便不利忘ナレト云ヘルモ此藥ノ忘ハ是非ニ腰カ痛カ力重キカ腰ニ病アル程ニ腰痛門ニ入ルナリ或腰腠スルモノ此方主之

醫方類聚

續編二

腰痛

九十二

烏巢堂藏

此方本證主用例

大處卑濕雨露侵淫為濕所著腰重如石冷如水喜熱物耐不渴便利飲食如故此方主之

此方他病活用例

衄血傷濕而衄此湯加川芎各除濕湯吐血濕溢血傷能令吐血此湯加川芎此乃濕毒鬱於經絡血溢妄行眩暈傷濕頭暈此湯加川芎痿脾濕流三腎之傷り發痿厥者此湯加草薢解

濕

滲濕湯 百七十一

治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛癢

熱惡寒或多汗惡風或小便不利大便溏瀉

- 人參一錢 白朮炒三錢 白芍酒炒一錢 乾姜炒一錢 桂枝五分 大附炮三分 甘草炙五分

右姜枣煎服

此方附子理中湯十桂枝湯ヲ合方ニノ加人參モノナリ桂枝附子ノ分兩少ケレ在畢竟右ノ合方ト心得ヨ論ニ不及大温補ノ劑虚寒ノ證ニ用ル葉ナリ方下ニ述ル所皆虚寒ノ證脉无定テ知ル沈緩或沈微ニノ弱ナルヘシカヤウナ方組ハ虚寒ノ證ニ出合ヘハ此方ヲ調合セント思ハズノ自然ト此方ニナルモノソサレ在古方ニ如此各力立テアレハイヨイヨヨリドコロアリ前ニ出ル所ノ局方ノ滲濕湯ト虚實ヲ考ヘ用ユベシ

濕

清熱滲濕湯 百七十二

治夏月濕熱痲困煩渴泄瀉弱赤

- 黄蘗鹽酒炒 蒼朮去皮同 白朮生 茯苓 澤瀉 黄連酒炒

醫方類聚卷之三十一
肉桂少許氣虛喘乏加人參脈虛合生脈散內傷生冷加炮姜

甘州炙五分 竹葉十片

右水煎熟服小便利為效老人虛人加

按此本二妙合五苓之半加黃連甘草以夏令之濕熱良可法也

滲濕湯ノ方名多シ此ハ濕熱ニ用ル滲濕湯ナリ凡治濕ノ某前
ノ滲濕湯ニテニテスム此カラハ濕熱ヲ治スル某ヲ載スル濕
ヲ治スルニ先ツ寒濕ト濕熱トノニツヲ辨別スルカ治濕ノ肝
要也此サヘ別ルレハ大ナ仕損シハナイモノゾ此方ハ方後ニ
云ゴトクニ妙散ト五苓散ノ半ヲ合シタルモノナリ方下ニイ
ヘル煩渴溺赤ナド皆濕熱肝要ノ目アテナリサラニ可考脈也

痺

當歸粘痛湯 百七十三 蘭室秘藏

治濕熱走注遍身骨節煩疼胸膈不利足

脛赤腫重痛

羌活 甘草 黃芩 茵陳 人參 苦參 升麻 多汗易

葛根 蒼朮 自汗易 歸身 白朮 防風 下腫易 猪苓

澤瀉 知母 疼熨易 各八分 生姜片 水煎熟服無時

此濕熱疼腫之聖方若不赤不腫痛上不熨為寒濕禁

此方蘭室秘藏腰痛門ノ下ニ在テ其方下云治濕熱之為病肩背

沉重四節疼痛胸膈不利云濕熱遍身ニ走リ腫レテ骨節疼痛

之別ノ肩背沉重ナル力或足腫疼痛スルニ用ル藥ナリ方後ニ

醫方類聚續編二 濕 九十四 烏巢堂藏

此方ヲ用ル所要ヲ挙ル医点アリ畢竟疼腰ノ二字ガ此方ノ的候腫痛スル上ヲ手ニテ按ノミテ必熱ス不熱モノハ寒湿ナリ方意大抵去湿燥湿泄濕清熱ノ某ナリ吳氏方考ニ載ストイヘ凡脚氣門ニ攝入ス東垣脚氣ニ用ラレタハ羌活導滯湯ヲ用テ後ニ此方ヲ用ヨトナリ然ルニ吳氏ハ始ヨリ此方ヲ用ヨトアレバ方考モ意得難ケレバ此ニ不載多味ナ某ナレバ味ヅ、吟味スルニ不及蘭室秘藏或技萃方ナレバ經驗ノ方ト意得ベシ此方他病活用例

脚氣脚氣初發一身盡ク痛三或四節腫レ便溺阻隔スレ屬濕熱先ツ羌活導滯湯ヲ以テ導之續ニ以此方除之**肩背痛**濕熱相搏チ肩背沉重ニソ痛ム此方主之**腰痛**夏月濕熱ニ因テ沉重ニソ痛ムニ此方主之

黃疸

清熱除濕湯 方考百七十四

治濕熱鬱蒸於脾作五疸

黃芩

黃連

山梔

茵陳

猪苓

澤瀉

蒼朮

青皮

龍膽

各等分

右煎服○穀疸加三稜莪朮陳皮砂仁神麩○身熱加柴胡○小

水短赤加黃柏○太便實加大黃○胸膈飽悶加藜蘆茯苓○飲

酒人加括萎仁葛根○虛弱人加人參○按治黃疸之全方也

吳氏方考五疸門ニ入テ丹溪治黃疸ノ方ト有テ方名ナシ○濕熱ノ黃疸ヲ治スルトアリ苓連梔子龍膽去濕猪苓澤瀉泄濕茵陳八濕ト熱トヲ兼治ス蒼朮燥濕青皮破滯更ニ加減ノ方ヲ考

黃疸

用ベシ加減ノ方ハ本症黃疸ノ加減ナリ

茵陳蒿湯 百七十
五寒

治濕熱發黃便秘脉實

茵陳蒿 莖

梔子 五枚
碎

大黃 二錢

右三味水煎服微利

大便

黃水去為度未去黃水

越三日再服

○按茵陳蒿湯其旨

方全在通利水道

小便不得不得借幽門

借テ小便ヲ通利セ子バナラヌソレ為嚮導爾

此方濕熱黃疸ニ用ユ大便秘ニ脉實ト云ガ的候ナリ方後意

ハ此方所詮水道ヲ通利スル菜ニテ大黃アリトイヘ凡下劑テハナシ水道ヲ通利スルハ幽門ヲモ借リ又ト云フハナイソレ

テ嚮導ノタメニ大黃ヲ用ルナリ

黃

茵陳五苓散 百七十
大金匱

即五苓散加茵陳

此方金匱ノ本方ハ茵陳十分五苓散五分合用ノ濕熱黃疸ヲ治ス又吳氏方考ニハ茵陳猪苓澤瀉茯苓白朮各等分桂少許分兩大ニ異ナリ医通ヲ按スルニ五苓散加茵陳トアリ未タ金匱ノ如クニ茵陳五苓散トチキニ名ハ立又然レハ茵陳五苓散ト五苓散加茵陳トハ同シヤウナリニシテ方ハ各別ノ方ト意得ベシ何レモ濕熱黃疸ヲ治ス症ニ因テ考用ベシ

○醫通云身黃如橘子色小便不利腹微滿スル者ハ茵陳蒿湯身

黃三小便不利ノ渴スル者ハ五苓散加茵陳云

暑并

桂苓甘露飲 百七十
七宣明

即五苓散加寒水石石膏滑石

此方濕熱甚久煩渴小便不利用之吳氏方考暑門二八日
河澗此方實治濕熱之簡捷張子和加人參甘草者八其脈虛スル
二因テ也加乾葛者八其暑渴ヲ治スル也加木香者八其濕氣ヲ
化スルナリ

此方他病活用例

吐血吐血暑天ニ在リ口渴面垢キ頭暈乾嘔ニハ五苓散或此湯
并ニ加麥門五味子藕節汁

濕

經驗白水酒 百七十
八摘要

治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難堪者

白木 去芦
一兩

細切無灰花酒一盞半煎至一盞溫服

痿

二妙散 丹溪百
七十九

濕熱腰膝痛者主之

黃蘗 乳潤
一宿

蒼朮 泔浸
七日

等分為末空心酒服三錢

此方和書方書摘要ニ出タリ面白キ方ナリ不能轉側及皮肉
痛夕ヘカク者ト云フガ目的ナリ此一兩八四五ナルベシ

吳山甫曰濕性潤下病則下體受之故腰膝病然濕未嘗痛積久

而熱濕熱相搏然後痛此方用蒼朮以燥濕黃栢以去熱又黃栢

有從治 蒸寒ヲ用テ病ノ熱ヲ治シ蒸熱ヲ
用テ病ノ寒ヲ治スルヲ從治ト云 之妙蒼朮有健脾之

功一正 蒼朮 一從黃栢 奇正之道也

醫藥并刊

續編二

濕暑 痿

九十七

為集堂

丹溪此方治筋骨疼痛濕熱二因ル者ナレバ痛ガ主ナル程ニ痺
 疰ノ菜ナレ氏此方元來東垣ノ説ニ黃柏蒼朮ハ治痿ノ要菜ト
 云カラ思付夕方ナレバ痿門ニ攝入スルナリ勿論痺疰濕熱ニ
 因ル者ニ用ヘシ方下方後ヲ見ヨ兎角痛ヲ目當トスルナリ医
 通云肥盛蒼朮ノ人足膝痿軟皆濕熱ニ屬ス潛行散ニ妙散主之
 医学正傳云二味皆勇壯ノ氣表實氣實ノ者ハ酒少許ヲ加テ佐
 之有氣加氣菜血虛ニハ加血菜痛甚キ者加生姜汁軟服ス

此方他病活用例

痺吳氏方考云濕熱作痛者上下ニ拘ラズ此方主之**腰膝痛**又云
 濕熱腰膝痛者此方主之**麻木**濕熱下流兩脚麻木或如火燎此方
 加牛膝為元**陰汗**陰間汗アリ下焦濕熱ニ屬ス龍膽瀉肝湯加風
 菜一二味風能ク濕勝ニ或當飯龍蒼朮及ヒ此散俱ニ効アリ

泄瀉

劉艸窓方百八 治泄瀉如神

蒼朮 炒三

陳皮 去白

防風 真各一

右糊丸如菽豆大○又泄加升麻六分

此方泄瀉ノ妙方ナリ煎菜テ思フ様ニナキ片濕瀉ナラバ此丸
 菜甚妙ナリ

燥

五味子湯 千金百

治傷燥欬唾中有血牽引胸脇痛皮膚乾枯

燥

五味 炒五分

桔梗

甘草

紫苑茸

續斷 竹筴

醫方類聚

續編二

燥

九十八

烏巢堂藏

桑根皮 蜜炒各一匙

生地黃 二匙

赤小豆 一撮即赤豆之細者

右丸味水煎空心服秘者加白蜜一匙

燥症ノ論中編ニ載スル如シ此方ヨリ通幽湯ニテノ五方千金方ニ出タリ医通ニ方論詳ナリトイヘ此症希ナルユヘ經歷少シ門外ノ揣摩不足論之故ニ不載只方下ノ主治ト病症ヲ引キ合テ考用ベシ

○欬唾中有血此症ウムニ欬アツテ欬血唾血アリ欬スルトキ胸脇ニ引キツリ痛ニ皮膚乾キ枯ルハ此病ノ本症ナリ

欬方下ノ如シ

麥門冬湯 千金百八十二

治大病後火熱乘肺欬唾有血胸膈脹滿上氣

燥

羸瘦五心煩熱渴而便秘

麥門冬 去心二匙 桔梗

桑根皮 蜜炙 半夏 生地黃 紫苑茸

竹茹 各一錢

麻黃 七分

甘草 炙五分

五味子 十粒碎

生姜 一片

右十一味水煎空心服○醫通曰按千金麥門冬湯即五味子湯

中去續斷赤小豆加門冬麻黃半夏生薑而五味子湯專治燥欬

方中反用續斷以燥濕麥門冬湯專治火熱乘肺欬唾有血反用

麻黃半夏世都莫解其故是以并其方而置之不知致燥之由皆

緣經脈阻滯非續斷不能通之欬唾有血是傷寒大病後餘邪蘊

燥

釀為火而乘於肺非麻黃不能開之痰凝氣結津液不行非半夏不能祛之與活人知母麻黃湯和劑欬冬花散等立法不殊令人每謂生夏性燥一切渴家以血家禁用又謂半夏幸温不當與閉冬竹茹寒潤葉同用若余則金匱麥門冬湯竹葉石膏湯俱不足法耶

此主治大病後ト云ヲ目當トスベシ是モ欬血唾血アツテ胸膈脹滿咽渴大便秘スル症ナリ

欬嗽方下ノ如シ

治風熱心煩欬喘便秘脾胃熱壅食不下

地黃煎 千金百
八十三

生地黄汁

枸杞子汁 二味酒搗各取汁

荆瀝

竹瀝 各半

真蘓

生姜汁 各一合

人參

天門冬 各一兩

白茯苓 各八錢

大黃酒

梔子 姜汁炒黑 各五錢

右十一味以後五味為細末

入煎六汁內調服方寸匕再服漸加以利為度

此症喘欬アツテ大便秘スルヲ目當トスベシ

生地黄煎 千金百
八十四

治積熱煩渴日晡轉劇喘欬面赤能食便秘

葶藶

知母

茯苓

栝萎根

鮮地骨皮 各二兩

石膏 四兩

生地黄汁 二升

麥門冬汁

白蜜 各一合

生姜汁 二合

燥

本草綱目

續編二 燥

百

烏巢堂藏

醫方類聚卷之三

竹瀝六合

右咬咀以水一斗二升先煮諸菜取汁三升去

滓下竹瀝地黃門冬汁緩火煎至四升下煉白蜜姜汁再煎數沸

初服三合日三夜一服加至四合夏月為散收姜汁竹瀝焙乾蜜

丸服前膏尤妙○喻嘉言曰此方生液涼血制火撒熱兼擅其長

再加大參乃治虛熱之良劑然非能食便秘者斷不可施

此症毛大抵前症卜同ノ日晡轉劇卜云ガ目當ナリ

燥

通幽湯千金百八十五

治大便秘結便出堅黑

當皈二錢五分

升麻三分

桃仁泥一錢

甘草生炙各五分

紅花少許

熟地黃

生地黃各一錢五分

水煎將成用菜汁磨檳榔五分調入稍熱服

此症大便秘結此方ノ物ナリ

大便秘結

潤燥湯蘭室百八十六

通幽湯加麻仁大黃各一錢

大要前方卜同シ前方ニ比スハ峻劑ナリ

燥

清涼飲百八十七

治上焦積熱肺氣不化口舌乾燥

黃連 黃芩 薄荷 黑參 當皈 赤芍藥

各一錢五分 甘草一錢

醫方類聚卷之三

續編二燥

秘結

百一

烏巢堂藏

大便
秘結

水煎入生白蜜一匕熱服大便秘結加酒蒸大黃

此方治肺燥主治方下ノ如シ四順清涼飲ノ方後ニ詳ナリ

四順清涼飲 一名四順飲 百八十八

治血熱便秘脈實者

當歸 赤芍

甘草

大黃

酒蒸各一
裁五分

水煎入生白蜜一匕熱服○按清涼飲治上焦之燥熱故用薄荷之辛散四順飲主下焦之燥結故用大黃之苦寒功用天淵

此藥大便秘結ノ藥ナリ方下ノ主治血熱ノ二字ヲ目當トスベシ方後ノ論ハ前方ト此方トノ上下ノ燥ニ用ル別辨スルナリ

此方他病活用例

燥

小兒腹痛熱ニ感シ作痛モノハ面赤ク壯熱四肢煩熱シ口中氣熱ス此湯加青皮枳殼小兒外感小兒傷風裏ニ入ル與傷寒ニ白但シ傷風ハ能食ヲ為異如シ煩渴大便秘赤黃者此湯合小柴胡滋燥養榮湯百八十九治血燥皮膚皴揭筋攣爪枯

四物湯去川芎加生地黃秦艽防風黃芩甘草

此方ハ燥在血脉皮膚ノ燥キ甚ク無所恐肝木見風疰皮膚皴揭シ筋攣リ麤草ニ見レバ中風ニ紛ル、忘ナリ秦艽防風ハ治風ノ藥ナリ故此湯ヲ用テ治外大補地黃丸ヲ用テ治内ナリ大補地黃丸方 方外 治精血枯槁燥熱

四物湯去川芎加生地黑參黃柏知母山茱山茱萸肉蓯蓉蜜丸每服六七十丸空心塩湯臨臥温酒下

消渴

繅絲湯百九

治三消渴如神

如無繅絲湯却以原蚕繭殼絲煎湯皆可代之無時飲之大効

此方出本草綱目回春二載之奇方ナリ繅絲湯ハユノ煮汁ナリ無之トキハ二番目ノカヒコノヌケガラヲ煎代之用ルナリ

痿

清燥湯 脾胃論百九十一

黃連 黃柏 酒 柴胡 各一分 麥門 當皈 生地 甘草 猪苓

神麴 各二分 人參 茯苓 升麻 各三分 橘皮 白朮 澤瀉 各五分 蒼朮 一分

黃耆 一分 五味子 九枚 右咬咀如麻豆大每服半

兩水二盞半煎至一盞去渣稍熱空心服

此方六七月ノ間肺金受射腰以下痿癱シ兩足夕ジクノ行走不正者此方主之

膈噎

生津補血湯 回百九十二

治年少胃脘血燥故塞

當皈 白芍 炒 熟地 生地 茯苓 各 陳皮 枳實 黃連 炒

蘇子 貝母 各七分 砂仁 沉香 各五分

右剉一劑姜一片棗一枚水煎竹瀝磨沉香同服

回春云年少之人有患膈噎者胃脘血燥不潤便閉塞而食不下也友松子曰此方即後當皈養血湯去川芎以薑厚朴香附加生地

縮砂之劑也後方治痰火氣結升而不降此方治胃脘血燥不潤之設某品尋常不須贅丹溪曰血屬陰陰主靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二氣滋養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有今夫血燥火積痰凝則用此方濟之又曰陳氏曰五膈者思憂喜怒悲也五噎者憂思氣勞食也嚴氏曰五膈五噎總是七情之氣鬱於胃口而成如此之類各有主方非此二方之能盡矣

此方他病活用例

胸痛百二十方云一人胸痛痰嗽不食大便結故與滋陰降火湯不効是以與此湯則能退痰除虛熱得奇效不食又云一老僧不食只羨湯茶而焚先與香葛湯順和湯大半愈發熱未退故用此湯全安

當歸養血湯百九十三

當歸 白芍煨 熟地 茯苓各 貝母一錢

膈噎

瓜蒌 枳實 陳皮 厚朴 香附 撫芎 蘇子炒各七分

沉香五分 黃連用豆豉同炒黃不用用連八分

右剉一劑姜一片棗二枚水煎竹瀝磨沉香調服

此方回春方下ノ主治并二百二十方ノ按友松子評ニ盡セリ回春ニ厚朴七分アリ謙云膈噎ノ初起ニ用ル某ナリ食通りカ子或食下リテ胸痛ムヲ目當トシ用ベシ大抵前方ト同意老少ノ別アリトイヘ凡通用如減ノ用ベシ百二十方按ニ加減ノ得奇効トアリ此肝心ノ意得ナリ右ノ二方通用ノ加減スル丁ニアリ又ニ方ノ某味ヲ作意ニヨツテ加減スル丁モアリ石室秘録ニ膈證ヲ以テ下向腎虛下ナシ六味地黄丸ニ加減シ用ル丁ア

リ此ハ腎虛血燥ヲ目當トスル此二方ハ血燥痰火ヲ目當トス
ルナリ。○回春云年老之人陰血枯槁痰火氣結升而不降飲食不
下者乃成膈噎之病也

○百二十方云按老人痰支形瘦皮膚燥痒無食味大便二三日不
行者血虛也此方加減而專可用也若雖壯年而有此證胸痛者膈
噎之先兆也亦加減而得奇效

○友松子曰丹溪先生曰膈噎病大率屬血少氣虛有痰有火也蓋
陰血枯槁則痰涎凝滯咽喉窒塞食不能下或食下則胃脘當心而
痛此皆血少痰凝將成膈噎之明驗也以此方補血豁痰順氣降火
則病斯瘳矣然而必用竹瀝一以潤其燥一以清其痰一以降其火用
大棗生姜行脾胃津液以和榮氣也○又曰不拘老少血虛之人有
些須輕病為醫所誤服香燥太過以致胃血乾枯成前症者世多有

之亦必以此方潤之或以前方更奇

○老醫傳云五十餘男一身憔悴痰粘不食胸微痛食則如支足冷
脈瀦右寸如有力與此湯愈タリ此方ハ回春ナドニモ老人ノ血
枯タルニ因テ挾痰ヲ膈症トナルニ用ルトアリ丹溪云譬ハ膈
ノ症ハ無水所ニ舟ヲヤルヤウナモノシヤト云云此症ハ膈ニ
テナケレバ膈ニナル下地シヤニ因テ用タリ惣別膈ノ症ハ食
ナドヲスレバ痛モノゾ

秘大便

麻仁九寒百九

治脾約大便燥結

厚朴姜汁炒芍藥

枳實炒各二錢大黃四錢

麻仁

杏仁各半

右六味為末煉白蜜丸梧子大飲服五十九日三服以利為度

大便
秘結

此方ハ其人素リ大便燥結スル宿病アツテソレニ外邪客熱ヲ加テ脾約トナルモノ此方主之脾約者大便秘結也

潤腸丸 脾胃論百九十五

治大腸風熱血秘

麻仁 別研各一兩

羌活

當歸

皂角仁

大黃

綠礬水浸濕紙裹煨

秦艽

各半兩一作防風

除二仁別研外為細末蜜丸梧子大每服五十九食前温酒下。

本方加郁李仁防風名潤燥丸

方下ノ主治ヲ能ク會得ノ用ベシ血秘ノ二字ヲ目當トスベシ

猪膽導

寒百九十六

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中

大便
秘結

如一食頃當大便出虛人不可用膽導陳將薑陳將瓜皆可削為

導濕熱肥盛痰悶可用黃瓜根浸濕削之為導此即土瓜根導也

當大便出ト云マデ本文ナリ虛人不可用ト云ヨリ以下ハ医通ナリ陳將薑陳將瓜ハ古キ生姜ヤ瓜ノ香ノ物ナリ此ヲ削リ用ベシ簡便ナル方ナリ若シ肥盛ノ人痰甚ノ煩悶ノ大便秘結スルニハ土瓜根ヲ削リ用ベシ土瓜根ハカラスウリノ根ナリ

大便
秘結

蜜煎導

寒百九十七

白蜜七合一味内銅器中微火煎之稍凝

如鉛狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以納穀道中以手急抱欲大便時乃去

傷寒雜病氏ニ大便閉結ノ其人虛弱下劑ノ用并カ夕キトキ此方ヲ用ベシ

火熱

伊尹三黃湯百九十八 倉公名火齊湯 治三焦實熱煩燥便秘

黃連酒煮

黃芩酒炒

大黃酒浸等分

麻沸湯ニ升清之須臾絞去滓分温再服麻沸湯者白水空煎鼎沸如麻也古方惟降火茱用之

此方ノ出處ハ伊尹三黃湯倉公火齊湯トアレヒ俱ニ書ナケレ

ハ如是言傳ヘナリト見ユル金匱ノ瀉心湯ハ大黃二兩黃連黃芩各一兩トアリ此方ハ各等分トアリ分兩異ナリト云ヘヒ茱味同レケレバ同方ト意得テモ不苦サレヒ瀉心湯ハ煎茱ナリ此湯ハ擺茱ナリ扱瀉心湯ノ主治ニ心氣不足ト云ナガラ茱ハ瀉心湯ト名ク痣ト某ト相違セリ此間疑アリ方考繩愆云金匱要畧ハ仲景ノ以後晉宋二代唐ヨリ五代ノ間絶テナレ宋仁宗ノ時ニ切レクニナリタル古本出タルヲ林億カ輩修覆ノ今ノ本トナレヒ金書ニテハナレ校正ノ誤リモアルベシカヤウノ疑アルハ尤ナリト云ヘリ謙云千金方此方ノ主治ヲ見レバ心氣不定トアリ定ノ字ト足ノ字似タルユヘ書違ヒトミユルサレヒ定ノ字ニシテカラトツクリトスミハセス此等ハ闕疑スベシ然ルニ活人書ニ此湯ヲ丸茱トメ三黃丸ト称ス若シ此方

用タキアアラバ三黄丸或傷寒論ノ大黃黃連瀉心湯活人ノ黃連解毒湯ノ類ニ加減スレバ此方ハ不用トテモ事ハ不可闕用井方ハ三黄丸ノ下ニ詳ナリ方後ニ古方惟降火薬用之トアリ強ク火ヲ降サントスル片ニ用ル薬ニテ古方ノ薬ナリ今デハアマリ用ザル薬ト見ユルナリ

右五十年前謙齋カ説ナリ當時ハ古方家ニ非ストイヘ氏專ラ用テ即効アルユヘ流行薬トナリテ素人迄モ用覺レナリ故ニ京師三黄丸ノ賣薬所々ニアリ然レ氏何レモ起居食事平常ノ如ク立煩ナレバ醫師ニ不議ノ投實ナル症ニ用井テ瀉下スレバ即効アリテ薬ヲ止ム三黄湯モ當時医家專ラ用ト云ヘ氏既ニ平卧ニ及タル病人ハ病ノ初起ヨリ段々治法ノ次第脈腹等ヲ精ク診シ不用則忽害アリ此薬ノ所詮治諸實熱不

解ノ六字可用ノ的候ナリ又瀉スルニ不拘三黄丸或散ナドヲ用テ病根脱ルト意得ヘ或庸医ナドニ相談メ不絶用テ脚微腫スルトアリソレニモ氣ツカス荏苒ト用ル中ニ忽氣急ヲ發シ斃スルト予屢目撃セリ又恐ル者ハ投實ノ症ニ医コレヲ進レ氏一向ニ不用モノモアリ予倩按ニ近來徽瘡四方ニ傳染ノ其初メ淋病疳瘡便毒痔疾多ク其餘毒アル症或食毒醇酒厚味ノ為ニ湿熱ヲ生シ脚膝痛ニ或痞レ或上逆頭痛肩背痛ニ起居食事平常ノ如クニノ彼是申分アル者多シ右ノ症ニ用テ多ク効アリ疥癬ノ餘毒モアリ局方主治ノ如ク三焦積熱五藏俱熱即生瘡癩瘡癩トアリコレ瘡癩瘡癩ト局方時代ニ云ヘルモノ今時ノ山徽瘡疥癬ノ類ナリ近來繁華ノ地ハ云ニ及ス邊鄙ニテ徽瘡ノ病多シ故ニ三黄湯三黄丸

ヲ用ル疝最多シ是治世久レキニヨリ人々酒色ニ耽リ其上
茶餌流行メ食毒多シ故ニ三黃劑流行メ即効アルヲ宜哉然
リト云ヘ凡虚實ヲ考ヘ用捨スベシ予一病人ニ久服セシメ
沉痾ヲ治セリ言長ケレ凡記之五十餘歳ノ僧右ノ膝ニ癰瘡
ヲ發シ痛痒不常一一年餘服茶數茶ニ三医ニメ寸効ナシ後
輕粉劑ヲ服シ癰瘡愈タリ其アト白ク粉ノ吹タルヤウニナ
リ雨天ナトニハ痒シ如此ナルヲ半年余ヲ歷テ冬十月ニ至
リ時々右ノ膝ヨリ股ニ至リ搐搦シ或腰背反張シ大便秘結
ス大便通トキハ搐搦反張モ輕シ雖然食事不劣氣力不衰ソ
寺務スルヲナラズ予種々茶ヲ與レ凡無効大柴胡承氣湯ノ
類モ用ルト云ヘ凡少シハ効アルニ似テ脚股搐搦屢發ル十
一月ニ至リ三黃湯ヲ投ス大黃五分苓連各二分五厘一匙ヲ

劑トメ投之日ニ二貼大便快利ノ次第ニ搐搦定ル然レ凡劑
ヲ緩メレバ大便秘シ大便秘スレバ又搐搦發ル此癰瘡ノ内
攻スルモノナリ翌年二月ニ至リ此湯ヲ投スル丁凡二百貼
餘ニメ快氣シタリ然レ凡服茶ヲ止ル片ハ大便秘結シ亦搐搦
アリテ步行シ難シ故ニ三黃散トシ日ニ方寸匕ツ、二三度
用ル片ハ大便快利シ三月下旬ニ至リ全ク愈タリ實ニ此病
僧ノ的劑トシヘテ散茶アリ昔キヲ不覺其後三四年ノ間
一日ニ一度或二日ニ一度此散ヲ懷中ノ津液ニテ潤シ用ユ
最初ヨリ曾テ白湯ヲ不用此節全快シタリ然レ凡少シニテ
モ秘結スレバ必方寸匕ヲ用ユ去ル戌冬ヨリ寅ノ冬ニ至リ
凡五年モ持茶トメ全愈タリ此三黃ノ久服ヲ記ス凡如此ノ
疝ハ其毒氣ノ内ニツケアル故不吾ナリ此藥實ノ趣キヲ以テ

諸病ニ活メ用ベシ其即効經驗吾人所知ナリ或一應ノ食毒
 酒毒ナドニ此丸此散ヲ投メ一度泻下ノ其症脱スル如シ其
 人全体多ク焚實ナル者ナリ然ルニ上編ニ云ヘル如ク大黃
 ノ性アシケレバ速ニ泻セズ予試ルニ新渡ノ大黃一斤ノ内
 七八両ナラテハ性好キ品ナシ吟味スベシ此方ノ所詮或癩
 毒或食毒一切ノ惡瘡ニヨリテ焚ヲ生ズル諸症盡ク此方ヲ
 主トスベシ○扁倉傳割解曰火齊者煎煮菜劑之通稱云云○
 又曰韓非子曰病在腸胃火齊之所及也漢書晁嬰志亦曰辨五
 苦六辛致水火之齊以通閉解結其所指太博何必一方哉云云
 圖南子ノ説實ニ千古ノ矚キヲ發ス然レバ倉公ガ火齊湯ハ
 一切ノ煎湯ヲ云ナリ倉公傳ヲ熟覽メ考ベシ伊尹三黃湯ト
 同方ニ非ル丁必セリ

火

金花湯 百九十九

治熱毒內蘊

三黃湯去大黃加黃柏三味等分煎服更加梔子各梔子金花湯

大抵黃連解毒湯ト同ニ加梔子各梔子金花湯ト云ヘバ即黃連
 解毒湯ナリ然ルニ黃連解毒湯ハ中比ヨリアノ方ニテハ擺菜
 ニスル此方ハ煎湯ナリ然ルニ解毒湯モ活人ノ原方ヲ見レハ
 ヤハリ煎湯ナリコレ以テ此方ト同事ナリ用井カク黃連解毒
 湯ノ下ニ詳ナリ

時疫

黃連解毒湯 宣明 二百

治熱邪外俱盛

三黃湯去大黃加黃柏山梔等分煎服

醫方類聚

續編二

火 時疫

百十

烏巢堂藏

嘔腹滿嘔吐或欲作利者加半夏三枚厚朴各二茯苓各二生姜片三三

焦實火內外皆熱煩渴小便赤口生瘡加連翹芍藥柴胡各等分

狂狂亂喜笑不狂者此心火盛先行吐法而後加半夏竹瀝竹葉

姜汁下臟毒下血者必在糞後各遠血加連翹槐花細辛甘草謂

之八寶湯帶婦人赤白帶下屬共盛而有寒熱者合四物湯加倍

黃連効即解毒按清熱之劑也崩三十餘歲婦人崩漏如瀉身

熱口渴合四物湯煎湯與糝灰而安娠又孕婦有前證合四物湯

加升麻白朮而安

此方時疫ノ禁ナリ後世用テ雜病ニ焦實火ヲ治スルノ總司ト
スルナリ

活人原方黃連解毒湯

治時疫三日已汗解或因飲酒後劇苦煩悶乾嘔咽燥呻吟錯語

不得臥 黃連七錢 黃柏半 黃芩壹 梔子肆枚

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯盞去滓服未

再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠

皆傳此方諸人用之亦効此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者

此方本症主用例 一病壯熱無寒汗多心昏嘔逆痞滿等ノ症涼膈散雙解散三黃石

膏湯主之○濕疫大便泄瀉此方主之○陽毒發斑如錦紋大便不
燥結者此方主之○熱病大渴煩燥背惡寒脈洪者白虎湯合此湯

血者加生地黄牡丹皮喘者加瓜蒌根厚朴。○熱病腹滿痛或下利清水痛者調胃承氣湯合此湯。○熱病誤用辛溫藥變症イロク出者皆此湯ニ加減スベシ。○濕病下症備者三乙承氣湯合此湯。○濕病餘熱不盡者小劑黃芩湯或此湯ニテ調理スベシ。○熱病不問風寒濕暑心腹滿痛譫語煩躁咽燥口燥內熱盛ナルニハ何レニテモ調胃承氣湯合此湯是一法也。○濕病熱毒畜胸膈內懊懣者涼膈散此湯撰用若シ呻吟錯語不得眠者此湯合五苓散。○濕病時疫熱毒盛脈大腹滿便秘發狂大承氣湯合此湯。○濕熱病發斑錯語心昏熱甚下症未全備者此湯加犀角玄參。○熱病發戰慄者白虎湯合此湯。○濕熱病煩悶乾嘔者此湯主之。○時疫熱極テ厥逆者涼膈散合此湯。○時疫四肢厥冷心胸ノ間有熱大便秘者涼膈散此湯可考用。○舌中見白胎外微少黃ナル者ハ必泄瀉

スルモノナリ宜用此湯惡寒セバ宜用五苓散。○舌胎中心黒ク厚シ燥ハ熱盛シニ津液枯生脈散合此湯。○舌紅而中心見淡黒滑ナル者ハ太陽ノ濕病ナリ惡寒表症ニハ雙解散合此湯。○舌紅ニ燥キ横ニ裂ケ為痛此湯加麥門有轉失氣大承氣湯主之。○舌紅色ノ中生紫色瘡者此湯加玄參薄荷。○弄舌ハ舌ヲ出シ唇ノ四方鼻ノ下ヲ子ブルハ惡症ナリ此湯加生地黄。○舌色紫而其中ニ有紅斑者ハ人參白虎湯或此湯加葛根黃連青代黒。○大頭瘟病ニハ此湯加天花粉

此方他病活用例

火症丹陽坊云常ニ單方ニ用ル丁ナカレ合諸方可用之々トハハ痰火ニハ合ニ陳湯血虛ニハ合ニ四物湯氣虛ニハ合ニ四君子湯謙云此方單方ヲ用ル片ハ菜味甚苦ノ嘔噦スルモノナリソレ

故合方ヲ用ルサレ厄擺菜ニノ用ル片ハ菜稀クシテ不苦ナリ
同謙云此方實火ヲ瀉スルノ總司ト意得テ一切ノ實熱ニ用ベ
シ其例甚々多ク盡ク載セ難シ故畧之只博ク考用ベシ傷寒牙
床ハ屬胃牙齒ハ屬腎如シ陽明傳テ入少陰二經相併セ血出於
牙縫如吐者人多不覺其為牙血以凉水漱血則止ム少頃又來者
是外用綠袍散內服此湯合犀角地黄湯或生地苓連湯下之頭瘟
本症二舉ル如ク大頭瘟ノ疔燉腫作痛煩渴好飲冷水宜加天花
粉以除痰火濕熱隔噎實火加童便姜汁麻疹麻疹已出煩躁作渴
者合白虎湯○謔語如狂者合辰砂六一散同麻疹吐血血者加
炒山梔童便痘疹七歲男子痘瘡發熱微渴自利医用木香散加丁
香予以出遲固因自利氣弱也所下皆臭滯陳積乃腸胃熱蒸而下
也以此湯加白朮與十貼利止瘡出後肌熱手足生瘡癩與涼劑調

補而愈同按盛者加芎藭白芍防風同痘瘡口鼻失血者肺胃熱甚
加生地大黃輕者黃芩湯同痘瘡吐瀉濕熱瀉下臭穢者加白朮血
老醫傳云吐血ニ犀角地黄湯七夕ル、一アルニ用吐血又云二
十七八歲男皮膚如常素嗜酒依病禁止之二十日已前吐血一
許與犀角地黄湯大半治之至今吐血少許一日ニ二度頭重上氣
飲食并太小便順脈如常此湯合加味瀉白散服之而安同又云前
症ノ如少酒傷ノ吐血ニ用蠱毒飲食一切ノ毒ヲ解ス蠱毒裏ニ
入ル或菌毒ニ用疔又云疔瘡熱甚ニ加玄參升麻獸傷又云鼠被
咬療菜怠リ十餘日ヲ經毒氣入裏腹痛壯熱汗出狂言用此湯愈

火

三黃丸 二百局 治諸實熱不解

三黃湯為末煉白蜜丸梧子大每服五十九空心麻沸湯下

火

此方三黃湯ヲ蜜丸ニノ用ルナリ蜜ノ味甘ク和ニノ素性和緩ナリ三黃湯ヲ用ンヨリハ此丸ヲ用タガヨシ局方ノ主治ヲ考ヘ用ベシ

局方三黃圓方

治^三丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不羨飲食下焦有熱小便赤澀大便秘結五藏俱焚即生瘡癰瘡癩及治五般痔疾蠱閉腫痛或下鮮血黃連去芦 黃芩去芦 大黃煨各十兩 右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓熟水下如藏府壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之

此方他病活用例

吐衄此方本仲景ノ三黃瀉心湯ナリ故心火盛ナル吐血衄血ヲ

火

治スルナリ分兩ハ異ナレモ三黃湯ノ下ニ云如ク畢竟同方ト意得テ可ナリ口舌脾瘻口甘キ者此丸主之四瘡瘡結毒瘡毒久シク不愈或ハ結毒ノ症ニ五寶丹ヲ用ルニ人ニ依テ大便甚夕秘結スルコアリ此大劑ノ一味土茯苓湯燥ス故ナリ此圓ヲ一度ニ壹々ホトヅ、日ニ三度兼用スベシ此予ガ經驗ナリ糊丸散菜ヨリ煉蜜ヨシ大黃ハ苓連ニ倍シ用ベシ

三補丸 二百二河澗

治陰火亢極不解

金花湯為末蜜丸服

主治方下ノ如シ三黃丸ニ比スレバ無大黃有黃柏タゞ腎火盛ナル者ニ用之此菜モ大便秘結ニ用ルコトモアレド三黃丸ノヤウニ大便ヲ下スカハナシ三黃丸ヨリハ輕キ菜ナリ三焦有火

咽喉乾燥シ小便赤澀大便微秘スル者宜之

此方他病活用例

脹滿 食肉了多ク腹脹滿者此丸加香附半夏蒸餅ニテ丸ニ用之

發熱 濕痰夜發熱スルニ此丸加芍藥散茶トシ用 **嘈雜** 嘈雜濕痰

氣鬱ニヨリテ不喜食モノハ此丸加蒼朮倍加香附 **調經** 經水去

多不能止モノニ此丸加香附龜板金毛狗脊 **產前** 妊娠熱アツテ

臨月ニ及ブ此丸加炒香附炒芍藥蒸餅ニテ丸トシ用 **抑熱** ニ

ハ此丸ト合地黃膏

火

金花丸 二百

治積熱不解

黃連解毒湯為末蜜丸服之

此方黃連解毒湯ノ用方ヲ考ヘ用ベシ但シ暴病ニハ解毒湯ヲ用井緩病ニハ宜用此丸

火

瀉青丸 二百

治肝經實熱大便不通腸風便血陰汗臊臭

當皈 川芎 梔子炒 大黃 羌活 防風 草龍胆各等分

滴水為丸空心茶酒下七八十九至百丸

此方主治方下ノ如シ下血陰汗ヲ目當トスベシ陰汗ハ罌丸陰莖ニ汗アルヲ云

此方他病活用例

下血 方下ノ如シ血色清ノ鮮ニテ四方ニ走り出此丸或煎湯ト

時疫

ナシ一二劑ヲ用テ後道遙散ニ加黄連羌活防風烏梅陰汗方下ノ如シ中風中風風熱甚ク大便秘結スルモノ令劑ヲ用ル中ニ時々此方ヲ用テ臧府ヲ利シ經脈ヲ通メ可ナリ令劑トハ相應シ夕菜ナリ驚風肝經實熱抽搐痰盛ニ發熱大便秘者主之

三黄石膏湯二百五

此湯治陽毒發斑身目面黃如塗朱眼珠如

火狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞證表裏皆熱欲發其汗則熱發汗ノモ不退又復下之下劑ヲ用ントスレバ大便既既大便遂頻小便不利亦有錯誤治温病症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其内

裏由表未解欲發散其表則裏症又急内ヲ治セントスレバ表未解發散セントスレバ

裏熱甚シ醫者ウジクノドウモエ起起不能措オク手待斃而已殊

不知熱在三焦閉塞經絡津液枯竭榮衛不通遂成此症又治汗下後三焦生熱脉洪數譫語不休晝夜喘息鼻時加衄身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識

- 石膏兩 黄芩半 黄連 黄柏各七 山梔子 麻黄 香豉二

水二鍾姜三片枣二枚槌法入細茶一撮煎之熱服

此方時疫、某方下甚夕詳ナリ考用ベシ黄連解毒湯加石膏麻

時疫

黃豆豉モノナリ醫通時疫門徃々用之畢竟內外熱盛ニノ大便不秘結モノニ用ル菜ナリ

三黃巨勝湯二百六陶

此湯治陽毒發斑狂乱妄言大渴呌喊目赤脉數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮難治者權以此湯劫之

三黃石膏湯內去麻黃豆豉加大黃芒硝是也水二鍾姜一

片枣二枚煎之槌法臨服入泥漿地漿水ナリ清水二匙調服即安

前方ノ症ニ大便秘結ヲ加ルモノニ用ル菜ナリ右ニ方陶節庵カ制ニノ時疫大熱大實ニ用ル菜ナリ三黃石膏湯ハ大熱ヲ主レ此方ハ大實ヲ主トス故ニ此方ニハ前方ノ去麻黃豆豉加大黃芒硝

時疫

三黃梔子豉湯二百七千金

治熱病時疫頭痛壯熱

三黃湯合梔子豉千金去黃

方下ノ如シ時疫頭痛甚キニ用ル菜ナリ

濕

梔子蘗皮湯二百八寒

梔子十五枚

蘗皮二兩

甘草一兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

此方傷寒論太陽篇ノ方ナリト云ヘ凡畢竟濕熱黃疸ヲ治スル菜ナリ濕熱在裏ニハ茵陳蒿湯濕熱在表ニハ此湯主之

此方他病活用例

黃疸發熱小便不利ノ渴スル者此湯主之

大黃黃連瀉心湯

二百九寒

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服。麻沸湯者言滾沸如麻也。

此湯元來傷寒誤治ニ因テ痞痞トナル者ニ用之傷寒汗ヲ発スベキニ汗ヲ不發メ反テ下之其後又発汗首尾相違ノ療治ニテ痞痞トナル表未解不可攻裏先表ヲ解スヘシ表ヲ解スルニハ桂枝湯裏ヲ攻ルニハ此湯主之濕熱凝聚ノ痞トナルヲ攻ル業ナリ三黃湯ノ下ト参考スベシ

附記

半夏瀉心湯

半夏 半升

黃芩

乾姜

人參 各三兩

黃連 一兩

大棗 十二枚

甘草 二兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再

煮取三升溫服一升日三服。此方傷寒惡寒發熱アル、痞汗

出テ表邪去ルト云ヘ氏但心下痞ノ不痛或ハ嘔吐下利スル

者此中氣順ラヌ邪熱心下ニ蓄テ痞滿スルナリ此方熱ヲ瀉

シ痞ヲ散シテ水氣ヲ追フ若シ心下痞シ嘔ノ發熱スル者ハ柴

胡湯ノ症ナリ又下後心下滿テ鞭ク按之手モ不可近モノハ

大陷胸湯ノ症ナリ半夏瀉心湯ノ症ハ發熱汗出テ其熱解ヌ

ルト云ヘ氏後心下滿テ不痛ノ痞スル者ニ用ベシ乾姜半夏

ノ辛以痞ヲ散シ苓連ノ苦寒以熱ニ勝人參甘草大棗ノ甘以

扶中氣又一切ノ雜病瀉アリテ心下痞シ或ハ不食或ハ濕瀉

目者瀉ノ類利水ノ劑ヲ用并テ其瀉不止者ニ用テ數効アリ此

方世人一切心下痞滯スル者ニ其痞ヲ不辨ノ漫ニ用ユル者ハ

醫方集解

續編二 濕

百十八

鳥巢堂裁

甚誤レリ心下痞スルト云ヘ比大便秘スル者ニハ宜シカラ
ズ又發熱潮熱ナドアルノ疰ニハ用ユベカラズ方中乾姜ノ
辛熱以テ苓連ノ苦寒ヲ推ト見エテ熱多キ者ニ用ユル時ハ
反テ熱ヲ助テ不宜ナリ惟心下ノ濕熱水氣ヲ去ルト云フヲ
目的トスヘシ故ニ酒客ノ病心下痞ノ不食スル者ニ用井テ
効アリ先ツ虚痞ニハ半夏瀉心湯實痞ニハ三黃瀉心湯ヲ用
エルコトナリ

生姜瀉心湯

生姜 四兩

甘草 二兩

人參 各三兩

乾姜 一兩

黃芩 三兩

半夏 半升

黃連 二兩

大棗 十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服
○此方其人素ヨリ胃氣虚ノ兼テ腹下ニ水氣アリ此誤リ下
シテ餘熱虚ニ乘ノ裏ニ入テ胃中和セズ穀氣不和故ニ心下

痞鞭乾噎ノ食ノ臭ヲ忌モノナリ水氣行ラサル故ニ腹中雷
鳴シテ下利スルナリ主トルニ生姜瀉心湯ヲ以テスルモノ
ハ其意水氣ヲ散ズルニアリ先ハ嘔多キモノニ用ユルナリ
因テ生姜四兩ヲ加フルモノナリ此仲景ノ妙処ニメ兩目違
ニ因テ用ユル所ノ方ノ意味ヲ見ルベシ後人ノ兩目力ハ
又ト云モノ論ズルニ足哉

甘草瀉心湯

甘草 四兩

黃芩 二兩

乾姜 各三兩

半夏 半升

黃連 二兩

大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服
○此方本傷寒中風誤リ下シテ其人下利日久不止日夜數
行ニメ穀不化腹中雷鳴ノ心下痞鞭シ或ハ滿或ハ乾嘔心煩
シテ安カラザルナリ此火熱上ニアツテ下水ニ交フヲ得ズ

故ニ心煩ノ不安ナリ医心下ノ痞ヲ見テ病不尽トシテ復下
之因テ下ルモノ益下リ上ルモノ益上リテ其痞益甚シ此
結ニアラズ又寒結ニモ非ズ誤リ下スニヨツテ中氣虚ノ邪
氣上逆シテ痞ヲナスモノナリ故ニ甘草瀉心湯以テ其急ヲ
緩クシテ中ヲ和スルナリ方甘草瀉心湯以テ名トスルモノハ和緩
ノ意ニ取ルモノナリ甘草大棗ノ甘中氣ノ虚ヲ助ケテ急ヲ
緩クス半夏ノ辛逆ヲ降シ嘔ヲ止メ苓連ノ苦寒痞熱ヲサリ
乾姜ノ温痞中ノ水寒ヲ散ス故ニ此方中ヲ緩クシ逆ヲ降シ
痞ヲ通シ煩ヲ除ク寒熱并ベ用井テ上逆ヲ下スト云ガ此方
ノ主意ニノ人參ヲ去ルハ氣ノ上逆ニ害アレバナリ○此方
半夏瀉心湯生姜瀉心湯小半夏湯等ノ嘔ヲ止ルノ劑ヲ用ユ
トイヘ此反テ嘔甚シクノ不止モノハ此中氣虚ノ上逆スル

モノナリ故ニ甘草ノ甘ヲ以其急ヲ緩クシ上逆ヲ降サシム
ルナリ是以効アリ後世ニテハ六君子ニ黃連山梔仁砂仁枳
實等加味ノ場へ此湯必至ト即効アリ

私云右附記三瀉心湯ノ方意近來古方家中人精シク
考へ經驗ノ的說ナリ

痞

附子瀉心湯

二百
十寒

大黃

二
兩

黃連

黃芩

附子

一枚炮別
煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞出滓內附子汁分温

再服

此又治痞ノ菜ナリ傷寒脉浮緊ナルハ發汗ベキニ反テ下之痞
トナル心下痞ノ惡寒スルモノニ此方主之此痞濕熱上ニアリ

陳寒下ニ在テ寒熱ハタクニナル症ユヘ此方ヲ用ルルナリ前方ニ加黄芩附子モノナリ大寒薬ノ中ニ大熱ノ品ヲ加ヘ尋常ノ方ニアラズ能ク考ベシ

此方他病活用例

脇痛傷寒痰結ノ症ヲ下スニハ大黃区硝ノ様ナ寒薬ヲ以テ下スベキニ巴豆ノ様ナ熱薬ヲ以テ下ス程ニ腋キ腹ガ強ク痛ムニ此湯主之。私云後世傷寒誤下ノ症ハ無シト云ヘ凡雜病ノ熱結ノ症ニ當時新渡ノ大黃瀉下ノ効ナキニヨリ紫圓梅肉丸巴豆入ノ熱薬ニテ瀉下スルヲ流行セリタトヘバ痔痛ナドニ大黃ノ効ナキユヘ巴豆ニテ下スユヘ大熱薬ナレバ後某毒ニテ仕モツレルヲ多シ大黃ノ目利目利近來醫師ハ勿論某肆ニテモ他國ニハ取扱フ者不案内ナリ錦紋ノ大黃ハ壹斤ノ内壹分ハ有力

大頭病

既濟解毒湯二百十 治上扱下寒太便秘
無シ隨分吟味スベシ古方家ノ医中モ大黃ノ吟味不案内ユヘ其効ナレ故ニ近來巴豆入ノ丸專ラ行レルナリ予數目撃セリ故ニ雜病熱結ノ症ニ誤下ニテ仕モツレルヲアリ考ベシタリ
ヒ萬病一毒ヨリ生ズルニ為テカラ其毒大黃ニテ下ス症モアリ巴豆ニテ下ス症モアリ何デモ可テモ紫圓トハ仲景先生仲景先生コノキ玉ヘ手前ハ扁鵲ガ流ナリトハ捧腹ニ堪タリ

三黃湯加甘草桔梗柴胡升麻連翹當歸

此方上熱下寒太便秘結スル者ニ用之蓋シ上熱下寒ノ症太抵既濟湯ヲ用ルナリ既濟湯ハ竹葉石膏湯ニ加熟附子モノナリ此方ハ其上ニ太便秘結スル者ニ用ルナリコレテ三黃湯ニ加

味ノ名既濟解毒湯、今此書ニ大頭病ニ入ルハナセナレバ此方
 元來東垣ノ制方ニテ一老人酒病ニ因テ頭面耳ノ前後赤腫痛
 胸中煩悶咽喉不利、身半以下寒へ別シテ足脛ノ寒へ甚シ、飲食
 減少困倦體痛ハ謙云此症大頭病ニノ病因ハ風熱ニテハ無メ
 酒熱ナリ東垣治之頭腫ノ上ヲ砭^{イカリ}メ血ヲ取り氣海三里ニ灸ス
 謙云此療治至極尤ナリ其後此方ヲ制メ用井ラレタリ謙云病
 人元來熱實ノ者ト見ユルナリ此療治甚タヨキ療治ナレト令
 時頭カラ血ヲ取ルマウナ^一ハシラレ又私云近來刺絡ノ術行
 ル甚タ益アリ享保中其事未タ無シ若シ大頭病ニメ元來溫疫
 デモ無ク凡熱ニモ不因メ酒毒テ腫ルカ他ノ病テ頭腫レテ上
 熱甚シク赤腫ノ腰以下寒へ大便秘結スルナラバ此湯ヲ用テ
 下部ニ灸ラスベシ此茶ヲタ^一上熱下寒ノ藥ト意得ルハア^一

火

上熱下寒ノ茶ニハ品ニヨリテ溫補ノ藥ヲ用ル^一モアリ此方
 ハタ^一上焦ノ實熱頭面赤腫^レ下焦寒へ大便秘結スル^一モ
 ノニ用ル藥ト意得ヘシ

龍膽瀉肝湯 十便良方
二百十二 治膽瘰

- 柴胡 一錢 黃芩 七分 五味子 九粒 甘草 生 山梔 炒 知母 去毛炒
- 天門 麥門 黃連 炒 人參 龍膽 各五分

每服五錢水鍾半煎七分不拘時。○吳氏曰謀慮不決肝熱膽溢
 口苦痰盛者此方主之

此方謀慮不決肝熱痰盛^一口苦^一酸^一者此方主之^一徐春甫云謀

慮不決肝膽虛ノ口苦キ者ニハ人參茯苓神遠志ヲ君トシ柴胡龍
膽ヲ佐トス甚キ者ハ六味丸主之

○謙云外ニ加減龍膽瀉肝湯ノ一方アリ世間通用ノ本方ノ様
ニ意得十便良方ノ方ヲバ異方ノ様ニ思ヘ凡此書ニ載スル十
便良方ノ方ガ本方ナリ

加減龍膽瀉肝湯 治小便澀滯或莖中痛

龍膽 澤瀉 車前 木通 生地 當歸 黃芩 山梔

甘草各五分

右水煎○按此方治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中
疼痛○此加減ノ方ヲ東垣ノ用ラレタ症ハ酒濕ニ因テ腹中
不和前陰臊臭發ノ痒キ者ニ用ラレタリ謙云此柴肝經ノ濕
熱ニ因テ種々ノ症ヲ生シ脾腎未虛モノ何病ニテモ用ルト
意得ベシ

此方他病活用例

脇痛肝經ノ濕熱ニ因テ脇脇滿痛小便赤澀ナルニ加減龍膽瀉

肝湯ニ去黃芩梔子加生姜淋小便澀滯或莖中痛ハモノ加減龍

膽瀉肝湯主之**口病**方後云謀慮不決膽熱口苦キ本方主之**便毒**

肝經ノ濕熱便毒ヲ生シ兼テ陰莖生瘡ニ加減龍膽瀉肝湯主之

囊癰囊癰腫痛小便赤澀發熱渴ヲナスニ此湯去柴胡加黃芩梔

子甘草又囊癰熱毒盛ニ腫脹大便秘スルニ更ニ加防己連翹赤

茯苓大黃右薛氏加減但シ此症モ又虛ニ因テ氣血下溜ノ作ル

モノアリ調補升提ノ可ナリ瘡口傷レ膿水出ハ托裏ノ藥ヲ用

ベシ此一方ヲ不可類懸癰此症肝經ノ濕熱ニ屬スル者此方主

之**下疳**下疳肝經ノ濕熱ニ屬ノ瘡久ク不愈腐爛スル者加減龍

膽瀉肝湯主之然ルニ此症徃々屬虛者アリ此一方ヲ不可類

設西藥手引草

續編二火

百二十三

烏藥

傷寒

四逆散

二百十三

甘草

枳實

柴胡

芍藥

右四味各十分搗篩白飲和服方寸七日三服。效者加五味子乾姜各五分并主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚炮令拆泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

此証傷寒傳經ノ陽邪內陷ノ胸膈中焦ノ陽氣ト不能交通故陽氣四肢へ不行四肢厥冷スルナリ此熱厥ナリ温劑ヲ不可用サレハ腹中痛或大便泄利スレバ承氣ノ類ノ下劑ヲ不可用柴

胡テ内陷ノ陽氣ヲヒキ升せ枳實ハ内滯ノ結聚ヲ破リ甘草補脾胃芍藥散失ノ陰ヲ收ム此少陰否隔和解ノ方ナリ此四逆ハ熱結トイヘハ陰進ノ象アレバ寒藥ヲ不可用惟用和解ノ方。○加減ノ法字面テキコエル腹痛加附子ト云ガ不聞ヤツナレハ其病人素内有沉寒結滯ノ故如之若熱滯スル片ハ加薤白條腸垢止下重ナリ。

○戴氏云傷寒泄利下重其人四逆先以水盞半葱白二根煎一盞血去葱煎此散至七分

此方雜病活用例

痢此方痢病邪氣内聚裏急後重ヲ治スルノ總司トノ加減用ベシ

芍藥湯

二百十四

行血調氣經曰澀而便膿氣行而血止行血則保命

讀編二傷寒 痢 百二十四

便膿自愈調氣則後重自除

芍藥一兩 當歸一兩 黃連各半 黃芩各半 檳榔 木香 甘草二錢

官桂二錢 大黃三錢 右吹咀每服半兩水二盞煎至一盞食後

溫服清如血痢則漸加大黃如汗後膿盡加黃蘗半兩依前服

劉河澗ノ製ナリ行血調氣ノ方ニノ方下ニ云如クナレハ專ラ

濕熱ヲ除クヲ主トス故ニ初病熱痢壯實ノ者後重甚ク難通ラ

目的トス聊カ眞虛者勿用 治瀉痢腹痛後重或濕毒下血身熱久而不

愈及膿血稠粘者 當歸芍藥黃芩黃連各二錢 木香 甘草各一錢

痢

右水煎服○按當歸芍藥調血和血黃芩黃連退熱清腸木香行

氣甘草和中此血和則腹痛後重除腸清則濕毒膿血止丹陽坊

用之口訣有三老人虛人痢疾雖有裏急後重腹痛難攻擊者用

之其一也雖少壯病邪不甚者或行攻擊而病邪漸輕然欲用補

劑則猶恐補佳者用之其二也或因濕熱而便血下血者加地榆

槐花用之其三也

此方濕熱赤白下痢腹痛裏急後重少者宜用之丹陽坊云老人

虛人裏急後重腹痛アリトイヘハ難攻撃者ハ此湯ヲ用ユト云

醫方類聚

續編二痢

百二十五

萬葉堂藏

痢

方然... 虛弱脾氣弱者八可溫補此方決不可用

苓連芍藥湯

二百十六
名醫雜著

黃芩 炒二

黃連 炒一

芍藥 炒二

已上三味痢疾必用之藥

枳殼 炒各一

檳榔 各一

炙甘草 三分

右水煎。若腹痛加當飯

半 二錢

縮砂 再

加木香芍藥 各五分

後重加滑石

炒一 再

加枳殼檳榔 各五分

芍藥 生用

再加五分黃芩

實者必加五分

○若白痢加白朮茯苓滑石

陳皮 各一

初欲下之

再加大黃

兼食積加山查子枳實

○若紅痢加當飯川芎

桃仁 各一

初欲下之再加大黃

○若紅白相雜加當飯川芎桃

仁 各一

以理血滑石陳皮蒼朮

以理氣有食積亦加山查枳

實○若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減苓連芍藥

加白朮

黃耆茯苓陳皮

縮砂 去檳榔枳殼再加炙乾姜

○若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減苓連

加當飯川芎

地黃阿膠珠陳皮

白朮 若色赤黑相雜此濕勝也及

小便赤澁短少加水通澤瀉茯苓

山梔 以分利之○若

血痢加當飯川芎生地桃仁炒槐花

久不愈減苓連

檳榔枳殼再加阿膠珠

側柏葉 炒黑乾姜

白朮 陳

皮錢一○若痢已久而後重不去此大腸墜下ナリ去檳榔枳殼用條實黃芩加升麻一以升提之○若嘔吐食不得下加軟石膏一陳皮一山梔炒五入生姜汁緩呷之以瀉胃口熱○有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白朮陳皮黃連黃芩阿膠之類以補之而痢自止○有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當飯炒乾姜縮砂厚朴肉桂之類○若得痢而誤服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦宜用前方以下之下後方調之○若得痢便用前方正法下之而未愈又用前調理法治之而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補

火

寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂龜牡蠣烏梅等收澁之藥方下ノ論ニテ痢病通論大要盡セリ方後ノ加減宜考究用究ノテ良法ナリ常ニ熟覽ノ胸臆ノ中ニアルハ此症ノ治法ニ於テ明白ナルベシ

左金丸 二百十七
丹溪

黃連 六
兩

吳茱萸 一
兩
湯泡

右二味同炒為末神麩糊丸如桐子大每服三四十九丸白湯下

此方肝經火實左脇滿痛スル者主之此症脇痛ニテ胸ニ引テ痛三或脇痛ニテ欬嗽シ或泄瀉ヲ兼ル丁アリ或眩暈目雜ヲ兼子或嘔噦嘔逆ヲ兼子或眼赤久或筋惕シ或吐血狂乱スル丁アリ皆肝火ノ為ス處ナリ此丸主之

火

此方他病活用例

膈噎 膈噎火二因ル者此方主之名曰令丸**刺** 按刺兼テ胸脇痛ノ者此方主之即チ香連丸ノ意ナリ

當皈龍蒼丸 二百十八

當歸 龍膽 梔子 黃連

黃蘗 各一

木香 麝香 大黃 浸青黛

蘆薈 各五

右為細末煉蜜丸如小豆大每服二三粒

生薑湯下小兒如麻子大服忌發熱諸物云後人加柴胡五錢

青皮一兩以神麩糊為丸乃平肝瀉火之計較也

此方錢氏小兒驚風發搐ノタメニ設ル藥ナリサレモ此方ハ肝

小兒吐舌

火ヲ目的ニ用レハ種々ノ用カタアルベシサレモ近ク意得ルナレバ怒氣ニ因テ起ル所ノ諸病脈實數者ニハ何病ニテモ此方ヲ用ベシ

瀉黃散 二百十九

藿香 山梔 石膏 甘草

防風 四兩

右剉同蜜酒微炒香為末每服一錢至二錢水一

盞煎至五分温服清汁無時

此方小兒木舌吐舌ニ用ル藥ナリ木舌ハ舌硬ノ不柔是脾經ノ實熱ナリ吐舌ハ舌舒長スルナリ是心胸ノ積熱ナリ俱ニ此方主之弄舌ト云アリ舌ノサキ少シ見ノ即入ル是心脾ノ虚ナリ補脾散主之入參白朮各一錢芍藥茯苓各八分陳皮川芎各六分

醫方考手引草

續編二

火

小兒吐舌

百二十八

為集堂藏

利下重渴欲飲水者陰虛生穀也故宜苦寒之劑以之不可作陽虛
 而用溫劑也所以用白頭翁以升木氣之下陷秦皮以堅肝腎之
 滑脫連麋以泄腸胃之濕熱較少陰證便膿血桃花湯之用乾姜
 迴乎角立也蓋少陰之水氣下奔雖為熱邪故可用從治之法厥
 陰之風氣摧拔木火駭々內動是以不可復用辛溫鼓激其勢也
 此方ハ本論ニイロク云テアレバ捷利下重スル者ニ用ル薬ト
 意得ベシソレテ全價ニハ下利ノ薬トスル今時痢ニ可用薬也
 此方雜病活用例

痢 一種陰虛痢疾切戒攻積之藥凡見痢下五色膿血稠粘滑泄無
 度發熱煩渴脘下急痛至夜轉劇而惡食或下鮮血者便屬陰虛急

宜救按存陰為主如蘇車丸阿膠丸飯連丸阿膠梅連丸千金黃連
 阿膠湯白頭翁加甘草阿膠湯等選用

喘

瀉白散 二百九二
錢仲陽

治肺熱欬嗽手足心熱

桑白皮 蜜炙
姜汁和

地骨皮 各一兩

甘草 炙五錢

為散每服四五錢入粳米百粒竹葉一把水煎服加橘紅桔梗各
 加味瀉白散有熱更加知母黃芩如有客邪禁用醫通曰或問地
 骨皮三焦氣分藥瀉白用之何義答言三焦屬腎實則瀉其子也
 門人曰唯吾道一以貫之

此方肺熱ノ喘急ニ用ル茶ナリ粳米必不可欠用ベシ

此方他病活用例

欬嗽方下ノ主治ノ如シ方後ノ加味ハ欬嗽ノ加味ナリ方後地骨皮ノ論ハ欬嗽ニ用ル片ノ論ナリ畢竟地骨皮ハ腎火ヲ瀉スル茶ナリ腎火ヲ瀉スレバ肺ノ子ヲ瀉スル程ニ母ノ肺ヲ瀉スル意ニ落ル故ニ名瀉白散同李挺云五更ノ時欬多ク痰少キハ食積濕熱肺中ニ流ルナリ此方加知母同又云火欬久キ者ハ痰ナレ此方加桔梗開之勞忘又云痰勞小便不利ニ加銀柴胡秦芫桔梗木通澤瀉當歸木香小便利ノ病去ルナリ火忘吳氏方考火門ニ入ル入門云悲哀ノ火肺ニ起レバ氣逆膈鬱加黃芩葶藶

欬嗽

東垣瀉白散

東垣二百廿三

治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘急

桑白皮一兩地骨皮七錢人參 五味子 陳皮 青皮各五錢茯苓三錢

右入粳米二十粒煎服〇百二十方云按治虛症久嗽之方也用滋

陰降火湯而此忘ト陰虛火動ノ症ニテアル一ジツ肺氣強

虛則與此湯有奇効血婦人久嗽不已有欬血而不食脉無力雖

清效湯失血之證而肺無火邪故用此湯而全愈〇此忘與瓜蒌

枳實湯則却為吐血慎之瓜蒌枳實湯ノ忘トハ素リ雲泥ノ違ナリサヤウナ誤治ヲスルナレバ吐血モスルハツ何ヤウノ了ガ出來テコウヤラ知レヌ

此方方下ノ主治医学綱目云喘ハ陰氣在下陽氣在上諸陽ノ氣浮無所依從故ニ欬嗽上氣喘也謙云陰氣在下陽氣在上云ハ

喘

喘ノ了ト覺ヘテ居レバソレテスム此方ノ用方ハ肺熱欬喘
ヲ兼テ嘔吐スルモノニ用ル葉ナリ但シ陰虛勞嗽ト風寒客邪
有テ欬嗽スルニハ宜シカラズ勿用畢竟原方ノ瀉白散ニ加人
參茯苓五味子補虛加陳皮青皮治痰氣合点ノ製方ナリ
○本邦老匠ノ傳ニ瓜蒌積實湯ノ症ノ虛症ニ用ルト云ヘリ或
虛喘ニ用ルトアリ餘脉皆弱ク右寸ヒトリ有力ニ此方ヲ用ル
ト云ヘリ意ヲ以テ考用ベシ

寶鑑瀉白散

寶鑑
二百廿四

治欬而口乾煩熱胸膈不利氣喘促

桑白皮

一兩

地骨皮

知母

陳皮

桔梗

各五

青皮

細辛

黃芩

甘草

各二

右煎服

欬嗽

百二十方云按太抵治喘嗽之方也數感冒發熱退後欬痰又
止不食尿赤無汗得奇効同久勞欬痰久不止而後成龜胸龜背
聲噴盜汗足冷大便結脉細數與七十餘貼而胸背如常喘止本
常患喘之人因氣鬱發尿赤脉浮數加紫蘇杏仁枳殼茯苓而安
羅謙甫當時此方ヲ製スルハ病ニ臨ンテ方ヲ製シタモノナリ
始ヨリ一定ノ方トハ三ヘ又今テ用シナラバ肺熱喘急口乾胸
膈不利トノニ用ベシ

加減瀉白散

準繩
二百廿五

治欬喘喘急脇痛胸滿氣促肺經濕熱等症

桑白皮

桔梗

瓜蒌仁

升麻

半夏

杏仁

地骨皮

各五

甘草五分 右入姜水煎服〇百二十方云按此方治肺火欬

嗽要方也

此方欬喘二用ル某ナリ肺熱痰甚ク胸痛喘滿スルモノ主之

〇右瀉白散四方始ノ原方ハ肺熱喘急ニ用ル又欬嗽手足ノ心熱スルニ用ユ第二東垣瀉白散ハ肺熱欬喘ヲ兼テ嘔吐スルモノニ用ル某ナリ第三寶鑑瀉白散ハ肺熱喘嗽ニ用ル某ナリ第四加減瀉白散ハ肺熱欬喘甚キニ用ル某ナリ

此方他病活用例

哮喘

一男子氣積ニ依テ上氣伊豆ノ熱海ニ湯治初メ六七日相應ノ食進ニ氣積快シ然ルニ頻浴過多ニ因テ氣逆シ胸塞疼喘息麤ク横臥ナシ寸脈緊實ニノ尺脈虛又足冷膝心ヨリ以上

ニ氣アリテ下ハ虚ス喘促声四隣ニ聞ユ此湯一貼ヲ與テ息少シ定リ厥止ニ貼ニノ平復ス

火

升陽散火湯

二百廿六 東垣

本方去獨活加葱白名火鬱湯

升麻 葛根 獨活 羌活 人參 白芍各五

柴胡八 防風三 生甘草二 炙甘草三 每服秤半兩水

二盞煎至一盞去粗稍熱服忌寒涼之物及冰水月餘

此一方東垣先生立方ノ本旨卒ニ難解トイハレ先ツ何ニモセヨ發熱肌熱甚ク手ヲ烙力如キ者ニ於テ此方ノ忘力不怠カト云穿鑿スベシ無熱者ニハ一向不與某ナリ然ルニ熱ヲ患ル所

因多端ナレハ其所因ヲ精シク吟味セ子ハナラヌ又太抵血虚ス
 ルキハ咽乾ク故ニ冷物ヲ好テ過食スル工へ脾胃ノ陽氣ヲ抑
 遏スルワレヲ升陽ノ劑ヲ用テ火鬱ヲ散スル粗土扱甚キヲ見
 テ即苦寒沉降ノ劑ヲ用工秋降冬沉春升夏浮此方ハ春夏升浮
 ノ藥ナリ

傷寒

六書陶節庵升陽散火湯

此湯治有患人又手冒胸尋衣

摸床謔語昏沉不醒人事俗医不識見病便呼為風証用風葉悞
 以死者多矣殊不知肝挾乘於肺金元氣虚不能自主持名曰撮
 空証小便利者可治小便不利者不可治

人參 當皈

柴胡

芍藥

黃芩

甘草

白朮

麥門

陳皮 茯神

有痰者加姜汁半夏○大便燥實識語發

渴加大黃泄瀉者加升麻炒白朮

水二鍾姜三片棗一枚搗法

八金銀首飾煎之換服謙云此症實非傷寒亦非時疫方下所謂
 肝挾乘於肺金病而類於時疫傷寒者也

○李挺云此方傷寒撮空ノ症主之此肝挾肺ニ乘シ元氣虚弱不
 能主持謔語神昏不省人事ナリ此方本邦老医名撮空散火湯

此方本症主用例

壯年ノ出家三年以來手足心焚氣不了々脈弦數四物湯加知
 母黃柏不効用此湯愈

此方他病活用例

腹痛 腹痛ニ此湯ヲ用ルハ腹痛ニ去來ガアルナリ虫痛寒痛
 ハ痛ニ去來ナシ

大補丸 丹溪

二百廿七

治陰火亢極足脛疼熱不能久立及婦人火鬱

火

火

發熱

厚黃蘗

塩酒拌陳米飯上蒸每蒸必拌炒黑亮如漆為度

煉白蜜九梧

子大每服二錢空心醇酒下如服之不應每飭加厚肉桂一兩

吳氏方考ヲ按スルニ腎火從臍下起ルモノハ水衰ナリ此方主之或腎火盛ニ足常ニ熱者用之是等皆腎火ノ目的ナリ黃柏味苦ノ厚シ陰中ノ陰莖ナリ腎經衝逆ノ火ヲ制ス火去ル片ハ水生ス故ニ大補ト云然ルニ單用スベカラズ氣虛ニハ補氣ノ劑血虛ニハ補血ノ劑ヲ用テ下之此丹溪ノ服法ナリ此丸ヲ他病ニ用ルモ又此法ニ依ルベシ

此方他病活用例

痿濕熱陰火盛ニ痿瘖トナルモノ主之痺濕熱陰道ニ入テ下身尽ク痛三或偏枯トナル是ヲ痛風ト云此丸ヲ散トナシ潛行

散ト名ク嘔血嘔血ハ声下焦ヨリ出ツ此丸主之耳鳴陰火盛ニノ耳鳴欲聾モノ此丸主之欬逆欬逆不足者人參白朮湯下此丸

滋腎丸

二百廿八

治陰虛大渴小便瀉痛熱起足心

大補丸十分

加知母七分

肉桂一分

滴水為丸食前沸湯下七

八十九〇凡熱在足心直衝股內而入腹者謂之陰火起於湧泉之下雖熱而不發渴為熱在膀胱此方主之

主治方下ノ如シ咽不渴ノ小便閉モノ主之

東垣先生醫按曰一人病小便不利目睛突出腹脹如鼓膝以上堅硬皮膚欲裂飲食且不下服甘淡滲泄之藥皆不効李曰疾深矣

盜汗

非精思不能思之。半夜曰吾得之矣。內經有云。膀胱者津液之府。必氣化乃能出焉。今服淡滲之藥而病益甚者。氣不和也。啓玄子曰。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。甘淡氣薄。皆陽藥。獨陽無陰。其欲化得乎。明日以滋腎丸。群陰之劑。投之。再服而愈。

當皈六黃湯

二百廿九

治盜汗屬陰虛者

當歸

黃耆各一

生地黃

熟地黃

黃柏

黃芩

黃連

各七分

右煎服

此陰虛盜汗ノ主藥ナリ。不得止而暫可用之。寒涼損胃ノ藥ナレバナリ。○浮石山去黃柏用蒲黃。○一方去熟地黃加甘草麻黃根浮麥。○赤水玄珠常ニ加酸棗仁。○或曰滋陰降火湯ノ忘ニノ換

虛勞

甚キ者此方用之。○此方ヲ用ヘキ症ニ無疑ノ盜汗不止者ニハ正氣湯ヲ用ベシ。但シ潤劑ニ宜キモノハ此湯燥劑ニ宜キモノハ正氣湯ナリ。正氣湯方 黃柏炒 知母炒各一分 甘草炙五分 水煎食遠服。○以上皆陰虛火盛ノ症ナリ。若シ傷寒ノ盜汗ハ半表半裏ノ症ニ非ス。不退ニ屬ス。此湯ノ忘ニ非ス。

滋陰降火湯

二百三

治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾此

方與六味地黃丸相兼服之大補虛勞神効

當皈

酒洗一分

白芍

酒炒一分

生地黃

熟地黃

姜汁炒

天門心

麥門心

去

白朮

各一分

陳皮

七分

黃柏

蜜水炒

知母

各五分

甘草

炙五分

盜汗

虛勞

百三十六

烏真堂

右劉一劑生薑三片大棗一枚水煎服入竹瀝童便薑汁少許
 同服本骨蒸勞熱者陰虛火動也加地骨皮柴胡如服藥數劑熱
 不退加炒黑乾薑三分盜汗盜汗不止者氣血衰也加黃耆酸棗仁
 炒痰火痰火欬嗽氣急生痰加桑白皮紫菀片芥竹瀝血欬欬痰中
 帶血者難治也加片苓牡丹皮阿膠梔子紫菀犀角竹瀝乾欬乾欬
 嗽無痰及喉痛生瘡聲啞者難治也加片苓瓜蒌仁貝母五味子
 杏仁桑白皮紫菀梔子同欬痰多津液生痰不生血也加貝母
 款冬花桑白皮咽喉痛生瘡聲音不清或咽乾燥虛火盛也用山

豆根磨水噲之再用吹喉散噲化丸方見回痰火擁喉提腫下者
 同治痰火痰火作熱煩燥不安氣隨火升也并痰火怔忡嘈雜加酸
 棗仁山梔炒黃連竹茹辰砂竹瀝痰火驚惕同治腰痛血虛腰痛加
 牛膝杜仲痿血虛脚腿枯細無力痿弱加黃耆牛膝防己杜仲去
 天門冬遺精夢遺泄精者虛火動也加山藥牡蛎杜仲破故紙牛膝
 去天冬淋濁小便淋濁加車前瞿麥車前蘼蘼扁蓄牛膝山梔去芍藥腫痛
 陰虛火動小腹痛者加茴香木香少許去麥門冬足熱陰虛火盛足
 常熱者加山梔牛膝去麥門冬

此方陰虛火動初起脾氣未虛者一旦用之効ヲ取ル其症大抵方
下ノ如シ或氣實ノモノト云ヘ凡病後ナドニテ一旦勞症ノヤ
ウニ変スルモノニ用之又病初發ニ非ストイヘ凡氣實モノ
陰虛火動ヲ患ルニ医者アマリ念ガ入り過テ降火ノ薬ヲ用テ
脾胃ヲ傷ランカト恐レテ温補ノ劑ヲ用井及テ病重クナル者
ニ此湯ヲ用テ得利アリ本邦ノ老医回春ヲ貴ニテ虚勞トサ
ヘ云ハ此方ヲ用テ誤ルコト多シ今ノ医ト云ヘ凡老医ノ傳ヲ受
タル者ハ勞症トサヘ三レバ此湯ヲ用ル中比薛己流トヤ才
召^{コソ}医者右ノ弊ヲ擣スギテ此方ヲバスキト用又ヤウニスル此
方モト王節齋が明医雜著ノ補陰瀉火湯ニ加減シタモノナレ
バ根カラナイ方ニテナレソレホトアシキ方ナラハ薛己が刪
リスレテソウナモノナレ凡謙云補陰瀉火湯ニ人參ヲ加ヘ

タリ凡不都合ナルコトニテモアルニサレ凡王節齋が殊外ノ
人參ギラヒユヘ不用ト見ヘタリ此ニ依テ考ルニ此方モ加減
ニヨツテ成程用ヒ様ノアルベキ薬ナリ元來其症ニ應ジサヘ
スレバカタノ如ク効アル薬ナリ物惣メ此方ニ不限甚タキク某
トソレホドキカ又薬ガアルモノキク某ハ活メ他病ニ用テ三
ルニ効多シ去ルニヨツテキク某ハ射ラ他病ニ用ル例ガ多キ
モノナリ

雲林龔氏曰夫虚勞症者自因元氣不足心腎有虧或勞傷氣血
或酒色過度漸至真陰虧損相火隨旺火旺則銷鑠真陰而為嗽為
喘為痰為瘵為吐血衄血為盜汗遺精為上盛下虚脚赤心提皮焦
午後怕寒夜間發熱或日夜不退或嘈雜怔忡嘔噦煩燥胸腹作痛
飽悶作瀉痞塊虚驚面白唇紅頭目眩暈腰背酸疼四肢困倦無力

虛勞 百三十八 烏巢堂藏

小水赤色脉來數大或虛細弦急怪症多端犯此難治虛勞不受補者難治喉痛生瘡舌啞者難治久卧生眼瘡者難治皆是陰虛火動也○丹陽坊云按歸芍生熟二苓可以滋陰益血黃柏知母可以滋陰降火火動則金衰天門麥門可以救金火盛則氣耗白木甘草可以養氣陳皮所以消痰利氣也童便何也丹溪曰凡陰虛火動熱蒸如燎服藥無益者非童便不能故加竹瀝何也丹溪曰經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補與薯蕷寒補義同故加又云竹瀝滑痰非助以姜汁不能行故加

○友松子曰古今醫鑑名滋陰降火湯者乃明醫雜著之補陰瀉火湯也即本方無麥門有川芎乾姜治色慾忘先見潮熱盜汗欬嗽倦怠趁早服之云○又謂王節齋長於補陰瀉火而創制此方尚曰先見潮熱趁早服之其方後曰此病屬火大便多燥須節調飲食勿令

泄瀉若胃氣復壞泄瀉則前項寒涼之藥難用矣宜服理脾胃藥又云若見血症涼之止之不應則葛可久十棗神書次第檢用又云收功保後合補陰丸常服之及用葛可久方觀此數條平篤齋亦未嘗全恃寒涼之劑以圖退火矣龔雲林既學節齋之方而不悉節齋之法於回春則專恃寒涼用治虛勞加減之藥亦類聚苦寒趁伐元氣之物未知此訣學于何等妖師而殺人不見血耶至於區流依回春作活計者凡見虛勞熱症不論藏府陰陽一概妄用直至元陽脫絕亦不回互更用此藥以圖補陰及致藥殺且云用滋陰降火湯而不應乃天命也嗚呼天命有是陰寒殺伐則地上并絕生物耳可不哀哉今後用是方者當知節齋立方本旨如色慾之人先見潮熱盜汗欬嗽則趁早服之若經多白直元受傷則此方禁勿與之

百二十方按云滋陰降火湯脉細數而無力細弦而數數大而虛
百三十九
烏巢堂

是也眼睛清冷如肅然有悲是也木抵陰虛症譬秋冬令故顏色青
醒眼中清冷惡寒發熱口乾声濁兼以欬嗽故問參蘓飲加杏仁五
味子以有退其症者若不退當宜此湯參蘓飲退表衛之按降火湯
清裡營之火豈無辨別而混用哉學者識之

此方他病活用例

喘急陰虛火動喘急二八此湯加蕪子沉香桑白竹瀝**眩暈**陰虛火
動**暈**二八此湯加川芎天麻竹瀝**消渴**下消八小便如膏此湯去
芍藥加天花粉山梔子葛根黃連烏梅**濁**瘦人虛火赤白濁二八去
芍藥加白朮葶藶山梔子**呃逆**臍下ヨリ氣上テ呃逆スルモノ
ハ加縮砂茴香沉香木香山梔辰砂柿蒂**小便閉**陰虛火動小便不
通二八加猪苓澤瀉木通牛膝**吐血**吐血ノ後痰アルハ陰虛火動
ナリ此湯主之**心恍**陰虛火動心恍二八加遠志酸棗**欬嗽**本症ノ

欬嗽二八加五味子欬冬**痰飲**本症ノ痰飲二八加貝母瓜蒌盜汗
本症ノ盜汗二八加酸棗仁牡蛎**勞**產後勞脾氣未虛モノ此
湯主之**積聚**陰虛火動積聚アルモノ未虛此湯ニ合大七氣湯
感冒陰虛火動ノ症酒食ト外邪ヲ挾ニ本症ト交リ發スルニハ
此湯ニ合藿香正氣散**傷寒**傷寒大半愈テ陰虛ノ候アルモノ此
湯主之**同**寒疫大半退キ時々譫語不止飲食少ク脉五動餘無力
與此湯應ス是其人素リ陰虛スル故ナリ**尾抵骨痛**小兒尾抵骨
痛ニ此湯加肉桂為引經**脛瘡**脛瘡久ク不愈足脛熱スルニ用此
湯奇効アリ**灸瘡**灸瘡血出テ走ルニ此湯主之**痛風**四十五六歲
ノ男体如常色黒ク去年左ノ耳上痛ニ如破大苦一四五ヶ月右
邊無効今ニ至リ不愈左膝腿手足腰肩臂共痛右身各無効不堪
行歩時ニ胸少痛遇淫雨酷暑トキハ痛甚ク全不食得酸味トキ

醫書卷之五
續編二
虛勞
百四十
烏巢堂藏

ハ食進三脉五動大便順小便順夜必二三度通利此湯主之痢痢
病午後ヨリ夜半ニテ十六七行夜半ヨリ日中ニテ二三行裏急
後重熱少アルニ此湯ヲ用テ愈タリ惣別痢病去來アリテ諸藥
効ナキニ此湯ヲ用テヨキナリ下焦ノ火ヲ瀉スル故ナリ
○凡陰虛火熱ニ属スル諸病活メ此方ヲ用テ奇効アリ

清肺湯 二百三十一回 治一切欬嗽上焦痰盛

黃芩 一枚 桔梗 茯苓 陳皮 貝母 桑白皮 各一 當歸
山梔 天門 杏仁 麥門 各七分 五味子 七枚 甘草 三分
右剉劑生姜東子煎食後服○痰咯不出加瓜薑 潤痰 枳實 降痰 竹瀝

清熱去五味子 忌飲 ○欬喘急加蕪子 下竹瀝去桔梗 ○痰火

欬嗽面赤身熱咯出紅痰 痰血加芍藥生地黃 何七痰血 紫苑阿

膠竹瀝 去此力害ニモナラ子用 五味杏仁貝母桔梗 ○欬虛

汗多者加白朮芍藥生地黃去桔梗貝母杏仁 ○欬喉痛舌不

清者加薄荷 喉痛 生地紫苑竹瀝去貝母杏仁五味 ○嗽而痰 濕痰

多者加白朮 濕痰 金沸草去桔梗黃芩杏仁 ○欬嗽身熱加柴胡 解熱

○欬嗽午後至晚發熱者加知母 陰虛 黃柏生地黃芍藥竹瀝去

黃芩杏仁 ○欬嗽痰結腸痛者加白芥子 腸痛 瓜薑枳實砂仁

醫方類聚 續編二 虛勞 百四十一 烏巢堂藏

火

木香小茴竹瀝姜汁少許去貝母杏仁山施亦加柴胡引經柴胡少

陽經兩服へ引クナリ

肺痰嗽ノ甚ナリ脈數而無虛候者主之痰嗽ニ三ツアリ痰火ヨリ生スル痰嗽ハ瓜蒌枳實湯主之肺痰ヨリ出ル痰嗽ハ此湯主之濕痰ヨリ出ル痰嗽ハ二陳湯ニ加減スヘシ

柴胡湯二百三治肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅

腫痛俱肝火也

柴胡 芍藥 川芎 龍膽 當皈 青皮 山施

連翹各一

甘草五分

右劉一劑水煎食後服

火

方下ノ病候皆肝火ナリ回春云左関脈洪數者肝火ナリ

此方他病活用例

脇痛脇痛肝火盛ナル者此湯主之眼目俗ニ云ノボリ目ト云モ

此湯主之

黃芩湯二百三治肺火欬吐血痰血鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或

鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛

黃芩 山施 桔梗 芍藥 桑白皮

麥門冬 荆芥 薄荷 連翹各二 甘草三分

右劉一劑水煎食後服

方下ノ病候皆肺火ナリ回春云右寸脈洪數者ハ肺火ナリ

此方他病活用例

欬嗽肺熱欬嗽此湯主之鼻鼻孔乾燥生瘡或鼻腫痛スルモ此湯主之 李挺云涼血行血古人方初黃芩湯加當歸金謙云黃芩湯則原方也非回春黃芩湯

怔忡

清火安神湯 二百三十四 治驚悸怔忡心神慌亂

當歸 一分 生地黃 一分 酸棗仁 炒各一分 芍藥 酒 黃芩 各八分 黃連 各八分

麥門冬 一分 川芎 一分 山梔子 一分 遠志 各七分 甘草 二分

右入姜煎服

怔忡ノ症多端ナリ此方ノ血不足氣有餘火升テ怔忡不寧忡ニ用之ナリ

狂

清心化痰湯 二百三十五 治精神不守喜笑不常言語錯亂妄見妄言

豨高酒 南星 半夏 陳皮 茯苓 黃連

當歸 酒 生地 川芎 人參 酸棗 炒 菖蒲 各一分 甘草 二分

右入姜煎服

此狂症ノ一方ナリ痰火ヲ退ケ心肝ヲ補フ劑ナリ

導赤散 二百三十六 心熱小便黃赤此方主之

錢氏

及...

續編二

怔忡 狂

百四十三

烏巢...

生地黄 木通 甘草梢分等 右為末水一盞入竹葉同

煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩○局方主治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩燥悶亂傳流下經小便赤澀淋澀臍下滿痛

此方心熱小便赤者主之加入參麥門燈心名加味道導赤散小便黃赤口乾煩渴スル者宜之

此方他病活用例

小便黃赤方下ノ主治宜考同前症煩渴ヲ加ルニノ加味道導赤散主之小便閉熱盛ニ莖中澀痛者加山梔大黃同上熱者加黃連燈心淋色鮮者心與小腸虛熱也去甘草加黃芩口舌虛熱口瘡糜

爛者柴胡地骨皮等分水煎服心胃壅熱水穀不化者此湯合四艾散

火

火鬱湯二百三十七回 治火鬱

山梔 柴胡 乾葛 撫芎 白芍 連翹 地骨各 甘草分

右剉一劑水煎服

小便赤澀五心煩熱口苦舌乾脈數ナルハ火鬱ノ症也此湯主之

甘梨漿二百廿八類篇

甘梨漿水類也生之可平六府之陽殺之可濟五藏之陰實火

宜生虛火宜殺

火

生發ノ服法宜考熱症既ニ極テ氣血消燦トコトモナウ氣分ア
シキヲ見テ三年ノ中ニ癰疽ヲ病テ可死ト云モノアリ病人教
ニ因テ食之豫メ防之他藥ノ非所及毎自食之生梨ナキハ乾
梨ヲ以テ湯ニホトバシ食之遂ニ免ル、一ヲ得夕リ

白虎湯

二百卅
九 寒

石膏

一 劬

知母

六

甘草

二

粳米

六

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

續論曰諺云

世上テ

春不服白虎湯

為瀉肺也蓋

其意者ハ陽氣

レニ石膏知母ノ寒降ノ藥ヲ用テ肺ノ春主陽氣上升石膏知
陽氣ヲ瀉ノ生發セザラシムルヲ恐ル

母苦寒降下惡其瀉肺之陽而不得生發也此特
此春バカリ白
虎湯ヲ不可用

ト云ハ春ハ温病ノ行ハル、時節黃芩湯ヲ用ベキニ指春不
不用自汗煩渴ニ白虎湯ヲ用ニカト云フヲ恐ル也

可用者恐人誤以治温病之自汗煩渴也至於秋冬
春斗テナニ
秋冬ノ感冒

傷寒ニ白虎湯ヲ混用ノ肺腎ニ藏ノ真氣
感冒傷寒反可渾用

ヲ傷リテモ苦ウアルマイカト、ガムル
專主熱病冬ヨリ

以傷金水ニ藏之真氣乎此湯
此カラ白虎湯
主治ヲ云

ス中喝當坐ノ暑氣
有氣虛ニ病ニニ氣虛蒸発ス
不能蒸発者

則加人参故張隱菴
傷寒集註
以為陽明宣劑
發散ト
其於湿温

則加蒼朮白
蒼朮温瘧則加桂枝白
皆夏月ノ
夏月所
見之證故昔人又
八月中氣ノ後ハ
有秋分後不可妄用白虎之戒

此方夏月熱病又夏月中暈ノ薬ナリ今此書ハ温熱病時疫一ツ
ニメ主治ヲ立ルナリ熱病ハ惡寒甚ノ無惡寒大渴引飲或身疼
△アリ此方主之又夏月天外ノ暴暑ニ傷ラレ中暈ノ病ヲ發
ス其症熱病ト全ク同シ熱病ハ脉必盛ナリ中暈ハ脉必虛ス但
シ弦細芤遲ナルヲモアリ治方ハ同シク此湯ヲ用ルナリ故此
湯温熱病時疫暑熱ヲ以テ此湯ノ本症トスルナリ石膏大寒陽
明ノ熱ヲ救ヒ知母少陰ノ源ヲ清シ甘草粳米心包絡ヲ護テ肺
ヲ保ツナリ

此方本症主用例

○中熱脊惡寒スル者ハ人參白虎湯主之 中熱中暈同症也○中
熱舌ノ邊紅ニメ中黑ク滑ナルハ人參白虎湯主之○中熱頭痛
躁亂不寧或身鍼ニテ如刺此熱肉分ヲ傷ル此湯加蒼朮○時疫

脉洪長ニメ渴シ大汗出テ未可下者ハ此湯主之○時疫下劑ヲ
用テ後脉又浮ナル者ハ可發汗此湯主之○時疫舌上白胎アツ
テ渴スル者ハ此湯主之○發斑未下以前胃熱發斑セハ人參白
虎湯主之熱勢盛ナラハ合解毒湯謙云一名化斑湯中暈熱病時
疫ニテ發斑スルモノ化斑湯ヲ用ベシ即人參白虎湯ナリ○温
熱病暑熱時疫謔語ノ面垢キ遺尿スル者ハ此湯主之○温熱病
自汗表蒸ヲ服メ大汗出テ不止煩渴脉洪大此湯主之○温熱病
無汗ハ黃芩湯此湯或三黃石膏湯主之○熱病或中暈頭重脹痛
スルニハ俱ニ此湯主之○熱病脉洪大自汗舌燥飲水小便不利
此湯主之○濕病嘔吐スルハ此湯合黃連解毒湯○温熱病欬嗽
スルニハ黃芩湯或此湯俱ニ加苕根竹葉○熱病手足厥逆脉滑
ナル者ハ此湯主之○熱病拂鬱面色忽赤少忽不赤煩渴飲水ハ

人參白虎湯主之。○ 煖病眠リカチニテ塞目ト其ニ、眠リ譫語
 煖アル者此湯主之。○ 濕熱病時疫譫語小便淋瀝眠ル少キ者
 ハ此湯加山梔。○ 煖病戰慄ヲ發者ハ此湯合黃連解毒湯重裏志
 ル者ハ涼膈散雙解散主之。○ 陽毒ノ志ハ壯熱頭痛躁悶不寧或
 狂言罵詈妄言妄見或膿血ヲ唾シ面ニ發斑ヲ生シ或舌卷キ焦
 レ黒ク鼻煤ク或咽喉腫痛大便黃赤ヲ下シ脈洪大ニシテ數此湯
 主之咽痛腫痛ニハ加犀角玄參升麻或犀角玄參升麻甘草四味
 各等分前服

此方他病活用例

瘡暑瘧又名瘧瘧成暑ノ時發セハ人參白虎湯或桂枝白虎湯主
 之喘喘忘暑月ニ發スル者此湯主之消渴上消ハ舌上赤裂大渴
 引飲人參白虎湯主之中消ハ能食而瘦自汗大便硬少小便數十

熱病中喝

ル者調胃承氣湯主之淋渴ノ欲飲水モノ人參白虎湯主之積熱
 氣分ノ實熱此湯或敗毒散加荆芥青皮白朮

白虎加人參湯

二百四十寒

石膏

一觔

知母

六兩

甘草

二兩

粳米 六人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

白虎湯ノ志ニメ氣弱キ者此方主之故ニ用カ夕皆本方ニ入ル
 友松子師傳云凡白虎湯之證皆加入人參然レハニ方俱ニ皆白虎
 加人參湯ト意得ベシ今按ニ此人參ノ分兩多少時ニ臨テ差畧
 アルベシ人參ノ上品下品時ノ宜キニ隨ベシ

此方他病活用例

消渴東垣曰舌上赤裂大渴引飲此高消也調神論云心移熱于肺
 傳為膈消者是也以此湯治之發熱壯男每夜發熱譫言晝則煖不

熱病
中喝

甚目微赤神如痴尿黄赤脉四動少有力此湯主之。○此條中編ノ諸熱門ト参考スベシ老医ノ傳ニノ不可解ナリ凡白虎湯ノ症渴甚キ者ハ何レモ人参ヲ加ベシ

如神白虎湯二百四十一陶 即白虎湯本方自有加減法

治身熱渴而

有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用

石膏 知母 甘草 人参 山梔 麥門冬 五味子

水二鍾棗一枚姜一片槌法加淡竹葉十片煎之熱服○心煩者

加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無

渴不可服此茶為大忌

溫熱
病

此方陶節庵カ方ナリ何ニモ仔細ハナシ本方ニ加味ノ茶性ヲ緩ルクシタルニテナリソレデ脉來微洪ト云本方ノ脉ハ洪盛ナリ

竹葉石膏湯二百四十二寒 竹葉二把 石膏一觔 半夏半升 人参三兩

甘草二兩 麥門冬一分 粳米半升 右六味以水一斗煮取六升

去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

此湯溫熱病愈後餘熱有テ嘔逆スル者ニ用ル茶ナリ人参白虎湯ニ去知母知半夏麥門冬竹葉病後虛煩ノ氣少餘熱未尽故二人參甘草ヲ用テ益氣麥門冬竹葉除虛煩清熱生津液半夏痰飲嘔逆ヲ治ス知母ヲ不用ハ病後ノ餘熱ナレバ熱病最中トハ異

續編二 熱病中喝 溫熱 百四十八 烏巢堂藏

ナリ知母ヲ用テ腎經ニ伏スル所ノ邪ヲ伐ツニ不及ナリ粳米
ヲ用ルハ白虎湯ト同シ意味ナリ。○加減。○氣弱大渴倍人參。○
多汗加黃耆。○陰虛夜煩加知母燈草生地黃芍藥。○嘔吐去石膏
加陳皮茯苓。○痰加貝母。○泄加白朮澤瀉

此方本症主用例

熨病脉滑而厥逆スルハ陽厥ナリ裏ニ鬱熱アリ表ハ厥冷スル
ナリ白虎湯或此湯主之。○病後不惺々錯誤寒熱瘧ニ似タリ煩
熱頰赤ク脉來浮數而輒此發汗未盡熱留テ心包絡ニ在リ此湯
加麻黃。○起居不常虛熱燥渴喘嗽氣乏是勞復ナリ此湯去石
膏半夏加大棗。○農夫田野ニアリ或力役ノ人暴暑ニ傷ラレ頭
角額痛發熱大渴引飲脉洪汗大出者急ニ地漿水ヲ作テ蒼朮白
虎湯ヲ煎用エ若老人寒茶ヲ不可用者ハ此湯ニ加熟附子少但

シ平生陰虛多火ノ老人ニテ熟附子難用モノニハ人參白虎湯
ニ加竹葉

此方他病活用例

衄血傷寒或雜病衄血ノ渴シ欲飲水水入レバ即吐スルアリ先
五苓散ヲ服シ次ニ用此湯霍亂吐瀉厥逆少氣唇面爪甲皆
青六脉俱ニ伏ノ酸穢ヲ吐出シ瀉スル所ノ大便甚々臭ク小便
黃赤ナルハ虛寒ノ症ノ様ナレバ熱厥陰經ニ伏メ熱極リテ陰
症ニ似タリ急ニ地漿水ヲ造テ此湯ヲ煎服ス效嗽上并日數多
キハ有火此湯去之同熱嗽諸藥不効此湯去竹葉入粳米少加知
母多加五味子栝石必審是伏熱在上焦心肺間者可用之

異方竹葉石膏湯

治胃實火盛而作渴

竹葉 石膏 栝梗 木通 薄荷 甘草 各一

溫熱病

右水煎服願生微論云火實則南方必盛以竹葉瀉之火亢則西方必囚以桔梗救之薄荷清其上木通清其下石膏甘草直入成土而清其中三焦之火皆平則水精上輸于肺水道下輸膀胱燔蒸若掃而溼液自克矣

竹葉石膏湯 二百四十 微論 治胃虛火盛而作渴

竹葉 二 黃耆 生地黃 麥門 當歸 川芎 甘草

黃芩 石膏 煨 芍藥 人參 各一 右水煎服○夫胃氣

大虛苦寒 黃 甘寒 麥門石 皆在禁例 禁入 此云胃虛者其人居恒

生胃虛而又為火邪迫之則水精不能上肺輸乃為煩渴是非中

暑之餘殃即是傷寒之遺害 中暑ノ餘災デハカ様ニ災ハナイ

遺災 テモナイ 溫熱病ノ遺災 傷寒ノ遺災ナリト云謙云傷寒ノ

直入陽明而滌熱黃芩麥冬直入太陰以清燥火甚則血液不榮

用 地黃芍既潤澤之品者血主濡之也胃虛則氣道不充用人參

黃耆甘溫之品者氣主噴之 アタ、ムル、 也芍藥瀉東方安胃土之仇

雙言也心肺俱治則水精四布五經并行何煩渴之不痊哉

此茶溫熱病餘災 三用 凡茶ナリ竹葉石膏湯モ溫熱病ノ餘災ニ用八茶ナリ竹葉石膏湯ハ痰逆ヲ主トシ此湯ハ煩渴ヲ主トス

此方他病活用例

醫藥辨別 續編二 溫熱 百五十 為難堂藏

時疫

瘡疽龔氏云瘡疽氣血虛ニ胃火盛ニソ作^ス渴^ヲモノ此湯主之

清熱解毒湯 二百四十 治温疫大熱

黃連^{酒洗} 黃芩^{酒洗} 白芍^{酒洗} 生地 人參^{各三} 石膏^{鷄子大碎}

羌活 知母^{各二} 甘草^{一分} 升麻 葛根^{各一} 生薑^{二兩切}

右水一斗煮取五升每服一升日三夜二服

此方時疫ノ劑人參白虎湯黃連解毒湯ノ半升麻葛根湯ノ類合方ニシタル茶ナリ温熱病時疫熱甚キニ用ユ大便秘スルニ不用大黃芒硝ノ下劑ナケレバナリ只寒涼ノ薬ヲ以テ熱一通リニ用ルナリサレモ大便甚タ不結ハ此方ヲ用テ熱ガ解スレバ自ラ大便モ通スルモノナリソレデ此方ハ熱甚ノ大便モ微シ

時疫

秘結スルニ用ユ叔ハ下メ後熱不解ニ用ル茶ト意得ベシ大抵生地黃芩連湯ナドニ類スル方ナリ

括蕒根湯 二百四十 治風温無大熱而渴

括蕒根^一 石膏^二 葛根^一 防風 人參 甘草^{各五分}

右水煎熱服無時

此方温熱病時疫ニ用ユ前方ト同ク涼解ノ薬ニノ藥品ハ多少ノ意アリ前方ニモ羌活葛根ノ表薬アレハ此方ニモ防風葛根ノ表薬アリ人參石膏ノ涼解ハ何レモ同シ前方ハ大熱ヲ解スルヲ至トシ此方ハ大渴ヲ至トス熱アレハ渴スルモノ渴スレ

心痛

ハ痰アレ其中心痛ニ各主トスル所ガ違フ意得ベシ

金鈴子散 二百四十 傳命 治熱厥心痛或作或止久不愈

金鈴子 即川棟子酒 煮去皮核

延胡索 醋炒 等分

為散每服三錢温酒調下

此方痰厥ノ心痛ニ用ユ方下ニ所謂或作或止久不愈ト云カ
此方ノ目當ナリ

痰火

玉竹飲子 二百四十 緒論 治痰火痰涎湧盛欬逆喘滿

萎蕤 一名玉竹 三錢 茯苓 二錢 甘草 一錢 桔梗 一錢 橘皮 一錢

紫苑 三錢 貝母 三錢 生姜 同橘皮蜜煎四枚

右八味長流水煎白蜜二合二服

此方珍キ方ナリ緒論ニ出ツ先輩ノ方ヤラ医通ノ新制ノ方ヤ
ラ未詳痰火盛ニ喘欬アルニ用ル某ナリ大抵右ノ症ニハ世
間通例括蕤積實湯ノ類ヲ用ユ此方ハ萎蕤ヲ君某トノ痰火ノ
補劑ナリ欬喘ニハ紫苑貝母ヲ主トノ經驗ノ方ト見ユルナリ

消渴

麥門冬飲子 二百四十 緒論 治老人津虧大渴

生脉散 加茯苓甘草枸杞生姜

此方消渴ノ補劑ナリ但シ上消中消ニ專ラ用ル某下消ハトフ

本草綱目卷之二十一 心痛 痰火 消渴 百五十二 烏集堂藏

テモ六味八味丸ノ類ヲ不用レハ効ナレト意得ベシ

消渴

蘭香飲子

二百四十
九 蘭室

治消中能食而瘦大渴便秘

白虎湯 去粳米加人參生甘草蘭香防風升麻桔梗連翹半

夏白豆蔻

此又前劑ニ比スレバ寒涼ノ品重シ石膏連翹アレバナナリ蘭香ハ脾胃ノ熱ヲ清メ不瀉口ノ甘キラ治スル主薬ナリ防風升麻桔梗ハ胃中ノ氣ヲ升提シ半夏白豆蔻ハ脾胃ヲ醒スモノナリ此方當時經驗ノ方ト見ヘテ於テ冷計リ難キ所アリ

消渴

甘露飲子

二百五
十 緒論

治胃中客熱煩躁口鼻咽喉瘡牙宣口臭

二冬膏加生地熟地茵陳枳殼黃芩石斛甘草枇杷葉

此モ方下ノ如ク消渴ノ劑ナリ其中口鼻咽喉ノ内ニ瘡ヲ生シ牙宣風トテ牙齒腫痛シ口臭キラ目當トスベシ二冬膏ハ天門麥門ノ二味ナリ茵陳ハ湿熱ヲ去リ生地熟地下焦ヲ補フ三消通治ノ劑ナリサレバ上中消ノ薬ト意得ベシ

心痛

連附六一湯

二百五
十一 壽

治胃脘痛甚諸藥不効者

黃連

六
七

大附子

一
製

姜枣煎稍熱服

此方熱厥ノ心痛通例ノ薬無効ニ用ル薬ナリ

心痛

清熱解鬱湯

二百五
二 龔

治心痛即胃脘痛多因氣鬱曰又蓄積成熱

而作痛也 山梔子五分 川芎 枳殼各一分 蒼朮 黃連各七分

陳皮 乾姜炒各五分 甘草三分

右入姜煎服服後戒飲食大半日或加香附子五分亦可十一

此茶爵焚ノ心痛ヲ治スル良方ナリ惣ノ痛三夕キ片ハ必露焚
ヲ生ス乾姜ヲ用テ反佐トスルサレト虚分甚キ症ニハ勿用ト也
醫療手引草續編二之卷終

每部須認此

圖章為證

江州藏書

皇都書肆

風月莊左衛門

村上勘兵衛

山本長兵衛

梅村三良兵衛

山本平左衛門

鳥飼市兵衛

高田清兵衛

淺野彌兵衛

安永五丙申年

孟夏吉日

浪華書肆

鳥飼市兵衛

醫方捷徑

烏巢先生著

醫方捷徑

未刻
二冊

傷寒通玄類證

刊行

金匱通玄類證

撰
一冊

醫療手引草

中編
二冊
刊行

病家示訓

增補附錄
刊行
一冊

同 下編

嗣出
二冊

方的
各病諸診
刊行
全一冊

同 續編

各門方旨嗣出
全部六冊自三至六嗣出

張氏醫通纂要

全一冊
刊行

同 別錄

一冊
未刻

合刻

治痢經驗
全一冊出來
附和韓人參考
增補刊行

和韓葭考

後編
未刻
附家授切紙傳一冊

治痢經驗內經金匱論丹水子友松子
方考痢疾試効治論等詳記錄之也

六八本草

中山氏片玉本草頭書
全二冊近刻

和韓人參考
稻若水之論并會韓
醫官而正諸參華語韓參唐參和參品
類等悉真偽弁明之也

皇文堂藏版目錄

醫書部 他書 別二録アリ

大坂高麗橋壹町目藤屋

淺野 彌兵衛

加藤謙齋先生算述書目

一 傷寒通玄類證

金匱通玄類證撰注

右二書ハ傷金匱ノ病門ヲ主類ヲ分チ其某卷中ノ使用ニソナルナリ
金匱ハ的要ノ諸注及ヒ丹水翁ノ論解ヲ附ス

二 醫療手引草上編

證ヲ察テ療治ヲホトコス初等ノ使用ニシ
テ古方後世方ノ論訣其本方アラハレ一家

方和方妙劑ヲ附シ古今諸名匠ノ説ヲ
評撫スルニ國字ヲ以テ通シヤスカラム

同中編

此編ハ發端ニ古方家後二
世方ノ論訣其本方ヲ

万レテ初学ヲ發キ次ニ腹診脈法ノ口訣ヲ示シ本文ニ至上編ニハ証治コトク
ク不備モノハ上編ノ病門ヲ再ヒ奉テ補遺トシ上編ニハ手近キ某方ハミ

ノセザルコトアリトイヘ氏中下編及ヒ續編ヲ著スニ至テハ諸方コトクノ不載キキ
日用ニ便ナラズ故ニ縱橫良方中八百ノ主方ニ子ノ活方ノセテモラサヌ又病

門毎ニ治法某方ノニツラ分チ
初季ノ爲ニ辨別シヤスカラシム

二同續編

自一至二

同下編

未刻 二

某方八百餘ヲ撰ミ國字ヲ以テ用。某縦横ノ論ヲアラハシ病門ヲ立門部中ノ一方毎
ニ方々ク主用活用ノニラメ例ヲ分チサトス主用トハ其病症ニ於テアタリニハノ方意也
活用トハ其方ヲ他証ニ用ヒ變ニ應ノハタラカス意得ナリ又古今老医ノ治驗
先人ノ遺法近日見聞スルトコロノ名医ノ法ヲ附スナリ

二増補病家示訓

日本医流
病家用意

和漢經驗方

一名手引草別錄
先生曾テ門弟子ト病

門ヲ分チ医案論證シ和漢古今ノ本方奇方及ヒ家方妙劑尤モ治瘡ニ於テ實
事經驗アルモノニシテ空論ナラザルラアツメ録シ年ヲ積ンテ巻帙ヲナセシラ
論撰シタル書ナリ此書ヲ見シ人其治瘡ニオイテ效驗的實ノ方ヲ得バ又録
シトシムニコト著述家創世ノ本意也故ニ今此本ノ病門毎ニ餘紙ヲ附スナリ

一合刻

治痢經驗

補和漢人參考

内經金匱ニモトツキ治論ヲアゲ古屋
丹水翁比山友松子等ノ医按治例考
方ヲ弁明シ痢ヲ瘡スルノ方ヲ
ツビラカニスルナリ

人參考ハ稻若水ノ論并ニ韓人ニ會シ人參品ヲタセシ華語因録韓産
和産唐産ノ品類コトクノ主能ヲアラハシ直眞偽ヲ辨スルノ書也

一本艸醫方捷徑

本艸綱目中ノ良方タルヲ
技萃シ病門ヲ分ニ編出

六八本草

中山三柳先生稿本
護益補遺 木部其益補考

原片玉本草ト稱ス本草綱目ノ要ヲ撮ミ釋名修治気味能毒ヲワケ諸品檢出ニ
便スルガ爲ニ國音早ハニ分チ屬ス尤補遺補考ハ物産家ノ考冀備國字ヲ以テ解シ日カカラ

一古今方彙口解

原本ノ方彙ハ通ノ医家某筆中日用カクヘカラサルモノ
ナリ今國字ヲ以テ方法ノ大意ヲ解シ一方毎ニ諸老医先

生ノ訣ヲ録シ加減料的當ノ并アラハシ
經驗ノ事実ヲ附ス医内初季ノ楷梯ナリ

傷寒論手引艸

傷寒本論ト張一
氏医通ノ説ト合

シテ今日瘡治ノハタラキニナルマウニ括要シ傷寒ノ瘡治ハ經ノ証治モアラハシ
スルマウニ講述セラレシラ其マニシルシタルトコロノ書ナリ

瘡疹結要

村上春基醫院傳
加藤玄順校

伊勢平岡宗安撰
附錄木邦老医傳

本書惣テ和漢瘡
疹瘡法ノ要ヲ纂シ初總論病原運氣調護等ヲラハシ次テ論治ヲラハシ終ニ某方診脈ノ活

套ヲ録ス附録スル処老医傳ハ日本名家諸病医案論治經驗事実漢金匱生數年録スル処也

古方活用

傷寒論三百九十七法悉ク寒涼攻撃ヲ以テ治スルヲアタハス先師傳
ヲ得後世方ノ活用スベキモノヲ附メ凡古方雜病ノ瘡法ヲ全フス

一方的

的候二百方ヲ撰ミハ經証治綱領ヲ附シ又各病者診ヲアラハシ凡フ病人ヲミテ証ヲ問ベキ次第ヲツラシテ各家ノ遺失ナキニ備フ 某氏龜本

五張氏医通纂要

張路王先生ハ清朝ノ名家ニシテ医連ノ書ヲアケルニ補瀉寒瀉和寒性下ノ治法大ニ備ハル且方世方法ノ淵源ヲ究ム其官刊

ノ本既ニ日本ニ舶來スシカレドモ其書失散浩博ニシテ初幸檢求ニ難ニズ謹心究生嘗テ其繁ヲ刪リ要ヲ纂メ數年其治法實事驗口ニ病門ゴトニ効ヲ得ルノ方法ヲ附シ撰定シテ一家ノ至寶トナル初學ノ輩ト雖見ニ簡ヲ用ルニ備レリ又卷首ニ医通類方ヲ附シ幾百ノ某方探リ求ルニ便ナルヲ掌ニルガ如シ實ニ濟世奇書

一天文醫西案

三喜空稿本 若山立意評注 加藤玄順校註 三喜空ハ天文年中ノ人ニシテ其郷里ヲシラス此書其家ノ秘本ニシテ題

只ニシルサズ今天文ヲ以テケツクモト日本上世ノ某方ヲ用ヒテ奇方妙劑少ナカラスヲ食補ノ禁好等ノコトヲノセスヘテカナカキニカヘンテ分チ難ハ旁ニ漢字ヲ附其意ヲ通

三刻增廣太平和劑局方

太宗ノ神宗皇帝元豐年中ニ海内ノ通医ニ詔ノアミ子ノ得效ノ方ヲ奏進シメ大医局ニ

ノ其效驗ヲ試ム是局方ノ權輿ナリ後徽宗ノ大觀年中ニ陳師文斐宗元陳承等詔ヲウケ玉ハリ茶局ノ方法ヲ正ス和劑局方是ナリ病門ヲ分チ古今ノアラユル正方奇方丸散丹某ノセテモラサズ又寧宗ノ嘉定年中ニ許洪トイフ人再ヒ其旨ヲヒラキ諸局經驗秘方ト云者ヲ増益シ猶用某指南ヲ加ヘ忘ニ随テ治ヲ導

キ別ニ圖經本草ヲ附録ノ此書ヲ大成ス其後四百餘年世ニ存スルコト希ナリ明ノ崇禎年中ニ表元熙翻刻ストイヘ凡誤多シ今 日本 享保年中ニ前典藥頭道

三 官命ヲ承リ其原本ノ 我國ニ存スルハ幸ニアラスマ乃チ日光山久能山ノ神庫ノ本及ヒ諸名家ノ秘スル數本ヲ採リ集メ校正スル所ノ書ニシテ實ニ濟世惠民 大宝ノ者也

五同橫本小册

失帳ノ便檢ヲ好ムハ此本ヲ采メ冬ラベシ價モ亦簡便 仲景全書正誤 大清乾隆纂修 醫宗金小

五嚴氏濟世方

宋嚴用和著 甲賀通元校 千金方外其甚秘要ハ實ニ方法ノ周備尊フベキ書トイヘ凡寒帳浩繁ニシテ急務ニ便ナラス又宋イ方各

多キ中ニ此濟世方ハ病門毎ニコトノ論治一章ヲケラハシ方法簡シテ要目取モ送家ノ準則タルベク元明ノ諸家ノ多ク據ル處ハ原書ナルモノナリ

五儒門事親

金張子和著 張先生者八百世医門ノ宗師ニシテ此書十形ニ療論ヲ立テ其方法ニ至チ汗吐下ノ三法ハ門ノ外チ古發明ヲ著ス

五玉機微義

明徐彦純 兩先生著 全五十册 合十五册 黄帝内經ヨリ仲景傷寒論金匱

要略等ノ經旨某方ヲ療門ニ悉ク引證シテ治術ヲ發明シナラ後世ニ及ヒ孫真人千金方張子和儒門事親王壽外其甚秘要嚴氏河澗東垣丹溪其餘諸名家ノ書ニ至ルニテ方論ヲ拆衷ノコレヲ録ス實ニ古方後世方ニ貫通シテ大ニ治癒ニ益アル書ナリ 十三科古方選注 清王晉三

初ニ傷寒科ヲアラハシ仲景二百十三方三百九十七法ヲ明シ和寒温汗吐下ニ逐テ辨ジ
蜜煎導猪胆導ヲ附シ次ニ外科外科幼科等ノ各科ノ方ヲ發明シ末ニ雜方茶性ヲ
附ス今傷寒科ヲ刻ス餘
科ノ如キハ嗣出ヲミツ者ナリ

雷真八石室秘錄

清陳士鐸 習

同内集活人方

瘡痢證治大還

清陳三農著 脈論病因論治某方各補
ヲ分チ瘡痢ノ治法ヲ大成スナリニ

痘疹證治大還

同著 病原ヲアラハレ部位ヲ論ジ順症逆症死症ヲ
クハシク辨ジ方法加減ヲ附ス 嗣出

一 景岳脈神章

明張介賓著 嗣出
景岳全書中脈論

景岳傳忠錄

同著 景岳全書中
ノ要論ナリ 嗣出

景岳蘊命方

同著 景岳全書ノ書タル於帙浩博ニ初テ讀得ヤスカラス
今其治法ニ切要ノモノヲ拔萃シの當ノ方書トス初ニ補和攻散

寒熱固因ノハ略ノ辨ヲアラハレ病門毎ニ論
症論治ヲ附古今ノ方法載テモラガズ近刻

景岳婦人新論

同著 嗣出 橫本
景岳全書中

二 景岳痘疹神書

同著 嗣出
景岳全書中

愈氏寓意

其門人ト醫案論評スル所ニテの實ナ
各ヲ各論トニ悉病ノ名ヲ著シ以證

六 李士材三書

清李中梓著 診家正眼
全書ノ中也 診家正眼ハ脈法ノ真決ヲルル

本草通元 病機沙篆

本草通元ハ諸家ノ

本州ヲ辨論併中シ用某機要ヲ附ス沙篆ハ
諸病ノ治法古法ニツテ古方ニ從ハテ臨機心變ヲ論

三 牛山活套

香月牛山著 國字ニシテ經驗
ノ方法ヲアツムルナリ

同方考

同著

三 鍼灸經驗方

朝鮮國醫許任著 針灸ノ要穴ニ存シテ試シテ成モノヲアラハレ部ヲ分チ類
ヲ正シ訛穴ヲ弁シテ怪ヲ明シ禁忌ヲ附針灸家ノ要ラシム山川宜庵

二 二十四經俗解

增益衆方規矩

永原了の増補訓占 古晉世三行ハハ 金齋
古今經驗ノ方書アリ 猶カケルハハハハ

ニアラズ今數百方ヲ増益シテ某箴中ノ全
書トナス其品ノ一字銘ヲ附シ分量量ホヲ委ヌ

方函

世ニ行ハレ方彙等ノ如キハ
キハ歷代ノ方ヲ集メテ全本ニ

キヲ得ルモノトイハレ然レ其撰博浩ニ檢閱ニツラシキコトナキニモアラズ今古今
ノ良方ヲ精ク選シ繁ヲ刪リ闕タルヲ補方論加減ノ法ハ吳氏ノ名醫方考ヲ主トシ

歷代ノ諸方書ヲ檢拾シ醫方口訣衆方規矩等ノ各モ其要ヲアゲタノサス又病論
大意モ某方ノ下ニアラズ末ニ丸散丹某ノ類日用經驗ノ者ニテ知ラズンハアルハカラサルモ

ノク秘ヲ探リ製ヲ精フヲコレヲ附ス實ス也
醫字ノ捷徑某箴ノ秘本トス

婦人方考

藤丹山撰 通俗國字ニシテ
婦人科ノ良方ヲ集メ要論ヲ附

一 大同類聚方

此書ハ曲業頭安倍朝臣貞貞等勅ヲウケテ撰リ日本
神代ヨリノ醫方ノ書ナリ全書一百卷今ハヒテ不傳

萬病回春

明 龔廷賢著 大本

遺本數紙ヲ故実ノ家ニ得テコレヲ刊ス

梅花無盡藏

甲斐德本道人著 別録附 日本方書

一 救病不邪秘方

和泉申齊著 數百人ニ用ヒ效

諸名山ニ秘スル所ノ奇方 實ニ醫術ヲタズクルノ書ナリ

稗ノ法尤モ奇驗イチシルキモノヲ附ス

道三サスノニコ

脈論ナリ

二 同脩治纂要

同注能毒

三

一 歌能毒

歌能毒

平カナ折本 一枚スリ

嗣出

廣益靈寶能

三村玄碩撰 原本

世ニハ卷ノモノ

五卷或アリ又ハ卷ノモアリ今補可ノ書林モモフ合ニ卷

ハラ九ノ能毒トヨブモノ日疋也某性ヲイロハ分ケニノ功能氣味和名異名修治製法コトトクノセテモラサズ又遺考ヲ附シテ大成スルモノナリ

一 靈寶能毒大全

初学ノ為ニイロハ分ケニ全セラ平カナニノ功能氣味和名修治製法ヲクハシケル又ニ一圖ヲアラタ初学ニ便リス

五 願生輯要

貝原篤信著

今日ハニ保養シテ病ヲ主セス天年ヲ保ツベキ法ヲ數ニ卷ノ書ヨリ抜萃シテ門ヲ

立テ類ヲ分ケテ精クルス別ノ患ヲ專ニシ身ヲ立ルニ志アル人一日モナクバアルカザル也

日用食性

東井玄朔著 小本 初二卷テ日用ノ

食物ニ上中下ノ三ヨラタテ能毒ノ大略ヲ知ラシメ次ニ食性部ヲ分チ氣味功能ヲクハシクアラハシ又次ニ諸病ノ禁好物ヲ録シ終ニ日用各法ヲ附シテ宛処ヲ示シテ悉クハシ

一 衆疾食例

諸病ノ禁好ヲ固守一枚摺 西面折本ニシテ懷用ニ備フ

食療手引

龜岡主人輯 食性ノ要ヲ小本 纂甚尙便ニ懷用ニ備フ

一 食療箋

食療手引草ヲ折本一枚摺 西面ニシテ懷用ニ便ナラシム

外科萬外集要

山本元仙 著 二

金瘡ノ療法同内某七氣ノ并等ヲ主トシ 其他諸瘡ノ療法ヲシルスナリ

同新明集

鷹取秀次著 三

十 石室秘錄

明 山陰陳士鐸 敬習 常業ヲ以テ治スベカラス故ニ其門ヲ立ルニ正医アリ

病ニ正病アリ奇病アリ其奇病ハ 醫アリ逆医アリ或ノ内治大治小治先治後治急治緩治等總ベテ一百二十八法ヲ

リテ法毎ニ岐天師ノ論ヲ述ベニニ方ヲ附シ最正當論詳ニ及之家妙ノ治法ヲ著ス

一 活人方

同述 石室秘錄ノ内集トヨブモノ雷直君ノ傳フル所陳士鐸ノ敬習スル所ニシテ編纂ノ手段諸書ノ方法ト同シカラズ君佐ヲ悟シ

奇効ヲ并シテ立方ノ的當只一方ニ限リ業ヲモチヒテカレコレノ

