

✕
i 25

490.9
I₂-10
3

No. 2067
1812



富士川文庫

1288

吞咽也。段云：今人以吞吐對舉，殊不知咽亦名吞。
 俗云：喉吞是也。猶之喉本名咽，平聲。今人以爲下咽。
 字一見切。說文注二上舌部。
 咽，盛也。段云：咽者，咽也。言食因於是以上也。
 隘，咽也。段云：隘者，扼也。扼要之處也。
 段云：凡言頤頤頤，无胡者，自外言之言寵。頤頤，自內言之故皆从口。自口而人也。
 啾，小兒聲耳。啾，小兒聲耳。段云：啾謂小兒小聲耳。啾，謂
 小兒大聲耳也。



氏圖書之記

吞咽也段云今人以吞吐對舉據此則咽喉本名吞
俗云喉吞是也猶之喉本名咽平聲今人以為下咽
字一見切說文注二上舌部

咽嗑也段云咽者因也言食因於是以上下也日上

嗑咽也段云嗑者扼也扼要之處也云

段云凡言項領頸亢胡者自外言之言嚨喉會吞

咽嗑者自內言之故皆从口自口而入也

啾小兒聲耳嗶小兒聲段云啾謂小兒小聲耳嗶謂

小兒大聲也日上

說文注

姜所以平嘔甘草所以緩逆

醫方考卷二

又曰傷寒解後多有此證是方恒用之

同上

張路玉曰虛則膽氣不充寒則痰氣搏聚故用姜半溫膽枳茹清中甘橘鼓舞陽和開發陰凝之寒々則痰陰之通稱千金方衍義

又曰詳半夏溫膽二湯一治實熱一治虛寒總為濁陰阻積不能行清淨之令是以主治不出滌飲為務而實熱反用秫米遠志虛寒反用竹茹枳實者蓋實非膽腑之本實故需流水煮秫米以通陰陽遠志統地黃以散實熱乃補中寓泄

之法虛寒用半夏佐生姜以散積飲竹茹輔枳實以治旺氣旺氣除而正氣自復膽腑自溫乃瀉中寓補之法非千金不能體內經之奧而衍無上甚深微妙也

同上

大補丸

弘化乙巳七月七夕

大補丸去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補氣藥下血虛以補血藥下並不單用

丹溪心法卷三

川黃柏炒褐色

右以水丸服

大補丸

醫方考卷二

黃柏

一斤炮褐色為末水丸氣虛者四君子湯下血虛者四物湯下

腎火從臍下起者腎水衰也此方主之腎非獨陰也命門之火寄焉腎水一虧則命門之火無所畏而自熾矣故龍雷之火從臍下動也經曰水鬱則折之水鬱者腎部有鬱火也折之者制其衝逆也

大補丸

栢皮味苦而厚，為陰中之陰，故能制腎經衝逆之火。火去則陰生，故曰大補。王冰曰：壯水之主以制陽光，此之謂也。氣虛下以四君子湯，恐其寒涼而壞脾也。血虛下以四物湯，助其滋陰而制火也。

又 同上卷二

大便燥結，睡中口渴者，此方主之。腎主五液，腎水一虧，則五液皆涸，故上見口渴，下見燥結也。黃柏味苦而厚，質潤而濡，為陰中之陰，故能滋少陰補腎水。此經所謂燥者濡之，又謂之滋其化源也。他如六味地黃丸、虎潛丸，皆益腎之藥，均可選用。

又 卷三

嘔血者，此方主之。黃柏苦而潤，苦能瀉火，潤故能就下也。

又 卷四

水鬱者，腰股痛，足下熱，此方主之。水腎也，水鬱者，腎部有鬱火也。腰者腎之府，故令腰痛。腎脉斜走足心，上股內後廉，故股內亦痛。而足心熱，黃柏苦而潤，潤能益水，苦能降下。經曰：水鬱則折之，此之謂也。

又 卷四

又淋證遇房勞即發者此方主之房勞虛其
腎水則火獨治故灼而為淋黃柏苦而潤若能
瀉火潤能補水

又卷五

陰氣衰於下令人足下熱氣循陰股而上者
名曰熱厥此方主之陽消則陰長陰退則陽進
故陰氣衰于下則陽往湊之令人足下熱也熱盛
則循三陰經而上逆因謂之熱厥黃柏味苦而厚
為陰中之陰故能補陰氣之不足瀉熱氣之有
餘王冰曰壯水之主以制陽光此方之謂也

處方及藥味尚簡

大率婦人妊娠唯在抑陽助陰之抑陽助陰
之方甚多然胎前藥唯惡心群隊若陰陽交
雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物湯
所以助陰故爾 本事方卷十

探試法

陽明病潮熱、大便微鞭者、可與大承氣湯、不鞭者、不可與之、若不大便六七日、恐有燥屎、欲知之法、少與小承氣湯、入腹中、轉失氣者、此有燥屎也、乃可攻之、傷寒論

成无已曰、潮熱者實、得大便微鞭者、便可攻

之、若不鞭者、則熱未成實、雖有潮熱、亦未可

攻、若不大便六七日、恐有燥屎、當先與小承氣

之、王叔和如有燥屎、小承氣湯藥勢緩不能

宣泄、必轉氣下失、探試法

探試法

治婦人姓孕五七月因事築磕著胎或子死
腹中惡露露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探
之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下
此藥催生神妙佛手散本事方卷十

治天口曰臍熱者實則大更熨臍背而如
熱氣也天口如之則寒氣也
之去少與小年產後之入腹中轉大更熨之
轉者不下與之者不大更熨之曰臍熱氣也
陽明赤白痢大更熨臍背而如大更熨之

對症治

熨臍下

暑月熱倒人昏迷悶亂急扶在陰涼處切不可
與冷飲當以布巾衣物等蘸熱湯覆臍下及氣
海間續々以湯淋布帛上令徹臍腹但暖則漸
醒也如倉卒無湯處掬道上熱土於臍端以多
為佳冷則顛換也後與解暑毒藥若纔熱倒便
與冷飲或用冷水淋之類即死舊有一法或道
塗無湯去處即掬熱土於臍上仍撥開作窩子
令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效

醫說卷十

引集驗方

○按此法本於金匱又出三因方

熨臍下

經曰心氣痛

林氏謂經言心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

經曰心氣痛者曰心氣者心之氣也心氣痛者心氣之氣也

疝候

素長刺節論病在少腹、痛不得大小便、病名曰疝、得之寒、說文疝腹痛也、按疝之起少腹也固然、然亦有現疝特在胃脅者、而今人漫然在上則稱積聚、在下則稱疝、夫疝與積聚不同、治療際有甚迥庭、今揭在心胸亦名疝之義、我以釋其疑、釋名心痛曰疝、說也、氣洗然上而痛也、脉怪卷二平奇怪脉病才四脈來中央堅實、尺寸脉俱牢、直上直下、此為衝脉、脊中有寒、疝也。

疝候

發汗之重劑而試以麻黃一味發汗則汗不必出凡藥之平如此故取成方中之各味以一一論其功為彼
治之而不治之此治之而不治之必戾立方之意心夫各味功用要當平主不瀉得而詳審之至解成方當混
和後之耳是讀方
書者之所當知也

發汗之重劑而試以麻黃一味發汗則汗不必出凡藥之平如此故取成方中之各味以一一論其功為彼
治之而不治之此治之而不治之必戾立方之意心夫各味功用要當平主不瀉得而詳審之至解成方當混
和後之耳是讀方
書者之所當知也

服藥當審強弱

服藥當就其人平素強弱而增損不唯飲量者

法亦然曰強人半錢七羸者減之白散方後曰強人服一錢

七羸人服半錢方後曰強人服一升羸者減之曰三

服小兒服四合金匱小兒方後曰強人初服三九日三服

弱者二九九痛丸方後曰強人服七合弱者服五合烏頭煎方後

曰老小量之外臺主之馬湯方後以上並視強弱老幼而消息之

義也又大黃附子湯者法曰以水五升者取二升半溫

三服若強人者取二升半溫三服是視強弱而異

者法之義也
服藥當審強弱

褚氏遺書修而肥者飲劑豐羸而弱者受藥減

仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若更下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病二三日口乾燥者急下之人多謂發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛舉斯二者則其它疑或惑處不可勝數此仲景之書世人罕讀也予以為不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏凡稱急者有三處謂纔覺汗多未至津液乾燥便速下之則為徑捷免致用蜜先也若胃中識得

仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若更下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病二三日口乾燥者急下之人多謂發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈盛舉斯二者則其它疑或惑處不可勝數此仲景之書世人罕讀也予以為不然仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏凡稱急者有三處謂纔覺汗多未至津液乾燥便速下之則為徑捷免致用蜜先也若胃中識得

了方無可疑若未能了候用之反不若蜜
充為穩也本事方卷八

讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧

專守一書者吾未見其能也

同九

傷寒論不幸此書傳世久遠遺帙頗多晉

太醫令王叔和得於散亡之餘詮次流傳其
功博矣惜乎以已論混經未免穿鑿金附會
成無已氏因之順文註釋並無缺疑心誤之言

傷寒瑣言

仲景景傷寒一書人但知為方家之祖而未解作秦

漢文字觀故於大經大法之意反有疑似而後
世賴其餘澤者往類輯傷寒論其間失其
本義及穿鑿金者亦有之矧以雜病為論但引
其例者乎同上

古來傷寒之聖唯張仲景其能推尊仲景而
發明者唯許叔微為最自陶節庵之書出而
藥味胡亂盡失張許之意

徐彬尚論篇方論凡

戴原禮辨傷寒論中所謂傳經一日太陽二日陽
明三日少陽豈有第二日病在裏而第三日又
在半表半裏者何也以五行生剋論之陽主生

本事方九有商
傷寒傳入之序自
太陽明少陽太陰
少陰厥陰所傳有
次序何者云可考

則水生木太陽膀胱陽水合傳之少陽膽木
兼太陽在表少陽在裏之間陽明在裏自
外漸入於內次第已當陽明居少陽之次此說
實前人之所未發陶節庵傷寒項言未之
及何耶續醫說卷六傳經失次○證治要訣二廿四
仲景傷寒論編次者不下數十家因致聚訟紛
紜此皆不知仲景作書之旨故也觀傷寒叙所
述乃為庸醫誤治而設所以正治之法一經不
過三四條餘皆救誤之法故其文亦變動不居讀
傷寒論者知此書皆設想懸擬之書則無往

不得其義矣今人必改叔和之次序或以此條在前
或以此條在後或以此證因彼證而生或以此經因彼
經而變互相詬厲孰知病變方端傳經無定
古人因病以施方無編方以待病其原本次序既已
散亡庶幾叔和所定為可信何則叔和序例云今
搜採仲景舊論錄其澄候診脈聲色對病真
方有神驗者擬防世急則此書乃叔和所搜集而
其輒加辨駁以為原本不如此抑思苟無叔和安
有此書且諸人所編果能合仲景原文否耶夫六
經現病有異有同後人見陽經一證襍于陰經之

中以為宜改入陽經之內不知陰經亦有此證也
人各是其私反致古人圓機活法泯沒不可問
矣凡讀書能得書中之精義我要訣歷分
明則任其顛倒錯亂而我心自能融會貫通
否則以古書紛更互異愈改愈晦矣 醫學源
流論

有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此
表實證也當汗之以麻黃湯或人問曰傷寒
大抵因虛故邪得以入之今邪在表何以云表實

也予曰古人稱邪之所湊其氣必虛留而不去其
病則實蓋邪之入人也始因虛及邪居中則反
為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實
能明此四字則仲景三百九十七法可坐而安也何以
言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表
裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中
常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而
設也桂枝湯之類為表虛而設也裏實則承
氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱
實所謂陽盛陰虛下之則愈也表裏俱虛所

謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華佗傳
有府吏倪尋李延共止俱頭痛身執所苦
心同他日尋當下之延當發汗或難其異他
日尋外實延內實故治之異本事方卷九
或人問曰何謂凡者予曰凡者如凡足疾屈而強
也謝復古謂病人羸弱須憑凡而起誤也蓋
仲景論中極有難曉處振欲振地心中懊懣
外氣拂鬱胃不仁膈內拒痛如此之類甚
多同上

論傷寒當以仲景脉法為準傷寒必本仲景

猶兵家之本孫吳葬書之本郭氏三命之本
瑒士課之本心鏡捨之而之他是猶捨規矩而
求方圓捨律呂而合五音必乖謬矣同上

用為有力本事方卷八

大黃以濕冷中寒上蒸同卷十

大黃濕紙裹二升米上蒸米熟去紙焙同卷十

六淫婦人經脈不通云方內

大黃十分蒸金匱大黃廬山丸方

大黃酒潤醫方攷卷二三黃連心湯方

謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀幸他傳
有府吏倪尋李延共出俱頭痛身熱所苦
同也曰尋當汗之延當發汗或難其異他
曰尋外實延內實故治之異
或人問曰何謂凡予曰凡者如凡尺疾是而注
也諸復古謂病人三脈弱煩渴之而起譌也蓋
仲景論中極有難曉處振之欲振地之中樞
而使之固也蓋此言由今言之則馬之
謂之弱之本心難言入經之方是則其
論其本心之本心是也

大黃製法 隨筆一廿六才可攷

大黃四兩去皮清酒洗 傷寒論調胃承氣湯方

大黃蕩滌絢熱傷寒中要藥須是酒洗生

用為有力 本事方卷八

大黃以濕帛裹上蒸 同卷十治藥制度 按本事方中多用此法

大黃濕紙裹二升米上蒸米熟去紙焙干 同續集卷

六治婦人經脉不通云方內

大黃十分蒸 金匱大黃廔蟲丸方

大黃酒潤 醫方攷卷二三黃瀉心湯方

大黃面

通經去積者二三黃面心易之

大黃十公蒸

金匱大黃湯藥方

六字歌入醫經下通三式

大黃黑條裏二升米土蒸米黑去條款干

大黃以黑命東不贈土蒸

同卷十式藥時受

用為首

本草卷八

大黃湯藥經之歸藥對寒中要藥敗是西主

大黃四兩去皮青面

對寒中藥對胃中藥方

大黃四兩

對寒中藥對胃中藥方

藥治通義卷五下
法大旨末條引呂文
可五十一

下劑加人參

本事方

乾姜圓即備急圓加人參者此溫利

剛燥

之劑而加人參滋補之品其味甚平

氣湯加人參其意蓋倣古然无甚深味

治中風入脾經年四夜不遂

湯方用麻黃靈仙附子桔梗防風葛根

川芎當歸竹瀝生薑方後云

下劑加人參

下劑加人參

本草綱目卷之五
茶類

唐陽公人參其意蓋效古然天其利也
之實而人參其意蓋效古然天其利也
本草綱目卷之五
茶類

古人頭痛用茶不一如局方川芎茶調散茶清下醫西方筆記頭風神方
入芽茶煎類

是也
本事五解毒雄
黃圓方后云用
熟茶清下七圓

今時服藥往禁茶夫茶清涼之品固非服
溫劑者之所宜但概禁之不必為得更有藥
忌茶之品宜從其言而不排叱乃信古之義也獵涉
之次纂集集載于斯

治中風入脾肝經年四肢不遂舌強語塞竹瀝
湯方用歲靈仙附子桔梗防風葛蔓荊子枳殼
川芎當歸竹瀝生姜方後云忌茗

藥忌茶

建茶前子圖
黃國之口各用
本草在藥性論
是也
人其茶煎飲
古人更論用

川芎當歸芍藥甘草湯主之
陽虛用滋陰靈山樹子
中風人野野
之其茶集集集集

品
今報

傷寒灸法

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰病下利脉微瀝嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

傷寒脉促手足厥逆者可灸之

傷寒灸法

下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死右傷寒論

本事方卷九陰毒漸深候文嘉頗同今以朱校于旁

陰毒漸深其候沉重四肢逆冷腹痛轉甚或咽喉不利心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時鄭聲指甲面色青黑六脈沉細而疾一息七至已來有此證者速於氣海或關元二穴灸三炷壯以手足和煖為効仍兼服三陽散肉桂散回陽丹返陰丹天雄散白朮散內外通逐令陽氣復而大汗解矣若陰毒已深疾

陰毒沉困候沉困之候與前漸深之候皆同而更加困重六脈附骨取之云本方

勢困重六脈附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數至此則藥餌難為攻矣但於臍中用葱熨法或灼艾三五百炷以來手足不溫者不可治也如得手足溫更服前熱藥以助之若陰氣散陽氣來即漸減熱藥而調治之治人書卷四 守株卷七陰毒可攻

返陰丹服此方藥三五服之不退便於臍下寸灸之須是大較日夜不住手灸不限多少壯數灸之仍艾炷勿令小則不得力若其人手足冷小腹硬即須更於臍下兩邊各一寸各安一

道三處臍下灸仍與當歸四逆湯并返陰丹六須頻服內外通透方得解退若遲慢即便死矣又若是陰症加以小便不通及陰囊縮入小腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴大段急灸之仍須與返陰丹當歸四逆加吳茱萸生薑湯慎勿與尋常利小便藥也尋常利小便多是冷滑藥此是陰毒氣在小腹所致也若有醫者見小便不通便用炒鹽及裹熱藥於臍下便慰欲望小便通緣陰氣在小腹之間致被熱物慰着無處出得即便奔

上衝心往有死者 同十六

傷寒胸脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而熾膨脹發喘而死不知胸脇痛自屬少陽腹膨脹自屬太陰也此外惟陰證乃可灸耳

李子建傷寒十勸

治結胸灸法

陰毒傷寒關格不通腹脹喘促四肢逆冷亦依此灸之氣通可治

巴豆十四枚

黃連

七寸和皮用

右搗細用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度終灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡

氣海一穴道家名曰丹田在臍下寸五分任脉氣所發治臍下冷氣衝心下氣結成塊婦人月事不調崩中帶下因產惡露不止繞臍疔痛針入分灸灸可百壯此男子生氣之源也臍氣虛備心真氣不足一切氣疾悉可灸之以手和暖為度本事方卷九

也本事方卷九

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服金液破陰來復等丹其脉遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰而見陽脉有可生之理仲景所謂陰病見陽脉者生也仍灸氣海丹田百壯手足溫陽回得汗而解同上

傷寒不可拘日數

余嘗論素問說經之書傷寒論乃說經與權故有言一日二日三日者有其證也王叔和撰傷寒例金氏于熱論而但改一日二日為文作三日四日可謂深得其意矣王又曰表已解而裏不消大滿大實豈有燥屎自可除下之雖四五日不能為禍也成無已曰下證既具則不必拘於日數

活人書卷一吐大抵在表者汗之在裏者下之在上者湧之在下者泄之瓜蒂梔豉隨證施用不可拘以日數也

又卷三亦有始得病便變陽成盛之證須便下之不可拘以日數

又卷五古云未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已此大略之言耳病人有虛有實邪氣傳受遲速不等豈可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脉浮者由宜發汗日數雖傷寒不可拘日數

之病逐日淺深
以施方治

少若有重裏證而脉沉者即宜下之正應隨脉
以汗下之傷寒固有始得病便發陽盛之證須便下
之又有腠理寒一二日便成少陰病者須急
溫又況六氣之邪乘虛入經自背得之則入太陽
或入少陰緣少陰有伏脉在背自面感之則入陽明之類不
必皆始於太陽兼寒邪有首尾止在一經或間
傳三經不可以一理推但據脉與外證治之此
活法也假令有人脉浮頭項強痛發熱而惡
寒每如此不以日數多少止是太陽經受之其
餘經絡皆倣此大抵傷寒憑脉與外證以汗下
之若過日多脉尚浮大數按之不足者尚責太

陽也可發汗而愈若按之實者汗之必死須下之
而愈也若始得病脉細沉數外證或腹滿咽乾
或口燥舌乾而渴為正責裏裏可下之而愈
若無此證但發熱脉沉者誤下必死須行麻
黃附子甘草湯麻黃細辛附子湯小發汗此
皆仲景之確論也

傷寒六書卷二傷寒總論

