

490.1
I 9-7
1.
2冊

醫學入門良方考

四明萬表選集

孫邦孚增訂重梓

經病

經前發熱為虛血滯宜破血枯宜補常時與經前作痛
為血積經後為血虛常時發熱為血虛有積經行發熱為血
虛有熱

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疴痛

當歸 川芎 芍藥 熟地 各等分

右水煎服○經候微少漸漸不通手足酸疼肌瘦潮熱脉

萬氏家抄



富士川

微數去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分經水過期者
血少也加陳皮白朮人參升麻未及期先來者血熱也加
黃芩香附黃連肥人亦兼痰治經色紫黑兼有塊者血虛
有熱也或作痛加重便製香附芩連或加柴胡有氣血俱
熱者宜涼氣血加柴胡黃芩生地香附經行身熱脈數頭
昏加柴胡黃芩經水臨行小腹連腰作痛者乃鬱滯有痰
血少香附莪朮玄胡索桃仁紅花朮香發熱加黃芩柴胡
陰虛血少經水不通小便澀而身體痛加白朮牛膝牡丹
皮香附陳皮桃仁經水行後作疼者氣血虛也加四君子
湯血枯經閉加桃仁紅花經水適來適斷或有往來寒熱

先宜服小柴胡湯後以此湯和之

肥白人經水過期者是痰多用二陳湯加南星蒼朮滑石及

川芎當歸香附

肥人痰多占住血海地位因而下多者日必漸昏用南星蒼

朮川芎香附作丸服肥人不及日數而多者痰多血虛有

熱亦用前丸藥中更加黃連白朮

經水不通用馬鞭草取汁熬膏為丸或燒灰存性為丸紅花

當歸煎湯下

肥軀脂滿經閉不行者導痰湯加黃連川芎

經水去多不住者以三補丸加香附龜板金毛狗脊

逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草錢灸五 當歸去芦炒 茯苓去皮 芍藥 白朮

柴胡去苗各一兩

每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎七分溫服

一方 治經不調而血水淡白宜用參芪歸芍香附白芍腹

痛加膠味艾葉玄胡索

固經丸 治經水過多不止

黃芩 龜板 白芍藥 各一兩 樗根皮 七錢半

黃柏炒三錢 香附浸二錢半童便 為細末酒糊丸服

四製香附丸 治婦人女子經候不調亦治女人久瀉

香附三毛一分 鹽水浸七日一分酒浸七日一分童便浸七日

右為末醋糊丸桐子大每服七十九空心食前鹽湯下肥

人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩

丹參散 治婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎不

安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩凍

丹參去芦不拘多少為末

每服二錢酒調下經脈不調食前服冷熱勞服無時

導經丸 治婦人經水不通臍腹連腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 甘草灸 官桂

桃仁炒一兩 大黃 二兩 血竭 半錢 紅花 少許 地膽去翅足

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心温酒下量虛實
加減服

通經丸 治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒炒去汗 蓬朮炒 當歸去芦 青皮去穢炒 乾姜炒 紅花

大黃炒 桃仁去皮細研 桂心 等分 乾漆炒去烟

為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中拈丸
桐子大每服五十九醋湯温酒空心下

紫金活命丹 治婦人經脉不通通而作痛血瘕等疾

錦紋大黃 一兩 苦苧蘆淨 五錢 芫荳去殼 七十一

紅娘子 六十箇全 小香 一錢

右為末紅棗煮爛去皮核和藥丸彈子大重二錢五分用
絲綿如法裹包入陰口深處當見頭疼暈悶作渴渾身困
倦可食白滾湯粥飯待下有黃水或血水滴三日其藥
自然脫下肚腹作疼三箇時辰惡物纔下有形可驗

補藥方

胡椒 五錢 木香 一錢 朝腦 一錢 砂仁 五分

為細末稀糊丸菡豆大硃砂為衣每服十五丸空心白湯

下一鍾茶時食白鷄卵三箇好酒一二鍾如此三服後服

加減四物湯數服此方神妙

血竭膏 治乾血氣

用錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末以好醋一升熬成膏丸
如鷄頭大臨臥服一九熱酒化開待溫服大便利一二次
紅脉自下此調經之仙藥也又方加香附若經血逆行或
血暈或吐血或咳血用韭汁服方見心痛門

失笑散

治婦人血氣痛欲死者

方見心痛門

紫金錠 治婦人腹內結塊久而不消并月經過期不至腹
內作痛或為邪所交腹中作痞熱酒磨服並愈孕婦不可

服 方見痰門

一方 治室女月經不通

紫葳

一兩

乾漆

二錢

芍藥

蓬莪朮

各一兩

為末每服二錢空心酒調下

又方 雄猪屎一兩燒灰存性為末空心溫酒調下一錢

一方 治室女經閉不行

用錦紋大黃一兩切片以好酒浸一日一夜取出晒乾蒸
熟再入酒浸再晒乾仍前蒸熟丸桐子大每服三十九空
心酒下

又方 蘇木四錢黑豈一升好酒一斤半入鍋煮至一甌加
童便一甌攪勻服出汗効

崩漏

皆由傷損冲任二脉血氣俱虛不能約制經血故忽然暴下

奇効四物湯 治血崩

當歸 川芎 芍藥 生地黃 阿膠炒 艾葉

黃芩 各等分水二鍾姜三片煎一鍾空心服○因勞

氣弱者加人參黃芪升麻○因熱者倍黃芩○因寒者加

炒黑乾姜○紫色成塊者血熱之甚加黃連○崩過多者

先用五靈脂半生半炒為末一服後分寒熱用藥

一方用白芷煎湯調百草霜服甚者加棕櫚灰稍止即以四

物湯加乾姜調之此急則治其標也四物湯加黃芩黃連

人參黃芪香附乾姜此緩則治其本也

又方四物湯加荆芥穗止血甚効

治血崩血淋及產後去宿生新

取黃黑牛胎一個腹中者去身只留四足酒洗淨蹄壳尤

要緊新瓦上炭火煨存性不可煨過研末無灰酒送下每

服重者七八錢輕者三五錢

治崩漏多因氣所使而下

香附末炒 歸身 白芍藥 地榆 熟地黃各一錢

川芎 黃芪 蒲黃 人參各五分 白朮一錢

升麻三分 水煎服甚者加櫻毛灰酒調服

一方香附炒黑為末每服三錢飲湯調下

治婦人血崩不止

槐花 一兩

棕毛灰 五錢

水二鍾鹽少許煎七分溫服

一方治漏下乃熱而虛宜四物湯加黃連

一方蚕沙為末每服三五錢熱酒調下

如神散 治婦人血崩不止赤白帶下

香附子 赤芍藥 等分為末鹽一撮水一鍾煎一鍾去

渣食前溫服

治血山崩

礬殼

舊紅褐子

陳棕

蓮房 各燒灰存性

右等分共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖下熱黃酒

一鍾熱服

帶下

赤屬血白屬氣濕熱為病主燥濕為先漏與帶俱是胃中痰

積流下移入膀胱法當升之甚者用吐以提其氣須斷厚味

加味二陳湯 治帶下

陳皮

半夏

茯苓

甘草

蒼朮

白朮

升麻

柴胡 各等分

姜三片水煎服

治肥人白帶是濕痰

海石

半夏 姜製

南星 姜製

黃柏 炒

蒼朮 泔浸

香附

川芎 酒洗

樗皮

乾姜 各等分

右為末醋糊丸桐子大每服五六十丸空心白湯下若月

去乾姜

治瘦人帶下多熱

黃柏炒

黃芩

滑石

樗皮

川芎酒洗

海石

青黛

當歸酒洗

芍藥各等

醋糊丸服

固真湯

治白帶臨行時臍下痛甚

人參五分

黃柏炒

黃芩炒

白葵花各一錢

乾姜

甘草各二分

郁李仁八分

柴胡七分

陳皮五分

水一鍾半煎七分空心服葵花白者治白帶紅者治赤帶

此治氣滯白帶者

固腸丸

治濕勝者用此以燥其濕亦不可單用須看病作

湯使

椿根白皮

性涼而燥須炒用

為末酒糊丸服血虛者加減四物

湯氣虛者參朮陳皮間與之

樗白皮丸 治白帶

樗白皮

山茱萸

苦參

香附各五錢

龜板二兩

梔子二兩

黃柏一兩

乾姜

貝母各二錢

白芍藥七錢半

白朮

為末酒糊丸服

一方 治赤白帶下用黃荊子炒為末酒調下二錢

一方 治崩中白帶

白芷六兩

花椒目四兩

以白芷四兩用石灰半斤淹三宿

瀉去灰將白芷炒焦同椒目為末或加茜草少許粥丸服
治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星 蒼木 栝皮炒 滑石 半夏 川芎

辛夷 酒苓 牡蠣粉炒各等分 水煎食前服

治赤白帶下用旱蓮草不俱多少陰乾為細末每用一匙入
鷄子清內攪勻蒸熟食之後食棗一枚去腥氣

胎前

當清熱養血

安胎飲 治孕成之後竟胎氣不安或腹微痛或腰間作痠
或飲食不美者服之或至五六箇月常服數貼

白朮 當歸 芍藥 熟地各一錢 人參 川芎

黃芩須沉水者 陳皮各五分 甘草 砂仁 紫蘇

各三分 姜一片水煎服

又方安胎

白朮 黃芩 炒麴為末粥丸服

治妊娠半產或三月墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯
浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾為末以山藥五六兩打
糊丸桐子大每服六十九空心米飲下

固胎飲

當歸身 熟地 人參 白芍藥 白朮 川芎

陳皮

甘草

薜荔即桑上羊兒藤

黃連加少

黃柏加少

水二鍾糯米一撮煎八分服血虛不安加阿膠痛加宿砂

芩朮散

黃芩條實者酒浸炒一兩

白朮壁土炒去土一兩

砂仁炒三錢

為末米湯調下二三匙

芎歸補中湯 治婦人性急常慣小產

當歸

川芎

茯苓

黃芪

黃芩

甘草

陳皮

阿膠

白朮

續斷

酒洗二錢

桑寄生

香附

砂仁

水二鍾姜三片煎八分空心服如未孕每服十五貼如

次三月內小產下次亦如期而來必先于兩月半內每日

服一貼保過三月半後方穩

東胎丸

懷妊七八箇月服之

黃芩

白朮

陳皮

白茯苓

為末粥丸桐子大每服三四十九白湯下

達生散

八九箇月服

大腹皮

人參

陳皮

紫蘇莖葉各五分

白芍藥

白朮

當歸

甘草

右作一貼入黃楊頭一箇葱五葉煎服夏加黃芩春加川

芎冬加砂仁氣虛加參朮氣實倍香附陳皮血虛倍當歸

加地黃性急多怒人加柴胡有熱加黃芩食少加宿砂神
麩渴加麥門冬食易饑多加黃揚腦濕痰加黃芩半夏腹
痛加木香胎動加苧根

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸

川芎

白芍藥

黃芩

各一兩

白朮 半兩

右為末酒飲調服方寸匕日二次或酒糊丸桐子大每服
五十九茶湯任下空心食前服日三次此養血清熱之劑
瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之

治婦人胎動不安及下血

艾葉

阿膠

川芎

當歸

各三錢

甘草 一錢

水四鍾煎二鍾去渣納膠令化分二服一日用〇八九箇
月者少加確仁

治產前因火動胎逆上作喘急者用條芩香附為末調服

一方 治產動出血產門痛用黃連為末酒調一錢日三服

佛手散 治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者又臨產服之

生速產後服之去惡血最効

當歸

去芦

芎藭

各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸溫服

益母丸

益母草

四兩酒洗

白芍藥

一兩酒炒

川芎

一兩五錢

當歸 酒洗 三兩 香附 兩半 炒 砂仁 一兩 熟地 兩半 酒洗 晒乾 搗斷

條芩 八錢 酒洗 白朮 一兩 土炒

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九白湯下此藥服之能令小兒無熱毒奶牙之患

治胎痛乃血少四物湯加香附為末紫蘇湯下

當歸散 療妊娘被驚惱胎向下不安小腹連腰痛下血

當歸 川芎 各八分 阿膠 炒 人參 各六分 艾葉 四分

大棗 二枚 茯苓 一錢 姜 三片 水鍾半煎八分食前溫服

當歸寄生湯 治妊娘胎漏非時下血氣虛血虛有熱

當歸 川芎 艾葉 白朮 各一錢 人參 一錢 續斷

桑寄生 熟地黃 各二錢 水二鍾煎一鍾空心服

人參橘皮湯 治始妊娘惡心阻食

白朮 麥門冬 去心 橘紅 白茯苓 各二錢

厚朴 姜製 二錢 人參 去芦 一錢 甘草 三錢

每服四錢水盞半淡竹茹彈子大一枚姜三片煎七分去

渣澄清空心食前溫服

又方白朮為末水丸隨所好或湯或水下空心服

經驗青竹茹湯 治婦人惡阻多從痰治

竹茹 彈子大一枚 橘皮 一錢 生姜 二錢 白茯苓 一錢半

半夏 二錢 湯泡七次 水二鍾煎七分溫服忌食羊肉鰾鮓等物

八味丸 治轉胞妊娠小便不通者是也 方見虞損門

又方四物湯加人參白朮製半夏陳皮甘草生姜水煎服

全生茯苓散 治妊娠小便不通

赤茯苓 各等分 葵子 各等分 水煎加髮灰少許空心服

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓 四兩 防風 去芦 麥門冬 去心 黃芩 各三兩

每服四錢水一鍾竹葉五片煎服

羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急語言蹇澁痰

涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角 川獨活 酸棗仁 炒 五加皮 各五分 薏苡仁

防風 當歸 川芎 茯神 杏仁 各四分

木香 甘草 各二分半 水一鍾姜五片煎七分不拘時服

治妊娠無故尿血

龍骨 一兩 蒲黃 五錢 為末每服二錢酒調服日三次

全生白朮散 治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名曰子腫

白朮 一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓皮 各五錢

為末每服二錢米飲調下

又方山梔子炒一合為細末米飲調下或丸服亦可

紫蘇飲 治子懸胎氣不和癸上心腹脹滿疼痛者是也

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮 紫蘇葉

當歸

去芦酒浸各一兩

人參

甘草

各五錢

每服四錢水一鍾姜五片葱白七寸煎七分空心温服

斬鬼丹 治鬼胎如抱一瓮

吳茱萸

川烏

秦艽

柴胡

白蠶

為末煉蜜丸桐子大每服七丸酒下取去惡物即愈

治兒在腹中哭用多年空房下鼠穴中土一塊令孕婦嚥之

即止

傷寒熱病護胎法 以竈心土水調塗臍下乾又塗之就服

一錢難產細研一錢酒調服

一方在臨月時用

當歸

川芎

黃芩

陳皮

白朮

香附

各一錢

白芷 五分

甘草 三分

蘆加人參

水煎調益元散一錢服

二合濟生湯 以枳殼芎歸達生三方抽其精粹而合成此

湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

枳殼

麩炒

川芎

各二錢

香附

一錢半炒

粉草

七分

當歸

三錢

蘇葉

八分

大腹皮

姜汁洗一錢五分

水二鍾煎一鍾待腰腹痛甚服之即產

如神丹 治難產

巴豆

三粒去殼

草麻子

七粒去殼

麝香 少許

研成餅貼臍上即產產下即去之

治難產用紅菟裘與馬齒菟同煮熟臨產食之胎即下

如聖膏 治難產兼治胞衣不下及死胎

用草麻子七粒去殼細研成膏塗臍心胞衣即下速洗去

之不即去腸出不收却用此膏塗頂上腸即縮入如聖之

妙一方用四十九粒

治橫逆生或手足先出者

兔緣子車前子等分為末每服二錢酒下

開骨丹 治產五七日不下及矮少女子交骨不開死在

龜殼自死者佳川芎各一兩 女人髮一握生男女者佳

當歸酒洗 川芎各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎服約人行五里時胎即下

猪肝蜜酒法 治婦人胞水早行胎澁不下

猪肝 白蜜 醇酒各一升

共煎至二升分作二三服不能服者隨其多少緩緩服之

催生散

白芷炒 百草霜 滑石 為末芎歸煎湯調下

濟陰返魂丹 治難產逆產俱效方見後

張子和曰大凡婦人難產者皆因燥澁緊歛故產戶不得開

通宜先於降誕之月自月之日用長流水調益元散日三

服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月則不宜服以滑石滑胎故也

將產時以烏不宿莖葉剉碎一大把加甘草一錢酒水各半煎一鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺烏不可宿故名又名石米刺

產後

產後當大補血氣為先雖有他症以末治之不可用芍藥

主方

白朮

歸身尾

陳皮

川芎

甘草

黃芪

人參各等分

水煎服大熱加炒黑乾姜熱輕則加茯苓

治產後氣血虛甚發熱惡寒切不可發表

川芎

當歸

熟地

白朮

茯苓

人參

甘草

陳皮

或加黃芪

水煎服如左脉不足補血藥多於補氣右脉不足補氣藥多於補血

一產下即以佛手散用童便一鍾酒一鍾煎七分服此藥大能去宿生新無腹痛血暈之患

治產後血往上升昏暈欲絕者以紅花一大撮好酒半碗煎數沸入童便二盞乘熱灌下立醒

治產後惡露不盡腹中刺痛

當歸 川芎 熟地 桃仁 紅花 陳皮

甘草 香附去便 水煎服 又方搗生姜真汁熱酒調服

又方用五靈脂香附為末醋丸服甚者加留尖桃仁

獨行丸 治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛

五靈脂去土半 生半炒 為末水丸彈子大每服一丸酒或姜湯

加減芎歸湯 治產後去血過多暈煩不省一切去血並治

芎藭 當歸去土半 酒洗焙

每服四錢水一鍾煎七分熱服○腹中刺痛加白芍口乾

煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾姜白芍水停心下微嘔

加茯苓生姜虛煩不得眠加人參竹葉大便秘澁加生地

橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加厚朴血崩不

止加香附咳嗽痰多加紫苑半夏生姜腰疼膝痛加牛膝

心下疼加玄胡索惡血不下腰腹重痛加丹皮

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰葶勞

當歸去蘆 酒浸 人參各七 黃芪去蘆 一兩 生姜半兩

右用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去渣

作六服早晚頻進

猪腰子粥 治產後葶勞發熱

猪腰子一箇去白膜切作椰葉片用鹽酒拌先用糯米一

合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熟粥蓋之如

作盒生粥狀空心服之

一方鹿陰莖焙乾產後虛勞者飯上蒸熟切片酒下極補最
人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身 人參去蘆 等分為末猪腰子一個去膜切片

以米三升糯米半合葱白二莖煮米熟清汁一盞入藥二
錢煎八分不拘時服

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱

其證心脅煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後
虛煩相類急宜服之

熟地 人參去蘆 當歸去蘆肉桂各兩 白芍 二兩

麥門冬一次心 每服四錢水二盞先以糯米一合淡竹葉

十片煎至一盞去米葉入藥并棗三枚煎溫服血甚熱者
加生地黃

治產後血暈用韭菜細切盛有甕瓶中以熱醋沃之急封瓶
口以瓶嘴納產婦鼻孔中搖之即甦又法以舊漆器燒烟

燻之

又方用鹿角燒灰出火毒為末酒調灌下即醒兼治血崩

又方荆芥穗研細末用一分吹鼻中

清菟散 治血迷血暈

人參 澤蘭葉 甘草各二錢 荆芥 川芎各五分

為末温酒熱湯各半盞調一錢灌之下咽即開眼

治胎衣不下以朴硝用童便調一二盞熱飲立下亦治死胎

治產後泄瀉

黃芪 白朮 川芎 茯苓 乾姜 滑石

陳皮 芍藥 甘草 水煎服

白朮散 治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘皮 麥門冬 人參 乾姜 炮各一兩

甘草 每服八錢水鍾半姜五片煎八分服

荳蔻理中丸 產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治

子脾胃虛弱久瀉

人參 一兩 白朮 一兩 乾姜 甘草 各五錢 肉荳蔻 七錢

右為末煉蜜丸桐子大每服四五十九空心米湯下酒煮

麵糊丸亦可

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地 一兩 洗淨酒 人參 去蘆 麥門冬 去心 各一兩 甘草 炙半兩

括萎根 四兩 水煎服一方用八味地黃丸龍眼湯下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝証

人參 二錢 白朮 二錢 桃仁 陳皮 各一錢 黃芪 一錢

茯苓 一錢 甘草 分五 水煎猪羊胞後入藥作一服

猪蹄湯 治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄一隻通草五兩將猪蹄洗淨依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁食之

又方用蒿苴嫩頭作羹食之

血風散 治產後諸風孿急或痿弱無力

川芎 芍藥 當歸 熟地 秦朮 羌活 防風 白芷 白朮 茯苓

右為細末一半煉蜜丸桐子大每服五七十九一半末俱酒送下

產後中風切不可作風治大補氣血為甚

調導散 治婦人產前產後大便不通

當歸 川歸 防風 枳殼 製各四錢 甘草 炙二錢

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎一盞溫服忌動風物

治產後敗血不止生地黃一兩石需內搗末每服二錢食前

熱酒服連進三服

一方消產後血塊

滑石 三錢 沒藥 血竭 各二錢 為末醋丸服瓦龍子丸 亦可

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝研細酒調三五錢瀉出惡物立止

一方琥珀三錢為末酒調下

二紗趁痛散 治婦人產後遍身疼痛及身熱頭痛

當歸 牛膝 桂心 白朮 黃芪 獨活

生薑 各半兩 甘草 薤白 各三錢 水煎服

產後水腫必用大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利

治乳汁不通

通草 七分 藿麥 柴胡 天花粉 桔梗 各一錢 青皮

白芷 各一錢 木通 赤芍藥 連翹 甘草 各五分

右作一貼水煎食後細飲更摩乳房如無子食乳者要消

乳用麥蘗二兩炒為末四物湯調下

治產後陰腫痛用桃仁去皮尖細研四五次抹之

治產後用力太過陰門突出四物湯煎熟入龍骨末少許

心連進三服用麻油湯薰洗

一方治陰根先以艾湯洗過次將蛇床子半升炒熟絹包熨

之自收入

治產後生腸不收用枳殼二兩去穰煎湯溫浸良久即入

治婦人子宮不收

荊芥穗 藿香葉 臭椿皮 各等分煎湯薰洗

華陀危病丸 治胎衣惡血湊心其證心頭迷悶胎衣上

衝心頭更不治

乾漆 五錢為末 大附子 一枚泡去皮臍

用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味丸桐子大每服三

十丸泔醕湯下須臾又進二服胎衣立下如無前藥以赤
小豆一升炒過用水三升煮二升去豆取汁溫服立下又
無意用婦人自己手足指甲燒灰酒調服須臾又進一服
更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下
烏金散 治產後一十八證

烏金子 即大烏 肉桂 去粗皮 當歸 去芦洗 真蒲黃 皂莢 不蛀者

青皮 去白 木香 血餘 洗淨 赤芍藥 紫葳

大薊根 小薊根 蚕退紙 煨存性新 棕毛 煨存性

紅花 一兩 川烏 生用 硃砂 細少許 血竭 少許細研

右一十八味除灰藥等別研外並為細末入研藥一處

勻每服一錢姜湯或芍藥或凌霄花煎酒調下甚者日夜

三四服忌鷄猪魚羊一切生冷油膩等物○第一胎死產

不下二產難三胎衣不下四產後眼花五產後口乾心悶

六產後寒熱似瘧疾七產後敗血四肢浮腫寒熱不定八

產後血邪如鬼神顛狂言語無度九產後失音不語十產

後腹痛十一產後百節酸疼十二產後敗血似鷄肝十三

產後咳嗽寒熱不定十四產後胸脇氣滿嘔逆十五產後

小便澁十六產後舌乾鼻中血出繞項生斑十七產後腰

疼如角弓十八產後喉中如蟬聲以上十八證並治

余嘗合此劑所在劑人積有年矣但古方元有蝨蟲水蛭

鯉魚皮余平生不忍用肉藥由是以大薊小薊紫葳代之
又去羌花巴豆而入蚕退紙血竭別撰醋煮大黃膏臨證
加減妙不可言自得之妙未嘗語人今既集方故盡發此
秘

錦紋川大黃不拘多少米泔浸經宿去粗皮為細末用陳
年米醋酌量多少先熬稠粘旋入大黃末不住手攪令極
勻以磁器貯之紙封口毋致蒸發臨用量輕重虛實入烏
金散內服之人柱病實者半彈子大已下漸少或以膏子
圓如小彈子大或如圓子大或如皂子大陰乾收之密器
內臨用旋看虛實以一圓令患人嚼破以烏金散送之或

以熱醋浸化入藥服之如尋常產後內熱惡露作痛俗名
兒枕痛及大便秘結者並煎四物湯浸化一圓同服
如發寒熱如瘧內熱者煎小柴胡湯浸化十九服之未效
者再進並不損人大能活血蕩穢潤燥清神開胃倍食兼
治男女老幼血疾除傷寒大病表未解者一切服之如神
無極丸 治婦人血塊痛極重者

錦紋大黃

四兩一兩酒煮七次一兩醋煮七次一兩童便
黃七次一兩益下煮七次

右為粗末再蒸七次晒七次然後研極細用當歸熟地各
一兩五錢濃煎汁一碗煮米糊為丸桐子大產後血塊痛
并婦女經水不通俱用紅花酒下心疼氣痛或腰腹疼用

小茴香炒過七分煎湯下三十九即安每日常服有塊者
一月之內下小小血粒自此除根

濟陰返魂丹治胎前產後一切病症功效甚大一名益母

益母草一味此草生二種用紫花者白花者不是於端午

小暑或六月六日花正開時連根收採透風處陰乾用時

不犯銅鐵器以石臼搗羅為細末煉蜜丸彈子大每服一

丸各照後開湯送下若量加木香同當歸赤芍藥丸炒其

藥不限丸數以病愈為度日服三五丸如桐子大服五七

十九熬膏丸炒治法于後○熬膏法益母草不拘多少連

根葉莖洗淨石臼內搗爛以麻布濾取濃汁入砂鍋內文

火熬成膏如黑砂糖色為度入磁罐內收貯每服一茶匙

○胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽米湯或

當歸湯亦可○胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱來往狀

如瘧疾者溫米湯下○臨產并產後各先用一丸童便酒

化下安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血養脉

息調經絡功效不能盡述○產後胎衣不下落在胞中及

產前一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中心悶

心痛炒鹽湯下○產後中風牙關緊急半身不遂失音不

語童便無灰酒各半下○產後氣喘咳嗽胃隔不利惡心

口吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下○產後

兩太陽痛呵吹心忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱
手足頑麻百節疼痛溫米湯下○產後眼前黑暗血暈血
熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁下如
無生者濃煎乾薄荷湯下及童便酒各半下○產後面垢
顏赤五心煩熱或結成血塊腹臍奔痛時發寒熱有冷汗
者童便酒各半下或溫薄荷湯下○產後餘血惡露不盡
結滯腹臍刺痛惡物上冲心胃滿悶童便溫酒各半下○
產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止
月水不調久而不治則為骨蒸童便酒下○產後鼻衄口
乾舌黑童便酒下○產後大小便不通煩燥口苦薄荷自

然汁下如無生者濃煎乾薄荷湯○產後痢疾米湯下○
產後瀉血棗湯下○產後赤白帶下膠艾湯下○血崩漏
下糯米湯下○勒奶痛或成癰為末水調塗乳上一宿自
瘥或生搗爛敷上亦可○婦人久無子息溫酒下一丸服
至一月有孕

婦人陰冷用吳茱萸入牛膽中陰乾百日每取二十粒研碎
帛裹納陰中良久如火熱

婦人粉花癬用艾燒烟薰入鉛粉內搽之

婦人虛弱諸病 附子嗣

加減四物湯 治婦人諸病

熟地 川芎 芍藥 當歸 各等分

每服六錢水鍾半煎八分不拘時服○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩○娠妊胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芩○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉○血崩加生地蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩○風虛眩暈加秦艽羌活○發熱心煩不得卧加黃連梔子○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓○筋骨肢節疼及頭疼惱寒加羌活防風藜蘆本細辛○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川練子○經水過多加黃芩白朮○經水澁少加葵花紅花○經水暴下

加黃芩○赤白帶下加香附白芷○血痢加阿膠黃連○產後血痢腹痛加槐花黃連嬰粟殼○血熱相搏舌乾口渴加枯藁根麥門冬○大渴引飲加知母石膏○腑臟秘澁加大黃桃仁○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁○目暴赤作翳障加防風羌活防已酒浸龍膽草○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

當歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸去芦四兩 肉桂去皮二兩 甘草炙二兩 白芍藥六兩

每服三錢水一鍾姜五片棗一枚同煎空心熱服

六神湯 治婦人血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 地黄 芍藥 川芎各二兩 地骨皮

黃芪各一兩 每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

滋血湯 治婦人皮聚髮落心肺俱損血脉俱弱月水過期

益氣養血調進飲食

人參 白茯苓皮去 川芎 當歸 白芍 山藥

黃芪 熟地各一兩 每服一兩水二鍾煎一鍾溫服

補中丸 治婦人虛損諸疾宜常服

川芎 白芍 黃芪 當歸 人參 陳皮

各五錢 白朮 地黄各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九溫水下

滋陰百補丸 專治女人勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍

熱心腹疼痛不思飲食疰羸乏力

益母草半斤 當歸六兩 川芎四兩 熟地四兩 人參

茯苓 玄胡索炒各二兩 芍藥三兩 白朮四兩 甘草

香附子一斤 便浸四兩 俱炒焙乾 益水浸四兩 醋浸

為細末煉蜜丸桐子大每服五六十九空心宿砂湯或醋

湯或酒或滾湯任下

烏骨鷄丸 治婦人虛弱咳嗽吐痰骨蒸勞熱帶下經水不

調瘦倦無力口乾舌燥

人參五錢 當歸酒洗 白芍酒炒 熟地姜汁 白茯苓去皮

香附重便浸炒 各一兩 川芎 陳皮 玄胡索

秦艽 貝母去心 丹皮各七錢 甘草五錢

右用黃芪為末拌飯喂鷄至肥眼生眵縊死燥去毛破開
取出腸穢好酒洗淨將前藥入肚內縫定用酒醋等分煮
鷄爛撈起焙乾為末鷄汁打糊為丸桐子大每服五十丸
空心米湯下

玉鑰啟榮丸 治女子無他疾經事調勻容顏不損但久無

胎孕先師云婦人者衆陰之所集常與溫居今失所養則
子宮有陰無陽子終不發用此丸平調氣血漸生微陽生

治怯瘦性急婦人經水不調不能成胎謂之子宮乾澀血少

不能攝受精氣宜涼血降火

當歸 川芎 芍藥 熟地 香附 黃芩

柴胡 水煎服

六味地黃丸 能補婦人之陰血不足無子者方見虛損門

百子附歸丸 此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後月

事參差有餘不足諸證悉皆治之殊益胎嗣

阿膠蛤粉炒 成珠 斷艾去勳梗 醋炙乾 當歸肥大者酒 浸去蘆 川芎去蘆

熟地去腦取 沉水者 白芍肥長者 各一兩 香附赤心者十二兩去毛 醋各浸一宿

共為末用大陳后榴一枚連皮搗碎東流水三升熬去滓

打糊為丸桐子大每服百丸空心陳米醋點沸湯下
神効墨附丸 治婦人久無子經事不調及數墮胎者

香附子 一斤要北分童便浸一分作四分一分好酒浸一分
艾綿 四兩要紫淨無細梗及艾塵者用醋二大碗同香
餅 以薪瓦炭火焙乾搗為末

白茯苓 去皮淨 當歸 去蘆淨酒浸 人參 去蘆 川芎 大實者去土淨

熟地 酒浸去土又以酒蒸過 上等徽墨 火煨醋淬 木香 五錢廣南者佳

右為末醋糊丸桐子大每服五十丸空心好酒下

加味益母丸

益母草 半斤 川芎 赤芍 當歸 廣木香 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸好酒或童便下

加味養榮丸 服之有孕且無小產之患

當歸 酒浸 熟地 酒浸 白朮 各二兩 芍藥 煨 川芎 黃芩 炒

香附 炒各兩半 茯苓 麥門冬 去心 貝母 陳皮 去白各一兩

甘草 炙五錢 阿膠 炒七錢 黑豈 大者炒去皮四十九粒

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九丸空心鹽湯溫酒任

下忌食諸血

四製香附丸 調經養血順氣健脾胃信服有孕

香附米 一斤作四分一分酒浸一分蒸湯浸一分童便浸

當歸 酒浸 川芎 熟地 姜汁炒 白芍 酒浸炒 白朮

陳皮 澤蘭葉 各二兩 黃栢 酒炒 甘草 各一兩

右為木酒糊丸每服七十丸空心白湯下

壬子丸 依方修合此藥服之不過半月有孕

吳茱萸 白芨 白蘇 白茯苓 各一兩 牛膝

細辛 錢各五 菖蒲 白附子 當歸 許各少 厚朴 桂心

人參 兩各四 乳香 三兩 沒藥 四兩

右為末煉蜜丸桐子大每服十九丸有効若男子服補益若

孕婦服即生雙胎空心好酒下用壬子日修合勿令鷄犬

婦人見

琥珀調經丸 治婦人無子能令經正

香附子一斤半斤童便浸半斤好醋浸各七日以好艾摻

去枝梗淨者四兩加入香附內攪勻再加好醋五碗入砂

鍋同煮乾為度晒乾為末另加後藥

當歸 酒洗 川芎 熟地 酒蒸另搗 生地 酒浸另搗

芍藥 畏各 琥珀 一兩另研

右為末共一處再搗極細醋糊丸桐子大每服百丸空心

艾錯湯下

濟陰返魂丹 久服亦能令婦人有子即益母丸

如聖丹 治婦人赤白帶下月經不不不能成孕

白礬 蛇床子 等分為末醋糊丸彈子大胭脂為衣薄綿裹

留綿帶二尺許打一大結長留在後只以綿裹藥丸深入
玉戶中定坐半日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多
因子宮不索服藥難効此藥易痊亦且効速不傷臟腑能
生子嗣

雛鳳丸 服之即孕

用頸窠烏骨鷄雌雄各一隻置放一處不可與群鷄相混
候生卵時初生頭卵記放待生卵數足將初生卵頂竅上
開一竅用辰砂三錢當歸芍藥川芎熟地各二錢細末將
卵黃傾出和藥末仍入殼內以厚紙封之衆卵內覆之待
群鷄生將藥卵出殼蜜丸空心好酒服三四十九極効

製附丸 寧波二守龍葵陽傳試驗者

香附

半斤二兩 使浸一宿 二兩 子煎湯浸一宿 二兩 酒浸一宿 二兩 童

右晒乾為末米醋糊丸桐子大每服七八十九空心益湯

下忌豆腐蘿蔔燒酒

子嗣 男子服

秘傳金鎖思仙丹 治男子嗜慾過多精氣不固盜以去脫

之劑也

蓮花蕊

十兩 忌地黃蒜

石蓮子

十兩 沉水者佳 去內青蔥取粉

鷄頭實

十兩 晒乾 搗取淨粉

右以金櫻子三斤取霜後半黃者木臼中杵却刺擊為兩
片去子水淘淨搗爛入砂鍋水煎不熄火約水耗半取出

瀝過重煎如稀餉如乾者水浸軟去之煎令如法入煎藥
末和丸桐子大每服三十九空心益湯下一月不走泄候
女人月信位取車前子一合水煎空心服之一交感即孕
平時忌葵菜車前子

固本壯陽丹

熟地用淮生地酒蒸九次石菖蒲錢五遠志甘草水浸去心一兩淮山藥二兩

五味子錢二肉蓯蓉酒浸洗去鱗甲白膜二兩菟絲子酒浸炒二兩牛膝酒浸一兩

巴戟酒浸續斷酒浸茯苓去皮益智仁去皮黃柏炒酒

知母酒炒各一兩破故布酒炒枸杞子酒炒山茱萸淨

杜仲去皮姜汁炒斷系沙苑蒺藜炒各二兩人參

虎脛骨酥炙各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心益湯下

巨勝子丸 治右尺命脉虛微欲脫陽痿不舉陽脫之證

熟地酒蒸生地酒洗赤白何首烏剉去皮黑者蒸天雄

牛膝去蘆同向天門冬去心枸杞子剉去皮穢器菘蓉酒洗去甲膜木香

巨勝子 兔絲子酒煮搗成餅晒乾白茯苓去皮栢子仁 楮實

酸棗仁炒破故布炒巴戟去骨北五味 覆盆子 山藥

續斷酒洗鷄頭子 川椒炒去汗目葫蘆巴 蓮花蕊 韭子

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心温酒下

大補陰丸 治左尺腎脉洪大或數遺精活血壯水之要藥

大也 方見虛損門

補陰丸 治左尺腎脉洪大或數遺精元氣不固補陰制火

之藥也 方見虛損門

加味虎潛丸 治左尺腎脉虛數精神短少腰膝無力補腎

養血之劑也 方見虛損門

八味丸 治兩尺脉微弱陰陽俱虛雙補之劑也 方見虛損門

補天丸 治六脉虛微氣血衰弱虛勞證

紫河車 一具 得男用女胎亦男胎俱以初胎為佳若不可

黃柏 酒炒 龜板 炙 杜仲 酥炙 牛膝 酒浸各 陳皮 一兩

冬加乾姜五錢夏加五味子一兩共研

右以紫河車水洗淨布絞乾或用酒煨熟入諸藥末共搗勻焙燥再為細末酒糊丸桐子大每服百丸空心温酒或椒鹽湯下

種子奇方 男子陽衰精薄服之大効

山茱萸 去核 補骨脂 酒洗炒各 天門冬 去心 麥門冬 去心

枸杞子 真甘州者佳 兔絲子 酒煮炒 熟地 酒蒸搗爛

山藥 各三兩 覆盆子 炒 巴戟 去心 白龍骨 火煨童便淬七次布包吊井底三日晒乾

左顧牡蠣 製同龍骨 鎖陽 酒洗 白朮 炒各 陳皮 一兩去白

杜仲 去皮姜汁炒去絲一兩五錢 共為末

紫河車一具頭生男子者水洗淨搥去筋膜擠去紫血用

米泔漂數次仍以酒洗過盛瓶內入酒封固重湯煮爛搗

如泥瀆不生瘡疾潔淨婦人者佳入前藥末共搗煉蜜丸

桐子大每服百丸空心温酒或鹽湯下

五子衍宗丸 男服此藥添精補髓疏利腎氣不闕下焦虛

實寒熱服之自能平秘舊稱古今第一種子方

甘州枸杞 酒蒸搗餅 覆盆子 四兩酒洗去

遼五味子 車前子 淨各二兩

右各藥俱擇道地精鮮者焙晒乾共為細末煉蜜丸桐子

大每服空心九十九上床時五十九白湯或鹽湯下冬月

温酒下修合春取丙丁巳午夏取戊己辰戌丑未秋取

癸亥子冬取甲乙寅卯等日忌師厄鰥寡及鷄犬六畜之

十精丸 精寒陽痿甚者宜服此藥

枸杞子 甘菊花 兔絲子 酒煮成餅 山茱萸 去核

天門冬 白茯苓 各三兩 淮熟地 用生者酒蒸九次

肉蓯蓉 酒洗去鱗膜 官桂 漢椒 去目各

右為細末紅鉛丸桐子大每服三十九空心鹽酒下

温臍種子法

五靈脂 香白芷 青鹽 冬二 麝香 一分

右為末以蕎麥麪湯和搓成條圍於臍上以前藥實其中
用艾灸之但臍內微温即好不過二三度

鹿角膠丸 精寒陽痿無子者服之

鹿角十斤 鹿角二兩 鹿角半寸 鹿角長 鹿角浸七日 鹿角用酒 鹿角羊 鹿角藿 鹿角一斤 鹿角當歸 鹿角四兩 鹿角黃

鹿角膠斤 鹿角霜 鹿角斤 鹿角半 鹿角天門冬 鹿角心 鹿角麥門冬 鹿角心 鹿角黃柏 鹿角酒 鹿角炒

知母酒洗 虎脰骨酥炙 龜板水浸 龜板刮去浮 枸杞子 山藥

肉蓯蓉酒洗 肉蓯蓉去浮 茯苓去皮 山茱萸淨 破故布炒

生地酒蒸 當歸酒洗 當歸各四兩 兔絲子酒 兔絲子煑 兔絲子搗 兔絲子成餅 兔絲子焙 兔絲子乾

白芍酒炒 牛膝酒洗 牛膝去蘆 杜仲姜汁炒 杜仲去絲 人參去蘆

白朮炒 五味子炒 酸棗仁炒 遠志甘草湯 遠志浸 遠志去骨 遠志各二

川椒炒 川椒去汗 共為末煉蜜化鹿角膠丸桐子大每服百丸空心鹽湯或酒下

延生護寶丹 補元氣壯筋骨固精健陽老年無子宜服

兔絲子酒 兔絲子煑 兔絲子搗 兔絲子焙 兔絲子乾 菟蓉酒洗 菟蓉去甲 菟蓉膜 菟蓉二兩 菟蓉再用 菟蓉酒 菟蓉四升

韭子四兩 韭子用酒 韭子浸 韭子一宿 韭子焙 韭子乾 韭子用 韭子三兩 木香半兩

蛇床子三兩 蛇床子用 蛇床子酒 蛇床子浸 蛇床子二宿 蛇床子煑 蛇床子熟 白龍骨一兩 白龍骨用 白龍骨茅香 白龍骨一兩 白龍骨同煑

晚蚕蛾全者 晚蚕蛾二兩 鹿茸一兩 鹿茸酥炙 桑螵蛸炒 蓮實炒

乾蓮蓬 胡蘆巴各一兩 乳香研 丁香各半兩

麝香一錢 麝香另研

除乳香麝香兔絲子末外十二味同為末將前兔絲子末

用前浸藥酒二升文武火熬至一半入蕎麵兩匙攪勻次

下乳香麝香等不住手攪熬如稠糊放冷和藥如硬再入

酒少許搗千餘下丸桐子大每服五十九空心酒下
仙茅酒 治男子虛損陽痿不舉

仙茅

四兩米泔浸去赤水晒乾

淫羊藿

四兩洗淨

五加皮

四兩

用絹袋裝入酒內浸一月取飲

又方燒酒十斤入龍眼肉百枚浸一月取飲

種子方 寧波龍二守傳試驗者

魚膠

八兩陳年者佳切碎蛤粉炒成珠

當歸

酒洗

一兩

沙苑蒺藜

一兩微炒

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九空心鹽湯下男服

此藥女服製附丸各養百日後交會即有子

種子之法必先寡慾靜養使精氣冲實然後擇壯盛女子俟

其行經後第一日第三日與之交媾必生男第二日第四日

則生女至五六日無用矣此已試之成驗也

萬邦孚曰醫家往往誇談種子成方善持符券而不知夫人

所以艱嗣之故蓋非一端有因自幼斷喪耗其精氣者有因

精寒不能成胎者有精滑易洩不足構女之陰者有過服熱

藥胎毒盛而子難育者是在因病而藥非可執方而論也如

云種之而已一味助長是自喪其真所稱非惟無益而反害

之者非耶若夫至本至要則又在方寸心術之間倘一念善

天必予以賢嗣一念惡即有子不肖與無子同可不慎歟此

又出於方之外者艱於嗣者其察之

小兒諸病

肝與脾病多肝只有餘腎只不足病因有二曰飽曰暖藥品與大人同只劑料小耳

小兒諸症總訣

察小兒之諸症緣病在於胎中乃保育之失調致百病於孩童稟氣之清且厚者則首脉堅而壽長稟氣之濁且薄者則首體弱而病無窮稟受各異厚薄不同入門觀色青必驚而白必冷啟關察脉赤乃熱而黑乃凶寒必傷於肺腑熱則蘊於心腎寒能作痛熱能生風夜啼不止皆因孕母胎驚哭聲欠高乃是受胎不足胎中受寒生下則面色青白而啼哭

乳胎中受熱生下則鵝口瘡瘍而重舌赤瘤內傷於寒者不吐則瀉外傷於熱者有風必驚驚哭夜啼當以鎮心為要多啼不止還宜煖胃為先面目青紅定是肝心受熱而黃慘淡乃知脾胃生痰吐而不食清胃口而飲食自進糞下黃臭去積食而腸胃自通○小兒無脉觀虎口三關可見一為風關寒在肺腑則紋或青或白熱在心胸則紋或赤或紅二為氣關關青黃定然傷食傷風紋上赤紅乃是驚風發熱三為命關赤紋在而可醫可救黑色過關難治難攻小兒不語驗五指寒熱可知中指冷積食痘疹中指熱傷風傷寒五指稍冷驚風立見○急驚卒然潮熱手足搐掣雙目直視痰涎湧塞治

當退熱行痰○慢驚得于大病之餘吐瀉之後過服寒涼之藥轉致脾胃虛損風邪乘之眼慢騰騰手足痠痲面色青白四肢皆冷必先理氣溫補脾元元氣一盛痰氣自下○慢脾由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極惟脾所受故曰脾風面青額汗眩暈交牙身體逆冷手足搐掣急與煖脾回陽十救一二珍太冲脉灸百會穴不醒神氣已脫決無生意○天劫客忤之疾皆關於心心為怪物異人所觸以致面赤發熱驚搐不止欲治此疾必先求諸心○丁奚脯露之症皆屬於脾外為風寒暑濕所傷內為飲食不節所損以致肚腹高膨手足細小寒熱相兼喘急不止頭骨開解翻胃退食治以調胃為先

○病有兒未能行毋腹懷孕兒飲此乳而作疾下痢寒熱毛髮不潤醫者善調脾胃其疾可瘳○口流清水唇紅面白虫痛也當安其虫而順其氣其痛自止面黃身冷日夜啼號腹痛也宜調其脾而煖其胃其疾自除○盜汗煩渴不止者心脾受熱也宜止汗散涼心安神而汗止渴消○暑瀉引飲不止者膀胱受熱也宜用五苓散利水道而陰陽自分○變蒸之候變者上氣蒸者體熱其狀似驚上唇有白泡如珠以惺惺散主之○五臟所因心屬火夏旺節氣合小腸為腑其色赤性主苦熱則驚搐冬則氣痛治心者先息火而疔可安○肝臟屬木春旺節氣合膽為腑其色青性主辛酸心與肝連

心火熱則生風二臟相搏風火相爭故發搐掣治肝者先瀉
心火則肝自退○脾臟屬土旺於四季辰戌丑未月各十八
日合胃為腑其色黃性好甘美不受苦澁飽則傷脾飢則傷
胃霍亂吐瀉生瘧生痰五疸五疳腹痛疝積飲食不節調和
失期皆傷於脾先培其土則諸疾可治○肺臟屬金秋旺節
氣合大腸為腑其色白性好清淨肺主氣懸於上為五臟之
華蓋諸家之疾皆出於肺寒則生痰作嗽熱則作喘作急先
散其氣則諸疾可醫○腎臟屬水冬旺節氣合膀胱為腑其
色黑性喜鹹腎本虛疝氣竄於上焦生牙疳虫瘡害人最速
諸家之病皆出於腎水生火降百病不生火上水下真元易

竭○痘疹五臟各有一症要識生克須明順逆肝臟水泡肺
臟膿泡心臟發斑赤色而小脾經發疹色黃微赤歸腎變黑
青紫乾陷春夏為順秋冬為逆痘始出時先發驚搐而後發
瘡者生如瘡已出而後發搐或吐或瀉者死先發熱乳食大
便如常其瘡紅活雖不服藥自然無害瘡已發而後泄不止
者死瘡癢而忽瀉膿血痂皮者順腹中有瘡也瀉血而水谷
不消者逆脾胃虛也或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救胃爛
也秋冬寒腎水得時其瘡黑色此腎症難治春膿泡金尅木
夏黑陷水尅火秋發斑火尅金冬發疹土尅水俱逆症又斑
疹瘰後發驚搐者死鼻有黑氣風攻頤頷唇項腫硬咳嗽氣

喘停耳心痛四肢虛浮吐高而突已上狀症皆不可治○小兒之疳皆起於脾失調理病傳各臟症類不同其名有五心之疳驚疳也面赤唇紅舌上生瘡小便赤澀煩熱盜汗是也當清熱鎮驚利水為先肝之疳風疳也搖頭側目白膜遮睛頭焦髮豎痢青多淚面青是也當驅風散邪消熱養血為主脾之疳食疳也面黃肚大水穀不消減食吃泥瀉下酸臭是也當行滯消積調理脾胃為安肺之疳氣疳也咳嗽喘急毛焦皮燥壯熱惡寒鼻流清涕面白是也當清金補脾利水次之腎之疳急疳也腦熱肌削齒爛泄瀉足冷身多瘡疥面黑是也當補養脾土後治其疳○吐瀉所因寒吐寒瀉煖胃為

先熱吐熱瀉清胃理氣積吐積瀉宜用化食風痰驚瀉當先治痰濕吐濕瀉專用醒脾○藥有三不可忽一熱不可下小兒氣弱下則脾胃易虛反生他症當先化食清熱溫平之藥則熱可消二痢不可止初作即止留毒在內反為所害必用化滯通利之劑則痢自止三瘡不可截截之太早反為不美當快脾化痰其瘡自退○傷寒三因一因夾食胃中宿食不化外感風寒面青潮熱口吐酸氣嘔煎不乳夾食傷寒也先宜化食而後退熱消食則吐止身涼二因夾驚閉紋紫赤面紅發熱或時驚跳頭疼煩悶啼哭不乳夾驚傷寒也當解散之則驚自定三因兩感傷寒胸滿氣促咳嗽生痰增寒壯熱

嘔吐煩渴頭疼昏悶惡風自汗驚哭不乳兩感傷寒也宜用
和鮮其疾可除○病有四不治眼上赤脉顛腫反陷魚口氣
粗齒齒咬人冷汗如雨痰熱不退臍風撮口鎖肚吊腸皆不
治之症也○嗟夫治幼之術不患病之難治惟患識之不真
苟識病以施治何藥餌之勿靈三因一因一因一因一因一因
小兒初生臍帶落後取置新瓦上燒烟將盡放地上以蓋覆
之存性研末若臍帶有五分重配水飛過辰砂細末二分五
釐生地黃當歸身煎濃汁調抹兒上臍及母乳上使藥下盡
次日大便遺下胎毒穢物可無瘡疹諸疾生一子得一子十
分妙法也又初生臍帶剪下即以枯礬一撮摻之可無臍風
之患

天一丸 治小兒百病

燈心

十斤以米粉漿洗晒乾研末入水澄之浮者為燈心取出入藥二兩半

茯苓

去皮 茯神 去皮木各二兩半

滑石

水飛五兩

猪苓

去皮五兩

澤瀉 去鬚三兩

人參

一斤去蘆煎膏一方

同熬膏

參六兩

白木六兩

甘草四兩

右為細末以人參膏和丸如龍眼大硃砂為衣外貼金箔
任病換引服大段小兒生理本天一生水之妙凡治病以
水道通利為捷徑也

驚風

急驚慢驚

天驚

胎驚

急驚歌曰熱極生風作急驚卒然目霎有痰鳴面青臉赤頻牽引實熱涼驚與利驚金箔鎮心羌活散稀涎更下滾痰輕搐而不已頻多汗生死還須自曉明
慢驚慢脾歌曰過服寒涼大病餘或因吐瀉久成之脾虛胃弱虛邪入眼慢騰騰搐四肢面色白青身厥冷痰涎額汗露睛微或兼下痢終難治並用溫脾與醒脾
胎驚歌曰壯熱腮紅心不寧四肢抽掣有痰生時時嘔吐身強直半歲中由胎受驚又有項間生大塊此名驚氣積而成消痰清熱先須理定魄安神要鎮驚

天癇歌曰天癇原由積熱生涎朝心絡又多驚雙眸翻上唇多燥項強痰鳴手爪青

治驚風大凡先要行痰一見牙關鎖禁先以稀涎散一二匙用白湯調灌入喉中如口禁不下即從鼻中灌入牙關少舒即以鵝翎蘸姜汁頻探喉中令吐風痰進滾痰丸先使其下降然後用四磨湯以行其氣氣行則痰行稍得甦醒以金箔鎮心丸抱龍丸次第與服如痰盛不得吐用姜汁竹瀝三四匙灌之又以吹鼻散擦鼻蘸藥取嚏依法而行不得嚏或啼聲不出口噤不醒額汗如珠遺尿噴藥者決不可治矣

丹溪謂驚風有二慢驚屬脾虛當溫補脾胃次以鎮驚用珠

砂安神丸參朮湯下急驚屬痰熱宜清涼之劑安神退熱
降火下痰丸主之世人以一藥通治之甚妄也

上竈搖頭齒牙額紅是心熱黃連甘草○目連開閉是肝
風柴胡防風甘草○左腮紅是肝熱瀉青散○右腮紅是
肺熱瀉白散○鼻上紅是脾熱瀉黃散○額上紅是腎熱
知母黃柏炙甘草○無故驚跳忽然大叫必死是火火發
氣虛甚也

稀涎散 治痰壅喉閉牙關緊急

猪牙皂角 明礬 各等分

為末每服二匙白湯調下要吐加瓜蒂

搐鼻散

半夏 細辛 荆芥 錢各一 牙皂 五分 麝香 少許

右為末用帛撚蘸藥入鼻中取嚏

四磨湯 治氣壅痰滯腹脹行氣之藥氣行則痰行

檳榔 木香 枳殼 烏藥 姜湯磨服

治小兒牙關不開用南星末一錢腦子少許研勻以帛撚姜
汁染藥於左右大牙根上擦之立開

人參羌活散 截風定搐豁痰安神

柴胡 天麻 前胡 人參 枳殼 茯神

羌活 桔梗 陳皮 防風 姜蚕 甘草

水煎入姜汁竹瀝服○痰盛加南星○瀉加澤瀉訶子○
大便結加皂角○昏迷加黃連○吐熱加黃芩○嗽加杏
仁○天癩加鈎藤○心跳加當歸○胸悶加枳殼○目連
睚動及肝風加青皮黃連

醒脾飲 治慢驚慢脾風

人參 白木 楠紅 白附子 甘草 茯苓

石菖蒲 藿香 天麻 木香 乾姜 蓮肉

陳米百粒 姜棗水煎服○瀉加訶子○不出聲倍加石菖

蒲○搗加全蠍蟬退○渾身厥冷加製附子

錢氏保和錠子 治小兒急慢驚風

辰砂 水飛 人參 白木 茯苓 去皮 茯神 去皮 山藥

赤石脂 煨七次醋 乳香 各二錢 礞石 硝煨 金色 牛黃

姜蚕 五靈脂 麝香 各五分

右為末糯米糊杵千下成錠量兒大小薄荷湯磨下

抱龍丸 治風痰壅盛驚搐昏睡

雄黃 辰砂 水飛 天竺黃 各四錢 麝香 一錢

膽星 八錢 以南星為末臘月牛膽汁拌仍入膽中陰乾百
日用陳者尤良拌過三次者可當半黃

右為細末甘草煎濃汁丸芡實大辰砂為衣薄荷湯下

琥珀抱龍丸 治慢驚脾胃虛弱風痰壅盛

琥珀 四錢 人參 去蘆 五錢 天竺黃 錢五 檀香 四錢 膽星 一兩二錢

茯神去皮 明天麻 各七錢 山藥 一兩 枳殼 四錢

雄黃 五錢 麝香 半錢 辰砂 水飛 五錢 甘草 炙 三錢

右為細末煉蜜丸如實大金箔為衣蠟固封薄荷湯下

辟異錠子 治風壅痰熱怖悸煩狂譫妄急驚搐搦

紫河車草 五錢 黑豆 煮 甘草 炙 牙硝 各半 人參 一錢

茯苓 去皮 五錢 明天麻 八錢 膽星 一兩二錢 防風 五錢

麝香 一錢 姜蚕 三錢 炒 龍腦 三錢 辰砂 水飛 五錢 全蠍 洗 炙 十二箇

右為細末山藥糊和作錠子金箔為衣薄荷湯磨下

金箔鎮心丸 解熱退驚安神除煩燥止夜啼

全蠍 洗 天麻 防風 去蘆 羌活 去蘆 牛黃

赤茯苓 去皮 犀角 甘草 麝香 辰砂 各一錢

金箔 二十片 為細末煉蜜丸如實大薄荷燈心湯下

安神鎮驚丸 治脾胃虛弱風痰壅塞昏睡不醒驚悸搐搦

人參 去蘆 白朮 炒 白茯苓 去皮 明天麻 膽星 橘紅

麥門冬 各五錢 甘草 炙 一錢 桔梗 姜蚕 炙 各二錢 木香 半錢

辰砂 水飛 全蠍 五箇 洗 炙 麝香 一錢 酸棗仁 炒 五錢

右為細末煉蜜丸如實大每服一丸隨飲子下○驚風薄

荷湯下○傷風荆芥湯下○夜啼燈心湯下○搐搦防風

湯下○慢驚冬瓜子仁湯下○常服薄荷金銀湯下

保驚丸 治小兒諸驚

明天麻 白附子 防風 蛇含石醋 蟬脫 荊芥

代礮石醋 膽星 半夏製過 白朮 茯苓去皮 川芎

各一兩 粉草 姜蚕炒 土硫 羌活 當歸

酒洗各六 全蠍洗炙 牙皂去皮 人參各四錢 山藥二兩

麝香二錢

右為末米糊丸龍眼肉大硃砂為衣量兒大小服○驚風

薄荷湯下○冷吐瀉乾姜豈菟湯下○熱吐瀉木瓜湯下

○焦燥不寧桃橘葉各七片炒葱姜煎湯下○瘟症用一

九遍身擦過燈心薄荷湯服一九○夜啼柿蒂湯下○受

驚糞清薄荷湯下

回天保嬰丹

明天麻三錢 糯米炒 胆星三錢 射香二分 雄黃三錢 白附子三錢 包煨

半夏三錢 姜汁製 姜蚕一錢 炒 牙皂一錢 酒洗 炒黃色 枳實一錢 酒炒 金蝎一錢 洗去鹽 去頭足焙乾

牛黃五分 巴豆三十粒 發 三日所用 止車三十個

前藥各為細末將枣溫水泡去皮核每棗一個入巴豆一

粒麪包煨熟去巴豆不用以棗肉搗爛為丸如桐子大硃

砂一錢水飛過用金箔為衣○急慢驚風先用姜湯下一

丸後用燈心湯下一丸○疳積用陳皮山楂湯下○嘔吐

藿香湯下○痰喘薄荷湯下○痰壅四肢不遂姜湯下

珍珠丸 治小兒急慢驚風痰涎壅盛頭狂譫妄等症

天花粉 三錢
姜蚕 炒去絲 二錢
珍珠 豆腐黃 三錢
人參 三錢
胆星 四錢

雄黃 二錢
琥珀 二錢
辰砂 五錢水飛 三錢
礞石 錢 三
犀角 三錢

射香 五分
半黃 七分
甘草 一分
冰片 一分

右為細末竹瀝丸芡實大硃砂為衣薄荷湯下

瑞金丸 治小兒風痰喘急并喘嗽驚悸

胆星 五錢
半夏 湯泡七次 一錢
廣陳皮 去白 一錢
旋伏花 五分
杏仁 去皮尖炒 一錢五分

紫蘇子 微焙 一錢
甘草 稍分 八分
貝母 去心 一錢
牛黃 七分
人參 一錢

桔梗 一錢

各為淨末合一處皂角煎汁浸蒸餅入姜汁五匙丸如黍

米大一歲見一分三歲三分淡姜湯空心服 有真羚羊角 入一錢更妙

星石降痰丸 治小兒驚風痰壅喘急

青礞石 煅硝四兩將礞石 煅碎拌勻入磁瓶內以瓦蓋之 蓋泥封固一寸厚大火煨過放地上 一宿取出研末用

南星 掘地坑取實炭火燒紅將末醋二碗發下隨下南星 以瓦盆蓋之四旁用泥封固次日取出為末听用

製過礞石 二兩
製過南星 二兩
辰砂 一兩
水飛 一兩
沉香 一兩

滑石 一兩 甘草 一兩
猪牙皂角 去皮 瓜蒌仁 貝母 各七

黃芩 枯礬 荊芥穗 各五錢

右為末姜汁煉蜜丸龍眼核大白湯化下大人亦可治

寧神丹 治小兒急慢驚風

膽星 一兩
天竺黃 錢八
姜蚕 炒 五錢
全蠍 錢四
鈎藤 四錢

明天麻 錢五
山藥 四錢
琥珀 錢
珍珠 各三
牛黃 二錢

雄黃

麝香

各一錢五分

右為細末，甘草煎膏，九芡實大辰砂為衣，每服一丸，薄荷湯下。○傷脾風，四君子湯下。

奪命丹

治急驚，不省人事，眼定不動，牙關不開，唇白并黑。

南星

姜汁和成餅

半夏

辰砂

水飛各四錢

金箔十片

珍珠

二錢

巴豆

去壳去油

紅粉

五分

銀箔十片

麝香

五分

共為末，糊丸，黍米大一歲一丸，燈心湯下。

礞石散

治急慢驚風，痰壅塞喉，命在頃臾。

青礞石一兩，入砂鍋內，同硝一兩，火煨通紅，消盡為灰。

候冷，如金色，研為細末，濃煎薄荷湯，入蜜調服。

治小兒驚風痰嗽，時作潮熱。

南星、半夏各四兩，米泔水浸透，為度，切片，曬乾，再用姜汁。

浸一日，夜曬乾，濃皂角水浸一日，夜洗，曬乾，礬水浸一日。

夜曬乾，朴硝水浸一日，夜洗，曬乾，入辰砂五錢，麝香三分。

研末，滴水丸，芡實大。○驚風，金銀湯下。○有熱，薄荷湯下。

○咳嗽，人參、五味子湯下。○冬加川烏、夏加礬砂。

治小兒風痰

南星

一兩用白礬水

白附子

二兩

右為末，麩糊丸，芡實大，每服三丸，姜蜜薄荷湯下一方用。

牛旁子炒研細，加痰藥中甚效。

封顛法 百日裡冰兒可用

射香 半字 蠟尾 去毒五分 薄荷 半字 青黛 一字

右為末棗肉研成膏新綿上塗勻貼顛上四方出一指許
火上灸

驚風子母俱服

人參 錢各一 白木 錢各一 茯苓 錢各一 胆皮 各五分 甘草

薄荷 半夏 天麻 各七分 細辛 三分 全蠍 炒去毒五分

姜三片水煎服

治感冒發熱驚搐

人參 羌活 錢各一 獨活 柴胡 天麻 各七分 川芎

茯苓 甘草 枳殼 桔梗 各四分 全蠍 三箇灸去毒

地骨皮 三分 前胡 七分 姜三片棗一枚煎服

錢氏白朮散 治脾虛吐瀉成驚

藿香 白朮 木香 白茯苓 甘草

人參 錢各一 乾葛 二錢

右為末每服一錢至二錢水煎服○頻瀉將成慢驚加山藥扁荳肉菓各一錢入姜汁一匙煎服○慢驚已成加細辛天麻各一錢全蠍三箇白附子八分

牛黃清心丸 治小兒狂亂驚風癇痰涎壅塞精神昏憤 方見痰門

紫金錠 治小兒急慢驚風五疳五痢癰疹瘡癩并昏憤不

省牙關緊急薄荷湯磨服 方見痰明

灸法 治驚風男左乳女右乳俱黑肉上週歲者三壯二三

歲者七壯

治小兒角弓反張雙目直視用南星半夏竹瀝姜汁灌之更

灸印堂

定志丸 治驚風已退神志不定

琥珀 茯神去皮 遠志甘草湯泡 人參 明天麻

天門冬去心 白附子 酸棗二炒 甘草灸各等分

右為末煉蜜丸皂子大辰砂為衣燈心薄荷湯下

釣藤飲 治小兒天吊壯熱驚怖眼目反張手足抽掣

全蠍灸 蟬脫 姜蚕炒 明天麻 犀角 膽星

青黛 辰砂各等分 麝香星藥多寡

右為末猪膽汁丸菴荳大井花水調一九入鼻令嚏次以

釣藤湯調六丸服

虎睛丸 治癇症邪氣入心

虎睛一對 遠志肉 姜製一錢 犀角一錢 石菖蒲一錢半

茯神去皮木一錢半 法製半夏二錢 麥門冬去心一錢

人參一錢 膽星三錢 琥珀一錢 麝香五分

右為極細末甘草膏丸灸實大硃砂為衣每服一丸金銀

竹葉燈心湯下

驚風不治歌

驚風精定要推求口禁心焦脉數憂眼合不開并竄瞪面緋
面黑手難收口張吐沫氣粗大髮直搖頭汗不收齧齧喉鳴
兼鼻冷遺尿瀉血總難瘳

慢驚不治歌

大凡陰症少人知睡困唇焦口角垂髮直乾啼牙齒露鼻乾
黑燥最難醫鯽魚口動何須治項軟鴉聲墮四肢張眼看人
睛不轉孩兒鬼已入陰司

驚癇慢脾死候歌

驚癇風邪傳在脾遍身虛汗似膠珠眼閉不開常若睡發搖

牽抽總不宜

臍風撮口

歌曰小兒臍風名不一胎風鎖肚腸吊疾更有卵疝共五般
皆由濕熱風相擊口吐白沫手足冷唇面紫色風投極吐大
筋青啼哭多撮口不乳四肢直藥用宣利使氣通斬關奪命
丹為急

小兒初生七日患臍風撮口者齒齦上有小泡如粟米狀急
以溫水蘸青軟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥
治撮口 小兒齧臍為風濕所乘或尿在抱裙之內遂成臍
風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣一條 蠍四尾 姜蚕七箇 瞿麥五分

右為末先將鵝毛管吹藥入鼻使噴嚏啼哭為可醫後用薄荷湯調下

斬關奪命丹 治臍風撮口此藥成粒吞下不可調化初生

兒痰盛者可用打痰

膽星 明天麻 白附子 炮各一錢 賦粉 四錢

芭豆去殼研成 全蠍炙 滑石各一錢 蟾酥三分

右為細末米糊丸麻子大茶湯下

小兒安神丸 治小兒夜啼驚怖消痰定喘

茯神去皮 山藥各一兩 膽星一兩 天竺黃 酸棗仁炒

陳皮錢各五 山柰仁姜汁炒 桔梗三錢 甘草炙一錢

辰砂四錢 為末煉蜜丸芡實大每服一丸燈心薄荷湯下

治小兒夜啼

人參 黃連炒各一錢 甘草炙五分 竹葉 二十片

作二貼姜一片水煎服

又方用燈花三顆辰砂少許細研蜜調塗乳上與兒吮之

寒胎寒 臍寒 中寒 寒嘔 寒瀉 寒脹 冷痢 胃寒不食 嘔乳 心腹寒痛 寒積不散 盤腸內痛 費勝疝氣 寒疝夜啼 以上皆寒症

歌曰百日胎寒與臍寒中寒內疝疝同看停傷食積留中脘

吐瀉頻啼乳干吐出不消純下白四肢厥冷夜嘔煎如斯

已上皆寒症萬勿差醫變病端

中湯 治胃寒嘔吐心腹絞痛一應內外寒症

人參 白朮 乾姜 甘草

姜三片棗二枚水煎服○凡胎寒臟寒則手足拳曲面青
白腸鳴口冷常哭身顫或噤口不乳加木香肉桂煨為藥
○凡中寒腹痛疝氣從小腹引至心胃中口吐清水面青
白手足厥冷加吳茱萸小茴香川棟子青皮枳殼○凡寒
吐乳片不消多吐少吐瀉痢青白小腹作痛加木香半夏
嘔甚加丁香○凡脾胃受寒飲食少進作飽不消加丁香
山查○凡寒脹腹大虛膨筋青內痛喜食熱物加大腹皮
檳榔木香○凡貧豚疝氣狀如筆管升上即痛似小腸有

物胃中積寒也加澤瀉乾姜青皮木香○凡嘔乳口角流
涎不消飲食加枳殼藿香○凡寒疝夜啼更盡則伏臥哭
多睡少天明則已腰面額汗眼中無淚面色青白漸入盤
腸加鹽炒茴香吳茱萸○凡盤腸內疝身躬偃氣不舒
暢加硝砂吳茱萸木香沒藥葱白

鈎藤膏 治內吊腹痛

乳香 沒藥各三錢 木香 姜黃各四錢 木鱉子 十二箇

先將木香等三味為末同乳香沒藥研極細拌勻煉蜜成
劑收磁瓶內量兒大小加減煎鈎藤湯化下次服木香散
木香散 治盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川棟子七箇去皮核用色 薑三十五 木香 史君子肉炒

玄胡索 茴香一錢 為末清米飲空心調下量兒大小服

乳頭散 治小兒寒痛夜啼

黃芪 當歸 甘草 赤芍 木香各等分

右為細末塗乳上令兒吮之

吐瀉

歌曰小兒吐瀉何以分傷食冷熱有所因肚熱脚冷不飲食
日晡潮熱往來生面黃肚腹餒酸吐瀉而不化兼臭腥急須
消導香稜劑依方施治能通靈

香稜丸 溫脾消積

川棟子炒 茴香炒 蓬朮各一兩 木香 三稜各五錢

右為末醋糊丸桐子大每服二十九姜湯下

加減五苓散 分理陰陽

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂

姜棗水煎服○吐瀉並作加木香蒼朮藿香○腹痛加煨

芍藥○寒吐寒瀉乳片不消下痢腹痛加煨乾姜枳實○

寒甚者加檳榔草菓○熱吐熱瀉則吐黃水瀉下如筒加

炒黃連黃芩去肉桂○脾胃受濕倍加白朮半夏○吐瀉

久而虛弱加人參白朮山藥○久瀉加訶子肉菓○久吐

加丁香○小便不利加滑石○飲食不進加益智大腹皮

虛脹加蘿蔔子大腹皮○胃膈飽悶加枳殼○胃口作痛
加草薏菴木香山查○飲食不消加枳實○小便自利去
猪苓○夏月暑瀉甚者倍加黃連白扁豆○生痰去肉桂
加橘紅○小腹痛加炒茱萸○胃氣不足加人參炒陳倉
米煨芍藥○宿食不消吐瀉酸醒加山查神麴麥芽枳殼
治小兒吐瀉黃疸

三稜 我木 青皮 陳皮 猪苓 澤瀉

神麴炒 麥芽炒 黃連 茵陳 甘草 白朮

為末姜湯調下

泄中和氣飲 治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與數服

以正其氣

人參去蘆 白朮各一錢 茯苓去皮 橘紅 藿香各八分

甘草炙去皮五分 水二鍾姜三片棗一枚煎七分溫服

助胃膏 治小兒冷氣入胃嘔吐泄瀉

白苳菴十四箇 木香炮二錢 砂仁四十粒 山藥一兩 人參

白朮炒 茯苓去皮各五錢 肉苳菴四箇 麴裹煨 甘豆炙三錢

為末煉蜜丸龍眼大米湯下

和中散 治小兒脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴六兩去粗皮 乾姜炮二兩 甘草炙一兩 白朮炒三兩

每服二錢水一鍾姜三片水煎空心服

小兒吐瀉不止肉豆蔻一枚刺一竅入丁香三分麪包煨熟
去麪為末作一服空心米湯下一方入乳香少許

小兒吐瀉腹痛吐乳以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名萬安
膏米湯化下

小兒夏月吐瀉益元散水調服

吐瀉不治症

唇紅作渴壯如石神脫口開渾不食汗流作喘腹常鳴面色
昏沉齒露里脉洪身熱吐蛔虫魚口鴉聲兼氣急吐瀉不止
常脫肛吃下藥物隨時出有藥吳救定歸真良醫見此先拋
擲○孩兒吐瀉病多時忌黑青丸見兩眉直上髮中如黧色

定知魂去也難回○霍亂吐瀉知何候青黃白色容顏有此
為風熱在脾間髮豎目眩難醫救○豎髮脫形眼不開此是
胸中有毒涎是病定知風搖起口乾唇白更多眠舌上生瘡
休道熱決然不救入黃泉○吐瀉之後發慢驚燥狂喘急氣
腹膨口渴無休眠不淨壯熱強直更呻吟

治小兒遺尿

鷓鴣脰

一具

鷄腸

一具

燒

猪胞

炙焦

右為末每服一錢酒下男用雌女用雄

桂肝丸 治小兒夢中遺尿

官桂

為末

雄鷄肝

等分

搗爛丸

如棗

豈大温湯送下日服

三服

脾胃

歌曰脾屬陰兮胃屬陽一身墻壁位中央土生萬物須和暢
一有虧盈雜病戕或吐或膨時泄瀉或煩或渴不加食常宜
助胃溫脾藥生冷休貪便是良

人參養胃湯

蒼朮炒

白朮炒

厚朴姜汁炒

陳皮

甘草炙

半夏

茯苓去皮

白芍炒

人參各等分

姜三片炒陳倉米百粒水

煎服○嘔吐加藿香木香○瀉加肉蓯○腹脹加枳實大

腹皮○不思飲食加益智仁

加減觀音散

調理脾胃宜常服

白朮炒

人參

白扁豆蒸

茯苓去皮

麥芽炒

山藥

黃芪蜜炙

神麴炒

香附炒各等分

為末每服一錢空心米湯下

啟脾丸 消食消疳補脾助胃最宜小兒可常服

人參

白朮炒

茯苓去皮

山藥

蓮肉去心各

山查去核

神麴炒

陳皮

澤瀉各八錢

麥芽炒淨粉

甘草炙三錢

為末煉蜜丸彈子大每服一九米湯下

健胃丸 小兒常服可無疳積之患

白朮壁土炒

山藥各一兩

茯苓去皮

山查去核

苡仁炒

陳皮

枳實各一兩

枳實炒八錢

木香二錢

神麴炒

人參各五錢

黃連炒三錢

姜汁

為末煉蜜丸龍眼大每服一九米湯下

參朮白朮散

人參

白朮炒

茯苓去皮

甘草炙

山藥

陳皮

蓮肉去心

苡仁炒各等分

為細末每服二錢棗湯調下

理脾却涎散

治小兒口涎多

白朮炒

人參

茯苓

陳皮

黃連炒

藿香

半夏炒

厚朴姜汁炒

枳實炒

甘草炙

姜三片水煎服

疳

歌曰骨熱唇焦五臟疳胸煩盜汗髮毛乾肚高脚細牙床爛
遍體生瘡瀉痢兼好吃土泥生米穀炭煤茶葉任皆食五疳
消積肥兒劑脫甲同投便見安

五疳消積丸

三稜

蓬朮

陳皮各六兩

神麩炒

麥芽炒

青皮

山查去核

蘿蔔子炒各四兩

檳榔

川棟子各二兩

為末麵糊丸龍眼大量兒大小白湯調下

肥兒丸

治疳熱

木香

胡黃連

史君子肉炒各兩

黃連

檳榔

龍膽草酒洗

訶子肉

肉蓯麩包

蕪荑

蘆薈另研

阿魏

良柴胡

右為末猪膽汁打糊丸蘿蔔子大每服四十九燈心湯下
茯苓丸 治心疳因驚而致者

赤茯苓

去皮

茯神

去皮

蘆薈

琥珀

黃連

炒各三錢

鈎藤皮

遠志

肉姜製焙

蝦蟇

各一錢

石菖蒲

一錢

麝香

五分

為末粟米湖九麻子大每服十九薄荷湯下

天麻丸 治肝疴傷目

青黛

黃連

炒

天麻

五靈脂

夜明砂

炒

川芎

蘆薈

龍膽草

防風

蟬脫

去足

麝香

各一錢五分

麝香

五分

為末猪膽汁九麻子大每服十九薄荷湯下

加減肥兒丸 治小兒面黃肌瘦肚大筋青細腹疴瀉脾胃

虛弱等症 脾疴

白朮

五錢米泔浸一宿麩炒

人參

陳皮

神麩

炒

蘆薈

山查肉

黃連

姜炒各五錢

史君子肉

炒二錢五分

檳榔

三錢

肉苳菟

二錢麵包煨

木香

二錢不見火

龍膽草

三錢

右為末荷葉包老米煮飯搗為丸如龍眼大每服一丸清

米湯下或淡姜湯亦可病深積重者加阿魏五錢醋調藥

清肺飲 治肺疴

桑皮

半兩

紫蘇

前胡

防風

赤茯苓

黃芩

當歸

天門冬

桔梗

生地

甘草

各二錢 每服二錢食後水煎服如鼻有蝕瘡或生息肉常

山熊膽泡湯用筆蘸洗

萬應沙方

九

小兒腎疳肢體極瘦遍身瘡疥寒熱時作頭熱脚冷者是也
六味地黄丸主之一方去山茱萸澤瀉茯苓加史君子川
棟子

治小兒疳症肚大筋青極重者用夜明砂微炒為末拌入飯
內與食又用絳紗囊裝一袋佩胸前神効

小兒疳疾六月間取糞蛆不拘多少水漂淨浸一宿撈起置
缸內將蝦蟇數隻與食之俟食蝦蟇盡取蛆再漂極淨務
令不臭新瓦上焙乾炒與兒食或將蛆為末用炒米粉入
砂糖和成餅與食亦可

治疳瀉及休息痢日久不愈取鷄子一枚打破用指大黃

一塊匙內溶以鷄子拌和炒熟空心食之

驚甲散 治疳勞骨蒸大黃○身熱○染肺○內熱○

驚甲九肋行佳沸湯浸洗黃便炙 黃芪蜜炙 白芍炒各生地 酒洗

熟地酒洗 當歸酒洗 人參各五錢 地骨皮五錢 每服二錢煎服

脫甲散 治小兒骨蒸晡熱五疳羸瘦大便閉結發熱發渴

當歸上 紫胡上 龍膽草上 茯苓中 人參中 甘草上

川芎中 麻黃中 知母中 加連鬚葱白水煎服

疳症不治歌

疳積丁奚晡露時腹膨臍突面黃羸吐虫瀉臭頭開解鶴膝
伶仃總莫醫

積

歌曰積因停滯在胸中乳食虛驚氣所鍾腹痛面黃睛作熱
疝羸煩渴瀉流通飲食不化腥酸吐覆卧啞煎兩目紅急用
香稜消積劑莫教日久積成凶

加減流氣飲 治胸膈痞塞氣不升降喘急不安積聚停滯

發熱不思飲食壹氣吞酸或閉或利等症

木香 枳殼 蓬朮 陳皮 青皮 檳榔

三稜 藜蘆 葶藶 大腹皮 砂仁

水煎服○大便不通加大黃○身熱加柴胡○內熱加黃

連○嘔吐加藿香半夏○胃口痛加益智草豆蔻○腹

小便不利加木通蘇梗○傷冷積滯加乾姜肉桂

治小兒食積腹痛

山查肉 神麴 炒 砂仁 炒 麥芽 炒 甘草 炙 陳皮

白朮 炒 青皮 炒 水煎服○寒痛加藿香吳茱萸○有

熱加柴胡

治小兒食積傷肚腹脹痛白酒麴炒同黃連為末水丸服

治小兒食積

蒼朮 浸炒 白豆蔻 同肉豆蔻 麴 肉豆蔻 七錢 山查肉 陳皮

厚朴 姜汁 炒 神麴 炒 益智仁 白朮 炒 各三錢 甘草 八分

為末米糊丸桐子大米湯下

小兒疳積膏藥

水紅花錢二 大黃 朴硝 山梔子 子石灰各一

右用酒醱鷄蛋大一塊同藥搗為膏青綿布攤貼再用湯瓶熱熨手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其驗也

治小兒吐蛔虫以苦練根為君佐以二陳湯煎服冬月吐蛔多是胃寒胃虛錢氏白朮散加丁香二粒服之

一方小兒吐蛔及糞內有蛔以史君子肉炒與食之每用二三枚不可多

腫脹

歌曰小兒腫脹脾家濕臟腑氣虛即成疾或因停積于胃中

或因瘧痢虛而得疳虛痞塊成血虛飲食飢飽皆為積醫人審察盛與衰分氣補脾不可失有積當與漸消之固本正標方是的陰囊無縫掌無紋臍突如李面如墨唇焦口燥脉不來有藥莫救徒用力

分氣飲 治四肢浮腫氣喘短急

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 大腹皮 枳殼

草菓 半夏 蘇子 木瓜 木通 木香

姜棗燈心水煎服○小便不利加猪苓澤瀉○瀉加肉菓

○腹痛加肉桂○胸膈不寬加砂仁厚朴

補脾飲 治脾虛受濕浮腫

白木炒 茯苓 人參 厚朴姜汁炒 陳皮 木通

木瓜 青皮 木香 乾姜 大腹皮 砂仁

姜棗燈心水煎服

治小兒腹脹

蘿蔔子炒 紫蘇梗 乾葛 陳皮各等分

入甘草少許煎服食少加白朮

蘇合香丸 治小兒卒中惡毒心腹脹滿刺痛 方見諸氣門

痢疾 冷白熱赤冷熱不調積下赤白痔瘡白下無度驚青休息痢黑若魚腸 愈而復作瀉痢停積而又下壯大肌瘦大便筆瀝疼痛盡毒痢下紫血

歌曰病因積久多成痢濕熱肥甘滯所為或赤或黃或純白

要分氣血屬何之從前導氣湯先用次第香連養臟施禁口

刮腸當介處平調臟腑治須知

導氣湯 初痢用此推去宿滯後服調理臟腑之劑

枳殼炒 黃連炒 檳榔 甘草 白芍炒 當歸

厚朴姜汁炒 木香 山查 木通 神麴炒

體厚者加大黃芒硝水煎服久痢去檳榔加升麻白朮

香搗餅 治小兒久瀉痢致脾虛脫肛不收冷熱不調赤白

膿血痢疾小腹疼痛或禁口不食日夜無度裡急後重經

久不瘥及疳積下痢泄瀉不止大人亦治

橘紅 青皮 厚朴姜汁炒 青木香 山查肉

茯苓去皮 神麴炒 麥芽炒 白朮炒各 香附炒

三稜 砂仁二兩各蓬木一兩 廣木香 五錢 甘草 二兩炙

人參 二兩 虛者用 為末煉蜜作餅空心米湯下白痢姜飯下湯

加味香連丸 治大人小兒痢疾

黃連 二兩一兩半 姜汁炒 木香 口下 青皮 炒 大黃 酒蒸九次

枳殼 炒 黃芩 炒 香附 一兩各 白芍 二兩 甘草 五錢

右為末姜汁神麴糊為丸桐子大量兒大小白痢姜湯赤

痢苦茶服

一鱗丸 治大人小兒痢疾如神

芭豈百粒去油絹袋盛甘草水煮半日江西淡豈豉一合

木香一兩共為細末人乳丸桐子大味砂為衣每服三丸

赤痢淡姜湯下白痢砂糖湯下赤白姜糖湯下五色痢肚

疼者艾葉湯下

養臟湯 平調臟腑去積溫中

白朮 炒 厚朴 姜汁炒 陳皮 甘草 茯苓 升麻

枳殼 木香 黃連 炒 白芍 炒 蓮肉

姜棗水煎服○純血加黃芩生地當歸地榆○紅痢加地

榆當歸○白痢加乾姜○赤白痢加當歸乾姜○腹痛加

乳香沒藥○久痢加粟殼炙○禁口加石蓮冬米○發熱

加柴胡知母○乾嘔加藿香○渴加五味子麥門冬天花

粉○裡急後重倍加檳榔枳殼木香○胸膈不寬加砂仁

元氣下陷加人參柴胡○小便不利加滑石猪苓澤瀉痢疾不治歌

真門如筒脉洪數發熱不食渴兼作瀉下渾似爛魚腸豈汁屋水相交錯汗出如流喘不休肚腹疼痛陰囊縮或如蹶躄鷄子臭有藥莫救備棺槨

造神麴法

白麴 十斤 蒼耳草 自然汁 野薺 自然汁 青蒿 自然汁

杏仁 四升 去皮尖 赤小豆 三升 煮爛連汁研

三伏內上寅日將藥汁拌麴如造麴法晒乾收用甲寅戊寅庚寅乃三奇日也此日修合名三奇神麴大有神效

瘧

歌曰小兒瘧疾多因合邪正交攻寒熱通截之太早反不良初用青皮飲消息次是截瘧不二湯神功一服如金石

青皮飲 治小兒瘧疾 方見瘧門

瘧疾經驗方

柴胡 有汗一錢 無汗二錢 白朮 二錢 無汗 茯苓 喉皮 半夏 各七分

甘草 三分 炙腹 黃芩 熱多五分 寒多一分 寒熱均七分 參 五分 虛甚一錢

草菓 五分 無食 生姜 寒多五片 熱多一片 薄桂 二分

水二鍾煎八分發前空心服

截瘧不二飲 發四五次然後可截

欖柳 草蓂 知母 貝母 陳皮 枳殼

半夏 常山 烏梅 蒼朮 柴胡

酒一鍾水一鍾姜三片煎半夏露一宿五更溫服渣隔宿

再煎服之

治乳兒瘡疾痞塊

川芎二錢 生地 白芍炒各錢半 陳皮 半夏

黃芩炒各錢一分 甘草三分 鱉甲醋炙為末五分

姜三片水煎臨服入醋炙鱉甲末

瘡疾經久不治歌

在苒經旬瘡不除更加瀉痢悶如痴蒸蒸作熱渾身瘦遍體

青筋鼻似煤飲食未嘗沾口腹頂門下陷項常垂生痰喘急

時加嗽縱有良方不可醫

傷寒 夾驚 夾食

歌曰傷寒六脉皆浮緊虎口三關紅紫影發熱惡寒腰脊強

頭疼吐逆煩悶盛夾驚睡卧時驚搖夾食餓酸噎氣逆無汗

况須用解表太陽過經終不吉

十神湯 此發散風寒之劑冬月用之春用參蘇飲

川芎 白芷 麻黃 陳皮 紫蘇 香附

升麻 乾葛 芍藥 甘草 姜棗煎服○有

汗去麻黃○熱甚加黃芩○咳嗽加半夏杏仁○喉痛加

桔梗前胡○謔語加柴胡黃芩○泄瀉加訶子木香○吐
逆加姜汁半夏○頂癩痛加羌活藁本○便血加棗仁○
便結加枳殼○裡熱盛加大黃

傷風咳嗽

傷風歌曰傷風貪睡面青黃呵欠頻頻熱似湯口吐氣來渾
似火鼻流清涕嗽生痰法當解表消痰嗽加減參蘇飲正當
更有抱龍丸可用霎時風散日回光

咳嗽歌曰咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽
多痰肺傷於熱生壅滯寒則發散熱必消實當瀉腎虛補肺
嗽而不已便成癩痰盛不已驚風至眼眶黑紫如損傷嗽而

有血難醫治疎風豁痰補瀉明欵花膏內生神秘

川芎茶 治大人小兒感冒風寒頭疼鼻塞遍身拘急惡寒

發熱等症

鮮川芎 梗葉切碎如
無用乾者 生姜 切絲 菖蒲 切絲 陳皮 切絲

鮮紫蘇 梗葉切碎
各等分 細茶 與藥相對

五月五日午時拌勻用盒蓋過宿使氣透次日取出焙乾
磁瓶收貯用時以沸湯泡一鍾乘熱薰鼻吸其氣復乘熱
飲之汗出即愈

加減參蘇飲

人參 紫蘇 柴胡 陳皮 甘草 枳殼

前胡 白芷 半夏 乾葛 茯苓 防風

桔梗 姜棗水煎服病虛及胃寒用人參壯實者不

用○似欲發痘者加升麻○肺熱咽不下加黃芩去人參

○痰盛加南星竹瀝○壯熱加黃芩○風盛欲發搐加防

風天麻○項背拘急加獨活○頭痛加川芎細辛○鼻塞

加細辛白芷○初嗽加麻黃杏仁○痰壅加葶藶桑皮○

久嗽加杏仁五味子貝母○吐痰加姜汁○初感冒欲發

散加麻黃蒼朮○肺虛唇白嗽不能接氣加人參糯米阿

膠○春冬感冒盛者加羌活○風寒已表惟熱不退者除

去本方用小柴胡湯

辰砂抱龍丸 治小兒傷風咳嗽痰喘煩渴鼻流清涕驚悸

風熱等症

天竺黃 夫花粉 茯神去皮 明天麻各一兩 膽星二兩

雄黃 防風各五錢 麝香一錢 辰砂五錢 水飛

為細末甘草濃煎汁丸芡實大辰砂為衣燈心薄荷湯下

傷風痰盛紫蘇姜湯下

豁痰湯 治感冒或驚風痰盛用以驅之

半夏 南星 橘紅 紫蘇 黃芩 枳殼

前胡 杏仁 桔梗 水煎入竹瀝姜汁服○風

痰吐涎加防風○結痰加瓜蒌仁○濕痰加白朮○寒痰

嗽喘加麻黃乾姜○食積面黃少食或多食即飢皆胃熱
化為痰吐出黃色有稠粘者加神麴山查麥芽○熱痰是
肺熱不已吐出成塊加山查天花粉

款冬膏 治嗽如神

欬花 紫蘇 杏仁去皮尖炒 桑皮各一兩俱為粗末

烏梅肉一兩蒸過搗爛入前藥和勻晒乾 共研為細末煉蜜調成膏嚥化

咳嗽不治歌

全嬰論嗽皆屬肺不治面青飲水忌燥狂顛陷上氣喘此嗽
逢之俱不治

辛夷膏 治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉一兩洗淨焙乾 細辛 木通 白芷 木香各五錢

杏仁一兩去皮尖研如泥 為細末用杏仁泥羊骨脂各一兩同

諸藥和勻瓦器中熬成膏赤黃色為度取冷入腦麝各五

分拌勻塗顛門上更用少許塗鼻中

惺惺散 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞身重相似傷

人參 白朮 茯苓 甘草炙 白芍炒

天花粉 桔梗各五錢 細辛根半一錢

為末每服二錢姜一片薄荷葉少許煎湯調服

小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少心神恍

惚宜服五苓散

芎黃散 治小兒齒不生

大芎藭 地黃錢各五 山藥 當歸 芍藥

甘草 各錢 為末湯調服并搽齒脚

治小兒龜胸

大黃 錢三 天門冬 心去 百合 木通 杏仁 去皮尖 麩炒

枳殼 炒 桑皮 蜜炙 葶藶 隔布 炒 朴硝 各五錢

為末煉蜜丸 灸實大食後溫湯調下 仍灸兩乳前各一寸

半上兩行三骨間六處各三壯 春夏從下灸起 秋冬從上

灸起 小兒兩目忽然視物不見 俗名雀盲 以鷄羊肝一具不用水

洗不犯鐵器 以竹刀剖開入谷精草一撮 瓦罐內水煮熟

不時食之

熱 胎熱 胎黃 目赤 便澀 便閉 便血 丹毒 胎毒 瘡瘍 咽痛 發頤 重舌 美舌 脾熱 鵝口 以上皆熱症

歌曰小兒生下受胎熱 目閉泡浮大便結 濕熱薰蒸遍體黃

小便淋澁或見血 滿口成疳及赤遊 發頤咽痛重木舌 胎毒

瘡瘍痛莫言 多啼不乳呻吟竭 諸症皆由擁熱為 大連翹飲

不虛設 三黃化毒丹可兼 頓令慈母生歡悅

大連翹飲 治三焦積熱 大小便不利 赤目丹毒 口瘡 重舌

木舌 咽痛 瘡瘍等症

連翹 瞿麥 穗 滑石 牛旁子 車前子 木通

萬氏家抄方 卷五

赤芍 山柰 當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荆芥穗 蝉脫 水煎服 ○胎熱加生地 ○

胎黃加茵陳 ○目赤加黃連 羌活 ○小便澀加猪苓 ○大

便澀加大黃枳殼 ○大便血加地榆槐角枳實 ○小便血

加麥門冬生地石蓮 ○胎毒瘡瘍加升麻生地歸尾 ○丹

毒遍身加犀角黃連 ○發願加羌活白芷 ○咽痛加桔梗

薄荷 ○重舌木舌加黃連升硝犀角 ○弄舌加石羔

生犀散 治骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾潮熱夜有盜汗五心

煩熱等症 生犀角錢二地骨皮 赤芍 柴胡 乾葛 各一兩

甘草錢二 每服三錢水煎食遠服

五福化毒丹 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥頰赤咽乾口舌

生瘡夜卧不寧譫渴頭面身體多生瘡癩

玄參 桔梗錢二 白茯苓錢二 人參 牙硝括

青黛錢各一 甘草錢各七 麝香二厘半

為末煉蜜丸芡實大金銀箔為衣薄荷湯下

鶴頂丹 治小兒積熱及暑月火盛心煩并麻瘡熱症一切

結熱 寒水石假 石膏各二 甘草二錢

為末甘草濃煎汁丸芡實大辰砂為衣薄荷湯下

瀉青丸 治小兒肝經風熱目赤腫痛兼治肝臟實熱尋衣

捨物目直不搖得心熱則搖身反折強直目連劄或目遍

青或臆腑泄諸藥不止脾虛肝盛

當歸 龍膽草 川芎 山梔 大黃煨 羌活

防風各二錢半 為末煉蜜丸芡實大竹葉砂糖湯下

八正散 治小兒心經蘊熱臆腑秘結小便淋瀝

車前子 木通 匾蓄 甘草 大黃煨 瞿麥

滑石 加燈心水煎服

四順清涼膏 治小兒熱結大便不通

芍藥 當歸 酒洗 黃連 姜炒各五錢 生地 酒洗 甘草

大黃酒蒸九次 黃芩炒三錢 為末蜜丸芡實大每服一九白湯下

又方小兒結熱大便不通猪膽汁滴入谷道即通不必服藥

治小兒木舌舌腫硬及重舌

百草霜 芒硝 滑石各等分 為末酒調服

一方小兒重舌用針刺出惡血即愈

治小兒解顱乃母氣虛弱故頭骨開而不合八物湯有熱加

酒炒黃連生甘草子母皆服外用帛束繫以白麩末傅之

釀乳方 解胎中受熱生下面赤眼閉大小便不通不進乳

澤瀉二兩半 猪苓 赤茯苓 天花粉 茵陳 甘草

生地各一兩 每服二錢水一鍾煎半鍾食後乳母捏去宿乳服

治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通不
進乳食啼叫不止

生地 當歸 赤芍 川芎 天花粉

每服五錢水一鍾煎服

小兒初生不飲乳不小便以葱白一寸四破之加乳汁入磁
器內煎灌之立効

蒲黃散 治初生兒大小便下血

生蒲黃 油頭髮燒灰存性 各一錢

為末用生地黄汁或米飲或乳調服

治小兒溺血

蒲黃 生地 生甘草 赤茯苓去皮各等分

水煎髮灰調勻食前服

一方小兒尿血以升麻甘草煎湯調益元散服

三黃丸 治小兒諸熱煎治身黃黃疸血便血

黃芩 黃連去鬚 大黃炒各一錢半

為末滴水丸茶清下三五十丸

地黄湯 治小兒鼻衄

川芎 生地 赤芍 當歸各等分 蒲黃少許煎服

治小兒胃氣熱吃泥

軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 白朮各等分煎服

退黃丸 治小兒黃病喫泥喫磚毛生米炭茶等物

皂礬八兩用麴一斤和作餅蒼朮八兩厚朴八兩姜

陳皮 甘草各八兩川椒七兩去汗

為末紅棗三斤煮熟去皮核胡桃三斤去殼搗成膏和藥

丸桐子大量兒大小用藥多寡酒服

治小兒痰熱骨蒸

二陳湯錢九升麻二錢烏根錢白芍錢各半人參一錢

五味子三十粒三貼姜棗煎服

消毒犀角飲 治小兒七蘊邪熱咽隔不利痰嗽眼赤臉腫

腮項結核遍身風癩疥癩及瘡疹已出未出不能快透

鼠粘子錢微炒四荆芥錢各一防風去蘆五分

一方加黃芩一錢犀角鈔五分如無犀角以升麻代之水

一鍾煎半鍾溫服

十種丹

飛灶丹 從頭頂腫起 石灶丹 從頭上紅腫起用赤小

鬼火丹 從面泡腫起 天火丹 赤點從背起桑皮末干

天灶丹 從兩臂腫黃色水 水丹 從兩脇臂虛腫生鐵磨水

胡火丹 從兩指赤腫乳香 烟火丹 自兩足起有赤白點猪

明漏丹 白 腫處土羊脂塗

白火丹 從髮際 虛腫以指捺之隨手起者是也以陳年

白火丹 香藥炒下無灰酒盪定滾數沸取起服

治丹毒發作恐其入腹一時無藥急以針於紅點處刺出惡血即散一方胎衣瓶中土調敷

治走馬火丹用慎火草搗汁塗之

治天火丹臍腹起者蚯蚓泥炒研細水調傳

治小兒赤痛熱毒鬱結內開發於皮膚赤如痛色宜服生地木通荆芥苦寒帶表之藥外以芒硝濃煎洗芭蕉油塗

金泥膏 治小兒一切無名腫硬爛赤諸般丹瘤熱癰濕爛

大人亦治用陰地上蚯蚓糞朴硝比蚯蚓糞三分之二一

處研細新汲水濃調厚敷患處乾再上

治小兒口糜滿口生瘡者是亦治大人

黃栢

細辛

青鹽

為末噙之吐涎即愈

小兒白屑滿口狀如鷺口用髮纏指頭蘸井花水拭舌如不脫濃煎粟米汁以綿纏筋頭拭之用煨過黃丹搽

小兒牙疳白礬裝入五倍子內燒過為末傳之

真黃散 治小兒走馬疳

鷄肫黃皮油燈上燒存性研細末入黃栢枯礬麝香一字用米泔攪口內傳之

小兒走馬牙疳用婦人溺桶中白垢火煨一錢入銅綠三分

麝香一分半傳之

小兒口疳

萬氏家抄方 卷五

人中白錢二 黃柏錢五 硼砂一錢 銅綠五分 麝香三分

冰片二分 男子髮一錢
一錢 煨存性

為末青布拭口以蘆管吹入涎出再吹

小兒口瘡不能飲食用礬湯浸脚半日以蜜炙黃柏炒姜蚕

為末傳之立進乳而安

治小兒頭瘡

臘猪油半生 雄黃 水銀各等分 研勻洗淨傳之

小兒癩頭瘡以五倍子煎湯洗淨煨鴉鵲糞研細傳之

一方用燒酒擦洗最効

一方用通聖散酒拌除大黃另酒炒共為末再酒拌令乾厚

服一錢水煎服外用紅炭淬長流水熱洗胡荽子伏龍肝

懸龍尾黃連白礬為末油調敷

小兒白禿辣離瘡以石灰窰內燒過紅土整四兩百草霜一

兩膽礬六錢雄黃一兩輕粉二錢榆皮三錢共為末猪膽

汁調搽

小兒頭上甜瘡以松香黃丹飛礬各一兩搗勻綿花子油塗

小兒黃水瘡癬以紅棗去核銅綠為末入棗內煨存性研細

有膿者乾傳無膿者香油調搔破敷之

小兒身面爛瘡

桑油鮮桑木搥碎裝瓶內用一瓶合口 輕粉 雄黃各五

高代家少方 卷五 三六

猪膽 一箇 滑石 一兩 硫黃 五錢 川山甲 十五片 鳳凰退 燒存性 五錢

為末桑油猪膽汁調絹包擦之

小兒面上甜瘡以清明揀過柳枝燒存性一錢銀硃七分共

研再入飛礬一分傳

小兒面上紫塊如錢大或滿面俱有

川山甲 十片 川椒 六日五錢 姜汁 四兩 野大黃根 取汁 四兩

和勻絹包擦

小兒天泡瘡用麩皮炒研末一錢青黛八分研勻井水調傳

小兒耳後蝕瘡以黃連枯礬為末傳之

小兒黑斑紅斑瘡痒癢並用防風通聖散為末酒調下

小兒遍身生瘡膿水不乾以黃柏末加枯礬少許搽之

綿繭散 治小兒遍身疳蝕膿水不乾

空蚕繭 出蛾者 每箇納白礬一分燒過研細乾傳

治吐母瘁

何首烏 藤上 金銀花 上 劉寄奴 中 羊蹄根 中 野菊花 中

煎湯與小兒浴用絹布抹乾以後藥搽之

六黎根 五錢 寒水石 煨二錢五分 瘡上 水少加五分 枯礬 二錢五分 瘡上 水多加五分

銀硃 四分 共為末以猪油熬化稍冷調入藥末絹包搽

不可見生水隔二日再洗再搽

鱧瘡頭膏藥

馬家少

七十七

乳香去油沒藥去油川山甲炙全蠍炙姜蚕炒龍骨各五錢

松香一斤芝蔴油四兩煎好下銅綠一兩入水中攪以綠

為度紅布攤貼

國老散 治癩瘡痘疹疔腫癰疽諸般惡毒及中砒毒困毒

傷寒發狂等症

五月五日選大甘草為末用大竹一段兩頭留節鑽一孔

入甘草以木塞之置糞缸內仍縛石墜至底浸四十九日

取出洗淨以甘草晒乾再研極細如小兒出痘見苗及諸

般惡毒並用糖湯調服

東華解毒膏 治大人小兒無名腫毒諸般惡毒瘡癤癰疽

發背痘毒風毒用紅絹津唾攤貼不見火極為神効

桃枝 柳枝 槐枝 榆皮 桑枝 俱用嫩皮

地骨皮剉碎各五升以長流水一担熬至五分去渣加當歸末四兩燻火熬成膏滴水成珠名五枝膏所用

瀝青淨一斤松香淨半斤乳香一斤沒藥一斤輕粉二錢黃蠟

銅青各二兩血竭二錢麝香一錢安息香五錢黃丹一兩水飛

用川芎大黃白芷各二兩入芝蔴油熬黑焦色去渣春夏

用油四兩秋冬用油六兩如法煎滴水不散次下瀝青松

香黃蠟化開下五枝膏二兩以槐枝攪百餘遍下乳香沒

藥血竭輕粉安息香黃丹再攪百餘遍下麝香銅青再攪

百餘遍滴水內浮似青荷葉為度拔扯二百餘遍浸一宿

取起收貯如貼瘡毒用槐枝葱白煎湯洗過貼之三五日一換

拔生膏 治諸般惡毒瘰癧鼠瘡纒起者點破即愈

血竭 二錢 蟾酥 三錢 麝香 一錢 雄黃 五錢 輕粉 三錢

乳香 二錢 沒藥 二錢

右用蕎麥稗燒灰一斗二升淋汁入九碗文武火煎至三碗取碗半收貯添用以碗半置磁器內候溫將藥研細末入汁內桑柰槐枝攪勻入好石灰一升再攪取起冷過宿磁瓶盛之凡諸惡瘡毒點頭上一日二次次日又一次瘡頭破血水出即愈仍貼東華解毒膏如日久藥乾將留起

灰汁加入

治外腎腫大

木通 甘草 黃連 當歸 黃芩

水煎服用紫蘇莖葉為末乾敷如爛以香油調鵝翎刷又用青荷葉包上

治小兒臍中汁出并痛用枯礬或黃柏末傅臍不乾以伏龍

肝塗或枯礬龍骨等分傅之

痘疹

辨痘疹熱

頭與肢節疼痛無時者時疫熱也面赤汗出鼻流清涕者傷

風熱也午後發熱頭與肚熱右額有紋者傷食熱也乍寒乍
熱呵欠煩悶驚悸咳嗽噴兩腮赤紅鼈涼耳冷者痘疹熱
也渾身壯熱妄言鬼神口鼻衄血驚搐不止幾死而復生痘
疹實熱在內也既辨認痘疹之熱與諸熱不同又須審其勢
之輕重輕則發散重則疎利首尾俱不可汗下蓋汗下二說
古人所深戒也

痘疹五臟所屬

肝為水泡初見標主淡出其痘細如蠶而色紅肺為膿泡初見
標主涕出其痘平大而色白心為斑初見標其痘尖細而色
赤脾為疹初見標三五成群黃赤與皮色相同腎為倒靨其

色黑初出之時五臟之症皆見者以熱併動於五臟也及已
出乃得歸一臟者以一臟受穢多而毒氣盛也亦有兩症三
症同出者所受同而併發也其瘡少欲發時呵欠煩悶者肝
也時發驚搐者心也乍涼乍熱手足冷者脾也兩頰赤而噴
嚏者肺也惟腎無症但鼈冷耳冷是也鼈耳俱屬腎腎居北
方主冷故也腎雖無症而其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸
腎也此由不慎風寒及內虛所致瘡黑陷耳鼈反熱者逆也
辨痘輕重

初見苗時用手揣摩其瘡勢宜堅而尖不宜軟而塌三次出
者輕一齊出者重臍突去處不宜有頭面心竅不宜多大小

不一等根窠紅活尖頭光澤者最輕平頭者半輕半重陷頂者極重又有出輕而變重出重而變輕顧調養避忌之何如耳此於氣血上見形勢則輕重可知矣

凡看痘輕重未會出點之先先看兩目不腫肉不紅無淡清淨其痘出來必輕極忌一塊五六箇極忌嘴邊出起乃脾家痘十不救一痘有大小不一等乃氣血之所由分也人多有不知一種小痘以為不起用藥發之誤矣凡痘看頭不看身醫頭不管身只要臉上頭上膿足四肢不必惧至落靨時靨如琥珀厚而紅者再無後患倘落下如帛薄如白荳殼者必

有後患或有服寒涼藥過多或飲水過多靨白者尚可治只以脾胃健為上能進飲食痘雖犯症終不死孩子不滿一歲一身一頭無縫者決不必醫用藥之法須先去其雜症如因感冒寒邪起者則散其寒因驚起者則定其驚因傷食者消其食雜症既去然後用補血補氣藥氣血充足自然成膿結痂矣又有痘出稀疎而兒體只是不快者必生內癍當看其指甲有青紫色便是急用化癍湯藥治之

輕症不可遽發

初出三日以後七日以前如痘色紅潤光澤尖凸者雖不服藥亦愈俗人無知專用煎炒火煨毒物及人牙川山甲之類

發之禍患無窮矣所當切戒若八九日痘色灰白平塌不起者方可用發藥

痘疹日期

痘出三日至足心為齊三日長肥滿三日成膿窠三日上蠟色結痂首尾十二日可保平安此其大約設使氣候乖違瘡勢沉重則又難定其期也

輕痘歌

熟緩神清痘少稀根窠紅活出參差四肢溫暖無寒熱乳食如常渴渴除太陽面頰俱光澤手足纒纒圓似珠更兼腰項當心少但宜調護不須醫

重痘歌

初熱一日即便出稠密鮮紅減飲食泄瀉煩渴頭面多紅班夾疹二便澁平塌灰白欠光明疔毒膿瘡水流濕若此重症須預防莫得臨時有疎失

不治痘

熱極腰疼發一出昏睡沉沉不納食一齊湧出如蚕種紅紫蓋班兼陷黑邪視皮浮痘若無頂似塵鋪兼火刺面唇先腫目無神脚冷如水漸過膝無分皮肉一般紅聲啞唇焦言不出水泡痒塌並空瘡牙疳臭爛聞不浣寒戰咬牙痘後驚醫若竹衣便膿血此皆死症不須醫總遇神仙難着力

避忌

正當痘疹之時謹司門戶恐被風寒所襲嚴禁房事恐為穢氣所乘月婦經水庖厨煎燂生畜糞穢及狐臭觸忤一切忌之須常燒芸檀蒼朮小棗之類及掛葫荑浸醋炭以逼其氣至若月經狐臭設在父母幼子時刻不可離將如之何必常加澡浴每易新衣不使氣侵其膚可也如有犯者當服托裏散肉桂隨意加減之

瘡疹痘辨

小兒壯熟有紅班如錦紋或如蚊咬者謂之瘡子有小泡如痘而微白色易靨者謂之水痘北人謂之疹子初起細小漸

漸紅胖貫膿如豆結痂謂之痘子古人謂之豌豆瘡痘與疹發自胎毒故今聯屬言之曰痘疹若癩症則傷寒內傷熱病皆能致此不專係於胎毒也醫者須分別之

痘初出或未出以絲瓜近蒂三寸連皮燒存性為末砂糖調服或入硃砂蜜調服之多者可少少者可無

痘疹奇方 纔覺發熱服之不出雖出必輕見苗并收早者亦可服

復生散 明淨硃砂四兩絹袋盛之當歸川芎升麻甘草各六兩用砂鍋取東流水七大碗入芎歸升麻甘草煎三大碗去渣將硃砂袋以一小竹橫閣鍋上離底一指許傾前

藥汁浸袋即止旋添煮之水盡為度焙乾為極細末聽用引經散 糯米五合淘洗淨瀝乾盪泥為餅包末在內入火煨通紅取出冷定揀黃色存性者為極細末聽用 小兒一歲用復生散一分引經散一分蜜一匙米湯半盞好酒三匙調服

稀痘丹

黑荳炒 姜蚕直者 硃砂水飛 白荳衣 苦絲瓜燒存性

木通 甘草節 翹子 百節菖蒲各等分

為末砂糖丸龍眼大金箔為衣甘草湯下春分秋分日製春分秋分日服

又方臘月八日用活兔一隻酒菓祭告藥王神畢殺取兔血以蕎麥麵和為紅丸取兔腦以蕎麥麵和為白丸小兒週歲內以乳汁調服紅白各三丸身發紅班為驗即不出痘縱出亦稀

兔血散 發熱將出時服之解毒稀痘

硃砂 雄黃 細茶 乾葛各五錢

臘月兔血與藥相停 拌勻為細末每服一分茶送下

痘將出時必發熱鼻尖耳尖冷方是便服升麻葛根糖毬甘草節鼠粘子之類其出必疎初熱以鼠粘子為末密調貼臚門上免患眼但見紅點便忌升麻葛根湯恐發表虛

須分氣虛血虛補之氣虛用參芪白朮血虛用四物湯血熱
加酒炒芩連丹皮等解毒藥出不快者加味四聖散紫蘇
飲子紫草木香湯紫草木通湯或快班散丝瓜湯有氣實
痰鬱而發不出者川芎防風升麻乾葛芍藥前胡紅花蟬
脫之類

初起自汗不足慮乃濕熱薰蒸而然也

出太甚者人參敗毒散紅紫者犀角地黃湯初出如胸前多
急須解毒藥加糖棗又有食少者加白朮

色白屬氣虛補氣為主初出色白者太虛宜大補氣血人參
白朮黃芪當歸川芎升麻甘草木香之類一云大便滑泄

加訶子肉菓

色黑屬血熱涼血為主初出色黑者大熱便宜解毒芩連黃
栝鼠粘子紫草葛根荆芥防風甘草之類黑為北方之色
屬水熱甚而反煎水化制之故色黑經所謂元則害承乃
制也且無熱則色黑人所共曉錢氏論中謂冬月盛寒歸
腎變黑其義安在何前人未之及也

色黑涼血色白補氣有中黑陷外白起者則相兼而治
瘡濕者宜補脾燥濕肌表間熱用風藥白芷防風之類
初起渴而飲水至後齰不齊宜益元散之類
將成就而色淡者宜助血藥芎歸之類補血為主將成就而

色紫者宜涼血解毒連丹皮連翹之類

解毒用丝瓜升麻酒芍藥甘草山查黑豆犀角亦小豆

吐瀉少食為裡虛不吐瀉能食為裡實裡實而補則結癰毒

黑陷倒靨灰白為表虛紅活綻凸為表實表實而用表藥則

必致潰爛不結痂

黑陷倒靨灰白者用燒人糞蜜水調服

被外惡氣所傷而倒靨者人參白朮黃芪稍連翹甘草稍白

芷當歸川芎木香

虛痒以實表之劑加涼血藥實痒如大便不通者以大黃寒

涼之劑少許下其結糞

活命紫金丹 治發不出隱於皮內遍身紫赤癩點或血熱

煩燥顛狂至死者服之即活癩即散痘起漿滿永保無虞

但十二三日氣敗無漿者不治如痘未發之先服之能使

稀朗絕無後患

當歸 甘草 木荆芥 荔枝 二兩去核用肉

用瓦罐四箇分作四處每處入藥一味再入辰砂細末五

錢加清水八分慢火煮一晝夜徐徐添水勿致枯乾煮畢

去藥止用辰砂焙乾勻研極細入煨天靈蓋末三錢飛麵

二錢兔血丸藁豈大量兒大小十歲已上三十九七八歲

二十九三四歲十五九白酒漿調服此藥必臘月辰日製

外以黃蠟為衣則不壞

小兒痘毒臘月內取人猫猪犬糞乾者入砂罐火煨為雪白粉加麝香少許每服五分蜜水調下

小兒痘疹餘毒出膿時用脫下痘屬同舊綿花燒存性敷上

最効不用貼膏藥亦不再發別處

痘毒入眼谷睛草為末猪肝不時蘸服

痘瘡抓破膿水不乾用多年墻頭上爛草為末搽之

麻疹辨疑賦

麻疹胎毒多帶時行氣候暄熱傳染而成其發也與痘相類其變也比痘匪輕標屬于陽本屬于陰毒盛于脾熱流于心

臟腑之傷肺則尤甚始終之變腎則無症初然發熱有類傷

寒眼胞困倦而難起鼻流清涕而不乾咳嗽少食煩渴難安

邪目視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其形善

疥其色若丹出見三日漸沒為安隨出隨沒喘急須防根窠

若腫若疹而兼癰皮膚如赤若疹尤夾斑似錦而明此藥

而愈如煤而黑若百無一痊瘡疹既出調理甚難坐臥發煖

飲食宜淡咳嗽涎沫不禁酸醎忽生喘急肺受風寒心脾火

灼口舌生瘡肺胃蘊熱津液長乾有此變症治法不同微汗

解毒熱勢少凶二便清調氣行無壅膝裡拂爵若即宜發散

腸胃秘結若急與疎通鼻衄者不必憂治邪從衄解汗者

不必遽止毒以汗鬆麻後多痢兮熱毒移于大腸咳嗽喉痛
兮痰氣滯于心胸口渴心煩法在生津養血飲食減少治宜
調胃和中餘症無常臨期變通此則麻之大旨妙用存乎一
發熱之時既明麻疹有出不快者用麻黃湯羌活湯消
毒散發散解毒外以羌萎酒糟蒸熱擦之自頭上至足為
齊頭面多者佳

凡看麻疹多于耳後項上腰眼先見其頂大而不長其形小
而勻淨既出之時如紫不紅乾燥暗晦乃火盛毒熾宜用六
一散解之四物湯換生地加柴胡見風浸早未清爽者宜

消毒飲加發散藥有出三日不沒者乃內有實熱宜四物
湯加清利之劑

麻後瀉痢者乃積熱移於大腸宜四苓散加木通苓連白芍
或豈菴丸香連丸之類

麻後痰嗽不止四物合二陳加瓜蒌桔梗五味渴加麥門冬
枳殼喘加蘇子桑皮

麻後牙疳紅腫者清胃湯合甘桔湯加牛蒡子荆芥玄參胃
爛者不治

孕婦出麻以四物湯加白朮條芩艾葉砂仁安胎清熱為主
麻疹正出之時不進飲食者但得麻色淡紅潤澤亦無害乃

熱毒未解內蘊實熱故不食耳麻退不食者四物湯加神
麩砂仁

出疹疹時大忌暈腥生冷宜避風寒水濕

麻疹輕重不治訣

或熱或退五六日而後出者輕淡紅滋潤頭面勻淨而多者
輕發透三日漸沒者輕頭面不出者重紅紫暗燥者重咽喉
腫痛不食者重冒風沒早者重移熱大腸變痢者重黑暗乾
枯一出即沒者不治鼻扇口張目無神者不治利青糞者不
治氣喘心前吸者不治麻後牙疳臭爛者不治

萬邦孚曰予苦艱於嗣故于小方脉尤留意焉既集痘疹方

論及小兒脉訣雜症凡五卷付之梓人矣茲重刻家抄方有

小兒一門先大父之所遺不敢廢也乃復以續得方訣分別

門類益加詳焉庶幾乎我祖活幼廣嗣之念為不孤耳

邦孚又曰今人之艱於嗣者得一子父母不勝其喜每于滿
月百日週歲即會親友殺生設席慶賀及稍有疾病輒又殺
生祈禱孰知爾子之命固命也畜類獨非命乎爾子惟恐其
有痛楚也殺畜類以祈神宴會彼獨無痛楚乎天雖不言必
不默祐爾於冥冥之中矣茲小兒方中若疳症用蝦蟇糞組
稀痘用兔血兔腦發痘用雄鷄頭天靈蓋等項及為子設席
殺生祈禱之類俱宜戒之

急救諸方

自縊死自旦至暮但心下微溫雖一日已上可活急抱起死者使繩寬解去繩切不可割斷微微燃正喉嚨放倒卧用被蓋急用竹管吹其兩耳一人急牽其髮不放手就用脚踏其兩肩一人摩其背及屈伸其手足摩捋之少活即以粥飲與之此法救人無不活者

人溺水死先以刀斡開口橫放筋一隻令其牙齦之使可出水又急解去死人心帶艾灸臍中即活

冬月墮水凍死四肢冷口不能言只有微氣者不可便以火炙用布袋盛熱灰熨心頭冷即換待眼開用溫酒或米飲

灌之

伏暑死者不可使冷冷即死用溫湯常摩洗其心腹間如路途急切用路上熟土鋪腹臍間令人更尿其臍中即活服鹽滷將死者急燒滾水以燈油脚淬在湯內待通口時灌下滿喉嚨即吐矣吐淨愈

卒中風不省人事多因痰壅用白礬二錢生研為末生姜自然汁調斡開口灌下其涎或吐或化下便醒

華陀救中忤中惡鬼氣用犀角末五錢麝香辰砂各二錢半每服二錢井水調下如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝葉湯調灌又無雄黃用着身上多時久遺汗衣或久着內

襯衣婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調下
又方卒中惡不省人事用韭菜研汁入鼻中

華陀急救鬼魘鬼打

凡初到客舍館驛及久無人居冷房睡中覺鬼物魘打但
其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魘不救即死

牛黃

雄黃

錢各一辰砂

五分

右研為末和勻每挑一錢床下燒次挑一錢酒調灌之如
無前藥用桃柳枝束邊者各折七寸煎湯灌下又無桃柳
枝用灶心土搥碎末服一錢并水調灌更挑半指甲許吹
入鼻中更用艾灸人中次并灸兩腳大拇指內離甲一韭

葉各灸七壯

睡卧中不省用韭菜汁滴入鼻冬月用韭根搗汁灌之

華陀治脫陽

大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人

事或傷寒新瘥誤與婦人交其證小腹緊痛外腎搐縮面
黑氣喘冷汗自出亦是脫陽須臾不救先以葱白數莖炒
令熱熨臍下次用後藥

附子

一枚重一兩剉八片

白朮

乾姜

各半兩

木香

二錢半

右四味各研末水二碗煎八分放冷灌服瀉更又進一服
合滓併服如無前藥用桂枝二兩好酒二升煎一升分作
二分灌之又無桂用葱白連鬚三七根沙盆內研細用酒

五升煮至二升分作二服灌之陽氣即回先用炒鹽熨臍
下氣海勿令氣冷又無葱白用生姜二七片依前法服
紫金錠 治自縊落水死鬼迷驚死未經隔宿心頭溫者並
宜冷水磨灌下良久即甦

治從高墜下瘀血沖心欲死用豈豉一大盞水二碗煎三沸
去滓服若便覺氣絕不能言取藥不及急擘開口以熱小
便灌之

治針失熱下肚不得出者將蚕豆煮熟同韭菜吃下針即同
菜大便出

治攪腸沙發即腹痛難忍者陰沙腹痛手足冷看其身卜紅

點以燈草蘸油點火燒之陽沙腹痛手暖以針刺其十指
背近爪甲處一分半許血出即安仍先自兩臂捋下其惡
血令聚指頭血即出為好

又痛不可忍須臾能令人死古方乾霍亂急用鹽一兩熟湯
調灌入口中鹽氣到腹即定又將石沙炒令赤色冷水淬
之良久澄清水一二合服

凡壓死縊死溺死斃死及產後暈絕用半夏一味為末如豆
大吹入鼻中須臾即活

治人九竅四肢指岐間皆血濺出此暴驚所致乘患人勿知
忽以井花水猛噴其面即止此法又治衄血如神

解諸毒

解砒毒早禾稗燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一碗毒下利
即安又方用白扁豆末新汲水調下華陀又用黑鯽四兩
磨水一碗灌之

中諸毒死只要心間煖不妨乃熱物犯之用防風搗冷水服

解諸藥毒用甘草黑豈淡竹葉等分剉碎水一碗煎服

解巴豈毒煮黃連汁飲

解附子川烏天雄斑蝥毒煮大小黑豈汁飲

解食河豚毒倉卒無藥急以清油多灌之吐出毒物即愈

紫金錠 治凡中蠱毒狐狸鼠莽惡菌河豚毒死牛馬羊肉

毒諸毒飲食毒草木鳥獸毒一切俱用薄荷湯或凉水服

治刺毛虫疼 用蚯蚓泥乾搽濕者又治胡蜂叮

解毒丸 解世間不測一切毒

山豈根 山茨菰 菜豈粉各三兩 板藍根即大青 土馬棕

黃藥草 續隨子 五倍子 紫河車草 木通

盆硝 藿香 薄荷 貫仲 石膏

姜蚕 乾葛 雄黃 百草煎各二兩 茜草根

大黃 辰砂各一兩 麝香五錢 甘草

右為細末蒸餅為丸彈子大以螺青三兩一半和藥一半
為衣每服半丸用生姜汁和蜜水化下

一覺腹中不快即以生薑試之入口不醒如甜乃中毒也急以升麻濃煎湯連飲一二碗以手探之吐即愈矣若多飲鹽水吐之亦好

解一切毒緊急無藥取香油飲之無傷

祝由科 禁蝎併蝎螫呪法

呪曰 玉女傳仙攝 執斬蚺蜥滅

右知有蝎螫之人來求治者於蝎螫處望而取氣一口默念七遍怒着作法吹蝎處其痛即止用法之人忌五厭肉扁鵲華陀察聲色定死生要訣
病人五臟已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謔語者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者至期而死

病人面黃目赤不死赤如衄血者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面黃目黑者不死黑如苔者死

病人面黑目青者不死

病人面目俱黃者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日死是謂亂經飲酒常風邪入胃
經膽氣妄泄目則為青雖天救亦不可生

病人面赤目白者十日死憂恚思心氣內索面色反好急

棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白八日死腎氣絕

病人面青目白者五日死

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人目無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目及顴頰赤者死在五日中午

病人黑色出於額上髮際鼻脊兩顴上者亦死在五日中午

病人黑色出天中下至上顴上者死

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中午

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑直視惡風者死

病人面黑唇青面青唇黑者俱死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不回直視者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目眶陷者死

病人眉絲傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人卧遺尿不覺者死及尸臭者不可治

諸病灸法

陰症傷寒小腹痛十指青六脉俱無此必死症灸法離臍之

上下左右各一寸各灸五壯又以線量病人一脚底長即

以所量線從兩脚後跟起上量至小腿線盡處以指按入

爪肉陷中是穴用墨點記各灸三壯即氣絕者猶能回生

又傷寒陰毒四肢厥冷脉微欲絕囊縮遺尿腹痛腹滿腸鳴

灸氣海石門關元三穴五七壯當臍中為神關下一寸為陰文一寸五分為氣海二寸石門三寸為關元

哮喘臆中一穴七壯在兩乳中間乳根二穴五壯乳根下一寸六分膻府

二穴二七壯在璇璣旁一寸五分每邊各開一寸五分為膻府是璇璣穴

鹽醋哮喘兩手小指頭端各灸七壯一云合灸之

喘灸璇璣一穴二七壯氣海一穴七壯

飲食不化脾胃痛灸中脘一穴七壯在臍上四寸氣海七壯

心疼灸上脘一穴七壯在臍上五寸大陵二穴七壯在掌後兩筋陷

腹痛灸中脘一穴七壯足三里二穴七壯三里在膝下三寸兩筋間

嘔吐不食灸中脘七壯氣海七壯天樞二穴七壯天樞在臍旁各開二寸

癯亂吐瀉灸中脘七壯氣海七壯

吐瀉日久垂死者灸天樞二穴七壯氣海一穴七壯

泄瀉裏急後重灸下脘一穴七壯在臍上二寸天樞二穴七壯

痞塊不散心中悶痛灸大陵二穴中脘一穴三陰交二穴各

七壯三陰交在踝上三寸

腹中寒痛泄瀉不止灸中脘一穴天樞二穴關元一穴三陰

交二穴各七壯

諸癆症已深難治者於癸亥日三更初令病人平卧以筋於

兩傍腰眼點兩穴各灸七壯

中風六脉微遲手足厥冷痰涎壅盛聲如拽鋸服藥不効者

於氣海丹田二穴多灸之

腰疼灸對臍一穴七壯立愈或灸腎腧二穴各七壯對臍各開一寸五分

喉及眼目疼痛灸合谷二穴各七壯在虎口兩指岐骨間

水腫灸分水穴七壯臍上一寸氣海七壯臍中心兩旁各開一寸

五分七壯

鷄爪風手足指彎束疼痛灸左右膝骨兩旁小窩共四穴各

三壯

諸弱症灸膏肓膈穴各七壯以指揣頸後脊骨一節至五節止以墨點之依脊骨向下量四寸至七節又點之却兩邊斜量向上各五寸以為左右

婦人氣血不足子宮虛冷不能成孕灸子宮三穴各七壯揣

次中高骨以墨記之用草心一條從墨記至臍中折斷摺作七分以四分量臍上灸之補血三分量臍下灸之補氣仍以臍下三寸折半正子宮穴灸之溫煖精氣受孕之所

氣弱症灸法 令患者正身去衣兩手伸開用粗麻線一條以兩中指捻線頭挺直使一人擎住勿動比數停當然後將此線對摺齊不可長短束在項中掛下背心線止處是穴以墨點記念呪灸之

呪曰八法神火不可輕流傳萬古顯神功包含天地陰陽一理治病靈功四海聞神火向天天開向地地裂向山山崩向海海竭向人病除向鬼鬼滅火行正氣火除邪氣火除四時不正之氣神火到處百病消散血氣通靈吾奉九天玄女急急如律令攝 須齋戒至誠灸之神驗如不至誠無効

無効

鬼邪迷將患者兩手大拇指相並以綿線縛住當甲肉相接

處騎縫置艾四處皆着火灸之若一處不着火雖灸弗効

此名鬼哭穴亦治五癩呆癡及傷寒發狂

尸厥不醒灸百會穴七七壯臍下氣海丹田二穴各三百壯

身温而甦為止

夢魘鬼擊人中穴灸七壯并灸兩脚大姆指端離爪甲側非
葉許各七壯此名足鬼眼五癩痲呆及傷寒發狂灸之皆
効

中風灸丹田氣海法在前又有於臍中一穴名神闕穴先用
細鹽填入上加艾炷灸至百壯即甦多灸更妙若灸至三
五百壯不惟愈疾亦且永年若灸少則時下雖或暫瘳復
恐復發難救其中風而口眼歪斜者如歪向右是左邊脉
中風而緩也宜灸左喎陷中二七壯喎向左是右邊脉中
風而緩也宜灸右喎陷中二七壯艾炷只如麥粒大若中

而口開手撒眼合遺尿吐沫直眦喉聲如鼾肉脫筋痛髮
直頭搖面赤如糝汗珠如綴者必死勿灸此又是驗過一
法

撮口臍風以小艾炷隔蒜灸臍中候口中有艾氣即可得生
又法臍風若成必有青筋一道上行至臍而生兩岔宜灸
筋頭三壯截住若見兩岔即灸兩岔筋頭各三壯十活八
九否則上行攻心而死矣

慢驚風急于兩脚面陷中動處乃太衝脉也灸五壯或七壯
又灸百會穴五七壯亦有得生者其穴直取以前後髮際
折中橫取以兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是如

有雙旋及旋毛不正者不可為准艾炷僅如麥粒大灸後
仍以醒脾散等藥調補收功

鼻衄不止多至升斗連口並出者名腦衄諸藥不効急灸上
星一穴七七壯即止永不發或灸顛會一穴効亦如之上
星穴在鼻直上入髮際一寸顛會穴在上星後一寸各陷
中可容豆者是又有于項後髮際兩筋間宛中穴灸三壯
立止蓋血自此入腦注鼻中故灸此立應其取前後髮際
穴前在兩眉中直上三寸後在大椎直上三寸是穴若尋
常鼻衄不必艾灸只于手之中指下節以線繫繫左衄紫
一左指右衄紫右指兩孔俱衄則兩手並紫自止

鼻塞不聞香臭名曰鼻淵灸顛會穴二七壯至七七壯止如
未應灸至四日漸退七日頓愈或灸上星穴亦効

齒痛隨所患左右肩尖微近後骨中縫少舉臂取之當骨解
陷中灸五壯永不發間有灸之而項或大痛者良久自定
不必疑

咳逆發餽灸穴在乳下一指許約六分正與乳相直骨間陷
中婦人即屈乳頭度之乳頭齊處是穴或云即乳房下起
肉處陷中用艾炷如小豆大灸三壯或七壯男灸左女灸
右只一處灸火到咳餽即定如灸不定者不可治矣

瘰癧灸法以手仰置肩上微舉肘取肘骨尖上是穴即肘髻

也隨所患處左即灸左右即灸右艾炷如箸頭大三壯即愈如復作再灸不過三次永絕根亦有兩肘尖并兩肩尖即肘髻與肩髻穴四處並灸者此治療之秘法也或有用隔蒜灸法先從後發核上灸起至初發母核而止多灸自効又有用蝦蟇一個去腸置癰上用艾照癰大小為炷隔蝦蟇皮灸七壯或十四壯熱氣透肉方住亦從後發核起至初發核止如蝦蟇皮焦移不焦處于癰上灸之有身面生癰瘡者當癰灸三壯即消亦有止灸一壯以水滴之而自去者癰癰灸後用牙皂七個姜蚕七條瓜蒌一個連皮子切碎五味子一歲一粒水二鍾煎熟加生大黃末伍錢

虛人三錢入藥汁內攪勻服只一劑百試百効後服六味地黃丸以滋腎水生肝血為善

積聚成痞于十三椎下當中點墨為記墨之兩傍各開三寸半以指揣摸自有動處即點穴灸之大約穴與臍平多灸左邊或左右俱灸或患左灸右患右灸左者亦効

又一灸痞法用破日今患人晨起弗飲食來就灸一入門檻內即覆睡地上將患人男左女右手以草莖量其掌後橫紋至中指根為則後將此草從尾巖骨尖直上貼骨比量草盡處是穴墨筆點記乃取七枝艾葉七人揉熟于患人睡處頭前地上擺大壯如工字樣。又于七壯之上每

壯取其艾尖為一小壯以灸病人穴上餘艾即一齊灸地
灸畢至日將沒時方許喫粥忌食生冷七日是日但換門
檻可灸數人艾灰及患人身上灰土俱掃送十字路口棄
之往來俱不可回顧此法不拘老幼俱可治惟灸瘡不發
者難愈

婦人橫逆難產危在頃刻者急于本婦右脚小指頭尖灸三
壯艾炷如小麥粒大下火即產如神

腰重而痛不可轉側冷痺筋攣不可屈伸者只灸曲踈兩紋
頭左右四處各三壯每灸一脚二火齊下艾火到肉初覺
一處痛用二人于兩邊一齊吹火至滅午時着艾至戌亥時

臟腑自動一兩行或轉動如雷聲其疾立愈此神仙灸法
妙不可言

痰瘡積塊只于第十一椎下兩傍相去各一寸五分灸七壯
即止此乃脾腧二穴也不但止瘡有泄痢体重痰癖積聚
灸之悉効

霍亂吐瀉四肢厥冷脉沉欲絕者又乾霍亂俗名攪腸沙者
死在須臾急用細白鹽填滿臍中以艾灸臍上七壯患者
立甦

噎膈翻胃灸法以男左女右手拿棍一條直伸其手拄杖在
地手與肩平其肩上有自有一窩名肩井穴灸三壯十愈八

陰症腹痛面色青慘或口禁失音四肢厥冷或大吐大瀉脈微欲絕痛極頻危者于臍下一寸五分氣海穴二寸丹田穴三寸關元穴各灸二七壯即愈如玉莖縮入死在須臾者將莖捉定用艾炷如菉豆大於龜頭馬口灸三壯其莖即出若臍下忽大痛人中黑色者多死灸如上法可生倘灸而不汗不溫不省者亦死

腸風便血量臍心與脊骨相平于脊骨上灸七壯即止如再發再灸七壯永不發然須按脊骨高突之處痠疼者是穴方可于上灸之至于吐血衄血百治不止者灸即除根一

切血症皆可灸

夢遺精滑于十四椎下兩傍相去各一寸五分與臍平處以指按之痠疼者是名腎腧穴灸以患者年紀為壯數立効又瀉脫肛灸百會穴數十壯即愈又有洞泄寒中一症灸分水穴一百餘壯愈

疝氣偏墜令患者合口用淨草一莖橫量其口以齊兩角為一則摺折再照此加以二則共是三則屈成三角△以一角安臍中心兩角安臍兩旁當兩角處是穴左患灸右右患灸左左右俱患兩角俱灸艾炷如麥粒大灸十四壯或三七壯即安又法于關元穴兩傍相去各三寸青脉上灸

七壯即愈

臍痛瀉溇或男婦泄利日久水腫膨脹腸中雷鳴與小兒奶利不絕者俱灸臍乳中神闕一穴三七壯即愈又一人年逾半百左手魚力亦灸此穴百壯而力頓生

肛門外痔先以槐柳枝煎湯洗過後用壯盛男子篋下頭垢捻成小餅約厚一分置痔上又用獨蒜切片如錢厚置頭垢上灸二七壯或三七壯無不消散又法以生姜切薄片置痔上痛處用艾火于姜上灸三壯黃水即出而散若有兩三個者過三五日照依前法逐一灸之俱驗有人患痔如胡瓜貫于腸頭其熱如火用槐柳枝煎湯洗過于患上

灸三五壯覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血穢并出而安便毒用薄篋一條隨其所患左右手量中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指尖肉盡處為則截斷却將此篋于手腕橫紋量起引篋向臂當中篋盡處是穴用艾炷如麥粒大灸三壯腫散痛止即安如少年患此與下疳者後多變為楊梅瘡若于初起一瘡且痛且痒處灸三五壯去其瘡母即不再發屢驗

痘疔隔蒜灸之若毒盛不知痛者不用隔蒜就當着肉灸之務要痛者灸至不痛不痛者灸至痛若灸後瘡頭紅腫發焮仍挑出毒血繼以艾火尤好如或挑破而不痛不出血

或吮出血而吐于水中色黑者不治痘癘初起未成膿時
即于毒上隔蒜灸之亦可消散

破傷風用胡桃壳半邊挖空將野外乾人糞填滿仍以榆白
皮一片刺十餘孔掩壳之口合在傷處以大艾炷于壳上
灸二七壯偏身汗出其人大困即愈其風犬咬傷亦照此
法灸之或着肉灸五七壯亦可一方用白芷蟬脫等分為
末黃酒調下外以槐白皮置傷處灸之孫真人曰春末夏
初狗多發狂被其咬者無出于灸其法只就咬處牙痕上
灸之一日灸三壯灸至一百一十日乃止宜常食韭菜永
不再發

瘡久成漏用大附子以溫水泡透切作二三分厚片置漏孔
上以艾灸之隔二三日再灸不三五次自然肌肉長滿亦
有用麥麩硫黃大蒜三物搗爛捻作三分厚餅子置患處
灸三七壯每三壯一易餅子四五日後再灸一次無弗效
者又有用蟪螬虫剪去兩頭置瘡口以艾灸七壯一壯一
枚不過七枚即愈如無此虫以淨土水和為餅或江西淡
豆豉為末唾和作餅置瘡上灸之皆可乾則再和
凍瘡每冬必發用野外淨土晒乾以大蒜同搗如泥捻作餅
子如錢厚置瘡口灸之乾則另換不問壯數直至瘡覺痛
痒然後口含漿水吐瘡上用鷄翎作刷子于瘡上洗刷庶

肌肉不致損傷洗畢軟帛拭乾以木香檳榔各二錢黃連
四錢為細末搽之或以蠟油調敷瘡口生肌甚速

有冷生風中風人臂骨脫臼不與有相連接多有醫治不痊
者要之總覺有止冷疼必先灸肩髃環跳二穴有顯屬手
陽明大腸經在肩端兩骨間陷中舉臂取之有陷處是穴
灸七壯若風感者灸二七壯環跳穴屬足少陽胆經在髀
樞髀子骨後宛宛中側卧港上足伸下足取之灸五十壯
蛇咬傷用獨蒜切片置咬處以艾灸之二艾換一蒜片至伍
十餘壯痛自定而毒自消矣

癩癩俟其發時將患者兩手大拇指相並以綿線縛住當兩
絲疔若生於兩足多有紅絲至膝生於兩手多有紅絲至
心生於唇面多有紅絲入喉宜細視之若到過膝過心過
喉則毒勢已盛便為難治急用鍼挑破絲脈或鍼瘡頭并
四畔多出惡血令泄其毒方可望生間有無他病忘忽然
暴死者亟以燈照其偏身如有小瘡即是疔毒宜速灸之
若灸後而有焮痛至一宿者乃是火氣下徹其腫內熱氣
被火導之隨火而出也如灸雖多畢竟不痛不起發不作
膿者是謂無陽症不治又有疔患于足或足指間重而潰
者至於脫節是名脫疽亦有患于手及手指間若色黑不
痛不潰者不治色赤作痛自潰者亦隔蒜灸之內服托裏

之劑庶少收功巢元方云脫疽其狀赤黑者死不赤黑不
死又云發于尻尾名曰脫疽若不急治便通洞一身十日
死于此見疔疽之生于下部者藥難導達危急殊甚孫真
人云在肉則割在指則截寧傷遺體真可延生若舍此而
用攻毒之劑先壞胃氣毒惡乘虛黑點延上雖有聖手瘰
無及矣故必以隔蒜灸法為第一

取穴法

凡取穴分寸當用同身寸法以患者男左女右手屈其中
指用稍稗心一條量指中間一節兩頭橫紋尖處即是同
身一寸截斷為則寸若多者照此加之或橫或直寸法皆

指騎縫去爪甲角如韭葉許是也鬼眼穴灸七壯又一
穴在兩足大姆指亦與取手穴同石及鬼眼穴灸之大
効

男子魚嗣者用艾一團以鹽填滿臍間却于鹽上隨鹽大小
做艾丸灸之如痛即換鹽灸至艾盡為度一日灸不完則
二日三日灸之最効

婦人如欲不生子者于臍下二寸石門穴一名丹田穴灸二
七壯至百壯止終身不孕

癰疽發背用濕紙搭在腫處看有一點先乾者即是瘡頭用
大獨蒜切作一分厚片置疽頂以艾于蒜上灸之每三壯

一換其蒜亦有詩上初發赤腫中間有黃如小粟米一粒
或一片者尤宜隔蒜灸之書云外形如粟內可容穀外狀
如錢裏可着拳慎勿視為微小致成莫大之患設或瘡頭
開大則以獨蒜十餘個淡豆豉半合乳香二錢同搗成膏
患處大小拍作薄餅置毒上鋪艾灸之務要痛者灸至
以痛不痛者灸至知痛乃止大率毒發一二日者十灸十
愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則雖灸不
能散矣。

疔瘡灸如前法甚則以蒜膏塗四圍八露腫頂着肉灸之以
爆為度如不爆者難愈更宜多灸百壯魚弗愈者有種紅
絲疔若生於兩足多有紅絲至膝生於兩手多有紅絲至
心生於唇面多有紅絲入喉宜細視之若到過膝過心過
喉則毒勢已盛便為難治急用鍼挑破絲脈或鍼瘡頭并
四畔多出惡血令泄其毒方可望生間有無他病症忽然
暴死者亟以燈照其偏身如有小瘡即是疔毒宜速灸之
若灸後而有焮痛至一宿者乃是火氣下徹其腫內熱氣
被火導之隨火而出也如灸雖多畢竟不痛不起發不作
膿者是謂無陽症不治又有疔患于足或足指間重而潰
者至於脫節是名脫疽亦有患于手及手指間若色黑不
痛不潰者不治色赤作痛自潰者亦隔蒜灸之內服托裏

之劑庶少收功巢元方云脫疽其狀赤黑者死不赤黑不
死又云發于尻尾名曰脫疽若不急治便通洞一身十日
死于此見疔疽之生于下部者藥難導達危急殊甚孫真
人云在肉則割在指則截寧傷遺體異可延生若舍此而
用攻毒之劑先壞胃氣毒惡乘虛黑黯延上雖有聖手療
無及矣故必以隔蒜灸法為第一

取穴法

凡取穴分寸當用同身寸法以患者男左女右手屈其中
指用稍稗心一條量指中間一節兩頭橫紋尖處即是同
身一寸截斷為則寸若多者照此加之或橫或直寸法皆

同惟頭部橫寸以眼內眥角至外眥角為一寸耳

是病難醫世身之疾也。然病在表者死，不在表者
死。又云：發于尻尾名曰脫疽，若不急治，使通洞一身，十日
死于此。見疔疽之生于下部者，藥難治，速治是急。殊甚，深
人云：在肉則割，在指則截。每傷遺休，異可延生。若令此而
用艾毒之劑，先壞胃氣，毒惡集虛，黑點延上，雖有聖手，亦
無及矣。故必以隔蒜灸法為第一。

取穴法

凡取穴分寸，當用同身寸法。以患者男左女右手屈其中
指，用指稜心一條量指中間一節，兩頭橫紋尖處即是同
身一寸。同身一寸，以男左女右，手屈其中指，用指稜心一條量指中間一節，兩頭橫紋尖處即是同身一寸。同身一寸，以男左女右，手屈其中指，用指稜心一條量指中間一節，兩頭橫紋尖處即是同身一寸。

