

X

-131

F >  
4-29

醫家大法下附方

490.9

I K-6

No. 2297

1月13日



基士川文庫

1350

附錄皆效方

諸風

黑虎保安丹

專治三十六種風二十四般氣

川芎 甘草 何首烏 白芷 當歸 天麻 草烏  
細辛 麻黃 防風 金釵石斛 荆芥以上各一兩  
川烏泡酒浸以上各四兩 蒼朮少許 詔腦

右件一十五味為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸各隨引子化下治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜



一塊氣

專治男婦噎隔痞滿胸膈刺痛癰瘕氣等疾

青皮

陳皮

三稜

香附子

小便浸沙戎木各一兩

檳榔

白牽牛

肉頭木

神曲

麥芽

礬金

黃連

金

蘿蔔子

百草霜

皂角

枳實

各二錢半

右為細末麪糊為丸米豆大每服二十五丸或三十丸疾在上食後疾在下食前飲酒者熱酒下不飲

酒薑湯下

時感

香蘇飲

治四時傷寒傷風傷食大人小兒皆可服之

香附米

紫蘇

陳皮

甘草

各等分

右㕮咀每服五錢薑三片葱三莖水盞半煎服不拘時頭痛加川芎白芷細辛荆芥咳嗽痰多加半夏桔梗桑白皮心痛加半夏玄胡索腰脚疼痛加檳榔木瓜枳壳木香婦人血氣加茴香烏藥當歸

正氣清肌飲

治四時傷寒頭疼發熱惡寒身體痛潮熱往来咳嗽

痰逆嘔噦心及山嵐障氣一切皆治之

蒼朮 陳皮 錢五 薑香 半錢 半夏 三錢 甘草 二錢 厚朴 四錢

右依此修合每服姜委五斤葱一莖煎服冷濁不止加木香 蘿子肉 豆蔻頭痛加川芎 白芷 潤熟加夢寐前胡口燥心煩加乾葛柴胡 瘰疾加常山草果 檳榔 咳嗽加杏仁 五味子 桔梗 嘴急加麻黃 蘇子桑白皮 身體疼痛加桂枝 麻黃 赤芍 藥嘔逆加丁香 砂仁 感寒腹疼加軍姜 官桂 足浮腫兩脚疼加大腹皮木瓜 五加皮 氣塊加枳壳 檳榔 茴香 三棱 熟結大腑不通

加朴硝 大黃 腹脹加香附子 枳殼 白豆蔻 胃脹滿 加枳實 桀木砂仁 痘疾加黃連 松壳去甘草

咳嗽

提金散

治五勞七傷多年咳嗽重者不過十服輕者服効

罌粟壳

六兩去頂  
隔蜜治

乳香 一兩 没藥 五錢 陳皮

桔梗

川芎 各五錢 丁香

木香

川烏 去皮 人參

麻黃

白茯苓 青木香

以上各二兩

柴胡 二兩去芦

右爲細末每服三錢用沸湯調食後服喘加滑石一兩

痰氣

三子養親湯

凡人年老形衰苦於痰氣喘嗽胸滿難食不可作病治妄投蕩滌燥利之藥反耗真氣予因三人求治其親靜中精思以成此方隨試隨效孝哉人子不可不知也

紫蘇子

主氣喘咳嗽用  
紫色真正者

芥菜子

主痰又下氣寬  
中用白色者

蘿蔔子

主食痞兼理  
氣用白種者

右各洗淨紙上微炒擊碎湏有何症多作則以所王

為君飲次之每剂不過三錢用生絹或稀布小袋盛之煮湯可隨甘旨飲啜亦不拘時勿煎大過令味苦辣口若大便素實入熟蜜一匙又寒加姜一片尤良南陵末齋子贊曰夫三子者出自先圃其性度和平芬暢善佐飲食忠養使人親有勿藥之喜是以仁者取焉老吾老以及人之老其利溥矣詩曰孝子不匱永錫爾類此之謂也

半夏丸 治痰如神

紹興半夏

一斤去皮明礬四兩煎湯

生姜

四兩搗取

甘草

一斤煎

右將半夏入礬湯浸之春夏二十一日秋冬四十九  
日捞起陰乾次入姜汁春夏三日秋冬七月仍陰乾  
爲末以甘草膏拌勻丸如黃豆大用瓷器收貯每服  
一丸不拘時候嚼良久嚥下

紫金丹

凡天欲雨便齁喘一至坐卧不得飲食不進乃肺竅  
中積久冷痰乘天陰氣從督脊而侵從鼻口而入則  
肺脹作聲此病有苦至終身者亦有母子相傳者昔  
市中一道人賣此藥一服即愈人不取信後果神効

遂留其方人或見用砒毒不敢輕試不知肺竅積痰  
非此不能刲出每劑每服不過七八次覺有痰腥臭  
白色吐至數升砒性亦隨而出是斷根矣何毒之有

砒霜用金脚者生研爲末一錢

白礬煅過另研爲末三錢

江西淡鹽豆豉一兩蒸軟研如泥旋加砒霜令勻

右研勻撫爲丸菉豆大疾癰者用涼茶或冷水送下  
七丸甚者九丸小兒老人五丸服下忌熱湯粥宜高  
枕仰卧以不喘爲愈

治瘧疾方

用韭菜田中蚯蚓糞上菖蒲根中獨蒜下

五月五日午時取三物碾令極細就丸如芡實大用  
礬紅爲衣遇糞時先用無根井花水送下或一丸元

瀉痢

黑牛兒散

治赤白痢禁口痢及泄瀉之疾

用黑牛兒即鐵甲将军

右燒灰為細末每服一錢或半錢燒酒調服小兒用

黃酒亦可服之立効

翻胃

治翻胃方

用抱出雞子壳寡者不用燒灰存性加芦根末各等  
分每服三錢好酒調下

治心漏方首前有孔常出水謂之心漏此疾醫書少載  
人多不知又能去腰疼

鹿茸去毛酥  
淡微黃

附子炮去皮脐

薑花

右三味等分爲末用棗肉爲丸每服三丸空心酒下

有人患腰疼服此而心漏亦止屢用有效莫知其理

積聚

珍寶丸

黑牽牛四兩半  
生半熟

三稜醋炒

蓬莪术

檳榔

茵陳

猪牙皂角各五錢

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三錢或二錢看虛實用雞鳴時茶清下能消一切積聚痞悶心胸膨脹服之有驗

羅漢丸

杏仁 半夏 山豆 草麻子

去皮白牽牛各一百箇

右用麥麸四合共炒存性為細末醋糊為丸如菉豆大每服五七丸諸般風疾麻黃湯下心腹脹悶蘿蔔湯下肉傷肉湯下霍亂姜湯或甘草湯下傷酒酒下心疼醋煎艾葉乳香湯下脚腿疼菉豆湯下大小便不通燈心湯下赤白痢訶子湯下婦人赤白帶下當歸湯下陰毒傷寒熱湯下五癆七傷猪膽湯下癰瘍心腹脹悶菉豆湯下打樸傷損溫酒下遍身疼痛乳香湯下小兒乳癰癰瘡用乳汁冷水任下胎前產後

當歸湯下喘嗽人參湯下取虫史君子湯下夾食

熱酒下或葱白湯下

治懸癰方此瘡在穀道外腎之間醫書不載人所罕知初癰甚小狀如松子漸大如蓮實治遲則破大小便皆從此出不可治矣服此有效

橫紋甘草截長三寸

右用山澗東流水以甘草蘸潤水文武火慢煮之不可性急炙至表裏濕潤透徹每一兩用無灰酒二碗煮至半碗溫服一日一服至消盡為度

腫脹

迴生丹

治浮腫肚脹服之退水神效

乾漆

炒盡煙

澤鴻

三稜

莪朮

陳皮

木通

炒

青皮已上五味同連翹巴豆一

兩五錢於沙鍋內炒入藥

甘遂

炒

連翹

炒

木香大不見

蘿蔔子

炒已上十二味各三錢

胡椒

炒一錢

椒目

炒五錢

桑白皮五錢炒

商陸

三錢不炒

赤茯苓

五錢不炒

黑牽牛

兩不炒

石楠

兩不炒

右為細末醋糊為丸如黍豆大每服十五丸至三十丸加減用第一服生葱二十四莖擂碎同溫酒五更送下第二服用陳皮桑白皮各等分煎湯服第三服

用麝干煎湯服切忌食鹽

秘結

治大便不通用蜂蜜熬成膏搗作柂指大錠子上加焰硝入穀道內即通

正直散

治一切久滯腹中積塊或疼或痛不思飲食令食黃瘦服之有驗

青皮

陳皮

芫花

醋炒黃色各等分

右為細末每服一錢溫酒不拘時調服忌食熱物

積聚

秋冬加半錢看虛實用之

治小便不通用蚯蚓糞皮硝各等分井水調塗小肚上而通用金蛇退一條燒過存性好酒調下神效

疝

玉環笑來丹

治小腸疝氣其效如神

茄核四十九粒

陳皮連白九錢

硫黃四錢

右共研末鹽水煮麪糊丸如豆大每痛時空心酒服九丸良久再服不過三服見效痛則再服又治

心氣痛者

虛損

班龍宴

班龍者鹿也氣稟純陽活血補氣血非金石草木  
比乃仙家服食丹法二十四品之一予嘗傳病癥賴  
此再造欲共於人柰何術多天禁訣待口傳知音者  
依此餽養廣延方士未必無相值也

馴牡鹿一隻每日以好人參五六錢煎水與喫藥渣  
拌米豆麥同各色土產藥草餽養以時勿犯雜水

雜草有日之外筋骨可用矣

宴法夜前減食以晚將鹿後二足用布懸起前二足  
强有力者抱定有角執角無角用木囊頭拘之握其兩  
耳使頭不掉側先用三棱鐵鍼刺開天地穴用銀筒  
如筋一頭斜銳入穴主者坐定啞共血十數口飲藥  
酒數盃復啞復飲以醉為度鼻中流出者亦可滴酒  
生乳藥傳鹿穴又養又宴漸隨人意一年可宴十二  
度一鹿可用五七年不拘男女老壯能用之終身無

疾而壽矣

人參 白朮 茶芩 甘草

花苓

當歸

芍藥

地黃

川芎

桑葉

沉香

木香

白朮

右十味預煮無灰酒一尊。審久用時。才加椒薑葱。仍乾肉壓之牛羊肉尤妙。

### 斑龍駿

養小牡鹿數隻亦如斑龍宣法。但不取血。不君牡鹿養三五年漸加硫黃。入料久則毛脫血白。置千高大圈欄內別以牝鹿在外。誘之欲交不得。畜羣長

鳴日夜守定待其身顛不堪必其淺精是駿也。急用銀盞器接尿香還十合鍊入服。食用藥有大候銖兩口訣。仙家所禁竹帛不傳。謾此數語未必無相值者云。

### 鹿髓丸

用所養斑龍已宴數年者取髓鍊成膏。加諸暖藥為丸。凡腎虛腰痛。但用一粒姜汁調搽腎掌。則暖氣從外透入過丹田。如火。蓋古來見人服補藥多致熱毒。上攻故為此法。得某方禁。竹帛。不以告人者。肇養

鹿以廣詢也如獵捕庖宰之鹿取髓亦可錄用但無  
此大功効耳

秘傳三仙糕

人參

山藥

淮山用

白茯苓

芡實

蓮肉

各一斤

糯米

三升

粳米

七升

白蜜

一斤

沙糖

一斤

右將人參等五味各爲細末又將糯米亦爲末然  
後和匀取木桶一箇將白蜜沙糖依數溶化隨  
將粟米和入于桶內藥上放米一撮隨即鍋上蒸之看  
藥上米成飯為度取出用火焙乾仍爲末子盛于磁

器內每日清早服一大匙白湯調下服至百粒  
鬚白者及黑大能壯陰陽益腎水養脾胃妙不絕口述  
太極丸

人之五臟配天之五行一有不和是以爲疾藥有五  
味各主五臟可使調和故曰太極

知母

屬金主清潤肺

金苦以降火佐

黃藥

厚朴

生之理去毛酒浸一宿

厚朴爲淨末二兩

四錢

黃藥

屬水王滋腎水苦以堅精

皮膚

水苦以堅精

水苦以堅精

水苦以堅精

水苦以堅精

水苦以堅精

破故紙

屬火收斂神明能促心包之火與命門火相

通故元陽堅固骨筋充實淡以治脫也

新丸

青爲末

胡桃仁

屬木主潤血養血屬陰陰惡燥故油以潤

砂仁

屬土主醒脾開胃引諸藥歸宿丹田香而竊和

皮待各藥成末將此三兩二錢研為泥和藥

五臟中和之氣如天地以上為中氣也去壳壳

將五錢用花椒一兩炒去椒不用

又用五錢不炒者共為淨末一兩

右各製如法和勻鍊蜜丸如梧桐子大每早夜白湯茶酒隨意送下五七十九服至三年效不可言服之終身地行仙矣

### 天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦火

痰除驚悸升精氣潤咽乾養元氣之上劑也

熟地黃

一兩四錢四分

白茯苓

一兩三分錢三分

柏子仁

一兩五錢

丹參

一兩三分錢三分

石菖蒲

一兩一錢四分

酸棗仁

一兩一分錢三分

百部

一兩六錢

牛膝

一兩三分錢三分

玄參

一兩三錢五分

天門冬

一兩六分

五味子

一兩六錢

甘草

一兩六錢三分

遠志

去心一兩六錢五分

杜仲

去絲一兩三錢三分

當歸

一兩六錢金箔張

真牛黃

三錢

琥珀

三錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每用一丸卧時燈心紅末煎湯化下

### 賽金丹

松節一塊 麻鞋臉一箇 黑牛皮一片 穿山甲數片  
石翫子一對 黃米一合 頭髮多加

右將松節燒各味存性為細末用麪糊調貼腫處  
專治折損折傷一切腫毒皆可療貼如重損皮破  
乾擦之極妙

還元丹

生地黃四兩酒浸倍乾  
取細末一兩熟地黃同上人參二兩去  
芦取末  
天門冬四兩米泔水浸  
去心取末一兩麥門冬同上白茯苓四兩去皮酒  
浸取末一兩  
地骨皮四兩童便浸酒乾取末  
一兩俱不可犯鐵器

何首烏一斤四製不犯鐵器生芝麻蒸一次晒乾羊內  
蒸一次晒乾酒蒸一次晒乾黑豆蒸一次晒乾  
凡用酒治藥忌鐵器衆末鍊蜜為丸加乳汁六兩首  
生小男者為妙入藥同蜜拌勻作膏尤好磁器盛之  
勿泄氣不拘時服一二匙白滾湯漱口

瑞蓮丸

定心緩腎生血化瘀

蒼朮一斤主脾四兩酒浸四兩醋  
浸四兩米泔水浸四兩生用枸杞子主肝二  
兩去核  
蓮肉主心一斤去心皮酒浸軟入  
猪肚內煮極爛取出焙乾五味子去心梗  
二兩  
熟地黃酒浸蒸  
主血二兩

右為末煮猪肚膏同酒糊為丸如梧桐子大每服四十丸空心酒下

眼目

三花五子丸

旋覆花  
蜜蒙花  
菊花各一  
青葙子  
地膚子  
覆盆子  
牛蒡子  
蔓荊子合兩錢  
防風  
川芎  
木賊  
蒺藜  
黃芩各兩錢  
草決明  
一兩五錢

右為細末用無灰好酒糯米糊丸如梧桐子大每服三十丸用來煎水煎湯送下如眼中冇翳膜者

皮煎湯下

明目流氣飲

當歸酒洗  
防風去芦  
地黃酒洗  
龍膽草酒洗  
芍藥  
甘菊花  
川芎  
決明子炒  
防已  
甘草  
杏仁子浸蜜  
右㕮咀用水一盞半煎至八分上半日服有翳膜加蜜蒙花木賊

婦人

女聖丸

治女子諸疾極效

香附子

古云女中之聖藥以其氣香則竄無滿氣也  
味苦則降血道大也其性勇毅光明可解

婦女癆結多怒之偏本草只言益氣世俗都言  
耗氣男子不敢服非也先春去皮毛用一斤為

草分作四製一用鹽水加姜汁浸透熟炒

主降痰調下部血

一用山梔子仁四兩同炒去梔

飲氣補血一用山梔子仁四兩同炒去梔

不用主除癆火一用童子小便洗過不炒

右四製各研細末各重四兩淨拌勻酒煮麪糊為丸

如梧桐子大隨証引子

經水不調酒下胎前諸病艾湯下產後諸病川芎當  
歸尾各一錢煎湯下白帶非冷乃庚辛金來主心氣  
所致小茴香湯木香湯下胸滿腸脹姜湯下頭暉薄

歸尾各一錢煎湯下白帶非冷乃庚辛金來主心氣

所致小茴香湯木香湯下胸滿腸脹姜湯下頭暉薄

荷荊芥湯下加生姜汁其餘病証與男子同者隨  
意用引不能者只用白湯下

瘡毒

天花刮毒丹敷一切腫毒

黃柏 天花粉多加南星 芍藥 麝金以上各等分

右為細末井水調敷患處不過二三次醋調亦可

蟾酥小錠子

蟾酥一錢

細白麯二錢

硃砂 少許

右用井水調為錠子如小麥大量瘡用度每瘡一錠

如瘡勢緊急用井花水服五七丸葱湯亦可矣証愈化毒爲水內托散 凡二十六方

凡患癰疽皆對口惡疔瘡乳花百種無名頭反瘡此藥能令內消去毒化爲黑水從小便出萬不失一此方不可秘藏不可輕視寶之寶之

乳香 穿山甲 白芨 知母 貝母  
半夏 金銀花 皂角 天花粉 各一錢

右㕮咀用無灰酒一碗煎至半碗去渣滓作一服溫進不宜加減得渣擣爛加秋過芙蓉葉細末一兩以

蜜水潤過一宿自消不必用第二服忌發物大劫外科以癰疽發背冠於雜病之先者何大抵變作在於頃刻性命懸於毫髮故也夫癰疽之名雖有二千餘証其要有二則陰陽二証是矣凡癰干陽為癰為熱為實發於陰者為疽為冷為虛其陽發於皮膚淡腫硬狀如牛頸之皮而不痛又有陽中之陰似熱非熱雖腫而虛亦不燥作痛而無腫時浮時消火盛而內腐陰中之陽似冷非冷不腫而實微赤而燥有膿而痛外雖不盛而內煩悶陽中之陰其人多肥肉狀

緊而內虛陰中之陽其人多瘦肉緩而內實又有陽  
變為陰者因草醫涼劑之過也陰變為陽者太艾  
熱藥之驗也然陽變於陰者多猶可致於陽故生陰  
變陽者少不能復於陽故多死間有生者此醫偶合  
於法百中得一耳所謂堯者橫於中而堯於外也人  
之身所自本於五臟之氣皆稟於胃氣胃五臟之  
根本故胃受穀脾化之以生氣肺主肌肉胃氣傳五  
臟而行血脉以經絡一身而盡夜一周雖癰疽有虛  
實寒熱皆由氣鬱而成其因有三內因外因不内外

因內因候於人迎人迎者左手關前一分也外因候  
於氣口氣口者右手關前一分也人迎氣口之脉和  
平則為不內外因也其原有五一天行時氣二已情  
內鬱三體虛外感四身熱搏於風冷五食炙燭飲法  
酒服丹石熱毒等藥以此五者為邪氣鬱於胃中胃  
氣盛而體實則邪氣相搏而流注於經絡淤於所滯  
血脈聚會壅結而成癰胃氣弱而體虛則邪氣盛而  
宿於經絡凝滯流積血脈不潮內腐而成疽故曰外  
形如粟中可容穀外貌如錢裏可着拳惡毒膿管寸

長深滿膿血相沾用藥可痊臭穢盡無敗氣衰陽  
絕陰盛仙難救命善用藥者當審人虛實察病冷熱  
推其所因究其所源如病發於陽而極熱必當順其  
氣勻其血氣順則宣通而不滯血勻則流動而自散  
氣乃為陽血乃為陰陰陽調和其病自安外則涼  
藥而觸之熱盛血得涼而易散則熱已瘳而血凝於  
涼是謂血之不散也此陽變寒陰漸成壞爛之根急  
歸溫劑以治解其外攻之血路出其中間已成之壞  
然後依法以收其功如病發於陰而極冷則內用

平補之藥以宣其氣滋其血助其元陽從其脾胃待  
其飲食進精神回復雖順氣勻血如常法外用熱藥  
以朝會一身之氣血曰死肌投毒氣後用溫藥以散之  
其極冷者或又為涼藥所誤不得已於三建而回  
陽病必傍出再作為佳此陰變為陽之候更生之兆  
也若內陽不回外証不見是為獨陰絕陽不可治也  
蓋陽者氣也陰者血也陽動則陰隨氣運則血行  
不運而血死血死則肌死肌死則病死矣冷証則用  
熱藥不過行其氣血氣血遇熱則行遇涼則止難用

冷熱之藥固妙先當以乳香豆粉救其心護其膜為  
五臟之囊素病之初起必上攻心之胞絡故先  
嘔逆而後癰疽或先癰疽而後嘔逆者皆毒攻於胞  
絡根於心也治之不早心必受毒神無所舍元氣昏  
暝毒之始萌傍腑肌肉治若非早者毒氣則透膜膜  
透則元氣泄臟腑失養精神枯槁膜自壞絕病有至  
盛內見五臟可得其生者膜完也病有微則未潰  
而死者其膜先透也是以救心護膜當為首治之良  
法此乃論癰疽之要其神聖工巧不可具述非尋常

草醫一草一木一鍼一刀之比得其要者毋自秘之

香粉散

凡惡癰疽一切瘡腫先以此藥頻服救心護膜  
毒不攻內

菉豆粉六錢去皮  
菉末可代

南乳香二錢  
末

加甘草生五錢末用  
草節尤良

右將前二味研勻入大碗用水一升煎甘草數沸投碗  
攪至溫任意服欲冷則冷服服不盡再服之

一方不用甘草用菉豆粉南乳香為末每服三錢新  
汲水調下亦止嘔逆

真君妙貼散 善拔諸瘡之毒

明淨硫黃 三兩 蒼麥粉 二兩

右為末井水和捏小餅晒乾或焙乾收之如遇惡瘡再研細用新汲井水調傳痛者即不痛不痛者即痛而愈

內補流氣飲

前味  
內托散

治癰背癰疽無分膿乳附骨等處及諸惡疔瘰癧一應腫毒未成而散已成即潰敗膿目出腐肉自去痛苦自減大有神功非常效也

人參 防風 桔梗 黃耆各一錢當歸  
官桂去皮 厚朴去皮姜製 白芷 甘草三錢 川芎  
右六味南木香白芍藥大腹子烏藥枳壳紫蘇各三錢病不退加白茯苓白术煨熟地黃○不進飲食加硝砂香附○痛加乳香沒藥○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咬加陳皮半夏湯洗七次 杏仁五  
片○大便秘加大黃枳壳小便淡加麥門冬車前子木通燈草○又治脚氣痛右碾細末每五六錢酒調服不飲酒木香湯下未湯亦可此方所用之藥皆能

發散風毒調理氣血消腫止痛生肌長肉真良劑也  
五毒而不識者談笑坐收全功如氣不和多用氣藥為  
主如血不和多用血藥為主藥又可作㕮咀以水一  
盞半葱白一莖煎至七分加酒一呷病在上食後服  
病在下食前服

柞木飲子

治癰背癰疽已未成者並收奇功此藥簡易誠為活  
命救貧之良方

乾柞木葉四兩 萍草根 甘草節 乾荷葉中心帶

地榆 各一兩

右為散每五錢水二碗煎至一椀分作二服早晚各進  
一服再合渣煎有膿者自乾未成膿者自消忌毒食  
易愈

六合回生丹又名六合奪命散

治癰背癰疽潰爛者有回生之妙

鉛粉一兩輕粉

銀硃

雄黃

乳香

薦上  
矣焦

沒藥亦矣各二分半共一兩一錢二分半

右六味各擇真正好者研為極細末收貯丸治其病

先煎好濃茶將瘡洗净軟帛拭乾後剖開猪腰子一箇用藥一分摻於猪腰子上却傳患處待猪腰子熟如蒸良久取去自此拔毒氣減痛苦定瘡口出膜穢不可手拚第三日依前法仍傳之第三日亦傳之瘡勢惡甚可傳七八九次瘡小傳一次可愈猪腰子不斧熟勿治又治對口瘡同前

泌陽焦閣老先生嘗施此方用藥一分傳一次則止  
茶仙施此方加藥至三五分傳數次見效尤速刃多  
在拔其毒耳瘡口大者恐一箇猪腰子傳之不足可  
加半箇割腰子法不可割脫僅兩浙雖要相連如  
大片約量瘡口大小摻藥則可用積  
猪腰子益佳其腰子有毒宜深理之

若腫瘡日久不愈用黃蠟少加好黃丹化攤紙上量瘡大小裁其蠟紙熟摻藥一二分粘在蠟紙上面貼瘡綿帛縛住任瘡出盡惡水即愈若患下疳用猪腰子切作寬片摻藥縛裹疳上或以尖刀穿開猪腰子納藥干內籠套其疳亦良羊魚鵝雞犬鴨及鳩毒藥物但忌之

### 驪龍散

治癰背癰疽破與不破二者之間功能捷奏

珍珠五分 牛糞十二月生用 餐繡各重一兩

鐵繡各重一兩

右研細末以猪腦髓加好醋調傳瘡口三五次愈初起者自消凡癰毒品味忌食之○癰背如黑不痛即為陰也用艾葉一斤硫黃雄黃研末各五錢以水同煮艾半日候溫傳之再煮別艾換敷十餘遍能齧者可療不死全無痛者出黑血必死○癰背初起爛開不住用白鹽梅皂角一味燒存性研末不癰熟者米醋調塗四圍箍之連換即不走開加姜汁同醋尤良如堯熟茶清調塗○堯背癰疽以榆皮研末每一匙涼水調傳留頂又方用文蛤殼為末摻之亦可以

姜汁醋調傳之又方用乾姜末雞彈清調傳留頂如癰疽皆潰爛者洗盡瘡口拭乾換末覺熱如烘生肌易愈此三方藥品雖微功效甚大實濟貧拔苦良剎也○堯背堯於陰又遭冷藥所誤或堯於陽而誤於藥冷者陽變為陰滿背黑色爛其四圍好肉上用洪寶丹把住洪寶丹天花粉三兩姜黃白芷各一兩赤芍藥二兩為末此藥一涼而已能化血為水又能使血瘀積又能涼肌生肉又能去死肌爛肉又能破血退腫又能滯氣浮又能止痛又能作痛又能閉膿又能出膿一反一復其方藥性無他遇涼效少遇熱效多非十分陽症不可輕用恐或外但可為後二藥之佐使當審之大抵此三藥可合

不除則寒根透髓尋常之藥固莫能及惟此藥大抵  
逐去陰毒挽回陽氣任骨中痛且止肌肉皮膚之疾  
效可立知矣必當斟酌而用不可大過則善凡冷流  
住鼓風久損痛冷痺風濕諸脚氣冷腫無紅赤者冷  
痛不腫者手足頑麻諸陰証及婦人冷氣風第一之藥也  
一夜陽回黑者皆紅察

其紅活不傳此藥却以冲和藥收功如不效欲作膿又以南星草烏加於冲和用之如陽已回黑已紅惟

白丁香硝砂乳香共研匀唾調傳於黑紅交處作一

圈上用冲和盖之冲和膏川紫荆皮炒五兩獨活炒去節三兩赤芍紫枝二兩白芷不見火一兩石菖蒲可加減共存細末凡癰疽流注等疼莫非氣血凝滯所成遇溫則生遇涼即死生則散

死則凝此藥性乃溫平紫荆皮不之精能破氣逐血  
消腫獨活土之精能止風動血引氣拔骨中毒去婢  
濕氣更能興石菖蒲破石腫堅硬赤芍茱萸之精能  
生血住痛去風石菖蒲水之精能生血住痛消腫破  
風散血白芷金之精能生風生肌止痛蓋血生則不  
死血動則流通肌生則不爛痛止則不散赤作悶風  
去則血自散氣破則硬自散毒亦散矣五者交功何  
病之有○此方如獨用亦須斟酌凡病有三証治有  
二法如病極熱者則本方中可倍加紫荆皮及菖蒲  
少用三品亦能消散但功稍遲如病極冷微加赤芍  
藥獨活能活血消散功亦稍遲而不壞病○如病熱  
熱大盛切不可用酒調但可葱泡湯調此茱萸傳上  
葱能散氣也血得熱則行故以熱傳如病稍可又當  
酒調酒能生血溫熱則血愈生酒又能行血遇熱則  
血愈至明早起藥自然去黑肉如割用藥洗之挾以  
生肉合口藥後收其功洗毒湯苦參防風甘草茱萸  
蜂房各六分咬咀水煎濃汁行矣至明早起藥自然去黑肉如割用藥洗之挾以

諸瘡毒可洗之○桃花散又名麝香輕粉散去風住  
痛生肉合口一切癰疽傷破久不平後者用前湯洗  
後此方乾擦大效五倍子倍乃君赤石脂根當歸酒洗  
洗倍黃、蘆薈白芷不見火黃丹飛麝香輕粉海螵硝  
赤芍茱渭石擴乳香沒藥右十四味研極細末候  
建慶若瘡中毒氣未盡凡生肌之藥用勿太早縱得  
平復合毒干內必有再癰之患法  
當次茅沾之臨時制宜無不愈者

### 懷忠丹

治內癰有敗膿敗血腥穢殊甚所致臍腹冷痛  
用此推膿下血

白芷一兩白礬枯白芍藥各五錢草葉紅蜀葵根兩  
右研末鎔黃蠟丸如梧桐子大空心米湯下三十九

推膜下血出盡後服十宣散神之惡物又方猪膏  
治陽癰又方以蟹甲燒存性末服之

### 金蟾護命丹

治諸惡疔毒瘡及堊背癰疽初起者一服則愈  
硃砂 雄黃 破砂 金脚砒 巴豆無製 南星  
半夏 乳香五分 斑蝥去首足十箇 癬香少許

右研末蟾酥丸、荳豆大飛黃丹為衣每一丸安古下  
噙化嚥盡爛嚼葱白三五莖飲好熱調一甌被蓋  
出汗為度仍服治喉癰乳蛾如不能飲食者只安  
丸于舌下則徐蒸之治傷寒口嚼葱就服

葱湯一碗、癰汗但忌生冷反病觸毒動風作疼之物  
及房勞氣怒○又方急救惡疔大効巴豆一箇去皮  
荳豆七粒乾脂少許同荳未研匀不必加減將疔破  
開乾點拔出毒氣即愈小兒痘疔不剖破熟丸妙識  
疔用針法諸疔先癰半足間其泡黃白紫黑等色其  
紅線一條直上急針刺線至處毒血出後塗蟾酥乳  
膏膏病者知針痛血出安一  
否則線攻心必危用矣

### 六辨散

治喉痺水米不進白礬三錢文火化計巴豆仁三

箇作六塊就鉢熬枯去豆研末加牙關緊急不能張

口吹藥令病者用鼻孔着力吸進亦愈附口瘡并舌

瘡之立見功驗

六六九

治厲風瘡凡男女皆從陰起不從者少其瘡多無皮形類楊梅俗以楊梅名之又以天疱瘡名之然雖醫之亦愈愈之後作不能斷根惟此方可斷根也先日服防風通聖散一劑次日服本丸飲食無忌

輕粉一錢三分黃丹飛過八分乳香三分硃砂去石五分

雄黃去石五分麝香三分

右為末糊和作六丸勿嚼碎每日空心服牙若微腫塗漱無妨忌序事百晝用前洗毒

湯洗之又用硃砂雄黃輕粉黃連銅線乳香沒藥黃芩大風子葉刀豆末黃蠟和作錠子桐油研塗瘡上用末摻可桐油調可治下疳

作金散

此治小兒肥瘡亦瘡之聖藥其名烏龍虎者即倒鈞壓灰

小兒肥瘡滿頭顱將鹽煅紅白礬枯瓦燒存性等分研墨漏燈油調塗須把瘡痂先去淨口塗三次病根無若醫尾加烏龍尾輕粉調勻也莫粗未前半養

湯熱洗洗時宜早不宜晡。發物忌之。功更効。茶  
從此作金呼。

雜治

取癌

治面上黑癌用寒食前後取桑條燒灰淋入石灰  
熬成膏用自己唾調點塗癌自落。

搽牙散

固齒烏髮明目

細辛二兩去土 破故紙二兩六錢炒 青鹽根一兩 地黃一兩六錢

地骨皮二兩以上二味俱用酒浸沒石子十箇  
春夏浸一日秋冬浸三日 沒石子十箇  
右為細末早洗淨干乾將末藥擦牙涎咽下勿吐  
水送至丹田

還元固齒散

旱蓮草一兩陰乾 梧桐淚真的五錢 猪牙白角煅過五錢 升麻四錢  
熟地黃五錢 槐角子一兩炒 細辛五錢 荷葉三錢 青鹽一

川椒一錢 沒石子五箇  
各為細末清晨用此搽牙數十遍漱淨叩齒三十  
六可以終身無齒疼之疾

奪天仙機散

早蓮草一兩

青鹽一兩

五倍子五錢培

赤茯苓五錢

細辛五錢

花椒五錢

槐角子一兩

淨五錢

猪牙皂一兩

存性

右為細末每日清晨擦牙漱去叩齒三十六通

終無齒患之疾

神枕法

昔太山下有一老翁者失真名字漢武帝東巡見老翁芸於道背上有白光高數尺帝怪而問之有道術否老翁對曰臣昔年八十五時衰老垂死頭臼齒落

有道士者教臣服棗飲水絕穀并作神枕法中有三十二物其三十二物之中二十四物以當二十四氣其八物以應八風臣行之轉少白髮反黑墮齒復生日行三百里不能棄世入山齋憇孫子復還食穀又已二十餘年猶得神枕之力終不復老武帝視老翁顏壯當如五十許仍驗問其隣皆云然帝乃從其方作枕而不能隨其絕穀飲水也方用五月五日七月七日取出山林柏以為枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以柏心赤者為蓋厚三分益致之令

密又當使可開閉也又鑽蓋上為三行行四十九凡  
一百二十孔令容粟穀米大其用藥

芎藭 當歸 白芷 辛夷 杜衡

白朮 豪本 木蘭 蜀椒 桂皮

乾姜 防風 人參 桔梗 白薇

肉蓯蓉 荆實云牡荆實飛廉

柏實

薏苡子

欵冬花 白術 奎椒

凡二十四物以應二十四氣加八物以應八風

烏頭 附子 薑蘆 皂莢 茵草

礬石 半夏 細辛

右三十二物各一兩皆㕮咀以八藥上安之滿枕中  
用布裹以衣枕百日而有光澤一年體中所疾及有  
風疾一一皆愈而身盡杳四髮白變黑齒落更  
生耳目聰明神方驗秘不傳非其人也豪本是  
老芎藭母也

武帝以問東方朔名云昔女媧以此方傳玉清玉清  
以傳廣成子廣成子以傳黃帝近有穀城道淳于  
公枕此藥枕見百餘歲而頭髮不白夫病之來皆

從陽脈起今枕風邪不得侵人矣以布囊衣枕  
尤當以韋囊重包之湏欲卧枕時乃脫去詔賜  
老翁匹帛老翁不受曰臣之於君猶子之於父也子  
之知道以上之於父義不受賞又臣非賣道者  
以陛下好善故進此耳帝止而更賜以諸藥

比天膏

片腦 牛黃 乳香 没藥 龍骨  
血竭 赤石脂 蘭香合三錢 輕粉 麻黃  
川芎 白芷 薄荷 草烏 全蝎全一兩

防風 連翹 黃芩 黃連 大黃  
知母 貝母 當歸 蒼朮 川芎活  
梔子仁 桔梗 柴胡 荊芥 五倍子  
海漂硝 白芨各三兩 川芎 李葉子 大楓子  
椿枝 桑枝 槐枝 亂髮各三兩 蛇脫  
柳枝

右片腦麝香牛黃乳查沒藥龍骨血竭赤石脂輕粉  
另研俱為細末其諸藥俱剉碎用油浸一宿外用蜜  
陀僧二斤研細每藥一料用麻油三斤以浸過為度文

武火煎至藥煎枯髮焦無踪影退火待冷去滓復入  
火以密佗僧四五錢時時入內用柳枝不住手攪令  
冷水一碗滴藥成珠不散方入乳香五味攪勻退火  
待溫方入片腦麝香牛黃一味攪勻入磁罐內收過一  
七方可用如貼身疼痛及半身不遂風濕等疾  
取生姜搗爛連汁炒熟擦患處三十遍拭乾大烘  
膏藥貼上如覺痒則揭起少復耳烘耳貼此藥治疾  
大抵無弗効者如貼治噎膈氣盛心口寶三錢如無  
牛黃狗寶加天鵝油三錢代之

余嘗嘆醫道軒岐得天地之神化之  
術傳于萬世世之言醫者陋不得一方輒  
自秘竊一效輒自奇窺管誣天病在腰心  
而罔覺仲景廣伊尹湯液爲大法襲而珍  
之者不知凡幾世矣

侍御屏崖王公觀風楚省爰出是集命荆  
門守楊充甫梓行楊大服曰仁哉因以素  
驗奇方附於后夫軒岐得天地之心而壽

醫仲景得軒岐之心而廣法

侍御得仲景之心而示方而牧守又得

侍御之心以廣劑皆可傳矣余過荆門會  
充甫付本州別駕部謫郎應仁卿校是  
囑余尾語余訝謂曰君與仁卿會脉知醫  
是集之足傳仁者之用心也余何以哉余  
何以哉

嘉靖甲午春閏月吏科給事中南山戚賢跋



