

池田家痘疹記聞

X

i 70

490.917
IK-7

No. 2164
12 i 70



富士川支那
1351

池田家痘瘡記聞



呉人戴曼公ノ亂ヲ避テ初我肥前崎陽ニ来ル其后彼此跋
涉ノ間而刈岩国ニ住スル一二年盖地理畧呉國ト坊彌タ
リ吉川ノ臣池田七兵衛与曼公相見ヘテ文リ善レ曼公
授ヒ治痘ノ術ヲ以テス七兵衛ハ乃チ瑞仙先生ノ曾祖父
也七兵衛コノ術ヲ受テ其家ニ傳ア瑞仙先生未タ成人
ナラサルニ其父ヲ喪フ因テ其父ノ弟子桑原玄仲_{岩国ヨリ}
此術ヲ授エシト也先師ハ乃チ方策斎藤子ガ此術ヲ受
ル处ノ師也曼公其后黄蘿山隱元和尚ニ從ヒ名ヲ独立
居士ト改ラレシト也

總論

見点至收齧十日為痘中癰瘍非痘中之數一粒見点為
大極前六日為陽后六日為陰

痘瘍流行取一室內小兒癰瘍レタリ凡見点セザレ内ハ
決メ痘ト云トハ知レヌモノ也

痘ハ陰病也病室宜暗室

痘中十日ハ診脉セス又腹候モセス診セサルトハ脉候ニ足サル
也且小兒多^{ムラカミ}腹^ラ梅^スシハ下利^ラナスモノ故却テ害アリ^ノ診脉セサ
疹^{全首ニ}始終寒熱虛實ハ唇舌ヲ以テ辨ル也痘有八症
見ヘタリ

血熱

毒瘍

氣虛

血虛

表虛

表寒

裡虛

裡熱

右八症ノ外ニ出テズ故ニ病人ニ向ヒテラハ是氣虛是毒瘍トヤト
八症内ニテ何症ト云トラ定ムヘレ症ラヨソ見定メサレハ治ラ誤ト

大也可惧也

痘ハ面ヲ目當テトス面ニテモ最天庭ヲ目當トス周身貫膿レ
テモ天庭貫膿セザレハ先症周身貫膿セス共天庭貫膿
スレバ生訣

四節口法 痘科鍵治法ノ次第初ハ升阳散膏癰^点炎^点
熖解毒^起次ハ托裏行薈^膿次ハ補脾滲湿^收此^ノ
四節トス池田云^ト托裏行漿ト補脾滲湿トノ間ヘ補中益
氣^ヲ入^レ也此^ヲ口法ト云^ト補中益氣^ヲ一月^ノ場^ハ貫膿終^ノ日午^ノ后
ヨリ收齧^レ即^ハ日午^ノ后^{マテ}ノ更也

齧不出者二日死出不齊者六日先無膿者九日先稍有膿者
十二日先是痘科鍵ノ說也皆大極ヨリノ日叢^{ナリ}醫^ノ說
齧不出者堯^ニ契^ノ初日ヨリ四日メニ至テ先出不齊者堯^ニ契

ノ初日ヨリ七日ノミ至リテ先ス無膿者大極ヨリ九日目ニ至リテ先
稍有膿者大極ヨリ十二日ソニ至リテ先ス 池田ノ説四、七日
ニ先ト云フ痘科鍼
ト吳ナルユンハ鮮不出者ナトハ見点卫セサルモノユヘ大極モシレズ是等レ
カラガ見点レヤト云目当キユヘ癰勢ヨリ計フルナリ是等
証ハ一日癰勢スレハヤ見点カケル麥ノ毒勢ア速ナル痘ユヘ日
數ヲコノ通ニトリテナヤヒナキモノナリ出不育者ハ大極モ
見点シカズ故己モ日數ヨコノ通ニ取テ千ヤヒナキ者也本痘科鍼ノ説ト先期
異ナルニハ非ス日數ヲ數フル莫ノ異ナル也

周身貫膿ノ天府灌膿セサルキ輕キ症ニ生ル者アリトイヘ共收醫
ノ敗必后頂癌毒ヲ癰スル也癌毒爻九スルハ毒癰ノレフニヘ丹
伏ノ毒ナレ吉兆也

痘科鍼利ノ卷十一曰大都自肩以上百幾点悅日可爰又不
瑣屑不歪斜虽遍體稠密雜証百出終不至先以上痘科
建之文也
コニ幾点悅日可爰トシラ池田家三テハナニタル也自肩以上

ヨカラサル痘百アル中ニ悦目ノヨキ痘ニモアルハ不至先トスル也ヨア
ラサル痘千百ヲ以テ計フル中ニ悦目ノ痘絶ニニ三点カ四点ア
リケルトテ不至先トスルニアラス

凡先スルハ一期ノ終ニ先ズ者也故ニ其癰勢ノ仕始ノタル時刻ト
大極ノ時刻トヲ以テ先期推知ラル也 四日七日ノ先癰勢仕始
ヨリ計フルナリ ヨリ計フルナリ九日
十二日ノ先ハ大極 凡二歳位ノ小兒先期遲ハサルモノ也一
二歳ノ兒ハ先期早一二歳以上ノ兒ハ先期晚ナリ
大低痘疹ノ脉ハ虛寒ノ証ニモ浮敷尤者也故ニ脉特
ニ足ラストスル也

池田先生曰諸証ノ阳氣從外入痘疹ノ阳氣從内入面部
等處茎同取ニ見点貫膿收醫スルハ順也

試痘輒痘瘻痘ニカキラス諸証ニ先キタツテ疾ノ膿ヲモツ

割破スルカヨレ然ラサレハ此痘ニ勢ヲ奪ハレ諸痘貫膿卫セサル
者也先キガケスル痘大粟大ナルモノ也是也由家ニ至シ松井ト元也
然ラサレバ未熟才モノ免角誤也
蚊近癰疽ノ如キ血至氣不糞スルハ多小腹ニ發スル也是毒瘡也
也七日ニ先スルノ証也

大抵哺乳兒ハ痘ノ毒ソ次食スルヤウニナリテハ准症ア
ルモノ也
病室諸不淨ヲ忌ム勿論也液臭經行キノモノ別ソ病室エ
行ケテラ忌然共親兄弟杯家内ノ者ニ是アルハ仕方亡シニハ胡荽
一味ヲ第末ニシ酒ヲウチ尠レ木錦袋ニ入懷ヘ入レ居ルヤヨシ穢
氣ヲ除トセ總テ胡荽ヲ袋ヘ入病室ナ四方エ釣リ置ク
カヨレ 明人聞人規カハ十一論ニ有

凡テ病室工行モノ次ノ間ニテナシ洗避穢氣薰法ヲ以テ莉

芥大棗炭ニ味筋末ヲ薰ノ病室ニ入ル、ヘシ医者ハ別メコノ
通ニスヘシ

癰瘍一日ニノ見点スルモノ大ニ重シ二日ニシテ出ルモノコレニ次ク
一二日晚アタリヤテ瘍サメ四日ノニ痘出ルハ至極吉兆也
癰瘍五六日モノ出痘セサルハ大槻汎寒ニ襲ハレトスル也
痘腫ヲ貪レバ始終吉ナリ

肉中紫紅塊アルモリハ必血熱ノ毒瘡也ノ証也
紫紅塊梅李大根加味

加減益元湯ノ証ハ痘瘡メ多シ、矯嗽有リ。

瀉血便血ハ毒瘻ア血熱ヤノ症也清涼攻毒飲涼血攻毒
久血熱ナラハ十神解毒湯ノ類
頭溫足冷等ノ純虛ノ証ナラハ初ヨリ加減益氣湯ト

用立升麻葛根湯ノ類ハ用ヒス

痘中貫膿アリリ其外イツテモナク、取痛スルモノ、有元角発熱、中吐瀉ナトシタルモノニ薦古ニ言フナケレハ毒瘡ニモアラス、兔角アリウキ、著故ナ、ワスニ置クヤヨレ甚シレハト建中湯ヲ用

三日六日ノ先ハ寒熱也、九日十二日ノ先ハ虛寒也、是大法す

薛立齋ニ言

氣虛ノ痘先一二禁ヲ知ルヘシ勿攻、發勿清涼勿解毒、始終保元四君ノ加減、宜レ救偏瑣信ノ諸池田案四君ハ用ヒス

肉脹者不痘脹見点二日メアタリヤラ、肉脹者不痘脹是毒瘡也、九日ノ先ニナル也

肉脹スヘキ痘ニ始ヨリ終ニテ肉脹セサレ、余毒ノ慮有

痘后發黃者、兔角過食ノ起ル也、穀疽ノ氣味也、唯痘ニハ灌膿收癰アタリニハ、女シ声嘔ミル者アレ共証ニヨリテハカ、ワズ然共ニ幹声嘔ハ好一又更也、見点起脹アメリニ声嘔スルハ甚惡レ大毒瘡也、声嘔平音ニ云フ時令ニヨリ知ル、ナリテハツマラスナリレス声嘔白人ノ知ルヤウニ

小兒頭瘡ノアル者ハ其痘必山條ナリ、勢ヒラ風瘡、奪ハヒニヨリテ痘カ十日ニハ、張出サヌ也

斷腰無根トキハ痘ノ根ノ散レテシテラ又ヲ云也

中位ノ痘ハ期ニ当ル、輕き、解ニ進ハ重キハ期ニラクル也

大抵痘十三七八ハ氣虛ニ屬スル也

兩腮ノ間ニ悅目可愛モノアリテモ天庭皆惡痘下テ炎聚不治ナリ

凡無勢毒瘡ナトノ証ハ六日迄ニハ解毒ノ虛一通リニ置
テ六日中后ヨリハ補托一通リニセ子ハナラヌ前ノ解毒
行届ヤ子ハ參附杯ヲ用ル補托ノ時カモツレニナルナリ
痘ヲ撫ルニ手ニ子バリツシテナルハ惡レ痘レーリヨシキツシ
リトシテサメヲ撫ルア如キハ吉ナリ

起脹貫膿ノ敗ニテモ唇腫ナトルハ兎角走馬牙疳
ニナル者アリ早ノ毒ヲサハヤ子ハナラヌ灌膿ノ時走馬牙
疳ヲ発スルハ不治ナリ

凡補托ヲ行フ痘飲食ヲキハ氣虛ノ目當也毒瘡各
別也

痘皆水泡ナレヒ至テ輕症飲食モヨシ進ミ外ニ何支モノ
ナケレハ溫補ヲ行フテユケハ間不先モアリ是必余毒ヲ

發スル也夫ニテ伏毒ヲ発レ、マウテ先ヲ免ル、ナリ

痘一期ノアハヒニハ必発契フルモノナリ

痘中微渴ハ常候也

疳蝕瘍ハ余毒ノ次第ニヒロガルモノアム

倍間收膿ノ后ニ契湯ヲ手拭浸ニス也是ハヨカラヌト也
乎ニハコレニヨリテ風寒ニ感スル物也蛆痘又ハ板梗ニリテ
舌ニウミヲ含ムモノ矣ム也其方米泔水一升ニ酒ニ合ヒテ
温メ巾ヲ漬ス也

倍間ミスルモノハ米泔水ノツクワカレ其中エ酒ヲナシ加ヘテ
赤小豆二粒粟糲三粒小麦一二粒入ヒテクス也是ヲ湯
ヲ引ト云

痘頭陷ノ其处チヨホト黒キハ毒也千金内托散加堯類

肉腫ノ早キ有毒氣虛諸証引合セテ見ケルヘニ氣
虚ナレハ其腫アンハイ如何ニモシテラヌヤウニ見ケル也

全不換ノ白褐不々明池田家ニ去之

池田ニテ家戸トヨハ曼谷市ナリ

痘十驗 十驗モ多クアテニナラヌナリ

様痘トテ兒ニ氣ヲ飲スル母ヤ又ハ乳ヲモヤヒ餓ミシタル兄弟ナト痘ノ汁ツキテウツルモノ也痘ニハ非ス癰テシタルモノモ未シ病サルモリモトモニコレヨリウツルナリ

診候

痘ヲ診スルニハ燈ヲ喫メ見ルヘシ紙燃ハ赤紙ヲ幅ニす位サキキニテ輕クモミ隨カ輕ノヨリ平ニコキ油ニ浸レ燈ニアフリ油ヲフキトク火ヲ有ル也痘ヲ見ルニ紙燃ノ傍ニ及フ

手掌ヲ覆ヒ火ノ明ヲ脇ヘナラサヌ様ニスル也明大ニ吳す痘ヲ見ル次第口吻ノ停ヨリ始一リ天庭ニ至リ頭中ヲ見テ畳ニドリ外面咽喉脣子腹脣前陰后陰背兩足ニ及フ

痘ヲ診スルニハ内ニ證外ニ證十症ヲ立テ見ル也必シモコドト云定ヘリシルヲ無レタトヘハ形色ハ外证唇舌ニ便食餌ハ内症是ニテ内外十证ヲ立テ彼邊引合テ見テ順逆先生ヲ知ルヘシナ証ヲ立テ見レハ大槻見落シナキモノナリ小兒ハ自ラ病状ヲシテナス故ニ股痛腰痛ワカリ兼生ノナリ大抵反張トレ偏倚シテ啼ヲ腰痛トスル也痘ノ顆粒ヲ見レニ頂根脚地ト見シヘレ小兒末タ右ヲ出スヘキセザルハ啼スレハ右見ルモノ也

口中ノ氣ヲ候フニ歎ヨリ外、指ヲ横ニメ唇ニ添テ候フ才

口中ノ温考
ラ候フ才

小児ハ外感風寒ノ証ナレシト惡寒、スルヤ否ヤ脇ヨリハ知
ヒ文モノ也肉上粟起鼻涕出ル等ヲ以テ知ルヘ

發 梗

發 梗ノ間先大法用升麻葛根湯風邪アレバ加味升
麻葛根湯桂枝葛根湯ノ類撰用ユヘシ又或始ヨリ
血 梗ノ証候アレハ十神解毒湯毒瘡ヒハ清涼攻毒飲、
氣虛ナハ加減益氣湯溫中益氣ノ類正ニ後テ用エ以上
諸症唇舌有訣先梗中耳后紅繩^ラ見ハスモノアリ診
候スヘシ紅色ハ梗輕シ朱色ハ梗稍重シ紫色ハ梗又一等
重シ黑色ハ梗甚レ大忌候縛一二條^ラ見ハスハ梗輕シ縛

縛多見ハルハ甚シキ也見点六アリテモ梗アレハ耳后

発 梗見点ノ間唇舌清潔滋潤則虽当忌吉兆后反
虛証ニ変スル者也可預慮不可過用升麻葛根湯斐
発表劑腋下ニレツトリト汗ノ淳シ位ニシテ直ニ加減益氣
えル也汗出ル丁過多七ハ表虛ノ貫膿ノ既ナ漏痘トナ
ルモノ也切ニ慎ムヘシ

発 梗見点ノ間唇舌乾紅則升麻葛根湯ノ后用十神
解毒湯二日大便秘スルサハ加大黃

発 梗見点ノ間唇舌乾紅ニメ白脂アルモノハ多大便
秘スル也十神解毒湯加大黃或清涼活血湯
升麻葛根湯ハ発 梗ノ間ノ善也見点ノハ証ニ隨テ芦

ラ轉スル也

唇舌清潔滋潤ナラハ中ニ鬱伏ノ毒ナキト知ルヘシ
堵スヘビコノ舌アルハ起膿脹貫膿アリミ虚舌ニナリト思
ヤリテ最初ノ癰發過メヤウニメ加減益氣陽杯ニテ補
丁行キサヘスレハ危トハ無キ者也

癰發、貶股痛ノモノニハ敗毒和中散便秘ハ加大黃
コレモ先ツ升散ノ第用テ以后ノトナリ升散ノ第三
止ムモアリソハ敗毒和中散ハ及ハス
是証舌ハ乾紅又ハ苔アルモアリ癰發、貶呕泻酸臭
傷食ナラハ呻吟平胃散治方升陽散膏ヒカル大低升
广葛根而毒盛而氣寒者加味升廣葛根湯
舌ニ胎アリテ乾燥スルハ癰發ノ最初ニテ直下劑
ニ宜シ不可癰散

見点 大極ノ定毒シヤラサトハ治レ難シ一粒見点ヨリ

二十六日ニテ一期終ルコレ二日三夜也先スルモ次一期
ノ交ナリ

一粒見点阿胶ト云フ詳ニスヘレ是乃大極也痘ノ終リニ
大極貶ヲ推テ行シ也故ニ至テ詳ニスヘキ也

天庭山根年壽人中風漿先見点者重シロ吻ノ停先見
点ノ者輕シ

見点ノ時分思様出浮カス、舌ニ平古ニテ滋潤有リ文シ白胎
チヨホカリ心中慎懼ノケシキアリ口ラムグニシテエツキアリ
煩悶不眠、免角蛇虫ナトニテキレル者ナリ是ニ參ノ連陽加山
豆根沙参人參代ラ用テ吐スル也是ニテ得吐セシハ雞翎ニ探
リニ六度モ痰、沫ヲ吐スル也是ハ氣虛ノ痘也吐后睡眠ス
ルヤウニナリ能出浮モノ也跡ハ加減益氣湯ラ用ルナリ

見点白ノ如水珠者氣虛アリ毒瘡アリ見分ケ難レ良
古ヲ見テ分ツヘシ

矯嗽ノ主方ハ加減益氣湯詳見前至立日不退紅ハ保元
湯加丁子糯米詳見前起脹部

見点后推大極法

朔日ノ朝六ツ時ヨリ發熱ニ夜四

ツ時ヨリモナリテハ早マ天庭アタリヘ二十金リモ痘出レト病
家ニ云ハ、是等ハ惡痘急証故大体一位時ノイレラレテ
夜六ツ時ノ大極ト定ムベシ是等勿論惡痘急症ユヘ先天
大瘡重証ハ勢急ニ 又朔日ノ朝六時ヨリ發熱リ二日
輕症ハ熱門緩ナリ

ノ朝五ツ時ニ痘出レト病家ニハ、前ノ証ヨリハ女ニ勢緩
キ氣味故女ニ心持ニテ又イレラレテ二日ノ朝六ツ時ヨリ
發熱メ三日ノ朝四ツ時此顔頰エナ四五モ痘出レト病

家言ハ、是等ハ前ノ症ヨリハ又勢稍緩ルニエヘニ二時モイ
レツシテ三日ノ朝六ツ時ノ大極ト定ムヘシニヨリ出ル發熱ノ三日
齷齪顔頰當リヤラ出ハジタル又朔日ノ朝六ツ時ヨリ發熱メ三
日ノ晚ヨリヨリ女哭サメノ冒ノ晝九ツ時痘口吻七八モ出
レト病家ニハ、是等ハ至極順痘ニテ勢大ニ緩ルニヘ
ニ時半モイレラレテ四日ノ朝六ツ時ノ大極ト定ムヘシニ大
法也三日モ發熱メ四日モ出痘スルハ大瘡口吻ヨリ出ノシテ后ヘビタルハ療治ニラレツユヘ惡シ、勿論大極ハ正
直ニ立置テ療治ハ皆先ラ取テ行ラ常法トス
見点三日出育ノ時ニ至テハ平痘ヲ見ストテヨリニテノ諸

証退テ氣モ委カニナリ食モ増テ平証ヲ見ハスモノ也己
ハ毒外ニ出モノ内炎ヤニナル也コレハ至極ヨシ
見点痘顎至テ硬シアラサゾラ撫ルヤウナルハ免角山
嵐ノ氣ニ中リタルモノナドニタツアルト池田先生云此ニ六桂
枝葛根湯ノ類

起脹

痘科鍵利ノ卷十、丁目痘至五日而内外症平宜皆起
發不退紅正氣虛也提コテ痘是乃矯衆也池田三
ハ此瘡工保元加丁子糯米ヲ用ヒ

痘ノ紅暉朱ノ色ヤ紅ノ色ヤラ見分ヘシ詳見于辨證
起脹ノ時四五月モ私便スルナラハ下証ナク凡四順清
涼欠杯ニテ便ヲ通メ置クヤヨレ左十ヶレハ貫膿モナ

シテ便通スル也貫膿ノ時便通スルハアレ、

起脹ノ時漏泄リ微渴スルハ常候す

痘四日起発大キニ駁チモノサット見レハハヤ貫膿レタ
ヤフニ見ユル也是痘苞裏スル也膿ニ非ス別メ廻リ
ヨ黃熟スルモノ有リ是等ハ兌角倒屬メ十二日ノ先ニ
ナル也是表虛毒甚也何分舌ニ氣ヲ舟クヘシコレニキ
金内托散ヲ用ル嚮多シ

痘立六日眼不封鼻不塞者虛之極翁仲仁言也
起脹ノ時少々内脹ノ增小便少々微渴スルモノナリ

是常候

貫膿

停漿トテ貫膿シヤケテ得セ又モノナリ是氣虛す

痘ノ四圍ニ氣ヲ付テ見ルヘシ紅暈散漫ニテニラ首痘西圍

ニガニ雛テキルモノナリ主方ハ參坂鹿茸湯

貫膿ノ敗右冷自滋潤ニテ白ソツルムシタルモノ古ノ奥ヨリ
ヘツクリト見エル是大虛矣也詳観于唇ユノ出ルハ八日九日
ノイセコノ敗ハ頬リニ附子ヲ用テ行扁ナス也附子一麦位入
キル茱一日ニ四帖モ用外ニ参附湯モ第用ス参附ノ兼計
ミテ粥ヲ莫テ食ハスルトモアリ見合ニスヘシ大低貫膿ノ
時参附ヲ用レ痘ハ兎角渴スル者アリ夫故善モ飲マスシ
貫膿ヨリ收屬ニ移ル場ニテ微渴スルハ常候ナリ九日
午后ヨリハ補中益氣歸生脉散合市

周身貫膿ノモ天庭貫膿セサルハ先证周身貫膿

セス云天庭貫膿スレハ生証 詳于總論中

周身貫膿ノ天庭貫膿セサルモノ難キ証ハ生ルモノア

リ口上

唇白舌ニ及ヒ舌白唇ニ及フコト治キハヘツタリトイツハイツル
謂之内潰大虛寒也指手口中ヲ候フニ寒ナリ鼻息
モ寒、陰囊モ縮ルナリコレハ建中帰

痘九日午后ヨリ立法ノ補中益氣ニ移ル十日午后ヨリ
補脾滲湿ニ移ル是大法也

貫膿ノ敗ニリテハ腹中雷鳴ハセスカ轉失氣ハセス
カト能ク氣ヲ付テ同フヘシ雷鳴スレハ必轉失氣出ルモノ
也是大便下利スルノ兆也預メ吟味スヘシ

貫膿ノ敗分濃薄ヨク見ルヘシ膿ノ薄キハスカシテ見六
米泔水ノ如シテモロくシテクニアワヌヤウニ見ユル也膿濃

キモノ、黄色ニシテ子バク見エルナリ

貫膿ハ日ノ夜ノ癰カ子或ハ驚キトホルハ翌日必変厄セ
收膿ニヤル敗分ハ何程ノ輕症ニテモ心痒アルモノ也
貫膿ヨリ收膿ニヤル敗分痘土黄色ニメ板硬者是表
実ノ证也古見合セテ虛舌ナレハ此敗ハ大聚子金内丸散
加暖叱ラ用エレハ瘻一段ハリアル也此痘也、ウスニラケハ
貫膿中大便通スルハ惡ケレハ九日午后ヨリ一行位通ルハ
好ニ又トナレハ瘻煩度ニノ云ナリ参附本スルカヨシ規用ルノ痘此例ニ非ス
貫膿ノ貯氣衝因喉ケキアリテビソツキテガレ反張ケキ
ノヤウニ見ヘ延多ノ出ルモナリ是毒内攻ノ兆ナリ此瘻ハ必
舌ハツルベツタリす

肥破淋漏ハ一奇散ヲフリカケル甚シキハ蕎麦粉カヨシニ奇
散ニテ行扁カス

收膿

痘九日ラ過テハ參附用捨スヘレ然ラサレハ眼病トナル也詳用度中

收膿ノニ二驗一、貫膿得モタニレ痘補托ノ葉用ニテ旦
ニ元氣ノ續キアリテ收膿ノ貯ニテモタヘタルカ收膿ノ貯下利
メ痂皮膿ラ下セハ吉トス是灌膿ノ貯膿ラ得モタサレ反
コ痂皮膿ラ下スラ以テ伏毒ナキ也伏毒ハ大連皴欠证ニ因テ
ハ加大蘋根ニモスルナリ
二、貫膿ノ貯膿ラ得モタサルカ收膿ノ貯空地エト
痘俄ニ出直ニ膿ラモタアリ是ラ補空痘ト云翻空痘
丘層出痘ニ吉也之ラ出スラ以テ伏毒ナキ也一二、貫膿

膿取膿ヲエモタサルカ收屬ノ敗癌毒ヲ発スルハ吉也
之ヲ発スルヲ以テ、伏毒ナキナリ。

ニニ驗ニ外伏毒ヲ発レ、ヘラフアリテ灌膿、此膿ヲ得モタ
サルヤ收屬ノ敗瘍麻ヲ発スル吉ニシテ、伏毒ナキナリ。
貫膿ノ敗倒陷ニタルカ温補ノ功ニ依テ收屬ノ敗段ニ
痴厚ノナリコノ下ニ膿ヲモツコレバ、托屬ト云。托屬スルモノ
ハ吉也コレニテ、伏毒ナキナリ。

收屬ノ時上唇腫堅キハ走馬牙疳ヲ発スル兆也。早ク大連羌欠
加大黃ヲ用ヘシ。口臭モ同シ。走馬牙疳ニナリタラ、京隔散用ヘシ。
漏痘后ニ爛痘トナル臭アルヲ良癪痘ト云。臭ア発スルハ毒氣外
凡收屬ニ臭アルヲ吉兆トス毒氣外発スルユヘリ。尸臭ノモノハ先ス臭氣附
袖テ不去モノモ先ス。

表臭十キモノ多ロ臭アルモノ也。追付走馬牙疳ヲ発スル也。氣ヲ
附早ク吟味スヘレ

痴厚キモノハヨク膿化シル故味芳レ薄キモノハ味辛レ
收屬追発契スルハ常候ナルヤ故ニ恐レ、ト勿レ根ヲ薦
メ屬ヲナスア故也。大ニ発契スル者ハ余毒ニ慮ラズニ
一敗ニ屬ヲ結ヒ或ハ屬ノ即痴ノ落ル者ハ毒ヨリテ銷鏘
スルカ故也。大連羌欠加大黃ニテ下之。

十二三日ニ至テ形ヤケトカ又ハヤケトノヤウナル者アリ。其證音清
ク食スミ神靜ニ氣爽ニ睡卧寧シ唇舌澤クノ肥破
淋ナルハ愚也。汪氏解毒欠主トスヘレ

收屬取ト收屬セス或ハ痴厚キモノニハ、汪氏解毒欠
当屬敗流漿不止ハ温表調中帰

ラ用ニハ痂厚ソナルナリ

陰逆痘症收齶ノ時一面ニミツヤニナリ板梗ニナリ其中ニ膿
カワクスレニ一面ニ上皮硬リテ上ヘ膿カ出モ卫セヌニ汪氏解毒
欠ニ加反鼻圭支ニテ中ヨリシカレタテルヤウニスレハ硬皮モワ
メツキ膿ガシワク外ヘ出コノ時ハ内カラ涌レタテル弊カユヘ契モ
出甚キハ譲詔杯スルアレニ是ハ氣遺ナシ其時大連竟欠加
大黃ヲ用ユソフスレハ又膿モカワキ契サソ前ノ通リニテル又汪氏
解毒欠加反鼻桂支ヲ用ニ其時又前ノ通大連竟欠加大黃
ヲ用元勢ニテユヘコレヲ用裁度モコノ通りニテ行ケハ次第
ニ皮中シクニメ膿モ外癰メ痂厚クテキ落痂アルヤウニモ
也此症ノ始ハ滋潤ニアレニ汪氏解毒欠ヲ用テ契ヲモタス六
右モ乾紅三十日既大連竟欠加大黃ニテ解毒ス又古滋潤

