

天鑑堂醫正策

古

X

t 29

490.9
Is-1
2

No. 4013
187 29



1398



醫西策下

平安 垣山千秋先生著

門人 淡海 齊藤謙治直

中河文翠竟全受

近來兒童罹痘連不遺一夭亡亦不啻先生最善豆治
門人輩以爲急望相議齊口請其新傳強固不已於是
先生口說其約門輩承當筆記以示其新方一讀爲昂
藏痘醫

夫痘疹ノ初候ハ直ニ發熱頭痛脉數急或吐瀉或發驚
搐搦煩躁ス是尤テ裏ヨリ表ニ達スル症ニシテ表ヨリ
裏ニ傳ル病ニ非ス何トナレハ寒邪皮膚ヲ犯メテハ
先寒レ其后發熱ス然ルニ痘疹ノ症ハ初発ヨリ直ニ

熱シ睡中微悸鼻中出氣粗ク一人モ先惡寒スル者ハアラズ是ヲ以考レハ痘疹ハ熱邪ナルト可知

痘証ヲミルニ初發ヨリ四五日モ過ハ必自然ト嚏ヘアリ其喜テ嚏ル痘ハ熱即解ス甚輕キ順痘之初ヨリ痘症ト知ラハ裏熱ヲ解スルノ剤ヲ与ヘレハ此スレハ痘數多キ者ハ少ク輕モノハ愈輕シ此時ニ臨テ古今ノ医專ラ升葛敗毒或桂麻ノルイキ用テ發表ヲ常トス是甚誤也以傷寒論准之ハ初ハケ陽直進陽明

年齡五十以上ノ人痘疹菊目石ノ如或ハ眼鼻ノ缺損スル人徃々アリ此ニ今時ノ痘ヲ患ル者ヲミルニ如此難痘ニ至テ治ルモノ少シ且痘數多ナレハ何分ハリ少シ難痘ト云

ニモ至ラバ灌濃末ニ惡症雜出メ死ス古人所謂痘ノ死生ハ膿ノ有無ニ判ストユレ宦言ニ以テ考ニ今ノ痘毒氣皮膚ニ空癰スルト不能メ死ニ至ルモノナルヘシ痘疹ノ首既見内攻之症者甚以爲難治タトヒヨク医治スルアルモ十ニ以手防急流水カ如レ非某治所及然余家獨ヨク治之血腦子千手丸而已

疹医不達新方之意難以医痘可見加天文博士之與舟師論陰晦風雨細變不反優乎一不識舟子其唯改之爲貴擇之爲善今治論大畧舉左

夫患者面白色赤頭痛發熱或腹痛吐瀉驚悸擣撓煩躁等之証ヲ發シ惡寒ナソ只一身悉熱者爲痘疹伶參湯主

之方

伶參三分 紅花二分 黃芩二分 大黃二分

茯苓三分

羚角五分

甘艸二分

防風一分

黃芩三分

連堯二分

山慈姑五分

生姜三分

右十二味爲一貼。番紅花汁ヲ以テ煎服スニ便快通解熱出痘セハ萬全ナリ。輕症太大黃可也。初發下利甚者不可太。大黃速用此方世医見利用。洪不知通因之術故也。誤之者出于此。サテ服後魚腸白脂ノ如キモノ下ルアリ。痘毒サルニサレハ出痘快レ且順痘ナルヘシ。若或大便熱閉不通。毒氣不下モハ兼用穆王丸或湯茱萸ウケズハ万億丸或千金紫圓可用シ。

番紅花ノ汁ヲ取汰。番紅花一錢許袋ニ入。熱湯ニ煎レ汁ヲ取り煎茱萸ヲ煎ス。

痘ハ五六日以下不用下剤。爲善初熱ヨリ不大便八九日ノコロ大熱煩躁アル者ハ伶參湯兼穆王丸方

白焰硝七分 大黃四分 丁香一分

右三味為末糊丸。加粟粒大辰砂為衣。

万億丸方

麵

右一味酒ニテ堅ク子リ巴豆五粒ハカリ皮ヲ去リ麵内ニ入レ布袋中ニ包ミヨク蒸レ巴豆熟ヘルヨ度トス。巴豆ヲサリ出レ辰砂ヲ三分入レ糊丸。粟豆大用之此方驚風胎毒及諸ノ急症アルハ胃中ノウツ子ツノ

モノ又此丸ニヨロシ

痘疹二三日發熱煩渴者令參湯兼滑黃丸麥門冬湯加連石並主之方

麦門五分 糜米三分 黃連一分 石膏五分
甘草三分 大棗二個 生姜

右七味前ノ番紅花汁ヲ用煎服入熱散小便清出痘セハ唯乳汁ヲ与ヘシ必矣ヲ服スルニ不及初熱ノ時熱勢少ク面部スコシ色ツキ只痘皮下ニ隠々トメ四五日ヲヘテ一、出ルド金一向起脹セズ而色撫々メ内攻ニ似テ内攻ニ非ス此症コレ瘧受虛弱ノ兒ニメ毒氣表ニ發スルト不能ナリ此前ノ下剂ヲ用テ必攻

ムヘカラズ參芩鹿茸湯主之兼敝甲鍤溫酒蒸玉龍煎亦主之鹿茸湯方

平人參 黃芪 鹿茸 當歸
以龍眼肉 伶參 附子 甘草

古生姜
右九味前ノ番紅花汁用煎シ滓ヲ去リ好酒ヲ入レ温服ス若惡酒者舍之本方若无鹿茸以牛角代之若番紅花ナキ其ハ或藍葉或ハ赤雞頭花ニ代用ニ本方附子アリコレ毒氣ニ似テ毒氣ニ非ス元氣虛薄以テ微トス不然者六不用シ以上諸湯多用羨林酒タトニ順症タリ圧用之可シ令能回膿故也

初發ノ時小便赤血ノ如ク眼目赤ク煩躁スルハ狂瘲ノ如
ハゲレクニユルモノハ治シカタシ然トイヘニ敝甲鍼温酒
蒸玉龍煎穿山甲丸鼴鼠丸之諸方皆以頻服必功アリ
代赭湯亦主之方

鼴鼠

三钱

麒麟血

大黄

辰砂各三分

熊胆

五分

鹿胎子霜

右六味末シ蜜丸用之又不得已者出血之法大効先
以鍼刺委中尺澤移其毒余屢行之取奇効然ニモ太
平之世愛血駁血至得風疾而發汗則爲以常何世人
疏理余血鬱者非痘唯行之萬病行之故以爲世医能
殺人焉夫有志之士勉旃

起張灌膿ノ片ニ當テ山ヲアゲザル痕ハ此方ヲ用ニ敝甲鍼
玉龍煎皆主之范蠡遺方登仙藥亦主之

黃芪

當歸

穿山甲

乾姜

人參

糯米

生姜

右七味煎ノ番紅汁ヲ用煎服ス兼千手丸血腦子一
角粉人糸末以美酒頻与之

起張灌膿ノ片ニ當テ又更ニ發熱者令參湯小柴加紅
花主之痘十二三日ニ至リ大渴者麦門湯主之若喘湧
カコトキ者竹茹石羔湯主之方

麦門冬

淡竹茹

石羔

半夏

粳米

甘草

大棗

生姜

右八味水煎服

草

大麥

米

麦門冬湯方

麦門

人薑

半夏

粳米

石羔

甘草

大棗

右七味水煎溫服又方治渴

西瓜乾皮

瓜呂根

茯苓

藕汁繭汁

右三味煎後ノ二汁ヲ入レ冷服微々以治万病大渴家
毒氣心ヲ衝ント欲ル者前ノ番紅汁二人參ヲ煎シナキ片ハ
以伶浸代之其湯ニテ熊胆ヲトキ用ユ或ハ生姜汁ヲ入レ
以治嘔氣煎茱ハ伶參湯主之若乳食不得ハ死症ニ急
刺委沢ニ瘡血腦子ヲ服サシム妙功ヲ奏ス又卒ニヨリ飲

乳スルモノアリコレ毒氣解スルナリ衝心止テ後唯伶
參湯或七味地黃湯主之方

地黃

夕藥

紅花

黃連

川芎

黃芩

當歸

右七味水煎服

痘毒内攻發熱驚悸不能乳食欲死者

蘘荷根

黃連

右二味煎汁ニテ熊々シヲ解キ用ユ又麻黃連芍赤小

豆湯三味折衝湯合方皆有效血腦子千手丸甲錠溫

酒煎玉龍煎皆奧ノ手ノ法方十リ

收屬ノ片腹痛甚メ手モ近ツケ難キ者ハ是毒氣之七味

消毒飲ニ宜シ此症滯食アリヨク是ヲ可考又一吐メ可ナリ

牛蒡子 桃仁 紅花 乳香

沒藥 大黃 黃連

右七味水煎服又無量解脫九定痛丸皆妙効アリ
結茄ノ片聲不出或痰喘アツテ渴者ハ是津液竭ル故ナリ
非毒氣加味生脉散主之方

麥門 乾姜 人蔘 山朱萸

天花粉 淡竹茹新者甘草

桔梗

右八味絲瓜水ヲ用テ煎服ス

落茄ノ後餘毒四肢ニアツヘリ瘡ヲ生スル者ハ連堯湯主之

連堯 桉榔 桔梗 丁子 木通

紅花 薰香 沉香 甘草 木香

右十味水煎服ス此方只痘餘毒ノミナラス一切胎毒
諸瘡瘍皆用テ宜シ或丁子代大黃若有腫氣者加商柳
或麻黃連軻湯主之方

麻黃 連堯 朮白皮 赤小豆

樟柳 大黃 甘草 銀耳

右八味水煎服

右大抵以上ノ方藥及水ノ多少ハ兒ノ強弱病ノ輕重年
ノ大小ニ從フ故ニ斯ニ不詳分量

泰平之世雖不家富身潤器物漸備故多疊席上之論至
如養痘兒者過愛最勝自招災害不可不辨也夫今世瘡

西醫
卷之二
七
兒風ニアタルヲ甚禁メ或富穰家ニ至テハ冬、時ナレハ
幾重モ屏風障子ヲ設テ表ヲ厚クシ或兒傍備火炉
ナトルマリコレ甚惡シ若如此スレハ痘熱毒氣鬱蒸
シ痒ミ出テ亦症雜出スル事アリ而レ庄未タ痘起張セ
サル以前ハ如此風寒、ヲ避テ起張ヲ摧捉スヘシ起張鮮
研ナレハ何ソ心配アランヤ起張後因循トメ如此厚弊セハ
其変難計然レ庄屏障ナトハ四季或土地ノ氣候ヲ勘
弁スヘシ夏時疊蚊帳ヲ垂ルト可忌風氣能生養ス
只邪氣ヲ受ヌヤウニメ可之タトヘ弓子ノ痘ヲ患ル或ハ
路傍ニ有ト虫各別難痘ニ罹ト云ヘ未聞已得天然自
免過愛可以觀也

古人有種痘汰近時其說ヲ言フ者アリ余亦屢行之尤
有契合故識于此先取輕痘落茹爲細末吹入鼻中不日
而出痘治方已備于先

痘ノ餘毒四肢ニ走リ難愈者取黃牛糞爲末水ニトキ
敷ヘシ若腫テ痛者以鉗針刺之以胡麻油煉敷之若
早ク干カサント欲スル片ハ但フリカケテヨシ
落茹ノ後痘痕斑ノ如クメ甚痒キモノハ蜆貝ヲ煎シ其
汁ニテ洗ヘシ又煎滌法アリ又一門丸可服止痒
痘ノ餘毒四肢ニアツベリ瘡トナル量ヲ取リ手足ヲ太
リ皮ヲ剥キ豆油^{シヤウ}ヲ付灸^{アフ}食ハシム
痘眼ニ入り翳羽トナルモノハ益母草一味煎シ汁ヲ取リ洗フ

或雀ノ生血ヲトリ眼中ニ點入ス或白丁子ヲ乳汁ヲ用テ能トキ眼中ニ點スモヨレ又熊タンヲ乳汁ニトキ或ハ絲瓜水ヲ用テトキ眼中ニ點モ亦皆ヨレ湯ハ小兒要方達降飲防風通聖散ニ宜シ

輕難痘症辨疑

夫痘疹之証初發熱微ニ^メ善食者爲輕痘熱微ニ^メ不

良食者咽痛聲啞スル者難痘也

發熱煩渴ニ^シ或ハ水藥ヲ不入二三日ノ間ニ羸瘦シ眼

目塙藏ノ魚目ノ如キモノハ惡症也

痘兒初熱腹痛似テ腹痛ニ非ス又衝心ニ似テ否ラズ

唯啼テイカン氏シガタキモノハ惡症ナリ

出痘入ヘキセツニ出痘セス大熱呴語妄言口中ノ臭氣甚ク氣息ノ症アリ如此者ハ燈ヲ照テ是ヲミルヘ面部及腹股ナトノ皮中ニ錦文ノ如ク或手腹及足趾ナトノ處ニ紫黑色ナルモノアリ治在此等ノ諸症ハ變ノ緩急ハカリカタシ如此者ハ急ニ死ニ至ルモノシ又如斯諸症ニ其兒本ヂ撰アワテ此症ヲ見スアリ或百日二百日モ前ニ歩撰スト云氏其出痘ニ至テ大ニ害ヲナスモノナリ又或大驚其后初發トナルモノハ治在多ハ難痘之若未痘セサル兒ニメ歩撰アラハ力ナラス先預メ其處ニ於テ出血スヘレ惡針モノハ膈衣針ニテ膿トメ拔ヘシ痘ノ初發ニ衄血シ或ハ嘔吐甚レク或ハ血ヲ交セ嘔者ハ

皆惡治在鍼針見ニ二三日ノ中ニ変証出テ死ス

初熱面色赤キヘ朱ヨツヽ、グガ如ク或ハ二三日モタヽ
ザルニモハヤ出カケル者ハ惡症也

痘足ヨリ先出ルモノハ逆痘ト名甚惡症也其赤キヘ
朱ノコトク灼熱煩燥メ渴シ時く舌ヲ出ス者ハ灌膿ニ
不至メ死ヌタトニ逆痘ニ非ト金前症ノ如キ者ハ膿ト
ナラスメ紫色ニ変メ死ス

初熱ノ片四肢百骸腰痛杖ニテ叩カル、力如ク或ハ胸
中痛モ皆惡症也

初熱一度解メ出痘シ又更ニ發熱ノ後出痘スルモノハ
惡症ナリ

頤ノ下又ハ目尻宋カミ或胸腹ナトニ多出ル者ハ惡症シ
其内胸腹ニ多出ル者ハタトニ面部ニサク凡凶症也多
変症出テ死スル者ニ然ト雖痘能回漿スルモノハ害ナキニ
痘粒ヨク地界ヲ分チ出ルト雖身體只火瘡ノ如ク汁出
テ日ナヘテモ落茄スルヘ不能モノタトニ能食スト
虽死スル者ニナリノ雜出者ハ生ニ此等ノ如キモノ臭氣
強ク看病病人一間ニ居ルニタヘカタキ者ハ落茄スルヘ不
能ト虽死ヲ免ル、モノノ

初熱ノ後出痘麻疹ノ如ク或アセボノ如ク或風班ノ如者
ハ惡症ナリ或初熱ノ内ヨリ出痘スルモノモ皆是惡
症トナルアリ

起脹灌膿ノ氏ニ至テ痘上ヲ針ニテツキタル如ノアト
有者或痘ノ中央陷入者ハ皆惡症ニヨキ痘ニモ如此症
アレ凡ソレハ一向少キニ惡症ハ針瘡ノ如或ハ陷入處
皆黒色ナリ

灌膿ノ氏ニ至リ地ハレ多キ痘ニ膿少キ者惡症也此證
輕視スレハ地ハレ多キニヨツテ痘ニモヨソ膿ノソ、キタル
トミユルシマドナトテ下ヨロセハヨソ山ヲ舉シ痘ト見誤之
痘八九日以後頭ヲフリコトカイニテ領ヲスル者ハ十日
コロヨリ氣急喘滿煩躁悶乱ノ死者也皆毒氣心
ニセマルユエナリ

痘八九日ヨリ十一日コロニ至テ聲不出モノハ惡症ニ

痘起脹以後心下ニ動氣アリヒククトメ起ル者ハ變症出
ルモノニヨク心チツクヘシ或ハ發熱ヨリ心下ニ動アルモノ
多ク内攻ヲナスモノニ其内左乳下ニアルハ巨里ノ動脈ニ
是ハ不苦心下ノ動ト支エ起ルモノハ惡症也

灌膿ノ氏ニ中テ膿ヲナサズ色赤ク起脹ニ似タル者ハ
惡症ニ後紫黑色ニ変ソ死ス日疫十日
灌膿ノ氏ヨク膿ヲモル痘トミエテモ内ニ水氣アル痘
ハ必色淡白ニ善キ症トヤキル、モノニ

灌膿ノ末十日又ハ十一日頃ヨリ葉ヲノムヲ不得モノ
惡症ニ是毒氣心下ニ迫ル故ナリ

外症重レト雖ヨク乳ヲ呑者ハ治スヘニ是毒氣内ニ攻

ムルト少ナケレハ也痘惡症多シト又十五六日ヲ過ルモノハ十七八活ルモノニ

灌膿ヨリ收膿セント欲スルキ乳食スルト不能只唇口ウゴクテ飯ヲ喫スル力如キ者甚惡症ナリ後或寒セシ咬牙出テ死スル者ニ

痘ノ惡症出ルハ發熱ヨリ十二三日或十七八日或二十二三日多シ此日數コロニメ惡症出ルモノニ難痘ニ至テハ必シモ此日數ニカヽワラズ

和列散一名串藥煮散

燕屎

免屎

各等分

右二味爲末以水一合半煮取一合用之治痘毒入眼

七十五日ノ内ナレハ必治ス

又一方白蒺利一味剉煎洗ヘシ痘星ナカル

先考作續傷寒論不敢建臆意擾古而著論擬諸仲景推弘伊尹湯液而作傷寒論不肖謹按仲景正而先考奇猶之陰陽昼夜不可缺也沉溝剛克高明柔克蓋是謂季邇來好剛而弃柔或反于此不肖亦憂之故刻其中闢大事者一二而尋彼思半焉云

論曰傷寒有順經過經兩感隔經之傳而兩膈每殺人順過張氏論之此舉其變夫有穿一日大陽卽傳少陽穿二陽明卽傳大陰穿三少陽卽傳少陰穿四大陰卽傳厥陰此爲隔經一日大陽卽傳少陰二日陽明卽傳大陰三日

少陽即傳厥陰此爲兩感王叔和亦論之順原_{有生至七}而病自愈過有生死隔多死兩感三日水醬不入不知人事卽死雖張仲景立門有方然亦順過二耳我今憫之傳二方隔經者救隔湯主之方用人葛根五錢石斛五錢知母一钱青蒿一两柴胡二钱白芍三钱半夏一钱炒梔子三钱甘草一钱右水煎服此方起死爲生稟非虛語故一見有隔經證卽必主之或疑青蒿用之太多不知青蒿不獨泄肝火尤能瀉陽明之燔且性不動更能益陰○兩感者救兩湯主之方用人葛根當飯各一两麦冬三两天花粉三钱元参二两白芍二两荆芥二钱右水煎服各有妙効○陽明發狂登高而歌弃衣而走見水而入罵詈呼號不避親

疎者太生遠矣用竹葉石斛湯妙矣最貴大劑石必至三四两半斤今傳奇方白虎湯中加元參麦冬各三两茯苓車前各五钱右水煎服此方勝于白虎一劑狂定二而口渴減三而渴止春秋治大渴者西瓜乾皮紅花寒米天花粉茯苓水煎服○癰斑依失治死症也然而斑亦不同有扁身癰者此內熱已盡癰子外有止心窩內癰者熱存于心中而不得出也起斑湯主之方用升麻二钱當歸一两元参三两荆芥三钱黃連茯苓三钱甘草一钱天花五钱右水煎服此方最神春秋客昉施麻疹家有効方中當天粉恐神意存于此乎○大陽症結胸症吳煩燥者主死言不可下即下而亦死夫結胸煩躁所以症或不可治也然此方有妙化結湯主之天花五钱枳實一钱陳橘五

分麦芽三钱天门来白皮神曲吳朱羚角各三钱右水煎
服一劑結胸開而津液自生也此方用天花以代瓜婁不
至陷胸之過猛烈而天花粉即瓜婁之根也最善陷胸而
無性猛之憂枳實消食寬中麦芽與桑白皮同用而化導
更速神曲陳皮調胃有神天門能生津液佐天花有水乳
之合世醫未知也天花得天門化痰食殊有不可側識之
功朱羚實破結最峻所以既結者善開必死者不速其死
也○傷寒涼有臟結之證載在大陽中其實非大陽病也
然則仲景載此者何故正辨大陽有似藏結之症不可用
攻故載之此以辯明矣夫臟結之症小腹之內與兩腸臍
旁相連牽生痛以至竇陰之筋亦痛重則有筋青而死者此

乃陰邪結於陰地也原無表症必須攻裏爲得救結湯主
之白朮五钱人蔘一两甘艸一钱附子一钱當歸一两肉
桂五分水煎服此方意求利腰脾蔘資元陽當活血甘和
中定痛附桂散寒、藏中溫結者自解其功獨異耳○陽明
症中有直視呴語喘滿者死而下利者亦死之文此必症犯
直視呴語而又喘滿下利一齊同見也苟有一證未備尚
不安死倘三症皆視死物決矣然生乃症胃家上燔爲喘
滿氣欲上脫也下利者火降氣欲下脫也先未脫者得法
治之猶可望生援脫散手之石斛五钱人浸一两麦冬白
芍各一两竹茹三钱右水煎服○傷寒壞症乃已汗已下
已吐而身仍發如火此不解之症也遇此症則用何法乎夫

經汗吐下而不治者失治也我傳奇方救壞湯主之方用
人浸五錢茯苓五錢柴胡一錢白芍一兩元浸五錢麥冬
五錢白芍子二錢當歸五錢陳皮五分右水煎服失治後
孱弱之軀不勝重攻故制此方死者可生○傷寒少陰症
惡寒身踶而下利手足逆冷不治之病也蓋陰盛陽無又
下利不止則陽隨利而盡不死何恃救逆湯主之人參二
兩附子二錢甘草乾姜各二錢白朮一兩茯苓五錢右水
煎服一劑而逆回二利止三全瘥○少陰症吐利兼作又
加煩悶手足四逆者死症也上吐下瀉且兼煩躁則陰陽擾
亂拂仰而無生氣可知況加手足之逆冷死決然而發從治
之則可救奠安湯主之人浸二兩白朮二兩桂桂丁香各二錢

右水煎灌之有奇効舍此方又何有別方哉○少陰病下
利雖止而頭眩昏暈亦死症也蓋陽雖回而陰已絕下多
亡陽竟至陰絕原無救方雖然陰陽之道未嘗不兩根而兩
相生也人桂湯主之人浸二兩肉桂二錢右水煎服成功
○少陰病四逆惡寒身踶脉不至不煩而躁本是死物而
以爲可救何全在脉不至未必非寒極而伏也不然陽絕則心空
將絕可知脉之不至未必非寒極而伏也不然陽絕則心空
煩矣而何以不煩但嫌其不煩而躁則陽未絕而將絕誠
可畏耳陽已微絕則陰亦隨之故曰陽而陰回一見此症
急以生生湯救之方用人浸三兩附子三錢炒棗仁五錢
右水煎服○少陰病六七日息高者死息高見於六七之

間明是少陰而非大陽息高與氣喘大殊大陽乃氣喘本於邪盛少陰乃息高職於氣裏而二者何以辨之氣喘鼻息粗大息高鼻息微小耳此乃真氣欲絕牽連氣海故上行作氣急最危之候止息湯主之人浸三兩熟地三兩牛膝三錢麥冬二兩破故紙三錢胡桃仁一箇乾姜五分右水煎服倘疑大陽喘症而妄投桂枝湯輩殺人於頃刻此方必須多服孤疑猶豫而輒止亦未能收功者也○少陰脈微細沉但欲卧汗出不煩自欲嘔吐至五六日自利復煩躁不能卧寐者死症也傷寒而脉微細沉明是陰症況欲卧而不能動乎汗已出矣內無陽氣可知心中不煩時欲嘔吐陽邪併而陰邪爲祟急用祿寒爲是乃失此不溫

至五六日而下利是上下俱亂今又加煩躁不得卧寐明是神脫非死而何然其原因失治至此故傳一方援絕湯與之方人蔓一兩水炒棗仁各一兩茯苓五錢肉桂二錢右水煎服○傷寒脉遲自然是寒誤與黃芩湯以解熱此重寒重寒宜不食今反能食名除中仲景爲死症何夫能食是胃氣存矣如何反曰死不知胃寒而加之寒藥反致能食者此胃氣欲絕轉現假食之象以欺人也此不過一時能食非可久之道病名除中者正言其胃中之氣除太而不可留也雖然備藥未生方用人浸茯苓五錢桂枝一錢陳皮三分甘草一錢右水煎服○傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死此仲景原文也我頻用

人附湯救之貧寒不能備久故立一方還厥湯與之求
兩附子三錢乾薑三錢右水煎服發厥家先用之○傷寒
熱五六日不下利忽然變爲下利者已是危症急煎人蔓
三兩五味一錢灌之又汗出不止之症加焉是亡陽也黃
芪湯主之白朮三兩黃芪三兩當歸一兩北五味一錢白芍
五錢右水煎服○傷寒下利日十餘行脉反實者死方用
人朮各一兩茯苓二兩右水煎服○婦人傷寒中風經水
適來適斷熱入血室則必變爲寒熱時而身戰時而身涼
目見鬼神心中驚悸本當刺期門一刺出血湧踊立已無
奈世醫不敢刺於乳下爰患恐懼於是發狂讖語變症百
出自鑒病之可嘆仲景良巧○產後感大陽風邪大喘大

吐大嘔不治之症也救產湯主之人蔓麥冬各三兩朮當
歸各一兩芎三錢刑芥一錢桂枝三分右水煎服方中的
量寶有神意○產後感風口吐膿血頭痛如破心煩不止
腹痛如死或作結胸皆大病前方主之○產後感少陰吟
語不止煩躁更驚悸者死方用當歸二兩川芎一兩人蔓
妙棗仁各一兩麥冬三錢竹茹一圓丹砂一錢熟地五錢
右水煎服○產後感陽明大喘太汗者亦不治方用麥冬
一兩人蔓五錢元浸五錢桑葉桑十四片蘿子五分右水煎
服實有奇効○產後發狂是虛熱居多方用人蔓三兩桑
葉三十片麥冬二兩元浸一兩青高五錢右煎服○妊娠
臨月忽感少陰症者急用人朮大劑溫之不應則死此仲

景之文也今亦加附肉姜末更妙○妊娠產後手足青一
身黑不救又嘔吐下利亦死○又吐蛇虫者在少陰症則
不治也安蛇湯主之人求各二兩榧子仁一兩白微三錢
桂一钱神曲五分右水煎服非本方制神曲無効○中寒
家手足青黑者不治又面青鼻黑腹中痛欲死囊縮死亡
頃刻救之少遲必一身盡黑而死又心痛欲死嘔吐不納
食下利清水本是不治急不待時速用銚鍼刺心上一分
出紫血少許然後用之人浸一而良姜三钱附子五钱茯
苓五钱朮三两丁香一钱右水煎服○又兩腸作痛手足
指甲盡青囊縮拽之不出蹉曲而卧不治又舌黑眼閉下
身盡黑上身盡青大溲出小溲遺不治與前方加昌浦主

之○中暑家汗出不止亡陽立時氣脫者死仲景獨浸湯
妙矣無則當取一兩黃芪二兩桑葉三十片救之○又發
狂氣喘汗如雨下如喪神失守亦死白虎加人連湯主之
石最用半斤又循衣摸牀以手撮空亦死人連湯主之又
猝倒心痛欲死者不治方青高一兩黃連人參白朮茯苓
各三钱香薷一钱藿香五钱坐夏一钱右水煎服又忽倒口
吐白沫欲發狂身如火燒紫斑爛然者多不可療其斑純紫
則毒盛恐難化耳起斑湯主之方見○霍亂不吐下者香
薷飲主之又腹痛欲吐不能欲篤不得四逆身青囊縮必
死法當用陰陽湯探吐之若不應急用救亂飲治之方人
浸五钱香薷三钱吳茱三钱令朮各三钱附子五分藿香

一隻木瓜三隻右水煎服下喉而氣圓矣若濕霍亂又不可用此方故立一方白朮五隻香薷一隻青高五隻茯苓茯令白朮三隻白扁豆二隻陳橘子一隻右水煎服○水濕家呃逆不止者死症其唯用止呃湯方白朮茯苓各三隻蒼朮三隻薏苡仁一兩芡實五隻半夏一隻人浸三隻陳皮一隻丁香五分吳朱三分右水煎服○產婦痢疾而加之嘔逆者必死也吾有一方不必服藥止須田螺一箇搗碎入麝麝香一分吳朱一分爲細末掩在脐上卽不嘔吐此

至巧也嘔逆一回速以當飯一兩苟蕎菜三隻甘草一隻枳殼三分檳榔子三分右水煎服○黃連一身盡黃兩目亦黃却是死症倘初起治之未可爲死方白朮一兩薏苡仁二兩車前五隻茯苓五隻荆芥一隻因陳五分右水煎服此方產後癰黃因虛者皆治○燥症家燥極生癰疽難以救療原是血燥肺乾也又舌乾燥火炎大腸陰盡遂至糞如年屎又燥極生風手足攣掣者又燥熱之極已生贖癌之兆口舌燥烈幾乎死症又乾燥火炎大腸陰盡遂至糞如年性紅矣如何吐白不知久病之人吐痰皆白沫者乃白血也非痰也世人不信取所吐白沫露於星光之下一夜而

必變紅矣此症苟不早圖變成綠瘀無再生矣唯用六地
四物方中加麥冬五味水煎服○燥極一身無肉嗌乾面
垢駁無膏色足心反熱者聖澤湯主之方乾荷葉赤芍各
等分水仙花三兩爲末每服二錢熱湯三沸服之熱自退
咽乾止而百身盡油○燥症善驚腰不能俯仰男子大癩
疝婦人小腹痛目眴皆突者腎著湯主之方地黃二兩桑
葉三十片山茱五錢沙參白朮各一兩甘菊花三錢右水
煎服○燥極而暉者不治用四物湯方中加炒黑乾姜末
治之○心痛家有二曰寒曰熱寒者手足反溫熱者手足
反冷以此辨之最善散寒湯方良姜三錢桂枝一錢白朮
三錢甘艸一錢草烏頭一錢蒼朮三錢貫仲三錢右水煎

服○治火湯炒梔子三錢甘草一錢芍藥二兩半夏一錢
柴胡一錢右水煎服

以火辯四鼓治方

蟲鼓惟小腹作痛而四肢浮脹不十分之甚而色赤而帶
點如虫蝕之象眼下無臥蠶微腫之形此虫鼓也方雷丸
三錢當歸一兩敗甲一兩酢炙地栗粉一兩鮮者取神曲
二錢茯苓三錢車前五錢白朮三錢右水煎服○水鼓滿
身皆水按之如泥者水鼓湯主之玄午一錢甘遂一錢肉
桂三分車前子一兩右水煎服一劑水流斗餘以至數劑
禁塗三月○氣鼓如水鼓按之止不如泥耳氣鼓湯主之方
白朮薏苡仁茯苓各一兩人浸一錢甘草一分枳殼五分山茱

五
一
水煎服○血鼓其由來漸矣或跌閃而血瘀不散或憂如
鬱結而血不行病乃生矣血鼓湯主之方水蛭三
炒黑必用
大約一兩
取三隻爲則也當取二兩雷丸三隻紅花三隻枳實三隻
白芍三隻午膝三隻桃仁四十粒右水煎服即下血

備急

喉腫閉塞多水不能下雖有神方難施其能今建一法用
附子一箇破胡紙五隻各研末調如糊作膏布攤貼脚心
以火烘之丁時辰喉卽寬而開可以服藥防風通聖散主
之○世人有服砒礮之毒五內欲裂者腹必大痛舌必伸
出必流血而死大黃甘草白芍各二兩當取一兩右水煎

服○凡人夏秋感熱濕患痢便血一日間至百十次不止
者至危也苟用涼寒以止血利藥以攻邪俱非善法今制
一方白芍當歸枳實各二兩檳榔子甘草各二隻滑石三
隻廣木香各一隻羅富子二隻右水煎服○腰間丸方菖
蒲二隻山羊血二隻人薑三隻紅花一隻龜角刺一隻山
慈姑三隻蘇葉二隻麝香一隻腦子三隻各爲末蜜丸如
龍眼核大酒化用居常佩于要間以救久五絕乃縊死
跌死壓死淹死壓死是也因外來之禍而枉死者也
又治邪祟昏迷猝倒者皆可灌之以代蘇合圓主治太
抵相同而用焉

傷寒相舌仲景氏論其概具有可繼其緒然而自門有

幕原之言貴矣攻用下劑雖略有與仲景且吾者彼亦

一癖物而可觀也今別審弘其標云

論曰凡見舌係苔胎者邪熱未甚也胡解之小柴係黃色者心熱也連唇見黃而帶灰色者胃熱也知母見黃而帶紅者乃小腸旁胱熱也梔子見舌紅而白者肺熱也黃芩葉黑而帶紅者乃腎虛而極邪也地黃元參入見紅而有黑星者乃胃熱極也石膏元參紅而有白點者乃心中有邪也柴連紅而有大紅點者乃胃熱而帶濕也茵陳五冷能入旁光但可用一二分不可多也白胎而帶黑點者亦胃熱也石斛黃而有黑者乃肝經實熱也胡桔子白而黃者邪將入裏也柴胡以解之中白而外黃者乃邪入大

腸也必須五冷散以分水則泄止矣中黃而外白者乃邪在內而非外邪在上而非下止加柴胡枳以和解之不見根黃而尖白者亦胃熱而帶濕也勸少加太水品黃而隔一瓣一瓣者乃邪濕已入大腸也急用因陳大黃下之有紅中如虫蝕者乃水未升而火來乘也可用紅而閑裂如人字者乃邪初入心非大創石膏黃連見有根黑而尖白者乃腎中有邪未散紅花龍胆不可見其腹痛與否痛而不可以知母元浸全之黃下之然須并其腹痛與否痛而不可近純紅而獨尖黑者乃腎虛而邪火來乘也可用石膏剖腎已虛而又用石膏急下之否則柴胡危子可以和解也剖是速死也當用元參一兩或二兩以救急多有中心紅暈而四圍邊旁純黑者乃君火相火之炎騰也急用大黃剤加生地黃兩許有能生者矣下而救之十人中亦救五六有中央灰黑

而四邊微紅者乃邪結於大腸也下之則愈不應則死以水枯槁不能潤之中原已燒為灰四顧推送見焰此時又不可竟用補藥蓋邪未散不可補神則加張急適所以害之也必邪下而后可補然亦不可多也有純灰色中間獨兩暈黑者亦邪將入腎也枳實大黃急用柴危若舌又見刺則火熱亢極也是症尤前葉總之內黑而外白內黑而外黃皆前症也与上同法十人中亦可得半生也又有舌卷舌硬舌短砂皮舌數種俱用前方叔之張玉說甚精必愚唯舌中澹黑而外或澹紅或淡白內或淡黃者較貴少輕人中可以前方叔之十人八九人生純紅而露黑紋數條者此水來乘火也乃陰症也其舌胎必滑必惡寒惡水下喉必吐儻現紅黑之舌乃死症也不須治之水極似火力極似水壹皆帶純黑俱不可治傷寒知舌之證目便有把握是古鑒相傳未普世行者矣

余嘗療腫病之人相其舌白胎滑以指歛之微令每觀帶冷因知爲鬼篤之人而斷之同家有同疾其胎芒粗而溫因知擊此世又嘗見一男口唇總赤如渥丹舌最
大紅而熱日後微冷唇口微淡因嫁死於它醫以旁觀焉後果死矣余以爲有萬病先脉腹證見而得徵於舌所以古之不舍也哉乃記

余搜家匱得陶朱公遺方論秦除市福傳次寫書蓋范蠡有三徙貨殖之名爲生于陶之日候時轉物逐什之利則傍以鑿致富乎遁而良巧賈詁之言之符也而除氏之歸化存于斯是希世之寶也余貴客學寔名而取藥其著日新故據蹠實者公之

鴟夷湯

一名少伯散

達鬱毒

瓜蒂十箇

皂角一兩

風茹一固

大黃二兩

右件七藥以遂粉別篩餘藥以水五升煮取二升半和散調攬服一升半得吐下者停後不知服盡靡粥自養

千秋嘗用此多治沉痼痼疾者無算又治食傷又治筋絡紓曲屈伸不利又治癲癇又治疝家拘癰又治沉舊水種又治卒厥中風又治頭眩髮退又治癰毒梅癰又治纏喉風急遽又治喘息陳舊者又治步樸衝心又治脚氣心痛又治陳積病又治流注風毒又治肉癰累歷

又治經閉三年者又治木舌曰瘡又治痔漏又治青盲又治禁口痢又治蠅症又治勞瘵初起又治腹痛十年者又治赤白帶下

右數症平生所用而功者學者詳審活用而見非常之大勲

會稽湯

治否癰疾

會稽夏朴實

一頭苦虎

一條禹餘糧

一塊

右㕮咀以水四升煮取二升三合去渣服

千秋屢用此治男婦麻溼下部膚滯之毒不遑枚舉又治灸中大熱又治腹脹熱閉又治一切利疾又治熱渴又治三消癥余其餘未活用試功效止于此後君謹勿

輕視

乘舟方 兒婦眩氣乘轂舟馬眩目反嚥中惡必先以硫黃硝石熏鼻而發永矣又夜行舟行含椒辟厲千秋也症用之其功神也又轉加丁香治反胃吐食心下留飲腹痛者又加白芨末糊貼湧泉治目星治腎虛上衝又加陳皮水銀治癬瘻中滿又加鷓古采治肝勞虫余之轉用余也止于此又期後日一舉

含椒方 余以胡椒禊瘴疫者前御也余用番椒常服辟風氣又以番椒帶裁瘡百癰百中其冷待發日先以叔粉糊練攢紙上而脅當一周凹背腹帶之肌上須臾大熱矣裁煎剝用白虎加桂枝麥冬湯其最功矣

沉存中云表兄病頭痛二十餘年每發如破万方不瘥田滋医見之曰老母病此數年得此方遂愈就求得指頭大十圓日一牧謗茶嚼下滋復來云痛太子試飽毒食不發爾著膳懵冒者永冷水服下咽即瘥傷冷即以沸艾湯下藥乃乘舟方治陰中伏熱名破陰丹方硫黃水銀各一兩陳皮青皮半兩細末右先將硫銚子內鎔以下水汞用鉄杖子打勻令無星頑入黑盞內研末入二波勺研用厚麵糊圓如桐子大每服三十丸如煩躁冷塈湯下陰症冷艾湯下許知可云一人患傷寒六脉沉不見深按至骨則沉緊有力頭疼身熱煩躁指末皆冷中滿惡心與此藥二百粒作一服冷塈湯下不半

時煩躁狂熱手足煩擲須臾稍定略睡已得汗自昏達旦方止身涼而病除

登仙藥

瘍癰潰靡藥

雄黃

磁石

石膽

丹砂

譽石

右各等分末合用黃芩置五毒其中燒之三日三夜其烟上著以雞羽取之爲成

千秋按周禮瘍医以五毒攻之鄭康成云如今之醫方是古來瘍家之聖藥也余家燒生々乳僧都比留此麥方也此藥能瞑眩近得方不瞑眩其功非諸藥所及余以登仙五分吐喘息吐胸瘡又揉丸治黴家凝結者又治膿漏痔疾又治瘍瘻內攻麻疹不出者以丸一水一合

煎沸消盡而取服大抵如棗大爲則此方奇異不可言矣客歲流麻之時余医爲魁

行意湯 治風氣百疾

麻黃一兩 寒天浮萍一兩 烏藥一兩 山芎半兩

桔梗半兩

夷頭半兩 甘草五錢

大黃一兩

草菓半兩

刑三稜半兩

山慈姑半兩

右十一味㕮咀以水一斗二升先煮麻黃去上沫入諸藥煮取六升去渣頓服覆衣禁肉血

千秋嘗用此治傷寒中風數又治積聚又治耳鳴又治癥喘又治梅瘡又治瘧又治咳嗽又治風水脉浮者又治赤目頭痛又治吐血下血鼻衄鼻淵又治脚氣痺疼

又治中風難矣又治癆蹙又治婦人室女僧尼鬱氣又治風秘便難又治無故不食者又治體中陰火出者又治經閉又治留飲又治中暑又治產後蓐風腹痛又治泄痢不止又治癰黃又多治麻疹又治累壓氣腫

此記者余平素用應明著也醫者自製而后見其嚴功

底績

西落顎輔男子生而四歲啞而癪病態更加兒医某某輩不能治逐余治之以手按腹曰宿食在上以瓜蒂皂角半夏爲末小丸服百粒迂久而吐穢物可三合達後不與乳轂大瓠不媳父母懼生蠭癬余曰勿乳王符傳云哺乳多則主癪病乳爲精能生啞癪蓋浮膜辟物所爲故吐之飢

而諸藏快通故勿乳三日之間令父母須臾熟一言兒語路轉與乳勿飽常飢如斯五日兒能語而癪亦不發父母因果宿怨遂投歡喜曰人無語禽君實生人雀踊不止云北山一鄙夫患腹痛多方無効余以苦參一七水二合煮取一合頓服食頃吐下穢物視之有九月節所食栗暨赤豆飯時已十月廿五日腹痛頓退

一婦人經中不辨著乎灸火忽大熱讐語吐嘔見鬼惝恍自失諸鑒誤爲溫疫升陽散火溫胆之計耳不妙診余先聞其狀因與羌活虎杖湯即服二合瞬息而涼矣先是母學禪門老僧患腰疼自施疝灸疼太熱癰漸相加焉口舌乾焦言語不利余與桂加龍蠅湯一服而止

室女年十五時罹痘初大熱妄言喜笑不止如_如有神靈嘔吐食藥不下一月經月適來余胗之洪大而緊諗曰食水不容曰暗之患乃刺期門出血八九滴嘔吐反掌已止飲啖不妨三日出痘

一朱舖彌兵衛患滿身皮膚蜂百爾_{百爾}医輩無迹請余外貼虎思膏內服大牡丹湯赤白癰脂出于二溲一月復故其男久罹瘍瘍治術若之不日而成

一社守年七十患癰痛其所由來蓋受外瘡而浴蕩湯所_以內攻而變也余以麻黃羚羊湯累服周宵二溲盡瓶心下痛_仲退却寬如_如三旬正快

鍵屋_僮頭宇兵衛者患腳腫重疼手按沒指福井某爲腳

氣療之幾二年許不見寸善請余胗之曰是非脚氣蓋梅濕餘毒其人云曩患便雖亟愈而有即病余斷曰五日正快乃通絡湯三日能步臻于余門請_請余先褰裳觀足絡從癰所趨之毒而刺之鱗瘡三合之出拜_拜下門已覺疾虛約日而痊

門人關元伯平生好議論而舊染難化余曰足下動輒欲聞一定固論以學毒積於胸中而迫于心也先可服吐毒散_散涌越宿臭元伯信以服之大吐惡痰自是不_圖眼翳明胸病豁讀書不倦飲食日進亦知吐藥無害反益世也余常乘輿巡視病者有不慮其_其鼻轎一病主而臻者謁內相署客席下婢將命客自懷出刺而云鄙子是大官北

小路每屋兵吉者年三十七日獲腫病于今三周期六更之医一爲脚氣癱藥于我也不間時矣未顧疑効慤擾良手而得一言乃病半愈幸投中方乃疾烏有伏詣一厥言未卒下婢應曰家主出矣惜哉失時阿病者吐辭喘々當邇轎還呼轎夫提耳而囑曰婢聞大熱大腫大病之人不可用轎馬也病擾外擾謂之至擾大熱嘔血而狂大腫喘慄衝心命脉何續此人歸路當死何望鑿藥轎夫周章走出黃苔余歸婢述其狀聞焉嘆曰千聞不如一見謂之不學之學明曉更徵使者來云如昨告死于途中鑿可以戒也

中居源左衛門者獲腰脚不利不可遐步業滿三年蓋得

此疾于瀉後云鄉里醫輩襄既憊心退矣客歲京來鑿學名家或肅于祈咒大約聞驅疾之言無不走而請百兩索然而未知濕功皆攏指退矣輶余葺其病切脉循膚立斷爲雞瓜風特虎竇爪牙之藥則一月而可也依鑿篠戚施之藥則二月而成也人情好采肩我二月而彼爲人扁急而噪俠辰未効乃刺血逆絡力者試步有利抵掌而樂姑焉復素面已倦色余雖無批頰退之志彼不彌月而食言故未績用不成爾後一木工遭同病命余艾之乃臆怒而發敷術病之中憶於是權知彼已之疾彼自不治也此人嘗問一病圖書其狀

曰一兒男子今享和三年亥春方七歲生後二三月而腹

中疼痛日夜啼呱不休幾一年許而及其痛漸退還胸腹
煩滿不得安且二年也毒結左左脇頗發起似覆碗但不
痛矣復自客秋八月其腫欣起疼痛無如之何至今春遂
潰而膿血穢水淋漓流出其臭也不可適臻十餘日而後
瘡中忽有努肉突出焉其貌頗類胥生兒之全足從瘡収
挺出之漸過半家人駿視之指爪皮毛悉具焉其奇怪殆
不可言於是乎腹脹雖減然而身體羸更形容枯槁脈洪
數而寒熱往來比夕唆嘔吐痰任冉不可治云

瘡根足少陽胆經之分野自京門至居鄒渡足太陽膀胱
經分野自志室下五分至胞肓



天鑑堂曰古時文獻不足未聞有此奇疾而唯有乞食輩
圍塲男女侏首或並陰瘻人而需群觀得錢是傍作而言
一奇山海經餘詰耳今歲遇囑中井氏求醫而將救此疾
於大方神藥迺得見其狀惜者其子命不保醫不治不在
此地則余亦遂不寓目下手乃記傳于後世尋及異方奇

史記云陸終氏娶鬼方之女孕而左右脇出各

三人皆坼剖而

產乃六人子孫

傳國千年



修已背折而
生禹之圖



簡狄胸折
生契之圖



宋史云宣和六年都城有賣
青果男子孕而生子尋母不
能收易七人始免而逝太云



西樵野記
云明嘉靖
乙酉橫涇
傭農孔方
忽患脹脹
憒憒幾數
月自脇產
一肉塊剖
視之一兒
肢體毛髮
悉具也



右所圖又餘額上生兒髀上產子股間乳子奇以又奇者
先

浪華一遊俠嗜酒或曰
幾飲醉乎曰五石始足
或曰一時五石足以與焉
不能則爲狗遊俠怒曰
何足乃飲至二升或怒
易以燒酌俠者痛喟欲
示其勇乃吸煙火一二忽

躰面發火或駿嚙水不愧發發

嵩山



焰焰即爲黑炭鹽飲食出勇何過無量而爲灰頗堪一笑



織工義兵衛七月得雲龍瘡余脉之大而滑裸體視之滿
身赤脉勃興爲坐弗癲疼痠癟不可靜也搔之從剽逐百
曼延爲雲龍繡紋是祝由所崇我可戰而克乃以非鍼刺
委中血蔑幾五合與新方火濟湯三日而龍氣敗走隱痕
五日正渝平八月又發足腫痺疼問余余曰祝由嘵敗誘
海若河伯將爲洪水子勿患復以鍼戰灸血漂櫓兩脚即
安以亥午當飯蓮蕊之散三日酒服焉爾後百身壯健其
遷母疾麻疹素生薄弱羸弱瘦體恐不堪救惄焉然余獨
於麻疹療藥存乎神方不累慮考盈期而瘳間一月復患
藏毒瘻瀉挺重呻金余脉之細數曰勿苦遽治乃與新方苟孟
湯是通因之術也于茲十日下竭斯滑日月寧如瞿齋改貌

生來之固一動都除却抱乎肥豐之憂其母嘗患經湏亂
政不于常手足指時時咬痛轉縮不利大次食三指代用
事不亦于常劇者通匝熱汗癥食藥微者自捧指呵胃氣
猶厭物之微掠寢至八九日烏有如掃復時而發因盾凡六
載余曰可待發而療于茲已發脉之兩手甚微抑系爲人怯
氣謙逡語聲暗々因先投通絡之湯也二十日矣浮通穢物
旁交刺血悶苦乃無是公之救瘳非尤昔若天湧出醴泉
民之固阿一喙而瘳蓋之乎余恆愧焉還竊虛譽夸曰
使抱病之人言精和千秋之伎耳自是經月得愛舉家
三人可計老彭之壽

一夫病癩瘻余以半夏厚朴湯三日而愈聖濟總錄云咽

瘻先刺破出血用塈豉和塗之妙余獲此法救喉痺比若
又一方急喉閉不得息死活在轉瞬者海帶汁每投必功
不可不知

一男瘞狗所噬即時發狂譏語恍煩躁爲狗貌吠聲余
以瓜蒂銅屑番木礬蟾酥少許四味爲末蕉飯擦茱唱之
須臾吐唾涎二升許下瀉無算困昏而斃不辨叔麦又以
新汲水浸四末不覆衣被自申至戌鮮然失患此人今年
三十五於是讀南史虎魄瘻金創余以貓油人油合爲膏
隣舍有人妄嘗含垢與夫爭言誤觸反而傷背足痛
號發乎四顧竟奈余因此膏傅之一夜而痊
東隣一處女經水不下三月病嘔吐嘗有私夫問姪乎余

余曰月閑亦有此症遽可吐焉服吐毒散五分湧後服療下丸峻瀉五行胸中白日間五日復行前方飲啖如故吐懊速失而後按腹有一兒滿月分身子母殊健余爲學生之日對家婦人得姓婦醫爲鼓脹峻吐下之也四月所不變同學學賀川氏之医偶胗之曰妊矣斷不可服某當保胎爲善婦悔其学生而不信復服如故可一月腹不減胎日張以是首停彌月婉子二身無損余嘆曰其蒂之固也不腐風雨未知有故反無損自是妊娠嘔吐逆上反欲害胎者平藥無効則以吐毒散救之余未遇其害不顧後之邂逅

近

一男倏患吐血素嘗不好酒色前医用三黃加桃花下之

二日不禁諫余勿爲余曰恐非食毒其脉細微慮心所致因取生地黃汁一椀調三七末一七炮姜末小半七數呷之一與蜜散矣又一武弁肉食後得吐血嘔咳命余蕩之乃與三黃加桃花麥冬神曲而寢安

跋鑒策跋



乾也學子于天蠶堂之暇趨嵯峨觀花抵
掌而曰美哉花也路傍有丈人白髮少
鋸直杖而曰吁不優於去年弱子何賞
委乎哉翁生于此今年九十曠九十花

卷之三
三黃
懶林
支公
聊曲
文海
甲子
與宣
煙鍊
矣
一
始
采
肉
食
之
日
始
成
於
因
氣
生
死
長
一
妙
歸
三
才
一
」
壽
未
小
半
之
建
二
百
本
禁
贍
金
修
築
余
日
時
非
多
其
相
時
贈
貴
之
向

昔人櫻花百詩有焉何寫於物氣也覺而熟行首悟新方剖寢不歎我焉又嘗逝鳥川流脉異哉昨日孔父已嘆之矣尋臻祇園謳曲無昔日調秋風葉人肩不摩車轂胡擊手大將有取我焉還以泣於親

感於羣傷於理嘆於樂喻於政事嗟於風俗歎於回生慟悼於死喪悵滅於別離參究於時候隱恤於廢孤惡乎興亡其情異而其施殊古人既有五噫津深知先生之招我焉蓋巧笑倩兮美目盼兮

乃謂溉乎古方後世鄙俚是博我也後素
者謂吾黨風韻是約我也如彼櫻花丈
人雖不學於物固學新實學然則此
篇小而至大大方同臭一目盡乎繪事
而后南向北轅惑不孤顧始可與論鑒也

夫策有雕于斯。於
文化改元甲子暮春望

門人伊勢内宮濱範國謹撰



每部必有
圖章無是
者屬偽本



