

醫事窺班


X

i 48

490.9

工文-1

No. 2123
148



富士川文庫

1326

醫事窺斑卷一

藝滿 順坂 健子乾 誌



脚氣

○論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人著並留意經方偏善此術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊間有釋門深師師道人述法存等諸家曰方寫二十卷其脚弱一方近百餘首魏周立代蓋無此病所以姚公集驗殊不勝慙徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重凡牙之寄作鍼於彼不得習水土往者皆置丘來

中國士太丈雖不涉江表，亦有居然而患之者。良由今代天下風氣混同，物類有等，所致之耳。然此病癥初得，先從脚起，因即脣、腹、眸人跡，為脚氣深師云：脚弱者即其義也。

○夫風毒之氣皆起於地，地寒暑風溫皆作濕氣，足常履之所，以凡毒之中，^皆人也。必先中脚，久而不瘥，遍及四肢，腹背頭項也。微時不覺，痛滯乃知。

○凡脚氣病皆由感凡毒所致，此病多不令人即覺，但因他病一度乃始發動，或食多大肉，經三兩日不起方乃覺之。庸医不識此疾，謾作餘病治之，莫不盡斃。始起甚微，食饌燒歎氣力如故，惟卒起脚底弱不能動，有動則此為異耳。黃帝曰：緩凡溫庠是也。

○凡毒之中人也，或見食呕吐憎聞食臭，或有腹痛下利或大

小便秘懶，不通或胃中衝悶，不敢復光明，或精神惛憚，或喜走忘詒言錯亂，或壯熱頭痛，或身體酷冷，疾煩，或嘔轉筋，或脚胫腫或不腫，或腰腿頑痺，時後縱不隨，復百節骨氣，或少腹不仁，此皆肺氣伏弱也。

○又有婦人產後春夏取涼多中此毒，深宜慎之。其然悶掣癱驚，悸心煩，呕吐氣上，皆其候也。又但覺睛下冷疼，幅々不快，兼十便淋瀝，不同生平，即是肺氣之後也。頑弱者，緩凡疼痛為惺痺。

○九四時之中，皆不得久立，久座，溫冷之地，亦不得因，酒醉汗出，脫衣靴鞋當風，取涼皆肺氣。其初卦去，三十卦，因此即應不復癥也。裏者初變即爻所受處，三十卦，因此即應不復癥也。

○凡小寃病候有異即須大怖畏決意急治之勿緩氣上入腹或腫寒不腫胸腹逆滿氣上肩息急者先不旋踵但看心下急氣喘不停息自汗數出或下寒乍熱其脉促短而躁呑吐不止者皆无

○凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而且故脚氣之人皆不得大補亦不可大泻終不得畏虛故預止湯不服也如此者皆死不治也

○其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

○脚氣不得一向以腫為候亦有腫者有不腫者其以少腹被痺不仁者脚多不腫少腹煩後不過三五日即令人呑吐者名脚氣入心如此者先在旦夕凡患脚氣到心難治

○凡脚氣初得脚弱便壅久入如又一方云如寃脚惡便多三里及絕骨又曰多絕骨最要

右十二條孫真人千金方

○發明曰丈脚氣之疾實水濕之所為也

○又曰丈乳酪醇酒者溫熱之物飲之屬也加以奉養太過亦滋其溫水性陶下氣不能拘故下疾於足胫積久而成膿滿瘻痛此飲食下流之所致也

○尹氏曰古無脚氣之說內經名厥兩漢間名痿凡宋齊之後謂之脚氣名雖不同其實一也

右三條徐彥純玉機微義

○惠豆湯治脚氣上沖黑豆半升大黃八分桔梗八分右以水三合先煮黑豆取二合去滓入諸藥再煎取一合服之

右一條獨嘯荀漫游雜記

○今人謂之脚氣者黃帝所謂緩風溫瘡也

右一條許叔微本事方

○肺氣兩脚酸痛風溫流注ハニ立積散=杉節藤痛ヲ加用レラ奇妙

右一條香月啓益牛山活套

○脚氣實ハ疝氣ナリ痛足流レタルカ脚氣ナリ治方温泉續金湯

右一條病因考

○大脚氣ノ病某初発多ハ皆膝骨弛緩行歩し難シ或踝骨疼痛或而脚酸痛或果筋腸硬脹レ或ハ遠行レ疲タル形ノ如ノ或足筋牽急或麻痺ノ痛痒ノ知外ゾ或

環口及腋下不仁或而脚痿弱頑瘻ノ而各皆小水短淡ニテ呼吸促迫ニ虛里ニ動盪ナル者ニ屬者ノ滿胞ノ門間悉ク皆悸動ス此証甚畏レヘキツヒシテ多ハ心ニ衡ノ根脚ト知ルヘキ

凡前二説ノ諸証ノ中一二証有テ小水弦不利ニ遂ニ腫ナキ人ノ者ノ脚氣腫滿ト云又始於腫ノ發セシテ唯痿弱麻痺氣急ナト許者アリ是テ乾脚氣ト云俗匠勤エスハ難云凡水腫脚ヨリニテ発ル者ノ脚氣ノ腫也ト鳴呼是何ノ言也乎可笑之至也殊ニ不知水腫初発皆自脚而腫者十九コトヲ唯前説ノ通ノ諸証有テ後腫ア為ス者ノ脚氣ノ腫ト空ム右ノ証ナクシテ腫ナキ人ノ者ハ皆平常ノ水腫ニ能ニ心ヲ用テ脉腹ヲ摩ニ猶且腫ナキセザンノ前右

、諸証有ヤ否ヤト委ニ是ヲ問ヘ、若水腫ヲ肺氣ト為テ誤治スルハ利水キノミニテ格別、嘗ナニ脚氣腫ヲ誤テ水腫、剝ヲ拔スレバ其度蹠ノ迫ラサズ

○丸脚氣ノ脉舌水腫、同レ類ナ以テ可し推

○丸脚氣ノ病其因亦水腫ト同事ニテ虛實二症凡ニ皆脾胃、虛ヨリレテ發スル者ナレバ其治吐下、剝ヲ用ズラシホナ取ラニテ上策トス然レビ吳茱萸木瓜換榔東白童便石膏麻黃、類ヲ用エレヒ衛氣少々降ラズ昏悶苦楚レ渴滴ノ水ニ利セバ呪吐スル者ハ能ニ三候六慾ヲ審ニシテ却ア爪蒂、類ヲ用ニ一湯ヲ取レバ豁然トシテ桂驗ヲ奏スルコトアリ是脚氣ノ水毒胸中ニ固沈スルノ証故渦吐ニ非レハ不能治者也然レビ其實証ナル事ナ徵識ニガレバ却

テ年期ヲ促シ若前、如クニメ呪吐ナク呼吸匯迫腹脹甚ク實候ニ疑ナキ者十方か甘遂桃仁野薑薇、類ニテ衛氣緩ニシテ証ニ隨テ降氣、剝、轉スベシ若虛証ナレバ前ノ如クナルニ犀角ヲ用ヘ、証アリ真武、類ヲ用ルノ証アリ

○丸脚氣ノ禁忌水腫、同レ食禁ヲ嚴ニセサレバ葉スト雖効ナレ

○丸脚氣ノ証水葉口ニ入レハ則吐スル者是剝証ニメコレ布危篤ニ至リ易レ心ヲ用ヤシ

○脚氣初メ少ニ手足麻痺ヲ覺エテ脇陽硬脹ニ或ハ少シク氣急或手足微脹或否ズ其脉實スル者ハ極薄故フ可觀

換模散方即香薷散加木瓜換榔羌活木香

○脚氣乾惺、拘挛小水短浅、心急手足麻痺甚
或膝骨弛緩者、越婢加木苓可用若心下和雖
氣急者、木瓜換榔加木香者凡
兼用之若肺症虛候有心下和難者、附子加
即金越婢湯之千金越婢、木瓜換榔吳茱萸加
証あり木茱萸兼用之ルトアリ

○脚氣乾惺、二証、論セズ小水不利心下痞尤甚其狀
覆盆如呼吸短促、脉狀實、屬外者外臺黑豆湯、
可用方在水膜

○脚氣胞滿氣急其氣欲上衝者大換榔湯之

○脚氣心冲昏悶先セントスル者桑白皮湯用ノ

桑白皮湯、桑白皮、吳茱萸、右水煎

○京都六七年前ヨリ急劇、病流行し人損度不少其
証心腹脹痛、或胞中隱痛掣り如、腹牽急、呼吸短促之
其証全可謂結胸故、時医多大陷胸、用工芍赤列、手
改十ヶレバ大陷胸湯用者凡五丈人服藥後暫時ハ
病勢緩様、ニ工レ瓦頃テ如前麻ナリ其後大陷胸
類用ヒタル即時吐出之次第、胞中、上冲し昏悶百
苦ニテ皆死入迅速ナルコト或三日或六七日、過入京
師、俗匠三日坊ト名付予屢其病、診ル、其証結胸似
テレ以、其脉、结胸、脉非々皆浮虛或浮弱或脉微沉細
力無力因思其証實、非人虛之下利、宜キ所非

人全脚氣ノ一種ニメ水毒急。胸中ニ上冲スル者ニト乃
外臺脚氣門。テ桑白皮湯ヲ櫻出。事ヲコレヲ用ヒ者五
六人東大便祕結ニ苦ム者アレ。此聊モ下法ヲ不行始終此
陽ヲ用テ救フコトヲ得タリ。其後右ノ証。テ脫候ノ多キ
者五人アリ。乃本方。於テ加附子亦全ク安レ
○乾悤ヲ不問脚氣ト水不利呼吸短息煩悶スル者吳茱萸
橘皮湯ヲ可用方。水腫門。アリ。此証。桑白皮湯ト大調小
異アリ

○脚氣冲心ノ症。桑白皮湯或吳茱萸橘皮湯十ト用ニレ。凡
苦味ヲ惡テ呪吐スル者。沈香降氣湯用ベシ。沈香上品
ニ非レハ効ナレ

沈香降氣湯方 沈香附一升右水煎

或証ニヨリテ蘿子茯苓ヲ加ルトアリ
此証ニ病氣尤甚者ニ。本方ニ半夏加布留末ヲ兼用ス
レ

○昼夜畜滯ノ利レ難ク。吳茱萸橘皮湯十ト用テ益通利也。
ガル者ニ。半夏厚朴湯加犀角可用。又小瘡頭瘡内似。腫
格別滿入ル程ニ。モ至ラズ。唯腹脹ノ利水レガタキ者ニ。
用テ妙ナリ

○脚氣心ニ冲レ先セントスト者ヲ救フ外臺

一方 柏榔細末。生姜ニ分。煎便。不拘。每服。右頓服。大
小臨時斟酌。マレ。遂衝飲ト云

○脚氣瘦弱。症附ナツ可用。証ニ。ア千金ノ附子湯十
ド用ヒ。胞中一物アリ。如ク胸肋脹脹ノ却テ快ラテ。本

ハ者ニハ千金越婢ニ木瓜換榔ヲ加テ用ハ力甚半有リ
犀角麻黃湯ヲ可用

犀角麻黃湯方 芎一兩 犀三兩 麻二兩 甘一兩 苦防已 各三兩
石、蜜略ニ附木片、防風當細桂立兩 右水煎

○脚氣上冲氣急治ノ後麻痺痿弱スル者千金附子湯ヲ可
用若氣急全ク去バハ梅柳木皮吳茱萸一粒ヲ加フマニシ若
心下結硬久メ去ガタクハ鼈甲ヲ可加

千金附子湯方 桂芍桔甘中附木芩姜

○脚氣沖心治ノ後痿弱尤甚、小水不利或腫滿勢少、少
ク少腹無力麻痺スル者金匱八味丸料ヲ可用

○八所灸痿弱等、証大ニ騎丁ク壯數、一穴ニカ十壯
毎日可矣然レニ腫滿或上冲ノ氣味有者ニハ不宜右等、

、証去テ後唯肺弱又ハ脾骨弛緩スル等、者ニ可矣

○風毒モ亦脚氣、類ニ無此病實証多ク虛証少シ其証
脚痛レ或欬脰スルモアリ睡者ハ梔蘋散犯氣甚ク痛亦准
ノ甚者ニハ越婢湯ニ木瓜換榔ヲ加フ

○此藥ニテ痛去難十者ニハ大黃一兩牽牛一兩甘遂ニ少
右三味糊ニテ丸シ毎夜一丸ヲハ兼用スベシ若脉証脫候
アルニハ千金越婢ニ木瓜換榔ヲ加テ用ヒ此症ニハ
下劑ヲ用エハカニズ或ハ桂枝附子湯ヲド用エハ証モア
能ハ審ヘスベシ

○實証、風毒硬脰不可屈伸、莫痛如焚不可忍日夜號泣ス

ル者禹功功散ヲ用ヘシ

禹功散方 韶午秋末小茴十枚右為末和勻丸酒ヲ以テ送

下スルコト一言曰、五大頻ニ快下利ナ得ル時ハ愈エ九
一晝夜、五方東ヲ可用然ラサレハ無効余屢試ルニ凡毒
、腹痛、牽午子ヲ以テ下スヲ上トス他東ニテ快下ナ得
ルコトアシニ其効ニ牽午、如速丁ラズ凡毒、脚氣、類
タクト雖唯水氣、如ク冲心、患ナニ故ニ凡毒、病辨ナ
治ナトキナシヤスし然ニ止ニ脚氣ニ凡毒ヲ兼スル証
アリ此症タマテニ凡毒ノ治ナ施シ却テ人ヲ誤ヘテアリ
可用心、

右二十一條和田東郭並木鎖言

○脚氣八處 風市伏兔 橫鼻 腰眼 三重 上庫

絶骨

○脚氣四處 鏤跳 陽陵泉 下廉 陽輔

右二條備後太田三秀備考方

○脚氣凝結骨筋痛且腫者易治六物解毒宜長服之、若在脛
或髀者及難得治未知其理如何其腫滿者木茱湯梅榔紫蘇
湯平水丸浮水散之類宜審其緩急先時施治

右一條龜南冥病因備考

○脚氣ハ中世治療、法ナ失テ唐ニモ其狀汰ウスナリ
タリ隋唐、頃ハ其名ニ多々載テ脚弱又侵凡或、凡毒脚
気ナド、云千金、頑弱名緩川疼痛スルナ為湿痹トニ工
皆古名ニ非ス左傳有沉溺重膿之疾ト是ニ脚氣ノコトナ
ラニ又陸賾上疏云水流膿胡三者注曰流膿者謂毒氣下流
足為之膿古人謂之重膿今人謂之脚氣素問刺癰篇附體病
七脚氣ノコトナラン

○脚氣ハ公候富貴ノ人常ニ膏粱ナ食ノ身ヲ勞セヌヘ作
ルト云是モ一因ニハアレシ又貪財ノ人ニモアリ必膏粱
ノニニテ作コルト限ルベカラズ
スベシコレ亦數々試驗アリ

○又年ミ腫ル人八味丸ナ連服メ食ミ梁肉ナ有テ淡薄ニ
スベシコレ亦數々試驗アリ

○氣急衝心ノ勢ハケシキハ平水丸遂丸、類ナシテ急
ナ叔ハ子ハナラズ一旦下リテエホ前條ナオスハ再ニ下
ス其時ハ目方ヲ增子ハ葉カナシ

○下ハ急ナ叔フノ權道ニテ下メ腫ノ引タルハ日干經
テ又立帰ルモノ多シ小便快通レテ腫ノ引ニ非ニハ眞ノ
治ニ非ス下スハ是非ナキ術ト思ヘシ下サレタ張合デ小
便順利スルコトミアルナリ

○項頸或ハ手足胷間ナトニ小サキ夙ニテ付タル如ク別
ニムワクリト腫ノアルコトマリ是木腫ノ偏ニ腫ノ多ト
似テ異ニ大ニ可懼如何ト云ニ一体ヘ滿クズニ如此ニ聚
ルハ毒ノ結ンタルニ衝心焉ナルニニ小便赤暗大便難
禁効ナクハ難治トスマレ

○衝心ニハ槟榔子末ヲ一束半童便ニテ服スベシ黑豆煎
汁ニ童便テ和ニ用ルエヨロシ又生姜汁モ加又黑豆湯モ
用ユベシ桃花ヘ心下一寸ハカリ下ニ勅擇アランニ用ユ十
束ニ湯ヘ胸膈ノ痛ナ目アテニ用ユ皆衝心ナクナビシ
○小便黃赤ノ不利ノ兆清メハ快通メ候トス故ニ便量少
クトモ清便ニナリタルハ不口ニ通ヒ付ト思ヘシ

○咳ノウヨク出タルニハ黯胞湯

○犀角ヲ用エル腫ハ瘀毒内ニ齧メ熱冒膈ヨリ肩背ヲ寧

シオル如キニ用エル時ニ用ベシ

○一角ハ上衝スルニ用エル又衝心ニ用ベシ

○鯉奧湯ヲ肺氣ニ用エルコトアルアリ

○瘻癬ニモ肺氣ヲ帶ルコトアルモノニドウレニテ又驗ナ

キニ化毒丸ヲ少シワハ兼用スベレ

○胸ヨリ喉ニモ腫アヒバ音声物ヲフクンデ言フガ如シ

凶兆ニ水腫モ同シク凶ト入

○脅間動氣強ク人迎ノ脈アラハニユルハ衝心ノ候ナ

○言語ニ息ノ不足トタノイキスル類ニ皆衝心ス

○手足心ノ平ニナルホトニ腫タルニ缺盆ノ平ニ腫タル

モ惡症ナルハ水腫ト同シ煩渴黑胎ハ白虎ニモ承氣ニ元

ナルヘシ熱ヲ帶タルハ水腫ニハシレ大半脚氣ニ屬ス

○鯉奧湯 九味桔梗湯桔梗、生木香、大黃、蘇子、

厚朴、姜

黑豆湯

十枣湯 防己湯 越婢湯 脾氣丸 鎮胃湯 桃花散

及楊大承氣湯 六物附子湯 平水丸 紫圓

桂康支加木苓附湯 相皮湯 甘遂丸

右十八條医事小言

○肺氣ハ血虛ノ故ニ氣逆盛シナリ痛ニ生ヌト心得下ニ氣熱テ消火痛ヲ止ベシ辰砂散滑石散ニテ血ヲ冷メ血ヲ生ヘシ

○玉丹ニテ下ノ寶丹ヲ用テ内熱ヲ消シタラハ氣血流通

ノ痛ハ治スルニ

○和方大黄人參茶百草霜蛇骨酸漿草乾粉。右七味末ニテ
茶ニテ飲ベシ

○山帰来清癰瘡ノ茶或ハ喫茶ニヨシ

○松茶 罂天蓋中鹿角大蟾蜍中蝮蛇小烏板鷹各鞋粉少

右末ノ茶カ兩。テ用ニマレ

○秘茶 黑頬煎ヲ病人ニ食スレハ發病是ノ脚氣ト心得

テ黒頬裏ノ腸ヲ去テ輕粉ヲ黒頬一頭ニ五兩入テ黒燒ニ

メ末メサツ、茶ニテ用ベシ

○脚氣ノ發ノ病初ヨリ即脚氣トナルコトアリ又他ノ病
ヲ走ル内ヨリ隱然ト因テ脚氣トナルコトモアリ其証多端
ニ膝ヨリ脚ニ至テ不人ノ威ハ甚ノ蟲名ト行カ如レ或ハ
足ノ爪端ヨリ腰膝ニ至テ水ヲ洒ルヤウニ冷ルエアノ脚

膝屈ノ不歩腫テ冷モアノ脚膝煩熱痛ニ拘牽カナワヌエ
アリ食餌ノ臭ヲ寒カリ不食スルミアリ腰ノ邊ノ鍼アリ
ガ如ニ覺ヘ胸ニ衝捨ルエアリ足膝ヲ動ニ役ストキ筋拘
急伸ラレヌエアリ胸擣シテ寢所工燈ヲ點スルテ惡カル
ミアリ身熱ニ頭痛スヘアリ腹痛ニ下ルミアリ
○總ノ脚氣ハ道血ノ道ヲ塞リ滯ル故ニ病發ル

○風寒血分ニアタリ水氣氣皮肉ノ中ニ滯リテ冷氣筋ニ
入り或ハ手足ヲ大ニ劣メモ脚氣ト咸ルニ

○灸ハ痛所ナ炳クベシ

右十條知足齋梅花無盡藏

○脚氣、脉、數急惡脉ニ
○公孫委中又ハ痛上ニテ血ノトルモヨシ

○木茱湯 治肩息急上衝

木臼

吳茱萸 鉄砂覆

右糊丸

○犀角湯 治脚氣衝心悶亂不識人

吳茱

木臼

犀角

青木香

○加味杉木湯 治脚氣腫滿

杉木節

橘葉

大腹皮

沸榦榔

右童便三牛煮

○加味松木湯 治脚氣腫滿

松木皮

生姜皮

大腹皮

桑白皮

橘皮

枳壳

大黃

黃芩

木通

換榔

芍 茯苓

鹿茸

○脚氣妙方

馬骨黑

酒

用

○枕茶散

桔梗花酒

力

枕茶等分酒

行用人

○防己散

防己十枚

將軍

五分

右九條二神傳

○聖惠方曰夫脚氣者晉宋已前名為緩風小呂謂之脚弱古

來無脚氣之說而病源有脚氣之候者皆因良醫所立此其病

從脚起故曰脚氣如此則緩风脚弱得其物稱矣

○聖濟總錄曰內經謂暑勝則地熱风勝則地動湿勝則地泥

寒勝則地裂寒暑風濕之氣皆本乎地人或履之所以毒亦易

中干足也因病從脚起故謂之脚氣

○外臺秘要云脚氣病多以春末夏初發動得之皆因地蒸春

發如鞋夏發更重入秋少鞋至冬自歇大約如此

○聖惠方曰江東嶺南土地卑濕氣候不同夏則炎毒膏薰冬

則溫暖無霜風濕之氣易傷於人

○聖惠方曰夫脚氣病者雖虛羸不可多服補藥補藥令人心腹脹氣實便死非渴不瘥又不可見虛而不渴也見氣實而先泄亦宜時取汗也

○又曰此疾不宜多卧每食後徐以力以散敷氣舒暢情性勿恣睡

○外臺秘要曰第一忌嗔嗔即心腹煩即脚氣發第二忌大語大語即損肺肺損亦發動又不得露脚當風入水以冷水洗脚脚胫尤不宜冷虽暑月常須着綿袴至冬寒倍令兩胫溫暖微有汗是大佳

○又曰凡患脚氣每旦早食任意飽午後少食日晚不食弥佳如飢可食敗粥

○外臺秘要曰脉沉緊者多先洪數者竝生緩者不療自瘥大況如此

○近世有名淳苦病者方言也或云黃脾也足胫為腫起居如常甚者難步履今時屢見兩足粗大之疾偕老者即古所謂壅疾是也又高野山中冬月間童子十五六歲者多罹脚疫初其處之兩脚為掣行步艱痛坐卧則如癡忘他無所苦數与茶餅無効唯當春暖之時挾腳田澤中屢踏泥濘則其病必愈或不愈者勒輒為痼終身禹步云率遭此疾者屬瘦人肥人蓋無之所謂皆是脚氣之類也

○脚氣者凡毒之稱蓋水土之病也

右十一條紀藩澹齋脚氣類方

○京師油街界屋新七翻身浮腫脚氣上衝心胞熱煩甚則正

氣乏絕晝夜倚壁不能卧進湯即吐衆医皆以爲必死先生作
趙婢加木附湯飲之吐尚如故而益飲之不止居五六日心胸
稍安某不復吐於是又作十枣湯飲之如傾諸症頓退

○婦人年可六十去夏患自汗如流日夜不止至八月左右手
足不仁腰背广痺莫知痛諸医以爲麻百方無効日甚一
日至十月請余余以爲脚氣蓄水所爲用換柳蘋子加大黃湯
二三日即愈下腰背手足皮中如虫行狀指端最甚數十日而稍
知痛痒於是用黃耆防己加广辛桂虎骨湯至臘月中旬手足
如常諸症皆已其初大便結院古有黃胎右股有塊時亦奔弱
動則胸痛心悶鶴臺問

此証足下以為脚氣夫脚氣者病特在脚之名也不知大
兄何以謂脚氣也使余從事初大黃附子湯後黃耆生文

五物湯半不替古而處則虽治半不可爲法足下思諸

東洞答

右二條建殊錄

○足脚疼痛歷數歲不已或牽急或時麻痺或時痿痺或行步
難患者與諸破血舒筋之刺全無効驗又用烏頭附子之類則
反痛烈者如何南涯曰先人多與桂术附子間得治者多確
治也壇者詳當歸刺屢有効有尿紫色或血色而治者又有下
利黑色或下血而治者彼用烏附刺則反痛甚者用之必有効
一老婦患此症十餘年遂爲瘦瘠羸瘦而腹中拘挛膨脹如龜
胎仰卧不能轉側飲食氣力如平生與當歸建中兼用消塊踰
月愈

青洲曰千金犀角湯一之竊建未得全効

○兩脚若隻脚乍大酸疼不能行步如斯二三日若十日許而用茶止不用亦止然或歲一發而后終為佗瘤者

南涯曰以先人之意處方則附子剝也頃者一婦人患此症不能行步數月遂迫胸脅脇中掣痛飲食具吐小水不利唇口乾燥一夕短氣急迫不知人事心下至少脅痛手不可近先因以為脚氣投茶數劑无寸効予診之胸中无動悸短氣有緩急是非脚氣上冲之症乃當歸芍藥散作湯服之三肢而痛退腹中雷鳴小便快利其色紫黑忽知人事欲食不吐翌日腹滿大便不通兼用消塊大便下黑血脅痛頓退服前剝十貼餘日行步如常

青洲曰是脚氣之脚氣一症也隻脚者雖治兩脚者易治然連不施治及肉脫而不治矣其不酸痛者烏頭湯家用紫丸若上

世者不可与紫丸

右二條陥症百問

○敗毒剤

○小續命

○桑膏肓

○曲池

○膚附

○溫陽

○溫泉

○硫黃

○陽

○脚氣脣滿小便不利者宜以八味丸煎汁服牡蛎澤浮散

右一條類聚方集覽標書

○脚氣痛楚易簡無名異末化牛皮膠調塗之

○風濕脚氣瑞竹堂石硫散生一兩

川烏頭生一兩

無名異禹

為末葱白自然汁和九倍子大每服一升空心淡茶生薑各吞下日一服

○脚氣腫痛巨方摘要白芷芥子等分為末姜汁和漬之

○脚氣腫痛永類方木鼈子炒每兩入桂半兩為末熱酒服二

末令解

○風毒脚氣肘后牽午子末蜜丸姜湯下

○脚氣入肢脹喘急簡便威靈仙末每服二兩酒下

○得脚氣夜半癟絕服肉塊大如石且无因不知人橘搗上視

服杉木湯半食頭大下三行氣通塊散

杉木湯方

杉木節一个橘葉一升無葉則以皮代之大腹

核榔七枚連子碎之童便三升共煮一升半分作兩服

右七條本草綱目

○七味核榔湯 治脚氣疏通之劑也

桂三分。大橘枳殼五分。核榔一升。甘姜各二分。右水煎服。

○烏頭湯 治脚氣遍身洪腫者

烏桑。核榔。大三分。商陸三分。姜七分。右六味以水三分煮

烏頭減二合內諸藥煮取一合日三貼

○黑豆湯 治脚氣上冲 黑豆九分。核一升。右以水

三分合先煮黑豆取二合去滓入諸藥再煮一合分服

○沉香散 治脚氣氣急毒攻心沉三分五厘。香附。木瓜各

宿砂土分。甘一升。核末三分。鹽少許。右水煎去滓內核杵

鹽攢調分溫服

○逆衝飲 治脚氣氣急上衝心欲先者方去前

○如神丸 治脚氣衝滿氣衝心氣可忍者

芫花。甘。大戟各一两。

大黃三分。右糊丸桔子大每服五分或五

分或一升空心姜湯送下

○洗脚氣急者方 磬石五分。芍。甘各六分。右水煎洗脚
妙或步加鹽亦佳

○松葉酒 治脚氣手足不仁或寒急及凡溫身體疼痛不已

者 松葉三束、烏頭、姜各半

右三味以酒一升漬之七宿日盡一合

右八條山田元倫名家方醫

○脚氣腫並衝心奇方 グミノ木枝葉トエニ煎レニ牛ニ

三升セ服スベレ

○脚氣撞心ニ水銀ヲ服メ妙ニ

○脚氣撞心ニ烏頭末ヲ糊ニテ煉リ葛子ノ如クニシテ湧

泉ニシキ灸スベレ

○脚氣腰痛筋ニキツルニ委中ニ穴灸スベレ膝ノナリソノ内兩ノ筋骨・間ニアリウツフキ卧メ兩足ノノボタル

ベレ

○足痛小便淡 三陰交ニ穴内踝ノ上三寸脣ノ下ニアリ

右五條

○脚氣下レ カハラケ所ナビク燒キ白キ

所ナム粉ノミ象

茱ニ丹 檜榔五分

茯苓一枚右粉ニメ上酒ニテ用ニ日ニ三度ホド用ニ先末

木火ニタキ惣身ヲアタメノ汗出ルホドアタリ粥ヲ喰

ヒ其後此草ヲ用ヒ冷ナルヤフニシテ十日ホド用ニヤレ

○脚氣腫タルニ茱菔根葉ニ煎シタル湯ニテ洗ベレ又

馬鞭草ノ煎湯ヲ洗フマレ

○脚轉筋スルモノハ皆血熱ナリ急ニ大蒜ヲ取テ脚心ヲ

磨リテ遍ク熱セレノ血分ニ芎芻芩紅ヲ加工テ与フ

右三條古方翼

○脚氣ハ内經ニ緩汎或ニ温痺トニ文人飲漢以來此病頗

ル多シ故ニ仲景ノ後議論紛レトメ奇談百端ニ或ハ方丈
、凡氣ニ依リニ或ハ腎水、心火ヲ剋ヘトシ或ハ凡毒ニ
感ニトレ或ハ腎虛トシ或ハ肺氣、實トレ或ハ壅疾トシ
或ハ水溫トシ或ハ宋元以未、脚氣ト云ハ實ハ虛氣人足
ニ流レタリナリト云或ハ今古脚氣衝心ノ症トシ寒ノ腸
上ニ厥ノ胸ヲ衡ツ云是孫氏ノ厥ノ脚氣ノ寒症ト該タル
ヨク起レリ厥ハ藏府ニカ、フテ忽死ス脚氣ノ經絡ノ事
ニテ足ノニニ限ヘ一病トハシ難ミト云ハ
如此望洋トノ飯一ノ論ナレコシ或ハ其緩ナルヲ以テレ
或ハ其急症ナシ以テ論スルニハシテ其会体ナ得サル所
十斗蓋此病内因アリ外因アリ虛アリ實アリ一端ヲ擧テ
論スベカラズ夫脚氣衝心ト云暴症ト皆少壯ニアリ淫暴
虚ノ人ニ有幼年老衰ノ人ニハ此急症アルコトナシ暗虚
、說タルコト的當セリ

○痢後調攝ニヨカラズ兩脚痿軟ニノ腹痛ニルノ痢後凡
ト云脚氣ノ如ニ必誤リ混セナシ

○軟脚瘡ト云症アリ大便清白、ノ足重ノ動ニ移ニ雖キ
モノアリ是亦脚氣ニ混セナレ疫ノ一症ニ

○衛心ノ病ハ何病、テモ下利ニ宜シ十枣湯ノ類

右四條医療察痕考

○大枳榔湯 嬰兒方治脚胫軟痛頑痹若轉筋胞滿短氣者
核一升生姜三分青皮五分茯苓一升桑白一升吳茱萸五分半
夏一升白芍二分木瓜五分甘 右十味

