

醫心方卷第十三

490.9
Is-3
12

No. 2258
12 / 109-1



富士川支庫
1411

醫心方卷第十三

從五味下行賦得志氣壯賦合并波箱林風箱標

治虛勞五勞七傷方第一 治虛勞氣短方第二

治虛勞少壯壯方第三 治虛勞氣短方第四

治虛勞精少方第五 治虛勞心忪方第六

治虛勞不得眠方第七 治虛勞容衰賦方第八

治虛勞虛汗方第九 治虛勞虛盜汗方第十

治虛勞傷汗方第十一 治虛勞虛汗方第十二

治虛勞虛汗方第十三 治虛勞虛汗方第十四



醫心方卷第十三

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治虛勞五勞七傷方第一 治虛勞羸瘦方第二

治虛勞夢泄精方第三 治虛勞尿精方第四

治虛勞精血方第五 治虛勞少精方第六

治虛勞不得眠方第七 治昏塞喜眠方第八

治陽虛汗出方第九 治陽虛盜汗方第十

治耶傷汗血方第十二 治傳屍病方第十三

治骨蒸病方第十四 治肺痿病方第十四

相連

治風汗方第十一

醫心方卷第十三

治虛勞五勞七傷方第一

病源論云虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一日

志勞二日思勞三日心勞四日憂勞五日瘦勞六日

五藏勞也六極者一日氣極二血極三筋極四骨

極五髓極六精極也七傷者一陰寒二陰萎三裏急

四精連之五精少陰下濕六精清七小便苦數臨事不

畢又曰脾傷所傷腎傷肺傷心傷形傷志傷

方在廿八卷

千金方云三人九子丸主五勞七傷補益方

身病源論
五肌極也

肌息至及身中筋也

此及五藏也居寒冬藏也足及小藏也苦及冬藏也皆林及

ヨコヒ
ヒモ
ハラト
フクミ
ココロ

武素痛也
急於新及

筋及瘦損也

筋字作筋音作筋骨也俗作筋

酸棗人シナクヌ又ルキナクヌ 栢子人カヘラ 薏苡人イイタクア 苟杞子クコ又スククセ 地床子ヒルハシロ 五味子セネカツラ

菟糸子ネナシクセ 菊子キク 菴藷子ヒキウモキ 荊子スアカルネ 地膚子チキクセ又ニハクセ 烏麻子ウマ

署預ヤブライモ 桂心ケイシン 于地黃ソウジヤウ

十五味加漿容三兩餘各二兩酒服如梧子廿九日二

范汪方開心署預腎氣丸治大夫五勞七傷髓極不耐

寒眠昂臚脹心滿雷鳴不欲飲食雜食心下傳淡不能

消春夏手足煩熱秋冬雨脚凌冷虛多忘腎氣

不行陰陽不發絕如老人服之健中補髓填虛養志開心

安藏上渡明目寬胃益陰陽除風去冷无所不治

醫心方卷十三

禹貴及四月者脾之符也

方

完。縱容一兩 カクハククク又イワキハハカ 山菜黃一兩 一方无 干地黄六分 一方代 遠志六分 干薑

八地床子五分 ヒルムシロ 五味子六分 ヒネカワラ 防風六分 ハチニカナヌルカ 茯苓六分 トツホト又トツフクリ

牛膝六分 牛ノクニ 菟糸子六分 ネカシクセ 杜仲六分 ハヒトク又ヒトナラ 署預六分 ヤトクイモ

凡十二物 搗下篩 蜜丸如梧子 服十九至廿九日

二夜一若煩心即停減之 只服十九為度 服藥五日

莖熾熱六十月通體滑澤十五夜顏色澤平足熱

廿夜雄力欲感廿五夜經脈充滿廿夜熱氣朗徹

面色如花手文如絲血心開記事不忌去愁上忌獨

息寸及澤水也又作選

夜不寒止尿洪陰年卅以下一劑即足五十以上

兩劑即足滿七十三有子婦人斷續者服一劑

五十得子无所禁但忌大率酢

又云六生散治五勞七傷五緩六急治寒熱脹滿大

腹中風虫曳消薇逐血補諸不足令人肥白方

生地黄根二斤 生薑一斤 生昌蒲根一斤

生苟杞根一斤 生烏頭一斤 生章陸根一斤

凡六物合七斤 剉洗之 傳令煖粗切之美酒二斗都

合漬三四日出曝之 暮輒還着酒中 趣令汁盡

大素經云 天有十日 人手有十 指辰有十 二是有十 指莖垂二 以應之女 子有陰而 不足二莖 故得懷子 今莖莖者 者玉莖陰

心搏末下從涌服半錢上日三十日之後增至

一錢以試有驗

煎藥方云蘓蜜煎治諸渴及內補方

蘓一升 蜜一升 地黄煎一升 甘葛煎一升 大棗百枚

伏苓 人參 署預 各三兩

右八物先蜜蘓入合攪洋後耳葛煎入洋棗膏以絕

絞入然後伏苓人參署預等散入合後入地黄煎

微火煎不心手攪冷之

今紫蘓蜜煎方有數首或藥種多少不同或

分兩升合各異仍取當今名醫增損之法以備

俗用藥種如左

蘓小一升 蜜小一升 甘葛煎大三升

地黄煎大二合五夕 麥門冬煎大二合五夕 生薑

五升 大棗百五十枚 練胡麻大三合

于署預小三兩 伏苓小二兩

凡十物先以蘓入生薑煎之令相得次入

蜜次以甘葛煎和大棗練胡麻絞去滓入

次入于署預伏苓次入麥門冬煎地黄煎

瘕 醫

皆入諸藥 薇火上剪不離手攪令和調
 至鬣尾不火^{オロル}心手攪冷之但或方如棗
 大服二九日三或如鷄子大服一九日三令之
 多少任意入酒服之

雜酒方 柘杷石決明酒治除腰脚^{疾アタラヌシタア}疝癰諸風痺惡

血去目白^{七ヶ}膚瞽赤膜痛^下眩^{眩側冷及目動也}疝^{セレカヒヌカハルツヤナヒ}疝^{トシロキ}諸瞽^{トシロキ}昏^{トシロキ}輕身補腎

氣和百^シ苒好顏色^{トクシ}延壽^{トクシ}肥健長^{トクシ}變方

石決明朝乾者一大斤^{洗多}芍杞根白皮小一斤

右二物細切^{コトカ}盛^袋以清酒四斗五升漬之春

五日夏三日秋七日冬十日去滓^滓始服多少^{ウカハ}不白^{ウカハ}占

大清經五^{ムコキ}茄酒治五勞七傷心痛血氣^{ムコキ}之弱男子陰痿

不起^{ツキ}囊下恒濕小便餘瀝而陰^{ムコキ}痒及腰脊痛兩

脚疼痺風弱五^{ヒラキヒレア}緩六急虛羸補中益精^{ヒラキヒレア}堅筋

骨強志意久眼輕身耐老耳目聰明落^{オチカ}齒更生^{オチカ}白髮

更黑身躄^{オチカ}輕強顏色悅澤治婦人產後餘疾百病

常用雄不用雌之五^{オチカ}葉者雄之三^{オチカ}葉者雌之雄者

味甘雌者味苦^{ニカシ}夏用莖^{ニカシ}葉冬用根皮切一升盛^{ニカシ}絹

袋以酒一斗漬春秋七日夏五日冬十日去滓温服

任意勿醉此藥禁物但死尸并產婦勿見也日食
 五茹不用黃金百庫也賀蘭方苟杞莢主五内邪氣
 契中消渴周痺風濕胃腹遊氣客契頭痛内傷
 大勞虛損頭面遊風、頭眼眩五瘥脚弱痿四支拘
 寧膝痛不可屈申傷中少氣陰消眩疼憂患驚
 耶忍悸心下結痛煩滿欬逆口焦舌乾好唾羸
 中淡水、腫陰下痒濕小便餘瀝脚中酸痛不欲
 踐地身中不足四支沉重時行噓噦折跌絕筋積
 聚五勞七傷目暗清盲熱赤痛補虛羸除寒

モトホリナシ

カメヲフ

カサチ

カシ

カ全又

カホシイタク

カサチ

カシ

コホシ其季及心動也

カカリカ

カサチ

カシ

カホシイタク

カカリカ

カサチ

カシ

カホシイタク

カカリカ

カサチ

カシ

カホシイタク

カカリカ

カサチ

カシ

契益氣力長肌肉心腰痛充五歲利小便益精氣
 止洩精之服耳目聰明陰氣長強堅筋骨鎮腦
 髓養神安魂安魂令人身輕能跳越岑谷不老
 而長生也
 苟杞根切大一石以水大三斛入煮取五斗汁去
 滓加暑預藕根各二大升煮取一大斗次
 牛膝伏苓石斛杜仲各大一斗以水五斗煮大
 取一大斗次茅根蘆根各大一斗以水一斛煮
 取一斗加棗膏大一升煮取令減半混合三

汁煎令減三分之二次加地黃煎大二升麥門ヤドヒケ

冬煎大二升次加蜜大一升千歲葛汁煎矣アトウラ

二升冬時蕪大二升稍煎令如糖ヤウヤク停冷納漆アメトメチ

器密封始服如彈丸大一九日三今葉加生薑汁

錄驗方生地黃煎補虛除熱將和取利也散石癰疽即良及送也助也

瘡癰痔瘻皆宜之方カタネ

生地黄根隨多少春採取汁復重春採取之盡練吹

其汁乃除去滓也以新布重絞其汁去滓練吹

濁令清淨量銚中量釜湯上煮銚勿塞全ニツリ

錫 可引見
七昭又
温器也
七九ナ

邊令湯氣得泄不啻也煎地黃汁竭減半許キアラフ

後煎下更以新布絞去廉碎結濁滓穢去復煎フロシチ

竭之令如鉛糖成煎北方地黃肥味濃シチ作煎北金又

甘美東南地黃堅細味薄作煎鹹苦不美ナリ

然為治同耳能多作則美好也少作則易竭ニカシ

苦之不美然少作不可減三升汁トモ

治虛勞羸瘦方第二ヤルル

病源論云夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人ナリ

精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也ツカシ

騷驗方苟杞丸治勞傷虛損方

苟杞子三升干地黄切一升天門冬切一升

凡三物細搗曝令干以絹羅之密和作丸

大如彈丸日二服九丸

范汪方云補養湯主虛勞羸瘦食已少氣方

甘草一兩炙木牡蠣二兩大棗廿枚阿膠三

兩麥門冬四兩心凡六物吹咀水八升煮取二升盡服禁

生冷ナテシヨヒヤカナルモノ

千金方甘草湯主虛羸瘵氣欲絕方

甘草二兩生薑二兩人參二兩五味二兩葶藶麥冬

五味水四升煮菜羹令如蟹目沸去滓內藥

煮取一升六合分再服

又云小麻骨煎主治一切虛羸皆悉服之方

麻骨一具碎苟杞根切一升二味各以水一斗別器

煎各取汁五升去滓澄乃合一器共煎取五

升二日服盡好將須用大升煮

本草拾遺云鯽魚肉主虛羸熟者食之腹中

蒼婆方治人瘦令人肥健肥自能行陰陽并去風為虛

...

...

文咀
廉持之
義又云
皆應細

瘦無力神驗方

取楓木フカツラ經五年以上樹皮去上里皮取中白皮

斗コトカ細剉ツミチ燉ハクシチ令水氣去以清養酒於白瓦器

中漬之依春夏七日秋冬二七日少飲酒

飲盡至下シタ似如楓膠少取食之不经數月

昂肥白立驗昂忌如法

搥要方搥去苟杞子消瘰癧瘰癧黃瘦不能食服之不過

兩劑必得肥肥无禁新方生地黄三大升切大麻子五大升碎

極無及音芝之上聲也
救也助也

右於甑中コトキ蒸麻子使熟下著カキ按上攤去登及按也他冊及開也熱氣

冷カヒ暖如人肌内地黃苟杞子カヒ熟カヒ按使三物相得

内絕イレ袋中以無灰清酒二大斗浸之ヒク春夏五

秋冬七日取服任性多少常使體中ヒク微有清

氣

明堂經云脾輸二穴灸三炷主腹中氣脹引脊痛食

飲ル少身羸瘦名曰食晦注云晦月盡謂陰氣盡陽

氣盛所以消食羸瘦

治虛勞夢泄精方第三

病源論云腎虛為耶ラレセ所乘耶客於陰則夢交接令時忍及小藏也腎虛弱不能制於精故曰夢感動而泄精

小品方別離散治男女風邪男夢見女於壁及怒恨也、夢見男

悲愁憂恚怒喜無常或半年或數月日復發者方

楊上寄生三兩 木三兩 桂心一兩 一方 三兩 苜蓿一兩

兩天雄一兩 炮 葶根一兩 菊根 昌蒲一兩 細辛一兩

附子一兩 炮 于薑二兩

凡十物合搗下後酒服半方寸匕日三合藥勿令婦人鷄犬見之又无令見病者々々家人見令

藥化知藥者令耶氣不去禁之為驗ナレ

又云龍骨散治男子失精百術不治方

龍骨タツノホネ大如指赤理錦文者アカリシホ薑本草薑草甘无毒二兩 桂肉二兩

干薑二兩 凡四物下後酒服方寸匕日三神良

又云ラス葶子湯治失精方

葶子コアラ一升 龍骨タツノホネ三兩 赤石脂三兩

凡三物以水七升煮取二升半分三服

集驗方治夢泄精方

葶子一升 葵一物搗篩酒服一方寸匕日再神効

本草云 葶子ホアラ 宋韻云葶 胡介及葶 菜也葉似 非也 非音久俗 作葶說及 云木名也 一種而久者 故謂之非葶

取在之上
一地也

醫門方療夢交接泄精暫睡即出身體枯條骨立者方

白龍骨八分 研キル 蓮子一升半 為散涌脹方寸匕 日二

加至一匕半日二

握要方云小便失精及夜夢洩精方

蓮子一升 麥門冬二兩 菟糸子二合 車前子二合

芍藥二兩 龍骨二兩

已上以水八升煮取二升為四服日三

玉房秘決云治數夢交接失精方

龍骨 牡蠣 甘草 桂 各三方 大棗一枚

水六升煮取二升半分三服

僧深方云禁精湯主失精羸瘦酸消少氣視不明

惡聞人聲方

蓮子二升 生粳米一升 二物合於器中熬之 米黃

黑及熟急 以淳佳酒一斗 投之授取 七升脹一

升日三副便愈

新録方治失精方

取蓮根搗取汁脹五合 日二

又方石楠皮搗為散飲服方寸匕 日二

又方葶子一升クハシキヲイホムシラコヌオホチカクシ赤螺蛭十四枚モチ水五升モチ煮取二升三服之為散酒服

葛氏方云治男女夢與人交接精便泄出此内虚積滯耶氣感菰治之方食

葶子一升ウシシネ粳米一升モ水四升モ煮取升半一服落字丸
又方龍骨二分ヲケラ朮四分ヲケラ桂二分ヲケラ天雄一分ヲケラ搗末酒

服五分ツミシ日三脈
又方兩足内踝上一夫脈服上名三陰交灸廿一炷夢

昂新

又方合手掌并大母指令有血相近以一至灸

又云治男女精平常自书或聞見所好感動便已發

此腎氣之少不能禁制方ヤチヒシキ
巴戟天イハクフルリ又ルケキモラクフルネ又イハクフルネ石斛カハラセト又ヤラセ黄耆フシ又オウ分等搗酒服方寸匕日三

又方カラスツ麻苧一兩セハナデヒ又オモタカ桂一尺カラスツ葶子一升フシ又オウ附子一枚フシ又オウ澤馬三兩セハナデヒ又オモタカ搗末服五分匕日三

又方カラスツ麻苧一兩セハナデヒ又オモタカ桂一尺カラスツ葶子一升フシ又オウ附子一枚フシ又オウ澤馬三兩セハナデヒ又オモタカ搗末服五分匕日三

醫心方卷十三

十三

又方雄鷄肝鯉魚膽令溼陰頭

治虛勞尿精方第^{上ハニル}四

病源論云腎藏精而氣通於陰勞傷腎虛不能藏於精故目小便而精液出

千金方治虛勞尿精方

薤子^{或本薤}一升 稻米二升 水一斗七升モ煮如粥取汁

六升ハ分三服

葛氏方治男子溺精如米汁及小便前後去精如鼻

涕或溺有餘瀝汚衣此皆內傷令人虛絕治之方

栝樓^{カラウリ}二分 滑石二分 石棗一分 搗末以麥粥服方

又方甘草 赤石脂ハ分 等搗末服方寸匕日三

腎門方云療失精無故自泄或目尿精方方寸二分

薤子 白龍骨 兔系子 各ハ分 麥門冬 車前子

澤^{七ナリヒ又オモタカ}各ハ二分 人參十分 石^{上ラハ未又上未ウ}留黃ハ分

為散空腹以酒服方寸匕日二加至一匕半

錄驗方淮南王枕中丸治陰氣衰腰背痛兩脰脗疼

小便多瀝失精人自書囊下濕癢方

小野石解イハクハリ巴戟天ヤヒヒラキ桑螵蛸クハシキ杜仲ハヒトク

凡四物分等アハセ合搗オロシ下篩シ蜜丸如梧子オロシ酒服十

病源論云腎藏精之者血之所成也虚漉勞則生七傷六

治虚勞精血出方第五

病源論云腎藏精之者血之所成也虚漉勞則生七傷六

搦氣血俱損腎家偏虚不能藏精故精血俱出

葛氏方云治失精之中有血方未取未日三

父蛾ツヒル二七枚カ介陰子カ介之玄ツレ參カ介稱半カ介分合搗末以米汁

向且日一服令盡之

稱俗作秤昌及正斤兩也

治虚勞少精方第六

千金方治虚勞少精方

廉角白末蜜和服如梧子七九日三卅日大効

又方生地黃根五升以清酒漬少飲之

又方漿コムツ煮ツクリ菹菜ハジヒ令熟洗陰日二十日知

雞酒方云桑樹東南枝白皮一把細切以酒一升漬之

經宿去來皮多少飲之精如湧泉未ク

治虚勞不得賦方第七

病源論云邪氣容於藏府則衛氣獨營其外行於陽

不得入於陰行於陽則陽氣盛居安及驕也則陽踴滿不得入於陰之氣虛故目不眠得

千金方云千里水湯治虛煩不眠方ヲナツメヌルキナツメ

半夏ホツクアヌカクホツクア三兩 秫米アハフモチウラネ一升 伏苓ツツホトヌツツクリ四兩 酸棗ヤナツメ二升 麥門冬ヤナツメ

三芍オニトコロ 甘草カウ二兩 桂心カウ二兩 黃芩オニトコロ二兩 遠志オニトコロ二兩

草解オニトコロ二兩 人參オニトコロ二兩 生薑オニトコロ四兩 十二味以千里水

一石煮米令蟹沸揚字落ハ之乃過澄取清一斗煮諸

千金藥取二升半分チ三服

又方療虛勞不得眠方

酸棗ヲナツメヌルキナツメ 榆菜ニシラハ 分等九如梧子キヌオホフチ一服五九

又方末干薑四兩湯和頓服キヌオホフチ覆取汗愈

又云酸棗湯主虛勞煩擾氣奔在胷中不得眠方

酸棗シラハ五升 人參シラハ二兩 石膏シラハ四兩 伏苓オニトコロ三兩 慧慧心二兩

生薑ヤナツメ二兩 甘草ヤナツメ一兩半 知母ヤナツメ三兩

八味以水一斗先煮酸棗取七升去棗イシラ內餘藥イシラ煎

取三升分三服

葛代方云治卒苦連時不得眠方

暮以新布火炙熨目并莖大豆囊盛枕之アフリ冷復フクロ

易終夜常枕立愈カヘリ

崔禹錫食經云螭治夜不眠志意不定トシラハル

本草經陶景注云榆初生菜人以作糜羹アツモウ革令人

睡眠愁公所謂榆令人眠トシモウチ

小品方流水湯至虛煩不能眠方

半夏二兩ホソクア洗 秫米一升アハクモチ伏苓四兩ホソクア

凡三物以流水二斗揚之三千過令勞煮三物得

五升分服一升日三夜并コソムチ

僧深方小酸棗湯治虛勞歲虛妻不得眠煩不寧コソムチ

方ヤトコロ酸棗二升ヤトコロ蜈蚣二兩ヤトコロ干薑二兩ヤトコロ甘草一兩ヤトコロ伏苓二兩ヤトコロ

芍之二兩ヤトコロ凡六物切以水一斗煮棗減三升分三服

本草云 知母一名蜈蚣 宋韻云是母即知母草也其音是也

治昏塞喜眠方コソムチ第八

病源論云嗜眠者由人有腸胃大皮膚溢者則分

肉不用解其氣行在於腹而遲留其陽氣不精神コソムチ

爽昏塞故令嗜眠

葛氏方治嗜眠喜睡方コソムチ草三升日中回煎分三服

又鼠目一枚燒作屑コソムチ實膏和注目外背則不肯

眠兼又取兩目絳帛裏帶之アケ目代者限不賣

又方麻黃木各五分アノチ甘草三分日中向南搗末食

後服方寸匕日三アノチ

又方孔公蔞子末五兩アノチ通草三兩アノチ茗菜一斤莫過及草名公雅云茶樹小似枹子冬生葉可

水一斗煮取五斗向暮服之即一夕不睡眠茗茶

龍門方療嗜睡眠方伏冷四兩

馬頭骨燒作灰服方寸匕日三夜一老今葉陶潛

作灰末服方寸匕
令人不睡眠

又方苦參三兩クラク木二兩アノチ大黃一兩アノチ搗末蜜丸如梧子

每食後服廿九驗アノチ

治耶傷汗血方アノチ第丸主
自此以下篇立与端目錄相違仍直畢

病源論云肝藏血心之液為汗言肝心俱傷於耶故

血從膚腠而出也倉泰又

腎門方治汗血吐血方アノチ

青竹茹三兩竹青皮也生地黃五兩アノチ人參二兩アノチ桔梗一兩アノチ

芎藭二兩オホセリ當歸一兩オホセリ桂心一兩アノチ甘草二兩アノチ

右切以水九升煮取三升去滓分温三服甚神効

小品方治吐血汗血大小便血竹茹湯方アノチ

竹茹二升 甘草六分 當歸六分 芍藥六分 黃芩

六分 桂心一兩 木一兩 人參一兩 夕藥一兩

凡九物以水一斗煮取三升分四服

勞病源論
云虛勞汗
惟

治虛汗方第十

病源論云諸陽主表在於腠理之間若陽氣偏

虛則津液發泄故為汗多損於心之液為汗故也

小品方治汗出如水漿及汗血衄血吐血小便血治

死都梁香散方

都梁香二兩 紫苑一兩 桂心一兩 人參一兩 生竹茹一兩

肉桂容一兩 于地黃二兩 凡七物治節以水服方寸

匕

千金方治汗出方 致一升酒二升漬三日服之不過三劑是

范汪方治汗粉藥方

牡蠣二兩 干薑二兩 附子一兩 炮

凡三物搗下以藥一合白粉二合和合摩汗出處

僧深方治大虛汗出欲死若白汗出不止方

麻黃根二兩

凡一物以清酒三升後火煮得一升五合去滓盡服

古今圖書集成

イヒクハリ又ニヒクハリ又ニヒクハリ
ヒトクハリ不

之

劫驗方治人汗勞不止麻黃丸方

麻黃根アツナ二分 石膏セキコウ一分

凡二物治治篩和蜜丸大人服小豆三九日三小兒

以意增損凡

錄驗方治振下汗出作瘡方

藤皮キハク三兩 黃連セクセ三兩 甘草カク三兩 米粉四兩

凡四物治治成粉汗出特粉之

又云心汗石膏散方 石膏四兩 甘草四兩 合搗先食

將水服方寸日三

陶景本草注云麻黃草及根凡復月雜粉寸用之

治風汗方寸第十一

經云凡熱者欲汗イタセム為通氣也一セムカ而皮膚致密不汗者

也風者欲汗不出イタセ為身疲也而皮膚踈薄汗出不

范汪方治風汗出方

防風ハクニカ二兩 牡蠣シカキ二兩 乾薑クシキ二兩

凡三物治治菴一升白粉三升合攪カイチ以粉之欲粉時

於銅甌中七升熬令小温良

僧深方治風汗出少氣方

防風ハクニク十分 一方三兩 貝木六分 一方三五 牡蠣蠣三分 一方三五

凡三物治治後以酒服方寸二日三

治盜汗方陽虛第十二

病源論云盜汗者目睡眠而身體流汗也此由陽虛

所致久不已令人羸瘦考病論云令人羸瘦枯瘦心氣不足已津液故也

千金方牡蠣散治卧即盜汗頭痛方

牡蠣ヲ母三分 牡蠣イ三分 防風三兩

右三味酒服方寸七日一汗之驗無者於此一

切泄汗皆愈

錄驗方心汗石膏散方 石膏四兩 甘草四兩 合檉蒡

先食漿服方寸七日三

極要方療盜汗方

麻黃アトナ三分 牡蠣粉二兩 蒺藜子二兩 熟米粉半兩

白米粉白米粉六分 已上為粉生絹袋盛卧汗出傳之

范汪方治盜汗麻黃散方

麻黃根三分 故敗扇燒屑一分

凡二物治飾以乳服三分七日三大人方寸七日三

醫心方卷十三

治傳屍病方第十三

當戶及丁下二 才ホム不

玄感傳屍方云夫傳屍之病為蠹窠深大較男夫

多以眩痺及勞損為根女人乃曰血氣或注為本

然比見患者百有餘人得狀不同為療亦異

形假既眾名号又殊所以然者中華通日傳屍蜀

土都名瘦病江左稱為轉注野俗謂之伏練下里

名為掩涂小嬰乃日無辜曰虛損得名為勞極骨

中契者号為骨蒸薇軟者稱日肺痿神鬼為宗

名之復連云

玉扁云
掩又作殭
殭殭病也
上於劫及
下余福及
宋韻云殭
殭不動良

病源論云
注病甚論
凡注之言
住也謂邪
氣居住身
內故名注

又云論曰大都男女傳屍之惟心胃滿悶背背煩

疼兩目精明四支支無力雅知欲卧睡恒不嗜脊背

急痛膝脛酸疼多卧小起狀似佯病每至且起

昂精神好欲似无病從日午以後昂四體夜熱面

好顏色不喜見人過常懷念悲纒不稱意昂

欲噴怒行三脚弱夜卧盜汗夢為鬼交或見

見先巨或多驚悸有時氣氣急有時欬嗽雜思

想飲食而不能多食死在頃更而精神尚好兩

助虛助虛脹或時欬鼻口乾燥垣多黏唾有時

助 魯得又骨也釋若助物也所以檢勒去歲也

張滿也

補各及說文肩甲也

セホ子
脊骨也

膚赤有特欲睡漸就沉羸猶如水涸莫不覺其死矣

又云論曰傳屍之疾本起作無端莫問老少男女

皆有斯疾大都此病相尅而生先內傳毒氣周

遍五藏漸就羸瘦至於死訖復易親一人故曰

傳屍亦名轉注以其初得半卧半起号殭殊內傳

五藏名之伏練不解瘵者乃至熾明假如男子

目虛損得之名為勞極吳楚云淋瀝也蜀云勞瘵也其源先從腎起

腎初受氣兩脛酸疼腰脊物急行立脚弱食飲少

兩耳聾甫送又欲似風聲夜卧夢洩陰沛痿弱腎既

受已次傳於心許及及內息也初受氣夜卧心驚或多忪悸懸

乏氣吸義及及短氣也欲盡夢見先巨有特盜汗食无滋味其季及心動也丙

生瘡心恒煩熱義及及短氣也欲眠卧朝輕夕重兩頰口唇皆

皆患紅赤手足五心亦皆熱心既受已次傳於肺

初受氣有時欬軟氣微弱有時喘氣卧即更甚

鼻口乾燥不聞香臭扶粉及滿也假令得聞唯覺朽腐物

氣時惡心憤扶粉及滿也欲吐肌膚枯燥或時刺痛或似虫

行乾皮細起状如起斤肺既受已次傳於肝

心職容及心動不定驚也連也

目不明之良

初受氣雨目漠漠カハシクシカシ面无血色常欲頻ヒソカチ自視不及

遠目恒乾混又時赤痛アカアイタシ或復精黃終キハフチ曾夢欲合眼

及好卧睡還不者肝既受已次傳於脾ウロコ初受氣

雨脇膚脹食不消化又時渴利熟ホシ食生出有時眩

痛腹イタダ雷鳴カキ唇舌雄乾カキ或生瘡腫毛ハ髮堅イシク无有

光聞或得上氣モク擡肩喘息利赤黑汁シ至此復者

将死之證也

又云傳屍骨蒸伏練菴絲相染滅門神秘方

紫胡其胡ハシセリ又ハアアカナ三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 冬桔梗三兩

續斷シニヤカラヌハアクセヌキクセ三兩 紫菀四兩 赤小豆一升小 青竹茹竹青皮也三兩

五味子セネカツラ三兩 干地黄五兩 死者以生十兩代之

若熱更加石膏三兩未 若不下食更加生麥門冬二兩

凡九物切以水九升煮取二升五合シホリチ絞去滓分温三服

去ハカリ如人行七八里重者服五六劑輕者兩三

劑隔五六日一服忌如藥法

又云主傳屍骨蒸例多盜汗粉身方

麻黃根アヘナ三兩 牡蠣粉シカキフスカユ三兩 羌活ハヒシ子二兩 麩米沙

半兩 末

白木粉六分

胡鷄脂一兩

又云主傳屍骨蒸鬼氣寒壯熱諸風虛疥癬搔

又云主傳屍骨蒸鬼氣寒壯熱諸風虛疥癬搔

癬方

直用桃柳槐菴蘿四種枝葉各剉一大升以水

九斗煮取五大斗去滓加塩二大升浸之

又云主傳屍伏練瘞孫骨蒸絃癩鬼氣惡寒挹或

如瘡等灸之方

大椎上穴 又兩傍纒下少許對推第間各相去寸

半二穴 名大柁 神傳及 骨得及骨骨也 又兩助下名章門二穴 又當心脊骨

上兩傍各相去一寸二穴

合七穴日取正午各灸七壯滿一百五十壯早寬漸

差

又云主傳屍瘞孫喜厭夢者灸高丘二穴 在足內踝下微前下 解者中灸七壯差也

廣濟方療瘦病伏練諸鬼氣惡注朱砂丸方

光明朱砂一大兩 研 桃人七十枚 去皮 麝香三分 研

右研朱砂麝香令細末後用桃人香砂為丸

如其和不鍛以蜜少許合成訖清飲服一七九

宇治本无疑首本無

日二服夜一服不痢忌雜肉及辛トラキヲ

又云療傳屍骨蒸掩深肺萎症忤鬼氣卒心

痛霍亂吐痢特氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵互

月閉瘰癧丁腫驚痛鬼忤中人吐乳狐狸吃力

伽丸方

吃力伽白木是光明砂研麝香當門子訶梨勒皮香

附子沉香重者青木香丁子香安惠香檀香畢

撥波斯犀角已上各一兩董蔭香蘇合香龍腦香已上各半兩

石研搏篩極細白蜜前志沫和為丸每朝取

并華水服如梧子四九於淨器中研破服之老少

每研一九服之仍取一九如彈丸蠟紙裏非

袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不

傳冷水煖水臨時斟量忌五辛臘月合之

有神藏於蜜器中勿令洩氣神効

治骨蒸病方第十四三

病源論云夫蒸病有五日骨蒸二日脉三日皮

蒸四日肉蒸五日內蒸

補更及胞胎也

腦按奴剉及頭腦也相背及骨髓也

又云有廿三蒸一胞蒸二玉房蒸三腦蒸四髓蒸五

骨蒸六筋蒸七血蒸八脉蒸九肝蒸十心蒸十一脾

ラ行筋字俗也筋骨也
苦味及金藏也
是及火藏也

旁光二音腹中水府也

都敢及肝之府也

蒸十二肺蒸十三腎蒸十四膀胱蒸十五膽蒸十

フク

ムラト

ハリスコロ
サ焦人有三焦上中下也

六胃蒸十七小腸蒸十八大腸蒸十九上焦中焦下

高貴及自虎通云胃者脾之符一ホソホ夕

オホラホ夕

アヲホ夕

廿肉蒸廿一膚蒸廿二皮蒸廿三氣蒸

府隔及皮

云云

玄感傳屍方云論日凡人唯知有骨蒸名而不知

心有心腎等蒸

又云五蒸病者附骨毒之氣療之通用生地黄汁

不限日數此方神驗

又云日骨蒸者其根在腎且起體涼日晚即契

病源論云
疳蟲作
云人有者
甘味多而
動腸胃間
諸虫致令
侵食府
藏此猶是
蠱也云云
虫動則侵
食成疳蠱
也但虫因
寸而動故
名之為疳
疳宋居耐
及病也
蠱假運
女力及虫食

即變為甘食人五藏若大便澀者与芒消二三

日服乃亦可搗苦參為散蜜和丸如梧子大一

服七九日再服无所禁忌以身輕冷凉冷能食為

度

二日脉蒸其根在心日增煩悶擲手如脚喻之思

白沫睡

莫困及溲也

合羽寒熱具

水口唾即浪言或驚恐不安脉数若蒸盛之時

變為寸昏下悶或暴利不能止若利方

醫心方卷十三

三

苦參二兩 青箱二兩 艾葉一兩 甘草兩 炙切以

水四升煮取升半分爲二升羊肥中盛灌下部

若不利服芒消方寸匕

本草云味辛大寒出大率備中

三日皮逐其根在肺必大喘鼻乾口中无水舌上白小

便赤如血蒸感之時鼻滿或自稱得注熱兩脇下

脹大軟徹背連脾疼眠寐不安或逐毒傷臍口內

唾面急与芒消一兩日不過三服之訖冷水浸手以

熨脇間及脛上白下第三脇間下脛下空中七壯

灸之

カクハシホネ

四日肉逐其根在脾體熱如火煩躁无汗心腹鼓脹

食昂欲嘔小便如血大便秘澁蒸感之時或體腫目赤

不能安寐者宜取大黃一兩半切以如小豆以水一升

浸經一宿明發取汁一服五合許發下昂上若熱

不定亦服芒消一七日二服任意以涼爲度

五日肉逐亦名血逐所以名内逐者必外寒而内熱

把手附骨而肉熱其根在五藏六府其人必困患

後得之骨肉自消飲食无味或皮燥而无光澤逐

盛之時四支漸細足跌腫起宜搗石膏十兩爲一

剖細研如鍾乳法和水一服方寸匕日再服為佳以

涼為度上件五逐患困特患愈後食牛羊肉皮肥臍及コエ

或涓或ルレハ房而得七ホラヲク久逐不除終變為甘疴必須先防

下部不得輕急治逐之

又云主大夫目虛勞損夢洩盜汗小便餘瀝陰濕弱

欲成骨蒸者名曰勞極黃耆大補腎湯方

黃耆カハラモト又ヤラクハ三兩生薑ヤハラクモ三兩人參カハラモト又ヤラクハ三兩大棗サネカワラ廿枚摩牡蠣ツカキカヒ

二兩夕藥エヒルケルリ三兩桂心サネカワラ三兩五味子ツツホト三兩地骨皮ククイ三兩

伏苓防三兩防已防風セネカワラ三兩橘皮又アブカワラ三兩慈石碎綿裹三兩

本草
防已
セネカワラ
又アブカワラ

甘草二兩

凡十四味切以水一斗二升煮取三升候去滓分温

三四服之如去八九里覆取微潤五日服一劑以

三日劑為斷忌黏食生冷ヒヤカクヒ

又云主骨蒸肺痿手足煩熱兼湯或不能食蘆

根飲方

蘆根切十兩ヤシ麥門冬ヤシ十兩去皮地骨白皮去皮十兩生薑

十兩切伏苓伏苓伏苓五兩橘皮去皮五兩兼服石骨

中寒虛脹痛者加吳茱萸カラハハカ八兩

凡六味切以水二斗煮取八升絞去滓分温五服晝三服夜二服忌如藥法

又云主骨蒸肺痿四體煩熱不能食口乾者麥門冬

飲方

麥門冬三升去心生者二升地骨白皮三升小麦升

凡三味以水二斗先煮小麦取一升去麦肉二

味更煮取三升絞去滓以温三服之相去四五

里

又云小龍膽丸療骨蒸身熱手足煩心中懊憹於報及梅也又於交食也羸

瘦不能食方

龍膽五分去毛黃連去毛芍藥甘草黃蘗大黃

黃芩本取人參支子人各四分

凡九味搗篩蜜丸飲服三九如梧子稍加以

知為度日二三服忌如法

又云骨蒸之病无問男女特忌房室舉動勞作尤

不宜食陳臭酸醎難消黏食牛馬驢羊大小豆

猪魚油膩酒麴菓菜野具之屬葵笋蒜蕨及

生冷等並不得食唯宜食煮飯塩豉將醬燒薑

葱菹苟杞クコ苜蓿モクゴク苦菜クサイ地黄ニホ菜サイ牛膝ウシノヅ菜サイ並トナリ須爛スロ

煮食之ヌク便病クセ稍退シヤク肌膚クワフ虛弱キヨク者可時食トキトキ于麻肺マノハ

又云主骨逆及眩痺氣等灸方

雨肩井 上廉 下廉 灸七壯

又方夾脊兩傍各相去一寸二分 兩乳下一夫助ト同ト

前法 廣渚方療骨蒸軍方肺氣每至日晚即惡

寒壯熱顏色微赤不能下食日漸羸瘦方

生地黄三兩切葱白二兩切香豉二兩 童子小便二升

甘草二兩炙

右地黄等於小便中浸一宿平晨前ツクヒ煎カシ去滓

滓澄去定取一升二合分溫二服忌食シヤク麩シヤク猪

肉油膩粘食

又云療瘦病方

靈天蓋一大兩死人頂骨麝香半香 桃人一大抄 去皮

生朱沙一兩半光明者好豉一大升天升乾之

右五味各別搗篩訖然後搗和合調每晨

空腹以小兒小便半升和散方寸匕服忌盡

廣利方理骨蒸熱積漸黃瘦方

欬カク莫メ甲カ六ロク分ブ多タ知チ母モ四シ支シ大ダイ黃ワウ六ロク分ブ葱ソウ白ハク五ゴ莖セイ豉シ

十二ジュウニ分ブン赤セキ棗ソウ根ネ白ハク皮ヒ八ハチ分ブン甘カン草ソウ四シ分ブン炙シ

切キレ以シテ童子コノコ小便シヤウベン一イチ大ダイ升シヤウ三サン合カフ煎ケン取ク合カフ去キ滓シ食シク

後ノチ良ヨク之ノ分ブン溫オン三サン服フク之ノ相サウ去キ如ニ人ニ行キ七シチ八ハチ里リ頻ヒン服フク

五ゴ劑ジ忌キ熱ネツ肉ニク麵メン人ニ莧ケン

又マタ方ハツ大ダイ黃ワウ四シ分ブン切キレ以シテ童子コノコ小便シヤウベン五ゴ合カフ煎ケン取ク四シ合カフ去キ滓シ空クウ腹フク

分ブン溫オン兩リウ服フク之ノ相サウ去キ如ニ人ニ行キ四シ五ゴ里リ頻ヒン服フク五ゴ劑ジ忌キ熱ネツ肉ニク

麵

治チ肺フイ痿ワイ方ハツ第ダイ十ジュウ五ゴ

氣主皮毛故易傷於風邪

病源論云肺主氣為五藏上蓋風邪傷於府藏

而面氣虛弱又目勞使大汗出或經大下而巨津液

之竭絕肺氣擁塞不能宣通諸藏之氣日成

肺萎也其病欬唾而噎乾沫而小便不利者難

治

廣利方療肺痿唾膿面腥臭連々瀨不止漸持

羸瘦形容枯槁方

紫菀頭子廿一枚匙子桔梗十二分歲炙天門冬八分

伏苓十二分洗生百合三枚洗生地汁二合湯成下

知母六分

切以水二大升煮取九合食後良久分温三服

如人行五六里進一服要利加硃硝八分湯

成下忌一切熱肉麵油膩菓子鯉魚

玄感傳屍方主肺痿欬瀨上氣不得卧夕黏唾

等寫肺湯方

淳歷子三兩稜火熱冷紫大棗廿枚破桑根白皮

三兩切

凡三味以水三升煮棗及桑皮取一升去滓

内亭歷子涎如渾丸許攪令消散更煮三

分減一調冷暖頓之良久當吐惡物殺利

一兩行如湯浚雪即得安卧神効 忌生冷

鹹酸腥臭油膩等

又去肺痿骨蒸氣若吐血聲破或多唾或

口乾兼渴不能食單脹小便方

又去肺痿骨蒸氣若吐血聲破或多唾或乾

兼渴不能食單脹小便方

單脹自身及他人小便百日即瘳日四服一服

也作已勞也三
字作極勞二字
九受氣外臺受下
飲少外臺飲

字
上一行
陰沛外臺沛
行二
怱怱外臺

博下有
心字
行五
皆志紅赤
如外臺無皆字赤下有
行六
有時

外臺作
時
氣微弱
有外臺氣下
行八
氣時
有外臺氣下
憤

外臺作
行九
起行
外臺作
行一
欲頻
外臺類
行二

終普臺
外臺終作朝暮二
行三
好卧睡
外臺好作
行四

文時
外臺文
行五
腹腸
外臺腸
上廿四頁
廣濟方療瘦

病
外臺載此方
行下九
志沫
外臺志
上廿五頁
紙裏
外臺

裏作
行四
五章
外臺作
下廿六頁
連脾
外臺引崔
七廿

頁上必困
外臺困
作曰

醫心方卷十一

