

醫心方卷

第一

✕

i109-1



醫心方卷第十四

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治卒死方第一

治中惡方第二

治鬼擊病方第三

治客忤方第四

治魔不容方第五

治尸厥方第六

治溺死方第七

治熱暈死方第八

治凍死方第九

治自經死方第十

治注病方第十一

治諸尸方第十二

治諸瘡方第十三

治鬼瘡方第十四

醫心方卷十四

同西

490.9
Is-3
13

No. 2259
12 j 109-1



富士川支庫
1412

治温瘧方第十五

治寒瘧方第十六

治淡實瘧方第十七

治勞瘧方第十八

治嶂瘧方第十九之瘧又

治間日瘧方第二十

治連年瘧方第二十一

治發作無時瘧方第二十二

傷寒證候第廿三

傷寒不治候第廿四

避傷寒方第廿五七カ

治傷寒困篤方第廿六カヒヒヤキ

治傷寒一二日方第廿七

治傷寒三日方第廿八

治傷寒四日方第廿九

治傷寒五日第卅

治傷寒六日方第卅一

治傷寒七日方第卅二

治傷寒八日九日方第卅三

治傷寒十日以上方第卅四

治傷寒陰毒方第卅五

治傷寒陽毒方第卅六ヤキヤキ

治傷寒汗出後不除方第卅七

治傷寒鼻衄方第卅八ハナキナ

治傷寒口干方第卅九カハク

治傷寒唾血方第卅十ツキナ

治傷寒吐方第卅一他言及説文吐也吐棄也

治傷寒噎方第卅二ツキナ

治傷寒臨方第卅三後分ツク

治傷寒下利方第卅四チアエモカシラノイ

治傷寒飲食勞復方第卅五トヤヤア丸

治傷寒洗梳勞復方第卅六チアエモカシラノイ

治傷寒交接勞復方第卅七トヤヤア丸

治傷寒後頭痛方第卅八イタケ

治傷寒後不得眠方第卅九ネカレ

治傷寒後汗出方第卅十アセ

醫心方卷十四

二

周西

治傷寒後目痛方第五十一

治傷寒後黃疸方第五十二

治傷寒後虛腫方第五十三

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

治傷寒後下利方第五十五

治傷寒後下部痛方第五十六

治傷寒腕巨瘡方第五十七

治傷寒後食禁方第五十八

治傷寒百合病方第五十九

治傷寒後瘡方第六十

治卒死方第一

病源論云。卒死者。由三虛而遇賊風所為也。三虛謂乘年之衰一也。逢月之空二也。失時之和三也。人有此三虛。謂而為賊風所傷。使

別石

陰陽偏竭於內。陽氣阻隔於外。二氣擁閉。故暴絕

而死也。若府藏氣未竭者。良久乃蘇。然必有兼扶鬼神

之氣而卒死者。皆有瀕邪退乃活也。

葛氏方。治卒死。或先有病痛。或居常倒仆。奄忽而絕

皆是中惡。治之方。

令二人以衣囊口吹其兩耳。極則易。久可以竹筒

吹之。並側身遠之。莫臨死人上。

又方。以葱葉刺其耳。口中鼻中面出者。莫恠

無血難治。有血是治候也。

醫心方卷一四

又方。以綿漬好苦酒中。須臾出。量死人鼻中。手

案令汁入鼻中。并持其手足。莫令驚。カハネクセ

又方。以人小便灌其面。數迴。即能語。此扁鵲法也。

又方。末皂莢如大豆。吹其兩鼻孔中。選則氣通。

又方。擣女青屑。以重一錢上。開口內喉中。以水若酒

送之。立活。又方。灸膻中百壯。

又方。灸其頤下宛。中名秉漿十壯。又方。灸心下寸。

兼療明堂經云
在頤前下
服之下

集驗方治卒死方。

取牛馬矢汁飲之。無新者水和乾者取汁。

同方

又方。取竈中墨如彈丸。漿水和飲之。須臾三四服之。

又方。梁上塵如大豆粒。著竹筒中。吹鼻中。与俱一

時吹之。又方。灸膻中穴。又方。取竹筒吹其兩耳。不過三

新錄方治卒死方。

慈根鳩取汁服六七合。

又方。桃白皮切一升。水二升。煮取八合。一服之。十里久不老

更服之。

僧深方治卒死中惡雷氏千金丸方。

大黃五分。巴豆六十枚。桂心二分。朴消三分。干薑二分。

醫心方卷一四

凡五物治下節シ和白蜜治三千杵セウ。脹如大豆二丸。老小以
意量之。

枕中方。治卒忤惡鬼セカ。魘欲死者。書額上作鬼字即愈。

龍門方。療卒死方。

取繩圍死者。辟挽ヒキ男左女右。以繩當大椎。申繩向
下。當繩頭灸脊上五十壯。又方。薑汁灌鼻。

又方。以葱黃心刺鼻中入七八寸。男左女右。立驗。

又方。鳩韭汁灌鼻即活。又方。桂屑著舌下即活。

治中惡方第二。

鬼氣也

ホシ

病源論云。中惡者。是人精神衰弱。為鬼邪之氣。卒中之
也。其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死也。

廣濟方云。卒中惡心腹刺痛。去惡氣方。

麝香一分。研。生犀角二分。青木香二分。

為散。空腹以熱水服。方寸匕。立愈。

范汪方。治卒死及心痛腹滿。魔忤中惡。三物備急丸方。

巴豆一分去心。皮。大黃二分。干薑二分。

兼取コレ凡三物。異鳩巴豆治合丸。以蜜丸如大豆。有急取三丸

以水和服之。口噤者。絞開令藥得入。口中。

又方取坏水以刀三七刺中飲之良。

集畧方。備急散。治卒中惡。痛腹滿欲吐短氣方。

大黃二兩。金色者桂心四分。巴豆一百枚。

凡三物。治令下篩。取一錢以水七合服之。

千金方。治卒死中惡方。

取牛馬屎汁飲之。无新者水和于者亦得。

又方。卷葱心黃刺鼻孔中。血出愈。

又方。灸兩脇下。又方。灸胃管十五壯。

集驗方。治中惡方。

大豆二十七枚。以鷄子中黃白酒半升合和。頓服之。

又方。用釜底黑塩三指撮。和水服之。警門方同之。

又方。以度ハカリ其兩乳中尖屈之。從乳頭向後肋間灸度

頭隨年壯。又方。灸胃管五十壯。

廣利方。療中惡容忤垂死方。

麝香錢重。研和醋二合服之即差。

葛氏方。華他治卒中惡短氣欲死者方。
菲根一朶。烏梅十枚。茱萸半升。以勞水一斗

煮之。以病人櫛內中三沸。櫛浮者生。沉者死。

煮得三升飲之。又方。灸足兩母指上。甲後叢

毛中各十四壯即愈

新錄方治卒中惡方

或一升。塩七合。水四升。煮取一升二合。分再服之。

又方。桃白皮切一升。水二升。煮取八合。一服之。

又方。生昌蒲根切三升。搗絞取汁。服四五合。

又方。酒服桃人末方寸匕。李人末毛三佳。

又方。伏龍肝末水服二方寸匕。

又方。取竹木中虫屎。水服方寸匕。

又方。塩一升水二升。煮臨消二服取之。

治鬼擊病方第三

病源論云。鬼擊者。諸鬼厲之氣擊著於人也。得

之无漸卒著。如人以刃旁刺狀。脅脇腹内。絞急切

痛不可柝。按或即吐血。或鼻口出血。或下血。一

名為鬼排。言鬼排觸於人也。人有氣血虛弱。精

魂衰。倏忽与鬼神遇。相觸突。致為其所排擊。輕者

困而獲免。重者多死也。

葛氏方。治鬼擊病方。

以淳苦酒吹内兩鼻孔中。

患於新發也。武立痛也。

ホニ

又方。灸鼻下人中一壯。三愈。不愈可加壯數也。
灸方灸鼻

又云。治諸飛尸鬼擊。走馬湯方。

巴豆二枚。カクモ、五分不。杏仁二枚。合綿裹椎令碎。投熱湯二合。

中指捻令汁出。正白便與飲之。如食頃下便。老

小量之。

僧深方。治鬼擊方。

塩一升。水二升。和之攪令釋。作汁飲之。令得吐則

愈。良。

新録方。治鬼擊病方。

搗薤汁灌鼻中。如杏人許。須臾。老好。

千金方。治鬼擊病方。

艾如鴨子大三枚。水五升。煮取二升。頓服之。

又方。灸膺上一寸壯。又灸膺下一寸三壯。

治容忤方第四。

病源論云。卒忤者。一名容忤。謂邪容之氣。卒犯忤

人精神也。此是鬼厲之毒氣中惡之類也。人有魂

魄。魄衰弱者。則為鬼氣所犯。喜於道間門外得之。

葛氏方。容忤死者。中惡之類也。喜於道間門外得之。
 令人心腹絞痛脹滿氣衝心脅。不即治之。致入治之方。
 以水漬粳米。取汁三升飲之。口已禁者。以物強發
 內之。又方。銅器若凡器盛熱湯。先以衣三重
 藉腹上。乃舉湯器著衣上。湯轉冷者去衣
 器親完。大冷者易以熱湯。取愈也。
 又方。搏書墨水和。服一錢上。
 又方。繩橫度其人口。以度之。齊去四面。各一處灸
 各三壯。令四火俱起。

又方。灸鼻下人中卅壯。令切鼻柱下。
 又方。橫度口中折之。令上頭著心下。灸下頭五壯。
 又云。已死者。搏生昌蒲根絞取汁。含之立愈。
 千金方。治容忤方。

塩八合水三升。煮取一升半。分二服。得吐即愈。
 若小便不通。筆頭七枚燒末。水和服之。即通。
 又方。灸巨關百壯。

范汪方。治容忤方。
 取牛子矢半杯。以酒三升煮服之。

新録方治客忤方。

搗生艾心取汁灌口中五合。

又水洩方靛帶服之。

治魔不寤方第五。

病源論云人睡眠則魂魄外遊為鬼所魔モウマシ屈其精神

弱者魔則久不得忤乃至氣暴絕所以須傍人助

爰并以方術治之乃獲也。

集驗方治卒魔欲死方。

搗生菲汁灌鼻孔中刺者并灌兩耳。

徐伯方治魔不寤方。

取葱菜刺鼻中慎勿火照之。

葛氏方云卧魔不寤勿以火照之ヒトモル致久但痛齧其

踵及足母指甲際而多唾其面治之方。

末皂莢以管吹カハラフキ內兩鼻孔中即起已三四日猶

可吹之。又方末竈中黃土吹兩鼻孔中。

又方取蕪菜搗以汁吹其鼻孔冬月掘根可攷。

又方以筆毛刺鼻孔男左女右可展轉進之。

又方以牛若馬臨魔人上二百息青牛尤佳。

又方。末昌菴吹鼻中。末桂內舌下。

又方。令一人坐頭首一人於外呼病者姓名。坐人應

曰。人諾在。便即得藥也。今案救急單驗方。井中呼之云。奉諭也。

又云。喜魔及惡夢者方。枕真射香一子於頭邊。

又方。帶雄黃。男左。女右。

又方。作犀角枕佳。又方。以肅頭為枕。

又方。以青木香內枕中帶之。

千金方。治魔不寤方。

雄黃如棗大。徐左腋下。令人終身不肯魔集。

驗方。周之。又方。伏龍肝末吹鼻中。

養性志云。人魔勿燃火愛之。魔死不疑。罔愛之吉。但

得遠愛之。不得近而急愛。喜失魂魄。

救急單驗方。療魔死方。

引牛臨鼻少時即活。又方。齧其足。楛指爪甲際活。

范汪方。治魔死符法。魔死未久。故可活方。

書此符。燒令黑。以少水和之。置死人口。懸鏡

死者耳前。擊鏡呼死人。不過半日即

生。廳鬼丹書之。

新録方。若魔鬼不悟者方。

酒脹髮灰一撮許。又方。搗菟藿根莖取汁煎之。

治尸厥方第六。

病源論云。尸厥者。陰氣逆也。由陽脉卒下墜。陰脉卒上外。陰陽雜居。營衛不通。真氣厥亂。容邪乘之。其狀如死。猶微有息而不恒。脉尚動而形元知也。聽其身內循々。有如嘯之聲。而股間聽者是也。

葛氏方云。尸厥之病。卒死而脉猶動是也。

以管吹其左耳自極三過。復吹右耳三過。即起。

又方。搗菟藿以如棗核大。著耳舌下。

又方。灸鼻下人中七壯。又方。灸膻中穴二十七壯。

又方。灸陰囊下去大孔一寸百壯。若婦人者灸兩乳之間。

又方。以菖蒲屑著鼻兩孔中吹之。令人以桂屑

著舌下云。扁鵲治楚王法也。已上二方。集驗方。

以繩圍病人臂腕。男左女右。申繩從大椎上度下

之。灸繩頭脊上五十壯。

集驗方治厥死如尸不知久。心下餘氣。扁鵲灸法。

龍門方同之。

范汪方治尸厥方。以梁上塵如豆者イシツ。著箆中。吹鼻中。与耳同時

吹之。又方。生薑汁灌口中。

新録方治尸厥方。

取葱白一升。水二升モ。煮取一升。頓服之。

又方。酒服桃人末方寸匕。

救急單驗方。尸厥死方。

灸兩足大指甲後叢毛內七壯。華他云。二十七壯。

治溺死方第七。

病源論云。人為水所浸溺。水從孔竅入灌注府藏。其擁肉

故死。若已拯救得出。即泄瀉其水。令氣血得通。便活。

又云。經半日及一日。猶可活。氣已絕。心上膈亦可治之。

小品方。治溺死。已經二宿者。可活方。

搏皂莢作末。以綿裹內死入下部中。須臾牽出

即活也。

又云。治溺水死方。

以窰灰布著地。令厚五寸。以甑倒覆灰上。以溺人

覆伏甑上。口中水當出也。覺水出。復更別熬灰

令暖。量之。溺人口中。水已出極多。便去甑。即

以暖灰壅溺人通身。但出口鼻耳。小時便蘇醒則活也。

又方。令二健人抱溺人。倒卧。瀝溺人水出盡便活也。葛氏方。溺死一宿者尚可活。治之方。

倒懸死人。以好酒灌其鼻。立活。龍門方又云。身尚温者。取竈中灰二石餘。埋人後頭至足。即活。

又方。便脫暖。奎覆之。取溺人伏其上。腹中水出便活。

千金方。治落水死方。

酢灌鼻。又方。裹石灰內下部中。水盡出即活。

又方。但埋死人暖灰中。頭足俱沒。唯用七孔。

錄驗方。治溺死方。灸齋中

集驗方。治溺死方。

焚沙以覆死人。使上下有沙。但出鼻口中。沙温

濕須易之

治熱暈死方第八。

病源論云。夏月炎熱。人冒涉途路。熱毒入內。与五藏

相并。容耶熾盛。鬱積不宣散。卒絕陽氣。暴擁經

絡不通。故奄然悶絕。謂之暈也。然此乃外邪所擊。真藏未壞。若便遇治。救氣宣則蘇也。夫熱暈不可得冷。便死。

葛氏方。凡中熱暈死。不可使卒得冷。便仍死矣。治之方。

以泥作^{モクセ}。繞^{タカシ}暈人^{カケ}。齋使^シ三四人更溺^{ナリカケ}其中。

又方。亦可屋草帶之。可扣^{タカシ}凡碗底。若脫車^{カケ}。

以著暈人齋上。取令溺。不得流去而已。此道路窮。

急元湯。當令人溺。若有湯。便可以与之。

又方。干薑^楮。梯皮。甘草末。少。內熱湯中。令稍^{ツク}咽。

勿頻多。不可煮之。

小品方。治中熱暈方。

取^{ハトリ}路上^{カケ}。熱塵土。以壅^{ウツメ}其心^{ウツメ}上。小冷復易^{ヒヤチ}之。氣通乃心。

又方。偏^{ウツイ}卧^{フセ}暈人。以草帶圍齋上。令人溺齋中。

即愈。又方。濃^{コク}煮^{ツク}藜飲之。至三升良効。

千金方。治熱暈方。

張死人口令通^セ。以暖湯徐^{ナレ}灌口中。小舉^{ナレ}死人

頭身。令湯入腸。須臾即蘇。

又方。灌地。將漿一盃即愈。

又方。把椅子若鷄。著心前熨之。

又方。地黄汁一盃服之。

又方。但以熨去及熨灰去壅其心上佳。

治凍死方第九。

多頁及

凍者寒也詩去凍其風

病源論云。人有在於途路。逢凄風苦雨。繁霜大雪。衣

服。霜濕。冷氣入藏。致令陰氣閉於內。陽絕於外。榮

衛結滯。復不流通。故致噤絕而死。若早得救療。而

溫氣通則生。

又云。凍死一日。猶可治。過此則不可治也。

葛氏方。治冬天墮水凍。四支直。口噤。裁有微氣方。

以大器多熨。使煖。囊盛以薄其心上。冷復

易。心暖氣通。目則轉。口乃得開。溫酒及作

粥清。稍含之。即活。若不先溫其心。便持火

灸其身。冷氣与火并。則死。勿為也。

治自縊死方第十。

病源論云。人有不得意至者。多生忿恨。注自縊。以

繩物繫頸。自懸。桂致死。呼為自縊。

又云。自縊死。且至暮。稚已冷。必可治。暮至旦。則難治。

此謂其盡則陽盛其至氣易通也。夜則感陰其氣難通也。

又云。夏則夜短又熱則易治。

又云。氣稚已折而心微温者。一日已上猶可治。

又方。用罽衣覆其口鼻。兩人吹其兩耳即生。

小品方。治自縊死方。

傍人見自縊者。未可輒割繩。必可登物令及其頭。即

懸牽頭後舉其身起。令繩微得寬也。別使一人堅塞

兩耳勿令耳氣通。又別使一人以葱葉刺其鼻中吹

令通。又別使一人齧死人兩踵根待其蘇活乃止也。

又方。治自縊死。慎勿割繩也。繩卒折。氣頓泄去便死。

不可復救也。徐トク把死人漸トク解。令繩漸寬也。然後解

下ソルセ之心下尚温。取鷄雌雄無在。拔翅毛去。勿令得飛

也。置地逐之。竟定。走鷄令極久。者其冠當黑。心急

以尺物撥死人口。開便牽鷄頭上。割鷄冠。折取五

臨死人口中。至喉咽氣便通。

千金方。治自縊死方。

凡自縊死。勿截繩。徐キル把解之。心下尚温者。甞能覆其俱又山翁又聲類云甞謂也。

口鼻兩人吹其兩耳。故急單驗方同。

又方。藍青汁服之。

又方。梁上塵如大豆。各內簞中。四人各捉一簞。同

時雨耳兩鼻昂治。

又云五絕方。

一日自經。二。牆壁。三日。溺水。四日。魔魅。五日。產乳

絕。皆以半夏一友細下篩。丸如大豆內鼻中愈。

集驗方。治自經死方。

鳩皂英細率屑取如胡豆吹兩鼻孔中心。單

用皂英三好。

葛氏方云。自經死。雅已久。心下尚微溫。猶可治也。治之方。

未皂英以葱葉吹內其兩鼻孔中。

又方。以蘆管吹其兩耳。極則易入。取活乃心。若

氣通者。少以桂湯稍。咽徐。乃以少。粥清。是

龍門方。療自經死方。

皂莢末如胡豆許。吹兩鼻中。嚏即活。

治注病方第十一。

病源論云。凡注之言。注也。謂邪氣俱注人身內。故名。為

往此由陰陽失守。經絡空虛。風寒暑濕。飲食勞倦。之所致也。或卒死之氣。或卒犯鬼物之精。皆能成此病。其變狀多端。乃至卅六種。九十九種。而方不皆顯其名也。

僧深方云。西王母玉壺赤丸。備急治尸注卒惡水陸毒。整万病方。一名者婆丸。

武都雄黃一兩。赤如鷄冠。八角大附子一兩。炮稱。

梨蘆一兩。上丹沙一兩。不使有石者。白礬石一兩。練之。

巴豆一兩。去皮整令紫色稱之。一方有真朱一兩。

凡六物。悉令精好。先治巴豆三千杵。次內礬石三杵。次內梨

蘆治三千杵。次內雄黃治三千杵。次內白蜜治

三千杵。之可從此。更治方杵最佳。有加真朱一兩者。

若不用丹沙。而內真朱二兩。無在也。生礬石。黑礬石。皆

可用。不必白色者。巴豆勿用兩人者。又方。別搗梨蘆。

附子下後。乃更稱之。又一方。每內藥。輒治五百杵。輒內

少蜜。恐藥飛。搗都畢。乃更治万杵。令藥得僮子治

之。大佳。無僮子。但九人三日。齋戒。乃使之合藥。用建

除日。天清无雲霧。日向。月建藥成。密之。勿令泄。著

清紫處。大人脹之皆如小豆。但丸數之無常。此藥
 治万病。元所不主方。上雖不能具載。故略說耳。若本
 病將脹者。禁食生菓菜猪突。脹以下病者。宿
 勿食明且脹二丸。不知者飲暖米飲。以發之。令下。不
 心飲冷水飲心之。病在胃上吐。胃下者下。或但意氣
 而愈。或食空不消腹堅脹。或痛脹。一丸立愈。風疝寒
 疝。心疝。疝疝。每諸疝。腹中急痛。脹二丸。積寒
 熱老。痞。蛇。疔。服二丸。腹脹不得食飲。脹一丸。卒大
 寒。熱。注來。脹一丸。卒開。格不得大小便。欲死。脹二丸。

音山腹痛也

善療腹中病也

痲結脹。一丸日三服。取愈。若後者射。尚九甚良。下利重
 下脹。一丸便新。或復天行。下便新。卒上氣。但出不入。及
 逆氣衝喉。暴積聚者。服二丸。日再。瘡未。菱。脹一丸。已菱
 脹二丸。便新。小兒百病。痞寒中。及有熱。百日半歲者。以一九
 如柔米。著乳頭。與服之。一歲以上。服如麻子。一丸日三。皆以飲
 脹。小兒大腹。及中熱。惡毒食物不化。結成堅積。皆令將
 脹。一丸。可以塗乳頭。使小兒乳之。傷寒。勅色。及時氣病。以
 焮酒。服一丸。厚覆。取汗。即差。若不汗。復酒。服一丸。要
 取汗。欲行視病人。服一丸。以一九著頭土。行无所畏。

終代及等也

カチラ丸

瘦
所祐及
又作瘦
瘦上俗
也
也
也
也

至死喪家帶一九。辟百鬼。病苦淋路。瘡瘦百葺。
酸疼。服一九。日三。婦人產生餘疾。及月水不通。及來
注不時。服二九。日二。卒霍亂心腹痛。煩滿吐下。手
足逆冷。服二九。注病百種。病不可名。將服二九。
日再。若腹中如有虫。欲鑽腸出狀。急痛。一心一作。
此是風氣。服二九。若惡瘡不可名。瘡疥疽。以膏。
若好苦酒和藥。先鹽湯洗瘡。去痂。拭令燥。以藥
藥塗之。即愈。惡風遊心。不得氣息。服一九。即
愈。耳出膿血汁。及卒聾。以穀裏裏二九。塞耳。

耳孔中即愈。癰腫。瘰癧。瘰癧。及欲作瘻。以若
苦酒和藥塗之。齒痛。以小丸綿裏。著齒孔中。咋
之。苦寒。契注來。服二九。苦虵。虵。蜂。蝎。蠅。所中。
及獾。犬。狂。馬。所咋。以苦酒和塗瘡中。并服二九。
即愈。卒中。惡。欲死。不知人。以酒若湯水。和二九。
強開口。灌。喉中。捧坐。令下。若獨宿。心。林。澤。之中。若
冢墓間。燒一九。百鬼。走。去。不敢近人。辟飲。田。飲。淡
飲。脹。一九。以。臍。和。一九。如。彈。丸。著。絳。囊。中。以。繫。臂。
男。左。女。右。山。精。鬼。魅。皆。畏。之。中。溪。水。毒。服。二九。也。

有瘡在身。以苦酒和三四丸塗瘡上。憂患之氣。結
 在鼻中。苦連噫及咳。鼻中刺痛。服如麻子三九日。
 三愈。婦人鼻中苦滯氣。息不利。小腹堅急。繞脊
 絞痛。漿脹如麻子。稍增之。如小如豆。心腹常苦痛。
 及中契脹。一丸如麻子。日三服。五日愈。男女耶氣鬼
 交通。歌哭無常。或腹大經絕。狀如任身。皆將脹三
 丸如胡豆大。日三夜一。又以苦酒和之。粉且以塗
 手間。使心主暮。又夕夕以塗足。三陰交及鼻孔。七日
 愈。又將脹如麻子。一丸。日三。廿日。腹中三虫。宿勿食。

明平且進牛羊糞。冬三臍。須臾便服。三丸如胡豆。
 日中當下。過日中不復服。二丸必有爛。下小兒
 寒熱頭痛。身熱及吐。視一服。一丸如麻子。小兒疳腹
 丁矣。不能食。不化。將服二丸。日三。又苦酒和如粉。塗
 陰兒腹。良。風目赤。或痒。視漠。浸出。燻。皆以蜜
 解。如粉。以塗。注。日。此目昔。頭卒風腫。以苦酒若膏
 和塗之。即愈。風頭腫。以膏和塗之。以絮裹之。若
 為蝨毒所中。吐血腹內。如如刺。服一丸如麻子。稍益
 至胡豆。亦以塗鼻孔中。以膏和通塗腹背。亦燒之。

醫心方卷十四

二十二

之自薰治鼠瘻以脂和塗瘡取駁舌狗子啗之即愈也。

千金方治一切注無新久方

先作卧灸兩乳兩邊耶下三寸第二助間隨年壯可

至三百壯又心下三寸灸六十壯又兩手大指頭灸七壯

又玄十注丸主十種注氣注勞注鬼注冷注生人注死人注

尸注水注食注土注茅諸注方

注食注水注茅諸注方

雄黃一兩巴豆二兩人參一兩甘草一兩蒿本一兩

桔梗附子一兩皂莢一兩枳一兩麥門冬一兩

十味空腹脹一丸如小豆日二以知為度有驗

葛氏方去注病即是五尸中之尸注又狹諸鬼耶為害也

大略令人寒契淋瀝沉不語之真不的知所苦而無處不

息累年積月漸以至死後復注易傍人乃致滅門

覺似此疾者便宜急治之方

桃核人五十枚研之以水一斗煮取四升一服盡

當吐病不盡二三日更作若不吐者非注

集驗方治注病方

取棗根白皮切二斗。曝ヒキ燒ヒキ作灰。湯淋取汁。浸小豆ヒキ三

斗。如此取灰汁。盡ヒキ蒸ヒキ豆ヒキ。作羊脂。義ヒキ散ヒキ此豆。

又云。治鬼注病相染。易盡ヒキ門方。

獺肝一具。乾之下。篩水服。方寸匕。日三。神方。千金方同

槎要方。療惡症入心欲死。無問遠近年月。皆愈方。

安息香。羊兩為末。酒服。即愈。救急單 驗方同之

又云。療症氣鼓無恒象方。

白芥子カラシ。搗為丸服之。一又酢ヒキ和塗。隨手為驗。

龍門方。療惡症入心欲死方。

獨頭蒜ヒキ一枚。書ヒキ雲ヒキ。如來大並ヒキ。以將胃汁。一小合ヒキ。頓ヒキ立ヒキ老。

又方。取塩如鷄子。布裹燒赤末。酒服。吐即驗。

又方。取枳布ヒキ。裹薄布。症上。以ヒキ。耐ヒキ斗ヒキ。盛ヒキ火ヒキ。耐ヒキ之ヒキ。令ヒキ汗ヒキ出ヒキ。驗。

新錄方云。惡症方。

塩五合。竈ヒキ突ヒキ。墨ヒキ三合。水三升ヒキ。煮。塩消去。滓ヒキ。頓ヒキ服ヒキ。吐ヒキ老。

又方。桃枝切三升。水四升ヒキ。煮。取一升。六合二服ヒキ。之。

范汪方。治尸注毒痛注ヒキ。來方。

燒髮灰。杏子中人。熬ヒキ令ヒキ紫色。

凡二物。人等膏和。酒服。梧子三九日三。

814

818

救急單驗方。療惡症方。

阿魏藥服二升和酒五卷。

又方。桂三兩。酒三升。煮取一升。分再服卷。

治諸尸方第十二。

病源論云。人身內自有三尸諸虫。與人俱生。而此虫忌惡。能與鬼靈相通。常接引外郎為人患害。其發發作之狀。或沉、默、不的知所苦。或腹痛脹急。或螺塊踊起。或牽引腰脊。或精神雜錯。變狀多端。葛氏方云。雜有五尸之名。其例皆相似。而小有異者。

一飛尸。變作无常二道尸。便作三風尸。便作四沉尸。便作

五尸經。變轉致大惡

又云。凡五尸。即是身中尸鬼。接引外邪共為病害。經術其有消滅之方。而非世徒能用。今復撰諸經要以救其弊方。

雄黃一兩。大蒜一兩。搏令相和。如彈丸者。內二合。漿酒中。服之。須臾。未老更一服。便心。有尸疾者。常宜蓄此藥也。

又方。桂。干薑。人等。未之。塩。三指撮。熬令青。未合。水服。

二方寸匕。薑入膏末之。三味煎。並令青。不令米泔。
新錄方。治飛尸方。

灸脊中及兩旁相去三寸各五十主。

又方。桃白皮切二升。水四升。煮取一升六合。分三服。

又云。治道尸方。

牛蹄下五三指撮。酒一盞下。治風尸。

又方。燻艾以青布裹更熨。又方。燻大豆裹更熨。

又云。治沉尸方。

灸大倉七壯。又灸乳下一寸七壯。

又方。駿灰。杏人。蜜和丸。如梧子。一服七丸。日二。
千金方。治道尸。注方。

桂心一兩。干薑二兩。巴豆大二枚。

三味下篩。上酥和。如泥塗病上。干即易。送。

又云。芥子薄。主道尸。飛尸方。

芥子一升。蒸。搗下篩。以黃丹二兩攪之。分作踈。

布。依盛之。更蒸使乾。薄痛上。當更送。蒸。依恒。

恒使乾。

治諸瘡方第十三。

病源論云。夏日傷暑。秋必病瘧。其人形瘦皮栗。

以月一日。菽當以十五日愈。設不愈。月盡解。

後瘧載卷未

通云。瘧病多種。各不同形。有溫瘧。有寒瘧。有瘧。

瘧。有勞瘧。有鬼瘧。此五瘧。內應於五藏。溫瘧者先熱。

而後寒。寒瘧者先寒而後熱。瘧瘧者吐逆。宿汁。

腹中生絃瘕。勞瘧者不得用力。鬼瘧不可與飲食。用。

用藥不得同。

集驗方黃帝曰。夫瘧瘧皆生於風。夏傷於暑。秋為瘧。

病源論云瘧氣在腸助之則宜而越效也則引腸下懸痛所以謂之瘧瘧

飯或法本一作瘧瘧字

於禁又

今葉百有

瘧瘧

瘧。問曰。瘧先寒而後熱何也。對曰。夫寒者陰氣也。風者陽氣也。先傷於寒而後傷於風。故先寒而後熱也。問曰。先熱後寒者何。對曰。先傷於風而後傷於寒。故先熱而後寒也。名曰溫瘧。其但熱而不寒者。陰氣先絕。陽氣獨發。名曰瘧瘧。

治之方。夫瘧必從四末始。先其發時。一食項。用細左藥繩。

緊。

束其手足十指。遇時乃解。

又方。取大蜘蛛一枚。內蘆管中。密塞管口。繩。

係以雄雞カケウ過葭時乃解去葛氏方同之

又方桃菜有核又紫菜也二十七枚サイ女心上僧深方同之艾葉モ上十四枚同之

千金方治癩方

未葭前把雄雞一頭著懷中時驚動令雞

作大聲無不著

又方故鞋底フルツラ玄兩頭燒灰并花水モ服之

又方未葭前預灸項大椎尖頭此上九漸灸過時心

葛氏方治癩病方

又方又煮豉又作湯飲數升令得大吐便斷

又方破一大豆天玄皮書一斤キホ作日字一斤キホ作月字

左手持日右手持月吞之立愈向日服勿令人

知之

又方灸鬣カク甲カク鳩末酒服方寸匕至葭時令

三服兼用火灸灸无不斷

龍門方療一切瘡方

取恒山カク甘草カク等分鳩末和水服方寸匕吐即差

又方取蓮鳩末三指撮以酒和欲葭前服之驗

范汪方治癩方臨發時鳩大附子オウ下篩以苦酒和之

塗背上。

廣濟方療瘡方。

恒山三兩。以漿水三升浸經一宿。剪取一升。欲發

請門前頰脹之。後吐苦心。无所禁忌。

小品方。斷瘡先大寒。後大熱者方。

小麦一升。淡竹葉一席口。恒山三兩。

凡三物。以水五升。宿漬。明且煮取二升半。分

三服之。

僧深方。治一切諸瘡無不斲。恒山丸方。

大黃一兩。附子一兩。恒山三兩。龍骨一兩。

凡四物。治冷下。齋和平且服。梧子七丸。末

發中間復服七丸。臨發服七丸。若不斷至後

後日復發。更服如此法。甚神良。

本草經云。治瘡者。煮葎草汁及生汁服之。

本草替疑云。治瘡。燒猫屎為末。酒服方寸匕。

治鬼瘡方第十四。

范汪方。治鬼瘡方。

丹書額。言戴九天書。臂言祀九地。書足言履九江。

819

書背言南有高山上有大樹下有不流之水中有神虫三頭九尾不食五穀但食瘧鬼朝食三千暮食三百急如律令書背言上高山望海水天門亭長捕瘧鬼得便斬勿問罪急如律令

產經
同之

又云平且發者布死鬼恒山主之服藥訖持刀

食時發者鎰死鬼蜀木主之服藥訖持索

日中發者溺死鬼大黃主之服藥訖持盂水

晡時發者舍長鬼麻黃主之服藥訖持磨衡

黃昏發者婦人鬼細辛主之服藥訖持明鏡

夜半發者厭死鬼黃芩主之服藥訖持車軟

鷄鳴發者小兒鬼附子主之服藥訖持小兒墓上析

草木

凡七物各一斗治下符發時加所主病藥一斗當發

日從且至發時温酒服方寸匕三服訖必持所主病

物甚良有効

又云平且作者容民鬼也先作時令病者持衣如律

去言欲遠出立愈

食時作者。容死鬼也。先作時。令病者辭。言欲歸之大道

上。橋梁下逃之。

馬中作者。市死鬼也。先作時。令病者因結棧北向吐。

此字誤字
掩安救是
坑也
營以埃。

日中作者。溺死鬼也。先作時。令病者取盆水中。著連南向坐。

營以埃。

日跌作者。已死鬼也。先作時。令病者言使捕汝庭中。

晡時作者。自經死鬼也。先作時。令病人當棟下卧。以繩索

繫病者頭。日入作者。人奴舍長死鬼也。先作時。令病者

磨碓問逃之。

黃昏作者。盜死鬼也。先作時。令病者踰去遠。無令

人知其家。入定作者。小兒鬼也。先作時。病者取小兒墓

上折草木。立愈。夜過半作者。囚死鬼也。先作時。取司

空棧。令病者持之。因從出。可榜笞汝者。

夜半作者。寒死鬼也。先作時。令病者温衣。營以埃。持

桃枝。飲食。匪內中。無人知見。紫此次上。

鷄鳴作者。乳死鬼也。先作時。令病者犯高棗席之。梳

目。應令持桃枝。營以埃。

如意方治鬼瘧方

發日早且取井花水丹書額作天獄字書背作

會獄字書背作背獄字左手作左獄字右手

作右獄字兩足心各作地獄字畢向東咒云日出

東方隱似沒晝罵白夜罵月瘧鬼不死當復

斂清冷之鬼飲汝血北斗七星何不截急々如

律令三過咒便愈

又方計葭日今夕可食鷄鳴起著衣履屣屣

隨意出戶脫之逢出勿願入幽閑隱室緊閉戶

勿令人知脫人來呼勿應過時勿飲食飢

極但卧忍之至夕乃還必斫也

通玄去鬼者或間或頻日葭作無時者此為鬼虐任

避之及用飲食送遣如三日不心用

恒山三兩豉一升秫米百粒蒜七斤研清酒

二升漬之一宿早且服之得大吐則心

治温瘧方第十五

病源論云夫温瘧與寒瘧安舍温瘧者得之冬中

於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪

醫心方卷十四

三十二

短氣
及
咳

邪氣不能出。目遇大暑。腦髓消鑠。脈肉消釋。淡

理發泄。故先契而後寒。名曰温瘧。

治寒瘧方第十六

病源論云。寒瘧。此由陰陽相并。陽虛則陰。勝

。則寒發於內。而并於外。所以內外俱寒。故病

發。但戰慄而鼓頷。

通云云。寒虐者。清。而惡寒毛豎。發則引温而少

契方。

朱沙四分。

雄黃一分。

人參四分。

恒山五分。

牡厲四分。熬。蜜丸如梧子。一服七丸。日再。空腹

脹之用粥飲之。

治淡實瘧方第十七。

病源論云。謂病人胃滿。先有停淡結實。目感瘧病。

則令人心下支滿。氣煩隘之。

范汪方。治瘧淡實不消。恒山湯方。

恒山六分。

甘草四分。

知母三分。

麻黃三分。

大黃四分。

凡五物切。以水五升。煮取二升。分三服。至發時令盡。

治勞瘧方第十八。

病源論云。凡癰積久不差。則表裏俱虛。客邪未散。真氣不復。故疾難繫間。積久不愈。則表裏俱虛。客邪未散。真氣不復。故疾難繫間。小勞便發。

集驗方。治勞癰。時不斫。衆治無効。此方治之。

生長大牛膝一大帛口切。以水六升。煮取二升。分

再服。第一服取未發前一食頃。第二服取臨發

今葉葛氏方云。酒三升。漬一宿。分三服。

葛氏方云。老癰久不斫者。

末龍骨方寸匕。先發一時。以酒一升半。煮三沸。及

契盡脹。溫覆取汗。五愈。

又方。炙鼈甲搗末。酒服方寸匕。至發時。令三服。兼

用火灸。無不斫也。

僧深方。治勞癰。桃菜湯方。

桃菜十四枚。恒山四兩。

凡二物。酒二升。漬一宿。露著中庭。刀著器上。明且

發。日凌晨。源玄澤。後溫令煖。一頓服之。必吐。良。

治嶂癰方第十九。

病源論云。山嶂癰。此病生於嶺南。帶山嶂之氣也。其

狀寒熱。休作有時。皆由挾溪源山嶺嶂毒氣故也。其病

重於傷暑之癰申治在元之註前下等有り
者自婆方治瘰癧要方。

蜀恒山三兩。甘草二兩。光明砂一兩。

三種鴉節以蜜寒和丸如梧子未發前服三九發

時服二九發後服一九於後三日更服一服三日慎食。

錄驗方治瘰及嶂氣方。

恒山二兩。甘草二兩。切以白絹大一升浸一宿去滓

二服未發前一服臨發又一服任吐慎生涎酢滑酒

完麵油膩房室

治間日瘰方第廿

病源論云問日瘰此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時

相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行

遲不能與衛氣偕出是以間日而作。

集驗方治瘰或間日發或夜發者方。

秫米百粒。石膏八兩。恒山三兩。竹葉三兩。

凡四物切以水六升漬藥覆一宿明且者取取二升分

三服取未發前一食頃第一服取臨發第二服當一

日勿洗手足面及嗽口勿進食飲取過時不發乃燥

洗進食也。并用餘藥汁。塗五心及胸前頭面。藥滓

量頭邊。此方從來舊用神驗。

小品方。折癰恒山酒方。治瘡癰。先寒戰動地。寒解壯熱。

日。煮間日。煮並折方。

癸甲一兩。淡竹葉切三升。恒山三兩。甘草三兩。酒三

升。凡五物。以酒漬藥。乃景上覆頭安露地。明且以水

七升。煮取三升。分五服。未煮前令盡。當吐。極傷

多。不必盡割。但禁飲水。粽。

治連年癰方第廿一。

范汪方。治連年癰不差。牛膝酒方。

牛膝草一把。好酒三升。凡二物。牛膝內酒漬一宿。明且

三服。

錄驗方。恒山治癰十歲廿歲方。

恒山二兩。甘草一兩。大黃二升。桂心六銖。

凡四物切。以恒山酒漬一夜。諸藥以酒三升。水二升。煮

取七合。頓服。下吐愈。

僧深方。治卅年癰。龍骨丸神方。

龍骨四升。恒山八升。附子三升。大黃八升。

凡四物各治莢。鷄子和。莢前服七丸如大豆。臨莢

服七丸。

効驗方。治卅年癰。恒山散方。

恒山五分。干沫タルウルシ四分。牡蠣シカキ二分。杏子カシモウヤネ二分。

凡四物下莢。酒服方寸匕。日三。

治莢作無時癰方第廿二。

病源論云。夫衛氣一日一夜大會於風府。則湊理開。

則邪入。則病作。當其時陰陽相并。隨其所勝。負

則生寒熱。故動作皆有早晏。若府藏受邪。內外失

守。邪氣妄行。所以休作無時。

葛氏方。治癰莢作无常。心下煩熱方。

恒山クキ二兩。甘草兩半。豉シ五合。以水六升。煮取二

升。分再服。當快吐。仍斷即飲食。

傷寒證候第廿三。

病源論云。經云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣水

寒。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。万類深藏。君子

固密則不傷於寒。夫觸冒者。乃為傷於四時之氣。

皆能為病。而以傷寒為毒者。以其最為致厲之氣。

馬。即病者。為傷寒。不即病者。其寒毒藏肌膚中。至
春變為溫病。夏變為暑病。者。熱重於溫也。是以
辛苦人。春夏必有必。有溫病者。皆由其冬時觸冒之
所致。非時行之氣也。其時行者。是春時應溫而返
寒。夏時應熱而返冷。秋時應涼而返熱。冬時應寒
而返溫。非其時而有其氣。是以一歲之中。病無長少。多
相似者。此則時行之氣也。
又云。夫熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。其死皆以六
七日間。其愈皆以十日以上。

葛氏方云。傷寒時行溫疫。雖有三名。同一種耳。而源
本小異。其冬月傷於暴寒。或疾行力作。汗出得風
冷。至春夏發。名為傷寒。其冬月不甚寒。多暖氣。及西
南風。使人骨節緩墮。受邪至春發。名為時行。其年歲
月中。有厲氣。兼挾鬼毒。相注。名為溫疫。如此。詐僞並相
似。又貴勝雅言。總名傷寒。世俗同。呼時行。道術者。初
言五溫。之復。以此致大歸。終是共途也。
醫門方云。凡傷寒病。五六日而渴。欲飲水。不能多。未宜
也。所以介者。腹中熱尚少。不能消之。便作病矣。至七八日

澱祖喜又
汗出也坪蒼

醫心方卷十四

三

大渴欲飲水。然當与之。常令不足。勿極意。云能一斗而
与五升。若飲而腹滿。小便不利。若喘若臧。不可与之。
戢然大汗出。是為已愈也。凡得此病。及能飲水。此為欲
愈之候。若小渴而强与之。目此成禍者。其數甚衆。
傷寒不治。惟第廿四。

葛氏方云。陽毒病。面目斑。如錦文。喉咽痛。下體膿。五日
不治死。

陰毒病。面目青。舉身疼痛。喉咽不利。手足逆冷。五日不
治死。毒病發赤斑。一死一生。

熱病未發。汗而脈微細者死。

內契脈盛躁。發汗求不青出者死。

汗雖出。至足者猶死。

已得汗而脈猶躁。感熱不退者死。

汗出而誠言煩躁不得卧。目精乱者死。

汗不出而臨面者死。汗出大下利不止者死。

汗出而寒不心。鼻口冷者死。發熱而症腰掣。縱齒

齧者死。不得汗而掣。縱狂走。不食腹滿。胃背痛。臨

面者死。

醫心方卷十一

喘滿誠言直視者死。熱不退目不明舌本爛者死。

欬而衄者死。大衄不止腹中痛短氣者死。

痰而衄者死。大便不止腹中痛短氣者死。

嘔咳下血身熱而大瘦削者死。

手足逆冷而煩躁脈不至者死。

大下利而脈疾及寒者死。下利而腹滿痛者死。下利

手足逆冷而煩躁不得眠者死。

腹滿腸鳴下利而四肢冷者死。利心眩冒者死。

腹脹嗜飲食而不得大小便者死。

身面黃腫舌卷身糜臭者死。

不知痛處身面青。齖不欲語者死。

目匡陷不見人口干謬語手脩衣縫不得眠者死。

始得使一身不收口干舌焦者死。

疾始一日腹便滿身熱不食者死。二日口身熱舌干者

死。三日耳聾陰縮手足冷者死。

四日腰下至足熱而上冷腹滿者死。五六日氣息高

者死。

七八日脈微于而溺血口干者死。

醫心方卷十一

又云。使温病不相易法。以繩度所
任戶中。屈繩燒斷。

醫門方。避温疫法。

赤小豆五合。以新布五寸裹。內井中。不至底少許。

三日漬之。平晨東向。男吞二七。女吞一七。病者同

床不相染。

又云。瘡温病轉相注易。乃至戚門。傍至外人無有
者。服此藥必不相易方。

鬼箭羽二兩。鬼臼二兩。赤小豆二兩。丹參二兩。

衛子
一名一

用羽

雄黃二兩。搏篩蜜丸。如梧子服。一九日二

三。与病人同床。傳衣不相染。神驗。

千金方云。温病時行。令不相染方。

立春後有庚子日。温蕪菁菹汁。合家大小並服。

不限多少。極要方同之。

又方。常以月望日。細坐東行。桃枝煮湯浴之。

又方。桃樹蠹矢末。水服方寸匕。

集驗方。新温加二月。且取東行。桑椹大如指。懸門戶上。又人帶之。

得富貴方云。欲至病人家。手中作鬼字。

玉箱方云。屠蕪酒。治惡氣温疫方。

白木桔梗ツクシ。蜀椒ツクシ桂心ツクシ。大黃オウゴン。烏頭オウゴン。枝樸シキ。防風フウフウ。

凡八物。細切ツクシ。緋ツクシ。成ツクシ。盛ツクシ。以十二月晦日ツクシ。日懸ツクシ。沉ツクシ。井中ツクシ。勿令ツクシ。至ツクシ。泥。

正月朔且出藥。量三升。温酒中。屠蘇之。向東戶飲之。各

三合。先從小兒起。一人服之。一家無病。一家飲之。二里无

恙。飲藥三朝。還量井中。仍歲飲之。累代無患。

葛氏方云。老君神明白散。避温疫方。

白朮二兩。桔梗二兩半。烏頭一兩。附子一兩。細辛二兩。

凡五物。搗篩。歲且以温酒服五升。一家有藥。則一里

無病。帶是藥散以行。所經過病氣皆消。若他人有

得病者。便温酒服一方寸匕。

又云。度嶂散。辟嶂山惡氣。若有黑霧鬱勃。及西南温

風。皆為疫癘之候方。

麻黃カネネクセ五升。蜀椒ツクシ五升。烏頭オウゴン二升。細辛コウキン一升。防風フウフウ一升。

桔梗一升。干薑一升。桂心一升。白朮一分。

凡九物。搗篩。平且以温酒服一錢上。

又云。新温病。令不相染著法。

新汲水ヒツクミ。綆ツル長七寸。盜著ヒツカ病人卧席下。集驗方。

又方。密以艾灸病人床四角各一丸。勿令病人知之。

又方。以^ク鯽^ノ魚^ノ密^シ置^キ病人^ノ卧^シ席^ノ下^ニ。勿^レ令^レ知^ル之^ヲ。

又方。附子^{三枚}小豆^{七枚}。令^レ女人^ノ投^シ井^ノ中^ニ。

治傷寒困^{クル}葛^ノ方^第廿六[。]

葛氏方。治時行^ノ垂^ル死者^ノ。破^レ棺^ノ千^金湯^ノ方[。]

苦參^{一兩}。吹^レ咀^レ以^テ酒^二升[。]煮^レ令^レ得^一升^半。盡^レ脹

當^レ吐^毒。千金方

本草^ノ蘓^ノ敬^ノ汪^ノ去[。]人^ノ屎^ノ乾^者。燒^レ之[。]烟^ノ絕[。]水^ノ漬[。]飲[。]汁[。]名[。]

破^レ棺^ノ湯^也。主^レ傷^レ寒^ノ熱^ノ毒[。]今葉葛氏方世人謂之黃龍湯

者[。]婆^方。治^レ熱^ノ病^ノ困[。]苦^者方[。]

生^レ麥^門冬^小一^升。去^レ心[。]搗^レ碎[。]熬[。]內[。]井[。]花[。]水[。]絞[。]取[。]一^升半[。]及[。]冷[。]入[。]三[。]脹[。]熱[。]甚[。]者[。]吐[。]即[。]差[。]

集^レ驗^ノ方^云。凡^レ除^レ熱[。]解^レ毒[。]無[。]過[。]苦[。]酢[。]之[。]物[。]

崔[。]禹[。]錫[。]食[。]經^云。梨[。]除^レ傷^レ寒^ノ時^ノ行[。]為[。]妙[。]藥^也。

通[。]玄[。]經^云。梨[。]雜[。]為[。]五[。]藏[。]刀[。]斧[。]是[。]為[。]傷^レ寒^ノ妙[。]藥^云。

治^レ傷^レ寒^ノ一^二日^方第^廿七[。]

病^源論^云。傷^レ寒^ノ一^日。大[。]陽[。]受[。]病[。]大[。]陽[。]者[。]小[。]腸[。]之[。]經^也。

故[。]先[。]受[。]病[。]其[。]脉[。]絡[。]於[。]腰[。]脊[。]至[。]於[。]頭[。]項[。]故[。]得[。]病[。]一^日而

頭[。]項[。]腰[。]脊[。]痛^也。以[。]下[。]次[。]第[。]如[。]常[。]

葛氏方云。傷寒有數種。庸人不能別。今取一藥兼治
治者。若初舉頭痛。實熱脈洪起一二日。便作此葱豉湯。

葱白一庖口。豉一升。以水三升。煮取一升。頓服取汗。

集驗方小兒
尿三升。

又方。葛根四兩。水一斗。煮取三升。內豉一升。煮

取升半一服。

又方。搗生葛根汁。服一二升佳。

治傷寒三日方第廿八。

新錄方。治傷寒溫疫三日內。脈洪浮。頭痛惡寒。壯熱身

體痛者方。

葱白一升。豉一升。艾子三七枚。桂心二兩。無用生

薑三兩。以水七升。煮取二升。分三服之。

治傷寒四日方第廿九。

玉箱方。傷寒四日方。

葎蒂二十七枚。以水一升。煮取五合。一服。當得吐之。

治傷寒五日方第卅。

范汪方。治傷寒五六日。瀉而利者。黃芩湯方。

黃芩三兩。半夏半升。人參二兩。桂心二兩。干薑

三累。大棗十二枚。凡六物。水七升モ煮得二升。分再服。

道玄玄。五日外肉涼內熱者。宜服之。宜服升麻湯方。

升麻二兩。黃芩三兩。艾子二兩。大青二兩。大黃二兩。別浸ヒタセ芒消三兩。水八升モ煮取二升半。分三升。

生餅シロク服。如不利盡服之。

治傷寒六日方第卅一。

范汪方。治傷寒六七日。不大便有瘀血方。服之。

桃人ヒラサネ廿枚。大黃三兩。水蛭十枚。蠶虫コノコ廿枚。凡四物。搗篩為四丸。卒服。當下血。不下復服之。

治傷寒七日方第卅二。

千金方。傷寒吐下後七八日不解。結熱在裏表俱熱時。

惡風大溫。舌上干而煩。飲水數升。白散湯方。

母六兩。石膏一升。甘草二兩。粳米六合。

四味水一斗二升。煮米熟去滓。分服一升。日三。

葛氏方。若已六七日。熱盛心下煩悶。狂言見鬼。欲起走者。

方。絞糞汁飲。數合至一升。世人謂之為黃龍湯。陳

久者弥佳。

治傷寒八日方第卅三。

録驗方。治傷寒八九日。腹滿外內有熱。心煩不安。莖胡湯方。

蜈蚣二兩。生薑三兩。葶藶三兩。莖胡八兩。大黃三兩。

黃芩二兩。甘草一兩。人參一兩。半夏二兩。

來蝶蛸七枚。

凡十物切。以水一斗。煮得三升。溫飲一升。日三。

治傷寒十日以上方第卅四。

千金方。治傷寒熱病十日已上。發汗不解。及吐下後諸熱。

不除。及下利不止。皆治之方。

大青四兩。甘草二兩。阿膠二兩。豆豉一升。

四味。以水八升。煮取三升。頓服一升。日三。

治傷寒陰毒方第卅五。

集驗方云。陰毒者。或傷寒初病一二日。便成陰毒。或服藥

六七日以上。至十日。變成陰毒。身重背強。腹中絞痛。

喉咽不利。毒氣攻心。下強短氣。不得息。區逆。脣

青面黑。四肢厥冷。其脈沉細緊數。此陰毒候。身

如被打。五日可治。七日不治方。醫門方同之。

甘草二升。外麻二升。當歸一升。蜀椒一升。

鱉甲四升。

凡五物^取吐咀。以水五升煮。三升半。久服。三行五里。復服温覆。中毒當汗。則愈。若不汗。病除。

重脹之

治傷寒陽毒方第廿六。

集驗方古。陽毒者。或傷寒一二日。便成陽毒。或服藥吐下之後。變成陽毒。身重腰背痛。煩悶不安。面赤狂言。或走。或見鬼。或下利。其脉深浮大數。面斑如錦。唯咽痛。下體^膿五日可治。七日不治方。^{醫心方同之}
甘草二升。當歸一升。蜀椒一升。升麻二升。

雄黃二升。桂心一升。

凡六物^取吐咀。以水五升煮。取二升半。久服。三行五里。

須復服。温覆手足。中毒則汗。則解。不解重

作。今世有此病。此二方實未經用。

治傷寒汗出後不除方第廿七。

集驗方。大汗出後。脉猶洪大。形如瘧。日一發。汗出。便解方。

桂心一兩十六銖。夕藥一兩。生薑一兩。甘草一兩。

大棗十四枚。麻黃一兩。杏仁廿三枚。

凡七物切。以水五升先煮麻黃。再沸。下諸藥煎。

醫心方卷十四

得一升八合。服六合。

治傷寒鼻衄方第卅八。

千金方云。傷寒鼻衄。腸間有餘熱。故也。熱因衄自息。不悉

者方。

牡蠣十五。

左顧者。

石膏五斤。

右二味。

酒服方寸。先食日

三四。一凡衄亦可用。一方以漿服之。集驗方同之。

僧深方。治熱病鼻衄多者。出血一二斛方。補不補重

補黃五合。以水和一飲盡即愈。不著別依諸衄方。

又方。燒牛一糞作灰。服方寸二。又方。以冷水洗佳。

治傷寒口干方第卅九。

集驗方。治傷寒熱病口干喜唾方。

干來棗廿枚。

碎

烏梅十枚。

碎

二物合搗。蜜和合。杏核大咽其汁。

治傷寒唾血方第卅。

范汪方。治熱病唾血方。

白茅根一物。搗下篩為散。方寸二。日三。至可絞取汁

飲之。

治傷寒吐方卅一。

醫心方卷十四

集驗方。治傷寒吐虛羸欲死方。

鷄子十四枚。以水五升煮取二升。乃內豉四合。復煮
兩三沸去豉。八再服之。

治傷寒歲方第卅二。

病源論云。傷寒所以歲者。胃中虛冷故也。

葛氏方。治傷寒宛不心方。

甘草三兩。橘皮一升。水五升煮取一升。頓服之日三四。
小品方云。春夏時行。寒毒傷於胃。冷宛方。

白茅根切一升。橘皮二兩。桂心二兩。葛根二兩。

凡四物。以水六升煮取三升。分三服之。

救急方云。天行後干嘔若歲手足冷方。

橘皮四兩。生薑半斤。右以水七升煮取三升。分四
五服五驗。

治傷寒後嘔方第卅三。

集驗方。治傷寒後干嘔不下食蘆根飲方。

生蘆根切一升。青竹茹一升。粳米三合。生薑二兩。
以水七升煮取二升。隨便飲。不差重作。

治傷寒下利方第卅四。

葛氏方。治熱病不解。而下利困篤欲死方。

大青^{ハトクセ}四兩。甘草二兩。膠^{ニカハ}二兩。豉八合。

以水一斗煮取三升。分三服。盡更作。日夜兩劑愈。

又方。以水煮豉一升。艾干十四枚。葱白一把。取三升。分三服。

治復寒飲食勞度方第卅五。

病源論云。夫病新差。血氣虛^尚。津液未復。目即勞動使成

病焉。若言語思慮則勞於神。梳頭澡洗則勞於力。未堪

勞而強勞則生熱。氣還入經絡復為病。名曰勞復。

門方云。論曰。凡溫病新差及重病差後。百日內禁食猪肉及

腸而肥。臭油膩。必大下利。藥所不能療也。必至於死。

若食餅^{クワヘモクヒ}餠^{キヤ}餠^{シヤク}菜^{キヤ}黍^{シヤク}餠^{シヤク}脯^{シヤク}粘^{シヤク}食^{シヤク}炙^{シヤク}肉^{シヤク}膾^{シヤク}菘^{シヤク}生^{シヤク}棗^{シヤク}栗^{シヤク}諸^{シヤク}菓

子及堅實難消之物。胃氣尚冷。大利難禁。不下之必

死。下之後免。不可不慎也。

病新差後。但得食粥^{カシ}糜^{カシ}。寧少食^{ルシ}。令飢。慎勿飽食^ル。不得

輒有所食。雜思之。勿与引日轉久。可漸食麩^{カシ}。鹿^{カシ}。雉^{カシ}。兔^{カシ}。肉

等為佳。

療熱病新差。早起及多食葷^{カシ}。復方。

艾子十枚。水二升。煎取一升。去滓。頓服之。溫卧令

841

發汗佳。通除諸復。

又方。燒龜甲末。服方寸匕。葛氏方同之。

葛氏方。治葛病新起。早勞及飲食多致復。欲死死方。

以水服胡粉少許。又方。燒飯籬末。服方寸匕。

小品方。治食勞復方。葛根五兩。以水五升。煮取二升。分三服。

千金方。治食勞方。

杏人五枚。酢二升者。煮取一升。服之。取汗。

又方。燒人矢灰。水服方寸匕。

治傷寒洗梳勞復方第卅六。

千金方云。洗手足復者。飲半盞。是汁合。梳頭復者。看頭垢如葉大者一枚。
平金方。治或目洗手足。或流頭勞復方。
取洗手足汁。飲一合。又方。取頭垢如葉大者。吞一枚。

天者一枚

宇治本无醫門方。去温病老後。當靜卧。勿早起。自梳頭。澡洗。但非

體勞。亦不可多言語。用心使患。此皆令勞復。

宇治本无又去。若欲冷病不發。復者。燒頭垢如杏人大服之。

治傷寒交接勞復方第卅七。

醫門方。云。温病新差。未滿百日。氣力未平。復而已。房

室無不死者。葛氏方云。餘勞。尚可。女勞多死。

又療丈夫契病者。而交接發。或陰^{ハヤク}即腫縮入腹中。絞痛^{ツク}欲死方。

取女人月經赤衣燒末。服方寸匕。

又方。取女人陰上毛燒飲之。極救急。

僧深方云。婦人時病毒未除。大夫日幸之。婦感動氣

泄。毒即度著大夫。名陰易病也。丈夫病毒未除。婦人

納之。其毒度著婦人者。名為陽易病也。

陰易病者。婦人陰毛十四枚燒服之。陽易病者。

燒大夫陰毛十四枚服也。

葛氏方云。男女温病後。雖數十日。血脉未和。尚有契毒。

与之交接即得病。名曰陰易。致人甚於時行。宜急治之。令

人身體重。小腹急。契上衝胃。頭重不能奉。眼中生眵。膝

胫拘急。欲死方。

取婦人禪親陰上者。割取燒末。服方寸匕。日三。小

便即利。而陰微腫者。為當愈。得童女禪益良。若

女病。取男禪如此為之。千金方醫門方同之。

千金方。治交接勞方。

取所与交婦人衣。覆男子上。一食久。葛氏方醫門方同之。

545

又方取粳女人手足瓜十枚。女中衣帶一尺燒以酒炙米汁飲之。

治傷寒病後頭痛方第卅八。

千金方云傷寒老後更頭痛壯熱煩悶方。

服黃龍湯五合日三。集驗方同。

治傷寒病後不得眠方第卅九。

病源論云大病之後府藏尚虛營衛未生。故成於冷熱。陰氣虛。衛氣獨行於陽不入於陰。故不得眠。若心煩而不得眠者心熱也。若但虛煩而不得眠者。瞻冷也。

千金方。溫瞻湯都敷。療大病後虛煩不得眠。此瞻冷故方。

生薑四兩。半夏三兩。枳實二枚。橘皮三兩。

甘草一兩。竹茹二兩。六味水八升。煮取二升。分三服之。

玉箱要錄云。大病老後虛煩不得眠。眼闇疼懊。農加。

豉七合。烏梅十四枚。水四升。先煮梅取二升半。

內豉煮取一升半。入再服。無梅用艾子十四枚。

治傷寒病後汗出方第五十。

病源論云。大病之後。復為風所乘。則陽氣發泄。故令

虛汗。

544

葛氏方。治大病後。多虛汗及眠中汗流方。

龍骨。牡蠣シカキ。麻黃根。鴉末カチ。雜粉ツネラフ以粉身。

錄驗方。治大病之後。虛汗不可心方。

干薑三分。粉三分。治合ツツ以粉。大良。

小品方。治大病後。虛汗不禁方。

染粉トキ。豉シキ。凡二物。凡等。火熬。令集フルキ。燒。故竹扇。

如掌大。取灰合治。以絹囊盛。傳體。豆心。最驗。

當先熬豉末之。与粉等也。

又云。治大病之後。虛汗不可心方。

宇治本无豉。自本等首。

至在強及
餌謂之染
或養字
也。稻餅也
師說粟也

杜仲ハナト。牡蠣シカキ。凡二物。凡等。治之。向暮卧。以水服。

錢。午上。汗心者。不可復服。令人乾。然。

治傷寒後。目病方。第五十一。

葛氏方。治毒病後。毒攻目方。

煮蜂窠。以洗之。日六七。今案廣利方云。蜂窠。半大。雨水。二升。云。又。僧深。方。治翳。

又方。冷水。漬青布。以掩目。集驗方。治翳。

又云。若生翳者。燒豉。二七枚。末。内管中。以吹。集驗方。同之。

耆耆婆方。温病後。目黃方。

麥門冬。菜三握。以水一升。煮取。三升。去滓。少飲。

之自差。

槎要方。療傷寒病温毒熱病時行疫氣諸病之後毒
无眼中生赤脉赤膜白膚白翳者方悉去之。有患赤
痛不得見光。病毒煩惱應心者洗之即愈。神効之方。

秦皮二兩。升麻二兩。黃連二兩。

右以水洗去塵屑。然後以水四升煮取二升半。分

三合。眼作以綿繞箸沾取湯以滴眼中。如屋漏狀

盡三合。須臾復用如前法。日五六過佳。

治傷寒後黃疸方第五十二

辛巳年丁巳

葛氏方。治時行病發黃方。

首陳蒿六兩。大黃二兩。艾子十二枚。以水一斗先煮艾

苜陳。取升去滓。內二藥。又煮取三升。分四服之。

千金方。治傷寒熱出表發黃疸方。

麻黃三兩。以清酒五升煮得一升半。盡服之。覆取汗。

治傷寒後虛腫方第五十三

千金方。治病後虛腫方。

豉五升。淳酒一升。煮三沸。及熱頓服。不耐酒隨性。覆汗

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

千金方。毒熱病攻手足腫痛欲脫方。

馬矢煮漬之。汝陽及未盡也又方。以稻糠灰汁漬之。

又方。常思草ナモア絞取汁以漬之。

又方。削黃蘗水个ッリキタ煮漬之。

又方。煮猪蹄取汁。以白葱塩少著中。以漬手足。冷則易。

集驗方。治毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方。

濃煮馬杖根以漬手足。又方。酒煮苦參漬之。

治傷寒後下利方第五十五。

小品方。治濕熱為毒及大陽傷寒外熱內虛熱攻腸胃

下黃赤汁及如爛肉汁及赤滯オツ熱腸痛者。諸熱毒

下良方。

支子クチオシ十四枚。豉クキ一升。薤白オホアラシ一席口。

凡三物切。以水四升煮支子薤白令熟。內豉煎取

二升半。入三脹。

經心方。治熱病後赤白利痢痛不可忍方。

香豉カウシキ一升。黃連カクレン三兩。薤白オホアラシ三兩。

以秬米ルシホ泔汁ナヒ五升煮取二升半。入三脹。之

醫門方。瘡傷寒後下利膿水不能食方。

黃連三兩。烏梅肉二兩。未逆蟻一兩。洋蟻和蜜合

為丸。空腹如梧子服卅丸。日再。加至四五丸。

又方。取龍骨末。服方寸匕佳。

治傷寒後下部癢痛方第五十六。

葛氏方。治大孔中卒癢痛如鳥啄方。

赤小豆一升。大豆一升。合搗兩囊。盛蒸之。令

熱。牙坐之。

又云。治毒病下部生瘡方。

取大塩以深導之。不過三。

又方。煮桃皮。煎如粘。以綿合導之。

范汪方。治大孔中癢方。

取女萎治下節。綿裹着大道中。瘡絕乃

出藥。

治傷寒。豌豆瘡方第五十七。

病源論云。夫表虛裏實。熱毒內盛。則多發瘡。重者周遍

遍身。其狀如火瘡。若色赤頭白者。則毒輕。若色紫黑

則毒重。其瘡形如豌豆之名。豌豆瘡。

今案千金方云。小便澀有血者。中壞。瘡裏廩不

出膿死。

千金方。治豌豆瘡方。

初發覺オホエ欲作則煮大黃五兩服之愈。

又方。取好蜜トキキ通身瘡磨上。又方。以蜜煎麻トリノクシクヒ之。

又方。青木香二兩。水三升煮取一升頓服トキキ老トキキ方同上。

又方。小豆屑クタイ鷄子白和傅之。又方。婦人月布モ拭之。

又方。青木香湯。青木香二兩。丁香一兩。

董陸香一兩。白礬石一兩。射香二升。右五味以水四

升煮取一升ホ再服。熱毒盛者加一兩犀角。無犀

角外麻代病輕去礬石。大神驗。

葛氏方。治時行蛇瘡方。

以水ホ濃煮外麻綿ホ沾洗ホ拭之。又苦酒漬煮ホ好。

救急單驗方。療時患遍身蛇初覺出方。

即服三黃湯令利ホ蛇即滅ホ。又方。飲鐵漿ホ升五ホ老。

又方。小豆末一合和水服驗。

新錄方。豌豆瘡滅癩方。

鷹矢粉クツツクハ上。若瘡干和猪脂ホ塗日三。又方。胡粉付上。

又方。桑白汁和鷄子白塗之。又方。用蜜塗之。

千金方云。芒消和猪膽塗瘡上勿動。痂落無痕。都敷及

今案天平九年六月廿六日下諸國官符云。凡是疫病。名赤

斑瘡。初發之時。既似瘰癧。瘡出之間。經三四日。支體府

藏大契如燒。當是之時。欲飲冷水。固忌莫飲。以綿能

勒腹腰。必令溫和。勿使冷寒。又鋪設既薄。无卧地上。唯

於床上敷箬席得卧息。又粥饘并煎餅粟等汁。温冷

任意可用。又糯粳糲以湯饘食之。又病愈之後。雜經廿

日不得輒喫鮮菓菜并飲水及洗浴房室。強行步

當風雨。年莫不可食。但乾麩堅菓等煎否皆良。

又麩及阿遲等菓并

傷寒後食禁第五十八。

養生要集云。凡温病傷寒愈後。但宜食糜粥唯少。

勿食大飽。引日轉久可轉合羊脂雉菟麋羹羹汁少

食之慎。不慎病復致死。

又云。凡傷寒毒病愈百日之內。禁食猪羊腸血肌菓臙

乾之難消之物。不禁者則令泄利不可復救也。

養性志云。諸病愈後。勿食五辛。食之令人目失明。

七卷食經云。時行病愈。食禁葫蘆蝦鮓葷。不禁病復

發則難治。後年輒發。

醫心方卷十四

醫心方卷十四

時行病後禁餅餌與膾諸生菓菜難消之物皆復發病

時行汗解愈後勿飲冷水損心肥常虛不能伏

時行病人不可食鯉鮓小鯉及鮓令病不愈

又勿食生菜及羊宗隔上乃為禁燔音藥釋氏云火光也

凡病人不得食熊肉令作長病終不除愈

時行後禁飲酒食真宗令泄利難治

時病愈後未滿三月食鮓與復食諸菜三年肌膚

不充

又食梅油脂物令暴利難治又食菘合鱠令病後

直田及陸云鮓或作鮓子麻云

菘又食蒜鱠令人損臍消又未滿三月食鮓鮓即復

病時行病後未強食青花菜令人手足損重云黃花

又飲酒合陰陽復病必死又食生菜合陰陽復必死

治傷寒變成百合病方第五十九

千金方云百合病者是一白脉一宗恙致病也其狀惡寒而

歛者病在上焦也廿三日當愈其腹滿後喘大便堅三四日一便

時復小溲者病在中焦廿三日當愈其狀小便淋瀝難者病在

下焦也廿三日當愈各隨其證以治之耳云具在本方

百合之病令人欲食復不能食或有羨時或有不用聞

醫心方卷十四

六十一

飲及飯。如有寒其實無。如有熱其復無。他常默欲
卧復不能眠。至朝口苦小便赤。欲行復不能行也。諸藥
不治。治之即劇。如有神靈所為也。

本无同上 百合病。其脉微數。其候溺時即頭覺痛者。六十日乃愈。

本无同上 百合病。候之溺時頭不覺痛。沂如寒者。卅日愈。

本无同上 百合病。證或其人未病。已豫見其候者。或已病一月。日
復見其候者。治之喜誤也。依證治之。治百合病已經發

之後者方。

百合根取七枚。擘之。洗水二升。漬之一宿。當沫出水

中。明且去水。取百合以泉水二升。煮百合取一升汁。

復取知母三兩。切以泉二升。煮取一升汁。合和百

治百合病已經下之後者方。

滑石三兩。代赭一兩。以水三升。煮取一升。內百合汁如前

法。一升。合和復煎取一升。分再服。之。

治百合病始不經發。汁不吐不下。其病如初者方。

生地黄汁三升。和百合汁。後煎取一升。分再服。大

便當去汗為准也。治百合病已經吐之後者方。百合汁一升。如前
法。取鷄子黃一枚。內汁中攪令調勻。再服。

治百合病經一月不解。變如渴者方。

取百合根一升水一斛漬之一宿以汁洗病人身也洗

身竟食白餅勿与塩豉也渴不差可用栝楼根并

牡蠣分等為散飲服方寸匕三

治百合病發熱者方

滑石三兩。百合根一兩。

右燉之飲服方寸匕三當微利者心勿復服也

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熱熱令黃色飲服方寸匕日

三滿消痛心

治時行後變成瘧方第六十

錄驗方云大五補湯治時行後變成瘧方

苟杞白皮一斤。麥門冬一升。去心。生薑一斤。干地黄三兩

當歸三兩。黃耆三兩。人參三兩。甘草三兩。

伏苓三兩。生竹葉五兩。遠志皮三兩。木三兩。

青蘗二兩。桂心五兩。大麥廿枚。桔梗二兩。

夕藥三兩。半夏二兩。洗。

凡十八物切以水一斗五升煮取三升分四服一日令盡之

855

掃作朕外 十四頁 宣散 仁和寺本散下有致陰 十六頁上

行七意至 仁和寺本 作 自縊 外臺作 十八頁 俱佳 源

作居 身內 仁和寺本 行 下二 卒死 仁和寺本 卒作 作

上三行 方杵 仁和寺本 六頁 上大腹 仁和寺本 作 腹

腹 下八行 心主暮 仁和寺本 傍記有 行廿日 寺和

作三 上四行 新錄方云惡症方 仁和寺本 下有灸乳 下邪三寸

日中 上四行 螺塊 外臺病源 上二頁 尸經 和仁

餘二肋間依 行 下八 螺塊 外臺病源 上二頁 尸經 和仁

年壯十三字 行 下三 十主 仁和寺本 作十良 案主 炷之 心

寺本 作尸 行 下三 十主 仁和寺本 作十良 案主 炷之 心

注 今案 仁和寺本 上七頁 遇時 外臺作 上八頁 服

之驗 仁和寺本 此下有極要方 療瘡無問新久 服之皆

灸桂心二分 松蘿二分 烏肉六分 灸右為散 酒服方

寸七日 再加至二十七五十九字 無范汪方 治瘡方 六字

下七頁 蜀木 仁和寺本 作 下二頁 脉肉 外臺作 頁三

八令盡 湯方 桂心半兩 恒山二兩 烏頭半兩 元花半兩

致五分 凡五物 以酒三升 水四升 令 下五頁 水粽 仁

糝字 無 上六頁 僧深方 仁和寺本 無此方 上七頁

為傷 仁和寺本 傷三字 上六頁 符初 仁和寺本 行 下九

死毒 仁和寺本 死 上四頁 通玄經 仁和寺本 無此條

856

醫心方卷十四

七小腸病源作行下七服一二升佳仁和尚存此下有干

頭痛壯熱脈盛如得一升頰脈之二日方真丹一兩以世五行

水二升煮得一升頰脈之下覆取汗世九字氣傷寒三日

三升煮取二升分再服六當得吐之仁和尚存此下有

覆令汗神驗四十一字行當得吐之仁和尚存此下有

日中惡汗欲令吐方致三升強一升水七升煮取二

升半去滓內蜜一升又煮三升頰脈七升當吐之世五

字下四行支子仁和尚存此下有又方龍

有半斤搗碎以水一斗煮取五升上七行如此為

使極冷飲其間或得汗則愈也七字上七行如此為

之仁和尚存此下有又方通治諸勞復亦七字上七行

五十四頁支子十四枚水一石揚之方過取二斗半夏

上六行支子十四枚水一石揚之方過取二斗半夏

二兩洗秫米一升茯苓四兩合上五十五頁令人乾燥

仁和尚存此下有又方通治諸勞復亦七字上七行

風小便難此下有又方治發汗後遂漏汗不心其人惡

附子至之方大棗十四枚擘桂枝三兩附子一枚碎之


八片凡三物以水七升煮取三升分三服七十一字

下九行濕熱仁和尚存此下有又方通治諸勞復亦七字

仁和尚存此下有又方通治諸勞復亦七字上七行

六十三

二



書三
五
二
寺
年
上
以
行
等

三十一

