

醫心方卷第廿

X
1109-1

F 10
1-70

490.9
Is-3
19

W.2265
10; 109-1



富士川支庫
1418



醫心方卷第廿

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治脹石除弊解發セキ方第一 治脹石煩悶バンル方第二

治脹石頭痛方 第三 治脹石耳鳴ウノ方第四

治脹石目痛方 第五 治脹石目無ムツ所見方第六

治脹石鼻塞スガシ方 第七 治脹石口于カギ燬タマ方第八

治脹石口爛タマ右痛方第九

中傷ウヂョウ熱氣ニホクイ自利ジリ二字

治脹石心噤方第十一 治脹石口中菱瘡方第十

治脹石咽痛方第十三 治脹石心腹脹滿バン方第十四

治脹石心腹痛方第十五

治脹石腰脚痛方第十六

治脹石百草痛方第十七

治脹石手足逕參方第十八

治脹石身躰生瘡方第十九

治脹石面上瘡方第廿

治脹石結腫欬癰方第二十

治脹石身體強直方第廿二

治脹石身體腫方第廿三

治脹石身體強直方第廿四

治脹石荳黃方第廿五

治脹石嘔吐方第廿六

治脹石咳唾方第廿七

治脹石上氣方第廿八

治脹石痰癥方第廿九

治脹石不能食方第廿

治脹石酒熱方第卅一

治脹石淋小便難方第卅二

- 治脹石小便不通方第卅三
治脹石小便稠數方第卅四
治脹石小便多方第卅五
治脹石大便難方第卅七
治脹石下利方第卅九
治脹石冷熱不適方第卅一
治脹石經年更發方第卅三
龐氏論云凡藥欬荳之候先欬頰申或苦頭
頭痛目疼身躰癆瘕或驚恐悸動周身而
也又癆病也

漆子卷七

瘓或耳中氣滿如絆車之聲或躰契割於
 火燒或如針刺七札噤音燎惡寒昧子對文、憤莫見文、不知
 痘或腹中燠熱如燒鍛鐵懷之也其疾
 基者腹滿堅於村石統口青黑大小便血而
 多無脉也如此之病歸於木澆以羌味目不明皇憤心亂也為期也
 痘論云夫脹散之人覓トトク昂洗覓飢則食
 先食不時失其度令石熱壅結於容文否塞不解而
 生熱也故湏以藥除之外臺方云凡服石之後若
 覓大熱者可服紫雪或金石凌或絆雪或白

雪等但半大升水取碗研一大兩香湯浴後頃
 脹之候一兩行利熱乃退矣凡此救急中紫雪爲
 上

千金方去解一切藥叢不問草石始覓惡方

生麥門冬八兩

葱白八兩豉三升

三味水升

大升取二升

七合分三服

又去治服散急覓動

葱豉湯方

香豉二升

葱白切一升

乾藍三兩

甘草二兩

四味切以水七升

煮取三升半分三服

小品方亦解寒食散發或頭痛或心痛或腹痛
或胃腸腫滿或寒或熱或手足冷或口噤或口瘡
爛或目赤或干渴惡食氣便飲吐或狂言倒錯不
與人相當或氣上欲施進退経時散發百端服前胡
湯得下便愈方

前胡二兩夕藥三兩黃芩二兩大棗廿枚甘草二兩大黃
二兩凡六物以水八升煮取二升半分三服腸堅滿加伏苓
二兩鼻中滿急枳子一兩連翹中令不用食加生
薑三兩虛乏口燥加麥門冬二兩若加藥者加水作

九升也 錄驗方夕藥二兩

又云解散三黃湯治癰盛熱實不除心腹滿小便赤
大行不利地連充胷中口焦燥目赤薰方熱

黃連二兩 黃芩二兩 大黃一兩 甘草二兩 芒消二兩

凡五物以水五升煮取二升半內芒消令洋分三服
又云小三黃湯是由來舊方與前治同然石勢勝
前方除實不如也

大黃一兩玄子十四枚 黃芩二兩 豉三升

凡四物以水六升先煮三物令數沸以箇豉內湯中

取二升分再服

又玄增損皇甫文子豉湯治人虛石感特折石勢除熱

方

豉一升半 文子十四枚 黃芩二兩半

凡三物以水六升煮取三升去滓內豉令得二升分

三服

又玄解散熱發身如火燒黃芩湯方

黃芩三兩

甘草一兩

枳實二兩

厚朴一兩

桔梗一兩

夕藥一兩 文子十四枚 凡七物以水七升煮取二升分

三服

又玄解散除熱心煩敏毒單行薺莧湯方 薺莧半斤

凡一物以水一斗煮取三升分三服停冷飲之

又玄解散除熱單行菽水石湯方

菽水石四兩 凡一物以水四升煮取二升半服七合日三

禪慧義玄解散麥門冬湯方

麥門冬一升豉二升 文子十四枚 葱白半斤

凡四物以水六升煮取二升分再服

新錄方玄解散方

支子人一升 葱白一升 猪脂四升

煎葱白焦布絞去滓一服如桃李日二三石當如

沙尿中出

又方水服大麦杭米麯五合日二三

又方飲熱酒使薰然醉

又方飲牛乳五六升勿絕佳

又方數飲玉漿曰一二

急藥方云丹石立驗方

甘草二兩 于葛二兩 故一大合

右以水五升煎取四升食前溫啜食後冷啜若
不心更喫

石論方除熱調石蘆根湯方

生地黃四兩切麥門冬二兩去心甘草一兩
蘆根四兩

伏苓三兩 九五物細切以水七升煮取三升去

滓冷分三服

又玄甘豆湯方

甘草二兩 大豆五合

凡二物以水五升煮甘草令減一升內大豆煮取

二升半分三服

治服石煩悶方 第二

將行遂
助也

乘於藏故令煩悶也

僧深方解散甘草湯治散發煩悶不解方

甘草一兩半

伏苓一兩

生薑一兩

凡三物以水三升煮取一升半分三服

今案小品方甘草二兩黃芩二兩大

黃二兩水五升煮

取二升分三服

張仲景云解散發煩悶欲吐不得單服甘草湯方

甘草五兩切以水五升煮取二升服一升得吐便心

新錄方云煩熱悶者方

薈蘆切三升水四升煮取二升分飲之

又一方單飲生地黃汁日二三升佳

又一方飲二三升生葛根汁良

樞要方治乳石癥動煩悶頭痛或寒熱脚冷氣

不通方

葱白十四莖

豉二大合

牛蒡一大兩

右於鑄中鋪葱即安蕕於葱上即着豉以

根也
助也
行也
濕也
氣也

物兼鋪上緩火煎候。蓀氣銷盡昂淋好酒。

一升半良久昂得瓦屑冷搘頃服隨性多

少飲之

又玄石荳煩悶者方

滑石十二分

研令細分兩服

右以水六四大升合和滑石末一升和攪令散頓服

治脹石頭痛方第三

皇甫謐云或頭痛欲裂坐脹藥食溫作漸急宜下
普瀉及漂謂之

之曹歎女頭面若眩冒者則解頭結散髮扇之漸甚頭

治卒死之發卒亦有之
痛面赤者以寒水淋頭不差以油裹盛水著頭結中外臺方云或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴須虛靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎及頭上三五十椀然後乃浴勿令見風浴託覆被安卧取汗仍須喫葱根葛豉

粥法

葛根三

大

握

千

薑

六

兩

頭

豉

三

合

葱

白

一大

握

生

薑

少

許

葛

十五

顆

葛根三

大

握

千

薑

六

兩

頭

豉

三

合

葱

白

一大

握

生

薑

少

許

葛

十五

顆

許

葛

十五

顆

及

豉

取

二

升

去

滓

細

研

少

許

米

作

稀

粥

并

著

葱

白

寺

煮

熟

並

熟

敷

之

託

依

前

覆

被

稀
力
作
糊
餅
之

香
薷

取汙託令婦人以粉遍身揩摩攸丸合半日許始可出外其病立愈

苦堅丸

治脹石耳鳴方第四

皇甫謐云或耳鳴如風聲汁出坐自勞出力過差房室不第氣并奔亂耳故也懃好飲食稍行步數食セヨ葛根トキナヘ心曹トノウ歎スル云耳鳴汁出數イナ冷食步行

治脹石目痛方第五

皇甫謐云或目痛如刺坐熱氣冒肝上奔亂兩眼故也勤冷食清旦以溫小便洗之又或頭痛項強

摩下マサフ治本マツボ天マツシ醫マツシ等マツシ有マツシ之

兩目疼者以水洗浴卽愈

樺慧義ヒカエイ解散治目疼頭痛方

芎シムネシカツラ

三兩

葛根クルミネ

兩

細辛アラヌホウキ

二兩

防風ハブウカガ

三兩

五味子ゴメイザ

三兩

木シキ

四兩

伏苓アラヌホウキ

四兩

黃芩ヒヨウキン

二兩

人參ヒンセン

二兩

九九物以水一斗三升煮取三升分三服

僧深方治散家目赤痛斐人洗湯方

葵人甘枝ヒコロヒタチ

半兩

苦竹葉クバハヤ

一枚

黃連カクテイ

一兩

九四物水三升煮取一升半一方取半升可日三洗之

可六七洗

葵根ヒコロヒ
唐カタシマ
根如蕷豆ヒコロヒタチ
大圓亦即カタシマ
有子及葉ヒコロヒタチ
如胡桃カタシマ

治服石目無所見方第六

皇甫謐云或目寢無所見坐坐飲食居處溫故也

脫衣自勞洗促令飲食須臾自明了

釋慧義云散發熱氣衝目漠漠無所見方

黃連

毫

于薑

細辛

蕤核

九四物分等

㕮咀

綿裹

淳酒五升

以藥內中於

銅器中

煮取二升半

綿注洗目使入中日再

治脹石鼻塞方第七

病源論云發則將令其熱盡之後令氣不退者

苓乘於肺主氣開竅於鼻其冷滯結氣不宣通
故鼻塞

曹欽方鼻口鼻冷飲冷洗

秦丞祖云治解散熱勢盡肺冷鼻塞宜服茱萸

湯方

蜀椒

朴

甘草一兩

于薑一兩

木朮一兩

桂心一兩

茱萸

兩

凡六物細切以湯六升煮取二升半分為再一服
治脹石齒痛方第八

以下第三次第與常相連仍直之

皇甫謐玄或斷腫脣爛齒可搖痛頰車噤坐犯熱
不時救故也當風張口使冷氣入咽喉寒水昂卷

治脹石咽痛方第十九

皇甫謐玄或咽中痛鼻塞清涕出坐溫衣近火故也

促脫衣冷水洗當風以冷石熨咽頰五六過自差

治脹石口干煥方第二十

小品方治口中干煥渴虛不下食方

蘆根炙少煮取濃汁以粟作粥漿服多少任意

葛氏方治口中熱干煥烏梅桑膏分等以蜜和丸如

來念之

周易敬本草注云口干食熟柿

董侍郎云若口干即取甘蔗汁任服

治脹石口中傷爛舌痛方第十一

僧深方解散支子湯方

黃芩三兩 丹子四枚 故三升

前三物咀以水五升先煮丹子黃芩令得三升
絞去滓乃內故煮令汁濃絞去滓平旦服一升半

匡甚良

治服石口中叢瘡方第十二

曹欽云口中生瘡舌強服丈子湯在上

僧深方云解散失革度口中發瘡方

黃芩三兩 外麻二兩 石膏五兩

末

丸三物以水六升煮取三升去滓每令以漱口中日可

十過 小品方若喉咽有創稍之咽之佳

小品方治口創小麋湯方

龍膽三兩 黃連二兩

子麋四兩

丸三物以水四升先煮龍膽黃連取二升別瀆子麋

令水淹潛投湯中和稍含之

治脹石心禁方第十三

病源論云其寒氣盛勝於熱榮衛不通寒氣內結於心故心腹痛而心噤寒也其状心腹痛而寒

噤不能言是也

僧深方云解散人參湯常用驗治心噤或寒噤不解

方

人參二兩 千薑一兩 甘草三兩 伏苓一兩 柯樓二兩

白朮一兩 枝實一兩

凡七物水六升真取二升五合分三服。

秦越祖云療散致酒方散發不解或禁寒或心痛
心噤禁皆宜服之方用。

羨豉二升勿令有鹽 凡一物熟令杏以三升清酒投之沸
湯胡移火 取溫服一升小小自溫煖シムラ 令有汙意若患熱不可取
汙者但服之不必期令汙也

治脹石心腹脹滿方第十四

病源論云居處犯シ温セ 致令石熱不宣內壅本府藏與氣相
搏故心腹脹滿也

皇甫謐云或腹脹欲決甚者漸衣帶坐寢處久下熱
又衣溫失食失洗不起行促行飲熱酒冷食冷洗當
風梯梳而立

僧深方解散三黃湯治散表心腹痛脹滿卒急方

大黃

黃連

黃芩

各三兩

凡三物以水七升真取三升分三服得下便心止
令素三黃湯化出小品方在上除熱篇

小品方云三黃湯治散感熱實不除心腹滿小便赤
大行不利地連丸膚中口焦燥目赤董熱方

黃連二兩 黃芩二兩 大黃黃二兩 甘草二兩 芒消二兩

凡五物以水五升煮取二升半內芒消令洋分三服

治脹石心腹痛方第十五

病源論云革間有寒胃管有熾寒熾相搏氣達攻
之心故心腹痛也

皇甫謐論云或心痛如錐刺坐當食而不食當洗而不洗寒熱相交氣結不通結在心中口噤不得息當校口根與熱消任本性多少其令酒兩得行氣自通得噫於風寒聲也曰以冷水洗淹布巾著所苦變溫復易之

自解之便速令食能多益善若大惡着衣小使溫便去衣昂差於諸痛之中心痛最為急者救之若若赴湯火乃可浴耳

小品方云治散發心痛腹脹兼冷動熱相格不消甘草湯方

小品方桔梗

甘草二兩

桔梗二兩

木二兩

枳實二兩

玄子一兩

凡五物以水七升煮取二升分三服

又玄單行甘草湯方

甘草四兩

凡一物以水五升煮之折半分之頓服盡當大

吐患心腹痛服諸藥无効者宜服此湯

張仲景方云黃芩湯治散瘀腹內切痛方

文子二兩 杏豉三升 黃芩二兩

丸三物切綿裹以水九升煮取三升分三服以衣

覆卧之應有汗

僧深方云若散瘀患口噤心痛脹慈白豉湯方

慈白半斤 豉三升

甘草二兩 生麥門冬四兩

丸四物以水五升煮取二升分再服 一方加茱萸一升

治脹石腰脚痛方第十六

特忍氣下咽

病源論云腎主腰脚服石熱歸於腎若將適失度發動石熱氣乘腰脚石勢與血氣相擊故脚熱腫痛也其狀脚煩熱而腰痛也

皇甫謐云或脚疼欲折坐下溫宜常坐寒床以冷水洗趁行又云或腰痛欲折坐衣厚弊溫以冷水洗冷石熨之

治服石百草痛方第十七

皇甫謐云或百草酸痛坐卧下太厚又入溫被中衣溫不脫故臥下當極薄大要也被當單布不着

綿衣少當薄，且垢故勿著。新衣宜著，故繫也。
雖冬寒，當常補頭。受風以冷石熨衣帶初不得繫也。若犯此，酸悶者，促八冷水浴，勿忍病而畏浴也。

桂要方云：脹乳石不得將慎衝。契失食憎寒頭痛。

百草瘦疼口脣乾燥

知母八分

石膏十三分

升麻六兩

通草八分

硝石八分

竹青皮六分

露蜂房二枚

灸

切以水二大升煎取九合食後分溫三服。

卷方

圮
岸崩

小品方云：解散二物，麻子頭歎湯治人虛勞下焦有
熱，骨髓疼煩，肌急內圮，小便不利。大行數少吸之。
口瘡少氣，折石熱方。

檀

豉二升

麻子五合

櫻

日不

櫻取入

櫻研物也

凡二物研麻子大以水四升煮取一升半分服五合

日三便愈。

神驗

治脹石，辛足達冷方第十八

石論云：治解散，胃中有熱，手足達冷者，苦寒甘草

湯方

甘草一兩

橘皮二兩

九二物水三升。糲取一升半以綿箸頭數取汁。

脹湏臾間復脹不可寢食。

治脹石面上瘡方第十九

廣濟方言石氣發熱身體痏腫面上瘡出方。

寒水石以冷水於碗中研令汁濃將塗瘡乾即點勿停。

治脹石身體生瘡方第廿

病源論亦將適失宜外有風耶內有積熱。乘於血。

氣壅滯故使生瘡。

千金方玄治散發瘡痛不可忍方

苓石五兩一味下蒜粉瘡上擦痛湏臾靜定。

今檢本草

陶注云消石

又玄散發生細瘡方

黃連

芒消各五兩

博學二味水八升糲黃連取四升去滓內芒消以布取汁。

瘡上敷易之

小品方云治通身發創疎折狂曰用火不得息者方。

對胡蘿蔔煮溫洗潰尤良冬取根煮飲之。

錄驗方云解散爛創洗湯方今東脉黃燭之

黃連半升 苦參

黃芩 各半升

凡三物以水二斗煮取一斗去滓極冷洗之日三
新錄方云凡散瘻瘍方

水研大麻子塗日二三 天方水摩蓼菁子塗

天方日二三

天方水和豉研爲泥塗上日二

秦丞祖療散發熱創三黃膏方

千金大黃二兩

黃連二兩

黃芩二兩

九三物以好苦酒漬之足相淹一宿猪膏二斤拔
火煎三沸，輒下去滓摩之
天玄瘡散浮在肌膚作瘡方

子蘂黃皮末下蔻鷄子白和如泥先熬子蘂汁

沖洗却以傅之不過再便愈

治脹石結腫飲作癰方第廿一

錄驗方云解散除熱，結腫堅起始飲作癰大黃

湯方

升麻

大黃

夕藥

枳實

各二

黃芩三兩甘草當

當歸

名一

凡七物以八升煮取二升半分三服使下腫昂消

小品

升麻

湯

治服石癰疽背方第廿二

千金方云癰疽背皆由服五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平未服石而自發者此是上世有服之者其候稍異

又云發生者小兒見背上癰痒有異尋取淨古火和作泥捻作餅子徑一寸半厚三分以

都念丸

瘻艾作炷炙近上炙之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅若如榆莢大灸七炷即善矣至錢許大曰夜灸不任忌
又云恒冷水射之潰冷石熨之日夜勿止待差住手龐氏論云凡諸服草石散者皆不可灸身體令人喜癩疽瘡也若體有瘡不可溫治也唯以水漬布枯之燒李中人作膏以摩瘡上諸洗如故
蘆侍郎云若發瘡及腫但服五杏連翹湯等在小品治

方

醫心方卷廿

二

又云若腫有根堅如鐵石帶赤色者服湯仍以小
艾炷當腫上灸一兩炷為佳

治脹石身體腫方第廿三

皇甫謐云或周身患腫不能自轉後坐久停息不
飲酒藥氣沈在皮膚之內血脈不通故也飲酒令
洗自步行步即^{卷之二}極^子不能行者使健人扶曳行^{卷之二下}之
秦益祖方云九藥荳之後身腫浮腫安取冷所

致甘草湯方

甘草三兩^{卷之二}大子十四枚

九二物以湯五升煮取一升半分再服

文云療散癰赤腫枯方

黃芩四兩 鷄子四枚 吴茱萸四兩

九三物擣下廣布以水一升合鷄子白於器攪之

令沸出滌巾枯腫上溫復易之數十過

千金方云若復脚腫向上稍進入腹則敍人方

赤小豆一斗以水三斗煮爛出豆以瀆脚膝以平日

一數日為之愈矣

又云若已入腹者不須瀆煮豆食之斯一切薑菜飲食

米麴。唯只食豆一物。渴飲汁。乃心。

又玄散發赤腫摩膏方

杏葉茶

生地黃五兩 大黃一兩 木人冊一枚 生章陵三兩
牛膝四味切酢漬一宿猪脂一升奠章陵黑去津摩膏

三夜一

治服石身體強直方第廿四

皇甫謐云或閉竅強直不可屈申坐久停息不自
煩勞藥氣勝血氣結而不散起沉滯於血脉中故
也任力自溫便令洗昂差任力自溫者令行動出力

足勞則發溫也非厚衣近火之溫也

釋慧義云治寒榮似中惡手腳逆冷角弓反張
其狀如風或先熱後寒不可名字若先寒者用
冷水二三升洗脚使人持之先熱者以生熟湯四
五升許洗之若體中竟直者是散急服此湯方
桔梗根三兩 支子一枚 人參一兩 甘草一兩
杏豉一升 石膏三兩末 葡萄葉三兩

凡七物細切之以水八升煮取二升半分三服
僧深方云治散發卒死身體強直以手署口上如

尚有痰氣昂便兩人汲水灌之洗三兩三時間死者乃戰セハ便令人扶曳行便得食竟復勞行半日許便愈此藥失葷瘦所爲似中惡解之方

黃連 大黃芩各二兩 黃芩一兩 芍子人十四枚

九五物以水七升煮取三升半去滓內更煮取三升三服近有用此湯昂得力也

治脹石菱黃方茅廿五

病源論云飲酒內熱亂曰脹石之熱又熱之搏脾胃之主土其色黃而候於肌肉積熱蘊結發於肌膚故

成黃白

錄驗方治散菱或黃菱熒毒胃中熱氣煩悶葫

菜葉湯方

葫菜葉一把切 几一物以水七升煮取二升半分再脹一劑便愈亦治通身黃終日用水不得息者濃煮大荳莖葉適寒溫自洗潰毫

尤良

新錄方治發黃者鵝蒼可取汁脹一升日一今案脹紫雪紅雪等可下去積熱

醫學心方卷十七

治脹石嘔烏木丸方第廿六

病源論云將適失宜脾胃虛弱者石墊結滯乘於脾胃致令脾胃氣不和不勝於穀故氣逆而嘔謂之嘔逆也

秦丞祖云芒消丸治散患積癥癥逆嘔方

芒消三兩 大黃大黃三兩 杏仁三兩

凡三物各別搗治先末大黃芒消下後後搗杏人子令如膏乃合三物以蜜丸服如梧子丸

曰二夕少隨意消息之

小品方太解。發散振動煩惱嘔逆。人參湯方法。議道人所增損方用如此。

人參二兩 甘草二兩 木二兩 黃芩一兩 柘櫟兩
九五物以水七升煮取二升分三服

治脹石效味方第廿七

曹叢論云效逆咽痛鼻中窒塞清涕出本皆是中冷之常候也而散熱亦有此諸患冷效者得溫是其宜也若是熱者得消於理當差和也欲分別之者飲冷轉劇者果是冷效也飲冷竟佳者果是藥

弊效也

皇甫謐云或效達咽中傷清血出坐卧溫故也或食

溫故也飲冷水冷石熨咽喉外熱上氣味苦病者並和水服

秦越祖云療散效陳膳嘔胃中冷先脹散下盛不得

脹散藥杏人煎方

杏子中人世

白蜜六合些莞一兩于薑一兩牛脂升

丸五物治合下

篩和以蜜微火煎令可丸如梧子服

丸日三老小甚佳

治脹石上氣方第廿八

病源論云脹散將適失肝溫大過熱搏管衛而氣達上其狀胃滿短氣是也

僧深方竹葉湯治散發上氣方

生竹葉二兩甘草一兩黃芩一兩大黃一兩文子十枚

伏苓一兩于地黃六分

丸七物以水五升煮取二升一合服七合日三

治脹石蒼潭方第廿九

病源論云脹散而飲過度將適失宜衣厚食溫即飲結成淡滯其狀淡反則胃氣不滿頭眩痛心脢

病結成淡滯其狀淡反則胃氣不滿頭眩痛心脢

絃急是也

皇甫謐云惡食如髮物生溫衣作暉也當急下之若不下方救終不差也蘆公曰以三黃湯下之

僧深方脹散家淡胸齧心下有阻滯客熱者吐之方甘草五兩以酒五升煮取二升半分再服欬吐者便扶蕩去

小品方云白巖湯治寒食藥羹トキハシナス匂中澹酢于歐煩方

白巖二兩半夏二兩ホウカヒ洗干薑一兩甘草半兩

七

凡四物以酢五升煮取三升分脹五合大酢酒能令石柯爛

治脹石不能食方第卅

張仲景云半夏湯治散瘀于歐不食飲方

半夏八兩ホウカヒ洗炮生薑十兩桂心三兩橘皮三兩

右四物以水七升煮取三升半分三服一日令盡

治脹石消熱方第卅一

小品方治消熱，瘀熱法積，飲酒石熱目感敷散行經絡中使氣力強，腎家有熱欲爲勞事，夕使腎

體虛則熱盛；心下滿口煩，渴欲飲；隨歎吐不安飲食

也。宜飲葛根湯安穀神除熱心吐渴也。

治脹石淋小便難方第世二

皇甫謐云：或淋不得小便，坐久坐不下溫及騎馬鞍中熱入膀胱故也。大冷食以冷水洗少腹以冷石熨一日即

僧深方治散癟小便難，其狀如淋方

葵子五合

凡一物以水二升半煮取一升一服，晝湏臾便利也。錄驗方云：解散閼悶結小便不通如淋方。

大黃一兩 麻子仁半斤 夕藥一兩 伏苓二兩 黃芩一兩

凡五物以水五升煮取二升半分再服 小品方內之

廣利方云：石氣頭痛煩熱，口乾小便赤少方

露蜂房十二分參

右以水二大升煎取八大合分溫二服 當利小便諸惡石

桂銀毒隨小便出

治脹石小便不通方第世三

病源論云：夫脹散石者，石熱歸於腎而內生熱，結小腸胞內否澁故小便不通也。

小品方云解散小便不通神良方

桑螵蛸世故 黃芩一兩

凡二物以水一升煮取四合頓服之

錄驗方云解散利小便致良葵子湯方

三歲

葵子

一升

右一物以水三升煮取一升半冷暖隨意

頓食飲不能稍胀一方加滑石三兩

治脹石小便稠數方第世四

皇甫謐云或小便稠數坐弊食及散諸含弊物餅添之故也以冷水洗少腹自心不倦者冷水浸陰又佳若復

不解脹文子湯昂解

小品方云解散除弊小便數少單行葵子湯方亦治淋同不通三歲葵子亦可用

陳葵根切一升以水三升煮取二升燶如人肌稍服之

外臺方文子湯

文子人二合甘草二兩黃芩二兩芒消二兩陽成以水內之以水五升煮取二升分溫二服取利昂差

治脹石小便多方第世五

病源論云持適失度弊在下焦虛冷氣乘於

肥故肥令不能制於小便則小便多也

新錄單方云鷄腸草煮爲羹取之搗汁服五六合

日二

又方棘直刺來針各三升搗蒜九酒若飲服世

治服石大小便難方茅世六

病源論云積服散盛在內，壅氣乘於大小腸，不瀉故大小便難也

花他方解散壅脹滿大小便不通方

九日二

枳實四兩 由豉四兩

凡二物以水二升煮之令藥薄爾乃煮得半升去滓稍

之飲多少溫自瘥

張仲景方治寒食散大小行難方

杏或二升 大麻子一升破

右二物以水四升煮取一升八合去滓停令一服六合量

新錄單方云大小便難服葵子

錄驗方云若大小便秘塞不通或淋澀溺血陰中疼痛此是熱氣所致熨之則愈

慰法先以冷物熨少腹冷熨已後復以熱物慰之

用有熱物熨已後冷慰之

治腹石大使難方第廿七

病源論云將適失宜犯溫過度散熱不宣熱氣積在腸胃故大使秘難也

皇甫謐云或大行大行者大使也腹中堅固如龜盤坐犯溫久積厚鞶糞不去故也消稹若膏使寒服一二升浸潤則下不下更服下藥昂菴蓬公曰若不下服大黃朴消等下之秦善祖云朴消大黃煎治胃管中有瘻糞大使難身

體發創解糞方

大黃金色者二兩 朴消細白者二兩

凡二物以水一斗煮減三升去滓著銅器中於湯上燉火上煎令可丸病人強者可預吞羸人中服可後宣得羊內若鴨麋肉羹補之

錄驗方解散不得大行方

大黃四兩 桃人七枚世枚

凡二物以水六升煮取二升二服一方大黃二兩桃人五

十枚

治脹石大便血方第廿八

新錄單方云散發木便血者方

丸九

葱白切一升豉一升 水四升 煮二升二服

又方車前草切三升水五升煮取二升三服

治脹石下利方第廿九

皇甫謐云或下痢如寒中坐行飲食犯熱所致人多
穀是卒疾又有滯癖者皆犯熱所為慎勿穀也
速脫衣冷食冷飲冷洗或大便稠數坐久失節度將
死之候也如此難治矣為可與湯下之僅十得一生耳

不与湯必死莫畏不与也下已致死令人不恨

小品方解散除熱心利黃連湯方

甘草一兩 黃連二兩 牛麻一兩 丈子十四枚

煎五合 几五物以水五升煮取一升半分再服

去滓取一升

分五物

秦善祖云黃連丸解寒食散癥大注下腸謂方

黃連芩成屑三升 鳴梅百廿枚

去核七升

分五物

凡二物治合下芩以蜜和之更搗三千杵丸如梧子服
廿九日可十服病甚者一日可至三四百丸

新錄方玄散 羔下利者服牛羊酪一升曰二

又方水和大麦及米，趁服一升。

又方致三升水四五升漬經宿或煮三四沸，冷服一升。

秦漢日二三鼎斯

ナミス

治服石弊渴方第世

病源論云夫服石之人石弊歸於腎而弊充府藏之

既弊沫液竭燥故渴引飲也

小品方治散弊盛渴方

生地黃一斤 小麥二升 竹葉切一升 茄杞根一斤

九四物切以水一斗煮取九升渴者飲之

又云呂方舒解弊心渴飲地黃汁方

生地黃一斤 小麥三斤 茄杞根三斤

凡三物以水三斗煮取二斗汁渴者飲之

又古單行芍杞白皮湯解散除弊止渴方

芍杞根白皮十斤以水三斗煮取一斗分服一升

治服石冷弊不適方第世一

僧深方解散人參湯治散發作冷弊不適方

人參二兩

白朮二兩

枳實二兩

桔梗二兩

千薑オホハシカツ二兩

甘草二兩

九六物以水八升煮取二升半分三服

治服石補益方第世二

秦古本无醫下同差祖云當歸九治散發

錄驗方解散除胃中熱益氣竹葉湯方

竹葉二兩 甘草十兩 白朮一兩 大黃二兩

凡四物以水七升煮取二升半分五合一服

又玄生地黃並補虛除熱持和取利也

僧除方解散散內補治百病巨勝湯方

胡麻アマ一升セイ 蜜 生地黃セイ一升セイ切 大棗オウジ廿枚 夕藥ヨクザク一兩

生薑ハシラ四兩 甘草一兩 麦門冬エイモンドウ四兩 桂心一兩 人參ヒンサン一兩

細辛トキソウ一兩 九十物以水九升煮取四升分四服

新錄方散發動後虛內補方

苟杞煎單含咽ヒトベフクアシタメ如桃李許日二三粥飲中夕好矣
難散涓服忌鯉魚虛熱人並得餌之

治服石經年更發方第世三

小品方玄蔴荳湯華他解藥毒或十歲或世歲而發
契或燬之如寒欲得食飲或不用飲食華他散法

樂石瓦年
耳大熱生
者濕就著
熱已

有石流黃熱欎；如熱流洗失度錯服熱藥劇。
者 檸裂譽石熱燥；如戰紫石英熱罔罔。喜卧
赴元氣力或時欲寒，皆是府氣所生藏氣不和宜服
此湯。

薺莞四兩 甘草一兩 人參一兩 藍子一兩 伏苓一兩
夕藥一兩 黃芩一兩 無青子三升

九八物切以水一斗先煮蕷菁子得八升絞去滓，煮藥
得三升半分脹七合日三若弊寒信人參減黃芩用。
半兩也若氣嗽倍伏芩減薺莞去一兩。

又玄應楊州所得吳解散單行慈白湯，方藥沉體
中數年更發治之方。

生葱白一斤凡一物以水八升煮取四升分脹一升使一日
盡之明日便當溫食飲於被中，後發便為知也不
過三劄都愈也。

又玄應散熱氣結滯經年不解數發者方

胡荽半斤

凡一物以水七升煮取二升半分作三服，盡一劄便愈。

醫心方卷第廿

醫心方卷第廿札記

一頁下	欲作仁和寺卒	二頁上	龐氏論 <small>此一段已見 篇中文</small>
四行	黑作字	八行	龐氏論 <small>十九卷第十四</small>
篇中文		下三	懷之也 <small>十九卷引此</small>
少異		行	皆破
發之候		五	行
七字		黑脉也	十九卷引此下有唯氣
仁和寺卒先		息藏通心下溫耳九字	行
作洗病源同		外臺方云 <small>所引外臺今見第</small>	先食
八		世七卷引薛侍郎	上一
行外臺方云		千金同仁和	三頁
行取凳	<small>外臺寬</small>	寺卒藍作董	行
作次		下七	二升半
八		四頁上	又云解散以
仁和寺卒		二行	下
無半字			
行塞急	<small>仁和寺卒</small>		
無急字			
九行仁和寺卒	<small>無與舊</small>		
校引字治卒合下同			
三			
行圮蓬	<small>外臺世八卷引薛侍</small>		
即乳石論作吐蓬案			
否痞			
圮並符鄙切			
行	二	石勢	<small>仁和寺卒</small>
勢作契誤		八	
行	三	兩	<small>仁</small>
和			

醫心方卷十才言

寺卒作 五行下 祝米趁 祝杭之異據趁訛仁
二兩 四行 和寺卒 六夏下 二升半 仁和寺卒 行八

立驗 無五字 七行 今案 以下注文仁 七夏下 即得仁
仁和寺卒 注 一行 二升半 仁和寺卒 行宣犯

犯作化 仁和寺卒 七行 今案 以下注文仁 七夏下 即得仁
即字 行 二作三 行宣犯

奇卒無 九行 曹歎 以下四十字 五曹歎 云以下十七字
仁和寺卒 行 曹歎 仁和寺卒無 行曹歎 云字仁和寺
卒無 行洗之 仁和寺卒 又云 仁和寺卒無 二行下
九行 曹歎 仁和寺卒 仁和寺卒無 二行下

皇甫謐 云以下一段已見第十九卷第三葉此
卷注二与十九卷互複今不一 行九云

發 仁和寺卒云 三十頁上 曹歎 云以下十字仁
下有石字 行 曹歎 仁和寺卒無 行四弊

勢 仁和寺卒 九行 冷水 仁和寺卒 八粥漿 仁和寺
無界字 行 無冷字 行 無冷字 行

字 九行 葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺
行葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺

字 九行 葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺
行葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺

字 九行 葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺
行葛氏方 仁和寺卒無 上二行 瘦散 仁和寺

卒 下二 曹歎 云以下十五字 仁和寺卒無 行小品方云 已見車
無 行 曹歎 仁和寺卒無 行小品方云 已見車

卷第一中 九地蓮 仁和寺卒同而傍 行攻乘和仁
此蓋重出 校改作圮說見前 行攻乘和仁

寺卒攻下 八令酒 仁和寺卒 上六行糴樓卒 糴作寺
有腹字 行令酒 仁和寺卒 上六行糴樓卒 糴作寺

括 八又云 以下四十五字 行六患口 患恐 十五
行又云 仁和寺卒無 行六患口 患恐 十五

三其狀 仁和寺卒以 八又入仁和寺卒 行八露峰
下九字無 行又入仁和寺卒 行八露峰

房 露作露 十六頁上 摧取 仁和寺卒 行十八頁上
仁和寺卒 行摩折 折作坼 行十八頁上瘻散瘻

今檢 檢作案 十四行注 摧取 仁和寺卒 行十八頁上
仁和寺卒 行摩折 折作坼 行十八頁上瘻散瘻

卒正作療 下四行轉後 徒益皆徒之訛 七行上脚
仁和寺卒 行三木人 杏与千全方合 舊校引或卒木作生章陵仁

膝 仁和寺卒 行三木人 杏与千全方合 舊校引或卒木作生章陵仁
作膝脚 行三木人 杏与千全方合 舊校引或卒木作生章陵仁

寺卒章作商千金同

行散起十九卷弟四

作越与舊校引或車合

行猪脂仁和寺卒

行脂脂作脂

行散起已載此文起

行人將或曰忍即持

行人將之義為輔

行注

行一員下

各二兩仁和寺卒

行結發仁和寺卒

行結發下有兼字

行一員下

急絃作結

行服畫仁和寺卒

行服畫畫盡之俗猶暑作署

行一員下

貞下更行散盛

行散盛下更有散字

行散盛行散盛

行一員下

單方仁和寺卒

行淋懶仁和寺卒

行淋懶懶作懶

行一員下

若石

行可後仁和寺卒

行可後後作緩

行一員下

字行

行米趁仁和寺卒

行米趁趁作趁

行一員下

夏下行秦差祖云

行當歸九丸

行當歸當歸作乾

行一員下

仁和寺卒世二夏如製如戰同行英勢仁和寺

作一兩

下一行如製如戰同

行英勢

仁和寺

卷之二十一

