

醫心方卷第三

490.9  
15-3  
3

No. 2249  
12 i 109-1



富士川文庫

1402

醫心方卷第三



從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頬撰

風病證候第一

治一切風病方第二

治偏風方第三

治半風方第四

治風瘡方第五

治柔風方第六

治頭風方第七

治中風口禁方第八

治中風口喎方第九

治中風舌強方第十

治中風失音方第十一

治中風聾嘶方第十二

治卒聾嘔方第十三

治中風驚悸方第十四

治中風身不仁方第十五

治中風四支不屈申方第十六

治中風身如虫行方第十七

治中風隱軒方第十八

治中風隱軒生瘡方第十九

治中風癩病方第廿

治中風言語錯亂方第廿一

治中風瘡病方第廿二

治中風狂病方第廿三

治虛熱方第廿四

治客熱方第廿五

風病證候第一

黃帝大素經云風者百病之長也至其變化為他病也無常方

楊上善云百病曰風而生變為万病又云人之生

病也感風氣以生其病也曰風氣為病又云九宮

經日冬至之日太一至坎宮天心應之以風雨其風從太一所居坤來而中宮名為實風長養万物若風從南方來向中宮為衝後來虛風賊傷人者也

素問經云千病万病無病非風

醫門方云凡人性稟五行目風氣而生長風氣雜

能長物還能為害傷人如水浮舟亦能覆舟

涼論云中風者風氣中於人也風是四時之氣

分布八方主長養万物從其鄉來者而人少死病

不從其鄉來者人多死病其為病也藏於皮膚之間內不得通外不得泄其人經脉行於五臟者各隨

藏府而生病焉

心中風但得偶卧不得傾側汗出若脣赤汗流者可治急灸心俞百壯若脣或青或白或黃或黑此是心壞爲水車目亭<sup>ト</sup>時悚動皆不可復治五六日而死肝中風但踞坐不得位頭若繞兩目連額上色有青脣色青面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑色一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死脾中風踞<sup>スル</sup>而腹滿身通黃吐<sup>ハシナ</sup>汗出者可治急灸脾俞百壯若手足青者不可復治也

腎中風踞而腰痛視腸左右未有黃色如餅糲大者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤贊髮直面上土色者不可復治也

肺中風僵卧而齰滿短氣喘悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色黃為肺已傷化為血不可復治其人當妄掇空或自枯衣如此數日而死

小品方云說日風者四時五行之氣也少布八方順十二月終三百六十日各以時從其鄉來為正風在天

地為五行在人為五藏之氣也。万物生成之所順，非  
毒厲之氣也。人當單之過不勝其氣乃病之耳。  
雖病然有自差者<sup>ノリ</sup>，加治則易食愈其風非時至  
者，則為毒風也。不治則不能自差焉。今則列其證  
如左。

春甲子木東方清風傷之者為肝風入頭頸。肝頸  
愈中為病多汗惡風，喜怒而脹痛。惡血在內飲食  
不下，支葛時腫，顏色蒼泄<sup>ハシナカタカタ</sup>，益乾仇劙<sup>ハラハラ</sup>。  
夏丙午火南方湯風傷之者為心風入胃腸。府藏  
泄私列餘也。

說解

制二爻通歌也  
心俞中為病多汗惡風，憔悴悲顏色赤洞泄。  
蒼泄<sup>ハシナカタカタ</sup>  
莫弗及大水之貞

清穀仲夏代己土同南方陽風傷之者為脾風。  
入背脊脾俞中為病多汗惡風，肌肉痛，身體怠  
惰，四支不欲動不嗜食，顏色黃憊，因人虛實之  
變，陽氣有餘，陰氣不足者，則內外生熱在中者，  
令人喜飢若陽氣不足，陰氣有餘者，則內如有寒  
從中出，腸鳴而痛。秋庚辛金西方涼風傷之者  
為肺風入肩背肺俞中為病多汗惡風，寒熱發  
欬，動肩背顏色白，需然病癰，晝差夕甚。

作癰  
莫愛病  
困也

臃然有澤腫時眩顏色黑令人厥

普江皮膚起皺

久

分

合

十

六

七

八

九

十

十一

十二

冬王癸水北方寒風傷之者為腎風入腰股四支  
腎俞中為病多汗惡風腰脊骨肩背頸項痛不  
能久立便出曲難不利墮婢按之不得小便腹脹面  
癰然有澤腫時眩顏色黑令人厥

右四時正氣之風乎人當單之過得病證候如此

アヤ

フ

リ

ナ

ト

シ

ハ

シ

ハ

シ

ハ

又云四時風惣名春九十日清風夏九十日湯風秋九  
十日涼風冬九十日寒風其氣分布八方示各異名  
也太一之神隨草居其鄉各冊五日風雲皆應之  
今列其風名如左

東北方艮之氣立春王為條風一名飴風王冊五日  
東方震之氣春分王為明庶風一名嬰兒風王冊五日  
東南方巽之氣立夏王為清明風一名鴻風王冊五日  
日南方離之氣夏至王為景風一名大鴻風王廿七日  
加智及  
合仲夏也仲夏中央之氣主三八方之氣代己王十  
八日合夏至合冊五日風名同

西南方坤之氣立秋王為涼風一名謀風王冊五日  
西方兌之氣立秋王為閼闔風一名野風王冊五日  
西北方乾之氣立冬王為不周之風一名折風王冊五日  
北方坎之氣冬至王為廣莫風一名大剛風王冊五日

右八方之風各從其鄉來主長養万物人民少死病也  
又玄八方風不侵其鄉來而從衝後來者為虛耶賊害  
萬物則人民多死病也故聖人說避耶如避矢也耶者  
風也今人壽多病是不知避耶也為病證候如左  
西風之氣內舍大腸中外在脇腰骨下四支草解中  
書本遺其病證今無也

嬰兒風為病令人崩細濕其氣內舍肝中外在肺中  
弱風為病令人體重其氣內舍胃中外在肉中  
大弱風為病令人萎弱其氣內舍心中外在脾中

謀風為病令人弱四肢緩弱也其氣內舍脾中外在  
肌中

剛風為病令人瘡トコ者枯燥瘦瘠也其氣內舍肺中  
外在皮中

折風為病則因人脉絕時而泄利脉閉時則結不通  
害累死也其氣內舍小腸中外在右手太陽中  
大罰風為病令人寒トコ者患冷不能自溫也其氣內  
舍腎中外在骨中脊ツキ背筋中也

又作呂字林  
又云脊骨也  
又作擣亦  
姓太歲為

又云新食竟取風為冒風其狀惡風頸多汙鬲下寒  
不通飲食不下脹滿形瘦腹大失衣則填滿食寒則  
洞泄

目醉取風為漏風其狀惡風多汙少氣口乾渴近衣則  
身熱如火燒臨食則汙流如雨骨節解惰不欲自營  
新沐浴竟取風為首風其狀惡風面多頭痛  
新房室竟取風為泄風其狀惡風汙流沾衣  
勞風之為病害在肺使人強上惡風寒戰目脫溼  
滯出候之三日中及五日中不精明者是也七八日

則發有清黃膿涕如彈九大從口鼻中出為善也  
若不出則傷肺

今案大素經  
注上好作他

又云風者其氣善行而數變在人肌膚中內不得  
泄外不得散目人動靜乃變其性其證如左  
有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消寒熱  
有風遇陽盛則不得汙遇陰盛則汙自出  
肥人有風肌肉厚則難泄善為熱中目黃  
瘦人有風肌肉薄則恒外行身中寒目淚出  
有風遇實則湊理閉則內伏令人熱悶若曰熱食

汗砍通湊理得開其風自出則覺肉中如針刺步行  
運力欲汗之如此

有風遇虛湊理開則外出湊如寒狀覓身中有  
如水淋時如竹管吹處

驗方云風者天地山川之氣也所蓋近遠有焉  
其一是天地八方四時五行之氣為遠風也其風颺  
颺于歸于委三爻  
颺颺颺者此則山川間氣為近風耳譬由鼓肩動  
於手握之間便能致風之能動物之能病人而非天  
地之氣也

逕古史文也  
鼓振之風也此人間逕巷門戶窓牖之逕氣天

又云經言諸取風者非是時行永草之風之非山川  
無風之日其恒有逕風人長居其間積日月此能虛  
人肌理入人百脉攻人五藏六府則致病焉復有野  
間廣澤都亭成逕風之不可居卧也復有賤坐恒  
使人扇之不能生病但小軒於逕穴中耳古今有  
身驗其事者甚衆今略記其三條於後章

古雒陽市有一土貼家家要貨賣信集但貨主  
周年中必得病致死遂成空廢無復生者有一七兒常

貼  
王篇天叶  
及物質

出市尤每歲輒見貨主非復舊人尤鬼問知多死疾  
源一品便看貼中唯見貨主坐處背約一柱有一虫  
食穴故寂有風貫過如箴頭大云射坐人項是  
風府處尤兒計疾源一品人坐所當皆是其項所  
對死當由此便詣市官求貼坐之町塞此孔遂无復  
病安全永保其富此其驗也

全難透口十二經皆有動脉獨取寸口以次五藏六府死生之法又守口者脉之大會

今有一人家作北向聽事閣在南架下主人四月忽  
病逐涼開闔正首闔卧乃詠脉作五六過來去  
章忍及候脉也又視也驗之  
後其作一過未至闔上注不進寸口而去或作五六過

爭大陰之脉動也又言促用至尺內陰之所治也

來後而作一過停住寸口不昂去脉既如此意欲詠  
者其變通其家內人應從闔內經過便暫閉闔闔  
之後脈便不復住闔上及停寸口中於是仍令其  
且閉闔久詠脈者則不覺復停住闔上寸口中仍復  
開闔少時風來甚速脈還復停住闔上寸口中仍復  
還閉闔卽復調病人嘔煩永不肯還膺中避風而  
脈冷湯以除溫遂病瘡絕而死矣是以明知速氣之  
風不可久當也

有一家作三間屋開中央一間南北對作都戶安一

針灸經手有內外用華佗脈訣守位各八分用上佳

床當中失夫婦便坐其中監者事經一年許夫婦皆中風口噤死也

治一切風病方第2

耆婆方治一切風病日月散方

秦膝八分獨活八分二味切搗篩為散以酒服一方守日二還遂四時之四季作服之春散夏湯秋麥冬

酒四季煎膏

又云治男女老小一切風病之風之狀頭重痛眼闇四肢沉重不舉不隨頭悶心悶煩躁手足疼痛腫

氣不能多食嗔怒憂思健忘多夢悟惛口口欲睡卧懶起面目失色房事轉弱漸自瘦不能勞動此万病耳此万病並主之方

人參白鮮防風防己芎藭秦膝獨活老小各兩  
右七味切以水一斗二升煮取二升一升為六服  
一方以水六升煮取一升半升為三服之相去  
十里分六服者相去卅里令勤勦無相惡宜久  
服之近年益智聰慧湯服訖散服方寸上  
酒服酒三斗瀆之一宿少少飲之前服少少服

之丸服蜜和為丸。如大豆一服十四丸並用。  
酒服之。其分兩一依前法。恒逐四時常令服使  
人不生万病。

范汪方治風有十品。一日入頭。二日入耳。三日入目。視  
瞧。四日入肺。五日入脾。六日入心。七日入肝。八日入腎。九日入骨。  
縮痛。不能久立。十日入皮。隱軒。生瘡。三日入筋。急  
疼。癱。不能久立。六日入心。憔悴。怒自悲。自喜。七  
日入肺。令人欬。短氣。晝夜劇。八日入肝。頭眩。目  
視不明。九日入脾。令人嘔。舌上割。兩脇下心滿。  
許忌及虛里及悅七又作喜

堅門不利。十日入腎。令人耳中雷鳴。甚則聾。  
出治之防風九方。

芎藭四分。蜀椒三分。一方貝母三分。防風二分。  
一方當歸二分。一方白芷二分。一方皂莢一分。一方  
木三分。一方瓦八物治下節丸。以蜜如彈丸。

頃服一丸。先食禁食。生食。生菜服。

藥十三日風當出去。當有熱。蒙隨以水洗之。

良今案錄驗方。玄如梧子以好酒服。  
三九日二不知。稍增可至十九。

小品方小續。命湯治卒中風。欲死身體緩急口目。

不正舌強筋少不能語奄々忽々精神悶亂諸風服之皆驗不令人虛方

甘草一兩 麻薑一兩 防風一兩半 防已一兩 大柴胡卷而黃芩一兩 桂心一兩 附子一枚大者炮 蒼菊一兩 勻藥一兩

生薑五兩

右十一物以水九升煮取三升分三服甚良不差更合三四劑必佳 取汙隨人風輕重虛實也有人脚脚氣 痛脚氣及不能言也 脊脚氣及熱病也 此方至六七劑得老有 風風氣 痘家天陰陰氣 草變ヨリカニメ 輒合之可以防防 瘡瘡 癢瘡 也

於識及病也

搖要方古療風病多途有失音不得語精神如醉人手足俱不得運用者有能言語手足不廢精神昏恍不能對人者有不能言語手足精神昏亂有言語手足精神俱不異乎常而妄作有時每發昂狂言語高聲大叫得 宅之後都不自醒者有諸事不異尋常發作有時每發則狂走叫喚者有諸事不異尋常發作有時每發昂作牛羊禽獸聲醒後都不自覓者有諸事不異尋常發作有時每發昂頭旋目眩頭痛眼花心悶輒吐經久之方

者有諸事不異尋常發作有時每發輒發熱頭痛流汗不自勝舉者此等諸風形候雖別尋其源也俱失於養本氣既羸偏有所損或以男女或以飲食或以思慮或以勞役既挫於事能不敗乎常量已所歸而捨割之靜思息事兼助以藥物之有可復之理風有緣飲酒過量不能言語手足不遂精神昏恍得病經一兩日且依後生葛根等湯服之

人主  
生葛根一挺長一尺徑三寸生薑二大合竹瀝二大升  
竹瀝如不可得宜物勦竹根大一斤切以水一大斗緩火煎

取二大升以代竹瀝如竹瀝根不可得以薦竹葉細切一大升以水二大升如上法煎取二大升以代瀝如無竹葉宜細切來條一丈斗以水一大斗煎取二大升代之

右先取生葛根淨洗刷便搗碎且空盃取汁盡々訖又搗取竹瀝瀝擗捺近取汁盡為膏和生薑汁綿瀝之細々浸服之不限迴數及食前食後如覺腹內轉作聲又似痛即以食後溫服之如經七日以後服附子等湯之

雜治方治一切風病獨活酒方

獨活五兩黑大豆三升熟令無音 凡二物以酒一斗漬之五

日始服日三多少任意但大豆者漬之二日出去

驗方云帝釋六時服呵梨勒丸方

右呵梨勒者具五種味辛酸苦鹹甘服无忌治一切病大消食益壽補益令人有威德近年是名家上仙藥療廿八種風癆塊大便不通體枯乾燥面及遍身黃者痔赤白下部疼痛久壯熱一切心痛頭旋悶耳痛重聽有身體癰疽積年不瘳痢不思食淡冷有胃中

啾味脣色白干燥滯小便稠數腸脹痞氣初

患水病者療

膏門  
破無顏色

黃腸內蟲脚氣

上吐无力支革疼痛血脉不通心上似有物

勇健忘心迷如是等皆恙矣除也

呵梨勒皮八分檳榔八分人參三分橘皮六分

伏苓四分

甘草四分

獨脊三分

豆蔻四分

大黃八分

干薑十二分

桃仁八分

牽牛子

十三兩 桂心八分

凡十三味㕮咀下筛以蜜丸如梧子狀廿九食

前以溫酒若薄粥汁服平旦得下利良

治偏風方第三

病源論云偏風者風耶偏客於身一邊也人體有偏虛者風耶乘虛而傷之故為偏風也其狀或不知痛癢或緩或急或癆痛是也

千手經日一遍偏風耳鼻不通牛脚不隨者取胡

麻油煎青木香咒三七遍摩拭身上承毫

龍門方治卒偏風方

草火灸全遍身汙流立差

又方大麻子搗以酒和緩取汁溫服熯益之佳

又方黑胡麻搗末酒漬服七日後差驗

極要方療偏風服之三日内能起方

羌活  
一名也

羌活三兩桂心二兩于薑二兩附子二顆炮

右以水一升半煮取半大升分二服

治半風方第4

病源論云風半身不隨身者脾胃氣弱血氣偏虛為風耶所乘故也

千金方治大風半身不隨方

差鼈壤土袋盛熨之裹

又方蟹沙煎姜作練袋三枚各受七升熱盛袋著患處如冷即取餘袋一依前法數々換之

又方灸風池肩禺曲池陽陵泉巨虛下廉穴

治風症方第五

病源論云風症者口噤不開背強而直如攣癇之狀其重者耳中篋之痛卒然身體症直者死也由耶傷於大陽經復遇寒濕則發症也

効驗方治風症身強方

小口  
羔大豆慰之

千金方 同之

又方差鼈壤土熨之取汗

新鍊方治風症身強方

薄荷三枝以水六升煮取二升分二服

葛氏方若身直不得屈伸及覆者方

取槐皮黃白者切以酒若水六升煮得二升去滓

稍服

蘓散本草注治風症方

銅屑燒令極熱投酒中服五合日三

又方鐵屑炒使極熱投酒中飲酒良

本草欝鬱治風症方

蕉葉沙熨之

治柔風方第六

病源論云柔風者血氣俱虛風耶並入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急四支不能自收重衣急不得

作息也

小品方治中柔風身體疼痛四支緩弱欲作不隨方

本草云  
牡桂注曰

燒酒三兩桂肉三兩生薑六兩干地黃三兩

大枝皮者  
肉少味薄  
小枝皮肉  
多半卷  
一名桂心

葛根三兩芍藥三兩麻黃二兩去節甘草二兩

凡八物以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日

三升今棄千全方云酒

葛氏方治中緩風四支不收者方

豉三升水九升煮取三升分三服日二作晉可酒漬

萸飲

治頭風方第七

病源論云風頭眩者由血氣虛風耶入於腦而引目系故也

養生方云飴食作卧久成氣病頭風

又云飴食沐浴作頭風

耆婆方治人一切風氣風眩病三光散方

秦膠十二分 伏神十二分 獨活八分

三味切搗篩為散以酒服方寸二日三依日月法

又云治人風氣風眩頭面病四時散方

秦膠獨活伏神暑預

四味切搗篩為散以酒服一方寸二日二依日月法

春各四分 夏各三分 秋各八分 冬各十二分

又云治人風氣風眩頭面風病五藏散方

秦膠桔梗獨活伏神暑預山茱萸莫分兩依四時散五味

五味切搗篩為散酒服一方寸二日二依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風頭中風病六時散方

秦膠桔梗獨活伏神署預山茱萸莫東本依四時散

六味切搗篩為散以酒服一方寸二日二依日月

散法

又云治人風氣風眩頭中風病中風脚弱風濕痺病七星散方

秦膝獨活伏神暑預天雄山茱萸藁本

七味切搗薜爲散以酒服方寸二日二依四時散法

又云治人風氣風眩頭面風中風濕痺脚少精

八風散方

秦膝獨活伏神署預山茱萸藁本天雄鍾

乳研七日充

八味切搗薜爲散以酒服方寸二日二依四時散法

依日月散法

又云治人風氣風眩頭面風中風脚弱風濕痺脚房

少精傷寒上痛中惡冷病十善散方一名十方散

秦膝獨活伏神署預山茱萸藁本天雄

鍾乳研七日夕藥干薑

十味切搗薜爲散以酒服一方寸二日二依四時散

丸兩

千金方治風頭眩口鳴目痛耳聾大三五七散方

天雄三兩細辛三兩山茱萸五兩干薑五兩署

頑七兩防風七兩六味下薜爲散漬酒服五分

仁日再不知稍加

又云小三五七散 丸九 主頭風目眩方

天雄三兩 山茱萸五兩 暑預兩七

三味下筛漬酒服五分二日一無不知 稍增以知覺

又云治頭風方

常以九月九日取菊花作枕袋枕頭

又方云芥子末丸九 咳和付頭一周時覆之

又方草薙子煮沐不過三四度愈

又方菊花獨活

茵草防風

細辛

蜀椒

皂莢

桂心 杜衡 可作沐及慰之

集驗方同之

驗方桃花散治風頭眩倒立 及身體風痺在皮

石楠五兩 暑預四兩 薤蕡三兩 山茱萸三兩

桃花半升 菊花半升 真朱半兩 天雄一兩

炮

凡八物合治下筛食竟酒服半錢 上日三稍增之  
集驗方治風頭眩倒立 眼旋屋轉頭脣痛 防風枳實湯方

防風三兩 枳實三兩 炙 伏神四兩 麻黃四兩

去草

細辛二兩 蒴朮三兩 前胡四兩 生薑四兩 半夏

四雨 洗 杏人 三两 竹沥 三升 土物切以水六升一

升 合竹沥 贲取二升七合分三服頻服雨三剂尤

良

冒作喘  
莫報及  
也任目細視

葛氏方治患風頭每天陰輒發眩冒者方

取鹽一升以水半升和陸頭蟹肉墨衣宿當薰  
汁出愈附子屑一合內塗中尤良

又方以桂屑和苦酒塗項上

范汪方治鼻孔偏塞中有濃血此乃是頭風而作  
兼由肺疾宜服此散方

天雄八分 炮 千薑五分署預四分通草六分山茱  
萸六分 天門冬八分 凡六物治下篩為散酒服  
方寸亡日再稍加至二亡

搖要方療風頭痛眼眩心悶壅而赤甚方

防風二兩 當歸一兩 山茱萸二兩 柴胡二兩 暑預雨

鷄子二兩 去白打黃碎

右為散用鷄子黃和散令調酒服方寸匕日三

僧深方治頭風方

吳茱萸三升以水五升煮取三升以錦染汁拭

鍼根數用

灸頭風方

天竅會  
之名也

千金方云灸天窓穴在上星後寸  
灸後頑穴在百會後一寸

百病針灸云灸百會穴在頑上旋毛中  
又云灸前頑穴在臍會後一寸五分

又灸五靈穴在當兩眼入髮際一寸

治中風口噤方第八

病源論云諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并結入

於頸頸夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤  
不開也

葛氏方治口噤不開者方

取大豆五升熬令黃黑以五升酒漬取汁奏強  
薺口以灌之

秦氏去搘及朱毫

又方獨活四兩桂二兩以酒水各二升合煮一升半  
取

分二服溫服

千金方治中風口噤方

水四兩酒三升煮取一升頓服之

又方服淡竹瀝一升

機要方療中風口噤不知人方

致五升 茄萸一升以水七升煮三沸飲之

千金方同之

廣利方理中風口噤不開方

獨活一大兩切以清酒二大升煮取一升半昂大

豆五大合熬取前酒熱投豆中密蓋經一食

久元過服二大合口噤耳拗口灌之日三四度

効驗方治人卒中風欲死口不開身不得著席大豆

散方

大豆二兩  
熬令焦薑二兩  
蜀牷二兩  
去目汗

凡三物搗下筛酒服一錢上日一愈

新疎方治口噤方

灸秉瘻穴在頤前下脣之下又方灸頭尖七

炷

治中風口喝方第九

病源論云風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則  
崩急引頰故使口喝方解言語不正而目不能卒視  
養生方云夜卧當耳勿令有孔風入耳口喜喝

胃心方卷三

三

大素經云類筋有寒則急引類移口有熱則筋弛緩不勝故婢

上九三十  
下九三十  
方

治之以馬膏其急者以自酒和桂以塗其緩者以桑鈎之弔以生桑炭置之坎中高下与坐等以膏熨急類旦飲美酒散美灸不飲酒者自強也為之三拊而已音撫摩拊也

錄驗方治口眼相引鳴僻者方

以生蠶血塗之以桑鈎吻遍樹著耳也血千復塗之用自酒勝血

辨

撮要方療風口面鳴兼舉風半身不隨語不轉方

以酒煮桂心取汁濕故布搘病上則以左鳴搘

右之鳴搘左秘不傳常用大効

僧深方治風著人面引口偏著牙車急舌不得轉方竹瀝一升獨活三兩生地黃汁一升凡三物合煮取一升頸脹之

又方翳風穴灸三壯主耳聾口眼為婢不正

手車引口噤不開瘡不能言甚神良穴在耳

後陷者中按之引耳

瞤如輪及  
目動  
又作瞤

小品方云眼瞤動口脣動偏鳴皆風入脈故也

急服小續命湯摩神明膏

又方灸吻邊橫文赤白際逐左右風乘不復

蒙灸隨年壯日之難之三難旦息三日不効

復三報之

千金方治中風口鳴方

炒大豆三升令樵酒三升淋取汁頓服之日一方

又方皂莢大者一枚去皮子灸一方一互下薦

年苦酒和塗之左鳴塗右之鳴塗左

集驗方治中風口鳴僻不正方

取空青如來者著口中含咽之即愈千金方云如

葛氏方治口鳴僻者方

銜奏灸口吻中橫文間寬大熱便去艾即愈

忽勿盡艾之則大過左鳴灸右之鳴灸左又

方蠶血和鳴頭塗之欲止拭去

范汪方治中風口僻噤方

豉五升茱萸一升合煮三沸去滓飲汁神驗又方

兩半又於頭上隨僻左右灸肘頸三四壯

秦居嫁切牛鼻環也

秦次去權及  
屈木孟也

奏

漱青奏

經心方治口渴方

青松葉一斤搗令出汁清酒一升漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頸面汗出千金方同之又方取衣裏摩丸處邊鼻心丸治中風舌強丸方第十九丸病源論云脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脈係舌本令心脾二臟受風耶故舌強不得語也范汪方治風舌強不語方中含回之見意鼓煮汁漸服一日可數十過不煩多

又方新好桂前去皮鴆下節以三指撮著舌下門咀之又方灸廉泉穴在頰下結喉上舌本今葉傳云中矩穴主中風舌強不顎ノカヒテ語在頭下脣裏曲白膚中集驗方治卒不得語方

煮大豆取汁稍含咽之

又方取桂一尺水三升煮取一升頓服之正物含下節酒服一錢土日十汗出耳

葛氏方治中風不語方

茲茱萸各一升水五升煮取二升稍服之

又方灸廿四葉二葉三推廿四上百五十壯

鍊驗方治舌強不能語言舌下藥樊石散方

樊石二兩桂心二兩

凡二物下筛置舌下便能言

治中風失音方第十一

病源論云唯龍者氣之所以上下也

九唯厭者聲之機口者聲之麻也

會本書喉字

門戶也舌者聲之機口者聲之麻也風寒客於

會

唯厭之間故卒然無音故謂風失音不語

范汪方治失音大豆紫湯方

大豆一升熬令焦好酒二升合煮令沸隨人多  
少服取令醉

効驗方治卒風失音大豆散方

大豆熬令焦蜀牴去目汗干薑各三兩

凡三物合下筛酒服一錢上目一汗出即愈

千金方治卒失音方

濃煮桂汁服一升腹取汗之可末桂著舌

下漸耳汁

又方濃煮大豆汁含之效良

又方參天窓百會穴 新陳方同之

孟說食蛭治失音方

杏人三分去皮熬搗

別作桂心末一分和如泥取李

扶許綿裹少回

之日五夜一文方搗梨汁一合頓

服之

治中風聲嘶丸心方第十二

病源論云聲嘶者風冷傷於肺之所為也

葛氏方治卒中冷聲嘶暨方

作盛又  
作豎音  
不言及下及

甘草一兩桂心二兩五味二兩杏人卅枚生薑八

兩切以水七升煮取二升三服

耆婆方治人聲嘶喉中不利方

桂心杏人子薑芎窮甘草各一升

石五味搗篩以蜜和為丸如梧子口中噙咽

汁

治聲噎合せ不劣方第十三

葛氏方治卒失聲合せ噎合せ不劣方

今案病源論雜有五噎而无聲噎風噎惟

橘皮五具水三升煮取一升頸服

又方針大椎旁一寸五分

又方濃煮苦竹葉服之

又方鳩糞荷根酒和絞飲其汁

樊石桂末綿裹如來內舌下有嚙吐出之

耆婆方治人風噎方

零羊角五兩炙通草二兩半防風二兩升麻  
雨甘草四兩矣

五味搗後爲散以自歛服一方寸匕日二

治中風驚悸方第十四

病源論云風驚悸者體虛心氣不足心之經爲風耶

所乘也或恐懼憂患迫令心氣虛亦受耶搏於心則驚不自安驚不已則悸動不安其狀目精不轉而不能呼

擇要方四神鎮心丸療男子讀誦健忘心神不定

風虛弱補骨髓方

伏神十二分天門冬十二分干地黃十二分人參八分

遠志皮八分上蜜丸飲服十五丸日再加至卅丸博濟安衆方云治因重病虛損後或日憂慮失心驚悸心忪或夜間狂言恒常憂怕或如神不足人小兒

諸驚癪等并時疾心熱等並宜服七寶鎮心丸服  
七寶鎮心丸

席睛一雙金薄五十銀薄五十光明珠二分雄黃二分  
牛黃三分席珀三分真珠三分龍膽三分麝香三分

右如法研如麵以乘肉爲丸如菉豆大每日空心  
心以井花水下三丸或五丸或七丸量而服之  
小品方遠志湯治中風心氣不定驚悸言語謬誤  
恍惚心中煩悶耳鳴方

遠志三兩去心伏苓二兩獨活四兩甘草二兩

夕藥三兩當歸二兩桂肉三兩麥門冬三兩  
半去心生薑五兩人參二兩附子一兩炮  
薰蕎三兩去皮

凡十二物以水一斗二升煮取四升服八合人羸可  
服五合日三夜一升半——十三服宣春——

葛氏方治人心下虛悸方

麻黃半夏分等磗蜜丸服如大豆三丸日三  
千金方云補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多  
夢不自覺自准自痛時吐血舌本強水漿水不通

方

紫石英二兩 麦門冬三兩 伏苓二兩 人參二分

紫莞一兩 桂心二兩 赤小豆四枚 甘草一兩

干棗廿枚

九味水八升——煮取二升半分——三服宣春夏服

又云定志湯，主心氣不足，心不外，痛驚恐方

遠志四兩 昌蒲四兩 人參四兩 伏苓四兩

四味水一斗——煮取三升分三服

僧深方云定志丸治恍惚憶念，胸中恐怖，志不定

定風氣千藏方

人參二兩 伏苓二兩 昌蒲二兩 遠志二兩

防風二兩 獨活二兩

凡六物治下薛以蜜丸如梧子服五丸日再

今案范汪方加鐵精一合細牽四丸

治中風四一枝不屈伸方第十五

病源論云風四支拘攣不得屈伸者由體虛湊理

開風耶在於筋故也

小品方云張仲景三黃湯治中風手足拘攣百草

寒煩譟作心亂惡寒引日不欲飲食秘方

麻黃五分 去草 獨活五分 细辛一钱 黃耆二分

黃芩三分

凡五物以水五升煮取二升分每服一服耳小汗出

雨服大汗出即愈

葛氏方云若骨草疼痛不得屈伸近之則痛短氣

氣自汗出或欲腫者方

附子二兩桂心四兩木三兩芍草禹水六升

煮取三升分三服汗出愈

又玄若手足不隨者方

取青布燒作烟於小口器中煙痛安佳

又方茲三升水九升煮取三升分三服

治中風身體不仁方第十六

病源論云風不仁者由營氣虛衛氣實風寒入於  
肌肉使血氣行不宣流其狀搖之如障衣是也

葛氏方云若身中有掣痛不仁不隨處者方

取干艾葉一斛許丸之內凡齰下塞餘目唯目  
以痛處著齰目上燒艾以煙之一時間愈

又方好木削之以水煮令濃契的アタマメ尔以漬痛處ハタカヒツカヒ

良

治中風身體如虫行方第十七

病源論云風大虛耶中於營衛溢於皮膚之間與虛  
勢并故遊奔遍體狀若垂行アリク 博床寶風寒ハサウエ

千金方治風身體如虫行方

塩一升水一石煎咸半ナトリウム 澄清溫洗三四遍亦治一切  
風又方以大豆漬廚コムツ 將水中アセナガ 温洗面頸髮不淨加  
炒麵アチャコ 勿以水濯之

又方成練雄黃松脂等蜜和飲服十九如梧  
子日三慎酒寃塩致神祕不傳

治中風隱軒方第十八

病源論云耶氣客於皮膚復逢風相折則起風搔搔  
隱軒

赤癰者由涼濕折於肌中之熱アラヒ 結成赤癰也—  
得天勢則刺取カタハシ 冷則減也

白癰者由風氣折於肌中熱アラヒ 与風相搏爲白癰也  
得天陰而冷則愛カタハシ 出風中アヒ 刺得晴溫則減著衣

身溫之卷

素問云赤軀忽起如蚯蚓煩癢重當龍起搔之逐半  
起也有白軀之如此

蟬也

興羊脚也

小品方白蘆方

宜煮荊蘚湯与少酒以浴佳

又方以酒煮石南草拭之風熱風寒風熱

又方水煮樊石汁拭之

又玄赤蘆方

宜生地衝草瘞之最驗大法如治丹諸方

千金方治隱軀百治不差方

本景天一斤一名慎火搗綾取汁塗上蟻炙手摸之

再三度即差

又方樊石二兩末酒三升漬令洋拭上立差

又方白蕊葉煮湯洗之

又方芒消八兩水一斗煮取四升浸綿拭

又淋石灰汁洗

又方大豆三升酒六升煮四五沸服一盃日三

如意方治隱軀術

漏蘆作湯以洗浴

効驗方治風搔茱萸湯方

茱萸一升酒清五升 凡二物合煮得一升

五合絞去滓適寒溫洗日三

錄驗方黃連湯治風搔隱軼方

芒消五兩 黃連五兩 凡二物以水八升煮

取四升去滓洗風痒，數日二

本草替疑風搔隱軼方

十全黃蠶沙汁漬之 又方梓葉單煮洗之

又方茺蔚葉可作浴湯

孟洗食經風搔隱軼方

煮赤小豆取汁停冷洗之

治中風隱軼瘡方第十九

病源論云人皮膚虛為風寒所折則起隱軼寒多  
則色赤風多則色自甚者癢痛搔之則成瘡

葛氏方卒得風搔隱軼搔之生瘡汁出初痒後痛

煩悶不可堪方

燒石令赤以少水中內塗數合及熱大熱以洗漬之

按奴和奴  
迴二爻  
擊也

又方剉桑皮二斗許煮令濃及熱以自洗浴。

又方以鹽湯洗之按恭菜塗之

又方以慎火合致搗以傳之

醫門方云煮菊藿湯和少酒以浴之極佳

劉涓子方治耳體濕軟皴瘡方

地榆根三兩黃連二兩大黃四兩黃芩四兩

苦參八兩甘草六兩芎芻四兩

右七物以水六升煮取三升半浴洗

孟诜食經云拧莖單煮洗浴之

刃方茺蔚可作浴湯

刃方煮赤小豆取汁停冷洗不過三四

刃方搗繫萋封上

治中風癲病方第廿

病源論云凡癲病皆是惡風及犯觸忘害得之初覺皮膚不仁或淫<sub>此背為疾始起便急者</sub>苦癢如虫行或眼前見物如垂絲或隱癰赤黑治之斬朱穀者鮆專食胡麻松木家善生癲名不一木癲火癲金癲土癲水癲蠟癲雨癲疥癲均謂癲也又有鴉癲白癲論諸癲形狀在

本書依繁不載

又云酒醉露卧不幸生癩

驗方云有人五癩八風之法一木癩二石癩三風癩

四水癩五沸癩

葛氏方云癩病乃有八種云

治白癩鷄癩方

苦參根皮乾之麻搗以好酒三斗漬廿一日去滓

服三合日三

又方干艾葉隨多少濃煎以漬麵及餚醜如常

造酒之法也

法酒熟隨意飲恒使董

又方取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草搗末

末服方寸口日三百日更赤起一年都差復色

又方搗好雌黃末苦酒和鷄羽染以塗瘡上乾

復塗之

僧深方治癩方

水中荷蕊千九百九十九煮以自瀆半日用此方多愈

又方水中浮青萍濃煮自瀆之

范汪方治大風癩瘡方

取葎草一擔二石水煮取石汁以漬刷不過  
三漬愈

集要方治癲方

田黃苦酒和漿之

治中風言語錯亂方第廿一

病源論云風耶者謂風氣傷於人也以身內血氣為  
正外風氣為邪若其居處失宜飲食不草致府  
藏內損血氣外虛則為風耶所傷故病有五耶  
一日中風二日傷暑三日飲食勞倦四日中寒五日

中溫其為病不同中耶者發時則不自覺知狂  
惑妄言悲喜無度是也

僧深方五耶湯治風耶入人體中鬼語妄有所說悶  
亂恍惚不足意志不定發來注有時方

伏苓松脂流入地中千歲變為伏苓形如鳥獸龜蟹者良入地四尺深者七尺得之

丸參三兩伏苓三兩伏神三兩白朮三兩菖蒲三兩

凡五物水一斗煮取二升半去滓先食服八合日

伏神范汪方伏神湯五邪氣入人體中鬼語妄言有所見  
聞說心悸慟恍惚不定發作有時方

伏神有根者名名伏神

伏神三兩昌蒲三兩赤小豆一枚人參三兩伏苓禹  
允五物水一斗煮取二升半分三服

經心方慈利陽治耶鼓無常罵詈與鬼語方

鴟頭一分蛇垣山一分甘草一分慈利一分

桃花方

五味好酒四升煎取一升頃服大吐

治中風癲病方第廿二

病源論云五癲者一陽癲二陰癲三風癲四濕癲  
五馬癲也人有血氣少則心虛精神離散魂魄妄行

曰為風耶所傷耶入陰則為癲疾又人在胎特其母  
卒大驚精氣并居令子發癲其發則仆地吐涎沫  
無所覺是也

千金方云治癲疾者視之有過者昂寫之量其血  
於瓠囊之中至其發時血獨動矣

范汪方治五顛方

鐵精一合芎藭一兩地丁子五合防風一兩

凡四物合和搗下筛日三服日用一錢有驗昂愈

又方灸天澤穴在肘中動脈

効驗方高風散治癲勞方

蜀天雄三分炮山茱萸一分署預十四分獨活八兩  
一方八分石南草十二分一方六分人參十分蜀附子二分一方六分  
术一分桂心十二分于薑八分一方六分烏頭六分炮  
細辛一分其義都鹽  
十全丸十二物治下節濁服方寸匕日三不知稍增以  
知為度

小品方治癲疾或作僵仆不知人言語妄見鬼方

狼瘡子三升清酒五升漬出曝乾復內汁盡曝子

搗治末寧腹服四分日三

葛氏方玄癲病方

灸陰莖上宛中三炷得少便通便愈

又方灸足大指裏毛中七炷

又斬鷄冠血瀝口中

千金方云風癲多天窓百會各三百壯

狂癲吐舌灸眉管百壯狂走癲疾灸大椎百壯

狂走癲癇灸季肋廿壯狂言妄語灸間使廿壯

狂走喜怒悲泣灸巨攬隨年壯

治中風狂病方第廿三

病原論云狂病者由風耶入并於陽所為也風耶入人血脉使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則全血氣相并氣並於陽則為狂發則欲走或自

高賢稱神聖是也

千金方云狂發少卧不飢自高賢自辨知自貴大善罵詈日夜不休

小品方治卒發狂方

用其人著地以冷水淋其面終日淋之

又云卒狂言鬼語方

以亂帶急合縛兩手反指便灸左右脇下對屈

時頭雨火俱起灸七壯須臾鬼語自云姓灸名先得去徐々詰問乃解其手也

又云狂罵詈擿打人方

灸口兩陽邊鷄九處赤白際各一炷并灸一

背胛間名臣攬三日一報之

又方灸陰囊下缝廿壮女人者灸陰會也

葛氏方治卒發狂方

燒蝦蟆 捣末服方寸二日三

又方者火三年陳蒲去滓服之

又玄狂言鬼語方

針其足大母指爪甲下入小許昂四

治虛熱方第廿四

病源論云虛勞而生熱者是陰氣不足陽氣有餘故內外生於熱非耶從外來乘之

拯要方療一切虛熱氣擁滯結不通三黃丸方

黃連二兩 大黃二兩 黃芩三兩

上件三物搗蜜和丸如梧子食後服三九日三  
又云療心臟間虛熱氣上迫咽喉口乾方

伏苓五兩 麦門冬三升二合去心 鳥梅肉二兩

右蜜丸如鰻棗大含銷咽之日夜含六七枚

若因食耳口苦者半麻三兩

廣濟方療虛熱齒連不下食昂頰悶地黃飲方

生地黃汁六合蘆根一搗生麥門冬一升

人參八分 橘皮六分 生薑八分 白蜜三合

切以水六升煮取二升去滓下地黃計蜜分

溫三。如人行四五里進一脈不刺慎生菜熱

麵炙肉高麥猪朴粘食

經心方大黃丸治虛熱食欲不消化頭脹引肩背酸

中介之口中爛傷不齧食方

大黃一兩黃芩一兩黃連三兩苦參二兩

龍膽二兩

五味蜜丸如梧子服五丸日三

又云生地黃煎火治虛熱及血利方

生地黃汁三升右內汁銅器中於炭火上

煎令如凝脂二合

効驗方龍膽丸治朝寒暮熱手足煩聾張血青

不能飲食方

龍膽二丸黃連二丸黃芩二丸人參二丸

芒消二兩大黃二丸

凡六物治下部蜜丸如梧子服五丸日三不知

可至七丸

葛氏方云若釤中熱結煩躁悶亂狂言起立者

方

以茺蔚花升水三升煮取升半以布瀆湯中擣

葛根中上燥復易

治客熱方第十五

病源論云客熱者由人府藏不調生於虛熱之客於上暉則膏華生淡實口苦舌干客於中暉則煩心悶滿不能下食客於下暉則大便難小便之滯

耆婆方治人客熱方

生地黃根一握淨洗搗絞取汁內少許蜜少

之服之又方以竹瀝待冷少飲之

又玄治季夏月客熱方

升麻兩甘草一分炙藍二分人參三分

粟米一升

一方

以水五升煮取半升去滓夜露之平旦一服

之

又云治人舌滯不能食方

菖蒲十二分人參三分防己三分切搗篩為散

以飲服一方寸匕日二服此方至夏月恒須早服之

無此病之

錄驗方竹茹湯治匈中客熱口生瘡爛不得食方  
竹茹四兩去上青生薑四兩甘草二兩前胡二兩  
本草如猪及王篇汝金文竹茹以塞舟

伏苓二兩 橘皮一兩

凡六物水六升煮取二升分服半日盡

范任方陽達陽治匈中有熱端肩息方  
半夏半升 人參一兩 石膏如鵝子者一枚  
生薑四兩 餡四兩

凡五物以水一斗五升煮得七升服一升日三

夜二

醫心方卷第三

醫心方卷第三札記

二頁上為衝後來審墨色為字似後人所加  
一行注為衝後來案文義恐當在末字下 行 下八醣  
汗病源作 汗鹹汁 七頁上 腫涕 涕忍辨  
續或是 非訛 十二頁 不遂 案遂原作遂不誤  
肥即 下六行 不遂 後人刪改作遂也 行 下三行 呵梨  
肌肥 十三頁 呵梨  
勒梨 頭有胃中在 案有恐 十四頁 心上似有物勞勇  
湧 行 下五 痰縱病源無 十九頁 十善散 機前數方例  
味一 行 古頁上半錢止上訛 上一  
方 五行 上一  
二字案傍記作參似是說文參牛鼻中環也 上四行 奏強 今卒肘後  
脊曲角也案癰發口蓋以曲木強發口也 行 下六  
一

食久一  
下傍記補宿

古三貞生棄炭

靈杞炭

大四  
貞下

非是

古五貞衡奏

衡奏蓋即奏案

二續命湯

續余即續余

古四行生棄炭

靈杞炭

大四  
貞下

之奏並作

古五貞行

忽勿忽寧衍合

古六貞下

六行傍記

鳥龍嚙

靈杞炭

蒸似是

古九貞下

五十斤片訛斤

古七

行心心

衍一

行禱靈

禱誤

下九懷忌忘訛

古三貞下

行心心

衍一

身訛

古六貞下

六行瀆面

古八貞未詳案

行心心

衍一

蚊蛇猶亦作因

古二行益洗

下二行蚊烟喙

古七

行耳體

上七

耳字梨蘆

古三行慾利

下三行慾利

古草白

行耳體

上七

一名蕊葵

古四行端

下四行端

古草白

行耳體

上七

以俗呼軟錄

古六行端

下六行端

古草白

行耳體

上七

十七頁背記

并上系

病源并下

古草白

行耳體

上七

醫心方卷三本言

二

醫心方卷第三背記

忘多

病源論曰忘者心虛也心神虛損而多忘  
養生方云丈夫頭勿比首卧神魂不安多愁忘

以上第十一葉

癇

病源論云風癇候者風邪之氣先中於陰病發於五臟  
者其狀奄忽不知人喉嚨喎然有聲舌強不能言

以上第十七葉上八行

秦

居緩切牛鼻環也一日牛拘

以上第廿五葉

卷之三

