

醫心方卷第十

F 9
1-70

490.9

Is-3
9

No. 2255
12 i 109-1



富士川宣雄

1408

醫心方卷第十



- 從五位下行鍼博士氣舟波介舟波宿祢康賴撰
其後
治積聚方第一 治諸疝方第二 治七疝方第三
治寒疝方第四 治八疝^{カハラ}方第五 治癰痕方第六
治累瘢方第七 治蛇瘕方第八 治鼈瘕方第九
治廩瘕方第十 治宍瘕方第十一 治駁瘕方第十二
治米瘕^癰方第十三 治水瘕方第十四 治食瘕^癰方第十五
治消瘕方第十六 水病證^{シル}候第十七 治太腹水瘕方第十八
治通身水腫方第十九 治下水腫方第廿一 治風水腫方第廿二

治水癖方第廿二

治身面卒方腫第廿三 治犯土腫方第廿四

治薰疽方第廿五

治黃疔方第廿六

治穀疽方第廿七

治酒疽方第廿八

治女勞疽方第廿九 治黑疽方第卅

治積聚方第一

病源論云積聚者由陰陽不和府藏虛弱受於風
耶搏於府藏之氣所爲也府者陽也藏者陰也陽
浮而動陰沉而伏積者陰氣五歲所生始發不離
其部故上下有窮也聚者陽氣六府所成故無
根本上下無所留心其痛無有常處肝之積名曰肥

氣在左脇下如覆杯有頭足令人癥瘕瘍心之積名曰伏
梁起脅上如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃營膚
大如盤令人四支不收羨苦。疽飲食不爲肌膚肺之
積名曰息竇在右脇下覆大如杯令人酒淅寒熱腎
之積名曰賁疣於少腹上至心下若竇竇之狀上卡無
時令人喘達骨萎少氣鑿門方云辨曰肥氣者肥盛
也言肥氣如覆杯突出如肥盛之狀伏梁者言其大如臂
狀似屋舍梁棟也故名伏梁瘍者滿也言其氣滿痞結
成積也息者長也奔者羣也言其氣漸長而逼於

暁故曰息奔病似伏豚而上衝心者也。又有奔豚之氣非
 積病也。名同而病異焉。華佗方云：車丸常在尊者
 後一車。故名二車丸。主心腹衆病。暁上積聚寒熱。食飲
 不消或從憂恚喜怒或從勞倦氣結或有故疾氣
 浮有上飲食裹少不生肌。寒若辟在脇。吞杏一丸
 易消若驚恐不安。吞失一丸日三獨卧。不忍病劇。畫
 曰六七夜三吞。微者畫日四五夜。弃吞寒辟隨利
 去。令人善失氣。又治女子絕產少腹苦痛。得陽
 必痛引胸中積寒所致。風入子道或月經未

絕而合陰陽。或急欲溺而合陰陽。或衣未捲
 而合陰陽。或急便署之濕從下上。久作長病。
 吞藥如上百日。有子貳車丸方。

蜀椒成樺一斤

乾薑大小相稱廿枚

粳米一升

朗陵鵝頭大小相稱廿枚

銕竈中灰一升

凡五物以水一斗半漬灰練裏中盛半絞結

內灰中一宿暴乾之。皆末諸藥下師和以蜜嚥

吞分如梧子。勿用漿水也。身中當

痺藥

力盡乃食。老小裁之。

范汪方五通丸主積聚單飲宿食寒熱煩結長肥
膚補不足方

枳目一兩 汗附子一兩 厚朴一兩 杏人子三兩 炙

半夏一兩

洗

亭歷三兩

蒸

芒消

五兩

熬

大黃九兩

炙

甘草

二兩

炙

大黃九兩

炙

甘草

二兩

使調和以蜜搏五千杵吞如梧子二丸

凡八物別搏亭歷杏人使就合和諸藥未

又去三台丸主五藏寒熱積聚臚脹腹大空鳴而噫食不
生肌膚劇者效遲若傷寒病已愈新令不叢飯已吞
五丸飲多吞十九取大便調利長安益氣補不足可常

服方

大黃十二兩

一方二兩

雄雞碎多
蟻令變色

亭歷

一升

蟻令變色

附子一兩

炮

冷

炙

杏人一升

一方

蟻令變色

消石一升

一方

前胡

二兩

一方

前胡

厚朴一兩

炙

伏苓半兩

丁香

一升

丁香

一升

丁香

一升

丁香

一升

丁香

一升

丁香

一升

細辛一兩

炙

半夏一兩

炙

洗

洗

洗

洗

洗

洗

洗

洗

洗

五十物皆搏篩

和

以蜜搏三万杵九如梧子從

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

度

又云治久寒積聚方

虎杖根一升許搏之以酒漬

日三

飲一升

小品方玄七氣九治七氣爲病有寒氣怒氣寒氣憂氣

恚氣愁氣熱氣此七氣為病皆生積聚堅牢如坏在腹中心痛煩惱不能食時去時來發作有時每發痛欲絕也其寒氣則吐達心下脹滿其熱氣則怒忽悶亂常如眩冒失精其怒氣則不可當熱病上邊心短氣欲絕不得息其恚氣則積聚心下不得食飲其喜氣則不可疾行久立其憂氣則不可苦作臥不安席其愁氣惄惄^則參或本作之置物四傍不復憶處四支手足跗腫不得舉之治產生早起中風餘疾也

大黃十分 炮 火 入參三分 枸二分 熬 火 半夏三分 炮 火

鴟頭五分 炮 火 桔梗三分 火 細辛三分 火 茉莉三分 火 故于薑三分 火 昌蒲三分 火 伏苓三分 火 蒿蔚分

葛根

紫菀三分

甘草

其草三分

石膏三分

英胡

三分

桃人

三分

木

凡十七物治合下節和以蜜酒服如梧子三丸日三不知稍增

今案錄驗方有桂心无蜀椒治宿寒積聚尤滿諸

毒氣

如石令人涼健身光澤

木

千金方七氣湯治憂氣氣勞氣寒氣愁氣或飲食為氣高氣或虛勞內傷五歲不調陽氣裏少達上下方

甘草二兩 桔梗二兩 火 夕藥二兩 枸三兩 半夏二兩

人參一兩 于地黃二兩 茉莉五兩 八味切以水一斗

量取三升分三服

又云神明度命丸治久病腹內積聚大小便不通氣上
槍胸腹中脹滿達苦飲食服之甚良方 大黃一兩

夕藥エビハクハリ一兩

二味蜜丸如梧子狀四丸曰二不知可增至
六七丸以和爲度又云腸下耶氣積聚往來寒熱

如溫瘧方

蓬鬚壤土熨之令即易

葛氏方玄露宿丸治大寒冷積聚方 磬石于薑
桂桔梗附子皂角美姜各三兩

鴆肺蜜丸服如梧子十九日三稍增至十五丸

僧深方治心下支滿痛破積聚欬遲不受食寒熱體
方 蜀牀フサバハクア五分 于薑五分 桂心五分 馬頭五分

右四物治合下肺蜜和丸如小豆先鋪食以米汁服
一丸曰三夜一不知積增一丸以知爲度禁食飲

新錄方治積聚方

馬覓鴆汁為煎令可丸涓服タラハシハリ一丸

棗ザクラ日三

德貞常方積聚方 炙弟十三推節下間相去三寸
又方灸上管穴在鴆尾下二寸又方灸胃管穴在上管下
一寸又方灸水分穴在脊上寸 新羅法師方

續隨子去上皮以酒一合和而服之二七粒量人老少

用之崔禹錫食鍾取幕青子一升鳩研以水三升煮取一

升濃脹之為藥也。治癥瘕也。

治諸疝方第

病源論云陰氣積於內復為寒氣所加故使榮衛不調血氣虛弱故風冷入其腹內而成疝也。疝者痛也成少腹痛不得大小便或手足厥冷。繞脅痛白汗出或冷氣逆上捨心腹令心痛或裏急而脇痛此諸復非一故云諸疝也。八十一難云五藏謂之病。六府謂之瘕。又曰男病謂之疝女病謂之瘕。葛氏方治卒得諸疝少腹及陰中大部。右闕及左右各寸無百法。

相引痛如絞白汗出欲死方。鳩沙參下節以酒服方寸匕立愈。又方。枳二合千薑四兩水四升取二升去滓。內稻一斤。又剪取半升分再服。又方可服諸利丸。九下之作。走馬湯。又方。灸心鳩尾下寸名巨。大部。右闕及左右各寸無百法。

強要方療積年腹內宿結疝令氣及諸癰癬方。杏羨爛豉心一升。驟乾後煎令小芥子一升。唯去石微熬。右蜜丸空腹酒服廿五丸加至卅五丸日二服初服半劑已來腹中覺絞痛勿堆此是攻病之候。

新錄方治諸疝方

桃白皮一升以水三升煮取一升

煩服之

又方酒服蒲黃二方寸匕日二

又方搗桃人八十枚去皮研如泥酒下

又方搗大蒜

爲泥酒

肿如棗二枚曰三危汪方治心疝發法兩足

大指甲本甲末之際甲內各半主隨年壯

又方

灸足心及足大指甲後橫理眛上及大指歧間白黑肉際

百壯則已

治七疝方第三

病源論云七疝者厥逆心痛足寒清飲食吐不下名曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥

疝寒飲食即腸下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在脊旁名曰盤疝腹中在脊下有積聚名曰附疝腹與陰相引而痛大行難名狼病也皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也

錄驗方七疝丸治人腹中有大疾厥逆心痛寒冷食吐不下名曰厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積大如臂名曰僻疝寒飲食即腸下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在脊左傍名曰臍疝腹痛脊右下有積聚名曰附疝腹與陰相引而痛大行難名曰

狼瘡治方

人參五分

桔梗五分

黃芩五分

細辛五分

千薑五分

蜀牀五分

當歸五分

夕藥五分

厚朴五分

鴉頭五分

凡十物治下篩和以白蜜丸如梧子先食服四丸曰三不知稍增禁生冥猪宍今案僧深方有八物桔梗細辛桂心夕喙二分脰三丸曰三范注征方有十二物蜀牀五分于薑四分厚朴四分桔梗二分烏喙一丸黃芩四分細辛四分夕藥四分此胡一分伏苓一分牡丹一分先鋪食以

酒服七丸曰三

治寒瘡方第四

病源論云陰氣積於肉則衛氣不行衛氣不行則

寒盛故令惡寒不飲食手足厥冷絞痛白汗出遇寒即發故云寒瘡

葛氏方治寒瘡去來每發絞痛方

吳茱萸三兩

生薑四兩

豉二合

酒四升

煮取二升二服

小品方云解急蜀牀湯主寒瘡心痛如刺繞脊絞痛腹中盡痛白汗自出欲絕方 蜀牀三百枚一方二百枚

附子一枚 棱米半升 干薑半兩 大棗廿枚 半夏十二枚

甘草一兩 先七物以水七升煮取三升熱服一升不覺復服一方

一升桂心方蜀林湯治寒疝痛腹奔脅方

吳茱萸半分當歸一兩芍藥一兩黃芩一兩

蜀林二合五味以水八升煮取二升半分三服

范汪方治寒疝腹中痛小豆蔻胡湯方並胡半斤

半夏半升洗去黃芩三兩甘草三兩人參三兩

生薑三兩大棗十二枚擘几七物㕮咀以水一斗半煮得

六升去滓服一升日三

耆婆方治寒疝積聚用力不節脈絕傷羸瘦不能食飲此藥令人強健除冷氣痞丸方

葛根八分炙真芪少許分煎歷八分熬

大黃八分右七味搗碎以蜜和為丸如梧子服五丸日二忌猪臭五年生冷酢滑

新錄方治寒疝及衝心痛方 塩五合寬安墨三合

以水一大升煮取一小升頓服之呴差

又方水一升五金漬豉一升五合绞取汁服之方桃人

八十枚去皮研如泥酒下之又方桃白皮一升以水三升

煮取一升頓服之又方以水若涓服乱髮灰方寸匕

曰又方水涓服伏龍肝方寸匕又方水服瓶帶

葛灰方寸匕日二 又方涓五匕燒灰角一枚投涓

中分二三服之 又方灸乳下一寸足大指裹毛

又方吞上三寸名大倉吞下二寸名丹田各五十七並

要穴 又方灸上管七壯 又方灸窮脊上二寸百壯

天方灸脊中百壯 治八痞方第五

病源論云榮衛不和陰陽障絕而風邪外入與衛氣相搏血氣擁塞不通而否也否者塞也言府藏塞不宣通也由憂恚氣積或墮墜內損所致其病腹內氣滿也言其氣滿 痞結成積也 錄驗方治八痞癥香丸方

結腹時一肚熱是也其名有八故云八痞而方家不約其

證狀

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆之大如盤令人四支不收蓋黃疸飲食不為肌膚今案楊氏注云痞不色言滿也言其氣滿 痞結成積也醫門方云痞者

痞結成積也

錄驗方治八痞癥香丸方

光明沙 麝香 丁香 曾精 各兩 大黃七分

名青

大黃七分

黃芩三分 朴消二兩 亭歷子六分 甘草一兩

巴豆六分 几十粒搗碎蜜丸如小豆一丸平旦空

腹服若老人瘖者同患之人脹如梧子一丸

傳信方云療秋夏之交露坐夜久腹內如羣右在腹

中痛者方 大豆半升 生薑八分 右以水二升煎取

一升已下頓服其堅痞立散 治癥瘕方 第六

病源論云癥瘕者皆由寒溫不調飲食不化與藏氣相搏結所生也其不動移者真名爲癥若病雖有結痕而可推移者名爲瘕也葛氏方云癥瘕病衝心不移動飲食痛者死

新錄方云治一切病溫自丸方南州刺史巨陰鉉言巨家慈澤視事三年自到任官以來巨妻不便水去有地下濕遂得腹脹病頃年已來恒遣醫師療治於今不差有一蒼昊道士名林勝

到巨州墺稼藥巨遂呼道士至舍說巨專妻病狀于時道士昂與巨藥方用治之病無不得差

紫菀二分 吴茱萸二分 白芍二分 厚朴二分
桔梗二分 皂莢二分 馬頭十分 伏苓二分
桂心二分 于薑二分 黃連二分 蜀牷二分
巴豆二分 人參二分 芝胡二分

右十五味搗下筛為散用好蜜和更搗三十杵丸如梧子大服二丸不知稍增可至五丸以為度當心腹積聚久癥瘕塊大如坏椀黃疸宿食朝赴臨吐

四支痛上氣時之腹脹心堅結衝心傍攻兩腸徹背連胸痛無常發或吞痛狀如虫鑽又治十種水病八種及胃吐逆飲食噎塞或五淋之病或九種心痛久治積年飲食不消化或治婦人不產及折續多年又治卅種乍寒乍熱治一切諸風體如頑痺不知痛處半身疼痛或眼中生瘻或如錐刀所刺頭顱墜落或面上瘻如虫行莫不見或手足煩熱或夜卧不安治七十種風又治卅種症或大人顛小兒廿五種驚癇渠井及強急也又治五耶夢鬼相通或四支沉重不能飲食昏嘔

口紫口渴死或差或劇似真鬼還終日憂愁情中不樂或恐或懼悲啼飲食無味婦人月水不調或多或少真似懷孕知子或連年累月羸瘦困弊遂致於死或哭或歌爲鬼所亂但能服此藥莫不除愈宜知驗合藥與婦人服之十日下出癰瘍虫長大尋一枚下腹三升其病即愈宜見被墮傷臨死有積血天陰昂羸瘦著床不能飲食命在旦夕服此藥日五丸至十五日當下鷄肝黑血如手指者二百斤白膿二升赤黃水一升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦疲氣困飲食不下臣与此藥
服卽生下升十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤身黑下膿
三升許病昂愈又臣公曹常患著床以經數年服此
藥卽生下升世曰下宗蠅蠅百枚有出青黃水一斗病昂愈
臣門師姪長多羸瘦著床食便吐出命在朝夕
從臣求藥服五丸至十五日下出宗蝦蟆十枚青水
一斗其病昂愈又臣家內有人常患心病癟無時節
癟昂欲死服此藥五六日下宗蛇二枚各長尺五寸有頭
眼未有童子班有文其病昂癟又臣治尼專得大風眉

墮落已經二年遍身出瘡毛狀如錐力所刺與藥服九丸
一月日出癩虫五色凡三升許其病昂眉鬚遂生至復
如故卽生下升臣知方大驗死罪謹上也服中禁忌令水生菜生糞
猪又安滑陳又夏物五章又僧深方云消石大丸治
十二癥皮及婦人帶下絕產無子及欲服寒食藥而腹中有
癥瘕僻實者當先服消石大丸下之此丸不下水穀但下丸
病可不令人極也又河西大黃八兩又朴消六兩

上黨人參二兩又甘草三兩又凡四物皆各異搗下筛
以三咸好苦酒又置銅器中以竹箸柱銅器中一升作一剂

凡三刻以置火先內大黃使微沸盡一刻乃內餘藥復盡一刻餘有一刻極微火便可丸乃令如鴨子中黃欲含藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也欲服者二丸若不能服大丸可分作四丸不過四丸藥丸欲大欲令細能不分又善若人羸者可小食强者不須也若婦人眼下者如鷄肝如米汁已黑或半升或三升下後填風寒作一坏酒粥食之然後作羹臘自養如產婦法六月則有子禁生冥賭冥享菜若服寒食藥者如法不與餘同也

千金方治癓瘕方

灸內螺躁後完中隨年壯

又方灸氣海穴百壯在呑下一寸半

又方

槲

白皮煎

名

桑

皮

剪

合可丸服之取知病動若下減之

丸

九

云

下

急

急

急

急

急

下如坏食則腹滿心絞腹痛方

丸

九

云

下

急

急

急

急

急

大黃二兩

津

沫

四

兩

三

味

各

異

鳩

五

百

杵

下

節

治亨厯子膏下二物散鳩五百杵和以蜜服如梧子元

本草摘葉有白汁故曰

葛氏方集

方同之

鈔

門

方

療

癰

瘕

瘕

瘕

瘕

瘕

腹內腸下小腹脹滿痛冷昂競其氣上衝心

不能飲食或欬逆氣急煩滿方

半

夏

十分

生薑

十分

生薑

十分

生薑

十分

生薑

十分

生薑

十分

大黃十二分 檳榔人十分 人參分八 吴茱萸六分

枳殼三分 炙 桔梗八分 伏苓六分

三木下大黃更煮三沸分溫 三眼タマ 相去

八九里當利三二行

廣利方理癥瘕腹脹滿堅硬如石肚カタナリ 皮上青脈浮
起 越方 紫葛粉八分 赤芍藥六分 桔梗六分 紫

莞頭廿五枚

青木香六分

水路呵梨勒皮

千金六分梢李子十二分 碎末 蜀大黃七枚 牽牛子四分

搏篩蜜丸如梧子空腹服十五丸 忌陳良黏

賦猪完

葛氏方治心下有癥大如杯不得食者方 亭歷二兩

大黃二兩陳涼四兩 搏篩蜜丸 捣千杵服如梧子二丸 日三

治暴癥方第七 痘源論云暴癥者由藏氣虛弱食

生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癥也 桂要方療卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療百日內皆死方

大黃半斤 朴消半斤 右先搗大黃為散然

後和朴消以蜜合令相得於銅器中置湯上

煎令可丸如梧子大酒飲任性服廿九日二不知

加之以知爲度今安葛氏方朴消三兩
范汪方有白蜜一斤半葛氏方治卒

累癥腹中有物堅如痛如刺晝夜啼呼不治之

百日死方取牛膝根二斤曬令小干以酒一斗漬之

密塞器口舉着契灰中溫之令味出先食服五六

合至一杯以意量多少又方用荊棘根少如此尤良

又方多取常陸根鴉蓋之以新布藉腹上以藥被

著布上以衣覆上冷復易之晝夜勿息已上半金集

驗方同之又方取席杖根一升于鴉酒漬飲之從少

起曰三佳此酒治癥力勝諸大藥

新錄方治暴癥堅在心膈下欬遲不下食或下不斷

方吳茱萸三升碎之以酒和煮令熟布帛物裹以熨

癥上冷更炒更燔用之癥當移去復逐熨

湏都消心火去暴癥堅張如石痛欲死者方取鼠壤

去黍糠二物亦分相和並炒速熨病上取差又方單用

暴鼠壤去之好又方伏龍肝如前方又方

病在上脹諸吐藥去之病在下宜利療之

本草贊疑云鳩莎草汁及乾末服之

治蛇瘕方第八

病源論云人有食蛇不消曰腹內生蛇瘕也。有蛇之精液誤入飲食之内令病之其狀常苦飢而則不下喉嚨塞食至胸內昂吐出其病在腹模端三有蛇狀謂之蛇瘕。

揣初委
丁果
度高下曰
揣又試也

新錄方治人食蛇不消生蛇之精液入飲食中令人病之腹內有蛇狀名之蛇瘕方濃作糉壅啜一升以上陶玄舞痞糉壅下蛇之藥非虛聖之又方鳩霞草和糉即餅字也

鳩取汁服八合 又方大豆蒸鳩取汁服一升

又方常思草鳩眼如上並頻之取姜半金方治蛇瘕

方白馬毛切長分以酒服方寸匕大者自出更服方寸匕中者二出更服三方寸七小者復出不可一頓

多服致人又云治蛇瘕大黃湯方 大黃半兩

鳩貳臭骨二枚皂莢六銖芒消如鷄子一枚黃芩半

兩甘草大如大指一尺 六味以水六升煮之三沸去

滓內芒消適寒溫盡服之十日復莫煮作如上法欲服之一宿勿食平旦服當下病也又云治蛟龍病方

開皇六年有人二月八月食芹得之其病癥似癰

面色青黃脹寒食強錫三升曰二吐出龍蛇有兩

頭大驗廣潘方同之今案病源論去五月八月蛟龍子治鼈

生在芹菜上人食芹不幸隨食入腹變成蛟龍治鼈

瘕方第九 痘源論云：癰痕者十云八十八謂腹內瘕結如蠶狀是也

有食蟹觸冷不消而生者十九只有食諸雜物得冷變

化而作者皆由脾胃氣虛弱而遇冷則不能尅消所

致瘕之言假也謂其有形狀而推移者也二十廣潘方療

鼈癰方

白馬屎一升五合溫服之令盡矣六葛氏方治癰痕

伏在心

下手掃ハカリ見頭足時轉動者ハタハタ白雌鷄一雙絕食一宿

明日膏ハラ煎飯飴ハラハラ之ハラハラ東其矢無多少於銅器中以滴

和火上熬可搗末服方寸匕日四五湏消盡乃止名恒飴

鷄取矢ヒトコロ畢敍鷄單食

千金方治癰痕

方 藍葉一斗搗水三升绞取汁服一升曰二又方白鼈

一斗鷄子三枚取白合煮取二合空服腹之廣潘方之

新錄方治鼈癰團似鼈有脚能動數衝心痛者十六

方取葫蘆根白皮搗三升以水五六合攪校取汁服七

又方單服白馬尿一升日二

八合水出 又方搗藍汁服七八合 治糞瘻方第十

病源論云人有冒氣虛弱者食糞因爲冷氣所搏
不能消之結成糞瘻糞瘻生是之有形狀如糞也又有飲陂湖之
水誤有小糞入腹不幸便昂生長久有形如糞養生方
云糞赤目作贊食之生瘻也 新錄方治人食生糞不
消又飲湖水誤小糞入腹不幸生長名之糞瘻方
灰火燒木作為灰湯若水脹方寸匕曰二 又方 燒年
燒糞鱗為灰湯若水脹方寸匕曰二 又方白馬尿脹开
久糞細為灰水脹方寸匕曰二 又方白馬尿脹开

又方糞搗皮湯脹之 又方豉汁脹 搗皮末方
寸匕曰三

葛氏方治食糞脹及生宗任胸中不消成癥方
朴消如半鷄子一枚 大黃一兩 凡二物以酒二升
糞取一升半盡脹之 治肉癥方第十一

病源論云人有病而常思得一宗。託又思之名為
宗瘕。千金方治宗瘕思宗不已食託復思方 空腹
飲白馬尿三升水宗出之 新錄方治宗瘕方 飲服大
豆黃豆黃末一匕曰二又方濃豉汁服一升曰二又方糞菘菜濃

汁脹之

治髮瘻方第十二 痘痘論古人有因飲食內誤有頭髮隨^食而入成癥胸喉間如有虫下上去來者是也廣濟方療髮瘻嘔欲飲油方油一升右香澤煎之大鉢勞^{タクハ}安病人頭邊令口鼻臨油上勿令飲及傳鼻面並令香氣叫喫取飲不得必當疫極眠睡髮瘻當從口出飲油人守視之并捉石灰一裹見癥出以灰杖^粉平捉癥抽出湏臾油盡即是髮也一初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短乞如之。

今案千金方云凡髮瘻者唯飲油也又云療胸喉間竟有癥虫曰中乃至三五升不飲食以此為病上下偏聞葱豉食香此是髮虫故也油煎葱豉置口邊行術二日不食張口而卧油煎葱豉以置口邊虫當漸出徐引去之無所忌

新錄方治髮瘻方滿食竟便吐者是成煎猪脂二升渭二升煮三沸一服一升日二取吐髮利瘻出乃以方飲白馬尿八合日一卷心髮瘻令食竟便吐餘瘻則不然已上千金方治米癥方第十三 痘源論云人有好啜米轉久亦嗜啜之若不得米則胸中清水得米服水便心米不消遂生

癥結

千金方治米癥恒欲食米方 雞矢一升白米

五合二味合炒令米焦 捣末水二升預服之湏臾吐出
病碎米若無米當出淡今案新錄方去水三升和攪預服之
當吐米不盡更服之大良

治水瘕方第十四

病源論云水瘕者由經絡否塞水氣停聚在於心下
腎經又虛不能宣利溲便致令水氣結聚而成。故曰瘕
在於心腹之間。按作水聲但飲飲而不用食遍身
虛腫是。范汪方治水瘕病心下如數斗油囊裹水
作聲曰飲二三斗不用食但欲飲久病則瘕堅有蝦蟆

蟲

蟹治并列丸草麻ハハキ煎成好者廿枚去皮坏中研

令熟

不用擣水解得三合宿不食清旦一頓服盡日中許當
呾下清黃如葵汁當裹結裹若病不盡却三日更增
服世牧草麻如上法若病故復不盡復增十物一枚服如
上法其以盡病為限藥但去病不令人悶亂下病之後慎不
可飲當五日斷飲試白麋用高方已神良。

治食癥方第十五

病源論云有人卒大能食非其常分因飢值生惹便大
食之仍呾分一宗塊繞畔有口其病昂愈故為食癥特由不

聿致此友累成癥非飲食生冷過度之病也

廣治方療食癥方

有人一食飯七斗并半猪餅

燔並不論因苦飢於惹中過飢急昂食生惹湏臾咷

出一宗薄而圍繞畔口無數昂以食授之三消盡飯七十

斗乃心咷此物後其人食病便愈此名食癥無所忌治酒

瘦方第十六

病源論云人有性嗜酒飲酒既多而食穀常少積久漸瘦其病遂常思酒不得昂咷夕睡不復能食古是胃中有虫使之然名爲酒癥今案諸方無治酒癥之方以此諸癥之方可治之新錄

方治諸癥方

冬旁光俞三百粒已上

又方酒若飲

服自駁丸灰又方鴉翹末酒飲服之曰二又方專歷子

玉竹熟以酒二升漬又方鴉翹末酒飲服之曰二又方

亭合歷子三升熟以酒二升漬又方鴉三日溫服半

盞曰二水病證僕弟十七集驗方云黃帝間

於岐伯曰水与膚脹脹覃石瘦石水何以別之岐

伯曰水之起也自果土頭或脹如新卧起之狀頸脉動

時欬瘡脰間寒足脰腹乃大其水已成也以手案腹隨手而起如裹水之狀膚脹者寒氣客於皮膚之間彭

。然不緊腹大身盡腫皮厚案其腹陷而不起腹色不
變。鼓脹者腹身皆腫大^{十七}與膚脹^也其色蒼黃腹脈起
脇覃^者寒氣客於少腹外与衛氣相薄氣不得營因有
所繫瘦而內著^之惡氣乃起息塞乃生始也大如鷄卵稍
以益大至其成也若懷^子之狀久者離^者歲月棄之則堅推
之則移月事時下右瘕生於胞中寒氣客於子門^之
閉塞氣不得通惡益當寫不寫而不留心日以益大狀
子如懷^子月子月事不以時下皆生於女如子^{可導而下}
今系石水之證無本方病源論云石水者四支小腹獨大其根在膀胱小品方云先從胃脾名曰石水其根在脾
亦名石水 腎門方

辨曰近驗水病者小便皆濁或黃赤不出溢入經絡致
令腫滿名為水病療法以利小便藥不差則以利大便藥
則愈若曰服利藥便利不可心者是死候也又云若諸皮
膚水脹者服諸荅汙湯得汙即愈湏慎風冷及鹹食
宜食鯉鱠^也臭莊^是小豆末利小便物為佳
葛氏方玄水病脣黑吞突岀死水病脈出者死于金方
玄水病初起^元雨目上^司先腫如老蟹色頸脈動股裏冷
脛中滿按^也之沒指腹中轉側有聲此其候也又云水病忌
腹上出水^之者一月死太^忌之又云水病忌^也孝產乳音

樂房室 謳戯一切臭一切宍生冷酢滑
萩黏米豆油臍用力ヲ

治大腹水腫方第十八 痘源論云夫疰病皆榮衛否
水

溢腎脾虛弱所爲而大腹癰腫者或因大病之後或積水
水久之令水氣下侵

虚勞損或新熱食竟入水自漬及浴冷水氣不散流

故溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

腫四支小腹陰下濕手足逕冷腰痛上氣欬味煩疼故云
故

太腹水腫千金方治大腹水腫氣息不通命在旦夕

九勝小服、金方酒ノ用ノ原藥、下之五味、一
者方牛黃二分、昆布十分、海藻十分、牽牛子八分、桂

者方半黃二分足有
一少許酒一少許鹽
水二少許味精半小匙
心八分林目三兩茲
亭歷六兩七味別鳩
亭歷就如

心八分朴目三赤
亭德武七分另在画廊
竹林子

膏令口_火凡_火吾子次良_火十九日再_火更_火利高_火

膏含和丸如梧子飲服十丸日再稍加少便利為度
醫門方藥大腹水重滿中失苟更急

醫門方療大腹水腫遍身洪滿小便澀少方海蛤

六合 研如題
亭歴子十分 起伏苓六分 橘皮四分 郁李仁四分

分乘根白皮五分甘遂二分漢防己六分橘皮四分

擣蒜為散別擣亭歷子如暗內散中蜜丸空腹飲

服七丸日一當利一二行如不利加一丸以利為度

忌猪 宗大醋油膩鹹食
アラヒタマニシテ
新錄方治水一病 腹大

思補方治水病腰大
面腫小便澁方亨歷子一升合
キリ熬紫色合
ヒタチ鵝如泥 芒消三兩 吳茱カクシカ

黃三令 搗爲散 合三種一更搗加少蜜可丸搗二千杵

飲脹七丸曰二服以小便利為度忌鹹酸菴心若熱水
四支煩心胸熱悶者去茱萸効驗方治水大腹亭
厯子散方 藍葉三兩 大黃一兩半 亭厯子二兩
凡三物治肺 先食酒服二方寸匕欲九服蜜和脹如大豆
日廿丸小品方治水腫大豆湯 方 大豆三斗
水五斗煮令熟出豆澄汁更內羨酒五升微火煎如飴
服一升漸增之令小下著婆方言人癥病四支脚肿面
脹一升漸增之令小下著婆方言人癥病四支脚肿面
腹俱腫方 香薷イヌマツ一百斤以水煮之令熟去滓更煎令
如飴糖少服之當下水小便數即差イヌマツ

又云治人多水身重而水出而虛越腫宜寫方
桂心一兩半 大腹檳榔三七ナツメシナウ生薑兩半
三味切以水九升煮取三升去滓分爲三服壹
下水即差

葛氏方治大腹水病方

防己甘草亭歷モキカツラ各二兩 檉苦酒和服如梧
子三丸曰三恒將之取都消乃止 又方白茅根一大把小豆
三升水五升煮訖去茅根食豆水隨小便下 又方恒
散小豆散并汁佳イヌマツ 本草經亦瑞安主冬水脹不

老垂死者作羹食之下水大効。要方療大水腫神
方白鴟四兩 桂心一兩 薩根六斤 甘草一兩 条人參一兩
細辛一兩 大棗十四枚 右以水九升煮索根取三升以煮藥
取一升去滓內鴟令洋盡分三服。一日一夜小便五六升是
龍門方療腹滿如石積年不損方 取白楊樹東南
皮去蒼葉風細押削五升趁令黃酒五升熱淋訖以絹
袋衣盛漣迷內此酒中密封再宿服。冬水病法之大觀證類本草云每服合量半升半寸半冬脾俞百粒在第十七椎下冬意舍
灸羣俞百粒三報在第十七椎下灸脾俞百粒在十一椎下灸水病法合量半升半寸半灸意舍
百粒在當脊孔治通身水腫方第十九

病源論云癰病者由腎脾俱虛故也。腎虛不能宣通水
氣脾虛又不能制水故水氣盈溢添液皮膚流遍四支所
以通身腫也。僧深方治通身水腫大小便不利方 常陸根三升
薄力赤小豆一斗凡二物水一斛煮取一斗稍飲汁食豆以小
便利為度。又玄治大水面自身體年足臂腫方 大戟分
草根三分 茯苓一分慈花一分凡四物治下節以小麦粥服
方寸匕良効。范汪方治身體流腫心下脹滿短氣達安
飲食方 大豆一斗以水三斗煮之令得一斗七升去滓內一斗
好酒合煎之令得一斗七升服一升日三經心方寫肺湯治身

面目浮腫方

未亭歷彈丸

大棗廿枚

水三升者乘

取汁一升半去乘內亭歷者取一升預服之得至五服若

帶水氣者先服青龍湯一劑乃服之今案醫門方亭歷子禹
大棗廿枚水三升云々

張仲景方青龍湯四治支疼痛面目浮腫方

麻黃半斤

去草根細辛二兩

干薑二兩

半夏二兩

洗

丸四物切以水八升

滿樞氣不能動搖乘根白皮湯方

素根白皮切二升桂

一尺生薑三顆

人參一兩

几四物切以水三斗煮取乘根

得一斗絞去滓內桂人參生薑黃飴十兩煎之竭得七升服

外消息更服今案本草桂一尺重半兩為正

醫門方療遍身腫脹小便澀方

菖蒲八丁名子二兩

藜蘆如泥

大棗廿枚

去核

以水一大斗煎取一小升絞去滓內亭

止丸如梧子空腹頓服令盡當利一二行

丸分二服亦効

治十水腫方第廿

病源論云十種者青癰赤癰黃癰白癰黑癰懸癰風

水
瘀石瘀裏瘀氣瘀也青瘀者先從面目腫遍一身其根在肝赤瘀者先從心腫其根在心黃瘀者先從腹腫其根在脾白瘀者先從肺腫其根在肺黑瘀者先從足趺腫其根在腎懸瘀者先從面腫至足其根在膀胱瘀者先從四支起腹滿大目盡腫其根在胃石瘀者四支小腹腫獨大其根在膀胱裏瘀者先腹滿其根在小腸氣瘀者乍盛乍虛乍來乍去其根在大腸皆由榮衛否濁三晦不調府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小便黃濁也今案諸方十水之名各不一品方十水九治水腫方同主治之藥多以異

腫從頭起名爲白水其根在肺杼目主之腫從胸起名爲黃水其根在脾甘遂主之腫從面起名爲青水其根在肝大載主之腫從腹起名爲氣水乍實乍虛其根在腸光花主之腫從股起名爲黑水其根在肾玄參主之腫從面起至足名爲懸水其根在膀赤小豆主之腫從內起堅塊四支腫名爲石水其根在膀胱棗根主之腫從四支起腹腫名爲風水其根在胃澤漆主之腫從腹起名爲冷水其根在小腹巴豆主之腫從胸中起名爲赤水其根在心亭歷主之右十種隨其

病始所在增其所主藥一分巴豆四分去心皮治末合下
蒜蜜丸服如梧子三丸得下為度不下日三匕可作
散末食服半錢上大便利明朝復服如法再服病愈
即禁飲食但得食于寔可又去水散治水腫方先從
脚腫名曰清水其根在心亭厯子主之先從陰腫名曰勞
水其根在腎澤漆色之先從腹腫名曰苓水其根在大腸蜀
枳主之先從面目腫名曰氣水其根在肺橐根主
之先從手足腫名曰心水其根在小腹巴豆主之先從口脣
腫名曰薰水其根在胃大戟主之先從腸腫名曰欬水其

根在肝茺花主之先從腰腫名曰肝水其根在華甘
遂主之先從胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之先從
從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之右十物分等
主十水隨腫所從始案方偏加藥二分合搏下蒜空腹
以水服方守之當下水多者減服下少者益之范汪方
治十水丸方第一之水從先從面目腫遍一身名曰青
水其根在肝大戟主之第二之水先從心腫名曰
赤水其根在心亭厯子主之第三之水先從腹腫名曰
黃水其根在脾甘遂主之第四之水先從脚腫名曰白

水其根在肺 菖蒲本主之

第五之水先從足趺腫名曰

黑水其根在腎 運翹主之

第六之水先從面腫至足名曰

玄水其根在膀胱華主之

第七之水先從四肢起腫滿

大木身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水四支小其

腹腫獨大名曰石水其根在旁光末根白皮主之

第九之水從腸滿名曰果水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛乍去名曰氣水其根在大腸赤

小豆主之九十病藥皆主之分等所病形同倍之治合

蜜丸如小豆先食服一丸日三飲下病服三丸人弱者以意算

之治宿食流飲寒熱濕病禁辛菜暗室生寘不禁就之

僧深方治身體浮腫十水散方

芫花三分 決明三分

大戟三分 石韋三分

去毛 巴豆三分 去心澤泻三分

鬼臼三分 甘遂三分

亭歷三分 凡十物治一葛以大麦

粥清汁眼方寸匕量

治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又
與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如裹水之狀按

腫上凹而不起骨革疼痛而惡風是也

小品方慈豆洗湯治虛熱及石熱當風露卧冷濕傷肌

小品方慈豆洗湯治虛熱及石熱當風露卧冷濕傷肌

熱疽在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小便不利大便難四支腫如皮囊盛水晃如老蟹色僵硬腫如斗莖腫生瘡如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕損脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支竟以葱楨脾胃故也內依方服諸利水藥外宜以此湯洗四支豆膏傳之別以猪蹄湯洗陰莖創爛處及孕腫也

葱合青白切一斤蒺藜子一斤春碎赤小豆一斤
子一斤春碎荳蔻切五斤巴豆一百枚合心皮打碎
右六物以水一石二斗煮取八斗以淋洗身瘡處葱烹膏猪

蹄湯方在本方又玄亭歷子迺神清治風水通身洪腫半
宗如裂者服之小便利自隨消方 春時釀清酒五斗
一方五斤亭歷子三斤茲薯酒中漬再宿便服一合以
漸增之病去小便利腫自消減皮縮也神良有驗若不能
得春酒餘極好酒亦佳 樣要方治風水毒氣通一身
腫方 猪白皮三兩 來根白皮五兩 橘皮一兩
紫蘋二兩 生薑四兩 大豆三斤 右以水九升煮取
一大升分四服三副百日內忌鹹醋 經心方治風水大豆
煎生桑根白皮細切三斤入土一天者大豆一斗二味以水

六斗煮取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合
弟一服日三夜一以知爲度又玄牽牛丸治脚腫滿步行
不能衆惡毒水腫方 大黃二兩 朴消三兩 奉牛子
七兩 姜杖人二兩 去全故予薑二兩半 人參二兩 橘皮兩半
右七物搗下筛以蜜和春方杵脹如梧子廿九以葛利爲
度腫昂心不差盡刮之者万毒万病廿八種風耶恙愈
用甚驗禁冷水猪宗子 僧深方治風水腫癰癧 當
陰消方 常イシキノ木 當陸根一升切凡一物以淳酒二斗漬三宿服
一升當下者減後半升起曰三不堪消者以意減之

又玄治通身腫皆是風虛水氣 身 治累腫痛蒲黃消方
蒲黃一升 小豆一升 大豆一升 凡三物清酒一斗煮三升
分三服 老婆方治人風水氣面俱腫上氣腹脹不能
食臘臘在床一經時不老者方 小豆三升 大麻子三升
搗碎以水研汁 杞根白皮一斤合煮豆熟食豆飲汁
即大下水昂差 イエ 蘭散本草注煮熟食之主水浮
腫又方服鴨肪食鴨頭主之水腫 又方桑灰汁煮大豆
飲之下水腫 水 治癰癧方第廿

病源論云癰癧由飲水漿不消水氣結聚而成癧在於兩

腸之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是以癰者
者謂癰側在於脇間故受名焉 効驗方云可服諸下
藥寫之 玄感方灸扶脊兩旁各卅壯 又方灸兩乳下
一夫助間二穴 新錄方杏人作前或作九酒脹如來三
又方灸桃人准上 又方單熬大麥孽為散服如上
本草經水研草麻子廿枚服吐惡沫也

治身面卒腫方第廿三 痘源論云身面卒洪腫者
曰癰水病之候也脾虛不能制水故水流溢散於皮膚
令身體卒然洪腫 范汪方治卒腫大戟洗湯方

大戟四兩 菟草二兩 苜蓿二兩 大黃二兩 黃連二兩
芒消二兩 亭厯二兩 皂莢二兩 凡八物皆㕮咀水一斗
五升煮得一斗絞去滓洗腫上日三 又云治諸卒腫一
風掣痛方 末芥子溫湯和塗水卒上以枯棗復易
不堪其痛者小塗之已試良 僧深方治累腫方
破鷄子搘令其黃白塗腫上棗復塗大良
又方大豆平搘搘飲汁食至不過三服良
落手方治累腫方 搗亭厯子薄之兩三過昂消葛
葛氏方治卒腫身面皆洪大方凡此腫或是虛氣或
是風冷氣或是水飲氣此方皆治之 用大鯉魚一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食。莫勿食飯及鹽或他
餚也不過再作便愈。^又又方大豆一升熟煮漿飲汁食豆不
過三作必愈。^又小豆半升又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆
內酒八升更煎取九升分三四服。腫卷後渴頑不可多飲
又方灸足內踝下白宗際三壯。又云治腫入腹苦滿急安飲食方
寧歷七兩 枸目三兩 伏苓二兩 吴茱萸二兩 槲蜜九如梧子
服十九日三。又方大戟 烏扇木各二兩 槲肺蜜九如梧子
二丸當下。又云若腫從脚起稍上進者入腹則致人治之方
生豬肝一具細切頓食勿与鹽乃可用苦酒可。又方煮豉汁

飲之以淳薄脚 治犯太腫方第廿四

病源論云犯太之病由居住之處穿鑿地。太犯觸太氣而致
病也令人之肌寒頭面遍體盡^腫氣急也。謂之犯太。新錄方
云以水脹伏龍肝方寸匕此主犯太氣兼腫大好本草拾遺云
藥有同類相伏者不伏水立服去以此案之以鼠壤土裹壓在
腫上可善 治黃疸方第廿五

病源論云黃疸之病此由涓食過度府藏不和水穀相并
積於脾胃傷為風濕所搏瘀結不散熱氣鬱乘故食已
如飢令身體面目爪甲及小便盡黃而欲安卧若渴而疸

醫心方卷十
三十五
者其病難治疽而不渴其病可治蓋於陰部其人

必嘔蓋於陽部其人

都其又根寒而發也元上七分葛氏方云黃病有五種謂之分
黃汗黃疽穀疽酒疽女勞疽也又云治黃疽一身
面目悉黃如橘方生第根一把細切以猪安一斤合作
羹盡食今案范汪方治年六十以上一服金又方搗生麥苗水和絞取汁服三
杵小麥勝大麥今案范汪方不和水范汪方治黃疽茵陳湯方茵
陳蒿六兩大黃二兩文子十四枚凡三物水一斗二升先煮
茵陳蒿減六升去滓內大黃文子煮取三升分三服之

小品方治黃疽身目皆黃皮膚趨塵出三物茵陳湯方
茵陳蒿一把文子十四枚廿本草書石膏一斤凡三物以水八升煮
取二升半去滓石膏一斤猛火燒令赤投湯中沸定
清取汁適寒溫服一升汗出乃愈又千金方治黃疽
身體面目皆黃三黃散方大黃四分黃連四兩黃芩四兩三分
味未先食服方寸匕曰三今案范汪方九如梧子服十九又本草拾遺去藥有同類候者身黃服黃物
錄驗方治黃疽大小便不利面赤汗自出此爲表虛裏
實大黃湯方大黃四兩黃芩四兩文子十五枚伊六
消石四兩凡四物切以水一斗煮得二升半去滓內消右腹

煎之得二升分再服得快下乃愈。又方蕪菁子五升一
末服方寸匕曰三

醫門方療黃病身體面目悉黃如橘由暴熱外以冷迫
之熱因流入胃中所致方文子人三兩 桔梗二兩 茯苓二兩
龍膽三兩 大黃三兩 摩節蜜丸飲服。世九日三加至五六十九
廣潘方療五種黃方 丁香七枚 化帶七枚 赤小豆七枚
爲散取暖水一鷄子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方搗杞合小麦煮勿令腹破熟而已曰食糲
枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈。灸黃疸法

鐵漿
取諸鐵

於器中
以水浸之
既久色
青沫出

葛氏方灸脾愈百壯。穴在第十一椎下。又方灸手大陰隨年壯。穴在半
兩旁一寸半。又方灸手大陰隨年壯。穴在半指端。

又方灸錢孔百壯。穴度乳至脊中風筋頭骨是。

又方灸胃管一百壯

穴在鶴尾脊中已上。千金方小品方同之。范汪方灸吞上下兩邊各一寸半二百壯
治黃疸六十以上。僧深方灸茅七椎土下。主黃汗。又方屈手大指

灸募上理。各七壯。又方灸脊中椎七壯。經心方灸兩手心

各七壯

僧深方同之

今案可服叱梨勒丸紫雪紅雪等

治黃汗方第廿六

病源論云黃汗之病身體洪腫糞熱汙出不渴狀如風

水汙染衣心黃如麋汁此由脾胃有熱汙出而入水中着浴

水入汗孔得之。醫門方療黃汗之病狀。如風水其

脈沉遲皮膚冷手足發厥面目四支皮膚皆腫胸中

滿。方夕藥八兩桂心三兩黃耆五兩苦酒五合以水七升

煮取三升飲一升心當煩勿壅至六七日即差今案葛氏方夕藥

水二斗方苦酒二升治穀疸方弟芒病源論云穀疸之狀食畢

心動不安而驚心搏鬱不安而發黃由失飢大食冒氣衝煙所致

扶加及意不歸也遺也

眩心搏鬱不安而發黃由失飢大食冒氣衝煙所致

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩芩子二七枚煮取二升分濁當去黃汁僧深方

治穀疸寒熱不可食。昂頭眩心中搏冒不安大茵

陳湯方茵陳蒿二兩黃芩二兩大黃一兩甘草一兩人參一

兩玄子十四枚黃連一兩凡七物切水一斗煮得三升分三服

治渴疽方茅廿八

病源論云夫虛勞人若飲涓多進穀少者則胃內生熱

因大醉當風入水則身自發黃心中懊痛足脰滿小便

黃面萎亦班若下之久變為黑疽面目黑心中如敗

元蘇瘻狀大使正黑皮膚凡之不仁其脈浮弱故知之涓

疽心中熱欲嘔者當吐之即愈其人必小便不利其後

當心中熱足下熱瓦合是其候明也

千金方治飲酒食少飲多滯結糞黃疸心中懊惱ヲ郁而不甚熱或于嘔オキル枳實大黃湯下之方 枳實九枚

大黃二兩豆豉半升
支子十枚右四味以水六升

煮取二升分三服今案葛氏方大黃一兩
枳實五枚支子七枚豉升范汪方治飲酒

得黃病方

糜生麦以井華水絞取汁頓服三升先食

曰三有驗

僧深方治湏疽方

生艾葉一杷 麻黃二兩 大黃六分 大豆一升
凡四物清濁三升煮二升分三服艾葉無生用
干半杷

治女勞疽方第廿九

病源論云女勞疽之狀身目皆黃糞熱惡寒少腹滿急小便難由大熱而交接ノミ竟入水所致

千金方云黃疽日晡發熱惡寒少腹急體黃顏黑大便溏黑足心熱此為女勞也腹滿者難治ノミ之方消滑石石膏右二味分等治以大麥粥汁服方一

寸口曰三小便極利

則今案葛氏方有消石膏小品方有石膏無芩石范注方有芩石無石膏

醫門方療女勞黃穀糞方

苦參四兩

龍膽三兩

文字五兩擣蒜爲散以猪膽汁和如梧子以飲服丸丸

廿九日三治黑疽方第廿

病源論云黑疽之狀若小腹滿身體盡黃頸上黑足
若下墊大便黑是也夫黃疽消疽女勞疽久之多變成
黑疽

葛氏方治黑疽者多死急治之方

本作根鴉絞取汁預服一升至三時外項病當隨小便去不

去更服之

今案范汪方云黑疽甚困醫所不治之立愈

醫心方卷第十

醫心方卷十

志便銀
不前立後
令其落處
更與急

醫心方卷第十背記

李草云
擗折者
極大停
鼓便
悶甚中人
主腰脹

以上第廿六葉

醫心方卷第十札記

三頁上
一行
永
櫟
櫟
亂

四 **成檉** 案檉怨讐訛謂脫黑子而稱之也

行下一

肥膚肌即四行貞

行下七怒忌案如

寧謙加二五真上

芳窮分有脫

成少腹病源

或
五
行
甲
內

內訣十員上
二行

七味案方口六味
脫一味否則六味

七
十四夏之天仁
上八行若

老人此旨西前
俟再攷

上三行貞似貞

上五行知服欲
夏上令可凡令訛

行
作故

小食仁和寺少

行仁和寺序上

六頁盡夜和訛

盡仁
下三
今安和仁

停手 仁和寺卒

行

其其根

仁和寺卒無一其字

下

從

腸滿 仁和寺卒腸

行

果水

仁和寺卒作黑水

上

六行

病源論

云

仁加寺卒此下有勞虛則行出

行

如裹水之狀

仁和寺卒此下有脈動時狀

下

七

崧菜和

字

七行如裹水之狀脉動時狀

行

行

遍身

仁和寺卒遍作

寺卒

崧

八切五升

仁和寺卒五作一

上

五行

遍身

仁和寺卒遍作

作崧

八切五升

仁和寺卒

上

五行

遍身

仁和寺卒遍作

通

六猪白皮

猪

行

汁二升

仁和寺卒二作三

注

四行

去心

命熬仁和寺卒作去令熬三字

上

四行

大麻子

仁和寺卒作大麻子

七主

仁和寺卒之字不塗

行

一是以無以字

仁和寺卒行

四日三和

行

仁和寺卒之字不塗

行

仁和寺卒

仁和寺卒行

行

行

寺卒

三

行

矣桃人

仁和寺卒矣字

行

草麻子

仁和寺卒

行

行

作草

歷子案原卷亦作草

行

脾虛

仁和寺卒作腎

行

脾虛弱四字

麅子

後人改作草麻子

行

脾虛

仁和寺卒作腎

行

脾虛弱四字

世五夏

新鱗方仁和寺卒

行

不伏水土

仁和寺卒無水字

行

無水字

十五校

仁和寺卒五作二

行

五六十九

仁和寺卒九作兩

行

六丁

香

仁和寺卒七員上

行

暖水

仁和寺卒暖作暖

行

一錢七

仁和寺卒七作上

行

仁和寺卒

世七員上

筋頭骨

仁和寺卒筋助案助物之訛

行

如礬汁

仁和寺卒

行

若須

此下有其脈

下一得之成黃汗也五字

仁和寺卒作得四行

行

若須

一升

仁和寺卒世八員上

行

一行心中佛冒

案原作佛冒後塗改作冒說見一卷

行

行

中

世下七員上

行

蘖生麥

蘖訛

蘖

世下七員上

行

蘖生麥

蘖訛

行

行

行

行

行

行

