K-242

F
カ-100

觀證辨疑目次

頭痛 一ヲ　項背強 一ウ　頸項強 一ウ　身體強 一ウ　発熱 二ヲ　微熱 二ヲ
無大熱 二ウ　有熱 三ウ　身熱 四ヲ　煩熱 四ウ　潮熱 四ウ　往来寒熱 五ヲ
悪風 五ウ　悪寒 六ヲ　寒 七ヲ　厥 七ウ　厥冷 八ヲ　厥逆 八ウ　逆冷 九ヲ
不仁 九ヲ　汗出 九ウ　無汗及不汗出 十ウ　頭汗出 十一ヲ　身疼 十一ヲ
身疼痛 十一ウ　身体疼痛　骨節疼痛 十二ヲ　腹痛 十二ウ　腹中痛 十三ヲ
腰痛 十四ウ　胸中痛 十四ヲ　脇下痛 十四ウ　心下痛 十四ウ　心痛 十五ヲ　咽痛 十五ウ
呃 十六ヲ　吐 十七ヲ　乾呃 十七ヲ　呃吐 十七ヲ　噫 十八ヲ　噦 十八ヲ　下利 十八ウ
大便鞕 十九ウ　燥屎 廿ヲ　不大便及不通 廿ヲ　小便不利 廿ウ
小便自利 廿一ウ　小便数 廿一ウ　渇 廿二ヲ　乾燥 廿二ウ　煩 廿三ヲ　心煩 廿四ヲ
心中懊憹 廿四ヲ　煩燥 廿四ヲ　煩躁 廿五ヲ　心下痞 廿五ヲ　心下痞鞕 廿六ヲ
心下鞕 廿六ウ　心下悸 廿七ヲ　心下満 廿七ヲ　胸満 廿八ウ　胸脇満 三十ヲ

490.9
Kα-19
No.2888
RK 242
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日
富士川文庫
1510

短氣 三十ウ　少氣 三十一ヲ　腹滿 三十一ウ　脹滿 三十二ヲ　腹脹 三十二ウ　少腹滿 三十四ヲ
少腹急結 三十四ヲ　少腹堅滿 三十四ウ　少腹拘急不仁 四十四ウ
少腹弦急 同上　少腹腫痞 同上　讝語 三十五ヲ　上衝 三十五ウ
目眩及頭眩 三十六ウ　目瞑 三十七ヲ　喘 三十七ヲ　咳 三十八ヲ　身重 三十八ウ　水腫 三十九ウ
衄血 并 吐血 四十ヲ　下血 四十ウ　經水不利 四十一ヲ　狂驚 四十一ウ　発黄 四十二ヲ
不得眠 四十二ウ　攣急 四十三ヲ　拘急 同上　不得屈伸 四十三ウ　不能轉側 四十三ウ
起卧不安 并 卧起不安 四十三ウ　不得卧 四十四ヲ 終

○

観證辨疑

平安　吉益猷修夫著

頭痛

血氣上行所致也血不滞不為痛氣不通亦不為痛也有氣為主者有血為主者有血氣俱迫者由水血氣迫者

桂枝湯 表　四逆湯 裏　呉茱萸湯 内

右歴観諸症桂支湯氣為主故脉浮発熱汗出若劇者必衄氣盛而逐血也四逆湯血為主故脉沉発熱不汗出終致厥冷血滞而氣不能循也血為主者其脉逆也氣為主者其脉急也二方之病在表裏呉茱萸湯血氣俱迫故無熱汗不出病自

急者屬氣也增頼迫也

内上攻吐涎沫是其證也

麻黄湯表小柴胡湯裏也症闕　十棗湯内

右歴観諸症曰身疼無汗而喘曰心下痞硬満引脇下痛是水気之証而頭痛不為主由水気迫也

五苓散

右一方水竭血気迫水気行則自治非頭痛為主者也

項背強　頭項　身體強

強者血也有由気血迫者有血凝気不循者有由水血気滞或血気迫者

桂支加葛根表　葛根湯表　瓜蔞桂支湯裏

右歴観諸症桂支加葛根湯葛根湯二方由気血迫者也故悪風強在項背也瓜蔞桂支湯血凝気不循也故脉沈遅強在身体也凡強者血気為主者有几々之状可辨別焉

小柴胡湯裏　桂支去芍薬加茯苓朮湯裏

右歴観諸症曰脇下満是水気之症也小柴胡湯症由水血気滞也或身熱悪風水在外血気不暢也加苓朮湯由水血気急也発熱頭痛水在内血気外行此薬之所以異也

発熱

気欝結也熱気霧蒸外発按其身上不灼熱者為発熱也有自表発者有自裏発者有自内発者有陰伏而発者

桂枝湯　麻黄湯　大青龍湯　小青龍湯
五苓散　麻黄杏仁薏苡甘草湯　柴胡桂支湯
桂支去芍薬加茯苓朮湯　厚朴七物湯
黄耆桂支苦酒湯

以上表証発熱也　曰悪寒　曰悪風　曰頭項強痛　曰身疼　此皆表証発熱也　圭支主之

小柴胡湯　大柴胡湯

以上裏証発熱也

小承気湯　調胃承気湯　大承気湯

以上内実発熱也　内実発熱者無表裏証有大便之変　此其候也　大黄芒硝主之

猪苓湯　梔子柏皮湯　大黄牡丹湯　消礬散

以上血症発熱也　血症発熱者曰大便黒暗溏　曰少腹腫痞　是所以異于実熱也

麻黄附子細辛湯　四逆湯　附子湯　真武湯
大黄附子湯

以上陰症発熱也　右歴観諸症　其脈浮　曰悪風　曰悪寒　曰頭項強痛　曰身疼　是表証発熱也　桂支主之　呕而無表証裏症発熱也　柴胡主之　無表裏症有大便之変者内実発熱也　大黄主之　其脈沈或弦　先発熱而後発諸症也　曰手足厥冷　曰身体疼痛　曰身瞤動　是陰症而非桂枝之治也　附子主之

微熱者熱之微者之　或曰発熱或曰　陥熱者之微　○　也無熱微中其　単症以是其方

微

微　微熱者非謂熱之微也　論中依寄誌處方　謂若此症微有熱　則此方主之　唯詳明也

小柴胡湯　五苓散　四逆湯　大承気湯
右歴観諸症皆裏症而属身熱也

無大熱者当無大熱之意二微熱者或有大熱或有微熱之意也故無大熱者必無大熱而有微熱之意也

○無大熱

無大熱非全無熱之謂即微熱也不言微熱者論中論症之勢明当有大熱而無大熱者也

白虎加人参湯　麻黄杏仁甘草石膏湯　越婢湯
乾姜附子湯　大陥胸湯
以上諸方皆微熱之意而属身熱也

○有熱

唯謂有熱者廣指之辞是亦属身熱也

黄連湯　大承気湯　調胃承気湯　抵当湯
白虎湯　桂枝湯　梔子豉湯

以上諸症虽属身熱者多是論也

○身熱

身熱者裏症也其熱無翕々之状按胸腹則如灼唇口必乾燥也手足不熱假令虽熱必有休止也迫而身熱者石膏主之外囊而身熱者柴胡主之血滞症発作有時也而削頸而還症於実事多有之也

梔子豉湯　梔子乾姜湯 属方
以上気急而身熱者也
白虎湯　白虎加人参湯　白虎加桂枝湯
以上逆而身熱者也
小柴胡湯
右外囊身熱也

右歴観諸證身熱者腹中不熱無水結之状及大便之変也

煩熱 煩熱者虚熱也心中手掌足心熱也煩者不可奈何之状也

三物黄芩湯　八味丸　梔子豉湯　小柴胡湯
小建中湯

右歴観諸證曰婦人在草蓐曰悸衄曰失精

潮熱 実熱也古今釈潮熱曰熱如潮信以時来也然則日晡処発熱以時来也何以分伏熱古今名也容矣若以時命之則何不云汐熱非潮信之義可以知也歟按夫潮也者取充実之義也海水潮則海隅江曲穴中岩間無所水不充満也潮熱之発則身体手足胸背腹中無處熱之不充満也故曰潮熱者実也有潮熱者水走于外作身重作腹満作短気不能発熱遂致潮熱故汗多則其熱不潮以水未実也其水未実則必発熱調胃承気湯證是也其所挙潮熱者小柴胡湯大陥胸湯大小承気湯而方中各有逐水之薬観者察焉

大承気　大陥胸湯　柴胡加芒硝湯　小承気湯
小柴胡湯

右歴観諸證潮熱者大黄芒硝所主而有枳実甘遂柴胡之類逐水之薬也水気血気倶実也

往来寒熱 寒熱者身体固有之熱也邪気往于内則為寒正気来于外則為熱故云往

未寒熱而不云寒熱往来水気外襄而血気不暢
之証也

小柴胡　大柴胡湯　柴胡桂支乾姜湯

右歴観諸症有外襄者有外行者外襄者呕而無頭
汗先見表症而後有寒熱外行者頭汗出而不呕
先見裏証而後有此症是其別也虽発熱不汗出
必胸服満是水気外襄而血気不暢之症也

桂支湯条特挙悪風悪寒蓋気主而急欲散血実温者悪寒気急与湯而不能発散而悪风非悪者則不見二症附子附之悪寒者気塞而血仔者又物之白悪思以血

○悪風
気爵而未発散之症也

桂支湯　桂支加葛根湯　麻黄湯
桂支加附子湯　桂支附子甘草湯

右歴観諸症曰悪寒曰頭痛曰項背強曰身疼曰
風湿皆表症而悪风者桂支主之

小柴胡湯　白虎湯　越婢湯　防已黄芪湯

右歴観諸症小柴胡湯白虎湯虽裏症以表未解
致此悪风也曰項項強曰表裏倶熱可以知表未
解也越婢湯防已黄芪湯曰一身悉腫曰身重此
以表有水而気来（発歟）致此悪风也此水気主而自汗
無気逆之状也
右四方曰手足温而渇曰大渇舌上乾燥而煩曰
自汗出皆無気逆状故不用桂支也

○悪寒
悪寒ゝ気难行之症也有気虚而悪寒者有気逆而悪
寒者有裡有伏熱而悪寒者所以気难行者一
也

附子湯　芍薬甘草附子湯　四逆湯
附子瀉心湯　桂支去芍薬加附子湯
四逆加人参湯
以上気虚血滞者附子主之

所謂逆而悪寒者者逆而逆物血気不和而血滞者之

桂枝湯
汗出悪寒無熱者血気急症也陽明篇桂支湯是也悪寒発熱汗不出者外裏之症也不可不察焉陽明病脉遅汗出多微悪寒又曰産後中風云々頭痛発熱
以上気急血滞者也桂支芍薬主之

大青龍湯　白虎湯　白虎加人参湯
以上気逆伏熱者也

大黄牡丹湯　葵子茯苓散　消谷散
以上血滞気不得行是非主症也
右歴観諸症曰少陰病口中和曰発汗後曰下之曰吐利曰脉微而利是気虚之症也附子主之曰乾呕曰心下悶気逆之症也主支主之曰煩燥曰口燥渇心煩曰身熱而渇是熱気伏於裏之症也石羔主之

悪寒者気欲伸而不能伸之症也寒者所在深而気閉血欲伸之意故不審悪之

寒
閉気之症也病人意知之無其形者也

大建中湯　柴胡姜桂湯　理中丸　通脉四逆湯
乾姜黄連黄芩人参湯　四逆湯
以上気逆而寒者也

附子粳米湯　大黄附子湯
以上気虚而寒者也
當歸四逆湯
以上血閉気而寒者也
右歴観諸症曰呕曰吐気逆之証也乾姜主之曰身体痛曰切痛曰服下偏痛気虚水滞之症也附子主之乾姜症者虽有不痛無呕吐附子証者虽有呕吐無不痛也不呕不痛者当歸主之是其別也

○厥

厥者欬也説文曰欬逆気也所循環之血気断絶自失血色劇則冷也冷与寒有別冷指人按之覚其冷寒者病人意知之按之不冷者也

通脉四逆加猪膽汁湯　甘草乾姜湯　白虎湯
四逆湯　通脉四逆湯　橘皮湯
右歴観諸症血気逆所致者乾姜主之水気逆所致者生姜主之何以知之吐利者血気逆之症也噦者水気逆之症也否〻之厥外裏而閉非気自然逆者故裏有熱而無呕吐下利之症也汗出而厥者気虚之症也附子主之以異其処在而虽兼症異所以気逆者一也

○厥冷　厥之劇症也

四逆湯・烏頭湯　呉茱萸湯　瓜蒂散
右歴観諸症曰下利曰大汗曰自汗出而気虚者

附子主之曰下利煩燥而血氣急所致者呉茱萸
主之曰脈左緊曰心中満而水氣外裹者瓜蒂散
主之

○厥逆 氣逆最甚者也當冷而不冷者何甚則逆極而
氣復外行所以不冷也
通脈四逆湯 四逆湯 白通加猪膽汁湯
烏頭湯 赤丸條云寒氣厥逆 症闕
桂支茯苓五味甘草湯
右歴觀諸症其劇於厥冷者以脈絶乾嘔或面色
赤或翕然如醉有上逆症也或腹痛或下利而乾
嘔則乾姜附子主之腹痛而不乾嘔無上逆之症
則有附子而無乾姜面翕然如醉無腹痛下利等
之証則乾姜而無附子是其別也

○逆冷、氣逆之証也厥冷者氣逆上行也
逆冷者氣逆不上行也
烏頭桂支湯條曰腹中痛逆冷
白虎湯條曰下之則額上生汗手足逆冷
右歴觀諸症氣虛而裏無熱者附子主之氣逆而
裏有熱者石羔主之不厥不上行故無乾姜也

○不仁 裏血滞氣不
行之症也
黄耆桂枝五物條曰血滞云々身体不仁
烏頭桂支湯條曰寒疝云々手足不仁
八味丸條曰脚氣上入少腹不仁

白虎湯條曰三陽合病云云口不仁
右歴観諸症氣急而血滞者黄芪主之曰血痺不
冷不偏是其症也氣不循血滞者附子主之曰寒
症曰偏曰冷是其症也血氣倶滞者石羔主之曰
身重難以轉側曰手足逆冷是其症也

汗出

汗出者水氣外出之証也有自表
出者有自裏出者有自内出者
圭支湯　桂支加葛根湯屬方　桂支加附子湯屬方
越婢湯　防已黄芪湯
以上表氣急而汗出也
五苓散　茯苓甘草湯屬方　黄芪圭支苦酒湯
白虎湯　白虎加人参湯　桂支加黄芪湯

甘艸附子湯　十棗湯　麻黄杏仁甘草石羔湯
葛根黄連黄芩湯
以上自裏起而出者也
大承氣湯　大黄硝石湯　小承氣湯
大黄牡丹湯
以上自内起而出者
大烏頭煎　四逆湯　通脉四逆湯　附子瀉心湯
通脉四逆加猪膽汁湯
以上陰症也
右歴観諸症自表起者曰発熱曰悪寒曰悪風其
自裏起者曰渇曰小便不利曰喘曰下利其自内
起者曰大便必鞕曰大便已鞕也帯厥者此陰症

之徵也氣急而汗出者石
羔主之脱而汗出者黄芪主之實而汗出者大黄
主之陰症而汗出者附子主之

無汗及不汗出 水襲氣之候也曰無汗者水滯而無可汗之状也曰不汗出者汗將出未能出者也

麻黄湯　葛根湯　大青龍湯
以上表水也
桂支去芍薬加茯苓朮湯
以上裏水也
右歴観諸症表水者身疼或喘也桂支麻黄主之
裏水心下満或小便不利也茯苓朮主之

防已黄芪ノ脱汗

頭汗出 内頭汗出者血氣攻而不結胸之候也

大柴胡湯　柴胡姜桂湯
以上水氣外裏也
茵蔯蒿湯　梔子豉湯
以上水氣急上行也
右歴観諸症曰往来寒熱者是外裏証而氣上攻
頭汗出者也柴胡主之無外裏証氣急上攻者梔子
豉湯主之

身疼 表疼騰也水滯而氣血欲行不能行之候也疼者按之徹而不移其所在

麻黄湯　蘇黄加朮湯　麻黄杏仁薏苡甘中湯

以上表水外裏而氣逆之症也
桂支加黄芪湯
以上血氣自裏迫表之症也
右歴観諸症自表裏而逆者無汗也麻黄主之自
裏出而急者自汗出也黄芪主之

身疼痛　曰身体者裏位而病在血分血
滞而氣不能行也

桂支附子湯　四逆湯　真武湯　附子湯
右歴観諸症疼者血滞而氣不暢故致煩而不為
寒主用附子而桂支佐之痛者氣脱而血不行故
必煩而不為煩也主用附子而人参佐之疼痛者
血滞不循氣逆不暢也主用乾姜而附子佐之

骨節疼痛　曰骨節者痛最及于裏
者也

麻黄湯　烏頭湯　桂支芍薬知母湯
以上疼痛無汗者也
甘艸附子湯
以上疼者也
柴胡桂支湯　白虎加桂支湯
以上疼煩者也
小建中湯属方　虚労云ゝ　四支痠痛　以上属上
右歴観諸症疼痛無汗者必用麻黄汗出煩疼者
必用桂支疼而痛者有桂支而不用附子痛不疼
者有附子而不用桂支也

腹痛 裏

腹痛者血滞氣難行之症也有由水而痛者有血滞氣急而痛者有氣逆血迫而痛者

大承氣湯　厚朴三物湯　枳実芍薬散

以上満痛由水者也

大烏頭煎　真武湯

以上血滞氣急之證也

通脉四逆　桃花湯　大建中湯

以上氣逆血迫之症也

桂支加芍薬湯 屬方

右歴観諸証由水而痛者曰満痛曰煩満是其候也枳実主之血滞氣急而痛者曰脉沉或弦曰自汗出曰発熱曰頭眩曰四支沉重是其候也附子主之氣逆血迫而痛者曰厥逆曰乾呕曰呕曰上衝曰便膿血是其候也乾姜主之

腹中痛

曰腹中痛者其所在最深也有血氣倶急而痛者有血滞氣急而痛者有氣脱血滞而痛者有水氣外裏而痛者

小建中湯　桂支加芍薬湯

以上血氣倶急之症也

当帰建　当帰芍薬湯　芎帰膠艾湯

以上血滞氣急之症也

烏頭桂支湯　烏頭湯　附子粳米湯

以上氣脱血滞之症也

小柴胡湯　柴胡桂支湯　四逆散　黄連湯

以上水気外裏之症也

右歴観諸症曰急痛曰自痛曰裏急曰攣瘀血気倶急之症也桂支茯苓主之曰疼痛曰刺痛曰漏下皆血滞気急之症也当帰主之曰吐曰咳曰卒痛留飲閉血気之症也半夏枳実主之曰逆冷曰手足不仁曰不得轉側手足厥冷曰腹中寒是気脱血滞之症也附子主之附子之証必寒也当帰之症必熱也

腰痛

腰痛者裏位也痛者気欲行不得行之候也着有血滞而気不得行着有気急而血滞着有気急而水滞着有水滞而気逆着有気不行而水滞着也

八味丸　当帰建中湯

麻黄湯　苓桂朮甘湯　桂支加黄芪湯

右歴観諸症曰拘急曰刺痛此血気急而所致之証也曰少腹不仁曰不能飲食者其毒在裏也血滞気急之症当帰主之小便不利者血気不循之症也地黄主之曰身疼重者其毒有表也黄芪主之曰身疼者表水閉血気之証也麻黄杏仁主之曰冷痛者血気逆而水滞血分之症苓朮逐水甘桂逐其気也

胸中痛

胸中者裏也毒疼飲而気急者又有気逆者有血凝気逆者有気急血滞者

瓜蔞薤白白酒湯　十棗湯　調胃承気湯

右壁観諸症曰喘息是水气外囊而痛也瓜蔞薤白々酒湯主之曰咳煩者有留飲而血气急也十棗湯主之欲主胸中痛者血气上攻也調胃承气湯主之

脇下痛

脇若水之所在也

小柴胡湯　大黄附子湯

観察此二條曰胸滿者此水气外囊之症也小柴胡湯主之曰発熱脉緊弦是血气急之症也大黄附子湯主之

心下痛

心下固有水之処也故心下痛者皆由水所致也

十棗湯疑前部之可与者乎

大柴胡湯　大承气湯

以上水气上攻之症也

十棗湯　大陥胸湯

以上水气結実之症也

桂枝去芍薬加苓朮湯

右水气停滞之症也

右壁観諸症水气上攻者枳実主之曰硬満曰否鞕曰鞕痛者水气結実者甘遂主之曰満微痛小便不利者水气停滞也苓朮主之

心痛

瓜蔞薤白々半夏湯　桂支枳実生姜湯　走馬湯

備急円　梔子豉湯　梔子大黄豉湯
甘艸粉蜜湯　大建中湯
右歴觀諸症曰胸痺不得卧曰諸逆水氣在胸則枳實半夏主之留滞于上者半夏主之自下迫者枳實主之曰腹脹者水氣在腹則巴豆主之曰身熱曰熱痛熱氣迫于心者梔子主之甘艸粉蜜湯由蚘虫所致者非其主症也

咽痛

曰咽中痛者必有痰飲曰咽痛者氣与血之変而已

甘草湯　桔梗湯　苦酒湯　半夏散　猪膚湯
通脉四逆湯 屬方

右歴觀諸症氣逆而所致者甘艸主之血滞而所致者桔梗湯之有痰飲而所致者半夏主之第下利血氣迫而所致者此非主症猪膚湯通脉四逆湯主之

嘔

吐者氣逆之症而其病在胸也由留飲氣迫而致者或有氣逆而有留飲者或猶有氣特迫而致者或有氣逆而致者也

小半夏加茯苓湯無吐之症當出吐噦部

小半夏湯　小半夏加茯苓湯　柴胡桂枝湯
小柴胡湯　黄芩加半夏生姜湯　大柴胡湯
葛根加半夏湯
以上有留飲氣迫者
半夏瀉心湯　苓甘姜味辛夏湯
以上有水而氣逆者

梔子生姜豉湯　四逆湯　大建中湯
以上氣逆者
呉茱萸湯　真武湯
以上氣自迫者
猪苓湯　白虎加桂支湯 属方
以上吐非主症也
右歴観諸症曰胸脇滿曰腹痛曰煩曰硬滿曰支結有留飲而氣急者也半夏生姜主之曰腸鳴曰胃氣逆而有留飲者半夏生姜主之曰心中懊憹曰胸滿曰小便不利或咳氣急而所致者生姜主之曰見厥曰腹中寒氣逆而所致者乾姜主之

吐

吐者血氣自腹上攻者也

大黄甘草湯　調胃承氣湯　茯苓沢瀉湯
茯苓飲　五苓散 属方　甘草乾姜湯　呉茱萸湯
乾姜黄連黄芩人參湯　四逆湯
右歴観諸症吐食者大黄主之吐水者茯苓沢瀉湯主之血氣迫者生姜主之血氣逆者乾姜主之曰手足厥冷曰悪又吐下之氣逆而所致者乾姜主之曰渇曰滿而不能食曰煩躁欲死血氣急者生姜主之

乾嘔　乾嘔者裏症也有氣逆而致者有氣迫而致者

呉茱萸湯　橘皮湯　小柴胡湯　桂枝湯

十棗湯

以上気逆而所致也

通脉四逆湯　白通加猪膽汁湯

以上気逆而所致者

右歴観諸症曰悪寒曰頭痛曰硬備気逆而所致也生姜主之曰下利曰厥曰心下痞硬有気逆之状者乾姜主之

嘔吐

嘔吐者有留飲而血気逆者有血気逆而留飲者

乾姜人参半夏丸　黄連湯　附子粳米湯

大半夏湯　大柴胡湯　小柴胡湯　小半夏湯

右歴観諸症如大柴胡湯小半夏湯由水而血気逆者半夏生姜主之曰妊娠曰腹中痛曰反胃血気逆之状而有留飲者半夏乾姜主之

噫氣

噫者血気逆心下而飲食不下者

生姜瀉心湯　旋覆花代赭石湯

右曰心下痞硬者血気逆之症也人参以治痞硬半夏以去其水生姜以逐其気也

噦

噦者水気逆之症也

橘皮湯　橘皮竹筎湯　小半夏湯　小承気湯

右歴観諸症自胸中起者橘皮生姜主之自心下

起者小半夏湯主之自腹中起者小承氣湯主之
皆有水氣迎之症也故命中有此水則噦或嚥而
腹滿見其前後之症也

下利

下利者裏症也氣不行而水下降也氣脫而不
行者乾姜附子桂支主之氣急而不行者黃芩
主之熱実而不行者大黃主之

白通湯　四逆湯　真武湯　通脈四逆湯

右歴観諸症曰脈微曰厥曰厥冷曰脹滿曰清穀
是氣脫之症也附子主之

黃芩湯　六物黃芩湯　甘草瀉心湯　桃花湯
葛根黃連黃芩湯　生姜瀉心湯　大柴胡湯
乾姜黃連黃芩人参湯

右歴観諸症曰呃曰心煩曰乾呃曰乾噫食臭曰
喘而汗出曰食入口即吐曰呃吐曰呃吐而下利
皆所氣急之症也黃芩主之

小承氣湯　大承氣湯　調胃承氣湯

右歴観諸症曰譫語曰口乾燥曰心下鞕曰脈遅
而滑是熱実之症也大黃芒硝主之

桂支人参湯　白頭翁湯

右歴観諸症二條曰腹熱利曰熱利是為熱所逐
而所致也故曰利下曰下重而不曰下利也

呉茱萸湯

右血氣急而所致者故厥冷煩躁是非乾姜附子
之類亦非黃芩之類

甘遂半夏湯
右宿水自利者也故曰利反快曰心下續堅滿此
其徵也以上四條特曰利而不曰下利示其所以
異也

大便鞕 水渇之證也
大承氣湯
以上熱實而大便硬也
小承氣湯 麻仁丸
以上熱少表裏有水大便硬也
小柴胡湯 桂支附子去桂加朮湯 抵當湯
右歷觀諸證曰手足戢然汗出曰潮熱曰多汗曰
小便數曰嘔不渇小便自利是水渇之徵也曰潮熱是
熱實而大便鞕也大承氣湯主之曰多汗曰小便
數者小承氣湯主之曰小便自利曰大便反易血
凝而大便鞕者加朮湯抵當湯主之

燥屎 未詳
大承氣湯

不大便及不通
大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯 大陥胸湯
抵當湯 走馬湯 小柴胡湯 厚卜三物湯
右歷觀諸證曰腹滿痛曰煩躁曰腹脹曰腹大滿

曰嘈曰從心下至少腹鞕滿曰臍下鞕滿此水氣上攻而大便不通之症也由于熱水氣竭者桒氣葦主之由于血而水氣竭者抵當湯主之水氣停滞者巴豆甘遂主之

小便不利　有水氣竭而不利者有水氣滞而不利者有熱結而不利者也

栝蔞瞿麥丸　猪苓湯　五苓散　柴胡桂支湯
桂支加附子湯　桃花湯　桂支加黃芪湯

右歴観諸症曰若渇曰渇不咽曰渇欲飲水曰煩燥曰下利不止曰発汗遂漏不止皆水氣竭之証也

葵子茯苓散　真武湯　桂支去芍薬加苓朮湯
苓桂朮甘湯　苓桂五味甘艸湯　甘草附子湯
四逆湯

右歴観諸症曰身重曰四支沉重曰短氣曰時又冒曰心下満曰微腫曰或咳或悸皆水氣滞之症也

大義二十湯脱十

茵蔯蒿湯　大黄硝石湯　大黄甘遂湯
柴胡竜骨牡蛎湯　小柴胡湯　越婢加朮湯
小青竜湯

右歴観諸症曰身黄渇引水漿者曰黄疸曰譫語曰往来寒熱曰黄腫曰発熱是熱鬱之症也

八味丸　茯苓戎塩湯　蒲灰散

右歴観諸症曰淋瀝曰少腹拘急此由血氣之変小

便不利者也

小便自利　自利者血気迫于内而不循環也

苓桂朮甘湯　桂支附子去桂加朮湯　抵當湯

小建中湯　真武湯　八味丸　白虎湯

右歴観諸症曰冷痛曰大便硬曰発狂曰消渇曰譫語曰眩皆血気迫之症也

小便数　小便数者有気盛而逐水者又有気逆而水自下者也

小承気湯　麻仁丸

以上気盛而逐水者也

甘草乾姜湯

右歴観諸症曰大便硬者気盛之症也曰心煩微悪寒曰眩而涎沫多者気逆而水自下之症也

渇　内津液竭之症也有曲熱水竭者有血液竭者有水竭而渇者

白虎湯

右曰表裏俱熱曰舌上乾燥而煩曰口乾舌燥曰身熱皆熱気伏而致此渇也石羔主之

茵蔯蒿湯　大陥胸湯

右曰発黄曰潮熱此熱気結水致渇者大黄主之

瓜蔞瞿麦丸　柴胡姜桂湯

柴胡去半夏加瓜蔞湯

右曰小便不利心下不満不悸少腹不満不見水

腫者是血液涸渇之症也栝蔞主之
五苓散　茯苓沢瀉湯　猪苓湯　八味丸
右歴観諸症曰発汗曰汗出曰吐曰咳而吧曰小便反多是水竭之症也沢瀉湯主之
小柴胡湯　黄芪桂支苦酒湯　生姜甘中湯
小青竜湯
右雖有渇是客症也而不為主無治渇薬也

乾燥

気盛而水竭之症也乾者易症也燥者劇症也燥者不目見之則不云之故大承気湯曰口乾燥白虎湯口乾燥又曰曰乾燥然則不可概也口舌曰燥咽胃中曰乾也有由汗吐下津液竭而乾燥者有熱而乾燥者有血液涸而乾燥者

白虎湯　大承気湯　大陥胸湯　己椒藶黄丸
右歴観諸症曰熱結在裏曰渇曰煩是熱結而作乾燥者
五苓散　苓桂五味甘草湯　生姜甘草湯
甘草乾姜湯
右歴観諸症曰下之曰多唾白涎沫不止曰吐逆是水気竭之症也
小建中湯　桔梗湯　桔梗白散
右歴観諸症曰悸衄曰失精曰吐膿是血液竭之証也

煩

煩者気為主有在表者有在裏者有在内者皆気欲発而不能発之症也有血滞而煩者有水滞而

白通加猪胆汁湯
脈乎

煩者有熱実煩者有虚煩者也

桂支湯
右血滞而煩者也

麻黄湯　小建中湯　小柴胡湯　瓜蒂散
大柴胡湯　十棗湯
右歴観諸症曰胸中煩曰心下急是病在于裏之
症也水滞而煩者也

調胃承気湯　小承気湯　大承気湯
内由熱実而煩者也
右歴観諸症曰大便溏曰大便硬曰燥屎是病有

梔子豉湯　梔子乾姜湯　酸棗仁湯
右歴観諸症曰虚煩曰大下之曰不得眠是病在
于内虚而煩者也

心煩　心煩者裏症也　有外裏気逆而煩者
有気急而煩者　有気自厥而煩者

黄連阿膠湯　猪苓湯
右気自然厥而煩者也故他無兼証黄連阿膠主
之

梔子厚朴湯
右気急而所致者也梔子主之

白虎湯　甘草瀉心湯　調胃承気湯
右歴観諸症曰背悪寒曰乾嘔是気逆而所致者
也甘草主之

小柴胡湯　柴胡姜桂湯

右外裏而心煩者也曰往来寒熱胸脇苦満是外裏之症也雖非主症外裏則気逆而煩甘草主之

心中懊憹 気攻心而所致也有結胸而所致者
有燥屎而所致者也

梔子豉湯　大陥胸湯　大承気湯

右歴観諸症心中懊憹者梔子主之他無兼症也曰短気曰心下因鞕此結胸之症也大陥胸湯主之曰有燥屎而所致者必心煩而心中懊憹大承気湯主之

煩燥 燥者乾也津液竭之症也

五苓散　桂支加黄芪湯　甘草乾姜湯

大陥胸湯脱乎

右歴観諸症曰大汗出曰従腰以上必汗出曰小便不利是津液竭之症也気急而煩燥者主文主之気逆所致也曰厥曰吐逆是気逆之症也

煩躁 躁者騒也気欲行而不能行血動者也

乾姜附子湯

右気欲行而不能行故有昼夜之別是其徴也

茯苓四逆湯

此條当有四肢厥逆之症方名可知焉以上気逆而煩躁也

桂支甘草竜骨牡蛎湯

以上血気逆而所致也曰因焼針者示血気之変

也

大青竜湯

以上水外嚢血気逆而所致也服茶水去則煩躁自止煩躁不為主也

呉茱萸湯　甘麦大棗湯

以上二方気急而煩躁者也曰頭痛曰乾呕是血気急之症也大棗主之

○心下痞　病在裏也痞者気不行也有自爵滞者有血滞而所致者有水滞而所致者也

瀉心湯

以上気白

半夏瀉心湯

精義　玄武湯与出少陰篇者廿
同其治茯苓也水以在血分表裏

○右血滞而所致也

小半夏加茯苓湯

右水滞而痞者也

右歴観諸症曰按之濡者水不聚血不凝也気自

滞者黄芩主之腸鳴者血滞之気不行也茯苓主之

心下痞鞕　痞鞕者血凝之症也

又有水滞而硬者也

桂支人参湯　生姜瀉心湯　木防已湯

甘草瀉心湯　旋覆花代赭石湯

以上血自凝之症也

小柴胡湯有脇下痞硬
而無心下痞硬之

十棗湯　大柴胡湯　小柴胡湯

以上水滞而所致者也

右歴観諸症曰下利曰雷鳴者水下降血自凝之症也人参主之曰利下曰引脇下痛曰呕吐是水滞而所致之症故主逐水而不治痞硬也

心下鞕 由水而血気倶急之症也有自表迫者有自裏迫者有自内迫者気不爵滞故硬而不痞

圭姜草棗黄辛附湯

此湯之所治或悪寒或不仁或手足逆冷而所致之者也是自表迫之症也

枳朮湯

是自裏迫者也

大承気湯

右曰下利曰脈皆平

甘遂半夏湯

曰下利曰續堅満是病在内位有留飲之症也

大陥胸湯

以上自内迫者也

右歴観諸症自表迫者曰悪寒曰不仁是表症也自裏迫者無表症心下卒堅是其症也

心下悸 水気動血之症也有津液竭而気逆而悸者有水気上攻而悸者有留飲而悸者

桂支甘草湯　小建中湯

以上気逆之症也

真武湯　茯苓甘草湯　苓桂甘棗湯　五苓散

以上水気上攻而悸者

小柴胡湯　半夏麻黄丸　小半夏加茯苓湯
以上留飲而所致者也
右歴観諸症曰叉手冒心曰煩曰衄是気逆之症
也桂支主之曰頭眩曰欬曰癲眩是水気上攻之
症也茯苓主之曰喜唾曰唾吐是留飲之症也半
夏主之気逆者用桂支固其主症也用茯苓者気
逆而水倶迫也故苓桂並用之真武湯之症因発
汗之変水独為患故不用圭也用半夏者由留飲
而気逆水去則逆自治故不用圭也気逆迫于血
分者一也故為気逆動血之証也

心下満　水結気之症也

小柴胡ノ無心下
満之症

大陥胸湯　十棗湯　甘遂半夏湯
以上水結血気者也
半夏瀉心湯　甘草瀉心湯　小柴胡湯
大柴胡湯属方
以上由留飲所致也
苓圭朮甘湯　桂支去芍薬加茯苓朮湯
以上気逆水迫之症也
右歴観諸症曰硬満曰硬痛曰堅満水結血気之
症也甘遂主之曰痞曰雷鳴曰不欲食留飲閉気
之症也半夏主之曰上衝曰眩曰小便不利有気
逆之症者苓圭主之

胸滿 裏症也有氣逆而致者有氣急而致者
有由水而氣逆者有氣急水迫者也
桂支去芍茱湯
右曰下之後者亦氣逆也是氣自然逆之症故無
兼症也
呉茱萸湯
右氣自急而所致者嘔吐曰胸滿者是氣急之症也
大㐮氣湯　厚朴大黄湯　茯苓飲
枳实薤白桂支湯　葶藶大棗湯 属方
以上四方氣急而水迫者也曰口禁口自吐出…
是水氣急之症也枳实主之
苓甘五味…利

云醫者咎他醫也今雖得下利以非其治莫力…尽利不止也

以上由水而氣逆也
桔梗白散　桔梗湯
以上由血而氣逆也
右歴觀諸症水氣逆者曰喘曰脹痛也由膿而…
逆者曰振寒々曰吐膿也桔梗主之

胸脹滿 裏水為主有囊氣者有氣逆而水
滞者有水聚而氣迫者也

柴胡姜桂湯 小柴胡湯
曰往来寒熱曰黙々不欲飲食曰心煩是水囊氣
之症也外囊則氣实故為熱而不雷鳴也

附子粳米湯
右氣逆而水滞之症也氣逆者為寒々而不見熱無

三十〇一·藥·炊 談

煩悸硬等之症曰腹中冷曰雷鳴是気逆而不治
実也
苓桂朮甘湯
右曰支満者支於呼吸者也不嚢不逆冒眩者水
聚而気迫之症也

短気裏 水気迫之症也

茯苓杏仁甘草湯　苓桂朮甘湯
以上二方曰胸中気塞曰有微飲是水気迫之[illegible]
也胸中塞自上閉而迫者茯苓杏仁甘草湯主[illegible]
自心下逆而迫者苓桂朮甘湯主之
十棗湯　大陥胸湯
以上二方曰心下悸鞕満水気実而迫者也甘遂
遂之自胸陥而及心下者大陥胸湯主之自胸下
及心下者十棗湯主之
栝蔞薤白々酒湯　大承気湯
以上曰腹満而喘水気自腹迫者承気湯主之曰
喘息咳唾背痛由疼飲而閉者栝蔞薤白々酒湯
主之
桂支芍薬知母湯　甘草附子湯
以上二方曰歴節疼痛曰骨節疼痛由疼痛而短
気者非主治也

少氣 水気脱之症也

梔子甘艸豉湯　竹葉石羔湯

右歴観諸症曰発汗吐下後曰虚煩曰虚羸是脱症也気急者梔子甘艸豉湯主之気逆者竹葉石羔湯主之

脹満　水気不行也

梔子厚朴湯　厚朴七物湯　小承気湯
大承気湯

右歴観諸症曰身重曰短気曰喘水嚢之症也枳実厚朴湯主之

已椒藶黄丸　茵蔯蒿湯　大黄消石湯

右歴観諸症曰小便不利曰口舌乾燥水気不行廍

然之症也不用枳実者非外嚢也

桂支加芍薬湯　白虎湯

右血気不循而水聚之症也曰時痛曰不可轉側是血気不循之症也此脹満非主症故不用遂気之薬也

脹満　水気聚之症也脹者作形満者不作形

血気不循水気聚之症也

厚朴生姜半夏甘艸人参湯

右血気走表留飲不消化因作脹満者曰発汗後者示血気迎于表也

四逆湯

右血気逆水聚致脹満者也此湯主之曰下利身

体疼痛者血気逆之症也

調胃承気湯

右血気迫于心水気不行作脹満者此湯主之曰吐後示血気迫于心也

備急円

右水気聚血気迫而致脹満者此湯主之曰卒痛者血気急之症也

腹脹

大承気湯　消蓄散　走馬湯

右歴観諸症病在血分水聚所致也曰少陰病曰心痛曰大便必黒是其症也脹而不満者水自滞也其脹者心大便不通也

少腹満

有由水而満者有由血而満者

小青龍湯　大黄甘遂湯　大陥胸湯

右歴観諸症曰小便不利曰小便難是由水満之症也

抵当湯　抵当丸　土瓜根散

右歴観諸症曰小便自利曰狂曰経水不利是由血而満之症也

少腹急結

気急而結血之症也

桃仁承気湯

右
少腹堅満水滞而血気不循環之候也
大承気湯
少腹拘急及不仁血滞而気不能行之症也不仁者易候也拘急者劇候也
八味丸
少腹弦急血気迫之症也
桂支加竜骨牡蛎湯
少腹腫痞血滞気不行也

大黄牡丹湯
右歴観諸症血滞気不循之症也曰如狂曰悪露不尽曰腰痛曰失精曰腹癰是其症也
譫語熱気攻心之症也
調胃承気湯
右主治譫語也故挙譫語一症而已
大承気湯
右熱実而有水気者主之曰潮熱曰微喘是水気之症也曰不大便曰有燥屎是熱実之症也
小承気湯
右水気竭而作実熱之状者主之曰発汗曰下利

曰喘是水走于外渴于内之症也非実熱之者故
不用芒硝以上三方熱氣急者也

白虎湯

右血氣不循熱伏而譫語者此方主之曰難轉側
曰不仁曰遺尿是血氣不循之症也

紫胡加竜蛎湯

右血凝滞而作熱実之状者此湯主之曰煩驚曰
不可轉側是血凝滞之症也異於白虎湯者胸満
而不腹満小便利而不遺尿有水氣之変也以上
熱氣上二方逆者也

上衝

氣逆不能外
発之症也

桂支湯　桂支加圭湯
以上氣逆而上衝者

葛根湯

右氣逆上衝而血迫者曰無汗小便反少曰口噤
不得語是血迫之症也

苓桂朮甘湯　苓桂五味甘草湯

右由水氣逆上衝者此方主之曰心下逆満曰小
便难時冒者是由水氣逆之症也

瓜蒂散

右水氣在胸而上衝者此方主之氣逆不為主故
無圭甘也

大建中湯

右脉中寒而上衝者此方主之此症亦非逆気故

無主支也

目眩及頭眩　眩乱視也水気迫之症也

頭眩者目眩之劇者也

葵子茯苓散　苓桂朮甘湯　真武湯　五苓散

小半夏加茯苓湯　沢瀉湯

右歴観諸症曰身重曰心下逆満曰胸脇支満曰

心下悸曰吃吐曰有水也曰支飲是由水気迫之

症也

甘草乾姜湯

右気逆而眩者此方主之曰遺尿曰小便数是気

逆之症也

桂枝加芍薬知母湯

右血凝気急者此方主之曰歴節疼痛是血凝之

症也

茵蔯蒿湯

右熱気迫而致者此方主之曰心胸不安久々発

黄者是熱気急之症也

目瞑

瞑者失明也血迫之症也曰必衄者

是血急之症也

麻黄湯

喘

喘者水在胸中

気不行之症也

麻黄湯　麻杏甘石湯　桂支厚朴杏仁湯

右表水逆于咽而所致者杏仁主之曰身疼曰悪風無汗曰発汗後汗出曰太陽病下之是表水逆于咽之症也

小青竜湯　小青竜加石膏湯　越婢加半夏湯

右裏水迫于咽而所致者半夏主之曰心下有水気曰乾嘔曰或渇曰或不渇曰目如脱状是裏水之症也半夏所治者咳而喘杏仁所治者喘而不咳是其別也

栝蔞薤白々酒湯

右疼飲自外冒者此方主之異於小青竜湯者有胸背痛之症此自外冒之徵也

畷語也穀者完穀糜爛也乞〻乞〻行作痰
此陰而非虚也
身疼痛曰身体者裏位也痰有血

葶藶大棗湯

右胸在水所致者葶藶主之曰胸満脹曰迫塞曰不得息是胸有水之症也

葛根黄連黄芩湯　木防已湯　大承気湯

右三方者血気之急而喘不為主也故無治喘之策也

咳

咳者水気在上之症也

苓甘五味姜辛夏湯　猪苓湯　真武湯

右水在血分而所致也茯苓主之曰手足厥冷逆曰手足痺曰下利曰四肢沈重此水在血分之症也

小青龍湯　越婢加半夏湯　小柴胡湯

右当飲所致者半夏主之曰乾嘔発熱曰上気曰

往来寒熱曰喜嘔是留飲之症也以熱上氣宗不
在血分也

十棗湯

右水迫干血分而所致者此方主之異甲乏者作
胸痛作煩是迫干血分之症也

桔梗湯　生姜甘艸湯　桔梗白散

右三方因血之変所致者咳不為主也此他在血
迫所致者或吐血或涎沫中帯血其症必咽中乾
是非水氣故不用逐水之薬也

身重

身重者表水滞之症也有外襄而水滞者有血
気急而水滞者血気不循而水滞者

大青龍湯

右一方曰脉浮後曰乍有軽時是外襄之症也

防已黄芪湯　桂支加黄芪湯

右二方曰脉浮曰汗出者是血気急之症也防已
黄芪湯者無裏症而桂支加黄芪湯者有煩燥小
便不利之裏症是其別也

大承気湯 属方

此症汗出身重血気急之症也而異於防已黄芪湯
者有短気腹満等之裏症而熱実也

葵子茯苓散　真武湯　苓姜朮甘湯

右曰洒淅悪寒曰腰中冷曰腹痛曰沉重此血気
不循之症也葵子茯苓散者曰洒淅悪寒而病在
表也真武湯曰腹痛下利而病在裏也苓姜朮甘

湯小便自利而病在内也
白虎湯、柴胡加竜骨牡蛎湯
右血気伏于内而不循環者曰煩驚曰譫語者血気伏于内之症也曰难以轉側者是血気不循之症也

水腫

腫者水気見于表也有自表起者自裏迫者也
自表起者曰身自裏迫者曰身體曰四支

越婢湯 越婢加朮湯
右曰脉浮曰悪風曰汗出曰不渇是水気走于表之症也加朮湯曰脉沉小便不利者虽見裏症是有自表迫于裏者故曰一身也

防已茯苓湯 防已黄芪湯
右曰四肢其々動曰腰以下腫及陰者是水気自裏見于表之症也麻黄所治之水着表而在于上防已所治之水着裏而在下是其別也

桂支甘草附子湯 桂支芍薬知母湯
牡蛎沢瀉散
右三方血気不循而水滞者也曰身体疼痛曰支節疼痛曰大病差後者是皆血気不循之症也故以治血気為主以水気不為主

衂血 并吐血

気急而逐血之症也

桂支湯 小建中湯 浮心湯 黄土湯 麻黄湯
右桂支湯者自表而迫者也故曰頭痛也小建中

湯者自裏而迫者故曰腹中痛也浮心湯者自
内而急者也故曰心氣不足自表裏逆而急者作
痛也主支甘草以治氣逆者茱以治痛也自内者
氣急而吐血者浮心湯主之自外逆所致者黄土
湯主之麻黄湯因水而氣逆所致者飲不為主故
以麻黄逐水飲自止也

下血

有血滞而下血者
有氣脱而下血者

芎歸膠艾湯　桃花湯　黄土湯

右歷觀諸症曰腹中痛者血滞而氣不循之症也
芎歸膠艾湯主之曰下利不止者氣脱之症桃花
湯主之自外迫所致之者下血或吐血或衄血也

黄土湯主之

經水不利

有血乾而不利者　有瘀血而不利
者有経閉而不利者也

大黄䗪虫丸　抵当湯　下瘀血湯　土瓜根散

右歷觀諸症曰羸痩曰肌膚甲錯者血乾之症也
腹満而不硬不能飲食者血乾不能消化故也大
黄䗪虫丸主之曰発狂曰少腹硬満曰善忘曰屎
雖難大便反易其色必黒曰消穀善饑是瘀血之
症也抵当湯主之下瘀血湯亦主之帯下帯滞也
行経中而滞変白物下或経一月再見者或陰癩
腫者経閉之症也経閉者肌膚自肥満土瓜根散
主之

狂驚　血攻心之症也

桂支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯

柴胡竜骨牡蛎湯

右歴観二方血気逆而迫者作狂驚作煩驚是竜骨牡蛎之所主曰胸満曰小便不利者是水気之症也水気血気倶迫者柴胡竜骨牡蛎湯主之血気独逆而迫者桂支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯主之

桃仁承気湯　抵当湯

右歴観諸症血自下部急者狂而不驚曰少腹急結曰少腹鞕満是自下部急之症也血為主者抵当湯主之気為主者桃仁承気湯主之

加木之二字脱乎

発黄

発黄者水気滞而瘀熱之症也有自表起者自裏起者有自内起者

麻黄醇酒湯

右自表起者主之

茵蔯五苓散　証闕　越婢湯

右自裏起者也当有渇小便不利等之症越婢加朮湯此症非黄疸也由水腫裏有熱而見黄色也

茵蔯蒿湯　梔子大黄湯　大黄消石湯

梔子蘗皮湯

右歴観諸症曰食則頭眩心胸不安曰頭汗出曰腹微満曰心中懊憹是自内越（起）之症也自内起而

氣急則梔子大黄豉湯主之自汗出熱不去則大黄硝石湯主之発熱而汗不出則梔子蘗皮湯主之

○消礬散

右血症而見黄色者主之他亦有举発黄之條皆非主証故不載焉

○不得眠 津液脱之症也

酸棗仁湯 猪苓湯

乾姜附子湯 梔子豉湯 五苓散

右歴観諸症曰虚煩曰心煩曰煩曰煩燥津液竭而氣急之症也曰発汗吐下後曰発汗後曰下利以示津液脱也

○攣急 血滞而氣急之症也

芍甘湯

○拘急 血脱而氣急之症也

四逆湯 八味丸 烏頭湯

以上脱症而氣急者也曰四支厥冷曰虚労曰厥逆是血脱之症也

當歸建中湯

右曰虚労不足者亦脱症也異附子者或刺痛或引腰背痛是血之症而不厥冷厥逆也

不得屈伸（血氣迫而不循環之症也）

圭支加附子湯　甘草附子湯　烏頭湯

右歷観諸症曰微急曰劇痛曰疼痛者血氣不得循環之症也

不能轉側（血氣逆而不循環之症也）

柴胡加竜骨牡蛎湯　白虎湯　圭支附子湯

右歷観諸症曰一身尽腫曰身重曰身体疼痛是血氣逆而不循環之症也

起卧不安及卧起不安（氣急者卧起不安血逆者起卧不安也不安者不能久之怵乍卧乍起也以心煩狂驚致此不安也）

梔子厚朴湯　桂支去芍薬加蜀漆竜骨牡蛎湯

不得卧（水氣迫之症也）

小青龍湯　八味丸

右歷観諸症曰倚息曰短氣是水氣急之症也小青竜湯者水主而氣逆故曰咳逆八味丸者氣主而水急故曰煩熱也

観證辨疑畢

十[illegible]國[illegible]本