

疳瘡秘錄




K 54-2

F
カ-108

490.9
Ka-21

No. 2548
IRK
54-2



富士川家藏本

富士川文庫

1520

宣川家藏本



疳瘡秘錄全



疳瘡

疳姑音耳

附楊梅瘡

結毒 便毒

疳瘡昂下疳也以下部陰莖生瘡疳蝕故名

下疳耳夫下疳者陰經頭口止下疳左右生瘡

如細粟粒或如豆粒或痛或不痛有腫有不

腫或寒熱溺淡而後漸々侵蝕膿汁淋漓潰

虧損終失陽物側癢則為便毒外癢則為楊

梅瘡內伏則結毒也唯由其他其形之異命

名而其本一也以多始於下疳故首論要又

青山求精堂
藏書畫之記

青山求精堂
藏書畫之記

瘡着龜頭後凹處者尤多。流着於陰囊者尤
為難治。後世稱囊癰者，李挺醫學入門陳實功皆是誰有至囊為
爛，李挺畢丸懸露而不死。外科正宗皆云不可治。又有膿
治名之曰脫囊。若死真癰者不可治。又有膿
痲之人，搗膿爛陰頭馬口，遂以成瘡及陰頭
溜膿貼視之時，睡中若不虞裡，獨起視去而
其竅膿粘着之處，刮剝為創，因成下疳者，王肯堂稱
陰頭瘡。始見于王壽外臺秘要又王肯堂證
又云：耻瘡，朱農婦人謂之陰蝕瘡。李挺為男
子一撞下

痔者非也。○按王肯堂曰：生於竅口為下痔。
瘡今但生於陰莖者皆為下痔。姑從之。凡下
部痔蝕者皆謂下痔。
何獨竅口哉？
有小兒患是證者，此其父母傳病之所致。蓋
原其所因，元是本於人身中瘀血也。既有一
滴瘀血，則正血漸々傳深，猶如渾清流也。
始但滯竅，軀中隨血隨而上下，以後絡流留
于體中，陰濕之地生瘡，痔蝕矣。得於乳抱者
間亦有之，又有因宿娼感氣傳染者，而非留
宿青樓者皆然。因其身元蓄瘀血，同氣相感

而生也。又有無外傳而自發者。此其體中所
固有之疾。血自發。陳實功所謂男婦陰器不
等而戒者。間亦有之。若謂此證全因是三
則非也。其他近世醫籍多說邪淫慾火。非必
皆然。便毒者。生於小腹腿膝合縫之間。結核
腫痛。潰如魚口。膿血臭爛。久難收口。方其未
發口也。世多好議。內消殊不知其已結核元
是瘀血濁液之所凝。聚結便僥倖退散。必復
在別處壅滯成窠。不得不發。不幸內伏後成
結毒者。比之而有。好肉消速愈之所致也。可

不慎乎。但矣。以娶毒發瘡。厚膿穢為佳。或曰
便癰。徐春甫古。今。便毒。言於不便處。患之故也。或
說近小。便處結毒。故也。並未得。的切。元是俗
呼。故無深義。△以瘡。發。似。與。口。故。諸。書。曰。左
為。臭。口。右。為。便。驕。馬。癰。又。曰。騎。馬。癰。其。云。左
毒。者。非。也。為。便。驕。馬。癰。又。曰。騎。馬。癰。其。云。左
亦。一。石。米。瘡。證。治。準。繩。曰。右。並。騎。馬。癰。其。云。左
外。疔。陳。實。功。外。科。血。疔。後。可。愈。也。云。一。石。米。瘡。此
醫。以。便。毒。血。疔。為。二。證。可。良。方。今。醫。統。外。科。經。驗
張。從。政。論。七。血。疔。而。其。下。音。俗。謂。昧。矣。此。雖。本。於
誤。矣。但。外。疔。血。疔。元。是。後。世。之。稱。非。可。用。之
又。曰。橫。痃。曰。外。科。正。宗。云。又。龔。廷。賢。種。杏。仙。方

臭泡或臭胞一作天泡丹毒亦名相混不可混
亦名臭泡然則此名與毒丹毒相混不可混
圖大風大風痘痘豆者多生滿面如鼓釘黃
痘屬風蟄疔賢普疫惡航云楊梅瘡者一大風
起以三不可名即與之癰時瘡外氣科正邪毒漆蟄
無與亦蓋音時興毒瘡也證治綿花瘡外科
準繩曰細小者稱癰豆瘡李挺曰癰如
綿花之為勝也難絕不若李挺曰癰如
果子瘡有黃頭瘡航曰類其像而俗呼之也或
結毒者謂因患下疳便毒楊梅瘡明耻穢惡
竊索速愈多用薰方嗅藥及水銀輕粉外敷

內服之劑以取暫時之快而其毒不能外發
遂以內陷伏藏結滯表裏上下皮肉筋骨關
節之間者也或有恙後過二三年者十餘年
而見以成害者又有俗溫泉取愈而後成者
溫泉者謂但馬州城嶺湯伊豫州道後及
諸稱魚瘡溫泉類非門所用溫泉也
又有其人元氣懦弱不能壯悍以外禦其毒
而毒氣留滯自成痼結者因父母及祖父母
傳健而嬰童之間已見諸患若至壯強始發
者或有本於小兒頭瘡諸惡瘡及臙疔瘡陰

癰腫痔漏而不幸變成結毒者其證而端
不可縷舉病於頭者謂結毒頭痛其證頭痛
如破連月不止晝夜不寐食減枯瘦或流鼻
出臭黃涕日久頭痛減者呼為腦漏若痛連
于目者後多失明凡頭痛非積于外邪者藥皆係結毒
病於目者謂結毒眼疾其證目痛血絲眵腫
瞳人有方樣久々釀膿潰蝕失明或青盲痼
於鼻者謂結毒鼻崩其始鼻中惡臭生小瘡
隱々而痛輕則山根山根即山根也墊重則鼻全落或有其

毒下陷止膠潰開漏孔者呼為膠漏病於咽
喉者有結毒喉癰結毒咽瘡結毒鼻痔三證
結毒喉癰者咽中腫痛飲食妨礙下辛鹹之
物則益刺痛終至咽門潰爛四成窠白膿汁
溜入胃脘痛不可忍臭不可近飯漿不通漸
糜漫潰旁及鼻竅喉門咽瘡鼻音二證並起
若不以治結毒之法治之則飲食癢而死矣
先醒者筆記曰倪仲昭患喉癰邑中治候者
遍矣喉漸々腐去飲食下馬銘銘曰未也又母曾患
口而咽每咽泣數行下馬銘曰未也又母曾患
毒也若少年曾患衝瘡子曰未也又母曾患

徵瘡乎曰然愈三年而得我銘韜以為牛必
誤服毒藥之故凡患此瘡者中寒涼輕粉之
毒發于身深者且延及子孫發毒之甥倘不
生毒女毒深者且延及子孫發毒之甥倘不
結毒之法治之必死既而詢之非昇某而何
果服凡藥而痊後曾口辟之非昇某而何
醫家恬然用之而不曉其中毒之深故特明
說○此本因瘡而非喉門之病猶咽痺說
痺也此由從古咽喉通門之病猶咽痺說
毒咽噎而以筆記先得我心後始從之而併
表其結毒咽噎者瘡生會厭漸糜爛利
蝕短小不能以掩氣道而水穀將錯入于喉
門故升氣衝突以出為咽噎也亦喉痛聲啞
水漿不得進下炙肉飢團類則不然也結毒

鼻音者毒瘡爛蝕懸癰之故蓋懸癰者口鼻
音聲之所分故閉口則懸癰前開喉息出于
鼻開口則懸癰後遮喉息出于口皆此類懸
癰之為屏障而隔分口鼻兩路之限也今伏
毒結于懸癰懸癰糜爛漸々剝缺短盡而止
故無口鼻兩路之隔而喉息溢出于鼻所以
作鼻音凡平人鼻聲者槩是天生懸癰短小
故耳痼於口者謂結毒口糜此因仗毒發于
口中糜爛掀痛或齒斷膿潰幾類牙疳膿汁

常出臭不可當狀如熱傷但比也熱傷無寒
熱候證而按癸辛雜志曰劉漢卿患牙槽風之
致而強毒命穿膿血淋漓此不知結毒之所
名陋哉

瘡於舌者結毒舌瘡是也此結毒中之一大
惡證哉或至于死世誤乎舌瘡非也其始舌
痛無定所赤爛焮腫潰缺如刺者不可忍或
舌心潰深陷成孔穴津液日夜漏脫飲食廢
而死者瘡於唇者結毒唇瘡是也其證或缺
或刺有痛有不痛缺者唇爛膿血出終及瘡

蝕刺者始如疣目若小豆若挑刺圓匾大小不一色紫黑皮堅厚殆類癰瘤後世名癰唇者疑是此毒時有血走不止或爲孔盞水流久年不愈者也痼於耳者有結毒聾其始其鳴如鐘鼓如衆人之咽喊漸々細音終至無聞又有始終鳴不止者想痰血結毒痼滯耳中縮括神竅故鳴猶指寒耳中掌掩耳門作衆鼓流水之遠響滯痰漸々腫起竅路宮細其絡腫塞內外不通音聲無聞而至于聾若耳出膿水者

不聾瘖於筋骨者結毒筋骨痛也此因瘀血
血惡水結滯于一身筋骨之間隨其所在發
為痛苦故證狀極多般有頭痛胸痛腹_脇痛肢
腋痛助_眇痛背脊痛腰痛肩痛肘痛臂_膊痛腕
掌痛手指痛臀痛腿股痛膝痛脛痛胫痛足
跟痛足指痛跟痛及眼痛鼻痛口痛咽喉痛
陰莖痛大槩一身有痛多是結毒須問認精
詳其頭眼鼻口咽喉陰莖痛已見于前胸痛
世多誤冒腕痛此證非積_疝所為則必是結

毒其他肢腋助_眇項背脊腰肩臂腿股痛皆
同此例結毒腹_脇痛所稀有其證腹中變痛須
參考餘證子細分辨肩肘臂_膊腕掌手指痛
其毒之瘡於手者也有則俱間亦持患一處
蓋肩之使肘肘之使腕腕之使指次身而然
其所重在肩与肘故其痛亦多着在其證肩
痛似腕不舉不能提物肘痛屈伸不便臂_膊
腕懈惰如痿或痛不可觸掌中熱按之則痛
指痛不可撮物屈伸不利或屈而不伸_{有指}

屈而不伸者須或左或右或左右俱傳還者
診候分明腫者有不腫者有子氣證大類于此須精診
條腿股膝膕胛踝跟足心足指痛其毒永痛
於足者也有則俱有或持在一處蓋腰之使
膝膝之使趺趺之使指次第而然其所重最
在膝故其痛持多其證膝痛隱々慘々不可
言喻起坐平生至難升降階石則尤痛難堪
堪但坐則難立立則難坐由膝之屈伸不便
也若已立則步數里之路不為難者亦間有

之腿股內外裏心疼痛膕筋張痛胛膕踝跟
趺上足心及指痛而不利或不可近手腫
者腫骨突出為墳趺肉隆起股筋隴起不腫
者脚肉漸減柴瘦骨立攢鼻露出股膕削細
俱至終廢步起坐動不易或左或右或左並
病風毒脚氣大類于此診病於皮肉者結毒
漏是也此因惡血瘡癰水交結于一身皮肉
之間隨其所在治作漏瘡有頭癰項癰頭
癰胸膈膕膕癰背脊腰臀癰臍臂肘手指癰

起於手指或股陰脇腸筋肉腠皆因此毒
又有結毒欬嗽久欬吐痰喝々不止具勞狀
而脉不甚數者是也此因其毒在骨肉中肉
攻裏面使內氣暴發逆上也又有結毒泄瀉
大類疝浮此因其毒流于腸中腸中瘦弱不
能分利水穀也有欬浮兼發者若腸胃罷極
飲食不進則危矣有由欬吐血者其血色紫
黑凝固不散或吐升許而無害想是腸胃裏
面若腸胃外面有結毒瘰癧血滯蓋皮裏為一

大泡日久蒸極泡皮爛破或裂破由欬或否
忽然湧出從逆氣而上出于口也此唯吐蓋
瘰耳是以吐盡而無害若繼以新血者危矣
又有結毒勞欬此因結毒伏于一身爵極蒸
熱變成勞欬亦死證也又有人不覺何所由
但連日不寐無餘證有非積疝則必是結毒
其後變患頭痛或復發揭梅瘡又患便毒痔
瘡微瘡若痲瘡癰瘡之人外敷水銀輕粉等
或用薰方嗅藥或浴愈瘡溫泉溫泉乃已前

所音者。是瘡愈毒陷皮裏平然全身腫脹者。此謂結毒木腫不善用法則必危矣。又有結毒痔漏因結毒成痔漏者是也。凡痔亦瘡蓋之極醜藏而成者。本同此屬。故有兼病當世視患膿麻之徒。多是此屬。蓋下痔陰莖外生瘡而疳蝕膿麻陰莖竅中生瘡爛出膿及血。故今呼膿痔做內下痔。且膿麻日久真膿濁氣摩爛竅口遂成下痔者。比今而有則可見其同類矣。又曾患麻人後過數年而有結毒諸語。

大泡日久蒸極泡皮爛破或裂破由欬或否忽然湧出從逆氣而上出于口也。此唯吐蓋瘡耳。是以吐盡而無害。若繼以新血者危矣。又有結毒勞欬此因結毒伏于十身爵極蒸熱變成勞欬亦死證也。又有人不覺何所由但連日不寐無餘證有非積疔則必是結毒其後變患頭痛或後發楊梅瘡又患便毒疳瘡。瘡瘡若疥瘡。瘡瘡之人外敷水銀輕粉等或用薰方嗅藥或浴愈瘡溫泉。非吾門所用溫泉乃已前

所是瘡愈毒陷皮裏卒然全身腫脹者此謂
結毒水腫不善用法則必危矣又有結毒痔
漏因結毒成痔漏者是也凡痔亦瘡蓋之極
醜藏而成者本同此屬故有兼病當世視患
膿淋之徒多是此屬蓋下痔陰莖外生瘡而
痔蝕膿痔陰莖竅中生瘡爛出膿及血故今
呼膿淋做內下痔且膿淋日久臭膿濁氣糜
爛竅口遂成下痔斯比々而有則可見其同
類矣又曾患瘡人後過數年而有結毒諸證

則益足必證其因之不異矣凡婦人患下痔
便毒徵瘡及結毒者每少此由其月々倍水
通下瘀血惡水亦從而下無所滯蓄故也間
有疝者非皆然也又今人曾患便痔瘡徵瘡
後病瘡疾則結毒脫然而去此由瘡熱滾動
徧身之血液而瘀血惡水痼滯經筋者被那
甚熱推蕩將去氣隧一新室寒頓開也是俗
間槩知之事而古人未嘗到故併表季按結
名諸書雖存而未詳持陳實功外科正宗曰
結毒者薰火收過瘡毒而沉於骨髓也又有

不經薰捺見苗未久服藥不多肉毒未盡便
用點茶收斂爵過毒氣者亦能致之矣則先
從筋骨疼痛日從漸中則損傷骨無定處隨便
不可生癰於口鼻則崩梁缺唇雖瘡破形更相
癰於咽喉者更變聲音癰在子足者妨于行
走原來苦楚一生毒遺數代情關一錯禍起
百端莫此為明又案華廣瘡門其下附出結
毒此二書正丹王案得我心故表而出季又王
肯堂證治準繩曰又有餘毒亦名氣毒又王
疼痛來去不定亦名濕毒蓋本于當此邪通呼
止氣毒不結毒者蓋本于當此邪通呼
及俗間呼為濕毒者蓋本于當此邪通呼
為濕或意其氣濕證者皆張濕熱是豈濕寒之
可生乎在意高山深谷河濱海涯露木濕之處
此則在在可患是證而反無病者而居於通都
者槩皆可患是證而反無病者而居於通都

太邑平康乾燥之地者多罹此患則可見其
疾全足痰血惡汁所醞而非因於濕也彰
而明矣

治法土伏苓瘡家之聖藥是疾之尤不可缺者

大儿疳瘡便毒楊梅瘡及諸結毒宜必用土

茯苓而肉餌雞肉及卯或乾過月外浴但

刈城崎溫泉新湯者積日累月餌浴兼施

無不痊者勿索速効以致癆瘵俗間之土茯苓

故多服則乾沽津液此膏東野語而利木之藥

之何害夫有病而用藥藥入而病當之非謀其

其餘乎且土茯苓平淡其氣味未見其有

毒又云食雞肉而髮脫此最明之諸者世之
毛髮脫落者食雞肉皮即皆能生髮安在其脫
落也溫泉別有考證但世稱愈瘡者多是在其湯
而反呼瘡者皆悉好湯吾門所用諸之刻雖有
莫若但刻城崎溫泉號新湯者唯望世之多知
真好處其亦俗問州菜有呼下便毒者者此固
劫奪暫快之術而非按本清源之法皆是者不
其紹致瘡痼也可痛惜乎好生君子不可不慎
也
○按王肯堂曰凡患此證先宜食毒物以
之後服通聖散之類須用土茯苓對停服
此其謂食毒物以發之發之後用土茯苓對
甚可取乎但彼所謂毒物乃吾門平常所
說活血滋補美味即前所謂雞乾過臘魚
及諸鳥獸魚肉類是也可謂雞乾過臘魚
也亦不獨肯堂大凡宋明醫流皆不不知是
意宜乎今時粗工指美味為毒物可勝難
哉

附字辨瘡本與小兒瘡瘡走馬牙疳之瘡皆
食耳物多生瘡病而無他義竊疑此證未
何者牙疳下疳並是滯疾發作潰蝕而非食
耳之所致而小兒瘡疳亦就與蝕以命名其
如此則三證義可通用故今皆定為貴蝕之
義也瘡之瘡蓋在橫邊結塊如瘡之凝以
微即謂其色也又微梅同音故通用耳
解劑通治瘡癰瘰癧瘡膿麻痺痔漏諸惡瘡
及腫

大黃 四分
通艸 六分
五厘

其 草 少

茯苓 一分
貳分

芎藭 八分

右剉木八合煎取四升溫服外車前忍
加減口傳石劑加車前子壹酒生硬者入
銀補有千層癰證治準繩曰輕則發廣癰亦
疊不
後世呼鵝掌風者亦是多結毒鵝掌風見外
書又稱子心毒治準繩又有稱腎臟風瘡者
本是痲癰類證治要訣曰癰風因精未調外
起流注四收治準繩曰癰風因精未調外
臟風王皆堂鳴目痒鼻赤齒浮指縫白等症
為腎臟風瘡且引戴說而於癰風類證下又

曰兩腋如癰搔痒久則膿水淋漓或搔起白
皮者名腎臟風也何其自相矛盾此皆命各愈
多致紛亂又不愈類見徐春甫古今醫統云腋腿
生瘡經久不愈類見徐春甫古今醫統云腋腿
又有乞際瘍證治準繩曰或問小瘡至玉莖
作有三四窮黃木根痒極湯沃之稍止而復
也詢之幼時曾生要瘡旬日如後大腫痛甚飲
食少進之作
結毒治之
皆是痔瘡徵瘡結毒中之餘證至于婦人陰
瘡諸證亦曰治法不異于本證須分辦詳細
而施其方李時珍陰蝕瘡甚久潰爛成下楊梅瘡及
○李時珍本艸綱目云
楊梅風并服輕粉成筋
瘡痛癰瘻瘰癧疽

用之藥今按楊梅風即結毒何其名目多
端哉王肯堂證治準繩曰午心結毒煥赤腫痛
俗名病穿厚又名穿邊穿窠天蛇又名穿梗天蛇
偏於掌邊者名穿邊天蛇又名穿梗天蛇
證愈元煩雜尤甚

通仙五寶丹

凡人病人遇楊梅天泡棉花等瘡致成一切
荏苒之疾或楊梅爛見骨經年不收口者或
筋骨疼痛舉發無時或遍身疔瘡不消或手
足皴裂出血或遍身起皮發癢一層起一
層或生赤瘰白瘰鵝掌風癬或皮好骨爛

口臭難當又治久年膿瘡不愈一切頑瘡癰
瘰並皆治之此方第一要上等材料不可安
傳非人

鐘乳粉 方三

大丹砂 方二

琥珀 方半

水片 方半

珍珠 二厘半

右為細末每服五厘別入皂白霜二分半
炒過合作一服每一料分作十二貼每一
日用土伏苓一斤用酒煎作十二碗去渣

清晨以一碗入藥一貼攪勻溫服
其伏苓湯須一日服盡不可別用湯水并茶
日々如是服盡一料或十二日即愈或有不
終劑而愈者如病重須再服一料無不愈矣
百發百中忌雞鰲魚牛肉房事菜完不忘
○若珍珠有油者用豆腐一塊取竅入珠于
內蒸之取出油即去盡右洩世金書方
通仙五寶丹
治楊梅瘡及下疳濕氣

珍珠

中十分

以五厘

初

取出

二重

包豆腐

解

龍腦

一分

琥珀

一分

辰砂

四分

水

煮

取出

珍珠

解

鐘乳石

水

三分

飛白麵

炒

一匙

水

煮

取出

珍珠

解

右六味合二錢五厘細末十四貼分作早朝

一貼竅時一貼服七日盡服每服土伏苓煎

湯用二一之

土伏苓煎法

土伏苓四十目用水一升六合煎之滓水

一升二分入六合煎之朝夕リ之寢ル

時下飲盡之其法 早朝一椀粉茶ト一
同飲也 午時一椀 夕飲後一椀 昏時
一椀 寢時一椀粉茶ト一
右ノ茶欲服五日以前ヨリ黑豆煮汁晝
夜服之豆無味難食以醬油煮ヘシ豫メ
以黑豆要血浮而後用五寶丹下毒氣也
服茶ノ日ヨリ勻喫黑豆此茶服スルノ
間塩茶酒青物生冷及雞鵝牛肉等食ス
ヘカラス尤禁房事勿飲湯水

觀茶

○以下非後藤
家之方不可用

治楊梅瘡毒經年不愈骨節疼痛全身黑
瘦手足不遂奇効如神疾新者無効三四
年後ヨリ可用

鉛一錢用

沈一錢

參一錢

朱一錢

水銀一錢

全茗四錢

先茶研三朱鉛ヲ能研テ後外ノ藥ヲ入研
也右末茶ヲ如キリ艾紙包管ヲ鼻中入茶
火ヲ付管中ハ五分ハカヲ入取替左右鼻烟

鯁之管長五寸其間宜含冷水不然口中咽
喉爛破也芥ノ大廿如圖

以紙二重ニ包裹ニ粘テ合セ

目ヲ封一日一本ヲ鯁ル二日ハカリ鯁ハ
如瘡フルヒ熱頭痛往來ニ芥アタル涎多
一二日経テ吐血下血ス惡血多下ホト宜
強實ノ人モ二日鯁ハ必アリル三本ヲ三
日四日ニ鯁也咽白リ多血出大便下リ
終テ熱醒自愈其間不食ハリノ粥少食ス

病人甚疲ニ芥烟全身ニ滿凝滯ノ惡血悉
散スト可知若惡血少キ症ハ不下モアリ
然トモ瘡毒無不治久年ノ瘡モ必治血吐下
後熱左リ難キニ
清血湯

歸小 芎大 芎大 地中 連大
扼大 芎大

右ハ味水煎服若煩悶加莎○服葉間并本
後禁物大ノ如シ酒 胡椒 生姜

干雞 冬瓜 鱮 雉子 鰯 蛸

右凡品五十一日忌之 今已三千年大忌

沐浴三十日 灰身三十日

○說約云 反胃有因結毒者云云

○又云 治結毒久浮難止理中五苓浮心

等劑無効者必有因結毒者宜試用此方

家方 解毒劑 仗通忍大芎大黃各中

耳充大黃加枳實或加桂

