簡明婦人病論

安藤正胤譯

三

k 46

富士川文庫

495.1
Ka
2

F 2
カ-112

倉頡廟

東洛

495.1
Kd
2
No.2528
19 K 46

米國斯密私氏著
日本安藤正胤譯

簡明婦人病論

東京 爽然樓藏版

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月15日
富士川文庫
3152

簡明婦人病論卷之三

米國 斯密私氏 著
日本 安藤正胤 譯

第六編 子宮諸病〔不孕〕

〔其一、加答爾〕

子宮頸ヨリ蛋白揉液ノ漏泄スル病ニシテ毎常必スシモ子宮頸内膜炎ヲ合併スル者ニアラス

〔原因〕感冒、子宮頸充血、房事過度等ナリ

〔現症〕患者衰弱ヲ覺ヘ輕微ノ背脊痛ヲ兼ヌ

〔徴候〕白帶下

〔診斷〕子宮頸管或ハ子宮唇ノ赤色顆粒狀ヲ見ザルニ由テ子宮頸内膜炎ト識別ス

〔預後〕吉ナリ

〔治法〕軀體ヲ安靜ニシ强壯藥鐵劑規尼及亞鉛ヲ撰用シ第十二方(三)麥奴ヲ與ヘ第十方(三)又石炭酸ト虞里斯林ノ合劑或ハ沃顛ヲ子宮内ニ注射スベシ第四方(二)(三)

第十二方〔强壯藥〕

〔二〕規鐵亞丸　硫酸規尼、硫酸鐵、硫酸亞鉛各二瓦

複方健質亞那越幾斯二瓦ヲ取リ丸ト爲シ日ニ三次與フ此虛性白帶下ニ必要ナル丸劑ナリ

第十方〔收斂藥〕月經過溢或ハ子宮出血ニ用ユ

〔三〕麥奴水　流動麥奴越幾斯二十滴至三十滴　稀硫酸十滴至十五滴水一ヲ取リ混和シ用フ

第四方〔注射藥〕

〔一〕石炭酸注射　石炭酸、虞里斯林各一ヲ取リ混和シ之ヲ施ス

〔三〕沃顛注射　骨盤内膿瘡ノ條下ニ出ツ

〔其二、炎〕

〔甲〕子宮炎

子宮織質ノ炎証ニシテ他病ヲ合併セサル者ハ稀ナリ、

〔原因〕器械的傷害子宮ノ手術ニ於ケルカ如シ月經時ノ房事過度子宮内或ハ他ノ「ペッサリー」、塡子、子宮消息子ノ妄用等ナリ、

〔現症〕骨盤内ニ劇烈ノ疼痛アリ該部ニ汎ク努迫アリ苦楚堪ヘ難ク悪心嘔吐及下利ヲ發シ便通ニ由テ疼痛増劇シ且牽テ股部ニ及フ

〔徴候〕子宮上ヲ按壓スレバ大ニ疼痛アリ膣内ヲ

リ撿査スルニ平常ニ比スレバ低下シテ腫脹ス子宮口擴開シ子宮ヲ按壓スレバ忽チ痛ヲ發ス而シテ子宮頸内膜炎ヲ合併セサル者ハ膣内灼熱乾燥ス

〔診斷〕本炎ト骨盤内腹膜炎ノ別ハ子宮ノ動移スルト按壓ノ爲ニ痛ヲ覺フル部分ノ子宮ニ局ストニ因ル其蜂窠織炎トノ別ハ沈澱物ヲ關クニ因ル又子宮内膜炎トノ別ハ子宮ノ腫脹較〻大ナルト全身ノ現症較〻劇シキトニ因ル

〔預後〕二三週間持續ス其轉歸ハ消散スルアリ或

ハ膿瘡トナルアリ

〔治法〕患者ヲ十分ニ靜息セシメ子宮頸ニ蜆針ヲ貼レ卵巢炎條ニ出ツ琵布ヲ施シ阿片ヲ充分ニ用井緩和ナル食餌ヲ與フベシ

〔乙〕子宮内膜炎

子宮體粘膜ノ炎証ニシテ子宮頸内膜炎ニ比スレハ稍〻罕ナリ

〔原因〕瘰癧、衰弱、月經時ノ感冒、子宮頸内膜炎、消息子、塡子、及子宮内挿杆ノ損傷、子宮腫瘍、膣炎是ナリ

〔現症〕蛋白樣ノ白帶下アリ或ハ血液ヲ混シ月經不調トナリ又處女膜ノ障碍ニ由テ月經痛ヲ来スコトアリ背部、鼠蹊部及下腹部ニ疼痛ヲ覺ヘ且頭痛アリテ肚腹膨脹シ惡心嘔吐ヲ發シ姙孕スルヲ得ス

〔徵候〕子宮ノ形狀平素ニ比スレバ頗ル長ク消息子ヲ挿入スレハ疼痛ヲ覺ヘ次テ些少ノ出血ヲ見ルコトアリ又深ク按壓スレハ疼痛シ兼テ子宮口擴張ス

〔診斷〕現症及徵候ニ據ル

〔預後〕炎症初發ナル者、唯粘液或ハ血液ノミヲ漏泄スル者、子宮轉位セサル者、子宮延長セサル者、全身ノ神經作用變調セサル者、月經收止ノ時適キニ在ラサル者等ハ都テ吉ニ屬ス之ニ反シテ炎証慢性ナル者、排泄物ニ膿ヲ混スル者、處女膜ノ障礙ニ由テ月經痛ヲ發スル者、子宮ノ甚シク轉位スル者、子宮腔延長スル者、腟炎ヲ併發スル者、月經過饒ナル者等ハ皆凶ナリ、


〔治法〕本病ヲ療スルハ甚タ難シトス先ツ全身ノ健康ヲ保攝シ佳良ノ食餌ヲ給シ新鮮ノ大氣ヲ迎ヘ強壯藥鐵劑、規尼及酸類等ヲ撰用シ房事ヲ嚴禁スヘシ又塡子ヲ施シ次テ沃顛亞鉛、硝酸銀、發煙硝酸或ハ過硝酸汞ヲ外用スヘシ但シ硝酸銀ヲ貼スルニハ「ラロセロエスミス」氏ノ腐蝕揷入藥ヲ用フルヲ良トス又硝酸或ハ硝酸汞ヲ貼スルニハ先ツ少シク子宮腔ヲ擴張シ「プレーヱール」氏ノ消息子ヲ用テ腔内ヲ掃除シ然ル後右ノ腐蝕藥ヲ含メル他ノ揷子ヲ腔腔内ニ送入シ二三抄時間留メ置クヘシ此際中和液第一編ノ第四圖〔ロ〕ノ如ク子宮鏡ノ底面ニ中和液ヲ貯留

セシメ以テ腐蝕藥ノ他部ヲ用井腟内ニ腐蝕藥ニ侵蝕スルヲ防クナリ

ノ溢流スルヲ防クヘシ子宮頸蜂窠織新生肥大ノ條ヲ參看セヨ或

第五圖

「アッチル」氏子宮内鏡



ハ「アッチル」氏ノ子宮内鏡ヲ用フルヲ可トス第五圖

術家ニアラサレハ危殆ナリ然レモ藥液ノ漏泄注射ハ熟練セル施

ヲ預防シ之ヲ適當ニ施セハ良効ヲ得ベシ其藥劑ハ沃顛、石炭酸、硝酸銀、硫酸亞鉛、硫酸銅若クハ硫酸鐵此藥ノ可否決シ難シナリ又亂刺法ハ妄リニ施ス可カラス若シ之ヲ施スヤハ寔モ愼戒ヲ加フヘシ

〔丙〕子宮頸内膜炎

子宮唇及子宮頸管内粘膜ノ炎証ナリ

〔原因〕貧血、數回ノ娠娠、産後子宮ノ全ク故位ニ復セサル者、子宮轉位、房事過度、子宮内「ペッサリー」

〔現症〕背部、腰部ニ疼痛アリテ勞動スレハ忽チ増劇ス黯色ノ白帶下アリ月經ノ不調ヲ來シ神經衰弱、體力脫耗、交接痛ヲ發シ又時トシテハ惡心

嘔吐アリ

〔徴候〕子宮口頗ル張開シ子宮唇腫脹シ按壓ニ由テ子宮頸ニ痛ヲ覺ヘ蛋白揉ノ粘稠液ヲ洩シ其液時アリテハ暗黒色ヲ帶フ

〔診斷〕此病ヲ診斷スルニ方ツテハ須ラク先ツ其炎ノ子宮頸ニ限局スルヤ否ヤヲ監定シ且其蜂窠織新生肥大ヲ合併スルヤヲ點檢スヘシ本病ニ於テハ子宮内ニ消息子ヲ挿入スルモ子宮内膜炎ニ於ケルカ如ク疼痛及出血ヲ發スルコトナシ

〔預後〕吉ナリ然レ𪜈恢復ハ極メテ緩慢ナリ

〔治法〕全身ノ健康ヲ保攝スルニ注意シ新鮮ノ大氣ヲ迎入シ淡泊ノ食餌ヲ撰用シ緩性下藥或ハ強壯藥ヲ與ヘ温湯ニ虞里斯林若クハ阿片ヲ和シテ子宮内ニ注入スヘシ又塡子ヲ用テ子宮頸管ヲ擴張シ硝酸銀、沃顛液、石炭酸第五方(三)單寧、醋酸鉛、格魯母酸第五方(三)硝酸汞、硝酸等ヲ外用シ或ハ烙鐵ヲ以テ燒灼シ或ハ亂刺法ヲ施シ若クハ匙狀刀ヲ以テ發炎セル粘膜ヲ掻削スヘシ

〔第五方子宮頸外用藥〕

〔二〕濃石炭酸水　石炭酸九分水一ヲ取リ混和ス

〔三〕格魯母酸水　格魯母酸百二水一ヲ取リ混和ス、

〔其三、子宮唇顆粒炎〕

此病ハ子宮頸ノ偏唇或ハ兩唇ヲ被フ粘膜ノ顆粒狀ヲ呈シ毎常子宮頸内膜炎ヲ合併スル者ニシテ一般之ヲ子宮頸潰瘍又ハ潰爛ト稱ス然レ𪜈此名義ハ妥當ナラズ

〔原因〕子宮頸内膜炎、蜂窠織新生肥大、子宮内膜炎、子宮脱隆子宮ニ於ケル摩擦ヲ致ス房事過度、分娩等ノ如シ

是ナリ

〔現症〕饒多ノ白帶下アリ患者衰弱ヲ覺ヘ骨盤ノ周圍疼痛シ勞動ニ由テ其痛增進ス若シ他病ヲ合併セサル者ハ諸症劇甚ナラス

〔徵候〕子宮頸ノ面ニ觸ルヽニ剪絨ノ如キヲ覺ヘ子宮鏡ヲ取テ之ヲ檢スレハ子宮頸ハ赤色ナル夥粒疹ノ輪狀ヲ以テ周繞ス但此疹輪ハ鬆粗ナラス動モスレハ出血シ其上面ニハ粘稠ナル蛋白樣或ハ膿樣液ヲ被ムル又此顆粒面ハ潰瘍ノ如ク陷没セスシテ高隆スルヲ常トス

〔診斷〕右ニ論スル所ノ現症及徴候ニ據ル

〔預後〕吉ナリ然レ𪜈原因ヲ除去セント欲シテ久時ヲ經ルヿ屢〻之アリ

〔治法〕子宮頸新生肥大ヲ合併セサル者ハ十分ニ亂刺法ヲ施スベシ若シ此法須要ナルヲ見ハ大約一週ヲ隔テヽ數回反復シ然ル后發煙硝酸、過硝酸汞、濃石炭酸水、第五方(二)子宮内膜炎ノ條ニ出ツ沃顛、腐蝕加里等ヲ撰ミ輕々外用シ或ハ烙鐵「リヤルドソン」「コルヒヂヲシン」ニ「コルヒヂヲシン」寧ヲ溶解セル者ニ單格魯母酸第五方(三)子宮内膜炎ノ條ニ出ツ濃鐵液或ハ硝酸銀ヲ外用シ又或ハ虞里斯林及硫酸亞鉛第三方(四)醋酸鉛或ハ單寧第三方(五)ヲ取テ腟内注射ヲ施シ或ハ酸化亞鉛若クハ莨菪ト沃顛鉛第二方(三)阿片等ノ「ペツサリー」ヲ施スヘシ腐蝕藥ハ其度ニ過ク可カラス若シ顆粒ノ著シク挺出スル者ハ剪刀ヲ取テ切除スヘシ若シ又子宮頸唇廣ク裂傷スル者ハ破裂側ヲ截去シテ其緣ヲ縫接スヘシ

〔第三方〕注射藥

〔六〕亞鉛注射　硫酸亞鉛六十瓦　水一瓶　和ス

〔九〕單寧酸注射　單寧酸二百四一巴
混和ス　十八氏　水一巴ヲ取リ
印篤ヲ

〔第二方〕收斂「ペッサリー」

〔三〕沃顛鉛「ペッサリー」　醋酸鉛六氏　沃顛一氏　合劑
二十ヲ以テ製ス
氏

〔其四、眞性潰瘍〕

此潰瘍ハ限局セル凹陷ヲ成ス者稀ナリ

〔原因〕子宮脫墜及衣服ノ摩擦是ナリ

〔徵候〕子宮頸ノ面ニ於テ見ルカ如シ

〔治法〕子宮ノ變位ヲ復シ身體ヲ安靜ニシ衝動藥ヲ外用シ硝酸銀ヲ貼シ紅色洗滌液ヲ以テ洗フ

ヘシ此波ハ昇汞十八氏朱九氏結麗屋曹多六滴水八瓦ヲ成ル水ヲ加ヘ一瓦ヲ取リ淨水一瓦ヲ加ヘ以テ其用ニ供ス者ナリ而シテ此液一瓦乃至三瓦ヲ用フル所ノ紅色洗滌液ハ皓凡二氏複方ノ如シ

〔甲〕小囊性潰瘍

子宮ノ「アク子」或ハ「ヘルペス」若クハ「アプテ」共ニ疹名ナリ

〔原因〕子宮頸顆粒炎、子宮頸內膜炎、或ハ蜂窠織新生肥大等ノ原因ニ同シ

〔現症〕子宮頸顆粒炎ニ同シ

〔徴候〕此病ノ徴候三アリ第一子宮頸ニ小隆疹布滿ス第二隆疹破潰シテ小潰瘍ニ變ス第三隆疹ハ赤色ニ變シ出血シ易キ結核トナル

〔治法〕第一小囊ヲ針刺シ以テ其粘稠ナル蓄液ヲ漏スニアリ第二硝酸銀或ハ過硝酸汞ヲ取テ囊窩ヲ燒爍スルニ在リ

〔乙〕黴毒性潰瘍

此種ノ潰瘍ハ甚タ罕ナリ治法ハ尋常ノ下疳ニ同シ

〔其五侵蝕性潰瘍〕

子宮頸ノ眞ノ潰瘍ニシテ上面深ク陷没シ終ニ危險ヲ來ス者ナリ然レ𪜈真ノ癌腫ニ於ケルカ如ク迅速ナラザルモノアリ

〔原因〕未詳

〔現症〕疼痛劇甚ナラス羸瘦漸ク加リ初メ潰瘍ヨリ血膿液ヲ洩シテ後終ニ惡臭液ニ變ス

〔徴候〕瘍面深ク陷没シ暗赤色ヲ帶ヒ其周緣硬ク若干時間子宮ハ其近傍組織ニ固着スルヿナシ又膣部ニ妨害ヲ見ス

〔診斷〕本病ト他ノ惡性病トノ辨別ハ其發育スル

ノ遲除ナルト子宮ノ移動スルト限界セル滑緣ヲ具フルト緣邊ノ增生ヲ欠クトニアリ

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕腐蝕加里（子宮頸肥大ノ條ヲ看ヨ）蜂窠織新生或ハ烙鐵ヲ以テ潰瘍面ヲ燒灼シ或ハ單寧、沃顚若クハ石炭酸ヲ取テ膣内ニ注入シ身體ヲ安靜ニシ且滋養物ヲ與ヘ後阿片若クハ蒲魯母ヲ用フヘシ

〔其六、膿瘡〕

子宮壁ノ釀膿ニシテ或ハ罕ニ子宮炎ノ繼症ナル者アリ

〔原因〕炎証ヨリ不明ニ釀膿ニ移ルモノナリ

〔現症〕子宮炎ニ繼發スル病症ニシテ即チ釀膿惡寒、夜間體温ノ增盛ヲ發スル者等是ナリ

〔徵候〕子宮壁ノ彈力性腫脹ノ愈〻膨大スル者ナリ

〔診斷容易ナラス但シ該症ト囊腫トノ腫脹ノ別ハ現症ニ據テ知ルベシ

〔預後〕手術ノ及フ所ニ位スル者ハ吉ナリ

〔治法〕十分ニ截開スベシ

〔其七、子宮膀胱瘻瘡〕

膀胱ヨリ子宮（膣ニ連接スル部ノ上位）ニ開ク所ノ瘻管ナリ

〔原因〕經久ノ靡迫損傷膿瘡潰瘍是ナリ

〔現症〕子宮口ヨリ尿ヲ漏泄ス

〔徵候〕膀胱消息子ヲ尿道ヨリ挿入スルニ子宮ニ通シテ之ヲ觸知スルヲ得ベシ

〔診斷〕現症及徵候ニ據ルベシ

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕月經收止スル後子宮口ヲ鎖閉スベシ

〔其八、子宮外口狹窄〕

子宮口狹窄シテ恰モ小針孔ノ如ク、細小ナル消息子ト雖モ之ニ通スル能ハサル者ナリ

〔原因〕或ハ先天ニ係リ或ハ腐蝕藥ノ結果若クハ瘢痕ニ由ル

〔徵候〕閉塞ヨリ来ル月經痛是ナリ

〔治法〕先ツ患部ヲ切開シ次テ大ナル消息子ヲ屢〻挿入シ以テ創部ノ癒著ヲ防キ或ハ腐蝕加里ヲ以テ子宮口ヲ大ニシ而ル後癒合機ニ由テ再ヒ子宮口ノ狹窄スルヲ禦クヘシ但シ塡子ハ其効用十分ナラス

〔其九、子宮内口狹窄〕

子宮内口ノ狹窄セル者ナリ

〔原因〕或ハ先天ナルアリ或ハ子宮前屈ナルアリ
又或ハ子宮内膜炎ナルアリ
〔現症〕閉塞ヨリ來ル月經痛乃チ經水ノ來ル前二
三日間ハ恰モ靨下スルカ如キ疼痛ヲ覺ヘ屢〻子
宮前屈ヲ兼併ス
〔徵候〕子宮頸ヨリ消息子ヲ送入スルニ内口ニ至
テ停止シ强テ之ヲ通過セシムレハ月經痛ニ等
シキ痛ヲ發シ而メ消息子ハ狹窄部ニ於テ固着
セラルヽノ感アリ
〔診斷〕本病ト惡性病ヨリ起ル狹窄トノ區別ハ消
息子ヲ送入スルヤ抵觸スル組織ノ感覺ニ由
テ辨スヘシ
〔預後〕吉ナリ
〔治法〕塡子ヲ以テ狹窄部ヲ擴張スルノ法アリ然
レ𪜈充分善良ナル者ト謂フ可カラス何トナレ
ハ之ニ由テ一時擴張シ得ルモ再ヒ狹窄シ易ケ
レハナリ故ニ此病ヲ療スル最良トスル方法ハ
獨リ患部ヲ截開スルニ在リ乃チ先ツ子宮鏡ヲ
以テ狹窄部ヲ擴張シ然ル後直刀或ハ單刃子宮
刀ヲ取テ僅ニ其兩側ヲ截開スヘシ但此手術ヲ

施スニ兩双子宮刀ヲ用フルハ宜シカラス必ス單双子宮刀ヲ撰用スヘシ其故ハ兩双子宮刀ヲ以テ截開スルキハ深キニ過クルノ患アリ然ルニ單双子宮刀ヲ取テ之ヲ施セハ手感ニ依テ截開ノ淺深ヲ節シ易ケレハナリ此手術ヲ施スヤ速ニ擴張器ヲ強ク挿入スヘシ是レ施術後直チニ之ヲ施スキハ炎証ヲ起スノ危險較ゝ少ナキヲ以テナリ吾父ノ子宮擴張器ハ漸次ニ之ヲ擴大セシムル者ナリ但シ螺旋ノ裝置ニ賴テ毎手術ニ於テ擴張器瓣ヲ開キ以テ其創痕ヲ潤大ニスルニ由ル若シ此手術ヲ施スニ方リ劇痛ヲ發スル者ハ之ヲ中止シ毎日消息子ヲ挿入シテ患部ヲ擴開スヘシ尚ホ截開ヲ要スルキハ宜シク其術ヲ施スベシ子宮内口ノ截開術ヲ施ス後ハ創處ノ全ク癒ルニ至ラサレバ決シテ塡子ヲ挿入ス可ラス是レ腐敗ニ陷リ易キ患アレバナリ若シ初メヨリ塡子ヲ挿入セントスレハ截開ヲ施スノ前先ツ十分ニ子宮頸管ヲ淨潔ニスヘシ又擴張器ヲ用フルニ方リテハ漸次ニ擴張セシムルコニ注意スヘシ初メハ子宮頸纖維ノ僅ニ裂

傷スルヲ度トシテ而シテ後漸ク擴張器辨ノ開張ヲ
增加シ遂ニ以テ適度ヲ得ルニ至ルヘシ

〔其十〕子宮肥大

眞性子宮肥大ハ多クハ病的沈澱物ヲ合併スル
者ナリ

〔原因〕罕ニ先天ナル者アリ或ハ産後子宮ノ全ク
故位ニ復セサル者是ナリ

〔現症〕靡重及靡下スルカ如キ感覺アリ兼テ背脊
痛ヲ發シ或ハ白帶下ヲ患フ

〔徴候〕子宮腔延長シ動モスレハ脫墜シ易シ

〔診斷〕他ニ病的新生物ノ徴ナキト子宮ノ長徑及
重量ヲ確定シ得ルトニ據ル

〔預後〕恢復緩慢ナリ

〔治法〕先天ニ由ル者ハ療法絶テナシ若シ産後子
宮ノ全ク故位ニ復セサル症ニ由ル者ハ子宮腔
及子宮頸ヲ亂刺シ「プレー至ール」氏ノ消息子ヲ
以テ硝酸ヲ塗布シ內服ニハ强壯藥ニ麥奴ヲ伍
シ與フヘシ第十四方ヲ見ヨ

〔第十方〕收斂藥月經過溢或ハ子宮出血ニ用フ

〔四〕麥奴規尼水流動麥奴越幾斯二十滴至三十滴稀

硫酸十滴至十五滴硫酸規尼三氏水一ヲ取リ混和シ與フ

〔其十一、子宮頸肥大〕〔延長〕

病的沈澱物ヲ合併セサル子宮頸ノ延長ナリ

〔原因〕或ハ先天ナルアリ或ハ力作勞動過度ナル例ヘハ縫裁器ニ於テニ因ルアリ下肢ヲ勞スルカ如シ

〔現症〕背部痛ミ時トシテハ子宮内外口ノ狹窄ヲ兼テ月經痛ヲ發シ或ハ不孕トナリ或ハ絶テ何等ノ症狀ヲモ顯サヾルモノアリ

〔徵候〕子宮頸平常ヨリ較〻長クシテ圓錐形ヲ呈シ或ハ又脫墜シ易シ

〔診斷〕上ノ如キ徵候アルト患部ニ著シキ病歷トニ據ル

〔預後〕吉ナリ

〔治法〕切斷スルニ在リ

〔其十二、子宮萎縮〕

子宮非常ニ變小スルモノニシテ子宮ノ縮小スルノ過度ナル者是ナリ

〔原因〕先天或ハ産後子宮ノ萎縮ニ因ルモノアリ

〔現症〕月經貧少、不孕症ノ有無ヲ決シ難シ是ナリ

〔徴候〕消息子ヲ以テ檢査スレハ子宮管ノ異常ニ
短ナルヲ知ル
〔診斷〕前ノ如キ徴候アルニ據ル
〔預後〕凶ナリ
〔治法〕卵巢ヲ刺衝シ或ハ結婚セシメ或ハ瓦爾華
尼杆ヲ施スヘシ
〔其十三、子宮不具〕
子宮ノ全ク欠クルヿハ甚タ罕ナリ時アリテハ
此器ノ僅ニ發育スルモノヲ認ムルヿアリ
〔原因〕先天ニ係レリ
〔現症〕經閉是ナリ但シ卵巢ノ尚存在スル片ハ色
情モ亦未タ刪去セサルモノナリ
〔徴候〕觸診ヲ施シ膀胱脫内ニ消息子ヲ送入シ手指
ヲ直腸内ニ插入シ若シ須要ナル片ハ手ヲ送入ス以テ精細檢
査スルニ全ク子宮ヲ探知スルヿナシ
〔豫後〕凶ナリ
〔治法〕絶テ之ナシ
〔其十四、子宮癌〕
子宮ノ惡性病ニシテ諸種ノ形狀ヲ以テ發顯ス
其病性三アリ第一遺傳シ易シ第二局處ニ發顯

ス、第三繼發ノ疾患ヲ貽ス是ナリ

〔甲〕硬性癌

此病ハ稀ニ纖維素ノ過剰スル子宮ノ惡性病ナル者アリ其初メハ硬固ノ沈澱物ニ由テ起ルモノニシテ子宮實質ノ肥大即チ蜂窠織新生肥大ナルヲ診斷スヘキ顯症ヲ見ス若干時間硬固ノ狀ヲ呈スル後遂ニ破壞シテ陷沒性癌ニ變スルモノナリ

〔原因〕遺傳ノ素質ハ中年或ハ高齡數回ノ娠姙、精神抑鬱、營生勞苦是ナリ

〔現症〕初起ハ輕易ニシテ白帶下及出血アリ爾後疼痛骨盤ニ徹シ按壓ニ由テ更ニ痛ヲ覺ヘ月經過溢及子宮出血アリ或ハ惡臭ノ水樣液ヲ洩シ全身衰弱シテ後一種ノ敗液質ヲ呈ス

〔徵候〕眞ノ硬性癌ノ徵候ヲ顯ハス者極メテ罕ナリ子宮頸ハ一種固有ノ硬結ヲ成シ結節ニ類似ス此癌腫ト子宮頸ノ非惡性硬結トノ辨別ハ觸診ニ因レハ甲ハ組織ノ硬結ヲ其表面ニ觸知ス宛モ濕潤セル護謨ニ觸ルヽカ如シ然ルニ蜂窠織新生肥大ニ於テハ粘膜下ノ硬固ナルヲ覺フ

ルノ別アリ又顯微鏡ヲ以テ撿スレハ肉材蜂窠織及細胞ヲ見ルヘシ

〔診斷〕此癌腫ハ屢〻診斷シ難キコトアリ然レ𪜈能ク病歷ヲ考索シ仔細ニ硬固ノ摸撫ヲ按撿スレハ大抵鑒破シ得ヘキナリ

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕切斷スヘク疼痛ヲ輕減スヘク且ツ健康ヲ維持スヘシ

〔乙〕陷沒性癌

硬性癌ノ壞敗メ終ニ潰瘍トナル者ナリ

〔原因〕未詳

〔現症〕初起ハ屢〻痛ヲ覺ヘサル者アリ然レ𪜈其經過スルニ從ツテ劇痛刺スカ如ク下腹部ニ徹シ血撓膿撓若クハ水撓ノ惡臭液ヲ漏シ敗液症ヲ呈シテ肌肉脫耗シ皮膚淡黃色トナリ生力沈衰シ病勢ノ侵襲極メテ急速ニシテ近傍ノ組織ニ及フ

〔徵候〕子宮ハ固著シテ動カス子宮頸ハ多少裂壞シテ陷沒シ其周圍ハ不整ノ硬緣ヲ作シ窩內モ亦不正硬固ニシテ結節狀ヲ呈シ時トシテハ甚

タ破碎シ易シ

〔診斷〕良性潰瘍トノ別ハ子宮ノ固普スルト增大スルノ急速ナルト潰瘍面ニ一種固有ノ硬結アルト全身ノ現症トニ據ル

〔豫後〕凶ナリ

〔治法〕可及的潰瘍ノ窩内ヲ清潔ニ刮削シテ惡性面ノ發生ヲ防キ時々十分ニ烙鐵ヲ貼シ或ハ腐蝕加里若クハ蒲魯母ヲ塗シ深痂ヲ結ヒテ健全ノ組織ニ達セシメ或ハ陷沒部ヲ充塡スヘキ塡子ノ部分ヲ豫メ濃石炭酸水ニ浸シ而メ後單寧虞里斯林中ニ蘸シ之ヲ數〻捕入スヘシ（第五方（三）炎ノ條ニ出ツ）子宮内膜

〔丙〕崩芽狀癌

此種ノ癌腫ハ子宮頸ヨリ發生シ其質脆弱ニシテ稍〻硬塊ヲ成シ多少膣内ニ挺出スル者ナリ而メ或ハ連接スル膣壁上ニ同一ノ發育點ヲ生スル者ナリ

〔原因〕詳ナラス蓋シ恐クハ淹久セル表皮癌ニ由ルヘシ

〔現症〕初起ノ疼痛陷沒性癌ニ比スレハ尤モ甚シ

ク又血撚液ヲ漏スコト少ナクシテ膿撚液ヲ洩スコト多ク亦其性初起ハ陷没性癌ノ如ク惡臭ヲ放タス

〔徴候〕子宮ノ固着スルハ之ヲ陷没性癌ニ比スレハ速カナラス之ニ觸ルヽニ恰モ孤立スル者ノ如シ時アリテハ唯子宮ノ偏唇ヨリ發生シ甚タ脆弱ニシテ輒ク手指ヲ將テ之ヲ破碎スルヲ得ヘシ

〔診斷〕翻花狀癌トノ別ハ敗液質ヲ顯スト疼痛アルト水撚液ヲ漏泄スルノ較〻鮮ナキトニ由ル

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕十分ニ癌腫ヲ切斷シ烙鐵ヲ施シ然ル後陷没性癌ニ於ケルカ如ク治療スヘシ

〔丁〕内皮癌

此レ惡性ノ癌腫ニメノ初起ハ子宮ノ唇上ニ一個ノ小片ヲ發シ爾後潰瘍トナル者ナリ

〔原因〕未タ明晰ナラサレ𪜈或ハ恐クハ瀰蔓淹滯セル子宮頸顆粒性炎ナルヘシ

〔現症〕背部疼痛シ局部ニ靡下スルカ如キ疼痛アリ子宮出血ヲ来シ血液ノ混交セル膿液ヲ漏泄

ス

〔徴候〕初起ニ子宮ハ移動スヘキモ癌體稍硬固ニシテ粗糙ノ顆粒面ヲ呈シ原來ノ小片ハ周邊ノ組織上ニ隆起シ全面赤色ヲ帶ヒ頗ル出血シ易シ

〔診斷〕子宮頸顆粒炎トノ差別ハ疼痛較劇甚ニシテ時アリテハ多量ノ出血ヲ見ルト子宮頸ハ毎常必ス腫モ著シク其容積ヲ增大セサルトニ由レリ又此癌腫ハ末期ニ至テ崩芽狀癌ニ變スル者アリ

〔預後〕通常必シモ凶ナルニアラス

〔治法〕健全ナル組織ニ接テ子宮頸ヲ切斷スヘシ

〔或〕翻花狀癌一名菜花耶菜狀癌肉眞ノ癌腫ニアラス又癌腫ニ類似スル者少ナク萌芽狀癌或ハ内皮癌ノ如ク硬固脆弱ナラス其質ハ脈管富有ノ組織ヨリ成リ顆粒狀若シクハ細絲狀ヲ爲シ子宮口ヨリ發育シ膣ヲ侵スヿナク所謂癌細胞ヲ含有セサルモノナリ

〔原因〕未詳

〔現症〕初メ血揺液ヲ洩シ而メ後出血シ且貧血症

ヲ顯レ全身ノ違和ヲ覺フ

〔徵候〕觸診スレバ稍柔軟ニシテ胎盤ノ如ク葉形ヲ成スヲ覺フ按壓スルモ痛ヲ知ラズ鮮明ナル肉樣ノ赤色ヲ呈シ水分ノ滲漏ナシ子宮ハ移動シ得ヘシ

〔徵斷〕顯微鏡ニ照シテ檢査スルニ癌腫ノ通徵ヲ欠キ而メ該腫瘍ノ粘膜瘢肉ニ同シカラサルト觸診スルニ甚シク柔軟ナルト出血シ易キトニ據レリ又萌芽狀癌ト異ナルハ其移動スベキト其質柔軟ナルト貧血症アルト又癌腫ニ固有セル敗液質ナキトニ因レリ

〔預後〕子宮啓ノ一部ヨリ起リ根底狹小ナル者ハ時トシテ吉ナルコアリ但其進歩スル者ハ固ヨリ凶ナリ

〔治法〕截除シテ後チ烙鐵ヲ施スヘシ

〔其十五、子宮纖維腫〕

纖維組織ヨリ成ル所ノ子宮一部ノ腫脹ナリ乃チ纖維腫、筋腫、筋腫性纖維腫ノ別アリ

〔甲〕腹膜下纖維腫

子宮ノ外面ヨリ多少突出セル纖維腫ニシテ或

ハ無脚ナル者アリ或ハ有脚ナル者アリ

〔原因〕未詳

〔現症〕骨盤内疼痛シ歷重及歷下スルカ如キ感覺アリ多少月經過溢ヲ發シ便通困難シ若シ腫瘍ノ後方ニ傾ク者ハ子宮後傾ノ現症ヲ呈シ其膀胱ヲ歷逼スル者ハ小便頻數ナリ

〔徵候〕腹部ヲ按診スレハ腫脹ヲ覺ヘ若シ腫瘍有脚ナル者ニ屬スル片ハ其子宮ヲ離レテ稍移動スルヲ知ル而メ子宮腔ハ增大スルコトナシ

〔診斷〕腫瘍ノ移動スルニ由テ蜂窠織炎ト鑒別シ急卒ノ現症ナキニ由テ血囊ト識別シ又子宮消息子ニ賴テ子宮ノ彎屈症ト異ナルヲ知ル但シ卵巢腫瘍トノ別ハ頗ル難シ然レ𪜈唯其子宮ト共ニ多少移動スルニ由テ之ヲ知ル卵巢腫瘍ノ子宮ニ連著スル者ハ屢診斷シ難キコアリ又結便トノ別ハ凸凹參差ナル形狀ナキニ由ルヘシ

〔預後〕其發育遲徐ナル者ハ吉ナリ

〔治法〕腫瘍大ニシテ全身ノ健康ヲ損害セントスル者ハ腹部ヲ截開シテ速ニ之ヲ除却スヘシ

〔乙〕子宮壁内纖維腫

子宮壁内ニ占位スル所ノ纖維腫ナリ

〔原因〕詳ナラス或ハ産後子宮ノ全ク故位ニ復セサルヨリ生スル者ナラン

〔現症〕月經過溢シ膀胱及直腸ノ刺衝機亢盛シ骨盤内疼痛シ又月經痛及白帶下ヲ發ス

〔徵候〕腫瘍ノ位スル壁ノ膨起スルニ由テ子宮脹大シ子宮腔延長シ且彎屈スルヲ覺フ

〔診斷〕上ニ載ル所ノ腹膜下纖維腫及下ニ說ク所ノ子宮内纖維腫ト臨牀鑒別スヘシ

〔預後〕發育徐々ナル者ハ吉ナリ但シ腹膜下腫瘍ニ比スレハ稍吉ナリ

〔治法〕子宮頸ノ擴張ヲ持續シ子宮内面ニ向テ腫瘍ヲ驅出センカ爲ニ麥奴ヲ與ヘ其効ヲ奏スルニ至テ施術シ次條ニ掲ク格魯爾加爾基十五氏水一汚ノ溶液ヲ外用スヘシ

〔西〕子宮内纖維腫

子宮ノ内面ニ起リ多少其腔内ニ挺出スル所ノ纖維腫ニシテ亦無脚ナル者アリ或ハ有脚ナル者アリ

〔原因〕未詳

〔現症〕月經過溢子宮出血アリ腫瘍ノ大サニ准シテ膀胱及直腸ノ刺衝ヲ異ニシ疼痛分娩ノ陳痛ノ如ク發シアリヲ發シ靡下スルカ如キ感覺アリ蛋白樣ノ白帶下ヲ見ル月經痛アリ

〔徵候〕子宮膨大シ且硬結シ子宮腔延長シ腫瘍ノ挺出スルカ爲ニ多少彎屈シ子宮ノ偏側ハ患部ニ反シテ外方ニ膨起シ時アリテハ子宮孔ノ張開スル者アリ尚ホ子宮ヲ精細ニ檢センニハ手指ヲ子宮内ニ揷入スルヲ要ス故ニ豫シメ塡子ヲ以テ子宮頸ヲ擴張ス可シ

〔診斷〕腹膜下腫瘍及子宮壁腫瘍ト鑒別スルハ子宮腔ノ延長較〻大ナルト其迂曲スルトニ由リ單純ノ彎屈症ト識別スルハ消息子ニ賴ルヘシ又卵巢腫瘍トハ子宮腔ノ延長ナルニ據リ骨盤内血囊及蜂窠織炎トノ別ハ宜シク病歷ニ憑ルヘシ

〔預後〕施術ニ便ナル所ニ位置スル者ハ吉ナリ若シ子宮頸延長シテ狹窄スル者ハ療法ヲ施スニ愼戒ヲ加フヘシ

〔治法〕纖維腫ハ其發育荏苒トシテ停止スル者ア

リ月經收止ノ後ニ在テハ殊ニ然リ或ハ病勢ノ退歩スルアリ或ハ粘膜癒肉ノ如ク偶然子宮口ヨリ挺出スル者アリ或ハ結痂剥脱スル者アリ但シ脱出スル者アリ或ハ仆孕ハ其發育ノ勢ヲ變換シ産後子宮ノ故位ニ縮小スルノ運爲ハ之ヲ減殺スル者トス「腫瘍ノ截去シ難キ者ハ阿片ヲ與ヘテ其劇痛ヲ鎮過シ「ペツサリー」ヲ用井テ壓迫ヲ緩解シ酸性强壯藥、印度大麻、没食子酸、的列並底那、收斂性ノ愼子、收斂性藥液ヲ子宮内ニ注射スルニ由テ子宮出血ヲ減却スヘシ又子宮頸ヲ十分ニ割開シテ劇痛及子宮出血ノ大ニ減省スルアリ此手術ヲ施スニハ尋常ノ子宮刀或ハ小刀ヲ用フヘシ又家君所用ノ滑動子宮刀ヲ用フルハ容易ニ子宮ノ全厚ヲ截開シ得ヘシ

除却ノ療法五アリ卽チ〔一〕ハ誘導驅出スルノ法〔二〕ハ締斷器（ラクニュール）ヲ用フルノ法〔三〕ハ扶出法〔四〕ハ結痂剥脱法〔五〕ハ子宮截除ノ法之レナリ

其一誘導驅出スルノ法　此法ヲ施スニハ先ツ塡子ヲ以テ子宮口及子宮頸ヲ十分ニ擴張セシ

ムヘシ但シ始メハ充分長キ層疊填子ヲ挿入シ之ヲ除去スル後海綿填子ヲ輸入シテ子宮ノ口徑ヲ擴張スヘシ斯ノ如ク張開スル後麥奴ノ子宮内「ペツサリー」或ハ「エルゴチン」ニ「ノ」氏ノ皮下注射ヲ施シテ子宮底ノ收縮ヲ促スキハ隨テ子宮ノ疼痛ヲ誘起シ分娩ニ於ケル如シ以テ漸次ニ子宮口ヨリ腫瘍ヲ驅出スルヲ得ル然ル後ハ粘膜癒肉ノ如ク處置スヘシ但シ其療法ハ粘膜癒肉ノ條下ニ就テ參看スヘシ茲ニ填子ノ用法ニ就テ聊カ數言セサル可ラス何トナレハ注意セスシテ妄リニ填子ヲ用フレハ次テ劇症ヲ發シ加之腐敗性腹膜炎ヲ發スルカ爲ニ死ヲ致ス者アレハナリ乃チ子宮頸ノ截開後直チニ填子ヲ挿入ス可ラス且創處ノ癒著セサルノ間ハ之ヲ用井スシテ創部ヲ開キ置クヘシ若シ然ラスシテ填子ヲ用フレハ惡臭液ノ欝滯ヲ生シ創部ヨリ之ヲ吸收スルノ恐レアレハナリ又填子ヲ除却スル後直チニ子宮頸ヲ截開ス可ラス患部ノ惡臭液ヲ盡ク淨除セサルノ間ハ截開スルヿ勿レ其理前ニ同シ又子宮内ニ填子ヲ停ムルハ十二時間ニ

リニ塡子ヲ用フレハ次テ劇症ヲ發シ加之腐敗性腹膜炎ヲ發スルカ爲ニ死ヲ致ス者アレハナリ乃チ子宮頸ノ截開後直チニ塡子ヲ挿入ス可ラス且創處ノ癒著セサルノ間ハ之ヲ用井スシテ創部ヲ開キ置クヘシ若シ然ラスシテ塡子ヲ用フレハ惡臭液ノ欝滯ヲ生シ創部ヨリ之ヲ吸收スルノ恐レアレハナリ又塡子ヲ除却スル後直チニ子宮頸ヲ截開ス可ラス患部ノ惡臭液ヲ盡ク淨除セサルノ間ハ截開スルヿ勿レ其理前ニ同シ又子宮内ニ塡子ヲ停ムルハ十二時間ニ


過ク可ラス若シ此時ヲ過クルキハ體温ノ増盛或ハ他ノ惡症ヲ發スヘシ填子ヲ挿入スルニ方ツテ劇痛ヲ發スル者ハ危害ヲ將來スルノ近徴ナルニ因リ施術家宜シク警戒ヲ加フヘシ又一箇ノ填子ヲ更換セント欲シ之ヲ除却スル後ハ「コンヂー」氏液（過満俺酸ノ濃溶液ニ水ヲ和スル者）或ハ石炭酸水（二十倍或ハ四十倍ノモノ）ヲ以テ患部ヲ盡ク洗浄セサルノ前ハ決シテ他ノ填子ヲ挿入ス可ラス若シ此豫備ヲ為サスシテ妄リニ之ヲ用フルハ最モ危險ノ施療トス若シ子宮頸ノ截開ヲ要スル者ハ豫メ先ツ子宮頸管ノ方嚮ト腫瘍ノ關係トヲ仔細ニ審明シ以テ腹膜腔ヲ開露セサルニ注意スヘシ

其二　締斷器ヲ用フル法　子宮頸ヲ十分擴張シ手指ニテ腫瘍ヲ觸知スルノ後鉤鉗子ヲ取テ之ヲ扣持シ小心ニ下方ニ牽引シ鋼鐵線締斷器ノ環或ハ瓦爾華尼締斷器ノ環等ヲ其上ニ輸シテ腫瘍ヲ截斷スルノ際細心ニ牽引シテ之ヲ除却スヘシ然リト雖モ時トシテハ腫瘍ヲ截斷スルニ緩ニ過キ之ヲ除去スルニ極メテ困難ナル

ナアリ斯ノ如キ時ハ吾所用ノ聯合沙魚齒形鉗（フカ）子ノ如ク分離シ得ヘキ二枝ヨリ成リ先ツ其一枝ヲ胎兒ノ頭上ニ輸リ次テ又一枝ヲ送リ適當ノ位置ニ至テ初メテ兩枝ヲ聯合スルカ如ク腫瘍上ニ施シ得ヘキ者ニシテ大ナルカヲ以テ牽引スルノ用ニ充ツヘシ」又或ハ腫瘍過大ニシテ上ノ施術ニ由テ一頓ニ除却シ難キ者往々之アリ然ルヽ片ハ復タ締斷器ノ繯ヲ施シテ腫瘍ヲ截斷シ再三之ヲ施シテ數片ヲ除却シ後麥奴ヲ與ヘ毎日唧筒ヲ以テ消毒液ヲ子宮ニ注射スヘシ

若シ多量ノ出血ヲ發スル者ハ數時間麻智胡藥ノ塡子ヲ子宮内ニ嵌入スヘシ

第六圖　腫瘍鉗子



其三扶出法　安全ニ扶出法ヲ施サントスルニハ唯一回ノ手術ニ於テ扶出ヲ終ラサル可ラス若シ然ラサル片ハ却テ腫瘍ノ生力ヲ妨害シ爲

メニ潰爛ヲ生シテ危嶮ニ陷ルコアリ蓋シ此手術ヲ施スニハ上ニ說クカ如ク子宮頸ヲ十分擴張スル後手ヲ腔内ニ送入シ其指ヲ子宮内ニ挿シ以テ腫瘍ノ囊ヲ破ルヘシ若シ腫瘍ノ子宮内ニ挺出スル者ハ手指ヲ腫瘍上ニ送リテ其底ヲ少ク爬開スヘシ若シ手指ノ腫瘍ノ上部ニ達スルヲ得サル者ハ「マリヨンシレムス」氏ノ鉤纖維腫ニ用フルヲ以テ腫瘍ノ底部ヲ破傷スルヲ良トス而メ後ハ「シレムス」氏ノ鉤ヲ深ク腫瘍ニ刺シ漸次ニ牽引シ腫瘍ノ位置ヲ脫セシメ子宮ノ收縮ト共ニ腫瘍ヲ掣下シ剪刀或ハ締斷器ヲ以テ其終尾ノ脚ヲ截斷シ然ル後上ノ如ク處置スヘシ但シ子宮ノ收縮ヲ促スハ麥奴ヲ用井或ハ外部ヲ摩擦シ若クハ瓦爾華尼電氣ヲ施シテ刺衝スヘシ

其四結痂剝脫法　此療法ヲ稱用スヘキ子宮纖維腫ノ症狀二般アリ一ハ腫瘍無脚ニシテ扶出法ヲ施スニ頗ル困難ナル者是ナリ一ハ子宮甚タ膨大シ且腫瘍ノ爲メニ轉位シ子宮口上方ニ屈シ恥骨ヲ壓逼スル者是ナリ甲ノ患者ニ於テハ烙鐵若クハ腐蝕加里ヲ用井子宮口ヨリ腫瘍

ノ占據スル部ニ深孔ヲ穿チ其嚢ヲ開キ以テ腫瘍ヲ少シク離開セシムレハ子宮自ラ收縮シテ逐次ニ之ヲ驅出スヘシ又乙ノ患者ニ於テハ烙鐵ヲ取リ子宮ノ後部ニ就テ新ニ子宮口ヲ燒開スヘシ此法宜シキヲ得レハ腫瘍自ラ潰亂シテ屑片漸次ニ人工ノ子宮口ヨリ脫出スヘシ斯ノ如クニシテ腫瘍漸ク減小スレハ子宮自ラ其本位ニ復シ子宮口モ亦低下シ腫瘍ノ屑片脫出セル孔モ遂ニ全ク痊ユル者ナリ但シ此療法ヲ施スキハ腐敗性腹膜炎ヲ來スコトアレハ最モ慈ニ意ヲ注キ宜ク石炭酸水或ハ沃顚水若クハ「コンデ」氏液ヲ取リ屢注射スヘシ

其五子宮截除法　子宮纖維腫ノ或ル症ニ於テ前ノ諸療法ヲ施スニ便宜ナラス且疼痛出血急進發育等ノ諸症若シクハ其一症アリテ爲ニ其身命ヲ危フシ或ハ患者ノ自ラ要求スル事務ヲ爲シ得サル片ハ子宮ヲ腫瘍ト共ニ截除スルノ法ヲ施ス可キヤ否如何ヲ辨別セサル可ラス但シ此施術ニ要スルコトハ健全子宮頸ノ多少截根トナリテ遺留セシムルニ在リ何トナレハ子宮

頸ハ素ヨリ膀胱ト親シク連係スルヲ以テ之ヲ
截除スル際ニ方テ度ニ超ルキハ危險ヲ誘起ス
ルノ恐レアレハナリ蓋シ此施術ノ最大危險ナ
ルハ言ヲ俟タサル所ニシテ既ニ卵巢截除術ノ
條下ニ略ホ載セタレハ今玆ニ贅セズ夫レ醫ノ
職タルヤ患者ノ身命ヲ保全シ苦楚ヲ緩解スル
ニ在リ而シテ現今本病ニ此手術ヲ施スノ後死
ニ陷ル者ノ員數昔時ニ比スレハ大ニ減少セリ
該患者ニ於テ其子宮頸健全ニシテ長サ度ニ適
シ子宮ノ無恙ナルカ如キハ先ツ患者ノ身體ヲ
安靜ニシ强壯藥ヲ用井淡薄ナル滋養物ヲ與ヘ
テ手術ヲ施スノ預備ヲ爲スヘシ又手術ヲ施ス
ニ當リテハ最モ注意シ且意外ニ生ス可キ事ヲ
顧慮シ而シテ卵巢截除術ニ於ケルカ如ク腹部
ニ就テ十分長徑ニ截開スヘシ膀胱ニ直接スル
所ニ及フコト勿レ是ニ於テ若シ腫瘍過大ナラサ
ル者ハ創口ヨリ前方ニ之ヲ牽出シ然ル後尖端
ニ一孔アル强キ曲針ヲ取リ子宮頸ノ上部ヲ穿
透シ而シテ强キ複鐵線ヲ針孔ニ貫穿シテ牽田（ヒキセトス）結
シ「ドクトル、シントラト」氏ノ「セルレヌーテ」締

糸ヲ緊張スル外科用ノ器具ヲ以テ各結締絲ヲ緊掣扭捻シ後固定シ以テ子宮ノ腫瘍ヲ切除シ「セルレヌーデ」ヲ以テ固定セル脚ヲ創ノ下端ニ保持スヘシ但シ創口ヲ縫合スルハ通常ノ法ニ沿フヘシ然レ氏若シ腫瘍大ニシテ其口ヲ極メテ大ニスルニ非レハ之ヲ牽出シ難キ者ハ鐵線ヲ腫瘍ニ穿透シ上ニ說クカ如ク其一部ヲ收縮セシメ之ヲ截去シ然ル後前ノ法ニ由テ其餘部ヲ穿透シ以テ全ク之ヲ除却スヘシ（但シ此際ニモ他ノ「セルレヌーデ」ヲ用フヘシ）又或ハ截根ニ強絹糸ヲ穿チテ綁結シ骨盤内ニ垂下セシムルモ亦可ナリ總テ以上ノ手術ヲ施ス所ノ患者ハ最モ愼重ニ看護シ以テ恢復ヲ全フセンコトヲ要ス

〔丁〕子宮纖維性囊腫

纖維腫内ニ一箇或ハ數箇ノ囊腫ヲ生スル者ニシテ或ハ纖維性囊腫ナルアリ或ハ撒爾格麻性囊腫ナルアリ、此種ノ囊腫ハ通常腹膜下ニ最モ多シトス

〔原因〕未詳

〔現症〕纖維腫ニ同シ

〔徴候〕纖維腫ニ同シキ徴候ノ外尚ホ多少液ノ瀦溜スルアリ洩液器ヲ用フレハ腫瘍ノ一部ニ液ノ現存スルヲ見ル

〔診斷〕姙娠トノ別ハ乳房ニ姙娠固有ノ徴候ナキト月經過滯ヲ發スルト時限ナキトニ由テ知リ卵巢水腫トノ別ハ既ニ論載セル卵巢囊腫ノ條下ニ明カナリ纖維腫トノ別ハ波動アリテ必ス腫形增大シ且發育ノ急速ナルニ據ル

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕洩液器ヲ用井テ蓄液ヲ導泄スルト腫瘍ヲ截除スルトニ在リ子宮截除術ノ條下ヲ看ヨ

〔戊〕瘜肉 剝列乙布

子宮ノ内膜ニ由テ被覆シ脚ヲ以テ其内部ニ附著スル腫瘍ナリ卽チ其種屬ハ纖維腫性纖維囊腫性、蜂窠織性ノ瘜肉等ノ類是ナリ

〔原因〕詳明ナラス蓋シ該腫瘍ハ子宮ノ收縮性組織ノ作用ヲ其内面ニ近キ所ノ纖維腫上ニ營ムカ爲メニ形成シ漸次ニ其面ヨリ挺出シテ脚ヲ爲シ其後尚ホ子宮ノ作用持續スルニ由テ遂ニ子宮口ヨリ挺出スル者ナリ

〔現症〕月經過溢子宮出血白帶下等ノ顯症アリ時アリテハ月經痛ヲ發シ子宮ノ腫瘍ヲ驅逐スル運爲ニ由テ恰モ靨下スルカ如キ疼痛ヲ覺ヘ若シ腫瘍大ニシテ膣内ニ位スル者ハ其部ニ充實ヲ覺フルモノナリ

〔徵候〕若シ子宮口ノ閉塞スル者ハ子宮消息子ニ賴テ子宮腔ヲ探試スルニ非常ニ長キヲ知リ且腫瘍ノ膨脹スルニ由テ其彎屈スルヲ知ル若シ子宮口ノ開哆スル者ハ子宮頸管内ニ腫瘍ノ挺出スルヲ觸知シ或ハ膣内ニ位シテ其脚ヲ子宮口ニ留ムルヲ探知ス又此腫瘍ハ其形大ニシテ十分膣内ヲ塡塞シ爲ニ其脚ヲ搜索スヘキ諸術ヲ障礙スル者アリ或ハ又膣口ニ挺出スル者アリ若シ些少ニテモ壅塞スルコアレハ惡臭液ヲ漏泄シ或ハ之ヲ撿査スルニ由テ出血ヲ來スコアリ

〔診斷〕消息子ヲ取リ子宮内ニ挿入シテ平常ノ長サニ達セシメ或ハ尚ホ長ク送入シ得ルニ因テ翻轉ト鑒別スヘシ

〔預後〕子宮口或ハ膣壁ノ收縮ニ由テ腫瘍ノ脚部

ヲ縊搾シテ腫瘍自ラ脫落シ或ハ潰爛シテ自ラ治癒スル者稀レニ之レアリ然レ𪜈治療ヲ施スヲ要キハ通例預後ハ吉ニ屬ス

〔治法〕其膣内ニ位スル者ハ剪刀或ハ締斷器若クハ瓦爾華尼燒灼締斷器ヲ以テ截除スヘシ若シ瓦爾華尼締斷器ヲ以テ鐵線軟撓ナルニ由テ腫瘍ノ周圍ニ匝ラシ難タキ者ハ此器械ノ管ヲ廢シテ鐵線ヲ腫瘍底ニ周匝スルヲ良トス「グーチ」氏ノ細管ニ裝スル結締糸ヲ用フルカ如クスヘシ若シ腫瘍子宮内ニ位スル者ハ子宮頸ヲ截開スレハ子宮ノ力能ク其腫瘍ヲ驅出スルニ適スヘシ

「グーチ」氏細管



若シ然ラスシテ障妨スヘキノ現症十分ニ備ハル者ハ先ツ塡子ヲ以テ擴張シ後締斷器ヲ以テ切除スヘシ此施術モ亦塡子ヲ要スル爾他ノ手術ノ如ク未タ危險ヲ免レサルモノナリ」以上論スル所ノ外尚ホ姑息療法ヲ施スヲ要ス乃チ月經時ハ患者

ヲ靜息セシメ麥奴、印度大麻第八方〔三〕卵巢癌ノ條ニ出ツ　沒食子酸第十方〔三〕或ハ阿片ヲ與ヘ腸胃ヲ疏解シ强壯藥ヲ服シ注射第三方〔五〕子宮唇顆ヲ施シ單寧酸粒炎ノ條ニ出ツ「ペツサリー」第二方〔三〕ヲ用フヘシ

第十方〕收斂藥月經過溢或ハ子宮出血ニ用フ

〔三〕沒食子酸水　沒食子酸十瓦至二十瓦　稀硫酸五滴　酸性玫瑰浸一瓦ヲ取リ混和ス

第二方〕收斂ペツサリー

〔一〕單寧酸ペツサリー　單寧酸二十瓦　合劑二十瓦ヲ以テ製ス

〔其十六、子宮頸蜂窠織新生肥大〕

子宮頸ノ非惡性硬結ニシテ或ハ汎發ナルアリ或ハ局發ナルアリ通常之ヲ慢性子宮頸炎後硬結ト稱ス卽チ結締織及纖維織ノ成形機亢盛シテ子宮頸ノ肥大硬結スル者ナリ

〔原因〕分娩ニ因テ子宮ノ未タ全ク故位ニ復セサルニ過クル者、産後ノ子宮炎或ハ子宮頸炎、全身衰弱、子宮脫墜、房事過度、月經時ノ感冒或ハ努力、石婦ノ媾合其他充血ヲ起スヘキ諸因是ナリ但シ處女ニ於テハ子宮ノ彎屈

ヲ本病ノ原因トス

〔現症〕薦骨部ニ疼痛アリ兼テ偏側胯關節或ハ兩側胯關節ニ徹スル一種特異ノ疼痛ヲ併セ月經順ナラス勞動ニ由テ疼痛增劇ス交接痛ヲ發シ屢〻出血ヲ來シ全身疲勞、頭痛ヲ覺ヘ繼發ノ子宮頸内膜炎或ハ其顆粒性炎ヨリ白帶下ヲ將來ス

〔徵候〕子宮低下シ子宮頸腫脹シ按壓スレハ痛ヲ覺エ硬固ニシテ屢〻結節ニ類似スル者アリ若シ硬結子宮ノ前唇ニ限局スル者ハ後方ニ腫脹シテ子宮頸管ニ突出シ少ク其開張ヲ起シ後唇ハ其上ニ延長シテ新彎月形ヲ爲シ子宮孔窩ハ自ラ前方ニ位スル若シ唯後唇ノミ患ニ罹ル者ハ右ニ反スルノ症狀ヲ發顯ス但シ子宮前屈若シクハ後屈ノ症ニ於テハ其前唇或ハ後唇ノ硬結スルヲ通規トス

〔診斷〕本病ト子宮。頸。惡性。硬。結。トノ別ハ患者ノ來歷ト子宮ノ移動スルト觸覺トニ據リ子宮。頸。硬性。癌。トノ別ハ彼レニ在テハ子宮頸ニ觸ルヽニ稍〻濕潤セル護謨ノ如キヲ覺ヘ硬結表面ニ及フモ此レニ於テハ硬結ハ只健全ナリ粘膜下ニ限

リ且敗液膿ヲ欠クニ由ル又子宮頸多血ハ本病ニ比スレハ較柔軟ナルニ由テ之ヲ鑒別ス若シ其子宮體ヲ侵ス者ハ鼓脹、惡心月經痛ヲ發シ全身ノ徵候較劇シク乳房疼痛シ子宮内ニ消息子ヲ挿入スレハ痛ヲ覺ヘ兩手ノ按撿ヲ施スモ亦痛ヲ發スルモノナリ

〔預後〕吉ナリ

〔治法〕本病ハ全身療法ヲ施スニ由テ病狀ヲ變換スルヲ得ヘシ乃チ過格魯兒化汞昇汞ヲ與ヘ次テ沃顛剝篤亞斯ヲ用フルカ如キ是ナリ然レ𪜈之ヲ全治スルハ局處療法ニ非レハ能ハス其最良ノ治法三アリ〔一〕腐蝕加里〔二〕烙鐵〔三〕截除ナリ蓋シ上ノ二法ヲ施スニハ先ツ一回或ハ數回子宮頸ニ蜱針ヲ貼シ以テ充血ノ症狀ヲ減退セサル可ラス但シ子宮頸ヲ針刺スルハ其効寡ナキモノナリ何トナレハ此法ヲ施スモ子宮頸軟ニシテ充血スルヤ如ク十分ニ出血セサレハナリ蜱針ニ由テ子宮頸ノ充血減退スル者ハ腐蝕加里ニ代フルニ加里石灰トノ合劑ヲ以テスレハ更ニ良ナリ此劑ハ腐蝕加里ニ比スレハ較緩和ニシテ其作用モ亦隨テ彼カ如ク劇烈ナ

ナラス而シテ或人ハ該劑ノ一片ヲ子宮頸ニ裝塡シ若干時間留メ置クヲ稱譽スル者ナリ然レ𪜈此療法ハ未タ危險ナレト謂フ可カラス何トナレハ腐蝕加里ノ溶解スルヤハ自ラ膣壁ニ散漫シテ終ニ健全ナル部ニ潰爛ヲ生スレハナリ故ニ單ニ腐蝕加里ヲ貼スルヤハ精細ニ其成効如何ニ注慮シ是カ爲ニ害ヲ被ムル者ハ直チニ其作用ヲ防止セサル可ラス

〔二〕腐蝕加里ヲ貼スルニハ先ツ患者ヲシテ半傾ノ位置「レムス」氏ノ位置ヲ取ラシメ患者ノ堪ヘ得ヘキ大サナル子宮鏡ヲ内下方ニ傾斜セシメ又滴流スル所ノ加里ヲ中和センカ爲ニ醋中ニ蘸セル綿塊ヲ子宮鏡底腐蝕加里ヲ貼センント欲スル子宮頸ノ部分マテ塡塞シ兼テ少許ノ醋ヲ子宮頸ノ下子宮鏡ノ底ニ滴入ス但シ「ドクトル、プロセロヱ、スミス」氏ノ擴張子宮鏡ヲ用フルキハ許多ノ綿塊ヲ取テ子宮頸ノ較〻下部ニ至ルマテ貼裝塡シ且多量ノ醋ヲ送入シ較〻大ナル瀦溜ヲ爲サシムヘシ是ニ由テ大ニ膣ノ傷害ヲ防禦スルヲ得ヘシ然ル後強固ナル腐蝕藥挿「ドクトル、プロセロヱ、スミス」氏ノ腐蝕藥挿ハ最モ安全ニシテ且頗ル便利ナル者ナリ、ヲ以テ腐蝕加里ヲ拈持シ子宮頸ノ硬結部ヲ被フ所ノ粘膜ヲ摩

擦シ以テ十分ニ毀壞スヘシ但シ最初ノ施術ハ單ニ此一方ニシテ足レリトス此施術第七圖ノ際子宮鏡ヲ固持シテ醋及水ヲ子宮鏡上ニ流注

第七圖

「プロセロヌ、スミス」氏腐蝕藥挿

シ以テ剩除ノ加里ヲシテ全ク中和セシメ然ル後綿絮ヲ除去シテ醋中ニ蘸セル綿栓ヲ子宮頸ニ填入シ晩景ニ至テ亦之ヲ除去スヘシ而シテ施術後ハ日々唧筒ヲ以テ「コンヂー」氏液ヲ膣内ニ注射スヘシ斯ノ如クニシテ結成セル痂ハ大抵一週以内ニシテ脫離スルモノナリ是ニ於テ尚ホ再ヒ腐蝕加里ヲ貼スヘシ尤モ前回ニ比スレハ充分ニ捺擦シテ深ク硬結ヲ侵蝕セシメンコトヲ要ス是ニ由テ陷没底ハ宛モ帶黄白色ノ物質中ニ刻シタル一小碗ノ形狀ヲ呈スルヲ常トス」子宮頸硬結ノ結節狀ヲ爲セル患者ニ於テハ其周圍ノ健全組織ハ加里ニ由テ黑色ニ變シ白色組織ハ別種ノ沈澱物トナリテ中央ニ遺留スルヲ見ル而

シテ腐蝕加里ヲ貼スル際健康組織ト病的組織トノ辨別ハ明ラカニ觸覺ニ因テ知ルヘシ再施術ノ片十分ニ腐蝕加里ヲ搽擦スルニ由テ甚タ深キ潰爛ヲ生スル者往々之アリ然ルニハ製皮ノ如キ鞏靱ナル一大片トナリテ脫落スル者アリ既ニ此際ニ至レハ硬結セル結節上ニ作用ヲ營ム所ノ子宮組織ノ收縮ニ因テ漸次ニ之ヲ驅出スル者ナリ流動麥奴越幾斯二十滴乃至三十滴ハ驅出ノ作用ヲ補助スル者ナルカ故ニ一週或ハ十日ノ後既ニ見ル所ノ碗狀ノ陷沒ノ隆起スルニ至ルマテ斷ヘス持長スルニ宜シ此隆起ヲ生スル後尚ホ續テ腐蝕加里ヲ搽擦シ以テ遂ニ硬固ノ白色組織ヲ見スシテ只加里ノ爲ニ燒痂セル健康組織ヲ認ムルニ至ルヘシ此療法ヲ施スヿ愈〻長ク硬結セル組織愈〻減耗スレハ腐蝕加里ヲ貼スルニ隨テ劇シキ痛ヲ發スルモノナリ是レ健康組織ノ知覺愈〻敏捷トナルニ由ル又濕潤溶解スル加里ノ化機ハ毀壞セル部ノ大熱ヲ生スルモノナリ故ニ施術ノ畢リニ至テ患部ニ注射スルニハ冷醋ニ水ヲ和シ用フヘシ若シ病的組織

ヲ毀壞スルヿ十分ナル片ハ患部ニ深キ陷沒ヲナシ後肉芽ヲ發生シテ全ク癒ヘ毫モ瘢痕ヲ遺スヿナシ實ニ此療法ノ善良ナル片ハ子宮頸更ニ健全ノ狀態ヲ呈シ曾テ腐蝕藥作用ノ痕迹ヲ認ルヿナシ」蓋シ全ク癒合スルニハ數週ヲ經過スヘシ此際宜シク患者ニ注意スヘシ加之其癒ル後モ尚ホ數週間ハ愼戒看護シ以テ子宮頸管ノ太シキ收縮或ハ子宮口ノ全然閉塞ヲ來サヽルヿヲ要ス乃チ之ヲ防禦センカ爲ニハ子宮頸管上大約一寸ノ間ニ毎四日若クハ毎五日ニ子宮消息子ヲ挿入シ後ニ至テ毎一週或ハ毎十日ニ送入スヘシ此術ヲ施スニハ至大ノ注意ヲ加ヘサル可ラス或ハ是ニ由テ炎証ヲ起スノ恐レアレハナリ（此炎証ハ骨盤内蜂窠織炎ノ狀ナルヲ常トス、）又患者ヲ寢牀或ハ睡椅上ニ安臥セシメサル可ラス何トナレハ腐蝕加里ヲ貼スル際若シ寒冷ニ暴觸スル片ハ忽チ蜂窠織炎ヲ發スルヿアレハナリ又癒合機ヲ補助センニハ時々濃石炭酸水ヲ患部ニ搽擦スヘシ是レ健全ナル肉芽ノ發生ヲ喚起セシムルニ須要ナリ若シ子宮消息子ノ用并ヲ怠

リ子宮口閉塞スル片之ヲ張開スルノ最良法ハ上ニ言ヘルカ如ク豫メ中和液ノ小溜ヲ作リ子宮口ニ尖形ノ加里ヲ貼シ屢〻消息子ヲ挿入シテ之ヲ開張セシムヘシ

〔一〕子宮頸ノ硬結深カラサル者或ハ子宮頸ノ疾患廣汎ナル者ハ烙鐵ヲ貼スルヲ鴻益アリトス抑モ此療法ハ久シク世ニ稱用セラル、モノニシテ佛國及米國ニ於テハ特ニ之ヲ賞譽スル者多シ然レ𪜈之ヲ施スキハ數箇ノ烙鐵器ヲ要シ且ツ之ヲ熾紅ナラシムル等ハ大ニ患者ノ恐怖スル所ナレハ仍ホ一般之ヲ用フルニ至ラス「ドクトル、パケリン」氏ノ石腦油燒灼器ノ如キ便宜有力ノ燒灼法アリ此裝置ハ白金ノ尖頭ヲ纖紅熱ヨリ白熱ニ至ルマテノ度ニ焚燒シ以テ子宮頸ニ輸送スルナリ而シテ其面滑澤ナルカ故ニ粗糙ナル鐵ニ比スレハ

「ドクトル、パケリン」氏燒灼器



熱ヲ放ツヿ小ニシテ且組織ニ附著スルヿナシ蓋シ之ヲ貼スルニモ亦豫メ子宮ノ充血ヲ除キ且感冒及炎証ノ諸因ヲ防禦スルニ注意スヘシ而シテ之ヲ用フルハ腐蝕加里ヲ塗布スルカ如ク痛ヲ覺ヘス且潰爛ノ膣壁上ニ蔓延スル憂ナシ又潰爛ノ勢モ腐蝕加里ヲ貼スルカ如ク深カラス但シ輕症ニ於テハ微紅熱ノ烙鐵ヲ貼スルノミニテ足レリ又或症ニ於テハ殆ント白熱ニ至ル者ヲ取リテ硬結セル子宮頸ノ多部ヲ燒爍セルヿアリ

(三)子宮頸甚タ大ニシテ子宮脣翻轉セル患者ニ於テハ腐蝕加里ヲ以テ廣部ヲ毀壞スルニハ大ニ時間ヲ破費ス故ニ之ヲ背カンカ為ニ截除術ヲ施サヽル可ラス乃チ鉗子ヲ取テ子宮頸ヲ拑持シ强固ナル曲剪ヲ以テ子宮頸脣ノ面ノ大部ヲ截除スヘシ此術ヲ施スニ由テ若シ過饒ノ出血アル者ハ烙鐵或ハ麻質格葉ノ栓ニ賴テ之ヲ止ムヘシ此施術ノ後患部ハ自ラ肉芽ヲ生シテ治癒スルモノナリ然レ𪜈子宮口ハ始終子宮消息子ヲ挿入シテ開張セサル可ラス若シ截除セ

ル部分大ナルキハ鐵線ヲ以テ子宮頸ノ兩片ヲ縫接スヘシ此際宜シク子宮頸管ヲ鎖閉セサルニ注意スヘシ

〔其十七、粘膜瘜肉〕

〔通例〕小ナル瘜肉ニシテ其大サ針頭ヨリ胡桃ニ至ルノ差異アリ子宮ノ唇緣ヨリ生長シ粘膜ヲ以テ被覆スル者ナリ

〔原因〕子宮唇ノ刺衝或ハ慢性子宮頸炎是ナリ

〔現症〕此瘜肉ハ小ナリト雖モ薦骨部ニ刺痛ヲ起スノ原トナリ時アリテハ月經痛蚤白揉白帶下ヲ發シ或ハ又少許ノ出血ヲ來ス者ナリ

〔徵候〕瘜肉甚タ小ナル者ハ其軟ナルニ由リ容易ニ之ヲ觸知スルヲ得ス然レモ巧手ノ觸診ハ大抵鑑定ヲ誤ルコトナクシテ毎常能ク之ヲ發見シ且擴張器ヲ用井テ直チニ之ヲ視ルヲ得ルコアリ

〔診斷〕上ノ現症及徵候ニ據ル

〔預後〕凶ナリ

〔治法〕轉捩ヲ行フテ除却シ或ハ剪刀ヲ用井テ截去スヘシ

簡明婦人病論卷之三畢

明治十二年三月十三日

版權免許

飜譯并
出版人 東京日本橋區南茅場町卅一番地 安藤正胤

發兌書肆

東京 芝大神宮前 山中市兵衛
同 馬喰町二丁目 島村利助
同 本町三丁目 瑞穗屋卯三郎
同 日本橋通三丁目 丸屋善七

大阪　心齋橋筋北久寶寺町　丸屋善藏
西京　寺町通姉小路　丸屋支店
名古屋　本町八丁目　丸屋善八