k 46

富士川文庫
495.1
Ka
3

F 3
カー112

全ク張開セサルカ如キ症ナリ、

〔原因〕羊膜液早ク脱漏スル者、神經衰弱、蜂窠織新生肥大ヨリ起ル硬結、子宮頸ノ下部非常ニ硬靱ナル者、子宮頭ノ癌腫是ナリ

〔現症〕陣痛劇烈ニシテ堪ヘ難ク且薦骨部ニ限局セル疼痛アリ患者灼熱煩悶ヲ發シ若痛ニ堪ヘス

〔徵候〕脈數ニシテ緊或ハ充實ニシテ指頭ニ彈戻シ觸診ヲ行ヘハ子宮孔ハ硬キ輪ノ如キヲ覺ヘ毎回ノ陣痛ヲ感覺スルヿナシ但シ癌腫ニ罹ル

495.1
Ka
3
No.2529
旧K 46

米國斯密私氏著
日本安藤正胤譯

簡明婦人病論

東京　爽然樓藏版

富士川文庫
3153
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月14日

簡明婦人病論卷之四

米國　斯密私氏　著
日本　安藤正胤　譯

〔其十八〕子宮轉位

子宮ノ形狀常ニ異ナラズシテ唯其本位ヲ轉スルヲ子宮轉位ト名ク蓋シ其甚シク前方ニ傾ク者ヲ前轉ト曰ヒ後方ニ傾ク者ヲ後轉ト曰フ或ハ其常位ヨリ低下スル者アリ之ヲ脱出ト曰ヒ其陰門マテ挺出スル者ヲ脱下ト曰フ但シ脱出ハ始終脱下ニ至ルノ勢アリ脱下ハ既ニ墜落セ

ント欲スルノ狀ヲ呈ス

〔甲〕

受胎セル子宮ハ通例僅ニ前傾シ或ハ前屈スル者ナリ是レ平常ノ角度ヨリモ地平面ト較、小ナル角度ヲナスヲ要スルカ爲ナリ

〔原因〕蜂窠織新生肥大、子宮底前面ノ纖維腫、劇甚ノ努力、紐帶ノ緊縛、子宮薦骨靭帶ノ弛縱、膀胱歇爾尼亞是ナリ

〔現症〕尿意頻數ニシテ利尿困難シ恥骨部ニ刺痛ヲ覺ヘ時トシテハ子宮頸ノ後方ヲ壓迫スルニ由テ便通困難ナリ勞動スレハ疼痛ヲ發シ且ツ行歩シ難シ

〔徵候〕子宮平常ヨリモ較、地平ニ位スルヲ觸知シ消息子ヲ挿入スレハ其膣ノ方嚮ヲ知得スヘシ

〔診斷〕上ノ徵候ニ依テス

〔豫后〕吉ナリ

〔治法〕他病ヲ合併セサル者ハ直チニ子宮ヲ本位ニ復スヘシ然レ𪜈若シ蜂窠織新生肥大或ハ子宮内膜炎ヲ併發スル者ハ復位ノ策ヲ施サヽル前先ツ其病ヲ治セサル可ラス蓋シ子宮ノ位置

ヲ復スルハ唯手指ヲ用フルヲ最良トス若シ子宮ノ前傾淹久シ毫モ充血或ハ炎証ナク且子宮周圍ノ結締織モ亦無恙ナル者ハ慎ンテ消息子ヲ用フヘシ而シテ子宮ヲ本位ニ護持センニハ毎日數時間仰卧シテ務メテ小便ノ通利ヲ遲延ニシ衣服ノ壓迫ヲ除却シ氣球或ハ「トーマス」氏ノ前轉「ペツサリー」若クハ「カットル」氏ノ前轉「ペツサリー」ヲ用フヘシ（子宮後屈症ノ治療條下ヲ參考スヘシ）

膣縫合術「シムス」氏ノ手術ハ子宮頸ノ直前ニ位スル膣壁ノ一部ヲ截除シ尿道ノ後縁大約一「インチ」四分ノ一以内マテ前方ニ割開シ横ニ縫合糸ヲ穿入シ以テ其兩縁ヲ連接スルニ在リ又「プロフェツソル、ストルツ」氏ノ稱譽セル手術ハ一千八百七十五年英國ニ於テ始メテ同氏カ實驗シテ成功ヲ得タルモノナリ其法先ツ膣ノ前壁ニ於テ其一部ヲ圓ク截除シ然ル後創縁ノ周圍ヲ繞ラシテ一條ノ絹縫合糸ヲ貫穿スルナリ但シ此縫合針ヲ貫穿スルヤ前ハ尿道ニ邇キ處ヨリ送入シ創縁ヲ距ル大約「一インチ」八分ノ一ノ處ニ位シ宛モ囊口ヲ闔閉スルニ其縁ニ糸ヲ貫ク

カ如クスヘシ後其縫合ノ一端ヲ初メ挿入セル部ニ近ク引出シ以テ縫合糸ヲ緊紮スヘシ創部閉合シテ小ナル皺襞點トナル是ニ於テ第一瘉著機ノ起ルトキハ膣ノ前部ハ著シク短縮シテ子宮頸ヲ前方ニ牽引シ子宮爲ニ其本位ニ復スルニ至ルナリ

〔乙〕後轉

子宮直形ニ違ヒナクシテ多少後方ニ傾キ爲ニ子宮口前方ニ向フ者ナリ劇症ニ於テハ子宮口高擧シテ恥骨ノ上縁ニ對シ子宮底ハ薦骨ノ空竅マテ後方ニ壓迫ス而シテ此變位ニ兼テ多少左右ニ偏倚スル者アリ

〔原因〕罕ニハ意外ノ遭際ナル者アリ大抵蜂窠織新生肥大、産後子宮ノ全ク故位ニ復セサル者、充血、妊娠、數回ノ分娩、腹膜炎或ハ骨盤内蜂窠織炎ヨリ起ル瘉著、膀胱膨脹セル時ノ打撲若クハ墜下、纖維腫、過緊ノ繃帶、膀胱歇爾尼亞會陰ノ破裂ヨリ來ル者ナリ

〔現症〕罕ニハ一ノ現症ヲモ發セサル者アリ蓋シ其現症タル薦骨部ニ限局セル疼痛ヲ發シ行歩

等ニ由テ不快ヲ覺ヘ便通ニ由テ痛ヲ增シ兼テ通利スル𪜈ノ感覺アリ時トシテハ子宮底若クハ子宮頸ノ壓迫ヨリ直腸或ハ膀胱ニ努責ヲ發シ或ハ月經痛ヲ起シ終ニ不孕ヲ致シ或ハ膀胱炎ヲ發シ若シ頓ニ後轉ヲ來ス者ハ疼痛劇甚ニシテ屢〻汎發諸症ヲ兼發スルヿアリ

〔徵候〕檢査スレハ子宮頸ハ前方ニ在リテ子宮口ハ恥骨ノ方ニ向ヒ子宮底ハ後ニ位スルヲ覺フ然レ圧後屈症ヲ徵スヘキ中間ノ溝ヲ見ス尚ホ子宮消息子ヲ以テ檢索スレハ診斷ヲ誤ルヿナシ

〔診斷〕子宮後壁ノ纖維腫ハ觸診スルニ後轉セル子宮ノ狀態ニ擬スル者アリ然レ圧子宮消息子ヲ送入スレハ之ヲ證明スルヲ得ヘシ

〔豫後〕癒著ニ由テ子宮ノ他部ニ連繫セサル者ハ施療スルニ治シ易ク若シ他部ニ癒著連繫スル者ハ之ニ反ス

〔治法〕蜞針（卵巢炎ノ條ニ出ツ）或ハ亂刺ニ由テ局處ノ減損法ヲ施シ子宮消息子ヲ以テ子宮ノ位置ヲ復スヘシ（子宮ノ位置ヲ容易ニ復スルノ意見ヲ以テ工夫ヲ費シテ製セル種々異樣ノ消息子ア

（リト雖𪜈老練セル施術家ノ手ニ在テハ尋常ノ消息子若クハ平行消息子ヲ以テ足レリトス）乃チ施術家先ツ患者ノ後ニ立テ右手ノ指ヲ子宮口ニ挿入シ然ル後子宮口ニ消息子ヲ送リ手指ニテ子宮ノ後轉ヲ觸知スル后漸徐ニ消息子ヲ後方ニ輸シテ子宮ニ送致スヘシ（但シ消息子ヲ送入スルハ男子ニ「カテーテル」ヲ挿入スルカ如ク少シモカヲ用井ルヿナク消息子自己ノ行路ニ任セサルヘカラス）是ニ於テ消息子ノ柄ヲ半圓錐形ニ迴轉シ（前ニ論スル如ク子宮内ニ於テ半圓錐形ノ迴轉ヲ致ス可ラス）右手ノ示指ニテ子宮頸ヲ支持シ拇指ト中指トノ空間ニ消息子ヲ安置シ左手ニテ其柄ヲ徐々ニ後方ニ向フテ壓托シ子宮ノ角度ヲ故ニ復スルニ至ル然ル後右手ノ示指ト消息子トノ間ニ子宮頸ヲ抱容シ子宮ノ全體ヲ緩カニ掣下シテ恥骨上ニ子宮底ノ多少安著スルニ及テ同指ニテ子宮頸ヲ後壓シ且其際ニ消息子ハ前方ニ彎曲狀ヲ爲シテ之ヲ除去シ子宮頸ヲ薦骨空竅ノ方ニ後壓シテ數秒時間支持スヘシ」子宮ヲ本位ニ復スル後若シ其後轉亘久セシ者ハ子宮ノ位置自ラ轉變スルノ勢アリ若シ又子宮ノ後轉ヲ起スヤ充血或ハ蜂窠織新生肥大ニ因スル者ハ永久ノ治療ヲ

施ス前先ツ其病因ヲ治セサル可ラス然レ𪜈右ノ病状ナキ者或ハ治療ニ由テ除却スル者ハ諸種ノ「ペッサリー」ノ適宜ナルヲ撰用シテ子宮ヲ本位ニ支持スルノ策ヲ運ラシ或ハ綿栓ヲ虞利斯林ニ蘸シ腟内ニ装塡シテ子宮ヲ本位ニ支持スヘシ尤モ「ペッサリー」ハ施術家ノ常ニ試用シテ成功ヲ得ル者ヲ採用スルヲ良トス乃チ「ペッサリー」中最モ須要ナルハ「ホッヂス」氏ノ「ペッサリー」又同氏ノ改正「ペッサリー」或ハ「ドクトル、プロセロエ、スミス」氏ノ彈力「ペッサリー」ナリ「ホッヂス」氏ノ改正「ペッサ

リー」ハ兩端ニ屈曲ヲ増加セル者ニシテ同氏常ニ之ヲ施用シ且費拉地費（ヒラデルヒヤ）ノ「ドクトル、アルベルト、スミス」氏ノ賞讃スル所ナリ又「ドクトル、プロセロエ、スミス」氏ノ彈力「ペッサリー」ハ「ホッヂス」氏ノ「ペッサリー」ノ復形ニシテ前面聯合シテ兩圈ヲ爲シ相互ニ分開セントスルノ機轉アル者ナリ此「ペッサリー」ヲ用ウルニハ先ツ其兩圈ヲ後轉セル子宮底ノ後ニ輪シ而シテ其前圈ハ卽チ後圈ヨリ離レテ子宮底面ニ間斷ナク緩徐ノ擧力ヲ發セシムルナリ但シ此「ペッサリー」ハ數子宮後轉症

ニ施シテ之ヲ恢復スルノ功力アル者ナリ頑固ナル後轉症ニ於テハ多クハ「シムプソン」氏ノ子宮内杆ヲ用フル如ク恥骨部上ノ前面ニ於テ外部ニ支柱ヲ施シ或ハ「カットル」氏ノ「ペッサリー」ヲ以テ之ヲ施スヲ必要トス但シ「カットル」氏ノ「ペッサリー」ハ後部ニ固著スル者ニシテ一小帯陰門内ヲ上行シ然ル後腰帶ニ固結スルナリ（後屈ノ條ヲ看ヨ）夫レ本編ノ如キハ專ラ單簡ノ施術ヲ載スル者ナルカ故ニ今茲ニ子宮後傾ノ治療ニ用井ル諸種ノ「ペッサリー」ヲ圖解スルニ要ナシ其圖ヲ掲ケ用法ヲ説明スルニハ別ニ一篇ヲ成サヽルヲ得ス故ニ本篇ニハ最モ輙ク施用シ得ヘキ療法ヲ掲載スルヲ以テ足レリトス乃チ子宮ノ後轉、後屈、及脱下ノ症ニ於テ從來未タ備論セサル位置ノ施藥ニ就テ一法ヲ辨明セサル可ラス

第八圖



「ホッヂス」氏改正「ペッサリー」

第九圖



「プロセロエ、スミス」氏彈力「ペッサリー」

卽チ上ニ掲載セル多クノ轉位症ニ於テ多少見ル所ノ骨盤ノ不正角度ヲ改良スルヲ謂フナリ此施藥ニ用フル具ハ「ドクトル、プロセロエ、スミス」氏ノ骨盤帶ナリ此帶ヲ用フレハ腰薦彎曲ノ角度多少減却スルニ（股骨廻轉軸ノ前出、肚腹ノ凸出、股屈筋ノ膨大ニ由テ徵知ス）由テ甚ク地平ニ位スル骨盤漸次ニ後方ニ傾キ遂ニ其平常ノ角度ニ達スルヲ得ル然ルトキハ内臟器ハ其壓迫ヲ除キ子宮隨テ其本位ニ復スルニ至ル斯ノ如キ骨盤ノ位置ノ療法ハ獨リ數多ノ轉位症ヲ本位ニ復スルヲ得ルモノナリ但シ該骨盤帶ハ輕便ニシテ太タ著ケ易ク且衣服ヨリ之ヲ透見セスシテ能ク身體ノ容姿ヲ改良シ却テ患者ノ好シテ之ヲ施スニ至ルヿアリ

〔丙〕脫下

子宮自體ノ重量ニ由リ或ハ膣壁若クハ子宮靱帶ノ如キ子宮ヲ支持スル部分ノ弛縱スルニ由リテ子宮ノ墜下スル者ナリ蓋シ脫出セル子宮或ハ脫下セント欲スル子宮ノ勢ハ極メテ僅少（ナルニ或ハ角度ヲ変セサルアリ或ハ後傾セルアリ或ハ後屈スルアリ或ハ前屈スルアリ）ヨリ子宮全體ノ陰門外ニ墜下スルカ如キ全

然ノ脱出トハ自ラ差異アリ

〔原因〕分娩及分娩後起立スルノ早キニ過ル者、會陰破裂、腫瘍、肥大、新生肥大、分娩後子宮ノ故位ニ復セサル者、膣壁ノ弛縦、血嚢、劇烈ノ努力、墜下、膀胱歇爾尼亞、直腸歇爾尼亞、老齢是ナリ

〔現症〕時トシテハ何等ノ症状ヲモ發スルコトナシ蓋シ其現症タル薦骨部ニ掣痛アリ膣内充實ヲ覺ヘ直腸膀胱ニ刺衝アリ行歩及勞動ニ由テ不快ヲ覺ヘ白帯下ヲ來シ或ハ罕ニ月經痛ヲ發スル者アリ又時トシテハ新生肥大ヲ誘起スルヨリ月經過溢ヲ發スル者アリ

〔徴候〕觸診スルニ子宮低下シ卽チ子宮外孔ノ位置ノ多少挺出スルヲ見ル而シテ子宮窩ハ屢〻延長スル者アリ

〔診斷〕本病ハ子宮口ノ現存スルニ依テ瘜肉ト辨別シ精細ノ撿査ニ據テ子宮頸肥大ト監別シ消息子ヲ用フルニ頼テ内翻ト識別ス

〔豫後〕肥大腫瘍等ヲ合併セサル者ハ治療ヲ加ヘ易シ若シ之ヲ合併スル者ハ難シ

〔治法〕單純ノ脱下ナル者ハ子宮ノ位置ヲ復シ適

當ナル「ペッサリー」ヲ以テ支撑スルニ頼テ足レリトス「ペッサリー」中最要ナル者ハ「ホッヂス」氏ノ單輪「ペッサリー」「グレーリー、ヘーウィット」氏ノ曲輪（第十圖）氣球「ペッサリー」或ハ「ドクトル、ゴトソン」氏ノ改正セル「ツワンケ」氏ノ「ペッサリー」是ナリ但シ「ペッサリー」ヲ用フルニハ其過大ナラサルニ注意スヘシ何トナレハ子宮ノ重量ニ由テ「ペッサリー」ヲ膣壁ニ壓著シ爲ニ潰瘍ヲ生シ膣組織中ニ之ヲ埋メ加之直腸若クハ膀胱ニ潰瘍性ノ穿穴ヲ發スルヿアレハナリ



第十圖

「グレリー、ヘウイット」氏曲輪「ペッサリー」

若シ他病ヲ合併スル者ハ先ツ其合併病ヲ治セサル可ラス乃チ子宮頸ノ肥大セル𪜈ハ之ヲ截斷シ其蜂窠織ニ新生肥大ヲ生スル𪜈ハ之ヲ治癒シ瘜肉或ハ子宮内ニ纖維腫ヲ生スル𪜈ハ之ヲ除去シ而シテ收斂性挿入藥或ハ收斂性注射ヲ膣内ニ施シ患者ヲシテ毎日數時間偏臥セル位置ヲ取ラシメ會陰ノ破裂セル者ハ之ヲ閉合

シ終ニ「シムス」氏ノ法或ハ「ストルツ」氏ノ法ニ頼テ膣縫合術ヲ施スヘシ

〔其十九〕子宮彎屈

子宮多少其常形ニ異ナル者ハ之ヲ名ケテ子宮彎屈ト謂フ

(甲)前屈

子宮ノ體其頸上ニ前屈スル者ナリ蓋シ其屈曲ノ度ニ種々アリ僅少ノ彎屈ヨリ殆ンド直角ニ至ルカ如キノ差異アリ此彎屈症ニ於テハ子宮頸常位ヲ變セサル者アリ或ハ後傾シテ子宮口

ヲシテ前方ハ恥骨部ノ方ニ向フ者アリ此症殊ニ未婚ノ石婦ニ多シ

第十一圖　諸種ノ前屈セル子宮ノ位置ヲ示ス



右ノ圖ニ就テ觀ル所ハ某ノ患者ニ於テ撿査ノ精細ナラサル所ハ施術家ハ子宮前壁ノ纖維腫ニシテ子宮ノ方位常ニ異ナラスト思慮シ或ハ

後傾症ナリト思惟セシムルニ至ル

〔原因〕或ハ先天ナルアリ或ハ卒然ノ緊掣或ハ墜下ナルアリ爾他子宮前壁ノ張力喪亡、子宮内膜炎、子宮體及子宮底前壁ノ腫瘍、腹部腫瘍、大便集積、紐帶ノ緊縛、子宮底ヲ低下セシムル骨盤内蜂窠織炎、圓靭帶ノ短縮等共ニ本病ノ原因ニ屬ス」

〔現症〕尿意頻數ノ症アリ患者ハ之ヲ膀胱ノ刺衝ヨリ來ルト謂フ或ハ又壅塞性月經痛ヲ發スル者アリ若シ彎屈ノ甚シキ𪜈ハ前唇ノ多血ヲ見ル且屢〻蜂窠織ノ新生肥大ヲ發スル者アリ（但シ此病ノ現症ハ子宮頸蜂窠織新生肥大ノ條ヲ見ヨ）又不孕ヲ致ス者アリ

〔徵候〕觸診ヲ行ヘハ子宮頸常ニ異ナラサルカ如ク或ハ子宮口ハ前方ニ向ヒ子宮頸ハ其後方ニ位スルヲ知ル若シ子宮頸ノ前面ニ沿フテ上方ニ手指ヲ送ル𪜈ハ子宮體ト子宮頸トノ聯接スル處ニ於テ多少深キ小溝ヲ觸知ス而メ此小溝ノ前部ニ於テ子宮組織ノ如キ强固ナル腫脹ニ觸ル又聯合撿查ヲ行ヘハ子宮ノ精密ナル形狀ヲ知得スヘシ但シ子宮底ノ腫脹ナルヤ否ヲ證センニハ子宮消息子ヲ送入スヘシ此撿索ヲ爲

スニハ豫メ手指ニテ察知セル子宮形ニ隨テ多少消息子ヲ彎屈セサル可ラサルコト屢之アリ又該彎曲症ニ於テハ以上諸徵ノ外多少子宮内口ノ狹窄スルヲ常トス

〔診斷〕子宮頸前面ノ腫脹ハ前方ニ挺出セル纖維腫ニ由ル者アリ但シ消息子ヲ挿入スレハ子宮溝ノ曲直如何ヲ徵知スヘシ乃チ若シ消息子ヲ挿入スルニ平常ノ方嚮ニ隨テ入ルトキハ消息子ノ尖頭ノ前ニ位スル腫脹ハ恐クハ纖維腫ナルヘシ然レ𪜈若シ消息子腫脹内ニ透入スルトキハ其子宮底ナルヲ知ルヘシ又纖維腫子宮體ノ後面ニ發スルトキハ聯合撿查ニ由テ之ヲ探知シ得ヘシ

〔豫後〕未婚ノ石婦ニ於テハ治シ難シ多產ノ婦人ニ於テハ較ヽ治シ易シ子宮ノ彎屈緊急ニシテ消息子ヲ除却スル後子宮直チニ不正ノ位置ニ還ル者ハ治シ難シ又子宮骨盤ノ高部ニ位スル者モ亦然リ

〔治法〕子宮ノ彎屈太タ緊急ナラス按壓スルモ子宮ニ痛ヲ覺ヘサル者ハ每週或ハ尚ホ數回消息

子ヲ用井テ位置ヲ復スレハ遂ニ全治スルヲ得ヘシ若シ彎屈ノ原因子宮内膜炎ナル者ハ其炎証ノ治スルマテ患者ヲ仰臥セシムヘシ又尿屎ノ通利ヲ催進シテ直腸及膀胱ヲ空虚ニスヘシ今玆ニ子宮外「ペッサリー」ノ功用ヲ論スルニ當リ子宮緊シク彎屈セル者ヲ本位ニ支撑スルニ其須要ナルヿ罕ナリト云ハヽ恐ラクハ余カ説ニ左袒スル者寡ナカル可シ尤モ或ル前屈「ペッサリー」即チ良製ノ「グレーリー、ヘーウィット」氏ノ「グレードル」（「グレードル」ハ骨傷患者ニ於テ衣服ヲシテ患部ニ直接セサラシムル如キ造搆ノ器具ナリ）ノ如キ「ペッサリー」ヲ撰用スルニ由テ治スル者アルハ更ニ疑ヲ容レズ然レ圧余ハ決シテ其成功ノ完全ナルモノニ非ルト云ハサルヲ得ス何トナレハ斯ノ如キ「ペッサリー」ノ支撑スル部ハ子宮頸ト子宮體トノ聯接スル隅角ノ溝中ニ在リテ其上ニ子宮ノ凭倚スル者ナレハナリ「カツトル」氏ノ「ペッサリー」（後屈ノ條ニ出ツ）ハ子宮内療法ニ堪ヘサル患者ニ施シテ多クハ其功ヲ収ムル者ナリ但シ前屈ノ療法ニ於テ眞成ノ功用アル具ハ獨リ子宮内扞トス然レ圧從來謹慎セスシテ之

ヲ用ヰ隨テ腹膜炎或ハ蜂窠織炎ヲ發スルコト數〻ナルカ故ニ遂ニ其効用ヲ蔑視スルニ至レリ蓋シ適當ニ之ヲ用ヰンニハ最モ謹愼セサル可ラス乃チ先ツ患者ヲシテ蓐内ニ安臥セシメ子宮頸ニ蜞針ヲ貼シテ（須要ナルトキハ數回反復スヘシ）按壓スルモ全ク痛ヲ覺ヘサルニ至リ時々消息子ヲ挿入シ以テ子宮ヲシテ之ヲ寛容スルニ至ラシメ是ニ於テ金屬或ハ玻璃製ノ杆若クハ「レムプソン」氏ノ瓦爾華尼杆ノ長サ大約子宮溝ヨリ一「インチ」ノ八分ノ一許短カクシテ其尖頭子宮底ヲ壓迫セサル者ヲ撰用スヘシ之ヲ挿入シテ子宮ヲ縱直ニ保ツ後ハ其金體ヲ本位ニ支撑センカ爲ニ「ホッヂス」氏ノ「ペッサリー」ヲ送入スルヲ良トス尤モ子宮内杆ハ始メハ一回ニ唯數時間留メ置キ後數日數週ノ間堪ヘ得ルニ至ラシムヘシ又壅塞性月經痛ノ患者ニ於テ子宮溝ヲ縱直ニ保チ且張開スルニ由テ該症ニ固有スル疼痛ノ輕減スルヲ察セハ月經時ニ方リテ子宮ノ位置ヲ縱直ニ保タンカ爲ニ經水來ルニ先チテ之ヲ除却スヘシ」若シ子宮内口ノ顯然タル狹窄ニ罹ル者ハ

擴張器ヲ挿入シ「シムス」氏ノ直刀ヲ取テ子宮内口ノ纖維及子宮頸ノ部分ヲ僅ニ截開スヘシ但シ或患者ニ於テハ子宮擴張器ヲ用ヰテ其施術ヲ扶助スヘシ（子宮内口狹窄ノ條ヲ參看セヨ）然リト雖モ彎屈劇クシテ子宮壁厚キ者ハ「マリヲン、シムス」氏ノ法ニ據テ前後ノ截開ヲ施スヲ以テ子宮溝ヲ縱直ニスルヲ最良トス乃チ先ツ子宮溝ノ後面ヲ截開シ消息子ヲ送入シ以テ創部ノ癒著スルニ至ルマテ該部ヲ張開シ然ル後子宮頸前部ノ外側ニ手指ヲ挿シテ溝上ニ達セシメ子宮内口ヨリ直刀ヲ送上シ其纖維ヲ穿チテ指頭ノ方ニ縱徑ニ切開スヘシ此際指頭ノ嚮導ニ由テ太タ深キ截開ヲ爲サヽルヘシ若シ其截開深キニ過ルトキハ危險ヲ將來スルヿアリ是ノ如クニシテ人爲ノ直溝ヲ作リ次テ子宮内杆ヲ送入スレハ治癒ヲ全フスルヲ得ヘシ但シ前屈ノ治療ニ施ス諸術ハ既往ノ炎証ヨリ生スル產物ノ存在セル患者ニ於テハ總テ禁忌トス

〔乙〕後屈

子宮頸上ニ子宮體ノ後屈スル症ニシテ其彎屈

ノ度ハ鈍角ヨリ鋭角ニ至ルノ差異アリ此彎屈症ニ於テハ子宮口及子宮頸ハ共ニ本位ニ違ハサル者アリ或ハ子宮ノ全體位置ヲ轉シテ子宮口ハ恥骨上ニ向フ者アリ

〔原因〕分娩、分娩後子宮ノ全ク故位ニ復セサル者子宮壁ノ衰弱、急卒ノ努力、或ハ墜下、子宮底纖維腫、妊娠、腹部腫瘍、恒久ナル膀胱ノ擴張、便秘、骨盤内炎後ノ收縮是ナリ或ハ蜂窠織新生肥大ヲ本病ノ原因ト做ス者アレ𪜈多クハ是レ本病ノ繼患ナリトス

〔現症〕壓下スルカ如キ感覺アリ殊ニ後部ニ於テ甚シク而シテ後屈セル子宮底ノ壓迫ヨリ器械的ニ便通ノ困難ヲ生シ若シ彎屈ノ度稍、鋭角ニ近キ者ハ子宮絞澁ヲ發シ時アリテハ月經痛ヲ來シ罕ニハ唯彎屈ノミニ由テ妊孕ヲ得サル者アリ爾他白帶下ヲ發シ或ハ後唇ノ蜂窠織新生肥大ヲ起シ繼テ月經過溢ヲ

第十二圖



諸種ノ後屈セル子宮ノ位置ヲ示ス

來シ或ハ痔疾ヲ發スル者アリ

〔徴候〕通例子宮口ハ多少前方ヨリ下方ニ向フヲ覺ヘ子宮頸ハ後方ニ位スルヲ見ル又子宮頸ノ後面ニ沿フテ手指ヲ送レハ小溝ニ達シ且子宮頸ノ後ニ腫脹アルヲ發覺ス聯合撿査ニ就テ按壓スレハ恐ラクハ其腫脹ハ彎屈セル子宮體ナルヲ知ルヘシ然レ𪜈是ヲ確定センニハ宜シク消息子ヲ用フヘシ之ヲ挿入スレハ通常先ツ上後方ニ過キ然ル後多少後方ニ直行シ或ハ彎屈ノ角度ニ随テ後下方ニ嚮ヒ遂ニ腫脹ニ達スルヿアリ

〔診斷〕後屈ト結便トノ別ハ乙ニ於テハ多少柔軟ニシテ捏粉ノ如キヲ觸覺スルニ因テ知リ又纖維腫、骨盤内蜂窠織炎、血囊、卵巣腫瘍トノ別ハ子宮消息子ヲ挿入スルトキハ明カナリ

〔豫后〕通般施療スルニ可ナリ

〔治法〕初發ノ輕症ニ於テハ慎シテ子宮消息子ヲ用フレハ容易ニ本位ニ復スルヲ得ヘシ（後轉ノ條ヲ参看セヨ）或ハ患者ヲシテ兩膝ト肩ヲ床ニ著ケテ俯セシムル位置ヲ操ラシメ後膣壁ニ沿フテ兩指

ヲ挿入シ僅ニ分開シテ以テ膣内ニ大氣ヲ通スヘシ是ニ由テ容易ニ子宮ヲ其不正ノ位置ヨリ擧上スルヲ得ヘシ爾後々轉症ニ於ケルカ如ク簡便ナル「ホッヂス」氏ノ「ペッサリー」卽チ小角度ノ彎曲ヲ具フル者ヲ送入シ屢治効ヲ奏スルヿアリ但シ「カットル」氏ノ「ペッサリー」ハ他ノ同器ノ奏効ナキ時ニ用井テ屢子宮ヲ本位ニ支撑スルヿアリ此器ハ金屬ノ支柱ヲ具スル者ニシテ

第十三圖



「カットル」氏「ペッサリー」

之ヲ前盲嚢或ハ後盲嚢内ニ安ンセシメ或ハ脫下症ニ於テハ子宮ノ全體ヲ支撑スルニ應セシムル者ナリ而メ其内部ヨリ一條ノ曲枝起リ會陰ニ觸レスシテ其周緣ヲ下後方ニ過キ其枝端ニハ一片ノ護謨管ヲ附シ此片陰門ヲ上行シテ腰帶ニ繫著スルナリ」子宮頸肥大或ハ蜂窠織新生肥大ヲ合併スル患者ニ於テハ聊カモ復位ノ策ヲ施サス初メ先ツ其病狀ヲ治スヘシ但シ充血劇甚ナラサル患者ニ於テハ子宮ノ位置ヲ復スルニ由テ充血ノ原因ヲ除却シ隨テ彎屈ヲ回復

スルコアルハ例外ナリ凡テ何ノ症狀ヲ問ハス先ツ初メ子宮ノ充血ヲ減損シ此障碍ヨリ起ル炎証ヲ除クヲ良トス又甚タ頑固ナル症ニシテ消息子ヲ除却スレハ子宮直チニ其不正ノ位置ニ復スル者ニ於テハ「レムプリン」氏ノ子宮杆ノ如キ具ヲ用フルヲ須要トス但シ此具ハ恥骨上ノ外側ニ固著シテ子宮ヲ一ノ位置ニ支持スル者ナリ然レ𪜈是ノ如キ具ハ唯劇症ニ於テノミ施スヘシ何トナレハ子宮ヲ固著シテ身體ノ運動或ハ呼吸ノ運動ニ隨ハシメサルカ故ニ患害

ヲ生スル者アレハナリ」或ハ骨盤帶ヲ要スル者アリ（後轉ノ條ヲ參看セヨ）或症ニ於テハ後腟縫合術ヲ要スル者アリ然レ𪜈此施術ハ十分ノ効驗ヲ奏セサルヲ常トス

（丙）横屈

子宮ノ體子宮頸上ニ右屈或ハ左屈スル者アリ此彎屈症ハ他病ヲ合併セサル者罕ナリ大抵前屈或ハ後屈ヲ合併スルヲ常トス然ルトキハ更ニ之ヲ右前屈、左前屈或ハ右後屈、左後屈ト稱スヘシ

〔原因〕収縮ヲ繼發スル所ノ炎証ナルアリ或ハ罕ニ意外ノ傷害ナルアリ

〔現症〕顯然タラス或ハ卵巣ノ方ニ子宮ノ偏倚壓迫シテ卵巣神經痛ヲ發スル者アリ

〔徴候〕子宮消息子ヲ送入スル𪜈ハ子宮ノ側方ニ腫脹スルハ子宮底ナルヤ卵巣ノ腫瘍ナルヤ若クハ骨盤内蜂窠織炎ノ沈澱物ヨリ生スル腫瘍ナルヤヲ定斷スルヲ得ヘシ

〔診斷〕上ノ如キ徴候ニ依ル

〔豫後〕施療スルモ凶ナリ

〔治法〕前屈或ハ後屈ニ於ケルカ如ク其治法ヲ施スヘシ

〔丁〕内翻

子宮ノ多少内側ニ翻轉スル者ナリ之ニ全不全アリ其不全ノ内翻ニ於テハ子宮底翻轉スルモ子宮口ヨリ挺出セサル者アリ或ハ子宮底ノ子宮口ヨリ挺出スルモ子宮頸ノ全ク翻轉セサル者アリ其全然ノ内翻ニ於テハ子宮ノ全體ト共ニ子宮頸ノ全ク翻轉シ或ハ翻轉セル子宮陰門ニ挺出スルヿアリ

〔原因〕子宮壁ノ弛緩スル際ノ努力、分娩時臍帯ノ緊掣子宮底ノ腫瘍、瘜肉或ハ分娩時卒然子宮ノ攣縮スル等是ナリ

〔現症〕失氣出血、生力虚脱、是ナリ蓋シ慢性ノ内翻ニ於テハ定時ノ出血（即チ月經性出血）アリテ背腰部掣痛シ尿意頻數ニシテ且困難ス

〔徴候〕手指ヲ挿入シテ撿索スレハ膣内ニ腫瘍アルヲ覺ヘ不全ノ内翻症ニ於テハ子宮口ニテ其腫瘍ノ根底ヲ圍擁スルヲ察ス然レ𪜈全然ノ内翻症ニ於テハ唯膣ノ穹隆部ヲ除クノ外毫モ周圍ニ子宮孔ノ輪状ヲ覺フルヿナシ又子宮底ノ子宮口ヨリ挺出セサル症ニ於テハ獨リ精細ノ撿査ニ因テノミ診斷スルヲ得ヘシ是ノ如キ症ニ於テハ腫瘍ノ周圍ニ於ケル子宮溝ノ短小ナルト聯合撿査ニ據テ子宮底ノ低下スルヲ證知スルトヲ以テ確乎タル診斷ヲ得ヘシ又此症ニ比スレハ常ニ多ク見ル所ノ一症即チ子宮底ノ子宮口ヨリ脱過スル者ニ於テハ次ノ徴候ニ由テ診斷スヘシ該症ニ於テハ内翻セル子宮ノ内面滑澤ニシテ許多ノ病的腫瘍ト其形質ヲ異ニ

シ子宮鏡ヲ以テ撿スレハ子宮ノ内膜ヲ認知シ消息子ノ尖頭ヲ後方ニ向ケテ膀胱内ニ送入スレハ直腸内ニ挿入セル手指ニ觸ル（若シ子宮底中間ニ位スル𪜊ハ然ラス）是ニ於テ子宮消息子ヲ取リ周圍ノ子宮頸ト子宮底トノ間ノ空處ニ挿入シ腫瘍ノ周圍ニ移廻スヘシ然ル𪜊ハ子宮ノ在ルヘキ位置ニ唯浅溝ノ存スルヲ察スヘシ

〔診斷〕上ノ徴候ニ於テ瘜肉ト鑑別スヘシ但シ瘜肉ノ患者ニハ子宮消息子ヲ瘜肉側ヨリ送入スレハ子宮管ニ達スヘシ

豫後若シ内翻ニ繼發スル炎証ノ爲ニ腹膜面ノ癒著ヲ生セサル者ハ吉ナリ

〔治法〕内翻ヲ轉シテ故ニ復スヘシ乃チ器械ヲ以テ久時壓搾ヲ施シ或ハ攣縮セル子宮頸ヲ截開シ或ハ下ヨリ壓搾ヲ加ヘテ同時ニ腹部ヲ截開スル等ノ諸術ヲ施行セシヿアリ但シ腹部ヲ截開スルノ目的ハ内翻セル部ノ盃狀窩ヲ擴張スルニ在リ然レ𪜈内翻ノ症ニ於テ患者ノ忍耐シ得ル𪜊ハ熟練セル手術ヲ以テ足レリトス乃チ其手術ヲ施スニ方リテハ先ツ患者ヲシテ仰卧

シ充分ニ迷矇水ヲ嗅引セシメ然ル後一手ヲ膣内ニ送入シ一手ヲ恥骨上ノ腹壁ニ當テ以テ子宮上ニ對壓ヲ施シ（此際强過セラレタル位置ノ痙攣ヲ避ンカ為ニ屢〻手ヲ交換スルヲ要ス）膣内ノ手ニテ子宮底、握リ初メ先ツ絞搾シテ子宮底ノ血液ヲ消退セシメ以テ之ヲ柔軟ニシ然ル後若干時ヲ經テ復故ノ術ヲ施スヘシ蓋シ此術ハ最後ニ翻轉セル部即チ子宮頸ニ近キ部ヲ推反スルヲ謂フナリ然レ𪜈手指ノ長短均一ナラサルニ由リ施術頗ル困難ナリトス施術ノ後ハ手指ニテ子宮底ノ中央ヲ久シク强壓シ以テ陷没ヲ生セシメ後尚ホ壓托ヲ持續スヘシ是レ從來既ニ稱譽セル所ナリ然レ𪜈此法ハ屢〻失敗スルヿアリ何トナレハ子宮底ノ中央ヲ强壓スルトキハ必ス横徑ニ突出スルヲ以テ子宮底ノ子宮頸ヲ透過スルヲ妨礙スレハナリ

内翻ヲ復故スルノ最良法ハ紐育ノ「ドクトル、ノイゲラス」氏ノ法ナリ此法ハ外側ニ對壓ヲ持續シ（時アリテハ薦骨岬ト之ニ向テ壓迫スレル子宮トニ由テ稗益ヲ得ルヿアリ）一指ニテ偏側喇叭管ノ附著スル處ヲ觸知シ以テ其上ヲ漸徐ニ强壓スルニ在リ然ルトキハ子宮壁中該

部最モ脆薄ナルカ為ニ必ス壓ニ随テ陷没シ爾後尚壓托ヲ持續スル片ハ子宮速ニ故位ニ復スルヲ常トス蓋シ此法ヲ慎重ニ持續スレハ概子子宮ノ内翻ヲ故ニ復スルヲ得ヘシ

分娩ノ第三期中ニ内翻ヲ發スル者ハ先ツ全子宮底ヲ胎盤ト共ニ固握シテ以テ一齊ニ其位置ヲ復故シ然ル後胎盤ヲ除却スヘシ

慢性ノ内翻ニ於テ復故シ難キ者ハ子宮ヲ截除スルニ如クハナシ

第七編

膣諸病

〔其一、〕〔膣加答流〕

清澄ナル粘液ノ流洩ヲ見ル所ノ膣粘膜ノ症狀ナリ是粘膜内毛細管ノ弛緩ニ次テ充血ヲ發スルヨリ起ル者ナリ

〔原因〕房事過度、感冒、膣内ノ異物是ナリ

〔現症〕膣ノ周圍ニ多少熱ヲ帶ヒ兼テ身體ノ衰弱ヲ覺ヘ他ニ合併ノ病狀ナシ

〔徴候〕過剰ノ蛋白様白帶下ヲ漏シ其中ニ膿ヲ含有スルヿナシ

〔診斷〕子宮頸内膜炎トノ別ハ子宮頸ヲ撿査スルニ依テ知ル

〔豫後〕吉ナリ

〔治法〕明礬（第三方〔四〕）石炭酸（第三方〔三〕骨盤内腹膜炎ノ條ニ出ツ）「ソルホ、カルボレート、オフ、ヂンク」（第三方〔八〕）單寧（第三方〔九〕子宮唇顆粒炎ノ條ニ出ツ）等ヲ撰ミテ膣内ニ注射スヘシ

〔第三方〕注射藥

〔四〕明礬注射　明礬（百二十匁）水（一巴印篤）ヲ取リ混和シ施ス

〔八〕「ヂンク、ソルホ、カルボラチス」注射　「ヂンク、ソルホ、カルホラチス」（百匁）水（一巴印篤）ヲ取リ混和シ施ス

〔其二〕膣炎

膣粘膜ノ單純ナル炎証ナリ

〔原因〕感冒、房事過度「ペッサリー」、悪臭液ノ漏泄、腐蝕藥、姙娠是ナリ

〔現症〕膣内焮熱シ會陰内ニ刺痛ヲ覺ヘ小便頻數ニシテ膿様ノ白帶下ヲ洩シ陰門及股部ヲ按壓スレハ疼痛ヲ覺フ

〔徴候〕小陰唇腫脹シテ赤色ヲ發シ膣部赤色ヲ呈シ膿様液ヲ被ムリ交接スレハ痛ヲ發シ時トシ

テハ炎証延テ「ナボレアン」腺ニ及ヒ該腺ヨリ稠膿液ヲ洩シ又顆粒ノ簇生セル所ニ一種ノ小囊アリ通常妊娠ニ兼發シ或ハ他部ノ炎証ヲ誘發スルヿアリ

〔診斷〕該炎ヲ淋疾ト鑒別スルハ極メテ難シ時トシテハ全ク之ヲ辨別シ得サル者アリ（淋疾ノ條下ヲ参看セヨ）

〔豫後〕若シ急性ナル者ハ大約二週間ニシテ治スヘシ然レ𪜈若シ慢性ナル者ハ定限アルヿナシ

〔治法〕患者ヲ十分ニ靜息セシメ阿片ノ坐藥ヲ施シ温湯ニ澱粉及罌粟球浸ヲ和シテ腟内ニ注射シ或ハ硫酸亞鉛（第三方㊅子宮顆粒炎ノ條ニ出ツ）「ソルホ、カルボレー」（第三方㊇腟加答流ノ條ニ出ツ）明礬（第三方㊃同上）單寧（第三方㊈子宮唇顆粒炎ノ條ニ出ツ）ヲ取テ腟内ニ注射シ硝酸銀水（硝酸銀六十氏水一泻）ヲ塗擦シ亞爾加里性ノ藥劑ヲ用フヘシ

〔淋疾〕

腟陰門及尿道ノ炎証ニシテ本ト媾合時ノ一種特異ノ傳染ヨリ起ル者ナリ

〔原因〕淋疾ヲ患フル男子ト交接スルニ由ル

〔現症〕發熱アリ小便頻數ニシテ會陰及股部ニ刺

痛ヲ覺ヘ通尿間灼クカ如キ疼痛ヲ發シ膿様白帶下ヲ漏シ陰門周邊ノ表皮剥脱ス

〔徵候〕腟腫脹シテ焮赤シ按壓スレハ痛ヲ覺ヘ眼ノ周圍ニ暗輪ヲ呈シ尿道ヨリ膿ヲ漏洩ス

〔診斷〕病性ノ猖獗ナルト顯著ナル尿道ノ合併病アルト患者ノ來歴トニ據テ斷スヘシ

〔豫後〕本病ノ經過短キハ二三週ニシテ治シ長キハ數月數年ヲ瀰ルヿアリ其合併病ハ便毒、陰門膿瘡、膀胱炎、子宮內膜炎、骨盤內腹膜炎ニシテ或ハ死ニ陷ル者アリ

〔治法〕醋酸鉛（第三方（七））「ソルホ、カルボレート、オフ、デシク」（第三方（八）腟加答流ノ條ニ出ツ）及上ニ擧ル藥劑ヲ取テ注射ヲ施シ濃硝酸銀水（硝酸銀三十瓦乃至六十瓦水一℥）ヲ塗擦シ單寧酸虞里斯抹ト阿片ノ塞子（第七方（三））ヲ施シ內服ニハ醋酸加里、重炭酸加里、菲沃斯ヲ用ヰ亞爾箇兒、咖琲、香料胡椒等ヲ禁スヘシ

〔第三方〕注射藥

〔七〕醋酸鉛注射　亞醋酸鉛（ʒ一）水（一巴印篤）ヲ取リ混和シ施ス

〔第七方〕塞子

〔一〕塞子ハ綿絮ヲ取テ臨機須要ノ大サニ作ルヘシ通常「タングリン」柑（按スルニ我邦ノ蜜柑ノ大サナラン）ノ大サヲ以テス乃チ糸ヲ以テ之ヲ纏ヒ而メ其糸端ヲ長ク残シテ結合シ之ヲ除却スルニ供スヘシ蓋シ塞子ヲ用フルニハ唯其面ニ虞里斯林ヲ塗布スルノミヲ以テ足レリトセス必ス之ヲ虞里斯林中ニ浸シ能ク揑シテ半泻乃至一泻ノ虞里斯林ヲ含ミ軟塊トナルニ至ラシメ然ル後子宮鏡ヲ以テ挿入シ子宮頸ニ向ツテ固塡スヘシ而シテ若シ尚ホ他ノ塞子ヲ要スル𪜈ハ再ヒ乾燥セル塞子或ハ橄欖油中ニ蘸セル塞子ヲ送入スヘシ尤モ第二ノ塞子ヲ送入スルニ由テ第一ノ塞子ノ糸ヲ除去シ能ハサル處ニ舉上セサラシムヘシ又第二ノ塞子ヲ纏フ糸ハ第一ノ塞子ト異ナリタル結頭ヲ作リ以テ始メニ之ヲ除却スルノ目標ト爲スヘシ但シ虞里斯林、石炭酸虞里斯林、單寧酸虞里斯林或ハ之ニ少量ノ濃石炭酸水（第五方〔三〕子宮頸内膜炎ノ條ニ出ツ）ヲ和セル塞子ハ共ニ子宮頸ニ向フ所ノ部分ニ止ムルヿ十二時間ナルヘシ

〔其三、膣膿瘡〕

腟壁下或ハ陰門腟腺內ニ發生スル膿瘡ナリ

〔原因〕姙娠、汚物、腟炎是ナリ

〔現症〕腟熱シテ疼痛シ且築動ヲ發ス

〔徵候〕腟腫脹シ按壓ニ由テ痛ヲ覺ヘ且赤色硬固ニシテ緊張ス

〔診斷〕炎ノ徵候ヲ現存スルニ由テ囊腫ト鑑別スヘシ

〔豫後〕吉ナリ

〔治法〕肢體ヲ安息セシメ温蒸濕法ヲ施シ膿ヲ導泄スヘシ

〔其四、腟瘢痕〕

一箇ノ柔軟帶ニシテ或ハ腟ヲ橫過シ或ハ子宮頸ヨリ腟壁ニ亘リ或ハ廣大ニシテ幾ント腟ヲ蓋閉シ或ハ全ク之ヲ塡塞スル者ナリ

〔原因〕分娩、胎兒頭ノ久時ノ壓迫ヨリ起ル炎証、器械「ペッサリ」ノ妄用其他腟ノ傷害是ナリ

〔現症〕若シ瘢痕ノ小ナル者ハ何等ノ現症ヲモ發スルヿナシ然レ𪜈或ハ一條餘ノ帶アリテ子宮頸ヲ牽引シ以テ其轉位ヲ起シ或ハ媾合ノ障碍ヲ致スヿアリ

〔徴候〕瘢痕ヲ觸診スルニ硬固不撓ノ帯ナルヲ覺ユ

〔診斷〕容易ニシテ大抵他ノ病狀ト誤認スルヿナシ

〔豫後〕瘢痕小ナル者ハ吉ナリ

〔治法〕若シ瘢痕アルモ絶テ妨害ヲ發セサル者ハ放棄シテ之カ治療ヲ施サヽルヲ最可トス何トナレハ腟ノ瘢痕ヲ截開スルトキハ毎常蜂窠織炎ヲ發スルノ危殆ヲ免レサレハナリ然レトモ若シ手術ヲ要スル者ハ愼ンテ之ヲ施シ數、喞筒ニ消

毒液ヲ充テヽ腟内ヲ洗滌シ且若干週間ヲ隔テテ腟擴張器（第十四圖腟壁攣縮ノ條下ニ出ツ）ヲ挿入スヘシ

〔其五、膀胱腟瘻瘡〕

膀胱ヨリ腟ニ通スルノ瘻瘡ナリ即チ〔一〕ハ尿道ヨリ通シ〔二〕ハ腟壁ヨリ通シ〔三〕ハ子宮頸ヨリ通シ〔四〕ハ膀胱ヨリ直チニ子宮ニ通ス

〔原因〕分娩時ノ延久ナル壓迫、傷害、膿瘡是ナリ

〔現症〕尿利間斷ナク持續シ瘙癢甚ヘ難ク表皮剝脱シ腟及陰門ニ尿ノ沈澱物ヲ貽シ全身ノ健康ヲ妨碍ス

〔徴候〕觸診ヲ行ヘハ瘻孔ヲ覺ヘ或ハ消息子ヲ膀胱ニ送入スレハ瘻孔ヲ貫透シテ膣内ニ挺出ス然レ𪜈若シ瘻孔甚タ小ニシテ右ノ方法ニ據ルモ容易ニ鑑識スルヲ得サル者ハ膀胱内ニ牛乳ヲ注入スヘシ然ルトキハ其患部ヲ通過スルニ由テ瘻孔ヲ發覺スルヲ常トス

〔診斷〕上ノ徴候ニ據ル

〔豫後〕太タ廣大ナラサル者ハ吉ナリ

〔治法〕尋常ノ瘻瘡ニ比スレハ差ゝ罕ナル數種ノ瘻瘡ニ在テハ特別ノ手術ヲ要スルヿアリ然レ𪜈之ヲ細論スルハ一小冊子ノ能ク悉ス所ニアラス故ニ今茲ニ最モ多ク施用スル所ノ一二ノ手術ヲ附載セントス乃チ〔一〕縫合法〔二〕膣閉合法是ナリ

〔縫合法〕此法數多アリト雖𪜈就中「レムス」氏及「レモン」氏ノ法ヲ最良トス

〔甲〕「レムス」氏ノ法　是法ヲ施スニハ先ツ患者ヲシテ「レムス」氏半傾ノ位置ヲ爲サシメ同氏ノ子宮鏡ヲ挿入シ小鈎ヲ以テ瘻瘡縁ヲ鈎持シ小狹刀或ハ曲剪ヲ取テ充分ニ瘡縁ヲ截離スヘシ尤

モ十分ニ廣ク剥離シ而シテ可及的膀胱ノ粘膜ヲ損傷セサランコトヲ要ス然ル後小圓曲針ニ絹糸ヲ貫キ以テ腟面上ノ創縁ヲ距ル大約一「インチ」ノ三分一ノ創唇ニ於テ前後ニ絹糸ヲ穿透シ（此際膀胱ノ粘膜ヲ穿透スルコト勿レ）絹糸ニ賴テ纖細ナル銀線ヲ透引シ而ル后鑷子及「レムス」氏ノ支柱或ハ８字形ノ捻轉子若クハ「アヴェリングス」氏ノ螺旋管ヲ以テ右ノ縫糸ヲ捻轉シ縫合糸ノ末端ヨリ小球ヲ貫通シテ以テ縫糸ヲ短ク截去シ「カテーテル」ヲ膀胱内ニ送入シ留メ置クヘシ此手術ヲ施ス前先ツ膀胱内ノ血塊ヲ清除セシカ爲ニ喞筒ヲ用テ洗滌スヘシ又豫メ阿片ヲ用ヰテ大便ヲ秘閉セシム而シテ施術後ハ八日ヨリ十四日ニ至ルマテ縫糸ヲ除却スルコト勿レ

〔乙〕「レモン」氏ノ法　此法ヲ施スニハ先ツ患者ヲシテ大ナル截石術ノ位置ヲ操ラシメ縫糸ヲ子宮頸ニ穿透シ以テ子宮ヲ前引シ子宮鏡及壓排器（レトラクトルス）ヲ操テ腟内ヲ能ク開張シ深ク瘻瘡縁ヲ剥離シテ膀胱粘膜ニ及ヒ或ハ該膜モ倶ニ剥離シ二列ノ絹糸ヲ取リ一ハ深ク且廣ク穿入シ一ハ右

ノ絹糸間ニ貫透シテ創縁ヲ維持セシメ然ル後両絹糸ト共ニ綁結スヘシ爾後ノ療法ハ患者ヲシテ最モ佳適ノ位置ヲ操ラシメ自ラ尿ヲ通利セシメ第八日ニ至リテ縫糸ヲ除却シ灌腸ヲ施シテ大便ヲ通シ患者ヲシテ大約一週ニシテ起居セシムルニ在リ

〔膣閉合法〕瘻瘡ニ罹ル患者ニ於テハ其病状ニ隨テ適當ノ手術ヲ決センヿヲ要ス故ニ該施術ノ須要ナルヲ見ハ固ヨリ之ヲ施サヽル可ラス其法先ツ大陰唇ノ最モ近縁ヲ截離シ然ル後大陰唇ヲ合著セシムルニ在リ或ハ膣壁ヲ削離シテ後癒著セシムルモ可ナリ但シ「カテーテル」ヲ膀胱内ニ挿入シ癒著ノ完成スルニ至ルマテ留メ置ンヿヲ要ス

〔其六、直腸膣瘻瘡〕

直腸ト膣トノ間ニ發スル瘻瘡ナリ

〔原因〕分娩時ノ久シキ壓迫、傷害、膿瘡是ナリ

〔現症〕膣ヨリ大便或ハ大氣ヲ漏洩ス

〔徴候〕或ハ觸診ニ依テ瘻孔ヲ發見スルヿアリ或ハ直腸ニ消息子ヲ送入スレハ瘻孔ヲ貫キテ膣

内ニ挺出スルヿアリ若シ瘻孔太タ小ニシテ右ノ撿索ヲ行フモ之ヲ確明スル能ハサルトキハ直腸ニ牛乳ヲ注射スヘシ然ル時ハ則チ瘻孔ヨリ其漏出スルヲ見ルヘシ

〔診斷〕右ノ現症及徵候ニ據テ診知スヘシ

〔豫後〕吉ナリ

〔治法〕膀胱膣瘻瘡ノ如ク亦瘻瘡緣ヲ截離シテ後縫合スヘシ蓋シ手術ヲ施スノ後ハ阿片ヲ用井テ十日或ハ十二日ノ間大便ヲ秘閉セシメ爾後始メテ便通ヲ疏開スルニハ緩下劑ヲ與フヘシ

〔其七〕膀胱歇爾尼亞

膣ノ前壁膀胱ト共ニ降下シテ膣内ニ腫脹ヲ形成シ或ハ陰門ヨリ挺出スル者ナリ

〔原因〕前膣壁ノ弛縱、結石、會陰ノ破裂是ナリ

〔現症〕尿意頻數ニシテ且困難シ膀胱ヲ全ク空虛ニスル能ハサルカ爲ニ遺留スル所ノ尿分離シテ安母尼亞性トナリ膀胱加答流ヲ發シ疼痛焮熱努責ノ症ヲ顯ハス

〔徵候〕膀胱ニ消息子ヲ挿入スレハ脫下セル腫脹内ニ膀胱ノ存在スルヲ知ル

〔診斷〕腸歇爾尼亞ト鑒別スヘシ（次條ヲ看ヨ）

〔豫後〕概子吉ナリ

〔治法〕姑息療法ハ輕症ニ於テハ局處ニ收歛藥ヲ外用シ「ペッサリー」ヲ用井テ患部ヲ支撐スルニ在リ蓋シ全治ノ効ヲ收メンニハ腟縫合術陰唇縫合術或ハ會陰縫合術ヲ施サヽル可ラス但シ「シムス」氏ノ稱譽セル腟縫合術ハ前腟壁ヲ十分ニ剝離スル法ナリ乃チ尿道孔ノ後半「インチ」ヨリ子宮頸ノ近傍ニ至ルマテ卵圓部ヲ切除シテ其緣ヲ左右若クハ前後ニ縫接スルニ在リ或ハ「トーマス」氏ノ說明セル方法ニ從テ腟壁ヲ膀胱ヨリ剝離シ其皺襞ヲ締紮シテ後之ヲ截去シ縫合ヲ施スヲ良トス或ハ又「ストルツ」氏ノ獨用セル方法ニ隨テ該術ヲ施スモ可ナリ（子宮前傾ノ條下ニ就テ看ルヘシ）陰唇縫合術ハ結菓良善ナラス會陰縫合術ハ通例膀胱歇爾尼亞幷ニ直腸歇爾尼亞ニ於テ要スル者ナリ

〔其八、直腸歇爾尼亞〕

直腸腟歇爾尼亞ナリ卽チ後腟壁ト共ニ直腸ヲ前方ニ膨出スル者ナリ

〔原因〕頑固ナル便秘、會陰ノ破裂、後膣壁ノ弛縦是ナリ

〔現症〕直腸膣嚢内ニ大便充積シ疼痛努責刺衝ヲ發シ兼テ腸ヨリ粘液ヲ洩下ス

〔徵候〕灌腸ヲ施ス後直腸ヲ詮索スレハ病狀ヲ證知スヘシ

〔診斷〕前ノ現症及徵候アルニ由テ定斷スヘシ

〔豫後〕凶ナリ

〔治法〕姑息療法ハ氣球「ペッサリー」ヲ用フルニ在リ但シ手術ニ賴テ全治ノ効ヲ收メント要スルトキハ後膣縫合術及會陰縫合術ヲ施スヘシ

〔其九、腸歇爾尼亞〕

腸膣歇爾尼亞ナリ卽チ小腸ノ一部骨盤內ニ低下シ膣內ニ於テ膨起スル症ニシテ通常直腸膣嚢内ニ起ル者ナリ

〔原因〕分娩間ノ緊掣是ナリ

〔現症〕膣內疼痛シ兼テ充實ヲ覺フ

〔徵候〕膣內ニ腫脹シテ緊張ス且彈力ヲ帶フ然レトモ蓄液アルヲ見ス

〔診斷〕本病ヲ診斷スルニ方テハ血嚢、骨盤內沈澱

物卵巣轉位等ノ如キ腫脹狀ト異ナルヲ撿スルヲ肝要トス又氣囊ノ一種特異ナル感覺アルハ觸診ニ依テ十分ニ知了スヘシ然レ𪜈鑒定困難ナル症ニ於テハ細小洩液器ヲ用フルニ如クハナシ是ニ由テ大抵疑團ヲ氷解スルヲ得ヘシ

〔豫後〕凶ナリ

〔治法〕復故ノ策ヲ處スルニ在リ乃チ患者ヲシテ膝肩ノ位置ヲ爲サシメ以テ歇爾尼亞ヲ推上スヘシ是法ヲ行フ后ハ患者ヲシテ充分靜息セシメ阿片ヲ與ヘ收斂藥ヲ取テ膣內ニ注射シ或ハ收斂「ペッサリー」ヲ施スヘシ

〔其十、膣癌〕

膣ヲ侵ス所ノ癌腫ハ通常表皮癌ナリトス此類ノ癌腫ハ膣口近傍部ニ發シテ恰モ疣狀ノ發育ヲ擬スル者アリ或ハ子宮頸ノ萌芽狀癌若クハ陷没性瘍ノ延蔓スルニ由テ起ル者アリ

〔原因〕詳明ナラス蓋シ遺傳ノ素質、淋疾（疑惑決シ難シ）汚物等ハ病機ヲ誘發スル者ナリ

〔現症〕局處ノ疼痛劇甚ニシテ始メ水様液ヲ漏シ後ニ至テ惡臭液ヲ洩シ交媾ニ由テ疼痛增劇シ

爲ニ出血スル者アリ

〔徵候〕患部ヲ觸診スレハ膣粘膜上ニ鬆粗ノ隆起アルヲ覺ヘ其面稍〻脆弱ニシテ抵觸ヲ受レハ忽チ出血シ差〻進期ニ於テハ腫脹ヲ發シ膣管ヲ壅塞スルニ至ル

〔診斷〕來歷、疼痛及傍發スル所ノ疾患ニ據テ究ト鑑別スヘシ

〔豫後〕凶ナリ」膣ノ表皮癌ヲ根絶スルニ最モ困難ナルハ膣ノ粘膜結締織ノ廣層ニ連接スルノ鬆粗ナルカ故ニ病勢容易ク近傍部ニ累及シ速カニ瀰蔓スルニ由テ有益ノ治療ヲ施スヿ能ハサルナリ仮令癌腫ヲ除却スルモ再發シ易キ者トス

〔治法〕初發ナル者ハ十分ニ切除シ烙鐵ヲ以テ盡ク創部ヲ燒灼スヘシ若シ病ノ瀰蔓スル者ハ半圓鑿ヲ取リ可及的之ヲ除却シテ烙鐵ヲ貼シ或ハ膣壁ヲ十分ニ截去スヘシ施術後ハ屢〻石炭酸注射（第三方三骨盤内腹膜炎ノ條ニ出ツ）ヲ施シ以テ腐敗性ノ吸收ヲ豫防スルニ注意スヘシ

〔其十一、膣嚢腫〕

腟壁ノ移動スヘキ緊張腫ニシテ或ハ罕ニ「ヒダチッド」（胞蟲）ナル者アリ

〔原因〕未詳

〔現症〕腟管ニ腫脹ノ挺出スルノミ他ニ何等ノ現症ヲモ見ルヿナシ

〔徴候〕膿瘡トノ別ハ焮熱赤色ヲ欠クト腫脹ノ移動スルト且透明光耀ノ景狀アルトニ係ル

〔診斷〕上ノ如シ

〔豫後〕吉ナリ

〔治法〕漉液器ヲ用井テ蓄液ヲ導泄シ或ハ嚢壁ノ一部ヲ截去シ或ハ愼重シテ全ク嚢腫ヲ切除スヘシ

〔其十二、腟瘜肉〕

稀有ノ腫瘍ナリ卽チ纖維織或ハ結締織ニ係ル所ノ小腫ニシテ或ハ無脚ナル者アリ或ハ有脚ニシテ腟壁ニ懸ル者アリ

〔原因〕明カナラス恐クハ刺衝ナルヘシ

〔現症〕時アリテハ鈍キ刺痛ヲ覺ヘ且壅塞ニ由テ不便ヲ生ス

〔徴候〕腫瘍腟壁内ニ移動スルヲ覺ヘ其質嚢腫ニ

比スレハ稍、緻密ナリ

〔診斷〕上ノ如シ

〔豫後〕吉ナリ

〔治方〕截斷シテ除却シ或ハ締斷器ヲ用ヰテ切除スヘシ

〔其十三、膣破裂〕

第十三編ニ就テ見ルヘシ

〔其十四、膣狹窄〕

膣偏側ノ瘢痕ニ由テ收縮スル者ナリ卽チ膣ノ一部ニ位スル圓帶ノ如キ是ナリ

〔原因〕腐蝕藥「ペッサリ｜」久時ノ施用、傷害、分娩是ナリ

〔現症〕不孕ヲ致ス者アリ膣ハ通常短縮スルヲ見ル

〔徵候〕檢査スレハ小孔ヲ發見ス此孔始メハ開哆セル子宮口ト誤認シ易シ然レ𪜈該孔ニ指ヲ挿シテ送進スレハ狹窄上ニ子宮頸アルヲ知ル

〔診斷〕上ノ如シ

〔豫後〕治療スルニ愼戒ヲ加フヘシ

〔治法〕少シク截開シテ强ク裂開スヘシ而シテ施

術後ハ毎日「ブーシー」若クハ「シムス」氏ノ腟擴張器（第十四圖）ヲ挿入シテ數時間留メ置クヘシ

第十四圖



「シムス」氏ノ腟擴張器

〔其十五〕腟壁攣縮

處女膜ノ部位知覺過敏ニシテ腟括約筋ノ攣縮ヲ起シ爲ニ交接ヲ妨礙スル者ナリ

〔原因〕歇斯的里、表皮剝脫、腟孔脈管腫、腟炎、肛門ノ破裂、遺留セル處女膜ノ知覺過敏、過大ノ陰莖是ナリ

〔現症〕交接セントスレハ劇痛ヲ發シ之カ爲ニ不孕ヲ致シ又行歩シ或ハ患部ニ觸ルレハ痛ヲ覺フ

〔徵症〕檢査ヲ行ヘハ劇痛ヲ發シ且腟括約筋ノ攣縮ヲ起ス或ハ小ナル消息子ヲ挿入スルモ忽チ痛ヲ發スル者アリ

〔診斷〕歇斯的里ト局處患害トノ區別ヲ爲スニ在リ

〔治法〕若シ歇斯的里ナル者ハ全身療法ヲ施シ强

壯藥ヲ與ヘ運動ヲ命シ鉛糖ト阿片ノ合劑（第三方（七）淋疾ノ條ニ出ツ）ヲ注射シ或ハ莨菪「ペッサリー」（第一方（三）卵巣炎ノ條ニ出ツ）ヲ施シ時々膣擴張器ヲ插入シ漸次ニ大ナル者ヲ用并静息ヲ命スヘシ若シ處女膜ノ部位ニ於ケル收縮ニ因ル者ハ先ツ指ニテ强ク擴張シ後擴張器ヲ用フヘシ又處女膜ノ裂縁ノ知覺過敏ニ由ル者ハ曲剪ヲ取テ處女膜ノ殘縁ヲ盡ク截去シ然ル後膣ヲ擴張シ後縫合部ニ近邇セル中線ノ各側ニ就テ左右ニ截開シ而ル後朝夕玻璃製擴張器ヲ送入シテ毎ニ二三時間留メ置キ丁字帯ヲ以テ之ヲ壓定シ日々怠慢ナク數週間持續スヘシ但シ姙娠ハ本病ヲ治スルノ最モ妙機ナリ

簡明婦人病論巻之四畢