

簡明婦人病論

安藤正胤譯

六

×

k 46

富士川文庫

×

495.1

Ka

4

F 4
カ-112

495.1
K2
4
No. 2530
12 K 46

米國斯密私氏著
日本安藤正胤譯

簡明婦人病論

東京 爽然樓藏版



簡明婦人病論卷之六

米國斯密私氏著
日本安藤正胤譯


第十一編

妊婦併發諸病

本編ハ主トシテ局處ノ疾病及患害ヲ論述スルヲ要ス

其一、尿利失禁

尿意頻數ニシテ或ハ失禁スル者ナリ
原因妊婦ノ子宮前傾シテ絶ヘス膀胱上ヲ壓迫



富士川文庫
3154

簡明婦人病論

卷六

一

爽然樓藏版

スル者、腔ノ前壁延展シテ多少尿道ヲ張開スル者或ハ尿閉ニ罹ル患者ノ小便充漲是ナリヲ次條看

〔現症〕上ニ同シ

〔徵候〕同上

〔豫後〕妊孕月ヲ重ヌルニ隨テ吉ナリ

〔治法〕前傾「ベツサリ」ヲ用井患者ヲシテ仰卧セシムヘシ或ハ寢牀ノ脚ヲ六「イン」チ乃至十「イン」チ許高舉シテ仰卧セシムヘシ

〔其二、尿閉〕

尿意頻數ニシテ困難或ハ全ク閉止スル者ナリ原因妊婦ノ子宮後傾或ハ後屈スル者ニ於テ子宮頸ノ前進スルヨリ膀胱頸ヲ壓迫スル者はナリ

〔現症〕全身違和シ膀胱頸ニ限局セル疼痛アリ膀胱及直腸ノ絞澁ヲ發シ小便滴瀝シテ安母尼亞性トナル

〔徵候〕下腹部ニ波動アル腫脹ヲ呈シ卵巢囊腫ト誤認シ易シ腔内ヲ検査スレハ子宮頸ノ膀胱頸ヲ前壓スルヲ覺ヘ且子宮底ハ膨大シテ骨盤腔

ヲ占ムルヲ察ス
〔診斷〕加多的兒ヲ用フレハ卵巢囊腫ト辨別スル
ヲ得ヘシ

〔治法〕患者ヲシテ蓐内ニ静息セシメ定時ニ小便
ヲ導洩シ鎮痙「ベッサリ」第一方卵巢炎ヲ施スヘ
ノ條ニ出ツ
シ若シ胎孕月ヲ重ヌルモ子宮自ラ回復セサル
者ハ腔或ハ直腸ヨリ子宮底ヲ漸徐ニ強壓シテ
子宮ヲ本位ニ復スルノ策ヲ施スヘシ或ハ又氣
球「ベッサリ」ヲ用フルモ亦可ナリ若シ此等ノ方
法一モ効績ヲ奏セシテ患者ノ身命危嶮ニ及

フ片ハ分娩ヲ誘導セサルヲ得ス

其三、子宮外妊娠

子宮外ニ於テ卵子ノ發育スル者ナリ蓋シ其部
位ハ或ハ喇叭管内ニ在ルアリ或ハ喇叭管ノ剪
線端ニ在ルアリ或ハ腹部ノ剪採端ニ在ルアリ
但シ其腹部ニ位スル者ハ恐クハ卵子若干時間
喇叭管端ノ一部ニ附著シ其發育スルニ至テ之
ヨリ分離スル者ナルヘシ
〔原因〕卵子ノ未タ子宮ニ達セサル前既ニ成孕ス
ル者はナリ

〔現症〕妊娠ノ現症アリ兼テ卵子ノ附著スル部ニ疼痛ヲ覺フ

〔徵候〕腹部偏側ニ腫脹シ妊娠月ヲ經ルニ至レハ兒體甚タ淺位ニ在リテ薄弱ナルヲ觸知シ時アリテハ子宮出血ヲ發シ腔検査ヲ行ヘハ子宮僅ニ脱落膜ノ爲ニ膨大スルヲ察ス喇叭管内ノ妊娠ニ於テハ左側或ハ右側ノ盲囊内ニ腫脹アルヲ見ル此腫脹ハ一種ノ者ニシテ宛モ囊腫ノ蓄液中ニ浮遊スル體ヲ含容スルニ似タリ之ニ聯合検査ヲ行ヘハ腫脹ハ多少移動スルヲ覺ヘ子

宮モ亦移動シ且其腔内ハ長サ三「インチ」ニ踰ヘサルヲ察ス又直腸ヨリ之ヲ検査スレハ較輒ク鑑識スルヲ得ヘシ

〔診斷〕太々難キ「屢」之アリ本患ト卵巢腫瘍トノ別ハ妊娠ノ來歴ニ據ルヘシ但シ卵巢腫瘍ハ子宮内妊娠ニ併發スルヲアレバ是レ亦知ラサル可ラス本患ト子宮纖維囊腫トノ別ハ腫脹ノ來歴及經過ト彼ニ在テハ腹部ノ腫瘍上ヲ按壓スル片子宮ノ移動スルトニ憑ルヘシ

〔豫後〕凶ナリ

〔治法〕若シ夙ニ喇叭管内ノ妊娠ナルヲ察セハ羊膜液ヲ洩シ盡スヘシ兒ヲ保全スルハ常ニ至要ノコナルカ故ニ母體ニ顯然タル危嶮ヲ將來スルニ非スレテ兒ノ生存ヲ期スヘキ者ハ腹部ヲ截開シテ之ヲ取り出スヘシ但シ胎盤ハ除却スヘカラス何トナレハ若シ之ヲ除去スルハ卵子ヲ包容セル壁ノ收縮スルヲ得サルカ爲ニ危嶮ナル大出血ヲ來スコアレハナリ子宮外妊娠ニ於テ手術ヲ施サスレテ自然ニ委托スルモ其胎兒ハ妊婦ニ大不便ヲ生スルコナクシテ數年

間止マル者アリ或ハ若干時ノ後凝塊自ラ破壊シ隨テ分裂セル片々直腸或ハ膣ヨリ漏洩スルコアリ

〔其四塊孕〕

卵子ノ頽敗セル者ナリ此症或ハ卵子ノ生命熄滅シ次テ不正塊トナリテ脫出スルアリ或ハ胎兒ヲ包裹スル外膜ノ「ヒダチ」形ニ變スルヨリ胎兒ノ死スルコアリ

〔原因〕詳明ナラス蓋シ黴毒ナランカ

〔現症〕頭初妊孕ノ顯症アリ後ニ至テ胎兒ノ死セ

ル徵候ヲ呈ハシ肚腹膨大スルヲ止メ乳房軟撓トナリ小ナル囊狀體ト共ニ液ヲ漏出ス

〔徵候〕胎兒ノ血行廢止シ子宮ノ腫脹柔軟トナリ聯合検査ヲ行ヘハ子宮ノ強固ナラサルヲ察シ手指ヲ子宮口ニ送入スレハ柔軟ナル胎盤狀塊ヲ觸知ス

〔診斷〕現症及徵候ヲ注視スレハ難カラズ

〔豫後〕吉ナリ

〔治法〕子宮口ヲ擴張シテ子宮ノ蓄藏物ヲ除キ盡シ麥奴ヲ用井テ適當ナル收縮ヲ催起セシムヘ

其五、陰唇及腔靜脈瘤

陰唇ノ靜脈非常ニ膨大シテ迂曲彎廻スル者ナリ時アリテハ腔ノ靜脈同一様ノ疾患ヲ被ムルヲアリ

〔原因〕血ノ還流ヲ妨碍スル骨盤内ノ壓迫是ナリ〔現症〕患者陰門ノ大充實及不快ヲ覺ヘ破裂スルカ如キ疼痛アリ且坐シテ陰部ヲ壓迫スレハ痛ヲ覺フ

〔徵候〕陰唇暗紫色ヲ呈シテ腫脹シ結節狀ノ靜脈

ヲ被ムルヲ見ル若シ分娩前ニ之ヲ發見セサル
片ハ其潰裂ヨリ劇シキ出血ヲ來シ或ハ死ニ抵
ル者アリ

〔診斷〕上ノ徵候ニ據テ察スヘシ

〔豫後〕難治ナリ

〔治法〕足部ニ方ル寢牀ノ脚ヲ十「イン」チ高舉シテ
仰卧セシメ寒罨法ヲ施シ陰門ヲ壓搾シ鎮痙洗
藥ヲ用フヘシ若シ潰裂スル者ハ創部ヲ壓搾シ
或ハ充分ニ過硫酸鐵若クハ過格魯兒化鐵ヲ含
メル壓定巾ヲ用フ

其六、墮胎

妊孕ヲ致ス婦人同時期ニ當テ屢未熟ノ卵子ヲ
墮下スル者ナリ

〔原因〕原發或ハ遺傳ノ徵毒、急性病、卵巢腫瘍、子宮
ノ纖維腫或ハ纖維囊腫、子宮彎屈、全身衰弱是ナ
リ

〔現症〕惡寒、發熱アリ次テ墮胎ヲ來ス蓋シ亦蛋白
尿ヲ發スル者アリ
〔徵候〕胎兒ノ血液循環漸次ニ衰弱シ羊膜液ヲ漏
泄ス

〔診斷〕時トシテハ原因ヲ探知シ難キヲアリ

〔豫後〕屢治シ難キヲアリ

〔治法〕若シ微毒ニ因スル者ハ妊娠中及次回ノ妊娠ヲ致サ、ル間水銀劑、沃顛加里、鹽酸加里ヲ與ヘシ、蛋白尿ノ現症アル者ハ羅馬浴ヲ行ヒ腰部ニ乾角法ヲ施シ實斐答利斯ヲ用井或ハ鐵劑ニ規尼ヲ配シ與フベシ、子宮彎屈ニ原ツク者ハ其位置ヲ整復スヘシ、全身衰弱ニ係ル者ハ或ハ患者ヲ安靜ナラシメ或ハ強壯藥ヲ與ヘ緩徐ノ運動ヲ命スヘシ、但シ卵巢腫瘍ノ患者ニ在テハ妊

娠中卵巢截除術ヲ施スヘキカ將タ之ヲ施サスレテ待ツヘキカノ疑惑ヲ生スルニ至ルスペンセル、空ルス氏ハ其實驗スル所ニ據テ此術ヲ稱讚ス宜シク患者ノ利害ニ隨テ決スヘシ、又纖維腫ニ由ル者ハ患者ヲシテ安靜ナラシメ爾餘ノ療法ハ分娩ノ後マテ猶豫スルヲ良トス但シ或患者ニ於テハ腹壁ヨリ子宮ヲ截開スルヲ要スルヲアリ

第十二編

分娩併發諸病

其一、子宮無力

分娩ニ臨ミ衰弱或ハ激動ニ由テ子宮其作用ヲ廢止スル者ナリ

原因全身ノ衰弱ニ由リ或ハ屢次ノ墮胎ニ由リテ分娩遲滯スル者或ハ兒頭ノ竇滯横産神經苦クハ精神ノ抑鬱ニ因テ分娩淹滯スル者はナリ現症整然タル有力ノ陣痛已ニ變シテ其來ル徐々ナリ或ハ之ヲ發スルモ暫時ニシテ止ミ兒頭進出セス妊婦疲勞シテ心身安カラス頻リニ長呻シ顔面愁色ヲ呈ス

徵候脈小ニシテ數且弱ナリ疼痛逐次ニ消退スルニ似タリ

診斷偶然ノ出血ヲ併發セサル者ハ鑑定難カラ

豫後屢凶ナル者アリ

治法食物ヲ給シ衝動藥ヲ用井或ハ麥奴ト規尼ノ合劑第十方ニ出ツ大ノ條子宮肥ヲ與ヘ或ハ鉗子ヲ用井テ分娩セシムヘシ

其二、子宮口緊張

分娩ニ當リ子宮口ノ擴張スルヲ甚タ遅ク或ハ

全ク張開セサルカ如キ症ナリ
原因羊膜液早ク脱漏スル者、神經衰弱、蜂窠織新
生肥大ヨリ起ル硬結、子宮頸ノ下部非常ニ硬靱
ナル者、子宮頸ノ癌腫是ナリ
現症陣痛劇烈ニシテ堪ヘ難ク、且薦骨部ニ限局
セル疼痛アリ、患者灼熱煩悶ヲ發シ、若痛ニ堪ヘ
ス

徵候脈數ニシテ緊或ハ充實ニシテ指頭ニ彈戾
シ、觸診ヲ行ヘハ子宮孔ハ硬キ輪ノ如キヲ覺ヘ
毎回ノ陣痛ヲ感覺スルヲナシ、但シ癌腫ニ罹ル

者ハ其侵サレタル子宮頸硬固ニシテ不整ナル
結節輪ノ如キヲ觸知ス

診斷觸診ヲ行ヘハ他病ト鑑別シ易シ

豫後患者ニ隨テ種々一様ナラス

治法哥囉吩格魯刺兒吐酒石惡心ヲ發スヘキ量ヲ用井少

許ノ莨菪軟膏ヲ取テ子宮頸ニ塗擦シ、温湯ヲ腔
内ニ注射シ、或ハ温腰浴ヲ行ヒ、或ハ温灌腸法ヲ
施スヘシ、其効驗ナキ者ハバル子ス氏ノ囊ヲ用
井テ擴張シ、若シ子宮口ヲ截開スルノ須要ナル
者ハ之ヲ施スヘシ、爾他鉗子ヲ用井、或ハ碎頭法

ヲ施シ或ハ腹部ヨリ子宮ヲ截開スヘシ
〔其三、會陰緊張〕

分娩ノ時會陰ノ擴張甚々緩慢ニシテ或ハ現ニ
張開セサルカ如キ症狀ナリ

〔原因〕舊癥痕是ナリ

〔現症〕驅出スルカ如キ陣痛劇甚ニシテ患者煩躁
憂苦ス

〔徵候〕會陰ノ中央膨起シ恰モ兒頭ノ該部ヨリ現
出スルカ如シ而シテ其前縁ハ薄クシテ硬ク且
撓屈スルヲナシ

〔診斷〕容易ナリ

〔豫後〕凶ナリ

〔治法〕溫浴ヲ行ヒ軟膏

蓋シ苳若軟膏ヲ用フルヲ可トスヲ塗擦シ

若シ會陰ノ破裂セントスル勢アル者ハ其中線
ノ各側ヲ切開スヘシ

〔其四、出血〕

〔甲〕意想外ノ出血

胎盤ノ一部當然ノ位置ヨリ剝離スルニ由テ起
ル所ノ出血ニシテ其源子宮竇ニ在リ

〔原因〕劇シキ情意感動、打撲、衝動、緊掣或ハ分娩ノ

際意外ノ轉位ヲ致ス者是ナリ

〔現症〕患者失氣シ生力脱耗シ子宮底上ニ鈍痛ヲ覺ヘ陣痛稍歇止シ出血ヲ發シ陣痛ナキ間ハ殊ニ出血シ易シ

〔徵候〕胎盤ノ分離セル子宮部柔軟ナルヲ覺ヘ出血ノ潛匿スル者ニ於テ柔軟ナルヲ殊ニ太シク脈小ニシテ弱ナリ

〔診斷〕疼痛及出血ニ據テ子宮無カト鑒別スヘシ若シ陣痛ノ存スル者ハ更ニ分明ナル識別ヲ得ヘシ

〔豫後〕出血ノ顯レサル者ハ凶ナリ何トナレハ若シ出血ヲ發見セサル前既ニ若干時間出血アル者ハ子宮壁上ニ血塊ヲ形成シ且粘著シテ容易ニ除却シ難ク終ニ以テ腐敗性ノ患害ヲ將來スルノ源トナル者アレハナリ然レモ若シ夙ニ出血ヲ發見シ早ク之カ治法ヲ施スハ吉ナリ

〔治法〕膜ヲ裂開シテ分娩ヲ催進シ毎日「コンヂ」氏水或ハ沃顛水第三方三骨盤内腹ヲ以テ子宮膜炎ノ條ニ出ツヲ洗滌スヘシ

〔乙〕不可免ノ出血

胎盤ノ一部或ハ全部ヲ以テ子宮口ヲ蓋閉スル者或ハ分娩ノ際其一部剝離スルヨリ起ル所ノ出血ナリ

原因胎盤ノ位置常ニ異ナル者是ナリ

現症妊娠後第六箇月或ハ第七箇月或ハ第八箇月或ハ第九箇月ニ方リテ出血ヲ發スル者アリ或ハ右ノ四箇月中連綿出血スル者アリ

徵候出血幾ント間斷ナク持續シ陣痛間ニ於テ増劇シ胎盤ヲ檢査スルニ其現存スルヲ覺フ

豫後屢凶ナリ

治法若シ子宮口十分ニ張開セシテ分娩スルニ適セサル者ハ子宮鏡ヲ用井テ小心ニ塞子ヲ腔内ニ裝填シ數時間留メ置キ滋養物ヲ與フヘシ而シテ其塞子ヲ除却スル片若シ子宮口ノ張開スル者ハ手ヲ送入シテ之ヲ擴張シ轉廻術ヲ施シテ分娩セシムヘシ但シ腔ヲ栓塞スル最良法ハ紙鳶尾狀塞子ト稱スル者ヲ用フルニ在リ其法先ツ一條ノ糸ヲ取テ其端ニ一箇ノ綿絮塞子ヲ結ヒ數「インチ」六「インチ」或ハハヲ隔テ、連々他ノ綿絮塞子ヲ結著シ然ル後子宮鏡ヲ以テ

一箇宛腔内ニ裝填スルニ在リ蓋シ該法ノ有益ナルハ塞子ヲ除却スルノ便利ナルニ係ル所ニシテ即チ其糸端ヲ牽引スレハ數箇ノ塞子箇々連出スルモノナリ

第十三編

分娩繼發諸病

其一、蓐熱

分娩後二週以内ニ産婦ノ患フル直達傳染性稽留熱ニシテ或ハ分娩前既ニ萌發スル者アリ是甚々稀有ノ疾患ナリ

原因或ハ直達傳染ナルアリ或ハ汚染セル大氣ニ由テ感染スルアリ或ハ産婦ノ聚合スルニ由テ傳染スルアリ但シ産婦ヲ侵ス所ノ一種特異ノ諸熱病ハ縱令産婦ニ流行スルコトアリト雖モ之ヲ稱シテ蓐熱ト謂フ可ラス

現症惡寒劇甚ニシテ全身違和シ食慾喪亡シ睡眠スル能ハス下利ヲ發シ惡露停滯シ乳汁ノ分泌廢止シ小便ノ排泄閉止ス

徵候體温旺盛シ脈數ニシテ實或ハ弱ニシテ壓止シ難ク顔貌苦惱ヲ表シ舌苔ヲ帶ヒ顔面帶紫

赤色ニシテ譫妄ヲ發ス

〔診斷〕該熱ノ產褥腐敗熱ト異ナルハ腐敗ノ原因ナキト惡臭ノ惡露ヲ欠クト初期ノ鼓脹或ハ腹部ノ知覺過敏ナラザルトニ據テ察スヘシ

豫後凶ナリ

〔治法〕體質強實ナル婦人ニ於テハ刺絡ヲ施シ格魯刺兒ヲ用井鹽類下劑ヲ與フヘシ又體質虛弱ナル婦人ニ於テハ多量ノ規尼ヲ用井亞爾箇兒^{第十一方}阿片、綠藜蘆^{第十一方}與フヘシ^{第十一方}〔第十一方〕災證ニ發熱ヲ兼ル者ノ療法

〔六〕亞爾箇兒

體溫ヲ減殺スルニ用フ乃チ武

蘭實ヲ取リ毎時ニ一ヲ與ヘ或ハ毎十分時

若クハ毎十五分時ニ一ヲ與フルモ可ナリ

〔五〕綠藜蘆

脈搏ヲ減却スルニ用ウ即チ綠藜

蘆丁幾

^{五滴}水

ヲ取リ混和シテ毎二時ニ與フ

ルヲ良トス

其二、產褥腐敗熱

外科熱ニ等シキ產婦ノ病ニシテ極メテ傳染シ

易キ者アリ

〔原因〕丹毒或ハ膿毒病若クハ死體剖見ニ臨ム所

ノ醫家ノ手ニ觸レテ外部ヨリ傳染スル者或ハ
爾他ノ腐敗毒ニ感染スル者或ハ臭氣アル惡露
若クハ會陰ノ破裂ヨリ生スル漏液ニ由テ内部
ヨリ感傳スル者或ハ子宮ノ收縮全カラサルヨ
リ胎盤ノ部位ヲシテ傳染毒ニ露呈セシムル者
是ナリ

〔現症〕惡寒甚シク患者困難ヲ訴ヘ顔面沈鬱狀ヲ
呈シ淡黃色ナリ發汗淋漓トシテ衣ヲ浸シ膿乳
汁及惡露ノ歇止スルコアリ或ハ譫妄ヲ發スル
コアリ嶮惡ノ症ニ於テハ患者自ラ十分强健ナ

ルヲ覺ヘ毫モ疼痛ヲ覺ヘス且按壓ニ由テ痛ヲ
發スルコナシ

〔徵候〕體溫増盛シ脈搏屢峻速ナルコアリ舌ハ始
メハ苔ヲ被ムリテ滋潤シ後乾燥シテ其緣赤色
ヲ呈シ側方茶褐色ニシテ中央白色ヲ顯ハシ或
ハ舌側白色ニシテ中央茶褐色ヲ呈スルコアリ
若シ惡露ヲ洩ス者ハ臭氣鼻ヲ撲チ顔面胸部及
股部ニ紫班ヲ發シ大便秘閉シ次テ下利ヲ發シ
肚腹鼓脹シ食慾喪亡シ安眠スルヲ得ス
〔診斷〕單純蓐熱トノ別ハ病毒傳達ノ來歷ト惡露

ノ惡臭ナルトラ以テ徵知ス

豫後通例凶ナリ

〔治法〕コンヂー氏水或ハ石炭酸水八十倍ヲ取テ

子宮内ニ注射シ毎三時ニ甘汞五々乃ト阿片ノ

合劑ヲ用井滋養物ヲ與フヘシ或ハ多量ノ規尼

五々乃亞爾箇兒第十一方ヲ用井氷帽ニ賴

テ體溫ヲ減省スヘシ

其三、產後子宮炎

產婦子宮ノ炎症ヲ發スル者ナリ

〔原因〕寒顫、腐敗熱、精神感激、器械ノ妄用、粗暴ノ轉

廻術、難産是ナリ

〔現症〕惡寒ヲ發シ下腹部疼痛シ顔色苦楚ヲ表シ

惡露遏止ス

〔徵候〕子宮腫脹シ知覺太タ敏銳ニシテ按壓スレ

ハ忽チ痛ヲ發シ脈數且實ニシテ壓止シ難ク體

溫旺盛ス

〔診斷〕該炎ト腐敗熱トノ別ハ子宮ノ疼痛顯著ナ

ルト其按壓ニ由テ痛ヲ覺フルノ敏捷ナルトニ

據ル其腹膜炎トノ別ハ疼痛ノ限局セルト子宮

ノ移動スルト原發鼓脹ヲ欠クトニ憑テ辨シ其

蜂巢織炎トノ別ハ子宮周圍ノ沈澱物ヲ缺クニ由テ識ル

豫後慎戒ヲ加フヘシ

治法下腹部及子宮ニ蟬針ヲ貼シ卵巢炎ノ條ニ見ユ甘汞

至十匹乃阿片ハニヲ用井頻リニ下腹部ニ温琶布ヲ

貼シ温注射ヲ施シ規尼ヲ多量ニ與ヘ食餌ヲ減

省スヘシ

其四、産後腹膜炎

骨盤内腹膜ノ炎証ニシテ屢延テ腸ノ腹膜ニ及

ヒ或ハ時々胸膜ニ蔓延スルコアリ

原因寒顫腐敗熱拙劣ノ手術便秘下劑又輕忽ニ起坐スル者はナリ

現症惡寒劇甚ニシテ顔色鬱憂苦楚ヲ表シ腹痛

アリテ食思喪亡シ睡眠スル能ハス兼テ惡露鬱

滯ス

徵候體温増盛シ脈數且小ニシテ屢緊ナルコアリ

下腹部知覺過敏ニシテ按壓スレハ忽チ痛ヲ

覺ヘ兼テ鼓脹ヲ發シ舌乾燥赤色ニシテ中央茶

褐色ヲ呈ス

診斷本炎ヲ子宮炎ト鑑別スルハ痛處較廣大ナ

ルト按壓ニ由テ痛ヲ覺フル部分ノ唯子宮ノミ
ニ限局セサルトヲ據証トシ又蜂窠織炎ト識別
スルハ惡寒ノ頻發セサルヲ憑徵トス

豫後凶ナリ

治法脈狀ニ依テ患者蟬針ニ堪ルヲ察セハ腹部
ニ蟬針ヲ貼シ甘汞ト阿片ヲ多量ニ用井但シ阿
者ヲ量テ麻酔セシム氷帽第十一方三
腹膜炎ノ條ニ出ツ處シ溫注射ヲ施シ斷ヘス腹部ニ氈布ヲ換貼シ
或ハ多量ノ規尼ヲ與ヘ綠藜蘆第十一方五
熱ノ條ニ出ツ用井少許ノ滋養物ヲ許シ若シ體力脫耗スル者

ハ亞爾箇兒ヲ與ヲヘシ

其五產後骨盤内蜂窠織炎

子宮周圍ノ結締織炎ニシテ滲出ヲ傍發スル者
ナリ

原因子宮炎及腐敗熱ノ原因ニ同シ

現症惡寒劇シク數日ヲ隔テ、反復再發シ偏側
或ハ兩側鼠蹊部ニ限局セル疼痛アリ顔色鬱憂
ヲ呈シ惡露閉止ス

徵候偏側或ハ兩側鼠蹊部ヲ按壓スレハ痛ヲ覺
ヘ體溫脈搏共ニ増進シ腐敗熱ニ比スレハ脈候

差充實ナリ腔ヨリ検査スルニ重複觸診ヲ行ヘ
ハ子宮ノ偏側或ハ周圍ニ一塊アリテ多少固著
スルヲ覺フ即チ此塊ハ滲出液ノ凝結セル者ニ
シテ若干時ノ後塊内ニ膿膿ヲ起シ次テ骨盤内
膿瘡ヲ發ス但シ該膿瘡ハ或ハ腹部ニ向フア
リト雖モ多クハ直腸若クハ腔ヨリ破潰スル者
ナリ

〔診斷〕該炎ヲ他ノ産後炎ト鑒別スルハ惡寒ヲ發
スルノ屢ナルト腔検査ヲ行フトニ據ルヘシ但
シ腹膜炎ニ在テハ子宮ノ固著スルト本病ヨリ

モ較速カナリトス

〔豫後〕他ノ疾病ニ於ケルカ如ク凶ナラス

〔治法〕患者ヲ十分ニ静息セシメ滋養ノ食物ヲ與
ヘ斷ヘス琶布ヲ貼シ腹部ニ蟬針ヲ施シ阿片若
クハ過格魯兒化汞ヲ用井後ニ至テ規尼ニ阿片
若クハ菲沃斯ヲ伍シ與ヘ若シ膿瘡ヲ發スル者
ハ腹部ノ腫脹上ニ發泡膏ヲ貼スヘシ

其六、會陰破裂

後縫合部ヨリ后方ニ裂開スル傷瘻ニシテ其長
短一様ナラス或ハ肛門括約筋ヲ裂開スルア

リ或ハ直腸上ニ及フコアリ

原因 會陰ノ緊張過急ノ分娩適當ニ會陰ノ擴張器械ノ妄用是ナリ

現症 破傷部ノ痛楚ナリ

徵候 會陰ノ全厚部ニ亘ル顯著ナル裂傷ニシテ或ハ又腔粘膜ノ小裂傷ヲ見ルコト鮮ナカラス共ニ斷ヘス注射ヲ施シテ洗淨スルノ外特別ノ注意ヲ要セサル者ナリ

診斷 容易ナリ

豫後 早ク發見スルキハ吉ナリ若シ忽セニシテ

之カ治療ヲ加ヘサルキハ傷部吸收ヲ營ムヨリ患害ヲ來スコトアリ

治法 豫防法 分娩ニ臨ミ兒頭ノ通過スル際輕々會陰ヲ支撐スヘシ若シ子宮ノ作用過劇ナル者ハ輕ク壓搾シテ其作用ヲ緩徐ナラシメ會陰ヲシテ擴張スルノ暇アラシムヘシ會陰ニ家猪脂ヲ塗擦シテ裨益ヲ得シコト屢之アリ若シ又會陰ノ破裂セントスル勢アル者ハ其中線ノ各側ヲ僅ニ剖開スヘシ施術分娩後六時以内ニ二三條ノ銀線ヲ取テ破裂セル組織ノ全厚部或ハ唯其

表部ヲ縫合スヘシ若シ此縫合ヲ施サ、ル片ハ
瘻傷癒ルモ仍廣キ裂痕ヲ貽ス一アリ只陰門孔
ルニ由テ然ルアリ或ハ二箇ノ裂患者十分健全
痕アリテ陰門孔ニ連接スルアリ
ニ復スル片ハ其裂痕ヲ縫合スルノ策ヲ處セス
ンハアラス即チ其法ハ先ツ會陰全厚部ノ各側
ヲ剝離シ然ル後一條ノ縫合系ヲ深ク穿透スル
ニ在リ但シ肛門括約筋ノ裂傷ヲ兼ヌル患者ニ
於テハ縫合系ヲ取テ裂開セル括約筋ノ偏側ノ
前縁ヲ穿テ直腸腔中隔ヲ貫透シ括約筋ノ對側
端ニ於テ牽出スヘシ又裂傷ノ直腸ニ及ハサル

者ハ數多ノ深銀線縫合ヲ施シ以テ裂縁ヲ縫接
スヘシ或ハ尚表部縫合ヲ要スル者ハ之ヲ施ス
ヘシ又或ハ三角ノ空處ヲ剝離シ三側即チ直腸
腔、會陰ヲ縫合スヘシ但シ是縫合ヲ施スニハア
ヴリシグ氏ノ法ヲ最良トス患部ノ癒著ヲ扶助
センニハ液類ノ滋養物ヲ與ヘ阿片ヲ用井テ數
日間大便ヲ秘閉セシメ或ハ某氏ノ稱用スルカ
如ク少量ノ蓖麻子油ヲ用井テ日々大便ヲ疏通
スヘシ或患者ニ於テハ肛門括約筋ノ兩側ヲ割
開シテ其緊張ヲ緩解シ或ハ會陰裂傷ノ兩側處傷

ヲ距ル一「イン」チ半或ハヲ淺ク截開シテ皮膚ノ
ニ「イン」チノ處ニ於テスヲ緊張ヲ弛解センヲ要ス

其七、子宮破裂

子宮實質ノ裂傷ニシテ其頸部或ハ體部ニ係ル
アリ

原因子宮ノ收縮組織ノ變質烈シキ分娩ニ壅塞
ヲ兼ヌル者器械或ハ轉廻術ノ傷害是ナリ

現症卒然タル劇痛妊婦ノ叫號ヲ發シ陣痛ハ反
テ消退シ胎兒ノ全體或ハ其一部裂隙ヲ透過ス
ルヨリ腹部腫瘍ノ形ヲ擬シ出血ヲ來シ生力沈

衰シテ冷汗衣ニ透ル

徵候脈小ニシテ數ナリ嚮ニ凸露セル部分退却
シ腹壁ヲ按スレハ容易ニ兒頭或ハ他ノ部分ヲ
觸知ス

診斷右ノ如キ現症及徵候アルニ據ル

豫後凶ナリ

治法胎兒ヲ全フセシカ爲ニ直チニ腹部截開術
ヲ施スヘシ尤モ尋常ノ子宮截開術ノ如ク諸ノ
豫備ヲ爲シ大ニ謹慎ヲ加フヘシ但シ自然ノ機
轉ニ賴テ分娩セシメント欲スルハ最大危險ノ

トニシテ且多時ヲ費サ、ルヲ得ス

其八、腔破裂

腔壁ヨリ腹膜腔ニ至ル裂傷ニシテ居恒子宮頸ト腔トノ連接スル所ノ近傍ニ起ル者ナリ

〔原因〕兒頭ノ大壓迫後ノ劇痛或ハ轉廻術若クハ器械ノ妄用ニ由テ自然ニ發スル者ナリ

〔現症〕劇痛、生力虚脱、出血是ナリ

〔徵候〕検査スレハ破裂ヲ覺知シ腸管裂隙ヲ穿チテ挺出スルヲ屢之アリ

〔診斷〕検査ヲ行フニ當リ手指ヲ破裂間ニ挿入ス

レハ腸管ヲ認知シ且子宮ノ腹膜面ヲ識得ス

豫後凶ナリ

〔治法〕少クモ四十八時間ハ破裂ヲ發セル側ニ患者ヲ保護シ子宮ノ重量ニ由テ傷處ノ傍側ヲ倚附セシメ阿片ヲ十分ニ與フヘシ

其九、産後白腫

下肢ノ靜脈中ニ蘇崙勃私ヲ生スル病ニシテ體表靜脈蘇崙勃私又白脚ト稱ス

〔原因〕産後血液稠和不良ニシテ靜脈中ニ血塊ヲ生スル者恐クハ淋尿管ノ壅塞ヲ或ハ英勃利私

謨ノ結果ニシテ分碎セル血塊血行ニ循テ他所ニ徙リ以テ脈管ヲ梗塞スル者はナリ

〔現症〕脚ノ一部ニ劇痛ヲ覺ヘ殊ニ靜脈大幹ノ循路ニ於テ甚シク其痛或ハ上部ニ始リテ下部ニ及ヒ或ハ下部ニ始リテ上部ニ達シ通例患肢ノ腫脹スルニ至テ減退シ患者心身不安ニシテ惡寒ヲ發ス

〔徵候〕脈搏駛速ニシテ體溫増盛シ舌苔ヲ帶ヒ大便秘結シ或ハ脚部大ニ浮腫スル者アリ通常股部腫脹シ或ハ之ヲ脚ニ及ホシ或ハ下肢ノ全部

ニ及ホス者多シ患部ノ靜脈ヲ觸診スレハ硬固ニシテ痛アルヲ覺ヘ赤線ヲ以テ其循路ヲ標示シ腫脹ハ硬固ニシテ緊張シ指頭ニテ壓托スルモ容易ニ陷没セス而シテ稍白色ヲ帶フ

〔診斷〕本病ヲ浮腫ト鑑別スルハ疼痛ノ劇烈ナルト指壓ニ由テ陷没セサルト靜脈ノ梗塞ヲ觸知スルトニ據ル

〔豫後〕凶ナルニアラス尤モ恢復ハ緩慢ナリ其吉ナル者ハ全身ノ違和自ラ整復シ腫脹漸ク消退レ隨テ吸收ノ運營ヲ發スルナリ然レモ其凶ナ

ル者ハ膿腫ヲ起シ或ハ英勃利私謨ヲ送出シテ肺腦ノ壅塞ヲ來シ頓ニ死ヲ致ス一アリ

〔治法〕本病ニ罹ル患者ハ蟻針ヲ要スル一甚タ希ナリ但シ患者多血質ニシテ患部ヲ按壓スルニ劇シキ疼痛ヲ覺ヘ且靜脈ノ循路發赤スルハ蟻針ヲ貼シ斷ヘス亞麻仁ノ毬布ヲ施シテ患肢ヲ全ク被包シ阿片若クハ莨菪ヲ以テ蒸漏法ヲ行ヒ淡薄ノ滋養品ヲ與ヘ鹽酸加里、鹽酸規尼、過格魯爾、化鐵、陀歇爾斯散等ヲ撰用シ莫爾比涅ノ皮下注射ヲ施シ患肢ノ摩擦ヲ避クヘシ是レ英

勃利私謨ヲ轉移スルノ畏レアレハナリ

〔其十、英勃利私謨〕

心臟瓣膜ノ蘓崙勃私或ハ發生物ヨリ分裂セル血塊ニ由テ動脈ヲ梗塞スルノ病ナリ

〔原因〕產後血液ノ稠和不良及蘓崙勃私是ナリ

〔現症〕肺ノ英勃利私謨ニ於テハ忽然至劇ノ呼吸困難ヲ發シ顔面蒼白或ハ青黑ヲ呈シ腦ノ英勃利私謨ニ於テハ半身不遂ヲ發ス

〔徵候〕脈狀系ノ如ク呼吸促迫シ肺動脈上ニ騷鳴ヲ生ス

〔診斷〕上ノ如キ現症及徵候ニ據ルヘシ

豫後凶ナリ

〔治法〕亞爾箇兒、安母尼亞ヲ與ヘ十分ニ靜憩セシメ胸部ニ乾角法ヲ行ヒ液類ノ食餌ヲ給スヘシ

其十一、出血

〔甲〕分娩第三期ノ際

子宮ノ收縮十分ナラスシテ胎盤ノ分離全カラサルヨリ起ル所ノ出血ナリ

〔原因〕子宮ノ收縮力速ニ胎盤ヲ驅出スルニ足ラサル者或ハ胎盤一部ノ病的癒著是ナリ但シ出

血ノ源ハ子宮竇ニ在リ

〔現症〕失氣、煩悶、生力虚脱是ナリ

〔徵候〕劇甚ナル出血ニシテ間斷ナク連續ス

〔治法〕流動麥奴越幾斯

半ヨリ乃至一ヨリ

ヲ與ヘ壓搾ヲ施シ

テ胎盤ヲ除却スルヲ試ミ若シ益ナキ時ハ手ヲ以テ之ヲ取り出スヘシ

〔乙〕分娩第三期ノ後

眞ノ産後出血ナリ

〔原因〕遲慢ノ分娩過急ノ分娩、子宮ノ收縮十分ナラサル者或ハ收縮後子宮ノ弛縦スル者是ナリ

〔現症〕失氣、生力虚脱ナリ

〔徵候〕脈動弱小、駛速ニシテ危嶮ノ出血連々トシ

テ持續ス

〔診斷〕仔細ニ檢索シテ陰唇靜脈瘤ノ破裂ト誤診

スベカラス

〔治法〕子宮底ヲ握持シ冷水ヲ注射ス腔内ニ氷片

ヲ送入シ或ハ子宮ニ嵌入ス麥奴ヲ與ヘ瓦爾華

尼電氣ヲ施スヘシ若シ諸療法皆効ヲ奏セサル

者ハ過硫酸鐵水若クハ過格魯兒化鐵水濃過格魯兒化

鐵水一、水ヲ取テ子宮ヲ洗滌スヘシ

〔丙〕第二期出血

産後第三日ヨリ第十四日ニ至ルノ間持續スル

出血ナリ

〔原因〕子宮ノ不整ナル收縮、胎盤ノ一部子宮内ニ

粘著遺留シテ其近傍部ノ收縮ヲ妨礙スル者是

ナリ

〔現症〕患者心身安カラス且腐敗性患害ノ顯症ヲ

兼併スルヲ屢之アリ

〔徵候〕脈數ニシテ子宮上ニ疼痛ヲ覺ヘ出血連綿

トシテ絶エス其色鮮明ナリ其源ハ子宮動脈ノ

開張セル端ニ在リ

診斷右ノ如キ現症及徵候ニ據テ察スヘシ

豫後屢凶ナル者アリ

治法若シ子宮口ヲ張開スルノ須要ナル者ハ擴

張囊ヲ用テ子宮口ヲ張開シ慎テ子宮内ヲ詮索

シ胎盤ノ殘部ヲ除却シ沃顛第四方三骨盤内膿瘡ノ條ニ出シ若

クハ麻質格丁幾、虞里斯林、石炭酸等分ノ和劑ヲ

取テ子宮内ニ注射シ或ハ前條ノ如ク過格魯兒

化鐵水ヲ以テ子宮ヲ洗滌スヘシ

輸血法

劇甚ノ出血ニ罹ル患者ニ於テ屢其身命ヲ救濟

スルヲアルハ獨リ輸血法ノミ故ニ今茲ニ其方

法ニ就テ聊數言ヲ辨說スルニ要アリ

輸血ノ施術ニ二法アリ(一)ハ健全者ノ臂ヨリ患

者ノ臂ニ直輸スルニ在リ(二)ハ纖維素ヲ含有セ

サル血ヲ注輸スルニ在リ乃チ甲ノ施術ニ最良

ノ二法アリ(三)ハ「アヴリシク」氏ノ器ヲ用テ施シ

(三)ハ「ロ―セル」氏ノ器ヲ以テ行フナリ「アヴリシ

グ」氏ノ器ハ一箇ノ護膜管ニシテ中央膨脹シ兩

端細小嘴ヲ爲スモノニシテ輸血セント欲スル

片ハ其一嘴ヲ健全者ノ靜脈ニ挿入シ血液器中ニ滿ルニ至テ或ハ豫メ少許ノ硫酸曹達ヲ含他ノ一嘴ヲ患者ノ靜脈中ニ送入シ然ル後連リニ器械ヲ運用シテ以テ血液ノ注流ヲ催進スルナリ但シ該器ノ用法ハ實際ニ施スニ當テ容易ニ曉得スヘシ「ローセル」氏ノ器械ハ右ノ器械ニ比スレハ差錯雜ナルモノナリ然レモ亦運用スルニ難カラサル者ニシテ練熟セル醫士ハ之ニ由テ容易ニ輸血ノ功ヲ收ムルヲ得ルナリ尤モ血液ヲ輸出スルノ人ハ手臂肥壯ニシテ肌膚薄ク

靜脈膨脹セル者ヲ撰ムヲ良トス

纖維素ヲ含有セサル血ヲ輸入スル法ハ初メ先ツ血液ヲ器内ニ瀉シ取り之ヲ打撃シテ全ク纖維素ヲ除却シ然ル後薄キ布片ヲ以テ溫器内ニ瀘過シ佳適ノ唧筒「ドクトル、プレー」氏ノ唧筒ハ最モ簡便ニシテ最モ必要ナルヲ取テ之ヲ患者ノ靜脈ニ輸注スルニ在リ

簡明婦人病論卷之六大尾

明治十二年三月十一日

版權免許

出版人 飛譯并

安藤正胤

東京日本橋區

南茅場町一丁目

東京 芝大神宮前

山中市兵衛

馬喰町二丁目

島村利助

同
本町三丁目

瑞穂屋卯三郎

同
日本橋通三丁目

丸屋善七

發兌書肆

大阪

心齋橋筋北久寶寺町

丸

屋

善

藏

西京

寺町通姉小路

丸

屋

支

店

名吉屋

本町八丁目

丸

屋

善

八

