

富士川文庫
496.3
Ka
1

赤西箱
十七号
共
四
冊

F 1
カ-2



富士川文庫

3130

3冊

496.3

Ka

1

No. 40

灰翳治術集論

自序

凡ソ人神ト萬物トヲ相繫ク所ノ諸器眼耳鼻口表皮

於テ視瞻ノ器ノ最モ卓絶セルトハ固ヨリ論ヲ

俟タズ夫萬物ノ在ルトヲ知テ其距離ヲ辨シ好

ム者ニハ近ツキ恐ル、者ニハ遠カルトヲ得ル

ハ實ニ此器ノ有ルガ為メナリ

ヘール谷人ノ言ニ云ハズヤ千八百十五年凡ソ外識

中五神視瞻ノ如ク要ナル者ナク視瞻ノ如ク人身

保護ノ用ヲ備スル者ナシト又他人ノ言ニ云子



シク^トカ^ハ千八百十^ノ人身ノ諸器タル固ヨリ互
ニ相須テ其政ヲ為シ以テ性命ヲ保續スト至ヒ
眼目ノ如ク汎ク全身ニ相關係スル者ナシト
然レ^ニ其疾病ニ罹ルヤ他ノ諸器ト異ル^トナク
然モ其病タル或ハ一分ノ明ヲ失スルアリ或ハ
全ク盲トナルアリ既ニ盲トナルトキハ假令ヒ
富貴ニテ高位ニ居ルト雖^ニ唯是一個ノ不幸人
タルノミ動モスレバ輒チ外物ノ為^ニ其身ヲ
害ス故ニ諺ニ云ハズヤ盲ハ貧ナリト其言允レ
リト云フベシ

然^レ其病必シモ皆不治ノ者ニ非ズ尚幸ニ一二
ノ治術有テ明ヲ復スル^ト恰モ獲活スルガ如ク
復タ^レ入交ヲ得ルニ至ル者アリ
其治ヲ得ルノ疾病中ニ於テ最タル者ハ灰翳ト
瞳孔縮閉トナリ此兩病其種甚ク居多故ニ其治
術亦種々アリ而^{シテ}其術タルヤ亦外科中ノ最タ
ル者ナリ且ツ此兩病タル屢々能ク相兼登ス故
ニ其治術モ亦兼テ施サ^ルヘカラサル者アリ
此兩病ノ治術當今世間ニ行ハル^ノ所ノ者ヲ纂
集^シ以テ正シク諸家ノ方術ヲ折衷スルハ實ニ

難事ニシテ此書ヲ著スノ本志ナリ然レ此事ヤ
實ニ諸家ノ高論ヲ假ルニ非スニハ敢テ予ガ微
力ノ能ク致ス所ニ非ズ故ニ今唯諸家ノ論說及
ヒ法術ヲ取テ混セル者ハ之ヲ分テ離ル者ハ
之ヲ合シ各自ノ部門ヲ定メテ以テ之ヲ示スノ
今夫レ諸邦ニ於テ著述スル所ノ眼科書甚ク居
多然ルヲ別ニ新術ヲ發明スルニモ非ズシテ此
著ヲ為ス實ニ唯無用ノ長物ヲ増スニ似タリ然
リト雖レ我邦ニ於テハ譯書ノ他尚ク灰翳ノ著

書少ク且ツテニハ一ノカ別出法ヲ興メ後ヒ
ユ子此人名カ復タヒ擠下法ヲ固執シ後又メンセ
ルト人名カ刺角膜術ヲ賞セルヨリ法術相定ラズ
論争競ヒ起リ其法未ダ決セズ尚且ツ穿瞳術ニ
至テハ未タ曾テ我邦語ノ著書アラズ故ニ今近
世諸邦ニ於テ發明スル所及ヒ修正スル所ノ者
ヲ取テ正シク其部門ヲ立テ之ヲ公ニスルモ亦
學者ノ為メニ少補アラサルヲ無カラニ守
凡ソ諸眼病中ニ就テ灰翳ハ我邦ニ於テ言未其
治術盛ナルニ名家ト稱スル者特リ他邦ニ多キ

ハ何ソヤ是実ニ我邦ニ其人ノ缺タルニハアラ
ズ唯其書ニキノ然ラシムルナリ既ニ外科術ノ
雋傑ト称スヘキ者甚タ多ク殊ニ眼科ニ於テハ
妙手ト称フヘキ者少カラズ夫レクリエイス子
ニス「アンシアウクス」^{三人}「メンルト」^{之三名}ノ如キハ其
最タル者ニアラズマ皆是レ「シカルパヘール」^{六人}「ヒ
ムレイ」^{一人}「ランケンベツク」^{一人}「カラール」^{一人}「ヒュホイス」^{一人}「ム
等ノ跡ヲ嗣テ眼科ヲ琢磨スル人ナリ
或人云ク十五年ノ著書ニ出ツ「瓦ソ」眼科ヲ修正
スヘキ卓絶ナル發明ハ皆外科術ト博ク通スル

ノ人ニ在ル者ニ純一ノ眼科家ノ能スル所ニ
アラズト其言実ニ然リ今夫レ人皆先天ノ灰翳
ヲ治シ縮閉セル瞳孔ヲ穿ツトヲ得ルハ全クセ
セルテ^{人名}ヨリ叙リ其他近世ニ至テ眼科ノ諸
治術ニ種々ノ發明ヲ為シテ益々之ヲ修正セル
ハ實ニ「シカル」^{人名}等ニ在リ^{按ニ此兩家ハ純一}
是故ニ外科内科ニ拘ラズ其支派ノ術ニ達セン
ト欲スル者ハ宜ク其本源ニ明カナラズニハア
ラズ今此編ノ著ヤ此言ニ合ハズト雖モ唯是レ
支派ノ中ニ於テ要アル者ヲ示サント欲スルナ

リ故ニ唯諸方術ノ折衷ヲ為スノミ學者之ヲ以
テ足レリトスルヲ勿レ

嗚蘭鑿官

漢

温設諾而度

識

灰翳治術集論

目次

大較

疾病之所在

區別

症候大較

各自之證候

疾病之始終

原因

他病合併

前見

預防法

内科術

施術月時之擇

患者預備

外科術

施術前之常則

擠下法上 刺剛膜術

ケルスエス之法術

シカルパ之法術

ワール之法術

ナウンデルス之法術

アダムス之法術

擠下法下 刺角膜術

ケニイセ之法術

コンラシ之法術

ヒユフホルン之法術

剔出法上 刺角膜術

フニイタク之法術

尋常之法術

ウエニセル之法術

サニタレリ之法術

ベトル之法術

ギブソン之法術

アダムス之法術

ワルドセツフ之法術

器具之論說

剔出法下 刺角膜術

ベルト之考按

ミユテル之法術

ルオベニステイニルオベル之考按

エアルレ之法術

クハトリ之法術

施術誤治之因

擠下法誤治之因

剔出法誤治之因

施術間及其後之傍症

後翳

術後之療法

翳鏡

諸術比較

諸法術可否之決定

灰翳治術集論目次終

灰翳治術集論 紀元十八百十八年發行

和蘭醫官 漢溫設諾而度 著

大較

凡ノ瞳孔ノ曇翳スルヤ其疾水晶体ニ在ルアリ

水晶囊ニ在ルアリ没耳瓦俾尼液水晶体周回ニ在

ルニ在ルアリ俱ニ之ヲ灰翳トシテカクシク

ツシヨト各ク

若シ水晶体全ク硝子様液ト分離ノ身体若クハ
眼球ニ至微ニ動キ在テ其翳震搖スル寸ハ之
ヲ探翳ト名ク○又翳ニ熟ト未熟ノ名アリ是レ
其遠近ノ固カラ得ルト得サルトヲ以テ區別ス
ト至氏子ハ之ヲ取テス宜ク其翳ヲメ弁セシム
ル所ノ固仍害ヲナス間ハ之ヲ未熟トシ既ニ害
ヲナサ、ルニ至テハ熟トスヘシ故ニ予ハ其翳
ノ流動質ナルト硬固質ナルトニ拘ラス俱ニ熟
未熟ノ名ヲ命ス翳唯水晶体カ水晶体囊カ若クハ
モルカクニ液ノミニ在テ他病ヲ夾マサル者ヲ

單翳ト名ク他ノ眼ニ害ヲ做ス病ヲ夾ムモノヲ
合併翳ト名ク、
其翳ニ疾候大較ニ無シ
凡ソ其疾ニ罹ル処ニ患者ハ其初ニ眼前ニ霧ノ
掩カ如キヲ覺テ其霧常ニ視ニト欲スル所ノ物
ヲ墜陸ス而シテ其翳ノ始メ水晶体ノ中心ニ最甚
クノ漸ク周圍ニ施及シ厚幅俱ニ増進ス以時ヨ
リメ患者頭ヲ傾ケ眼ヲ轉動スルニ非レハ物ノ
形ト色トヲ明辨ス皆ト推ク其疾漸ク進テ終ニ
明暗ノ外更ニ辨スルヲ能ハサルニ至ル時ニ

至リハ瞳孔内白色差クハ灰色差クハ黄色ノ斑
見レ瞳孔ハ縮張尚自在ナリ但シ葡萄膜他部
愈着セル者ハ然ラズ

各自之症候

翳唯水具囊ニハ在ル者ハ之ヲ見ルニ深カラ
ニ微白雲ニハ二三ノ微白色ナル斑點翳ノ面ニ
見レ其曇暗スルハ始メ中央ヨリモ周圍ニ甚ク
其増進スルハ甚ク疾速ナリ患者物ヲ視ル毎ニ
物ノ面ニ二三ノ小黒点アルカ如キヲ覺フ但シ
此種ハ速ニ水具体囊ト合併シ易シ

此種ノ翳施術後ニ突スルコトアルコトハ其色乳白
ニメ碎片ノ如ク或ハ動揺スルアリ或ハ動揺セ
サルアリ○水具囊ノ前面ニ突スル者ハ帯
青銀色ニハ周圍ヨリ中央ニ向テ光甚ク如キ線
條見ワルコトアリ故ニ又之ヲ星翳ト名ク此種
ハ虹彩ニ変ラ生シ易ク且ツ後面ニ突スル者ヨ
リ帯ニ居多トス後面ニ突スル者ハ帯青緑色ニ
ハハ階セルカ如ク且ツ虹彩変テ起スコトナシ故
ニ此種ハ自ラ別ナリ
水具体翳ハ其所在甚ク深ク中央ヨリ始テ徐々

其周圍及于其終り大抵皆膜翳ト合併スト至
其時間甚々長シ
軟翳：於ラハ水晶体其裏ト共ニ著シク増大メ
虹彩ニ愈着シ瞳孔之カ為ニ縮張ノ機ヲ失メ其
動トキト恰モ真ノ黑翳ニ於ルカ如キニ至ル患
者以ニ至テハ昼夜ヲ辨ズルカ如キニ至ル患
水晶体ノ実質剛固ナルト石或ハ骨ヲ如キニ至
ル者ハ瞳孔ノ縮張甚々容易ニ著シク縮小ス
但ニ其翳ノ色ハ人ト定ルトナシ
黑翳始テ至之ヲ察見ス人水晶体ニモ水晶体ニモ

癸ス其水晶体ノ癸スル者ハ瞳孔内常ニ差フ
ナク黒色ニ又瞳孔ノ縮張ハ或ハコレアリ
或レコレナキアリ水晶体ニ在ル者ニ在ラハ瞳
孔ニ直接メ二三ノ黒線見レ多少ハ其翳虹彩ニ
愈着ス○加之視瞻漸ク茫手トナリ病ノ進ニ從
テ透亮ノ光氣假令ハ燭火ノ如キ其光其大共ニ
減少スルヲ覺フ寸ハ此病タルト蓋疑ナレ但レ
此病ハ真ノ黒内翳ト混スル人アリト虽ニ術ニ
由テ治スルカコトヘニ真病ト自ラ別アルカ知ル
ヘシ或人ノ經驗說ニ云翳ノ黄色ナルハ融解ス

此徵チリト又之翳ノ動搖スルハ眼水腫ヲ兼テ
水晶体流動シ硝子様液変性スル徵ナリト〇然
レ翳ノ色ノ施術ノ功ニ害ヲ為スルハ未タ
確據タル證據ヲ得ス
没耳尾停尾液翳ハ帶青乳白色ニ其増進甚タ
急速其液ノ量著シク増息スルカ為ニ眼後室
甚ク狹窄シ翳ノ状稍締メ如ク或ハ雲ノ如シ
疾病之始終
灰翳ハ始テ成ルヤ甚ク疾速ナルアリ緩徐ニメ
殆トト辨スヘカラサルアリ緩徐ナル者ハ常ニ

最モ多キ処ニ其始先ツ眩暈頭痛眼窩痛或ハ
額痛ホラ発スル者アリ或ハ然ラサル者アリ而
シテ瞳孔自変ラ見ツス前患者先自ラ微小体ノ眼
前ニ浮游スルヲ覺レ視ル所ノ者皆雲霧ヲ隔ツ
ルカ如ク次テ速ニ瞳孔内小白斑ヲ発ス
翳ノ全成スル時間ハ定ムルコトナシ或ハ二三年
経ルアリ或ハ高経年弥久ナルアリ偶ニ水晶体
翳甚速ニ全成スルアリ多クハ是レ乳翳ニ於テ
アル所ナリ灰翳ノ究竟種々アリ其一幸ニ吸收
管一種ノ変機ヲ得テ全ク翳ヲ吸收シ尽スルアリ

為ス劇々吐ノ長ク暫留スルモ亦於因トナル
○灰弱ノ近因ハ水具体水具葉及セ設ル尾俾尼
液ノ墨弱ナルヲ前ニ之ヘルカ如シ予ハルテ也
人ノ説ニ從ヒ且ツ自ラ実験ニ由テ之ヲ見ルニ
水具葉弱ハ是其ノ曠ノ激衝ヨリ起スル者タル
ヲ疑フニ角曠激衝後ノ墨弱ヲ残スラ以テモ之
ヲ徵スヘシ然レ氏水具体弱ニ至テハ未夕明ニ
然リトスルヲ得ス何者其實質栄養ヲ機轉未
夕明ニ然^{知ル}リトスルカラ得ヤレハナリ夫レ激衝
能ク其部ノ栄養ヲ失フシメテ其實質ノ組織ヲ

変シ近傍ノ部分ト分離セシメ且ツ之ヲノ尖痺
ヤシメ終ニ融解セシムヘキ者ナラシヤ凡ノ身
体何レノ部ニ於テモ液ニ融レテ融解スル部ナ
キニ水具体ハ特リ水隸液ノ融ニ由テ融解スル
ニ由テ之ヲ見レハ水隸液特リ弱ヲ融解スル一
種ノ性ヲ備ル者カ也等ハ皆疑メ存メ後ノ君子
ヲ俟ツ

他病合併

他病ノ合併スルハ此疾ニ最多クコレアル所ニ
ノ治術ニ害ヲナス甚夕少カラマ宜ク其合併

合中何レカ最モ害ヲナス
病
下ノ詳ニ登ルニ其

シ来ル所ノ諸病ノ根ヲ断チ而シテ後ニ始テ術ヲ
施スヘシ然ラサレハ妙手ト云氏必ス其功ヲ誤
ルモノ之
合併病ニ二種アリ一ハ全身ノ病ニ一ハ一部ノ
病ニ全身ノ病トハ即チ梅毒瘰癧頭瘻毒症等ノ
属是之一部ノ病ハ結膜病角膜病虹彩病水棘液
病硝子棘液病網膜病等是之
所翳ニ合併スル角膜病ハ眼疾及ヒ結膜ノ傷冷
毒病ハ疼痛最甚ク曇暗程度ニ至ルニ非レハ其
疼退カス故ニ先ツ術ニ先テ適宜ノ療法ヲ施サ

スニバアラハス
脈痛棘腫ハ屢ニ発ヤル激衝カ若クハ緩和劑ノ
通用ヨリ発スル者ニシテ其所在結膜ニ在ルアリ
脈絡膜ニ在ルアリ虹彩ニ在ルアリ共ニ皆先ツ
適宜ノ薬剤カ外科術ニ由テ之ヲ治シ而シテ後ニ
翳ノ方術ヲ處スヘシ
角膜病ハ斑点ト葡萄腫トナリ○斑点ノ大ナル
者ハ角膜上面一部ノ潰瘍若クハ激衝ニ由テ其
膜間重襲メ成ル膜ノ組織稠密トナレル者ニシテ殊
ニ其斑瞳孔ヲ蓋フ寸ハ大ニ施術ヲ妨クル者ニ

以下原
文難辨

葡萄腫ハ剛膜ニ発スルアリ角膜ニ発スルアリ
虹彩ノ脱弛ヲ兼フルアリ共ニ皆反翳ニ合併ス
ル所ノ難治ノ病ニ癌腫モ亦其所在ニ拘ラス皆
然リトス
虹彩病ハ放衝ト愈着ト瞳孔窄小トナリ○眼ノ
放衝ハ総テ其内部殊ニ虹彩ニ及フ寸ハ必ス終
ニ白翳ヲ発スルヲ其常ニ况ンヤ勿時ニ於テ術
ヲ施サハ其放衝益増進ノ卒ニ其眼ノ全廢ヲ失
スルニ至ラント必ヤリ故ニ放衝諸症ノ全ク減

退シ去ルマテハ施術ノ期ヲ延スヲ眼科ノ常則
ナリ○虹彩ノ愈着ハ角膜ニ愈着スルト水長囊
ニ愈着スルトアリ共ニ皆劇キ放衝ヨリ発ス而
シテ一部ノ愈着ト全部ノ愈着トアリ一部
ノ愈着ハ瞳孔ノ常形ヲ失スルヲ以テ知ルヘシ
ト虽氏全部ノ愈着ハ甚ク難知ニ推トス共ニ互
ク先ツ其愈着ヲ分離セムンハアラヌ○瞳孔窄
小ハ偶々他ノ疾ヲ兼ルヲナクメ特リ発スルア
リ放衝ニ由テ他部ニ愈着スルヨリ発スルアリ
其愈着ニ由ル者ハ治シ難シトス他疾ヲ兼子サ

ル者ハ葎蓉及ヒ菲沃斯失無密ノ如キ麻劑ヲ外
 用メ一時ノ張擴得ルニシテ其病ハ
 膿眼ト眼水腫ハ最チク内翳ニ兼発スル也タリ
 ○膿眼ハ角膜實質ノ襲間ニ発スル腫瘍ヨリ
 眼前窓若クハ西窓ニ膿液充盈メタルナリ若シ
 其膿溢泄シ或ハ分高滲出スルホニテ角膜ノ襲
 間ニ凝固スル寸ハ斑点トナル其斑点著シテ大
 小ノ瞳孔ヲ蓋フ寸ハ亦内翳ノ施術ヲ妨ク○眼
 水腫ハ水抹液多泌ノ過度ナルヨリ発シ或ハ角
 膜裡虹彩前ニ透明ナル一種ノ膜ヲ生スルヨリ

合或ハ硝子様液小品
 液ホノ融解スルヨリ発
 レ

発シ或ハ唯水抹液吸收ノ度ノ微ナルヨリ発ス
 或ハ嫩膚ヨリ発ス眼水腫ハ亦屢々能ク深ク眼
 底ニ発スル所ノ瘰癧ノ前徵トナルコトアリ
 硝子様液病ハ常ニ能ク内翳ノ施術ヲメ其印ヲ
 誤ラシムル者ニ其病ノ大ナル者三アリ即チ緑
 翳乾燥及ヒ化骨是ナリ
 緑翳ハ合併病中至惡症ノ一ニシテ全ク視瞻ヲ妨
 ルモノ之人若シ灰翳ノ縁ヨリ眼底ヲ窺フニ其
 色常チラナル者ハ必ス此病ノ合併スル之症
 ニ於テハ方術更ニ効テルコトナシ○硝子液乾燥

ハ甚夕稀ナリト虽氏子亦自ラ実験ヤルナリ
其液ヲ包裹スル所ノ薄膜常形ヲ有スルヲ能ワ
ス敬篤ノ其中ニ浮懸シ至微ノ拳動ニモ必ス動
搖ス故ニ搖翳ハ多クハ其症ヲ兼ルモノ之以症
モ亦術ニ由テ視瞻ヲ得ルヲ難シ○硝子液化膏
ハ其榮養常ヲ失スルヨリ発スル者ニモ常ニ真
ノ黒翳ト混シ易シ而メ俱ニ治シ難シトス
真ノ黒翳ノ灰翳ト合併スルヲ辨別スルハ甚
難シトス諸家皆瞳孔ノ散大スルヲ以テ真ノ黒
翳ノ微トスト虽氏亦此症ニ於テモ瞳孔弛張自

在ナルヲ得ル者屢ニ是アリ然氏其瞳孔散大
ノ患者水晶体ノ周圍^{即チ翳ノ最}ヨリ是モ光
輝ヲ透見スルヲ得ス加之ニ血彩全ク運動ス
ルナキ者ハ此病ノ合併タルヲ疑ナレ○且ツ
黒肉翳ノ真症ハ其病甚夕次序ナク其患者一時
ハ物ヲ見ルヲ明ラカニ一時ハ全ク見ルヲ得
サルモノニモ草疔ノ灰翳ハ斯ノ如キ症候絶テ
マレナキヲ預メ常ニ理會シ得ハ皮袋ハ誤認
スルヲ少カラシム
前見

心翳施術ノ功ハ患者ノ年齢・應ニ愈着ノ有無
ニ應ニ合併病ニ應ニ稟質ニ應ノ人々相差フカ
ユヘニ預メ概見シ難シトス
○凡ソ少壯ノ年齢ハ術ヲ施メ善功ヲ得易シト
スト至成極老ノ徒モ亦効ナキニ非ス可ル明
止人曾テ百六歳ノ老人ニ術ヲ施メ効ヲ得タリ
ト云リ但シ其視瞻ラ者ハニテ歳ト増ヨ又嬰兒ニ於
テハ術ヲ施スニ宜ク戒慎ノ意ヲ用ヒスハアラ
スト至成或人ノ説ハ如キ者ニ非ス其説ニ云フ
宜ク嬰兒ニハ施スヘカラス稍年ノ長マルラ俟

ツヘシトゲセルテ「エ」
説ラ非トセリ○虹彩ノ運動自在ニ且ツ假令
愈着スルアルモ至微ニ著シカラサル者ハ施
術ニ害ナシトシ且ツ外見合併病アリテ効ヲ得
難キカ如キモ術ヲ施メ却テ善効ヲ得ルコトアリ
唯眼白ノ感動最モ甚シキ者ニハ術ヲ施ス勿レ
其刺戟ニ由テ非常ノ害ヲ招クコトアレハナリ○
草翳ハ總テ治シ易シトス時トメハ此症術ニ由
ルコトク自然ノ良能ニ由テ自ラ治シ視瞻故ニ
後スルモノニ

預防法

唯既矣ノ醫ノ治スルノミナラス亦未タ矣ヤサ
ルヲ預防スルコトモ眼科ノ要務ナリ故ニ總テ眼
ニ害ヲ為スヘキ者ハ皆之ヲ避ケレシメ既ニ其害
ヲ受ル者ハ務テ之ヲ除シテ要スヘシ○初生
児ニ於テ過度ノ光氣遠ニ其眼ニ蝕ルコトヨリメ
生涯ノ害ヲ残スコト委此レアルハ皆又ノ知ル如
ク年ナリ且ツ眼ノ諸毒ハ薄弱ニメ熾衝ニ罹リ
易シ其熾衝ヨリ眼ノ諸病ヲ誘矣シ就中能ク灰
翳ヲ發ヤシムル者ニ是故ニ強ク視カテ費モ亦

至害アリ宜ク之ヲ慎シムヘシ○若シ既ニ灰翳
ヲ發スル徴候アルナリカ所及務テ其全成ニ進
ムヲ防クヘシ之ヲ防クニハ眼ニ光輝ノ射入ス
ルヲ少クスルヲ自トスコルリシコト嘗テ其ニ用
ルニ内翳管ナル者ヲ發明ス是惟要用ナル所ノ
事物ノ外物ヲ見得サテシムル事ナリ
眼科術

水晶体若クハ其囊翳ヲ後故ヤシメンカ為ニ古
来種々ノ内科術ヲ施ス者アリト云凡未タ曾テ
一モ物ヲ得シ者アテス保適當ノ醫ヲ求ニ由テ既

奈ノ醫ヲ前散ヤシメ夕別ト云ノ例アリト云走
其ノ如キハ甚ク稀ナル者ニヘシ未夕信據スル
ニ是ラズ

施術月事之擇

世ノ一般ニ云ク弱ノ眼ニ灸スル寸ハ宜ク他眼
モ亦之レニ罹ルヲ俟ツテ術ヲ施スベシト據ア
ルニ非ス他人ノ所謂弱ノ熟ナル者モ亦切ニ利
害ヲ為ス者ニアラズ唯弱ノ白色増進ノ針作用
自在ナル寸ハ術ヲ施スニ宜トスルノ三月時ノ
擇トニ於テモ亦然リ夫レ冬ハ最モ傷冷毒ヲ受

易キ時ナレバ之ヲ施メ害ナシ況ヤ他時ヲヤ四
時俱ニ施メ害ナキトハ実験ニ由テ之ヲ知レリ
患者預備

古昔ハ施術前患者ノ種々ノ預備ヲ為サシメタ
リト云氏當今ハ之ヲ用ヒス何者唯此患者ノ衰
弱ヤシムルノニ利用アラサレ病之然レバ
施術前一二日ハ緩ナル下劑ヲ与テ飲食ヲ節ヤ
シムヘシ是レ腸胃ヲ清淨ニメ欲術ヲ防ニカ為
之肉食ヲ禁スルモ亦佳トス又施術前ニ阿片少
許ヲ与ヘ瞳孔窄小ナル者ハ菲決失亜密裁裁欺

劑若クハ苳苳膏溶液ヲ眼中滲入スル能ク
 患者ヲ靜思セシメテ術ヲ施スル容易ナラシム
 外科術
 灰翳ハ自然良能ノ力独リ能ク之ヲ治スルヲ能
 ワサルカ故ニ人能ク之ヲ扶助ヲ為サズバ有ヘ
 カラス其扶助ニ唯外科術ノ力而シテ其術タルヤ
 唯視瞻ヲ害スル者ヲ除キ其機能ヲ復故セシム
 ルニアリ○古今ニ至テハ其術實ニ精ヲ極テ然
 シト冬セリ而シテ其得ル所ハ印ハ皆同一ナレド

之ヲ用ルル方法ハ種々アリテ一ナラズ然レド之
 ラ總ルニ其方法唯ニヤリズ一ハ眼内ニ於テ水
 晶体ノ位置ヲ轉スルニ一ハ更ニ孔ヲ穿テ之ヲ
 外ニ出タスナリ○此ニ術ノ用法ニ各ニ種ノ差
 アリ一ハ角膜ヨリスルニ一ハ剛膜ヨリスルニ
 ○其眼内ニ在テ位置ヲ変セシムルヲ各々ニ擠
 下法トテテパルツトシテト云フ孔ヲ穿ツテ外
 ニ出タスヲ剔出法トテト云フ孔ヲ穿ツテ外
 膜ヨリスルヲ刺角膜術ト名ケ剛膜ヨリスルヲ
 刺剛膜術ト名ケ此方法ノ用法ハ家々ニ相差テ取

捨議論多トナリト云氏施術前ノ常則ハ俱ニ相
 同キ者アリ故ニ先ツ其常則ヲ説キ而シテ後ニ各
 個ノ法術ヲ説ントス
 施術前之常則
 術ヲ施ス室ハ光氣ヲ適宜ニシ患者ハ椅ニ倚ラ
 シメ^椅ノ櫛ハ宜ク高クソ患者ノ頭ヲ仰テ光線
 ノ鼻ニ接メ眼ニ入出トナラシムヘシ強キヲ禁
 ス光氣強レハ虹彩之レカ為ニ縮張スレハ之又
 水具付ヲ擠下スルカ別々スル少時間ハ他ノ一
 眼ヲ閉シムヘシ
 ○補者一入患者ノ背後ニ立チ

其頭ヲ胸ニ受ケ手ヲ其頭ニ當テ其手ノ示指ヲ
 以テ眼脥ヲ掲ケ他ノ補者ハ皆其所ニ居テ術者
 ノ用ヲ俟ツヘシ
 ○定脥子原名「オ」ヲ握リツト固定スルホレハ
 故トアバクワヘンテシ人カ始テ發明スル処ニ
 ノ近未大ニ其製ヲ修繕セリ其蓋具ハ其眼小ニ
 ノ深ク眼窩ニ沈ムモノカ或ハ患者自ラ靜止ス
 ル寸能ワサル者ニ於テハ殊ニ最ニ有用ノ者ニ
 但シ此器ハ眼ヲ壓迫スル寸ノ最モ微ナキヲ以
 テ上差トス若シ之ヲ用ントスル寸ハ其患者ノ

背後：五ツ所ノ補者命スヘシ
 ○術者、宜ク患者椅ヨリ高キ格ニ居テ其定子
 ラ患者ノ椅ノ階子ニ置クヘシ其子ヨリ固定ラ
 得ルモノ之然レ氏術者各々慣ル、所ニ從テ其
 宜キラ得ヘキニ
 摺下法
 刺剛膜術上
 曇翳セル水晶体ヲ摺下スルヲハ殆ント二千年
 未灰翳ヲ治スル無ニノ方術トモ世ニ行レタリ
 故ニゲルレユニ蓋シテ見ルルヲ人ノ方術著書世ニ傳

シカルハ扁平釣鉞ヲ
 以テ摺下法ヲナセリ

ハルヲ又シ以テ人ノ淚ハ右眼ノ翳ニハ左手ヲ用
 ヒ左眼ノ翳ニハ右手ヲ用テ其鉞ハ銳ニモ甚ク
 細カラズ直ニ右側及アリ而シテ之ヲ刺スヤ外
 背ノ剛膜ヨリ瞳孔ニ白灰入レ水晶体ノ処ニ至
 ラ其翳ヲ上ヨリ下ニ向テ摺ス莫ク時翳若シ再
 ヒ上ルヲ下ル寸以テ之ヲ數度ニ切碎テ深ク沈マ
 シメ而シテ其鉞ヲ抜クニ
 此方術行ワルニ久シカリシニ佛蘭西ニテ
 別々方ヲ發明セシヨリサシク衰ヘタリ然レ氏尚
 伊太里^地及ニ於テハ盛ニ之ヲ用ヒ

且ツシカハ人カ中真セヨリ再々後夕世ニ
 稱用スルニ至レリ歟久ハ其鍼ヲ製ラ少ク改テ
 稍扁平ト為メ其尖ヲ鋭ノ如クシ長ク甚夕鋭ク
 少ク扁ナル方ニ鉤股ノ方尖端ニ至ルマテ鼻骨
 ラ附接ス身ノ一取是レ水具体ノ前面ヲ破リ易カ
 ラシカ為ナリ而メ其法術ヲ施スヤ左ノ如シ再
 左眼ノ翳ニ於テ先ツ鍼ヲ右手ニ取テ管ヲ
 持ツカ如クシ下眼ヲ下ニ曳キ補者ヲシ其頭ヲ
 カ所及因係シ併ヤテ其腹ヲ上ニ掲ケンメ而メ
 其鍼ヲ持夕ル手ノ余指ヲ顛顛ニ當テ鍼ヲ後後

顛顛ニ向テ外背ノ方角膜際ヲ距ル七一レイン
 許一分弱ノ処瞳孔ノ横中徑ヨリ少ク上ニ偏ス
 ル部位ヨリ刺ス但シ其鍼ノ能ク紅彩ヲモ毛掠
 抜原ルハハハルセシヤラモ毀傷ヤサラン為ニハ
 一ノイニ半ノ処ヲ自トス
 而メ後ニ其鍼ノ柄ヲ徐々ニ顛顛ヨリ遠サケナ
 カラ鉤リニ後テ之ヲ進メ鉤端全ク眼球内ニ入
 ル寸ハ其鍼ノ腹ヲ水具体ノ上部ニ至ラシメ下
 ニ向テ之ヲ拵メ微シク其位置ヲ変ヤシメ但シ
 鍼ハ其始ノ空ク毛狀体ト水具囊トノ間ニ在リ

次之虹彩裡面ト水具囊トノ間来ラレ
ハ是時瞳孔見ワレシムルヲ目的トス之ヲ要
スル者ハ是若シ其鍼水具囊ト水具体トノ間
入テ唯々水具体ノミヲ硝子楮液中ニ挿レ入ル
トテ其囊残テ後翳ヲ生スルニ而メ其内
脊方ト向ヘル鍼尖ヲ正横ニ水具体ノ中心ヲ越
テカ所及水具体及々其囊ノ内脊方ノ縁ニ密接
ヤシメ而メ後ニ鍼ノ柄ヲ少ク已レノ方ヘ倚セ
ル意ニテ鍼尖ヲ水具囊ト其体ノ實質ニ刺レ入
レ半輪状ノ動ヲ以テ彩ク其囊ノ前面ヲ截リ破

リ以テ翳ヲメ瞳孔ノ部位ヲ去レメ以テ瞳孔ヲ
メ同ク黒ク視瞻ニ害ヲキテヲ得ヤシメ而メ後
ニ鍼ヲ其マニ暫ク止メ少ク捻テ固着ヲ離シ之
ヲ抜ク又後翳ニ於テ之ヲ眼前室ニヤシ融解セ
シムルモ其術意今々同シ
又此方ニ拵テ其翳ヲ滑脱ノ深ク硝子液中ニ溶
リ入ルトアリ然ル寸ハ宜ク其マニニ置クヘク
殊ニ其水具囊既ニ破ルル者ニ於テハ然ルラ佳
トス又其曇翳セル水具體眼前室ニ逆出スルト
アリ此症ハ即チコトイヘス欲カ始テ偶爾ニ別々

方々々明ヤレ所々者々ノアッレアウクニベル
 此レ人等其々融解ヤレムヘキヲ云フト本
 才ト魚床教年間融解ヤサル者多キカ故ニ宜ク
 其他症ヲ継発ヤサルニ先テ其弱ノ出ツヘキ道
 路ヲ為サズンハアラス然氏先ツ充氣ヲ減メ瞳
 孔ノ張擴マレ度ヲ見其張擴能ク弱ヲ入ルヘキ
 許ナラハ再々弱ヲ其内ニ入テ橋下スルヲ宜ト
 ス
 又レハ方術ニ共ニシカルバニ差
 ワスト虽氏唯ハカ軟弱及ヒ流動弱ニ施ス

術ハ大ニ差ヘリ即唯水具囊ヲ切破ルノミニメ
 其他ヲ水棘液ノ融解力ニ任スニ其用ル処ノ鍼
 ハ細クメ其長サ一寸許其尖銳ク其端ハ分一許
 ノ間一側ニ又テ設ケ尖ヨリ柄ニ至ルニ從テ漸
 次ニ太カラシム而シテ施術前矢ツ菴蓋致哉私創
 ノ溶液ヲ眼ニ滴入シ差クハ其瞳ニ塗擦メ瞳孔
 ヲ開カシム其方術左ノ如シ
 患者ヲ其高サ適互ナル椅子ニ靠シメ若クハ枕
 ヲ高ヤル上ニ臥サシメ定瞭子ヲ以テ上瞭ヲ固
 定ヤシメ外眥方角膜ヲ避ルコト一レハ強ク処

ヨリ剛膜ヲ刺メ其鍼ヲ入ル但シ鍼ノ鈍側無キ
方ヲ上ニ向フシム而メ其鍼ノ水具体ニ届ク寸
尖端ヲ前ニ倚セテ眼前室ニ見ル可ナラシメ其
翳軟質カ流質ナル寸ハ唯々其水具囊ヲ破ルノ
ニニメ鍼ヲ抜キ其排泄セル濁汁ノ吸収ヲ俟ツ
其吸収ハ一二日ヲ経テ尽スアリ唯々一二時ニ
メ尽スアリ而メ後ニ高瞳孔内ニ変シ見ル寸ハ
再々鍼ヲ入テ縦横ニ多截シ以テ皆眼前室ニ出
ス若シ其翳固質ナルト見ル寸ハ指下メ水具
囊ノ後面ヲ鬆ク切破リ直ニ其鍼ヲ抜ク若シ又

其翳水具囊ニノミアル寸ハ其囊ヲ体ト俱ニ多
截メ微小片ト為シ亦之ヲ眼前室ニ出シ徐々ニ
吸収セシムサリシテ先天下ノ翳ニ施セ
ル後術蓋トシ虹彩後ノナル者ハ刃ンセルト細
カ譯唇ニ詳ナルカユヘニ爰ニハ唯々ルニカ
語ヲ引テ以テ是レリトス
「ル」曰「カ」ウレ「テ」ル「君」ノ術ヲ施スヤ鍼
ヲ虹彩後ニ入レテ鍼尖ノ瞳孔中ニ届ル寸水
具体ヲ其囊ト俱ニ切開キ以テ水具液ヲ滲入
セシメテ吸収ヲ為サシム而ルニ後自ラ法ヲ

換テ針ヲ角膜ヨリ入レテ之ヲ前術ト名ク是其
意ニ以テク角膜ヲ刺ス寸ハ其故衝ヲ起スコト少
レ且ツ此術ニ於テ尚故衝ヲ起スルコトアルハ是
レ其刺ス処ニ係ラズ唯翳ヲ動スノミメ故衝
ヲ起スル者ニアラス憶フニ是ハ以テ瞳孔ヲ閉
カント為メ用タル良薬ノ所為之故ニ予ハ後術
ヲ勝レリトス後術ハ唯鍼ヲ常処ヨリ入レテ水
具囊ヲ破ルノミナルカ故ニ先ツテ瞳孔ヲ潤開
スルコトヲ要セリレハ然レモ術後ニ於テハ良
薬ヲ用テ瞳孔ヲ潤開カシメスハアラス然ラサ

レハ翳ノ虹彩ニ愈着スル恐レアレハナリ
アタルニ各人ハ其収ヲ速ナラシメシカ為ニ翳
鍼ヲ以テ水具侍ラテ截分ス其鍼ハ直ニメ甚タ銳
ク尖ヨリ柄ニ至ルマテ及ラ備ヘ之ヲ剛膜ノ常
処ヨリ眼ニ入レテ先ツ翳ヲ横ニ截テ其各ラ種
々ニ分截シ共ニ水具囊ト毛捺挺ト繋着スル処
ヲ截リ高シ其碎片ヲ尽ク鍼ノ扁面ヲ以テ眼前
室ニ出シ以テ其融解ヲ自然ニ任カス
ベシ此各人ノ説ニ老又殊ニ其翳ノ固キ者ニ在テ
ハ全ク吸收ヤス或ハ然ルコトヲ得ルモ甚タ難シ

ト云ヘ氏「アタム」迄ノ術ニ由ル寸ハ尚之ヲ速ニ
吸収セシムルヲ得ヘシ何トナレハ彼レハ銳
又ノ翳鍼ヲ以テ氏々ニ分截スレハナリ

摘_下法

刺_{角膜}術_下

爰ニ挙ル所ノ刺_{角膜}術ハ翳ニ摘_下スル者ノミ
ナラズ水晶体及ヒ其囊ヲ破リ或ハ唯其囊ノミ
ヲ截分テ其体ノ位置ヲ変セシメサルカ故ニ摘_下
下_法ノ字義甚タ當ラズト至氏尚刺_{剛膜}術ノ摘_下
下方中ニモ此_法ヲ截_載セシカ如ク唯其方中ノ變

法トノ之ヲ見セシ
刺_{角膜}術ハ他ノ法術ニ比スルニ最モ新シト至
氏入ノ重貴稱用スル最甚キカ故ニ今既ニ能ク
修正ヲ極尽メ毫モ加ル処ナキニ至レリ
蓋シ此_法術ハ各家ニ各々自己ノ發明トシ自負主
張スルカ故ニ其真ニ發明スル人ヲ弁シ難シ即
チ暗厄利亞ニ於テ「ギブ」ニ於テ「サウ」ニテ
込人トヲ以テ「發明家トシ」佛蘭西ニ於テハ「タル
夕」トモ「タル」トモ「タル」トモ以テ「發明ノ人トス
ル」ホナリ然レ其諸家ノ始テ北方術ヲ為セル歳

月ト其術ノ巧拙ヲ比較スルニ之ヲメ始テ規
 矩正キ一個ノ法術ヲラレムル者ハゴロフホル
 名ナリ
 於法術ハ千七百年前暗厄利亞ニ於テ「左ルケト
 入之ヲ其唇ニ著レ次テ「マウサルトリクテルホ
 ヲト「ベールゲ」セ「セ」コ「シ」ラ「シ」カ「ル」バ「ハ」等
 ノ唇中ヲ由テ世ニ公行スト至氏諸名家特ニ
 至ルマテ曾テ發明スル者アラガリシ「ト」實ニ異
 トスルニ堪ヘタリ
 此方術施法ハ適當ノ鍼ヲ以テ角膜ノ一点ヨリ

刺レ瞳孔ノ中ニ入レテ水晶体ヲ摘下スルカ若
 クハ之レヲ分截シ吸収セシムルニアリ
 水晶体毀傷スル「ト」ア「レ」ハ必ズ吸収ニ由テ消散
 スル「ト」ハ刺角膜術發明ノ以前已ニ世ニ明カナ
 リレ之何者意太里亞國ノ「マ」ラ「カ」リ「ユ」ハ「各」ス「ラ」已
 ニ之ヲ知レリ即チ其唇ニ金ノ線條ヲ管ニ夾ミ
 唯之ヲ以テ翳ヲ破ル「ト」ラ「云」ヘリ「ハ」ト「各」モ亦已
 ニ之ヲ知レリ其唇ニ之ヲ術後翳ノ一部眼中ニ
 残レ氏恐ルニ是ラ終ニ吸収シ去ル者ト
 リク「ト」止「ル」人及「テ」ホ「ツ」ト「各」又「此」事「ヲ」證「ス」即チ「ホ」

ツ止ノ説ニ曰ク水長囊毀傷ノ水粘液之ニ滲入
スル寸ハ假令其始メ曇翳ノ視瞻ヲ妨クトモ時
日ヲ経ルニ後テ漸ク詰解シ運速ニ應リメ終ニ全ク
消散ノ軟乎タル鮮明ノ視瞻ヲ得ル下拾ニ妙手
ノ術ヲ受タル者ノ如シ全
ケレト也^名術ヲ施スニ鍼ヲ角膜ノ側ニ備セル
処ヨリ刺メ翳ヲ摘下スコシラズ^名ハ其法ニ由
テ更ニ一種ヲ工夫ス其用フル所ノ鍼ハコシヤ
ツ止状ノ細キ翳鍼ニ外之ヲ角膜ニ刺シ瞳孔ニ
入レテ水長囊ヲ粉ク截開シ其他ヲ吸收力ニ任

カス^名術^名大^名術^名ニ
千八百零六年ニ^名ニ^名ル^名ニ^名カ^名刺^名角^名膜^名術^名ノ^名看
ヲ著セルヨリ以テ術漸ク盛ニ世ニ行ハレ^名尔^名後^名シ
シケ^名テ^名及^名ビ^名ヨ^名ク^名進^名ズ^名カ^名コ^名ツ^名チ^名シ^名ケ^名シ^名地
ニ於テ之ヲ施行シヨリ益々盛ニ廣ク改遷巴洲
中ニ普權ナルニ至レリ^名
コレ^名ノ^名方^名ニ^名地^名ノ^名モ^名シ^名タ^名井^名シ^名人^名千八百十三年ニ尋
常ノ刺角膜術ニ差ス所ノ一種ノ新法ヲ發明シ
自ラ以テ之ヲ以テ法術ノ祖ト^名是^名北^名國^名ニ^名在^名リ^名シ
カ^名故^名ニ^名タ^名ル^名タ^名シ^名又^名カ^名佛^名蘭^名西^名ニ^名於^名テ^名已^名ニ^名之^名ヲ^名其

唇著シテ知ラサ刺ノ其法術殆ト暗厄利
並ニ於テ其ノ術ヲ示シテ其ノ明ヲ示ガリシ
作サシテ者ト彷彿タリ
「ビ」フホルシ名カ用フル鍼ハシカルビ入ル不弱鍼
ト同クメ少ク差ト「シ」ンゲンベリクシ入ルカ用フル
所行者ハ「シ」カハシバシ鍼ヨリ細ク其尖三稜シメ
切ルベク少ク鉤リテ其頸ヲ指細クレシ之ヲ刺ス
ニカカシテ夫端ヲ距ルニ後テ漸次ニ太ク且ツ四
分ニ身ニ國ニ板ニ子ニシツト「シ」ガラシトシハシ入ル等カ用ル
処皆以テ大同小異ニ「シ」モンシタイシ之シ入ルカ用ル所ノ

者ハ其長サ五寸許其本固ク尖端鋭状ニメ西側
又アリサハシテハ「シ」ハシカ用ル処ノ者モ西側又
ノ鍼ナリ施術前ニ先ツ瞳孔ヲ麻痺ヤシメテ開瀉
スルヲ要ス爰ニハ菲沃失垂密菴莖ヲ佳トス
其法西薬ノ「シ」キシハ何レカ一ヌヲ取テ半ヲ蒸
餾水ニ溶シ其一ニ滴ラ眼ニ點滴スルカ若クハ
其「シ」キシハ割ラ「シ」トシハノ細トナシ之ヲ腫ニ塗擦
シ以テ瞳孔ヲ開カシム
「シ」ンゲンベリクシハ「シ」トシハホルシ之シハノ方術ヲ改
テ修正スルト甚々尽ヤリ故ニ吾輩ノ法術皆「シ」ン

ゲンベソクニ後ノ是故ニ今先ツコラシゲンベソ
 シノ方術ヲ以テ身一ニ奉ク
 其術ヲ施スヤ左眼ノ翳ニ於テハ鉞ヲ右手ニ取
 テ驚管ヲ持ツカ也シ其小指ヲ頰ニ當テ、其手
 ノ固定ヲ得ル但シ右眼ノ翳ニ於テハ其小指ヲ
 鼻下ニ置ク而メ後ニ其鉞ヲ角膜ノ上部ヨリ下
 ニ向ケテ刺入レテ其鉞背ヲ水具囊ノ前面ニ中
 ラシメ其翳固質ナル寸ハ益々鉞柄ヲ高メ其尖
 端ヲ下ニ押シ以テ水具体内ノ上縁後ニ向ヒ下縁
 前ニ向フ可クナサシメ其係深ク之ヲ硝子液内

按シテ同二回
 誤ナシ
 七回

指下法若シ其翳軟質ナル寸ハ之ヲ無数ニ截
 分チ其碎片ヲ盡ク眼前空ニ出ス
 前ニ云フ所ノ「ラシゲン」ヘリクノ鉞ハ唯指下法
 ニ用ル所ノ者ニメ其翳ヲ破ルニ用ル者ハ其能
 ク截ル「ノ」鋭利ナラシカ為ニ少ク其製ヲ変ス
 即チ其鉞背ニ鋭又テ設テ鉞腹ヲ鈍ニシ其幅ハ
 前ニ異ル「ノ」ナク背平ニ指下鉞用ル者ハ鉞其又ノ
 部ヲ西扁平面トナシ頰及々其他ノ部ハ形状大
 小皆刺角膜鉞ト差フ「ノ」ナシ此鉞ヲ分ラトメト
 名ク「七回」板

此鍼ノ用法ハ其頸ノ部分即チ其又
 示指カ爪
 間ニ其即按ラルハ指方クノ爪際
 ラナリ但スレ受ケ共ニ其
 同指ヲ以テ下賤ラ下ニ曳キ右手ノ
 環指一作項頭ヲ左
 手ノ拇指頭ニ按レ以テ術中押壓ノ害勿ラシ
 ラ欲ス但右ノ左手ヲ眼共ニ常
 次ニ其示指ヲサク上
 ニ進テ角膜ヲ下ヨリ上ニ向テ刺レ其鍼ヲ翳ニ
 届ラレム而シテ後鍼柄ヲ起メ翳ヲ上ヨリ墜ニ截
 ルト二回次ニ鍼ヲ轉メ脊脊ヨリ外脊ニ向テ横
 ニ之ヲ分截ス其碎片ハ水掬液ノ溢出スルニ從
 ツ鍼ノ動ニ從テ自ラ眼前室ニ出ツ

彼レ自ラ屢試ムルニ此鍼ハ眼ニ入ルト甚タ容
 易クサレモ損挂ヲ起ストナク翳ヲ能ク截ル
 已前ノ鍼ノ比ニ非スト云然レ指下スルニハ尚
 已前ノ鍼ヲ用ユ「モンタイ」名ハ自ラ患者ノ背
 後ニ立テ其翳ヲ胸ニ受テ補者二人ヲ置キ一人
 ニハ患者ノ両膊ヲ持タシメ一人ニハ其頭ヲ持
 タシメ鍼ヲ角膜中ニ正横外眥方ノ剛膜際ヲ
 距ルト一レイン許ノ処ヨリ刺レ其鍼尖ヲ瞳孔
 中心ニ至ル寸一轉メ鍼ノ扁面ヲ正横ナラシメ
 以テ之ヲ水晶体ニ刺レ種々ニ動カシテ之ヲ水

其体ノ上ニ至ラシメノ上ヨリ下ニ向テ微^ミ内ヨリ
外ニ向テ眼後室ノ下部ナク外眥ニ偏スル処ニ
拵下シ而メ後ニ之ヲ扱ク
「モンタイ」ニ古来ノ法術ニ缺ラ補ヒ誤ラ正
メ大ニ之ヲ修繕セラルナリ其功ノ尤モ大ナル
者ニアリ「ハ」拵下法ヲ施スニ月時ヲ擇バサル
ナリ「ハ」拵下法ヲ施スニ其翳若シ動キ追キ
アル寸ハ先ツ其緊着ヲ其鍼尖ニテ截リ尚シニ
三日ヲ経テ施術ニ妨ナク毫モ傍症ヲ生スヘカ
ラサル「ハ」ヲ見定ルニ非レハ再々拵下スル「ハ」

為サ、ルニ是故ニ十日十五日乃至二月間ニ數
回鍼ヲ入ル、ノミニメ術ヲ果サ、ル「ハ」間、以
レアリ
先天ノ翳ハ水晶体翳アリ膜翳アリ西翳相兼ル
アリト墨氏多クハ皆膜翳ニ故ニ「カウ」ニルス
各ガ偶ルニ発明セラル方術ニ由テ多クハ皆治ス
ルモノ也
一男子誤テ木刺ヲ以テ眼ヲ致傷スル後其刺
角膜ヲ貫テ虹彩ノ縁ヲ傷リ水晶体ニ及テ次
ニ「ハ」弱シ「ハ」燦^ハ衝ヲ童子虹彩内眥ノ方ニ於

テ一部ニ愈着セリ故術ヲ治スル後蓋ヲ用
テラ瞳孔ヲ開キ見ルニ翳ノ前面十字形割目ア
リテ水晶体縹ノ如キ状ヲ為ス後数日ヲ経テ
其翳全ク融解消散シ瞳孔清潔ヲ得ルヲ惟モ
術ヲ施セルカ如シ
切ウシテル匹之ヲ見テ新ニ盲児ニ施スヘキ一
術ヲ發見セリ是レ児ハ眼ノ轉動甚キカ故ニ摘
下剔ウ西ヲカラ施シ難ケレハ之其法唯細キ及
鍼ヲ一板ヲ以テ緩徐ニ水晶体ヲ截リ破ルノ
彼レ此法術ニ由テ得ル者七十人中ニ五十

二人盲ニト云ヘリ而シテ其術ヲ施スヤ夫ノ如シ
○先ツ患者ヲ凡上ニ臥サシメ固ク其体ヲ定テ
動クコナカラシメペルサトシ人ノ定眸子ヲ以
テ上瞼ヲ掲ケ鍼ヲ角膜ノ剛膜ニ近通セル処ヨ
リ刺シ其尖端ヲ瞳孔ノ中心ニ至ラシム以下ハ
ルト名人ノ語ヲ以テ之ヲ補フ
ハルト曰ク彼レハラウシタル其鍼ヲ横ニ微動
シ但シ其動瞳孔ノ常形ヲ全ク鍼ノ肩ト尖トヲ
以テ水晶体前面ノ中央ヲ截開ク其切ルヤ十
分カ孔ヲ開ベシマレ術後其創口ノ互ニ閉着

マセサヲカ為之其囊ニ孔ヲ開テ後再々鍼ヲ
其体ノ實質中ニ入レ意ヲ用テ緩徐ニ其紐後
ヲ切開キ而後ニ鍼ヲ其体ニ投キ定睛子ヲ去
リ軽ク其眼ヲ蓋フテ臥サシム
又曰汝術ハ燃衝ヲ突スルト至テ罕ニ若レ然
ルトアヲハ宜ク術ヲ尽メ之ヲ防クヘレ且ツ
術後速ニ良薬ニキス割テ眉ニ塗ルヲ要トス
之レ瞳孔ヲ開カシメテ毀傷セル水具囊ノ虹
彩ニ愈着スルヲ防シカ為メニ
コイ子ニ各カ用ル鍼ハ其尖端一レイニ半許ノ

間ヲ扁ニメ其横徑ヲ一レイニ三分二許ナラ
シメ其頸ヲ細クメ田クス其術ヲ施ス剛膜隆ヲ
距ルトニレイニ許ノ処ヨリ鍼ヲ斜メニ刺レ一
側ノ及ヲ以テ堅ニ水具囊ヲ切ルト数條其一方
ヲ截去テ以テ水具液ヲ水具体ノ實質ニ暴觸セ
シメ其融解ヲ催進ス
凡ソ諸症悉ク皆刺角膜術ニ由テ治スヘキニ非
ルトハ固リ然リ且ツコレイ子ニ曾テ一匠ノ拵下
ハ皆刺剛膜術ヲ容易ニト云テ非トシ刺剛膜術
ニ非レハ治スヘカラサル者アルトヲ証ス即チ

其言云フ

刺角膜拵下法ハ刺剛膜術ヨリ危険多ク其弱
ノ融解ニ難キ者ニ在リハ危険殊ニ多シト
曰イ此名ノ説ニ由ルニ凡ソ弱ノ截破ニ易キ者
ニ於テハ實ニ刺角膜術ノ如ク簡約ニメ危険ニ
能相遠当セハ者ナレ下至凡固着セル弱及ヒ瞳
孔ノ閉着セル者ニ於テハ今ク然ラズ唯刺角膜
術ノ能ク相適当セル者ハ軟弱流動弱乳汁積弱
俸列ニ特弱等其他トモルカクニ液ノ弱又クミツ
止人カ所謂囊弱瞳孔膜弱ノ如キ假弱先天ノ弱

多クハ皆 核弱 原名トカクニククノ種類 其中ニ核
及ヒ後弱ノ類是ニ彼又以為ク速者ノ体弱大ニ
術ノ印ヲ害スル者アリ故ニ十歳以下ノ児搦搦
ヲ柔レ易キ又眼ノ深ク陥没セル又及ヒ眼瞼ノ
十分ニ開キ難キ又等ニハ刺角膜術ヲ自トスト

白内翳治術集論三

別出方^法上

○刺角膜術

別出方^法ハ、擠下方^法ニ比スルニ、甚ク難トスト、至モ

既ニ「ア」ニテ「イ」ルリ「ス」人ノ時ニ於テ有リ「シ」ラ「リ」

「ス」人ノ書ニ出タリ、蓋シ此方ハ「厄」勒「奈」亞「及」ヒ

亞刺比亞ニ於テ「ア」セニ「十」人ノ時既ニ之ヲ施

シ、其後世人皆「十」丈水様液溢出スルヲ恐レテ之

ヲ棄瘞シ、後人又「夕」ホ「ル」ケ「ル」コ「イ」テ「ル」人「再」ヒ「然

」方ヲ興セリ、然レ迄世ニ至ラハ、傳來甚ク詳ナラス

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 其、之、下、法、刺、角、膜、術、等。

唯千六百九十四年ニ獨乙都ノ眼科ブルイタク
 人別出方法ヲ施セルト明ナリ又術タルヤ角膜ヲ
 裁向ラ醫ラ小鉤ニラ曳出スゴスレイトホヒ
 ウス名之ヲ学ラゴスレイハ千六百九十五年ニ之
 ラ施シホヒウスハ千七百零二年ニ之ヲ施セリ
 後千再々中絶シ唯千七百零七年ニスト江イ一
 ス名人偶爾ノ疝ニ由ラヌ方ノ施スヘキヲ考一
 可子ト名人其考按ニ依ラ其次年ニ之ヲ施ノ以テ
 又用フヘキヲ證セルト
 寔ニ別出方ヲ規矩相定レル一個ノ方術トセ

ルハタヒル人ナリ其發明前世千七百年ノ中頃ニ
 在リ而ルニ又術ニ用ユル置置是多クノ繁記
 ナリニカ故ニチバエイ人之ヲ改メテ簡約ニシ
 唯一種ノ器具ヲ以テ之リトセリ即千兩側ニ
 ノ小カトトストノ器名是也
 其後又々諸家之ヲ改メテ大ニ又器具ヲ増ス就
 中ホエイト名人ハ加之ニ一種ノ小カトトヲト
 糸ト云テ以テ之テニハトハ之ニ加フルニ鉤
 フ義義ヲ以テ之テニハトハ之ニ加フルニ鉤
 眼球ヲ固固ククラ以テ之テニハトハ之ニ加フルニ鉤
 ト定驗子トテ以テ之テニハトハ之ニ加フルニ鉤
 自家ノ小鉤

中レハニナラニ名
 ヲ以テ計トハ
 五歩ホトアリ
 合端ニテ漸ク
 大リ柄ヨ去ル
 三レイニノ処ヨリ

シエツポルドヲ加ハハ
 ハリヤ
 ラニセツト
 ニセル名共ニ其形状一様ナ
 ストナリト名クハ
 ウエニセル名ノ
 長ク其長寸ハ
 端ヲ距ル下六
 此背ハミナ
 フ第一板リク
 又アル部斜ニ
 加ハハ
 ト名クハ
 今尚ヲ
 用ユ
 状ニ
 尖
 三
 少
 凸
 出
 柄
 備
 一
 側
 全

長ノ六分一
 他ニ
 鈍ニ
 又ナク
 又柄ハ
 赤ク角形ニ
 第一板
 状ノ小カ
 ハ両ヲ
 施術ニ
 用ル
 二指ハ
 常ニ
 顛
 上
 中央
 ノ微シ
 上ニ
 保テ
 眼球ノ
 静定ス
 ルヲ
 俟テ
 直ニ
 又尖ヲ
 角膜ノ
 横邊
 剛膜ヲ
 距ル下
 半レ
 以テ
 許ノ
 処ニ
 刺シ
 連カニ
 眼
 前室ニ
 全幅ヲ
 横断ノ
 相對ス
 此処ニ
 至リ
 以テ
 角膜ヲ
 半月状ノ
 兩半面ト
 十ス
 而ノ其
 下半面ハ
 前ニ
 張リ
 女
 子
 齒
 レテ
 下
 睪
 支エ
 ラル、
 故ニ
 其
 創
 旬
 自
 ラ
 鑿
 孔
 十
 以
 其
 横

断スルニ当ラ眼球モ共ニ動リテ有ルトキハ
 尚ラ其動ニ從テ刀ヲ進ムテヲ要ス是レ又刀ヲ
 引退リレハ水様液溢出テ虹彩ヲニ近^通スレハ
 也若シ然ルテ有ルトキハ連カニ又術ヲ止テ指
 テ以テ眼上テ摩擦ニ虹彩ヲ引収マシムルヲ常
 則トス若シ又テ角膜ノ創口小ニテ水晶体ヲ出
 スニ難キ時ハ剪^カ若クハ小刀ヲ以テ裁テ之ヲ大
 ニス
 角膜ヲ横断スルトキハ水晶体直ニ前室ニ進出
 スルト屢テ状アリ又テ瞳孔収縮ノ然ラサルテ

三ホク屢ニ状アリ状^ニ於テハ眼瞼ヲ開カシ
 ムレハ瞳孔向ラ翳自ラ創向ニ道出スルヲアリ
 瞳孔ノ収縮ニ由ルニ非ス又ノ翳自ラ動キ難キ
 者アリ状^ニ於テハ^レスナク^レテ入レテ水晶
 囊ヲ破ルラ要トス又之ヲ入ルマ釣背ヲ以テノ
 釣版^即ル^ルア^ラ水晶囊ノ上部ニ至ラシムルニ用
 フルニ^レカ^ルハ^ル人^ノ鉞若クハ^レウ^レニ^レセル^ル人^ノ金^ノ鉞
 テ佳トス^之ニ^レ由^テ状^レヲ^レ觀^レハ^レニス^トト^レ如^ク状^ニテ^レ十分^ニ
 水晶囊ヲ切破ル後水晶体ヲ出スニハ輕キ壓迫
 テ十^ニサ^スニ^ハア^ラス^又壓^迫ス^レヤ^直ノ^前ヨリ

後ニ向テ圓膜ノ上部ニ為ス一ニ硝子液之カ為
 メニ後口ニ壓ナシテ水晶体自ラ逆出ス如ク
 壓迫スル時ハ硝子様液少シニ溢出スセテ
 トス 硝子様液尋常
 其醫モシ骨様ナリ時ハ壓迫ニ由テ動シ難シ強テ壓
 迫スルハ硝子様液必ス溢出ス之ヲ出スニハ
 外ニク毛引ノヲ用フルハ佳トス又之ニ及テ軟
 ナル者 即水晶体既ニ破ニ於テ其囊ヲ截リ破ルハ
 綿ノ如ク汚液溢出セバ温湯ヲ射入テ之ヲ洗一
 シ若シ又囊ノ状又ク害ヲナス可キヲ見バ

ニク毛引ヲ用フルカ若クハクヒト ル人ノ眼ヒヲ以
 テ尽ク之ヲ除キ去ル可シ
 ウエニセセルハ又カテ眼前空ニ入ル時ハ蓋ニ又
 尖端瞳孔内ニ入レテ水晶体前面ヲ截リ破リ次
 ニ又角膜斷餘ノ処ヲ截テ又術ヲ終ル實ニ簡約
 ニテ施シ易キカ如シト蓋ニ甚ク虹彩ヲ毀傷シ
 易シ虹彩ヲ毀傷スルハ劇ク燧衝ヲ眼ノ内部
 ニ奈ス諸家ノ此方ヲ取ラサルモノ多クハ此レ
 カ為也
 廿ニタシリ ル人カ施ス所ノ術ニ種アリ又一ハ患

者、椅子若クハ几上ニ置テ其頭ヲ己レノ膝ニ枕
セシメテ固ク保持スルニヤト伏^伏ノ両側及アル
コトストウリ^リラ角膜ノ上部ニ刺シ其尖ヲ水晶
囊ノ前面ニ至ラシメ之ヲ截リ破リ次ニ之ヲ抜
テ輕ク壓迫ラ為ノ水晶体ヲ送出セシム此^法方術
ニ由テ誤治スル者三四アリシヨリ更ニ其法ヲ
改革ス

先ツ患者ヲ椅子ニ坐ラシメ其椅ノ欄ハ高クシ
テ其頭ヲ固持スルニ便ス 是レ補若ノ手ヲ以テハ其保而
持ノ固カラカレカクノ也
ノ一手ニ定睨子 其上縁ノ幅ヲ取リ其手ヲ額ニ當テ
廣クス

眼ヲ固定シ他ノ一手ニ一寸五分許ノコト
ウリ^リリ^リノカト^ト桐^桐葉^葉ヲ以テ常法ノ如ク眼前室ニ刺
シ入シ其尖ヲ瞳孔ニ入シテ水晶囊ヲ截リ分チ
内背ノ方ニ倚セラ之ヲ抜キ柄端ヲ以テ輕ク眼
ヲ壓シ水晶体ヲ出サシム若シ出ラ難キトアル時
ハカノ尖ヲ以テ其創口ヲ大ニシ小鉤ヲ用ヒテ
之ヲ出ス^トベ^ベル^ルハ^ハ後^後醫^醫ノ再^再ヒ^ヒ登^登ス^スル^ルヲ^ヲ御^御テ^テガ
為メニ水晶体ヲ其囊ニ降ク^クヲ^ヲナ^ナセ^セリ^リ此^此レ
ニ用ユル所ノモノハ昂キ彼レガ自ラ昏明スル
所ノ鈕狀鐵^鐵之^之 一^一枚^枚之^之ヲ^ヲ正^正直^直ニ^ニ弱^弱中^中ニ^ニ刺^刺シ^シ指^指ヲ

以テ少シク下ニ動カシキハ捨テ水晶囊周囲ノ
繋著ヲ離サシメテ以テ翳ト共ニ之ヲ引テ出ス
グフニ名ハ軟弱ニ於テ其患者極老ナルガ為メカ
若リハ角膜ノ甚ク平ナリカ^為カ若リハ其眼ノ
深ク眼窩内ニ陥凹スルカタメニ自家ノ剔出方^法
施シ難キトキハ先ツ尋常ノ拵下鍼ヲ剛膜ヨリ
刺シ水晶囊ノ前面ヲ截破リ鍼ヲ種ニ向ケテ
水晶体ノ实质ニ刺シ細カニ之ヲ截碎シテ以テ水
漾液中ニ游泳マシメ而シテ再ニ^コビストラリ
シテ以テ角膜ニ孔ヲ穿テ其碎片ヲ外ニ出ス其

術左ノ如シ
患者ヲ尋常ノ剔出方ニ於ケルカ如ク居ラシメ
テ移動スルコト勿ラシメテ度幅ノ^コストウリ^シテ
取テ外背ヨリ眼前室ニ刺前術ニ於テ水晶囊ノ
令截尚ラ未ク不^レ足ナリテ疑フハ斜ニ刀尖
ヲ瞳孔ニ入シテヨク之ヲ截分テ而後ニ刀カヲ
抜キ令碎セシ弱ト共ニ水様液ヲ流出セシメ次
ニ小ヒテ創口ヨリ入シテ其残余ヲ悉ク除去ス
又除去スルニ當テ小ヒ背ノ輕ク壓迫スルガ為
ニ弱ノ分碎多クハ又ク硝子液中ニ拵入セラレ

アタムスルハ又始メ楮下方ノ篇出セル所ノ方術
 ラ用ヒシニ後キ之ヲ交換ス但シタラハルニ以テ又術
 殆トギブリニ名ノ方術ニ同シ蓋シ彼カ之ヲ交換
 セルモノハ從來ノ術ニ由ラ剛弱ノ全ク分碎セ
 ヲル者ヲ眼前室ニ出シ虹彩状シカ为メニ壓迫
 セラシテ劇キ焮衝ヲ登セシク有リシカタメ
 又交換セル方術ハ殊ニ弱ノ核甚ク剛固ニメ分
 碎シ難キモノニ之ヲ施ス又之ヲ施スマ先ツ莖
 落ラ以テ瞳孔ヲ向テ致ラシテ以テ眼前室ニ出
 ヲシメ而後ニ角膜ヲ穿テ之ヲ外ニ出ス

又前術醫ヲ眼前室ニ用ユル鍼ハ又長一寸許又幅
 一寸之十三分一許又眼膜ヲ刺貫クニ強クノ腕
 也ゴウニカ為ニ又両面ニ肉ヲ附テ圓形ニ近カ
 ラシメ尖端全長ノ十四分一許向ハ兩側ニ鏡及
 ラ備不方ニ板状及ノ処ヲ去ルニ送ラ漸次ニ又根手
 ラ太クシテ以テ水様液ノ溢出ヲ禦クニ便ス
 施術ノ前膏莖若ノ稀溶液ヲ眼ニ滴ス是レ弱ヲ
 眼前室ニ出ス後早ク瞳孔ノ常形ニ復セニガ为
 人若莖若ノ溶液功力強キニ過リル若クハ当
 日ニ至ラ之ヲ用ヒ時ハ然ルコトヲ得ス

術ヲ施スニハ先ツ患者ヲ椅子ニ靠ラシメ鍼ノ
 扁面ヲ虹彩ニ向ク可キヤウニノ虹彩後一レイ
 ニノ處ニ刺入シ又尖ヲ正横ニ水晶体ノ前面ニ
 至ラシテ而後ニ又再ラ後ニ向テ水晶体ト又囊
 シ十分ニ截合ス
 又弱モミ固クノ命截ニ難キ時ハ次ニク鍼尖ヲ
 引キ退ケテ水晶体中央ノ微下ニ至ラシメ鍼合ヲ
 拵ノ繫著ヲ離シ以テ又上縁ヲ前ニ向ケテ瞳孔
 前ニ至ラシメ又ニ、翳ノ後面ヲ前ニ向ハシム
 ルニ從テ全ク之ヲ眼前空ニ出ス而後ニモシ又

△ノ扁面ヲ以テ翳

囊其体ト共ニ出スノ残在スルヲアセバ鍼尖ヲ
 以テ其周圍ヲ截破ル而ル片ハ別ニ焮術ホノ事
 件有テ新膜ヲ生スルニ非レハ後翳ヲ吞スルノ
 恐シキト云フ然ラナセバ以テ往鍼ヲ放ラ第ニ
 ノ術ヲ施ス又法左ノ如シ
 患者ヲ凡上ニ仰卧ヤシノ稍又頭ヲ高フコラニ
 セトシ若ハ弱カラ以テ角膜ノ縁外管方ニ孔ヲ穿
 シ細クノ鉤シル小カラ以テ其孔ヲ上下ニ截リ
 廣ク次ニ小鉤ヲ其孔ヨリ入シ水晶体ノ前面接
 ルニ或時既ニ前ニ沿テ瞳孔ノ中央ニ至ラシ
 術ニ由ラ後ニ向テ

但シ又之ヲ入ル時
扁面ヲ水晶

併入ルハ鉤、是ニ於テ又鉤端ヲ前ニ向テ弱ニ鉤
 体ニ接ス可シ
 ケテ之ヲ引出ス此法ニ由ルハハ壓迫ヲ用ユル
 ノ害ナリ且ツ又孔尋常ノ剔出法ニ於ケルヨリ
 小ニテ便也且ツ若シ又術中ニ水晶体破レ、時
 ハ又碎片ヲ鉤若クハ小ヒテ用テテ除去去リ若
 シ又其碎片甚ク微ニシ難クシハ又終ニノ
 水様液ノ融解力ニ任ス自ラ眼荷重ノ下部ニ融解ニ尽ク殊ニ角膜
 偏側ノ創口ハ治癒甚ク容易ニ
 アタムス人カ方術ハ即チ「ストエリ」ハ「ス人カ偶尔」
 症ニ由ラ得ニ所ノ考按前ニ本ツク實ニ百年ヲ

越テ始ラ又功ヲ成就スト云フ可シ
 刺角膜剔出方法ノ施後ニ奈スル害殊ニ虹彩、脱
 全ワレハ「プロ」云フ是尋常ノ刺角ヲ預メ御クニ「ワルト」
膜術ニ於テ其支持ヲ傷ツテ登
 人ハ尋常ノ如ク半輪状ニ断ツテ禁メ少シク上
 ニ偏メ刺スラ佳トセリ而シテ上ニ偏スルト甚
 タシキ時ハ創口小ニシ水晶体ノ出ツルハ難シ
 宜ク斟酌アル可ト云フワルト曰フ人ガ此ニ用
 ヌル所ノ刀ハ即チ「人ノ翳刀一板ニシテ又幅
七畜
 本ニ至ルニ送テ漸ク廣ク又背滑ニシ肉ヲ先
 ツルカニ押ラ塗リ「人ノ定眼子一板ヲ

以テ上眼ヲ固持シ中指ヲ以テ眼球ヲ適宜ニ内
背ニ拵シヨマカ尖ヲ角膜ノ中横徑ヨリ微高ク
側縁ヲ距ルヲ一レノニ許シ処ニ刺ス又刺スノ
勢ニ將ニ瞳孔ニ入ラニトスルホドナラシメ其
尖ノ虹彩ニ適ナ時ニ接セニトスル時又尖端
ヲ起シ即チ其背ヲ虹彩ニ向ハシムルナリ斜ニテ微ク下ニ向テ相對ス
ル処ニ至テ角膜ヲ横斷シ又斷終ル処ニ縁ヲ距ル一レノニ許也刀ヲ引
キ向テテ出ス又刀ノ形状漸次ニ廣クテ故ニ水様
液急ニ溢出セテ而シテ虹彩脱落セズ彼レ白クテ方
七十人ニ施シ一人ニ角膜ニ癍痕ヲ残セルモノ

十ニト云フ
レイオニ名地ノキエエリニ名人ボウルヲマウリス
地ノキエエリニ名人前ノキエリニ和蘭ノハニウエイ名人ハ
ルニニギト名地ニト名人ホカ冬明スル所ノ
黒貝ハミナ一器ニテ眼ヲ固持スルト角膜ヲ截
ルニ二月ヲ兼ヌ即チ前ノキエエリニ名人カ用ユル
所ノ若ハ其形状タニリモ引ノ如ク又一般ハ角膜
ヲ截ルノ刀トナシ一般ハ眼ヲ固持スルノ鉤ト
ナシ彈子ヲ備ラテ又作用ヲナス後チノキエエリ
ニ名ハ此レニ扁ナル柄ヲ備ヘ又柄中ニ彈子トシテ

ナ一ラ役々又上部詳ニ金輪ヲ附ク又輪ハ定眩
子ヲ以ラスルガ如クニ角膜ヲ圍ムニ備フ又夕
其外部ニハ「ヒキガ子有ラ指頭ノ微カニミカノ
作用自在ナラシム 高ラ又製ノ詳ナルヲハキユエリ
ニカチ八百零六年ノ著書ニ出ツ
ジユモシト人ノ器具殆トキユエリニ人ノ器具ノ類
似ス 但シ 其異ナル所ハ角膜ヲ豈ニ截ルノミ又夕「ハ
ニウエイ人ノ器具ハ刺絡ニ用ユル「子ツベル 本
部
ニ彷彿タルモ「ノ角膜ノ下部ヲ截ル
「ハ子「人ノ言曰ク刺角膜術ノカハ「回リ「工
ニセル人ノ器具ヲ用フ「ミ精微ノ伎倆臨機忘変了

リ敢ラ又功ヲ器機ニ託ス 託 一「ニ非ス「ウエ「セ
ル人ノ言ニ曰ク眼ハ「首弱 ノ器 之「彈子 ハ 子ヲ用ユルガ如
キ器具ハ危害甚ク多ク之妙手ニ「旦ツ明智ナル
ニアラスニハ敢ラ施用不可キ所ニアララス

別出 法 下
刺剛膜 膜 術

刺角膜剔出 法 方ニ控ラモ亦夕屢々誤治ノ誤治ノ
有ル為メニ「ル人始テ刺剛膜剔出 法 方ヲ施ス可キ
事ヲ工夫ス即チ又按ハ角膜ヲ距ル「一歩 分 許ノ
処ヨリ「ピスト「ラ「リ カ名前ヲ虹彩後ニ刺ニ次ニ
出ツ

小鉤ヲ入レテ水晶体ニ鉤ク曳キ出スニ方ニ板以為
 ラリ此術ニ由テ虹彩ヲ毀傷スル莫無ク角膜ニ
 癍痕ヲ殘スル患ナシト彼レ自ラ醫業ニ之ヲ施
 ナ試ムルニ必ス其巧切ノ有ル可キヲ見ル
コレニテ人モ多ク千八百十一年ニ同種ノ按ヲ登
 ス以為リ剛膜ノ角膜ヲ距ル一トニ余、処
 ニ指下法鉞ヲ以テ孔ヲ穿キ又孔ヨリ小鉤亦ニ板
 ヲ水晶囊ノ後ニ入レ又鉤端ヲ水晶囊中央ノ部
 ニ届ラセテ少シク前ニ動カシテ弱ノ剛軟ヲナ
 リリ其弱剛復ナル時ハ鉤端ヲ以テニ鉤クテ創

口ニテラ曳出シ又ニ、ニ眼ヲ鼻方ニ向ハシメは弱
 カラ以テ其創口ヲ截回キ又截回クマ置ク前頭骨ノ外角
膜ノ囊内ニ入ラバ 其創口弱テ出スニ十分ノ大ヲ得ル
ルヲ要ス 片ハ鉤ト共ニ之ヲ曳キ出シ創唇ハ能ク合詞セ
 シメテ眼ヲ切ツ可シ若シ劇キ燃術ヲ継登セハ
 コルトロフ名ノ法ニ從テ角膜ニ鉞ヲ以テ孔ヲ穿
 キ水様液ヲ泄ス可シト此法ワルトロフカチ八百イノ十名
十三年ノ著書ニ出ツ
 ノ大学士ルカニニステイルニテル名モ亦々同種ノ答
 明ヲナス蓋シ既ニ他人ノ此考按アリシヲ知
 ラナリシニ而テ此術ノ當ニ施スヘキヲヲ奏明

マールハ一個ノ病痣ヨリスト云

一小児齡五歳^リベニ子^ノス^ル削管^カヲ^テ其^手ニ^持

ツ^テ其^友之^ヲ奪^ハニ^トス^ルヲ^拒マ^ニト^ノ誤^テ

其^尖ヲ^持テ^テ自^ラ眼^ヲ毀^傷ス^ルコ^トニ^ベニ^テ其^ヲ

イ^ニル^コト^ニ往^テ之^ヲ見^ニ剛膜^ノ下^部角膜

ヲ^距セ^テ一^ニシ^イニ^ノ処^ニ創^アツ^テ又^創口

寸^ノ六^分一^許ニ^水様^液溢^泄ノ^角膜^皺縮^シ水

異^体ハ^道出^メ自^ラ眼^ヲ掩^ヒシ^所ノ^布片^ノ内

ニ^包ミ^レ水^異囊^ノ残^餘ハ^又創^唇ノ^向ニ^ハサ

マ^シリ^A

^Bア^ルシ^ハ既^ニ千^八百^零一^年ニ^之ヲ^登明^シ屠^シ

之^ヲ患^者ニ^施テ^テ其^功ヲ^試ミ^大ニ^又法^則ヲ^定メ

ク^リ

其^用ヲ^ル所^ノカ^ハ即^チ小^{ナル}ヲ^ニセ^トシ^ニ又^尖

ニ^適宜^ノ角^形ヲ^十ニ^其幅^ハ四^シイ^ニ許^{アリ}而

テ^之ヲ^一種^ノ小^{ナル}ク^ニグ^毛引^ニ附^接シ^其柄^中

ニ^ハ彈^子ヲ^備ヘ^テラ^ニセ^トノ^匪退^自在^ナラ^シ

ム^然ヲ^以テ^剛膜^ヲ刺^テ深^ク虹^彩後^ニ入^ラシ^ム

次^ニ彈^子ニ^由テ^又ラ^ニセ^トヲ^抜ケ^ハク^ニク^止

ヒ^トリ^眼内^ニ止^ル是^ニ指^テ當^ラ之^ヲ追^テラ^シ

側面ノ腫孔ニ見ハル、月少しノ退ケテ又股ヲ
向キ意ヲ用テ水晶体ヲ挟ミ造直ニ又繋着ヲ高ナ
シノ以テ創口ヨリ之ヲ曳出ス

若シ造直ニ固カラズノ挟ムハ破碎スルヲア
ル時ハ再々他ノコトニマトラ附接セラルニク
ラ入レテ又碎片ラ一ニ曳出ス若シ結膜腫脹

ノ創口ヲ壓削スルコト有レバソニテ
鐵蓋ヲ眼ニ挿
未詳

ニテ以テ再々タニグラ入レ易カラシム
クワトリ名人ハ千八百十五年ニ始テ一ル、名人考

接ラ徂テ之ヲ術ニ施セリ又法友ノ如シ

又弱ヲ挟ムニ用フル所ノタニグノ製他ニ異ニ

ノ柄ノ合スル股ヲ固ク可ラシム又創口ヲ造ル

ヤウエニセ名人ル小カラ取テ剛膜ノ角膜ヲ距ル

トニシイニ許ノ処ヨリ虹彩後ニ刺入レ而ノ後

ニ莫クニクヲ創口ヨリ法△ノ如ク之ニ縛帯ヲ施

スニ恰モ弱ノ術ヲ施セルモノ、如ク十六日ニ

ノ全ク復治ス

此ニ由ラ剛膜絡膜毛様鞏帯硝子液ホノ毀傷ハ世

人ノ曰フカ如キ危症ヲ奏スル者ニ非ス却テヨ

ク法ノ如ク治ラ施スベキヲ知レリ由テ復レ

以為リ水晶体ニシ其大ナルカ剛固ナルニ由テ
拵下合截共ニ施シ難キミノ或ハ水晶体愈著ス
ルミノニ於テハ剛膜ヲ刺メ剔出方ヲ施スヘシ
而ノ其法ヲ立ルテ尤ノ如シ
刀ヲ入ルヤ固ク尋常ノ拵下方ニ於ケルヨリ深
クメ水晶体ノ前面ニ至ラシム可シ但シ又刀ヲ
進ムルニ當ラズニ前後ニ偏倚スルテナク唯
上下ニ動カスヲ佳トス然レ由テ虹彩散スル
ナク水晶体自ラ破レル而ノ後ニ輕ク上眼ヲ壓
ス可ク水晶体只囊ト共ニ自ラ外ニ出シ又ク

只囊甚ク至薄ニ別出シ難キトキハ唯之ヲ吸
尿管ノカニ任シテ可ナリ
行シ自ラ云フ然ク法ヲ定ムト至氏此術ハ唯白
内翳ノ初答ニ施セル者就中刺角膜術ノ施シ難
キ及々其翳剛固若シクハ大ニ過キテ合截スル
テニ拵下スルテニナシ難キハ用フベシ止
世匠高ク此術ノ可否ヲ云テ議論紛々ナルニ
C_{入ル}其入ルヤ一股ハ水晶体ノ後硝子様液ノ
前部ニ届ラシメ一股ハ水晶体ノ前面毛様体ノ
後ニ至ラシメテ瞳孔ニ見ハルベクナシ之ノ

以テ水晶体ヲ挟ミテ之ヲ外ニ出ス
彼レ此術ニ由テ功ヲ得ルモノ甚ク多シト云ハ
自ラ其施シ難キモノ多シト云フ就中又醫ノ愈
著セルモノ及テ水晶体ノ破碎スルハ然リト
ス

○施術誤治之因

施術ノ誤治ハ多ク合併病ニ因リ或ハ又部ノ常
ニ異ナル所アルニ因ルヲ實驗ニ由テ明ナル所
也ト余ハヨク又症ニ隨テ方術ヲ処スルハ亦
タ之ヲ免ル、
一ヲ得ベシ今誤治ノ因トナルモ

ノ一二ヲ挙テ以テ之ヲ免ル、一助トセニトス
○拵下方誤治之因

若シ其囊ヲ截破スルヲナクテ水晶体ヲ硝子様
液内ニ拵下スルハ甚ク融解シ難ク或ハ全ク
融解セザルモノニ此融解セザル弱モシ細膜ノ
表面ニ近接シ在ルトキハ多少必ス雑症ヲ發シ
或ハ視神呈ノノ疔瘡ヲ起スヲアリ而シテ之ヲ截
テ眼前室ニ出スモノハ如此キ危害アルヲナク
速ニ吸収シ尽ク
既ニ拵下セル水晶体再々上テ或ハ一分瞳孔内

ニ見ハレ或ハ全ク本位ニ後スルコトアリ是レ
硝子様液自然ニ有スル所ノ彈カニ由ル若クハ
他ノ因アツテ然ラシムルカホク決然リレ裁判
ナシ而シテ硝子様液ハ至軟ノ流動質ナレハ全
ク其内ニ擠下セシモノ再々彈キ後ハスノ理ナ
シ必ス是レ眼後室ノ底ニ懸リ止ラ然ルモノナ
レ可ニ其志ニ在ラハ其筋ノ動搖スルカ為ノニ割
キ燉衝ラ登レ瞳孔狭シカクノニ縮固クは涯治
セナルモノアリモシ其水晶体ノ剛軟分截スル
コトヲ得ヘキモノニ於テ其害ヲ防クコトヲ得ヘキ

○ 割出方誤治之因

割出方誤治ノ因トナルモノハ硝子様液溢泄ト
虹彩脱垂ト其眼ノ小ニテ深ク陥凹スルトハ眼
前室内ノ小ナルト瞳孔ノ小ナルト角膜創口ノ
愈着ニ難トトハ是ナリ
硝子様液溢泄ハ或ハ眼球六筋ノ痙攣ヨリ起シ
或ハ水晶体ヲ出サニカ為テニ用ユル液ノ壓迫
ヨリ起シ又壓迫ハ創口ノ甚ク小ナル時其力ノ
度ニ過ルヨリ害ヲナスコトアリト余氏多クハ創
口ノ大ニ過リルモノ其液ノ溢泄ヲナカシメ易

之且ツ稟負又液ノ流利ニ易キモノニ於テハ殊
ニ然リ故ニ此症ニ於テハ角膜ノ創口ヲ上邊ニ
造ルヲ佳トマル人アリ虹彩脱去ニ赤ク厚ク水
只体ヲ出スニ用ユル塵迫ノ猛症ニノ又角膜ノ
創唇ニ塵控セラルルヨリ燬衛ヲ登之ニ加ニ
壞痕トナレルヲアリ假令ニ然ラザルモ又燬衛日
ヲ往ルトテハ猶ヲ視瞻ヲ失ワシムルニ至ル施
術ニ先ツテ葺若友ニ非汰失亜謀斯ヲ用フルト
キハ此誤治ノ因ヲ免ルルヲ得一ニ
按ニ瞳孔濁
スレバ水晶
体

ノ之ヲ塵迫眼ノ小ニノ深ク陥凹スルモノ及テ眼
スル患ナシ
窩縁ノ甚ニク突起スルモノハ別出方ヲノ屢々
又治ラ誤ラシム是レ角膜ノ遠回ク哉伺難カタ
ノニ水晶体ヲ出スノ塵迫遠回ナラズ是ヨリノ
重難ノ諸症ヲ徇察スルヲアルニ由ラ此症ニ於
テハ他ノ指下方ヲ施スヲ佳トス
眼前空甚ク小ニノ角膜ノ虹彩ニ近接スルモノ
及テ角膜平ニノ凸起セサルモノニ於テハ哉伺
シ十分ノ大ヲ得難ク且ツ虹彩ヲ毀傷スルノ害
ヲ免レス

瞳孔甚々小ニノ麻痺劇ノ功ヲ奏シ難キモノニ
 剔出方施ス月ハ水晶体ヲ出スノ壓迫ニ由ラテ虹
 彩ヲ破リ若クハ虹彩周圍ノ繋着ヲ傷ス若クハ
 ラスノ虹彩弛延ニ水晶体之シカ為ノニ出ツル
 下アルニ術後必ス瞳孔ノ異形ヲ残シ或ハ細膜
 ノ疔痒ヲ繼登スルモ角膜ノ創口ハ必ス此
 モニテ速ニ愈着スルモノニ非ズモ其創口久
 シク伺テ水様液ノ溢泄稽留スルハ或ハ虹彩
 ノ脱垂ヲ起シ或ハ其創唇壞疽トナル或ハ後速
 カニ愈着スト余ハ過多ノレイムハ
即纖維ヲ
 十不度 創口

ニ溢ルハ月ハ麻痕ヲ残シ視瞻ノ害ヲナス

○施術向友其後ノ傍症

施術ノ向若クハ其後ニ施^於テ登スル所ノ傍症
 指下方ニ於テ剔出方ニ於テモ種々アリ○拵
 下方ニ於テ必ス此^レアル所ノモハ出血也是レ
 眼膜中ノ血絡毀傷スルヨリ登スル所ニテ血
 モニ剛膜ト結膜ノ向ニ溢ルハ青班ヲ登ス
 然班ハ一二日ヲ経テ白テ消散スルモノニテ出
 血虹彩ノ毀傷ヨリ登スルモノニテ殊ニ過多
 ルハ鍼孔既ニ閉塞スルハ更ニ角膜ヲ穿ツテ之

ヲ排泄ス一之然此出血施術ノ向ニ在ラ且ツ
甚シキ妨碍アルニアラズニハバクマニ置クラ
佳トス
鍼ノ入ルテ深キニ過ルルハ惡症ヲ奏シ易ク
且ツ其鍼網膜ニ徹スルハ真ノ黒内筋ヲ奏ル
テ明シ毛様靱帯ノ變位ワルフラリチニク
位置ヲ變テノ義及ヒ水晶体
拵下ノ深キニ過ルルモ立リ之ヲ奏シ易シ
剔出方ニ於テハ瞳孔水異体ノ排同ニ出ツルニ由
テ毀傷損破セラシ或ハ術ノ巧拙ニヨラスニテ
著シク散大スルテアリ此症後治マサルハ視

瞻ニ妨害ヲナステ少カラス○術後ニ残ル所ノ
視力乏弱ハ水晶体ノ除去スル後硝子様液ニ位
置ニ由リ起セズ此カタノニ光線適宜ニ聚合マコ
ルノ致ス所ニ即チ是レ硝子液ノ四面ヨリ光線
ヲ離向セシムルニ由テ虹彩ノ脱去硝子様液ノ
溢出ニ由ルニ非スノ唯水様液ノ溢泄ニ兼テ其
因既ニ此膜ノ膜弛後ニ在ル者瞳孔ノ楕形ヲ為
スラ以テ此徵トス難治トス
而テ硝子様液溢出ノ勢ニヨリテ奏スルモノ
ハ眼瞼ヲ軟カニテ廣ク擦シ若クハテカイスケト口
ニ名カ説ノ如ク強ク光輝ニ觸レシムルバ自ラ収

縮ニ入ル者ニ但シ此言ハ焮衛ヲ兼指下剔出両方共

ニ最ニ多兼登スル所ノ傍疔ハ焮衛ニ是シ多ク

ハ皆十箇貝ノ刺戟ヨリ登スル所ニノ或ハ又器

貝ヲ眼内ニ止ムルヲ久シキ由リ或ハ虹彩ノ

縁ヲ壓迫スルニ由ル而シテ虹彩ノ焮衛ハ屢々ヨ

リ眼内ノ諸器ヲ消滅セシメ全ク視瞻ノ用ヲ失

セシムルニ至ルヲアリ或ハ立テ器貝ニ由ルニア

ラスノ他ノ病因ノ此ヲ致サシムルモノアリ

後弱ニ亦両方術トミニ此ニ有ル所ノ傍疔ニト

虫ハ大登スル所ノ疔状種々有テ一十ヲサレカ

故ニ今之ヲ別ニ掲テ詳ニ之ヲ示サニ

○後醫

後弱ハ實ニ匠家ノ功ヲ失テ患者ノ望ヲ虚フマ

シムルモノニト虫ハ全ク不治ノ疔ニアラス

此疔ハ即チ施術後数日ヲ経テ更ニ後々登スル

所ノモノニ多少視瞻ヲ失セシムル此レニ水晶

疔ヨリ登スルト水晶囊ヨリ登スルト近傍ノ部分

ヨリ登スルノ別アリ而シテ多クハ内因ノ在ル有

ヨリスル者ナリ

貝水晶疔ヨリ登スルモノハ或剛固ナル水晶疔弱

ニ於テ之ヲ破碎スル時ハ其一分残在セル水昆
囊中ニ止マレ若ナルヤリ此症ニ於テハ瞳孔ノ
後ノ水様液中ニ游泳スルカ如クニ見ハレ或ハ
既ニ摘下セシ弱數時ヲ経テ後ニ再々其縁ヲ眼
後室ニ見ハスモノナリ水昆囊ノ後晶ハ術
ヲ施スルハ水昆囊ノ一分残在ニ燼衝ヲ登ニテ
蒲桃膜ト愈著スルコトヲ察スル弱ハ白クノ銀色
ノ縁條若クハ斑點ヲ見ワス水昆囊ヲ圍ム所ノ
近傍ノ部分若クハ水昆囊ニ登スル所ノ後晶ハ
燼衝ニ由テ滲出スル^レイニハ^{織維}ノ凝固スル
ハ^ハニ^ハ

コリ生スルモノニ白色ナリ細形ヲ縮小セル
瞳孔内ニ見ハス或ハ又ク水昆囊及ニ其囊ヲ全
ク除去スル後ニ尚ク曇翳ヲ残ス^レマ^リ燃ル寸
ハ是レ又病硝子様液ノ膜ニ在ルア若ク硝子様
液ノ前ニ凸起ス^レト^モ其^レノ瞳孔内ニ近ニ由テ
以テ視察ヲ妨害スルナリ或ハ又ク血色ノ後翳
膿様ノ後翳ナル者ヲ見^レト^モナリ
後晶モ少シク内部ノ固ア^ラナルハ^ハ摘下方
ニ固^由リ若クハ剔出方ニ由テ之ヲ治ス可シ而シ
氏術ヲ施スハ早^ニ過^キナ^ラズ^レト^モ要ス^ルニハ

くヨク吸収カニ由ラ自ラ除去スルヲアレバナ
リ

○術後之療法

術後ノ療法ハ諸術共ニ大ニ異ナル所ナシト云
氏亦々各個ニ論セサル可ラサルモノアリ
拵下方ニ於テ鍼ヲ抜リ後ハ宜ク直キニ又睨ヲ
初メシムヘシ又々此ニ乳待帶菜汁ノ類ヲ以テ温サレ
モノヲ云フ
ヲ施スノ方アリ又方先ツ患者ヲ暗室ニ入レテ
衾薦ニ靠カラシメ帯ヲ固ク患者ノ口ニエツ帽子
ノ名附
ケテ之ヲ徧待ス
但シ女ニモ眼ヲ壓迫
セテラニテラ要ス而テ諸ノ方拳動

ヲ禁ス可シ拳動スレハ醫ノ再々上ル患ヒア
ハ之若シ眼中ニ甚キ焮衝ノ覺フマレハ撒絲
ニ雞子白ト明礬トヲ薔薇水ノ和劑ヲ浸シ之ヲ
掩フ可シシカレバ
ノ方ナリ傳帶ハ宜ク日々ニ三四回更換ス
ルヲ佳トス然ラザレバ眼睨ノ詞着スルコトア
リ但シ其時眼ヲ光輝ニ觸レシム可ラス光輝ニ
觸ルニ三四日ヲ経ルニ非ナレハ許スヲ勿レ
剔出方ヲ施ス後ニ施テハ速ニ其創口合着セシ
ムルヲ以テ第一ノ務トス宜ク其創唇ヲ相合セ
シメ下睨ヲ以テ之ヲ固定セシムヘシ若シ此レ

ヲ急ルキハ膿ヲ釀ノ異形ノ癥痕ヲ残シ視瞻ニ
大ニ害ヲナスニ至ル若シ又創口十分ニ合着セ
ズノ残ル所アリハ水様液ノ溢泄禦キ難クノ是
夕治愈シ難シ是故ニ術後亦三日若クハ四日暗
処ニ於テ其眼ヲ揜ス可シ但シ又睽ヲ伺クハ宜
ク復往テル可シ然ラザルハ創口ノ合着異形ヲ
ナシテ虹彩ノ一部其向ニハサテルコトアリ
若シ虹彩ノ一部又創向ニ出テ、諸術之ヲ入ラ
シムルコトヲ得サルキハ、又創外ニ出ツル部分ヲ
除去スルカ若クハ水斂ノ後ニ腐蝕スル劑ヲ用

ヒテ之ヲ入ルシム可シ但シ燉衛ノ痊愈ノ消散
スル者ニ非ナシハ之ヲ施スコト勿シ
燉衛ハ諸術後ニ常ニ有ル所ノモノ也之ヲ治ス
ルニハ後和ノ劑ヲ外用シ蓋テ防燉衛劑ヲ吞服
セシム一シ又夕刺絡蠅蛆法術ヲ施ス眼近傍及ヒ飲
食ヲ節ニスレハ爰ニ最ニ偉功アリ虹彩ノ燉衛
ニ於テモ療法相同シト金氏モ其虹彩近辺ノ
部ニ愈着セニトスルカ瞳孔縮小セニトスルト
キハ甚若クハ非汰失並護斯ヲ用ユハコトヨク瞳
孔ヲ伺カシメ己ニ微愈着セル部ニ於テカ為ニ

分高ス

○醫鏡

既ニ除去セル水晶体ノ用ヲ補フテ視瞻ヲ扶ケ
ニカ為トニハ弱鏡原名スクリル
ツリレニナルモノアリ是レ光
線ノ眼ニ入ルニ先ツテ先ツテ之ヲ屈折セシムル
ノ器ニノ丈製ハ世人ノヨク知ル所ナルカ故ニ
敢テ愛賛セズ但ニ此鏡ニ視瞻ノ漸ク復スル伺ニ
於テ謾用スルト勿シ其視瞻ノ復スルヤ始メハ
是ヲ速カニ追ヒ後ニ漸ク遅ク終ニ止マツテ全
ク進マサルニ至ル又止マル時ヲ俟テ始テ之ヲ

用ユルヲ要トス其当ヤニ用フキヲ見バ豆ク
其視瞻ノ強弱ニ依リ硝子凸面ノ度ヲ斟酌シ以
テ之ヲ製スヘシ

○諸術比較

正論ニ原ヒテ諸方術ノ害ヲ挙グル時ハ其利自
ラ見ル可ク且ツ何症ニ於テハ此方ヲ施シ何症
ニ於テハ彼術ヲ施シ可ナル乎ヲ比較シ定ムル
コトヲ得ヘシ

或人曰ク方術ハ角膜ヨリ施スニ非レバ危害甚
ク多ク且ツ鍼ニ由テ剛膜脈絡膜及ヒ虹彩裏面

ヲ毀傷スレハ内部ニ嗽衝ヲ吞メ至大ノ害ヲ起
シ又夕内部ノ血絡ヲ傷テ出血スレハ衝ヲノ終
一ナルヲシメ又夕横ニ鍼ヲ入ルニハ其道長フ
ノ硝子様液損傷スル所多シ又曰拵下方ハ膜翳
ニ於テ水晶体ノ後部ヲ除キ難キガ故ニ後留ヲ
吞ニ易ク軟質ノ翳ニ拵ニ拵下スル難下スル
ノ難キカ故ニ鍼ノ眼内ニ止マレテ長ク好シカ
為メニ危害ヲ招キ易シ又曰拵下方ニ誤治多シ
一夕ニ誤治スルヲアレバ後夕之ヲ施サニト欲
スト余氏患者恐シテ許シ肯マサルモノ也

刺角衝ニ拵ケル害ハ其數實ニ少ナシト余氏亦
夕全ク危害ナキニアラス或人曰ク骨様翳ニ施
テ角膜ヨリ拵下スルハ剛膜ヨリスルモノニ比
スルニ危害甚ク多シ是レ其鍼ノ虹彩ヲ壓迫ス
ルヨリノ嗽衝ヲ吞メ易ケレバニ又夕曰ク其ノ黒
内翳ハ多ク刺角膜拵下方ニ拵テ水晶体ヲ網膜
ニ壓迫セシムルヨリ吞スモシ又弱ク鼻方方ニ
拵下スルハ一旦リ網膜ニ触レサル可クノ深ク之
ヲ拵下スヘシ
刺角膜ノ剔出方ハ其危症ヲ傍吞スルノ最モ多

△殊ニ然リト云故ニ
ニナルハハハハハハ
翳ヲ硝子様液中
拵下スルハ

手更前ノ一術ニ比スルハ同日ノ論アラズ假令
ニ妙手ニ由テ又治全ナラ得ル若ト至又創痕全
リ消滅スルニモノニアラス今又方術ノ害ヲ計
ルニ水様液ノ溢泄スルハ虹彩之シカ為ノニ前
ニ向テカノ及ニ触シ易ク此ヨリノ害スルノ害
甚ク少カラズ又患者ノ動搖スルヲアルガ若ク
ハ水昆虫ヲ出スニ用ツル壓迫ニ由テ硝子液甚
ク溢泄ニ易ク又溢泄スルハノ壓迫甚ク熾衛ヲ起
シ易ク又熾衛眼内ノ諸器ニ施シ及ニ終終ニ膿
潰スルニ至ルヲ屢々有ル所ニ故ニカニアニラ

ル人ノ言ニ曰ク此方術ハ一、ル人ノ妙手ニ於テステ
尚ク未ク全ク危害ヲ免レ、ル人ノヲ得ズト角膜ノ
壞疽ニ亦ク剔出方ノ害ノ一ニマウカイル人ノカ徑
驗書ニ少シニ恐レシナキカ如キ症ニ於テ之ヲ實
驗セルヲ云エリ彼レ以テ是レ角膜ノ害
復ラ栄養スル細絡ヲ毀傷スルヨリ起スルミノ
ナリト是故ニ彼ハ剔出方ニ於テニ穿瞳術ニ於
テニナルタケ又創口ヲ小ニスルヲ佳トセシ
シヤフニ人ノ言ニ云フ剝剛膜剔出方ハ危害
最ク多シ宜ク施スヘキノ術ニ非スト夫レ剝角

膜別出方家ノ説ニ拠ルニ剛膜ヲ刺スハ拵下方
ニ於テ尚ラ脈絡膜及ヒ毛様挺ノ毀傷危害ヲ繼
登スルコト多シ況ニヤ其毀傷ヲ大ニスルモノラ
ヤ且ツ此方ニ於テハ眼ノ内部ニ出血スルコト多
ク硝子様液ノ溢出立タ御シ可ラズ
右件ノ論説ニ由ルヤヨク諸方術ノ言ヲ知ルコ
ト得ベシト至ルニ亦タ其利ヲ擧テ示サズニハ何
シノ症ニ於テ何シノ方カ処スヘキコト知リ難カ
ラニ

○ 横鍼拵下方

原名メイテシイキ子トテリニツ
キニグ横ノ拵下方ト云フヤ

ハ骨様筋ト

搖翳ヲ除クノ他ニ十之ヲ施メ佳也此方ノ利ハ
又水晶体ノ能ク硝子様液中ニ於テ融解スルコ
ト術之ヲ剔出方ニ比スルニ甚ク施シ易キトニ
在リトス

○ 直鍼拵下方

原名ホーレスヲ子トテリニツ
キニク前ノ拵下方ト云フヤ

ノ利多ナク

ハ論ヲ俟タスノ明ナリ何トナレバ此方ハ猶ラ
未熟ノ手ヲ以テモ施ス可ク毛様靨帯及ヒ其挺
ノ毀傷スル恐シナク且ツ焮衝疼痛兩ナカラ微
小ナシハ也此方ニ由ルヤ水晶体ヲ遠回^分截破碎
ノ之ヲ眼前室ニ出シ或ハ唯其囊ノミヲ破ラ^其

他ヲ吸収管ノカニ任スレハ次ヲ独リ自ラ消散
ス豈ニ容易ラズトセニヤ

此方術ノ利益甚ク多キヲハ日ヲ進ラ漸ク益々
明カナリ宜ク「ウニ」子ニ「ル」イニ「ラ」ニツヒ
ユト及ヒハ「ル」皆トニ地名於テ出板セル眼科書ヲ見
ヨ千百十四年ヨリ十六年ニ至ル迄ラ白内弱ヲ
療スル者三百六十余人ニシテ又二百三十八人
ハ皆ト唯此方術ニ由テノニ全ク治得タリ
直鍼別出方ノ利ハ前術ノ如ク知覺ナキ角膜ヲ
刺スト後留ノ奈セナトニ在リ又々又眼割キ

焮衝ニ羅リ易キト又眼ノ動搖ニ易キト其眼珠
及ヒ直傍ノ部ノ形状此方術ニ妨ケ有ルトニア
ラナルハ他ノ方術施シ難キモノニ於テ之ヲ施
メ可ニ又此方術ニ於テ硝子様液ノ欠ニリ溢出
スルハ其功ニ大害ナシ且ツ其患者曾テ併視瞻
故ニ過リルヲ得ル者屢々此レナリ是レ硝子
様液ニ出ノ水具体ノ位置ニ入り眼後室ヲ充ツ
ルヲ已ニ前ニ過リルニ因ルモノトス又々別出
方ニ於テ眼後室ノ空間ヲ廣フスルヲ拵下ニ若
クハ分截スルモノヨリ多キカ故ニ患者故近視

眼ヲ病ムモノハハ割出方ヲ佳トシ遠視眼ヲ病
ムモノニハ拵下方若クハ合截ヲ佳トス
翳ノ大ナルモノ及ヒ骨様ナルモノニ拵テハ又
瞳孔ヲ出ツルハ虹彩ヲ破裂セシメ或ハ廣痺マ
シムルヲヤルカ為ノニ横鍼剔出方ノ拵ヲ答ス
ル人有テ以為ラキ此方ニ由ルハ水晶体ノ出
ツルヲ容易クシテ其ノ如キノ言ヲ免ル可シト
而シテ又試験ヲ重スルヲ未タ少キカ故ニ
確乎トシ明カニ其利ヲ曰フヲ得ス

○諸方術可否之決定

前件ノ諸論ニ由テ之ヲ按スルニ方術ハ各々又
習慣ニ得ル所ニ從テ処スルヲ佳トス凡ソ人皆
十又自得スル所ノ方術ヲ貴テ其他ヲ非毀スル
トコ是其常ニト余ハ方術各々利ト害トアリ宜
ク一術ニ拘泥ノ其他ヲ全ク棄瘞スルヲ勿ルベ
シモ此ノ諸方術ヲ尽ノ皆明カニ之ヲ知ラスニ
ガアラス何トナシハ或ハ他病ノ合併スルニ由
リ或ハ弱質ノ剛軟及大小ニ由リ或ハ其近傍ノ
部分ノ害ヲナスニ由テ彼此ノ方術施シ難キモ
ノ有シハ之今彼此ノ方術ニ拘泥偏倚スルヲ十

△諸毒應ノ尽ク之ヲ治スルノ大匠ニシテ欲セバ

ク又習慣ニ送フ度ナク同症ニ種々ノ方術ヲ施
ノ之ヲ試ムルニ利角膜術ニ由テ水晶体ヲ分截
シ若クハ唯其嚢ヲ破テ近傍ノ部ヲ換スルナ
ク水晶体ノ位置ヲ変スルナク水様液ノ吸収
カ按ニ恐ラクハ融解ノ誤ニ任カスモノハ又功ノ甚ク他術ニ勝
ルヲ覺フ就中其嚢ヲ破テ融解マシムルモノハ
少シニ傍症ヲ奏スルナク利益最ニ多シ故
ニ予ハ常ニ多ク此ニカ用フ

