


富士川文庫

496.3

Ka

2



F²

カ-2

496.3
ka
2



3643

白内翳方術論一

和蘭紀元一千八百十八年鑄行

和蘭醫官

ハニ。オニセノルト

著

總論

危ツ瞳孔後疊暗ニテ盲スル者其疾病ノ位置ハ

水晶体ニ在ル者アリ水晶囊ニアルアリモルガ

タニ液ニ在ルアリ俱ニ此ヲ白内翳ト謂フ

品別

其一
或云此疾ノ始テ人多死
病同于人死テ以未
文ノ所ナリ○其所立跡

力ニス人曾テ此病ヲ分テ二種トセリ其一ハ

水晶液ノ稠厚トナルヨリ覺シ其一ハ

水漏液ノ稀薄トナルヨリ覺シ其一ハ

灰翳ニ在ル者アリ水晶囊ニアルアリモルガ

カタクニタルニシテ何

一狀既別前有疾病之

所在一章云

ヤニタニ舊ニ蓋ニ化ノ諸

病同于人死テ以未

文ノ所ナリ○其所立跡

モルガニ液 水晶囊内
水晶体ノ

周圍ニ
在ル液
灰翳
カタクニタルニシテ何

一狀既別前有疾病之

所在一章云

ヤニタニ舊ニ蓋ニ化ノ諸

病同于人死テ以未

文ノ所ナリ○其所立跡

各人ニ始ケリ即ナ西子ノ
談吉原醫ハ瞳孔内更ニ
瘡ノ發キ生スル者ハ水様
液ノ稠厚ナリテ雲翳也

者ナリト其後一ヶ月余年
ニ至テダニル人或云チニテ
此其故班トノ此疾ハ

水晶体ノ雲翳スルニ成ルト
其後ニイタテヒニア

シスフリツアツミ人等
ミナ此談ヲ佳トノ其事ナ
トヲ譲ス

其一ハ水晶体翳是レ其雲翳水晶体ニ位置スル

其二ハ膜翳是レ其病唯ニ水晶囊ヲ侵ス者ナリ

其三ハモルカグニ液翳是レ此液ヲ稠厚ニシテ

雲翳セシムル者ナリ

其位置ノ區別ハ予ガ定ムル所ノモノ在ノ如ニ
其一唯水晶体ノミニアル者其二水晶囊_{下共ニ}
雲翳スルモノ其三唯水晶囊ノミニ在ルモノ此

症於テハ其全周面ニ在ル者アリ唯前面若ク
ハ後面ノミニ在ルモ外有リ其四其雲翳水晶体
ハ中心ヨリ始ル者其五其雲翳横ニ線ノ如ク腫
孔後ニ見ル者其六後翳是ナリ後翳ハ施術後

ニ発セル歎衝ヨリメ起ル或ニ膜翳ノ一分残在
スル者ヨリ発ス

後翳ナースターリル南

其色ニ後テハ此ヲ光澤翳孔様翳赤、黄、黒、綠、褐色
翳等三分キ○實質ニ後テハ其硬キ_①骨及_②石
不如半者_③骨翳石翳ト云ニ軟ナル_④酪ノ如キ
者_⑤柔翳軟翳ト云ニ水晶体全ク溶解セル者

泰流动翳ト云ヒ其膠不如キモノヲ膠様翳ト云
水晶体全ク硝子液ヨリ剥離ケ僅微ノ挙動ニモ
振搖スルモノハ此ヲ振搖翳ト名ク○又翳ノ固
直生度ニ後テ此ヲ熟ト未熟トニ分ツ而ヒ此
區別皆未タ穩當ナリトセズ予ハ唯此ヲ起登セ
シムル原因ノ仍ノ害ヲ生ス可キ間ハ此ヲ未熟
トシ其全ク害ヲ生セガル可キニ至ル者ヲ熟トス
翳唯水晶体若クハ其囊若クハモルカクニ液ニ
位置スルノミニシテ他病ノ累ニザル者ハ此ヲ
單性翳ト名ケ他ノ眼疾ト異ヒ発スル者ハ之ヲ

合併病翳ト名ク

症候總括

危ソ此病ニ罹ル者ハ其始ノ雲霞ノ如キ物眼ヲ
覆ヒ荒字トタ視瞻明亮ナラズ○水晶体ノ中心
ヨリ量リ始テ漸々周圍ニ及ヒス其翳唯く汎漫
スルノミナラズ稠密ノ度ニ於テモ増進シ○頭
ヲ頃ケ眼ヲ轉スルニ非レバ物形色影ヲ弁シ難
キニ至リ殊ニ早々色影ヲ失ヒ卒ニ明暗ノ他更
三分弁スル者ナキニ至ル○此時ニ於テ瞳孔内
一個ノ白色若クハ灰白色若クハ黄色ノ斑ヲ發

ス然トニ仍虹彩ハヨク張縮スルヲ得ル者也
若ニ此虹彩張縮セサルス必ス他部ト合着セ
ルモノト知ルベシ

症候區別

其病水晶囊ニ位置スル者ハ其翳黴白色ニレテ
深カラズ其前面各處ニ黴白色ノ小點アリテ其
疊翳スルノ中心ニ始ニラズ瞳孔ノ縁ヨリ始リ
其進行速々速ニノ患者物タ見ル毎ニ小黒点其
物面左ルガ如キタ覓ノ病症ハ最速ニ水晶体
翳ト相合併スル者也

此種ノ翳モシ施術後ニ発スルホ故乳白色ニメ
恰モ碎片ノ固着セル乎若ク之懸垂ノ動搖スル
モノ、如シ○若唯水晶囊ノ前面ニ侵サル、
すハ銀白色又青色ス帶ヒ許多ノ線條瞳孔ノ
縁ヨリ中心ニ輻輳ス故ニ亦タ此タ光芭状翳ト
名ク○此種當後半面ノ侵サル者ヨリ多クメ
ヨク虹彩ト愈着スルトアル〔後半面ノ翳不青綠
色ノ深四十九ガ如ク敢天虹彩ト愈着スルト
水晶体翳ハ稍深ノメ常ニ中心ヨリ始メ徐ハニ

其縁及ホス其翳膜翳ト合併セザル間其進
行是夕達ナリト知ルベシ

柔翳軟翳ニ於テハ水晶体大膨脹ノ其囊是タ
厚ク屢ヨク虹彩ニ愈着メ瞳孔運動スルヲナク
開張スルヲ恰モ真ノ黒内翳ニ於ケルガ如シ○
此症ニ於テハ患者晝夜ヲ弁スルヲ能ウバ
石翳骨翳ニ於テハ瞳孔是夕老ニ黒内翳羅甸名
カタラクタニタラ
收縮ス其色ハ毎症是夕老ニ黒内翳
ハ水晶体ニ位置スル者アリ其囊ニ位置スル者
アリ○其水晶体ニ在ル者ハ形状殆ドト病ナキ

者ノ如ク瞳孔黑色ニメ運動スル者アリ或ハ此
ヒナキ者アリ○水晶囊ニ在ル者ハ黒色ノ線條
瞳孔ニ密邇シテ其前面ニ見レ屢ヨク虹彩ト
愈着ス○此種ニ於テハ患者其始ノ明亮ノ光輝
譬ハ蠟蠋ノ炎ノ如キヲ見ルニ小ニメ不明ナル
ヲ覺フ此症ヲ以テ此病ノ発スル徵トス○此病
ハ人ヨク真ノ黒内翳羅甸名
アツウロニタラト謬誤スト雖モ術
ヲ施メ功アルガ為メ其假症ナルヲ知ル
人常ニ謂フ黄色ノ翳ハ溶解ノ徵ニ振搘翳ハ
眼水腫水晶体溶解及硝子液変性ヲ兼ルノ徵、

ナリト而レ庄赤曾テ翳ノ色ノ施術ニ害ヲ為
スヲ見バ
モルカクニ液ノ翳ハ乳白色ノ青色ヲ帶フ此病
多ハ外因ニ係ルト庄氏其發現スル人速カナル
ヲ以テ之ヲ知ル○此症ニ於テハ此液ノ著レツ
充積スルカ為メニ後眼室甚タ狹隘トナリ翳ノ
状綿ノ如外若クヤ雲ノ如ニ

疾病始終

白内翳ノ發スル其進行或ハ甚タ疾速ナル者ア
リ或ハ緩徐ニメ著シカラサル者アリ○其疾速緩徐

ナル者ハ常ニ最モ多キ症ニメ其始ノ頭痛眩暉
眼窠痛額痛等ヲ発シ或ハ全ク此諸症ナク其瞳
孔ニ変ラ見ハスノ前患者已ニ視力ノ乏弱ヲ覺
エ物ヲ見ル毎ニ雲霞ノ隔ツガ如ク○而メ後ニ
一小灰白斑ノ速ニ瞳孔内ニ發スルヲ見ル
自内翳ノ十分ニ形成スル其時間ハ甚タ不定十
リ或ハ兩三年間亦形成ニ子ルアリ或ハ其間尚
ヲ長キ者アリ○水晶體翳ニ於テハ偶ニ甚タ少
時間未成立者アリ此症ハ殊ニ乳様翳ニ於テ常

白内翳ノ終リ種々有リ

其一吸收管ニ吸收シ去ラヒテ全ク消散スル者

アリ。○ガルリツセニ人ハ膜翳ノ融化スルヲ見

テノシ人ハ水晶体翳ノ融化スルヲ見タリト

其ニ水晶体自ラ其位置ヲ変メ前眼室ニ移リ若

久ハ硝子液内ニ移テ以テ再ヒ視瞻ヲ得ル者アリ

然レモ如此キ天幸ノ終リヲ得ルハ甚タ稀ナル

トニシテ尋常ミナ視瞻ノ失亡ヲ以テ終ニ者ト

知ルベシ

遠因

白内翳ノ因分テ二トス曰ク遠因曰ク近因○此
病ノ由テ発スル処ノ因_{兩因共}甚タ多シ翳ハ其生業ノ
為メ若クハ學術ヲ研精スルガ為メニ長ク其眼
ヲ強キ光輝ニ觸レミタ若クハ掌ニ至小ノ物ヲ
觀察スル所ノ人ハ此病ニ罹リ易ク○或ハ辛辣
性ノ飲液ヲ誤用スルヨリ発スルト多ク○或ハ
他ノ諸疾病ヨリタ生ス就中徽毒瘻瘍様病
壞血病傷冷毒痛風等ヨク此レカ導誘ヲ十ス○
或ハ外部ノ損傷ニ由テ水晶体疊暗シ或ハ水晶
囊破裂シテ此ヲ発シ○或ハ劇キ嘔吐ノ長ク止

辣

一訣辛味飲候所有
一章云
又此疾、老少、拘_ニ此
アリト無_ニ父母遺傳ア
ルニアニヤハ殊_ニ元_ニダ
レトス

一試
高野ヨリ直_ニ飛下ル等
能_ニ之_ニ該因ラヌ

ニザル者亦此因ト努ナル也、隣ト通じ、良也。

近因

是上水晶体及ヒ近接スル部分ノ墨暗ヨリ発ス
ル者ニシテ其水晶囊ニ位置スル白肉翳ノ此膜
ノ歟衝ヨリ來ル者トス何ワヤ其墨翳ト愈着ト
共ニ是レ歟衝後ノ岸症タリト精詳ノ試験ニ因
テ知ル所ナレバ也且ツ角膜ノ歟衝後ニ登スル
症候豈此症ト符合セズヤ

○水晶体翳ハ全ク然ラバ何リセ予輩未だ其ノ

實質ノ榮養如何ノ機能ニ由テ成ル丁ヲ知テサ

レバナリ○或少歟衝ヨク此体ノ榮養ヲ妨ケ真
實質ヲ変セシメテ其繫連ヲ剥離セシメ
遂ニ壞疽ニ陥エシムルノ理アル者乎或ハ其水
晶液中溶解スル何等ノ理ニ由ル乎未タ此ノ知
ルコト得ス○而ヒ古未未タ生活セル實質ノ
液ニ觸レテ自テ消滅セリ例ヲ聞カズ此ニ由テ
之ヲ見レ空此翳ハ是レ既已ニ壞疽トヒル者
乎○後日將計攻、研精ノ真正理ヲ明證セシ
モサニ他病合併時真害ニ至ル歟

瓦ソ白内翳合併ノ施術ニ害ヲ成ス諸病アリ

一説云
九ノ身体何ノ部ニ於テ
液ニ觸テ融解スル部ナキ
水晶体ノ傷リ水晶液ノ
翳ニ触レ融解スル事
ヲ備ニ看カ

索セハシノ儀アラズ其害ヲナスヨリ多キヲ詳ニ尋
ツ其病源ヲ治メ尽ル後ニ真方術ヲ施ス可シ
合併病ニ全身ノ病アリ各部ノ病アリ○全身ノ
病ニ屬スル者ハ瘻瘍様病梅毒白堊様病等ノ類
ニシテ各部ノ病ニ屬スル者や結膜角膜虹彩水
梯液硝子液細網^網腺外病是ナリ由
瘻瘍様病徽毒白堊様病等ノ内翳ト合併スル
寸ハ先ツ適宜人療方ヲ以テ此ヲ治スルニ非レ
ハ敢テ方術ヲ施スコト無カ松可シ必ス其功ヲ

得ルノ難ニ洋師鍼灸銀針等諸法又藥及ヒ青
結膜病内蔵内翳合併スル者ハ此膜及ヒ眼瞼
ノ傷冷毒病ナクモノアリ静脈瘤様ノ症アリ眼
瞼及ヒ結膜ノ傷冷毒病ハ剽走疼痛ヲ発スル者
ニ在テ其疼痛暘翳ノ其極ニ至ルニ訴レバ退カ
ニ是故ニ施術ニ先ツテ此トガ治方ヲ施サズニ
シアラズ○靜脈瘤様ノ症ハ屢々発セル歟衝ヨ
タル者ニシテ結膜ニ在ケアリ眼様膜ニ在ケア
リ虹彩ニ在ケアリ俱ニ害多ニ亘ク適當ノ醫薬

斑点ハ其膜間
角膜ハ數
層ノ組織網密ト生
吉子

ヲ用エル。守若クハ術ヲ以テ此爻治メ而後ニ本
病ノ施術ヲナス可シ。○精細脉絲、血絲脈、黃色
白内翳ニ合併スル角膜病ハ其膜ノ斑点葡萄腫ト
是ナリ。○精細脉絲、血絲脈、黃色
其一著大ノ斑点ハ角膜上面一部ノ腫瘍ヨリ生
ニ或ハ此膜ノ焮衝ヨリ發ス殊ニ其斑点瞳孔ノ
正面ニ在ル。視瞻ヲ妨ケ且ツ施術ニ大害ヲ
十石參毒散、大活血散。

具ニ葡萄腫ハ剛膜合發スルアリ。角膜ニ發スル
有リ。或ハ虹彩弛緩展延スケニ由テ發スル有リ

一灰髮脂下
然リトス

俱ニ常ニ白内翳ニ兼發スル者ニメ難治トス
白内翳ニ合併スル虹彩病此膜ノ焮衝ト愈着
及ヒ瞳孔之縮脉是ナリ。○精細脉絲、血絲脈、黃色
其一焮衝ハ何等人性質拘ラズ。總テ眼ノ内部及
曰虹彩之發スルオシヨク白内翳ノ發スル者ニ
メ且ツ此症ノ仍テ止サル間ニ施術ヲナス。す
全愈ヘ焮衝ヲ增進シ總テ眼ノ消滅ヲ成ス至
少是故ニ此症ノ全治スルハテハ施術ノ期遅延
バ不テ佳トス。全藥合煎服甚大リ。○精細脉絲、血絲脈、黃色
其二虹彩、角膜若ク水晶囊ニ愈着スル者多

久ハ剥キ焮衝ヨリ繞発スル者ニ有テ而此ニ
一部ノ愈着ト全部ノ愈着トアリ○一部ノ愈着
其瞳孔之異状ナルニ由テ此ニ知ルト金氏
全部ノ愈着ニ至テハ甚夕亦知ニ難シ俱ニ是レ
多害ノ合併病ナリ宜ク先ツ務テ此ヲ剥離ス可レ
其三瞳孔ノ縮小大ル者ハ偶ニ僅微ノ前病モア
少々無クノ發スルト有リ○此症モ剥離キ焮衝
ヨリ發シ其近接スル部分ト愈着スルキハ此ヲ
変セシムルト難シ而レ氏其確乎タル原因ナク
之テ發スル者ニ於テハ偶イナルコチカベルラ

トニナヒヨドアミス等ノ剝ク外敷メ忽チ張大
得ニシムルトアリト之ニ及スル時ニ之ノ
膿眼及ヒ眼水腫也屢々ヨク白内翳ト相并ヒ発
ス○膿眼ハ腫瘍ノ如ク角膜重築ノ間ニ発シ或
ハ前眼室内ニ発シ或ハ真兩部同時ニ発ス是ヒ
多クハ脈様膜及ヒ葡萄膜ノ焮衝ヨリ繞発スル
者ナリ○其纖維質_ノ實質_ヲナス_ハ即チ纖維質ナルカ若クハ
溢出_シ若ク_ハ滲出_シノ角膜重築ノ間ニ猪留スル
未だ斑点トナリ其点毛已著大ニノ瞳孔ノ正面
細懸ルオサ施術ニ害ラナスト亦夕最モ大ナリ

眼水腫ハ水様液過度ノ分泌ヨリ發スル者ニメ
或ハ以為テク是ト角膜内虹彩前ニ一種ト至薄
透明ナシ膜ヲ生ム因テ水様液ノ吸收度ヲ失テ
少キ者ナリト或ハ以為テク是ヒ眼内ノ稠厚液
液ノ屬ニ溶解メ発スル者ナリト或ハ謂フ是ヒ
焮衛不続症ナリト○此病屢々眼球内ニ深藏
スル眼癌腫若クシ眼球萎縮ノ前兆タル「有」
硝子液ノ變化ハ白内翳ノ施術「害ヲナス」固
ヨリ甚々多シ○此液ノ變化ニ於テ最著キ者
ハ歸翳硝子液乾燥及ヒ其化骨等是ナリ五十六

其一綠翳ハ光線ノ射入ヲ妨碍スル「水晶体ノ
翳」於ルカ如ク一般ニニテ其発スルヤ水晶体
ノ縁ヨリ眼底ノ色ノ異常ナリ透見ス○若シ
此病ト合併スルオハ施術功アルトナシ
其二硝子液乾燥ハ其例甚々稀ナリト金石偶
亦タ之ト有リ○此症ハ硝子液乾燥シ尽テ其位
置ニ一種ノ他液充填シ其已前硝子液ヲ包裹セ
サル蜂巢状膜ハ萎縮メ其中ニ浮ヒ頭ノ微動ニ
モ振搖スル「怡モ振搖翳」於ル如ク然リ○此
症・於テハ水嚢囊及ヒ体俱ニヨク墨翳トナル

者ニシテ方術ノヨク視瞻ノ復故セシメザル所
ナリ

其三硝子液化骨ハ是レ眼目機械ノ機能其序ヲ
差フヨリ登スル者ニシテ其症真ノ黒内翳ト誤
認シ易ク實ニ不治ノ病ナリ

眞ノ黒内翳白内翳ニ合併スルヲ弁別スル丁ハ
寔ニ眼科中最第一ノ難事ニメ且ツ古哲ミナ瞳
孔ノ收縮力ヲ失^失スルヲ以テ此徵トスルト魚氏
亦屢々此症ナクメ既ニ合併スル者有リ〇而レ
氏若ニ其瞳孔散大ノ患者水晶体ノ周圍^{是レ其}
^量翳^量也

モ^モ善^キヨリ光明ヲ透見スルヲ得ズ且ツ虹彩
光輝ニ觸レテ運動セザルすハ是レ其合併疑ヒ
ナシトスルモ殆ド可ナリ

凡ソ黒内翳ノ發スル其間患者ノ物ヲ見ルニ或
ハ較字トメ端正ナルヲ覧ヘ或ハ茫字トメ不明
ナルヲ観ユルヲ有テ視瞻ノ強弱定レル度ナキ
者ナリ而ハニ單性ノ白内翳ニ於テハ曾ラ此ノ
值フアラバ是レ視瞻ノ感覺ニ於ニ疾病ニノ
如キ症ノ有ルヲ聞カズ是故ニ學者モニ此症ニ
實ニ網膜病タルヲ決定シ敢テ方術ヲ施ス丁

無可レシ

預防術

應三合併・應三薰質、
應三人々相易・故・癩
散見之雖ニス〇庶少
壯ノ年於ハ術ヲ施ノ爲
テ得易ニトキモ極毛佳
モ亦効キニ非スアリル
夫レ眼科勤務、唯レ其既癰セル白内翳ニ術ヲ施
シテ此ヲ治スルノミナラバ將ニ其癰セントス

曾テ百人、威ノ老人、術ヲ
施ノ功ツ得タリト
但ニサ寒者ハ二十二歳ノ
時ヨリ其體脛ヲ失フネ
ナリトゾ
又寒火於ラハ術ヲ施ミ
宣々我慢ノ意ヲ用ヒズア
ラズト焦モ或人、説キ者
ニアリス、其説云宣々寒火
ニハ施ス可ト、稍年長ミ
テ候クベシトケセんテ、ハ
イワ「ト各等皆此説フ
非トセリ○虹彩運動白
左ニテ且ツ假令愈着スル
アルモニ至微ニシテ著カク、骨ス者等ヨク一生涯ノ害ヲ残ス者ナリ○若シ
カルモノハ術術ニ害トモトニ且ツ外見合併病アリテ幼ラ得難キト加キモ、術ヲ施ノ及ア善功ヲ得ルナリ、唯眼内ノ感動最モ甚シキ者、術ヲ施ス勿レ真刺戦ニ由ラ服

既ニ白内翳ノ僅カニ発スルヲ見ル
此ノ害ヲ招ケテ有レバナリ。蓋醫ハ總テ治ニ易ニトス時トノハ此症特ニ由於ナク自然ノ良醜ニ由於自ニ治ニ視膳故ニ復入ヘモナリ。

其増進ヲ防クガ為メニ務メテ光輝ノ射入ヲ減ス可シ。○其光輝射入ヲ減スル為メハ一個ノ管ヲ患眼上ニ抵テ唯對スル所ノモノ、他敢テ

內科治方

丸ソ白内翳ニ許多ノ薬剤ヲ内服エシムルハ其
目的固ヨリ疊翳セル水晶体及ヒ其囊ヲ復故
セシムルニ在リト虽ニ敢テ其功ヲ逞フスルモノ
ヲ得ル者ニ術ス

世人一般云灰翳一服三癒
スはすハ宜シ他眼モ亦之罹
ルヲ俟ツテ術ヲ施スベシ據

アルニ非ス他人ノ所謂翳ノ熟

ナル者モ亦功利害ヲ為ス者

非ス唯翳ノ白色増進ニテセシムル、ニニメ他ノ功ナキカ故ニ予カ輩ノ

針ノ作用自在ル耳術ア

施スリ佳ズルノ三月時ノ

擇セシ日之テ施ノ害レ次々

ハ最モ傷考ヨリ受易テ

時ニ氏ニテ施ノ害レ次々

他時ヲア四時俱ニ施テ

害テキテハ寢翳。宿ラネ

知リ

古来用フル所ノ預備方ハミナ唯一患者ヲ疲労
シムル、ニニメ他ノ功ナキカ故ニ予カ輩ノ
流ニ於テハ此レヲ用ヒズ○然レビ施術前一二
日緩ニ下利セシナテ飲食ヲ節ニシ肉食ヲ斷チ
胃腸ヲ淨刷メ歟衛ヲ預防スルハ最モ要事タリ
○且ツ施術前一時許ニ阿片少許ヲ与ヘテ患者
ヲ靜黙セシメ若シ其瞳孔非常ニ縮ハスルコト
見ルスハヒヨシニアミス。若クハベルラトニナ越
先割メ溶水ヲ眼中ニ滴入ス可シ

外科治方

白内翳ニ於テハ自然良能ノ力獨リヨク之ヲ治
セシムルコト得サルカ為ニ外科術ヲ以テ之ヲ
補助ス其目的唯視瞻ニ障碍ラナス者ヲ除去
シテ其機関ヲ復故セシムルニ在ルノミ
其方術ニ由テ得ル所ノ功ニ至テハ皆相同シト
魚庄其施方ニ於テハ各大ニ差ヘリ○而レ庄亦
多其谷、方術ノ目的トスル所ノ者ハ唯二種ニ
一ハ剛膜ヨリスハリ○其眼過キス即ケ水晶体ヲレテ其位置ヲ変移セシム
ル
名ヲ摘下庄ナシ通病ニアル
ト新ニ創口ヲ造テ之ヲ除去スルトナリ

○此二術ノ用法ニ合二種ノ
別アリ一ハ角膜ヨリスナリ
一ハ剛膜ヨリスハリ○其眼過
内ニ在テ位置ヲ変セシム
名ヲ摘下庄ナシ通病ニアル
ト新ニ創口ヲ穿テ外ニ

出スラ剥出法(オイトチーミング)前
角膜ヨリスル刺角膜術(キモトナオシヒトメトウ)

角膜ヨリスル刺角膜術(キモトナオシヒトメトウ)

家ニ相差ラ取扱議論

定則(キモトナオシヒトメトウ)

紛ニナリトキモトナオシヒトメトウ

ノ後ニ各個ノ法術ヲ説

ニトス

光輝(キララ)禁ス若ニ

強ケバ虹彩(カクニン)縮

張スベナリ

施術前定則
由ニ頭ヲ仰キ光輝ノ鼻ニ接ス眼ニ入ルニ適セ
シメ他ノ一眼ハ固ク審閑メ開クコト得サラレ
ム○補者一人其背後ニ立チ胸ヲ以テ患者ノ頭
ヲ支ヘ手ヲ前頭ニ置テ示指ヲ以テ患眼ノ瞼ヲ
掲ケ他ノ補者ハ其傍ニ居テ術者ノ用ス弁ス
偶ニ定瞼子原名オーラクリットオツアキウ
テル。オーラクリットオツアキウ
ラ用フケル

定瞼子ハ故ニアバクワヘニ
元ハ从カ始テ聲明スル所

近來大変數々修繕セリ

有リ是器ハ其眼ヲ壓迫スルヲ微ナルガ為メニ
在ル者若クハ患者ノ自ラ靜止スル丁ラ得ザル
モノニ於テ最要ノ器トス○若ニ此ヲ用シトス
モノナリ然ニ術者各々
慣ニ所ニ後テ真宣フ
得キヤリ

其利多シトス殊ニ其眼ノ小ニノ深ク眼窩中ニ
在ル者若クハ患者ノ自ラ靜止スル丁ラ得ザル
モノニ於テ最要ノ器トス○若ニ此ヲ用シトス
モノナリ然ニ術者各々
慣ニ所ニ後テ真宣フ
得キヤリ

施術者足利義通著
白内翳方術論二

挤下法第一

論貫剛膜施術者

挤下法ハ疊翳セル水具体ヲ挤下メ其位置ヲ變
移スル法ニナ殆ニトニ年「十未白内翳ノ療方ニ
於ケル無ニノ方術トセリ是故ニゲルニエス葛地法ア始テ登見人

人名

ノ方論世ニ行ル、丁久ニ〇サノケルニユスノ
療術ニ於ケルマ右眼疾ム者ニハ左チラ用カ左

ハニオニセノールト著

白内翳方術論二

眼疾ム者ニハ右キラ用フ〇丈針ハ銳ヘソ芒タ
細カ十ラス立ニナ銳利^{西偏外アリ})隔校ラナセリ此ラ以
テ外眞方ヨク瞳孔ニ向テ則膜ヲ貫キ丈針端^ノ
水異体上面ニ末ル寸ハ^又針ラノ一轉即セシモテ
丈水異体ヲ下ニ向テ押ス少向而ナ尚ラ自ラ
再ヒ上ルヲ有ル寸ハ丈ヨウ沉著セニカ為ソニ
此レラ數片ニ功破ス

○此針ノ製造形狀此時以木世^ミ大ニ變セリ
右作ノ方術世ニ行ル、ト久ニカリシニ近世^{ヨリ}割
出法ラ分明セシヨリ世人皆此ラ療癒ノ用ヒス

拂蘭西ニテ
然民尚イタリア及此國ニ於テハ盛用之

而ルニ又タシカル。人十ル者有テ更ニ新説ラ起
ニ再ニ又術ラセニ行レトム〇丈ニカル。バ用
ユル處ノ針タル丈形狀少シク前條ノ針ト差フ
即千一篇面アリテ丈端鋒^{第一}如ノ(四種)
(一枝)長ノ甚タ
尖リ少シク丈扁面ノ方ニ曲リ復曲シル方ニ於
テ尖端ニ至ル迄魚骨一種类ラ接合不逞レ莫ニ
水異体前面ヲ容易^ク功破シ得ルカ為ノニ〇丈
術ラ施ス方法左ノ如
〇若シ左眼ニ術ラ施サニトスル寸ハ丈尖端^ノ
曲レル針ラ右ノチニ取テ華ラ持ツ如ク握ノ同

時ニ下瞼ヲ按ナムラ下ニ引キ補者一人後ヨリ
其上瞼ヲ掲ケ^{シテ}以テ保ニ眼ヲ固持ノ轉動サラ
シム〇而ナ又針ノ曲リト患者、左顎額ト向方
同フナ他ノ諸指ヲ顎額上ニ置キ角膜ト闌膜ト
際ラ去ル^{外脣一方}一レイニ許、^{中指}処ヨク瞳孔模徃ノ
少ク上ニ向テ貫穿ス〇而レ氏又虹彩及ニ毛様
撻^{原名ハルモニモレニシニ}テ毀傷セオラニ^{之ヲ}欲スル為メハ角膜ラ
去ル、^{遠ケヤガラ曲リニ遮ア之ヲ}際ラ一レイン半十ラシムルラ佳トス
〇而ナ又針ノ柄ヲ徐ニ^ニ顎額ヨリ遠ケラ全針
ニ曲レル^{之ヲ}用ヒラナシ以テ又曲端ラ全ク眼球内

ニ進入ミ其曲ノラ水器体上部ニ抵テ以テ上ヨ
ク下ニ向テ精ニ水器体ラノ稍^{更位置}ラ麦穗マ
シ^{此ノ}時針ノ水器囊ト虹彩ノ向ニ見シ、^{ラ日}
的トナ針ノ曲端ラ毛様体ト水器囊トノ向ニ刺
入ス〇是し術者ノ最ニ注意慎戒ス可キ处トス
何トナレハ若ニ又針水器体ト水器囊トノ向ニ刺
ツテ其体ノ^ノ附子液ノ中ニ陷ル^シ其囊本位
ニ止テ後醫^{術後再発スル者}是ラ後醫トエフ
内^向背ノ方ニ有テ水器体ノ縁沿^ニ正横ニ撞テ針尖
ラ甚タ内^向背ニ近近セシム〇此時針柄ラ少ク前

ニ向ハシメ水呉囊及ニ丈ノ実体ノ中ニ刺入ニ
半規様ニ轉動ナ又囊ノ前部ノ影多ニ切破シ以
テ翳ラト瞳孔内ラ去ラシテ瞳子ラト凹ニ且ツ
里ク瞻視ニ妨ナキニ至ラニ斜^{サク}暫^ク其^二止^ノヨキ而後ニ丈針ニ僅
微ニ轉動ラトニテ此レ引出ニ了ル○又後翳
ニ於テ丈残在セレモノラ前眼室角膜ト虹彩ト
ニ撞出ニ以テ落解セムルニ丈術ノ大意ニ於
ケル違ワス

○偶ニ將ニ椅下セニトスル寸丈翳針ヲ滑脱ナ
自ラ深ク硝子液内ニ隠シ、ノ有而ル寸ハ術ヲ

棄止セサルフラ得ス殊ニ丈水呉囊ラ破ルミノ
ニ於ラ燃^{然ルナ佳トス}リ或ハ立タ丈醫^人セル水呉体向ラ前
室ニ送^出スレフ有リ〇此症タル是レストエイヘ
ス人カ十七百七年ニ於テ始テ剔出方ヲ發明セ
處ノ者ニ又タ此ノ症ニ於テハ丈水呉体ヨク前
室内ニ於テ自ラ融解ス丈例アニシヤウクス^{古人}
ベル、人カ書中ニ出タリ默^スルニ又タ他書ニ云フ
丈融解一年ラ往ルニ非ナレハ成ラスト是故ニ
宜^ク其^二化^シ疾^病絶^る矣^ルサ^ルニ^ス先^テ真^正醫^ノ道^路ヲ^ナ出^ワバアラズ然^ニ先^ツク^リ更^ジ登^スル傷^病ヲ預妨^スル^トニ心^テ用^ヒス

光輝ニ減ノ瞳孔

張撫スル度ノ良具

許ナラバ再ヒ致リ良具

内ニ入テ捨下ス佳

よス

ニハアラス殊ニ先ツ丈瞳孔光輝ノ減退ニ由テ
人ワルレ人カ方術殆ト右併一方ト同ニ併ワルレ
人ハ丈翳ノ軟ナル者カ流動ス可キモノニ於テ
ハ唯水異嚢ニテ破テ永様液ノ其體羽レ溶解ス
ルニ仕ス○丈施術ニ於ケル針ハ毫タ細クナ丈
長一極許丈尖基タ銳尖端ヲ去ル一極向許一
側ヲ銳ニタル可カラシナ一側ヲ鈍ニシ尖ヨ
リ柄ニ至ルニ遂テ漱ク太トカラシム○丈施術
前先ツベルラトニ十越箋割ノ溶液ヲ滴入シ若

クハ之レラ眼瞼ニ擦メ瞳孔ヲ潤カシナ而ノ
后丈術ラ施ス方左ノ如ニ

○先ツ患者ヲナ丈高適宜、椅上ニ居ラシノ或
ハ凡上ニ卧サシナテ丈頭ヲ枕子ニテ高クニ

定臍子

未詳按、眼瞼固持

テスル、呉守

一レイニ強

而ナ后ニ丈角膜ヲ顎頸ノ方ニ去ル一八分梅之
一ノ處ニ

針ノ

副膜

鑽透ス但其針ノ鈍側

ラ上ニ向シム○丈針ヲ有ツノ其如クニ其
ラ前方ニ向テ衝入シ丈端丈ノ殆ニト水異体ニ
達スル丈囊ト共ニ少レラ鑽透ニ尖端ヲノ前

室ニ見レシムルニ至ル〇而ナ若ニ丈弱ノ軟十
ルキ又ハ流動ス可キ貯ナリコラ見ル寸ハ唯ニ
功入レルノニナ針ヲ拔キ術ヲ休メテ排泄マ
ル貯、自ラ吸收セラル、ラ待ツヌ吸收多クハ
一二日伺ニ成リ或ニ又タ偶ニ一二時間ニナル
トマリ〇若ニ瞳孔内変化ラ十ス、少ナキヲ見
ル寸ハ再々又タ針ヲ入レテ水晶体ト囊トラ保
ニ従横ニ功分ナヌ片ミテ前室ニ撞出スル、トニ
カルハ人カ術ニ於ケルカ如クス〇若ニ丈弱硬固
ノ貯ナル時ニ挿下法ヲ施ナ其脹、後面ヲ影多

ニ功合ナ以テ直ニ真針ヲ拔ク〇若ニ又タ丈弱
唯ニ水晶囊中ニリ有ル寸ハ丈囊ト体ト共ニ
多少ノ小度ニ分子前室出三前室内ニ於テ徐ニ吸收セ
シム〇ナウニデルス人名後術ト名シル者アリ丈後
術ノ名タル詳ニ知蘭人マールト人カ書中ニ出タリ、後按

ニ是レ虹彩ノ其術中予カ弁説ニ要ナル者アルカ
ナニ今ベル、人ガ語ラ引テ此ニ贊ス
ベル、曰クサウニテルス君ノ術ヲ施スマ針ヲ虹
彩後ニ挿入ニ丈針尖、瞳孔中ニ末ル寸水晶体
囊ト共ニメラ功同水様液ト混マシナ

又吸收ヲ起サシ此術之レラ故ノ第一術トスア
後坎ニ代フルニ術ヲ以テセリ是レ又锐ニ以为
ラク角膜ヲ鑽透スル寸ハヨク焮術ヲ名スル焮術
刺角膜術ニ於テ尙少ナレト○而レ氏又施術ニヨツテ名スル焮術
燮術ヲ發スルアハ是真刺ニ係ズハ是レ鑽透1状ニ拘ワル者、非スナ唯ニ翳ノ
唯翳羽ヲ動カスノニシテ燮術ヲ發スル者ニアズ博ニ此ハ
是レ瞳孔ヲ開カント○アタムス名ハ又吸收ヲ速ナラシムニカ為ニ
為ナリ故ニテハ後術ノ用タル良苦ノ折
勝レトス後術ニ唯
鐵ヲ常々アリ入テ
水晶裏ヲ傷ハミ
ナルカ故ニ先ツテ瞳孔ノ潤滑スルヲ要セ
サレハナリ然レニ術ク
剛膜ヨリ鑽通ニ始ナニ
水晶体ヲ横ニ功分千
後ニ於テハ良苦
用ア瞳孔ヲ開ケレゾ
スニバアラズ然ニザハ
翳ノ虹彩ニ愈着スル
熱也ハナリ

次ニ又毎片ミナ又之ラ數分ニ功ニ逸ナテ又囊
ト毛根柱ノ繫連ニ功高ニ次ニ体囊トミニ又ノ
功ニ分テル小片ラ針ノ扁面ヲ以テ前室内ニ排
出シ以テ融解ヲ自然ニナシム

○ベール人カ曾テ高年一人ニ於テ殊ニ又翳硬キ
者ハ甚タ吸收ヲナシシナ難ニト云ヘル者終ニ
アタムス人ニ由テ幸ニ又治得ルニ至レリ何ソ
ヤ往レハ此症ニ於テハ甚タ銳利ノ針ヲ以テ水晶
体ヲ薄片ニ功令テヨク更融解ヲ進ムレハナリ

論貫透明角膜施術者

此篇論スル者ハ角膜ヲ貫テ水器体及文壺ヲ破
リ或ハ又体ヲナ位置テ変移セシム斯唯壺ノ
破ルノ方ナルカ故ニ寔ニ椅下法ノ名當ラサル
ニ似タリト金此テ文中ニ列スル者ハ前篇モ亦他
十之差ニ椅下法中ニ支術ナレハナリ
○貫角膜方ノ始テせニ行ル、ナヤ丈登見及ニ
治効等ラ得レハ殆ニト剔出方ノ始メテ行ル、
寸ニ差ハス且ツ其レラ他術ニ比スルニ大ニ勝
レリトノ一尺丈治効ニ於ル未タ全ク十分ノ級

ラ得レトセス

○貫角膜方ト剔出方ト丈術固ヨリ相及ストイ
ニヒスルニ最モ新ニト坐
氏人ノ貴重特用スル最
モ甚ニキカ故ニ今既停
止ラ極尽ノ毫モ加ル
所ナキ、至リ

刺角膜術ハ他ノ法術

ニシテ始メテ發明矣及第

即エニゲランド地ニ於テハギプリ六人トサウニデ

ルストノ方術其致ラニシニ○拂良斯地ニ於テ
ハタルトラ人ニタクニ人兩家各互ニ相知ラヌ、
暗ニ同時ニ此ヲ發明ス若シ人其兩家孰レ力先

見ノ誉レアルヲ知ニト要セハ宣クビユアリ
人始チ銀鉢正シ一個ノ活割トスヒシ
エルニ人カ貫角膜方ノ著書ニ就テ見ル可シ自ラ

昭ニタラン○夫レ貫角膜方ハ一千七百^年ニ於テ

始ニテ登見セラレエニケルヤ國ノ眼科ナユル

キユエト人^名ガナリヨルト官^名リク人^名ノ世ニ於テ患者

ノ角膜ラ貫テ奇効ヲ得シ^ト及ベテウサルト人

リクリタル曰ポツト曰ベール日ゲレイヤ同コ

ニテニ日ニカルパ日ホガ此術ヲ施シテ各々奇

テ由テ世ニ公行スト等^著名家^山時ニ至^テ諸^ノ首^ノ明^ノモノアラ

カリニ^ト実ニ黒^トス^ニ堪^タリ

舍^ノ接^ノ法似是

○此方タル全ク他ノ方術ト異ナ^ト適宣ノ針尖

一訳作
人^ノ莘^ノ書出

ラ角膜^膜及瞳孔ヨリ入レ以テ^ニ脣^ノ羽^ノセル水^ノ體ラ

捨下シ或ハ又タ文^ノ體及^ノ囊^ノ功分ノ吸収セシム

ルモノナリ

○凡ソ水^ノ體^ノ獨^ノ囊^ト分高シ或ハ不度^ノ自^ト破^ル裂^シ或^ハ術ヲ以テ分析スルニ申テ吸収サ^レテ自ラ消散^ス可キ^トハ貫角膜方ノ創ナ^テ世ニ行^ル、寸既已ニ公歟トナ^セニ明カナリシニ^シ行^ス人^ノ己ニ^シ吸收スルヲ知^レリ何ソヤ彼レ刀術^ノ施^ス唯^ニアルニカシス人^ノ管ニテ金線^ノ葉^ラエ

以テ又製水呑体ヲ破碎スルノミナレハ之バ
人亦タ此レラ知ラサルニ非ス何テ以テカ此ラ
知ニ従レ術ヲ施ス后半翳ノ一分眼中ニ残在ス
ルニ敢而又害ヲ為フヲ恐レサレバ也○リリテ
ル人名ホット入名六ニ又タ此事ヲ證ス即ホットカ説ニ
ヨク若し水呑嚢毀傷ナ水様液ヨツツ此ニ往流ス
ルヲ得田ル寸ニ依合ニ又始ナ臺翳甚シクノ
全ク光線ノ通路ヲ妨クル者モ時ノ経過ヲ以テ
徐々ニ融解シ速キ者アリ遲キ者アリ終ニ全ク
消散ナ其眼明亮視瞻ヲ得ル巧手ノ術ヲ受ル

モノ、如シト

○ゲレイセ人右件ノ諸家ニ次テ此方ヲ施ス即干
角膜ノ側凹ニ穿破ニ又針ヲ以テ又醫ヲ拘ス意
フニ忍テクニラ人試驗亦タ此ニ原ツク
又試驗ラニセト状ニ針ヲ角膜ヨリ瞳孔内ニ入
レ水呑体ト囊トラ分離ノ立ニ水様液ニ觸レシ
ナ吸収ニ由テ之ラ消散セシナ囊ハ此レラ影彌
ニ功同キ自餘ニナ吸収力ニ任セシムニユツツコ
ルニ人此諸驗ニ從テ千八百八年ニ貫角膜方ノ書
ラ著ス其書大ニ世ニ用ラし殊ニゴツキニク各地

大學士ラニケンヘツク人ヒムレイ人丈説ラ貴ヒ
遂ニ兩士ノ實驗ニ由ラ歐羅巴州中敢テ丈方ラ
知ラサルナキニ至シリ○故ニ由茲ラ觀ルニ茲
方術ノ明カニセニ行レテ他ノ諸術ニ冠タルニ
至ル所以称譽ハ此兩士ニ在ル固ヨリ論ナシ○
千八百十三年ニイカニ各地ノミニタイ人新タニ
貴角膜方ノ一術ラ登見ナ自ラ以为ラク登見唯
己しニ在リト是レ彼レ坡地ニ居テ又院ニ拂
良妣ニ於テタルト人カ登見セシ書人在シヲラ
知ラサレハ也○此ビ丈地ニ於テリ彼レ固ヨリ

此術ノ發見者タル論ナシ○丈術タル是レエニ
ゲラニト地ニ於テオウニデルスカ登見メ終ニ
アニケステル地ノキブソンニ擴弁サシニ者ト
異ナルトナシ

○ヒユツコルニカ用ユル處ノ針ハ殆トシカルハ
ノ竈針ニ差ハス○ラニゲンベツク人カ用ユル處
ノ者ハ丈針端三角ニノ助ニ可ク「カルハノ針
ヨリハ細ク丈本ト稍イ鈎リ丈頭稍細ク星レ貫穿
カラニヤ又尖端ヲ去ルニ遂テ漸ク大ク漸ク田カテ
ニカカヌ又カナリ又丈柄ハ角形ナラシム第一枝○
ベ子ジクト名人

ガラキ一人
○モニタイ一名寺ハ右件、針ニ少シク度スル者ヲ用
丈本ト曰ク、又端歛状ニテ西又マリサウニテル
スモ亦タ西又、針ヲ用エ
毛ソ外方ヲ施サニトスル寸ハ先ツ術テ以テ广
痺セシナ瞳孔ヲ開闊セムルヲ要トス即チ此
ニ用ユル處ノ禁制ハヒルセニコロイト
ヒヨシアム
スニゲル
十フトミカ一ベルラトニラ佳トス丈ビルマニコ
ロイト、偉効アルフハ院ニヒムレイ名カキハ百
年ニ著セル書中ニ詳説セリ○ハムクユルク名地

レイマリエ人
○レイマリエ人
剔出方ニ用ルフニリナクトニカ一テ、効カラ
エイ入院ニタラ聰明ニ我國ニ於テハゲオツフ
エイニ因テ世人之十知ルフラ得タ
○術ヲ施サントスル少時前右件ニ云ル、兩種ノ
越後御糞レカ一果一ヵラ取テ八弓、蓋餉水ニ
溶カニ一二沸ラ眼中ニ注キ或ハ又越後瓶ラコ
リムノ桐トナミテ眼瞼ニ塗リ擦ニ以テ瞳孔ヲ
開カシム
○モニタイハ貫角膜方ニ禁制ラ用ルフラセス

而し氏其時既已ハレイス地諸大医ハ皆妙ラ
用レフラナセリ○マウニテルスハ既ニ以テ用
ニシカ故ニエニケラニト地名於テハ登見者ノ名
ラ得タリトイヘ氏レイセス地名テルハケト人名由
テ擅作セラル而ニ又ハケト地名夕剔出方ニ於テ
ハ既ニ十八百一年ニ始ラ用テ効ラ得ニナリ
○大學士ラニケニ一ツカガニユツユル二人名方
術及ニ機械、製ラ變セム實ニ告聾、方術ノ
因テ起ル處ニ而シテ又タ彼レガ名譽ハ固ヨリ
ヒユツコルニ、在ニニ由ルヲ論セズノ知ルベ
筆鷺管取ル如クニ小指ラ頬ニ置テ以テ支持ニ若

是故ニラニケニヘツクノ方術ハ尊童ス可キ第
一ナル者也又術友ノ如ニ
○左眼ラ療セントスルサハ針ラ右手ニ持ツフ
之右眼ニ術ラ施スサハ小指ラ鼻下ニ置固定テ
ノ角膜ラ上ヨリ下ニ向テ貫キ又針ラノ鉤鉤背ラ
水畏寒前面ニ達セシム○若ニ支翳、硬性ナル
ト見ルス、其柄ラ高クメ支翳、中心ラ椅ニ以
テ水畏寒体ラ轉倒シ又上邊ラ後トナニ下邊、前
トナサニシテ深ク硝子液内ニ挿下ス

○若ニ又タ又翳ノ軟性ナルヲ知ルすハ妙ラ
數片ニ功破シ龜ナテ皆以前室ニ出サシム

○右件ニ用エル處ノ持下針ノ外ラニケニ一ツ
ク人又タ又功破ノ容易カラニガ為ナニ又針ラト
名^テ又^テ變製^ト即^テ其^ノ鉤背^ト針^ト即^テ其^ノ鉤背^ト之^ノ鉤腹^ト設^テ鉤腹^ト鉤^ニ其^ノ幅^ト其^ノ裏^ト平^ニ鉤腹^ト其^ノ刃^ノ部^トニカアリ^ト其^ノ刃^ノ部^ト兩扁平面ト^ニ頸及^ヒ其他ノ部^ハ形状^ト大^ニ小^ニ皆刺角膜鍼ト^{カランニ}○其針^ト頸^部即^テ其^ノ刃^ノ部^ト示指^ト側^ト溝ニ即^テ母指^ト方^ト溝也

差^フナシ此鍼^ヲ分^ラ要ス^ト名^ト第三^回○其針^ト頸^部示指^ト側^ト溝ニ即^テ母指^ト方^ト溝也^ト但^ニ又仄^ニ剪^カテ短^ト此鍼^ヲ分^ラ要斯^ト手^ノ環^ト指頭^術ラ施^スノ前常ニ以^テ指^ヲ左^手ノ母指^頭ニ抵^ヘ右^手ノ母指^頭ニ抵^ヘ但^ニ左右眼共^ニ常ニ右手^ノ用^ス之^ノニカ^ト是^レ術^ヲ施^スニ當^テ押壓^ト害勿^カラシ^ニカ^ト

為也○下ヨリ上ニ向テ角膜^ヲ貫キ針^ヲ翳^ニ達セシム又針^ヲ動ハ^シニ^テ其持スル處ノ示指ノ動ニ由ル○而^テ全腕^ノ動^ヲ以^テ又柄^ヲ高ナシテ^ニ竈^ヲ上ヨリ下ニ向テ^ニ微動^{スル}ト^ニ二回○次テ針^ヲ一轉回^ニ横ニ竈^ヲ内ヨリ外ニ向テ^ニ分^カニ^テ○水様液^ヲ注入ト針^ヲ微動^トラ^ニ外ニ向テ^ニ分^カニ^テ○^ル小片^ノ前室ニ出ツルヲ^ヲ催進スハ^ニタ^ハ損傷^ヲ起ス患ヒ少ク且ツ彼^レカ貫角膜^ヲ持下方ニ用エル針^ヲ比スルニ肩^ヲ功破スル^ト

大利レト 然レ賛下スルハ尚已前ノ鐵ヲ用ヒ

○ ミニタイン人方術ハ妙レラ

夏術次第二舉凡力

○術者自テ患者ノ背後ニ居テ輔者二人丈傍ニ
「人面勝人顎」

立手選者ノ手牌ト頭ヲ固持シ以テ又頭ヲ御恭

心主橫外嘗方
胸 = 安せひノ而ノ其針ヲ上ニ向ハシム角膜横

經，外端則膜子去之，一兩分許，以火燄入

レ〇丈針尖、瞳孔中心ニ来る。すハ少ク轉ノ事

扁面ラ正横ニ向ハシ以テ丈尺ラ水呑轡及テ才
体ニ押入シ〇次テ又針ラ水呑体ノ上辺ニ至テ

卷之三

上ヨリ下ニ向ヒ少ニタ外ニ向テ

下部以行文水過往于後室ノ下部少之夕外邊

備又以火至元之火而火后二丈針引半

生了心。履經驗，以術，大利。而丁

ニモニ外名自世ニ公ニセリ〇丈ノ利益

不于車之行者，若之方醫視西一但，此

御上高見美少夫テ以テ急ニカリ石

美上，萎下，得心非也。楼下之難，半日不

於一門一土而反以二朋而屢々釗于月中

セニタイン名ハ古事ノ
法術ニ鉄ヲ神ト誤ラ
正ヲ大之ヲ修繕セル
人ナリ其功ノ左モ大ト
ル者ニアリハ下法
ヲ施スニ月將ヲ擇ハ
サルナリハ下法
ヲ施スニ真誠羽毛軒
難キヲアルシハ先ツ
其聲柔善ノ真誠先
ニテ截リ離ミ二三日
經ノ施術ニ妨ゲナリ
毫モ傍癥ヲ發スカ

レバ再び摘下スルト
ナサルナリ是故ニ
二款鋼ノ入ル、ミ
ニレテ掛フ黒サルト
間此アリ

ナク傷瘡ヲ各スルト無キ者星レトト

此天敵也

○アーニケボレ子弱ハ水異体ノ弱アノ癢、

弱アリ体癢共ニ疊弱スル者有リト全モホール
コウナニテハ多ク癢弱ナルトサウニテルス名入

既ニ丈一種別ナルト施術ニ於ケル傷瘡トニ由
テ明ニ證セリ

○或人誤テ回甚タ細キ鍼ヲ以テ角膜ヲ破リ紅
彩及ニ水異癢、縁ヲ損傷シ○次テ強キ嬾衝ト
虹彩、愈着ラ善タル内弱ニ癒セリ又愈着内弱、
方ニヤリ
○而ニ丈嬾衝、治スル后ニヘルラトニナラ

以テ其瞳孔ヲ開カシナテ以ラ見ルニ丈水異癢
前面ニ十字形、截同有テ水異体ノ状綿ノ如ク
○其後一二時水異体全ク溶解ニ瞳孔透亮トナリ
唯又、虹彩ノ縁愈着セリト金氏丈快復ヲ得シト
實ニ施術ニ由ル者ノ如ニ

○此癒症ニ李ツヒテ役レサウニ一種)方ヲ名明ニ
以テ生盲ニ児ニ施ス(術トセ)是レ弱少ノ児
ニ於テハ眼、運動轉動、一種別ナルガ為メニ剔出
方摘下方共ニ施ニ難ケレバニ而レ氏丈水異癢
ヲ破ラニカ為メニ一種)細キ利刀ヲ用第一板
彼

レ共方ヲ七十人ノ患者ニ施ナ奇効ヲ奏シ明カ

水品袋ソ載リ破ル
レ視聴ヲ得セシムル者五十人アリ

○文術將ニ如何ノ方法ニヨル乎下条ノ分解ラ
見ヨ○患者ヲ此上ニ置キテ移動無カラシナヘ
ルリ人名カ一格スヒケル名器人名器以テ眼瞼ヲ
揭開シ○而ノ后細扁ニナヌアル針ヲ以テ丈角
膜上凹膜ニ近キ處ノ处ヨリ貫キ又針尖ヲ瞳孔
ノ中央ニ届カシム○自餘一方術ハ今ハルレ君
一諱ヲ以テ共ラ補フ

○ハルシ曰カウニテル人名カ術ラ施スヤ唯ノ針ス人カ術ラ施スヤ唯ノ針

ノ尖及ニ肩ヲ以テ水晶体中心ノ上面ニ微動ラ
ナス又微動スルノ廣幅瞳孔ノ自體大ニ過キス
○文目的唯ニ水晶囊ノ中心ヲ破傷スルニ在ル
ノミ而ニ氏若ニ唯ニ此レ鑽透スルニニナ
アラバ文目的ニ達スルトセスト何ソヤ愈着カヨ
ク速ニ文創口ヲ合付セシムレハ也是故ニ水晶
囊前面ニ於テ微動セシムル後ナ戒慎注意ナ文
針ヲ水晶体ノ実質ニ撞入シ以テ文体ノ組織ラ
分解ナ○而ナ后ニ文針ノ及アル方ヲ推下ケ文
動ニ申テ水晶体ヲナ水様液ヲ排泄ナ前ニ追ニ

シムナ時瞳孔自テ縮小ノ術ヲ施スト位置狭窄
ス○星ニ於テ又ノ針トカーグスピーゲルト共
ニ放去テ軽ノ丈眼ヲ覆ニ患者ヲ薦中ニ因サシ
ム
又曰ク以施術ニ於テハ斂衡ヲ召スルヲ少ナシ
若シ召スルヲ有ルハ諸術ヲ以テヨクシラ制伏
シ術后速ニベルヲトニ十越哉剗ラ肩上ニ塗擦
シ以テ虹彩ト毀傷セル水臌囊トノ愈着ヲ防ク
ト○ミニニセニ地名レイ子ル君ハ水臌囊ヲ種シ
截滅シ又ノ實体ノ一分ヲ取リ降クヲ以テ住ト

ス○又用二ル處ノ針ハ又尖扁ニナ又尖端ノ長
一レイニ半許又幅三分レイニナ六許又尖ヨリ
又圓頭ニ至ルニ従テ漸々細クス○又術ハ明膜
ヲ去ルヲニレイン許ノ處ヨリ又針ヲ斜メニ貫
キ入レテ又針ノ又アル方ヲ水臌囊面ニ抵テ上
ヨリ下ニ向テ種ニニ功破リ以テ又一分ヲ取リ
除キ○水樣液ヲ直ニ水臌囊ノ實質ニ觸しこナ
シテ又溶解ヲ催進ス
○凡ソ貫角膜方ハ諸症ニ皆適当スル者ニ非ス
ナ且ツ又術タル傷候下方按ニ則膜ヲニ於ケルヨリ

ハ甚^タ容易^キト 固^{ヨリ}論^{ナシ}レイ子ル君曾^テ
訴^テ拵^ラ舉^ラ正^锐テ立^テ丈^方術^ラ施^{ナシ}以^テ功^ラ

奏^ス可^キ症^ラ定^ム

○レイ子ル曰^{一五曾^テ云}几^ソ角膜^ラ貫^ラ椅^下スル方^ハ則
膜^ラ貫^ク者[・]ビスルニ^ニ甚^タ危^駆ニ^ナ且^ツ又弱^ク
硬^クノ溶解^ニ難^キ症^ニ於^テハ殊^ニ危^レト〇又

ヨク

貫^{レイ子^リ說}角膜方量^モヨク適^当ナ丈^術簡約最^テ危[、]怖^ル
可^チトナニ而^レ氏若^ニ又醫愈^有及^ク又瞳^孔
ノ闊^開スル者^ニ於^テハ功^{アル}トナニ〇彼^レ

又^タ說^ラ定^ラ曰^ク貫^{角膜方}ハ丈^術簡約容易^ニ
ノ丈^{ヨク}十分^ニ水様液^中ニ溶解^ス可^キ者^ニ於^テ
ハ炎症癰^{甚^タ成^リ}易^ク殊^ニ能^ク輕^ク軟性^流性^ニ

乳樣性膠樣性ホノ翳^ラ適^当ニ亦^タミルガニ人液^ニ

弱^ク囊^ラ翳^ラ假^ラ弱^ワ

ア^ニゲホ^レニ^ニ生^タ弱^ク

多^クハ軟性^ニ

者^{ナリ}

其中^ニ核^ラ舍^ム

此^ノ弱^ク族^子ア^ツ及^ヒ後^ニ

溶解^{シカクシ}

枝^葉ト名^クル處^ノ者^ニ

種^類矣^ニ

此^ノ弱^ク族^子ア^ツ及^ヒ後^ニ

溶解^{シカクシ}

此^ノ弱^ク族^子ア^ツ及^ヒ後^ニ

溶解^{シカクシ}

醫^ニ是^レ水^呑体^ノ再^々上^ルニ固^テ登^スル者ア^リ又囊^ノ功^破セ^ルニ^ヨ

一部^ニ因^テ登^スル者ア^リ粘^液ノ殘^渣ノ登^スル者ア^リ

相^當ス〇彼^レ又^カ患者^ノ寧^貞ヨク方^術

妨^害ラナス^ト有^リ故^ニ十^歳以下^ノ小^兒搐^掣

ニ^ナ有^リ故^ニ十^歳以下^ノ小^兒搐^掣

様、運動ニ癡アル人眼ノ深ク眼窓内ニ在ル者
生盲ノ人及ヒ又眼瞼ノ十分ニ開キ難キ者ニ於
テハ此ノ貫角膜方ヲ施スニ非レハ他術ナシ

白内翳方術論三

剔出法第一

ハニカニセノ一ルト著

論貫透明角膜施術者

○向内翳、剔出法ハ丈世ニ行ハル、丁捨十法
ヨリ遡シトイヘ既已ニアニテールリエス名人
、時ニ發明セルフ予曾テラトセス人詰ニ由テ
此ヲ聞ケリ○キリ一ケニ名地及ヒマテニマ名地ニ
於テハアケニ十人一世ニ至ラ仍テ未タ此方

術アラス是實ニ坐ルニ非ス唯其水様流ノ失亡
ニ由テ害ラ生セニフテ恐テ此ラ療棄セル者ノ
ニ後ナエイテル人名丈庭ノ再ニ輻湊ノ害ヲ為テ
レフヲ保證ナ遂ニ此ラゼニ行ハシム○坐ニ吾
國ニ於テハフレニイタフ人カ著述セシ書ノ説
ニ因レハ古未曾テ他國ヨリ此方ヲ傳來セルノ
ナリ唯此人千六百九十四年ニ始テ白内翳ヲ割
出スルヲテナセリト○丈庭タレ先ツ角膜ヲ截
洞キ而ナ后ニ小刀ヲ用テ更ノ墨翳セル水異体
ヲ外ニ曳出スル也○ゴスレイ畠及ホウス

人兩士共ニ彼ニ次テ外方術ヲキセリ即ナコス
レイハ十六百九十五年ニ於テシホヒウスハ
七百二年ニ於テス○而ルニ其方術再々廢シテ
千七百七年ニストエイース人カ度ラズト登見
ニ見テ以其方術ノ成ス可キヲ証シ大明年又
タベナフ人カ此ニ次テ方術ヲ定メシノ外更ニ
又タヒテ曰ヘル者ナシ
○千七百年ノ中頃ニ至テタヒト心人始テ再々
此剔出方ヲ成シ以テ此方術ノ比类十キトテ世
ニ公ニス鳴呼其名蓋人也人ニ在レ丁如何ソ学

者宜ク思惟マヨ○以ノ人ノ用ヒニ器械又數甚
タ多カリシカ後世ノ諸哲ニ由方大ニ減ベテレ
タリ○又少ク減ナニタ簡易セし處ノ第一ナル
人ハテハエイハ即子唯々丈兩又ノ小及ト
トニニ其レ用フ
坐ヒニ其後又タ種ノノ聰明者アツラ又器械ヲ
增加セル者甚シ多ニ就中ホエイエトハ一種
ノ小刀ト絲シラトラ加ヘテニハト、眼ヲ固持マ
ニカ為ノニ一様ノ頗刀ヲ加工サルトハ一種
ノ小カトオーフスニケルトテ加工ヘシケ
ルハ
クテル等ハ
ニマルト共ニ其形狀ノ一種ナル
フ。是ヒ今時仍用フル處ノ無比ノ器械也
ハロニウエニセルヘカ用ル處ノ口ストウク
墨ハ其角膜上ニ用ラナス。其形ラニ
セト状ナルカ為ノニ彼レ是レラゲラト、ノ詳未
ト名ノ是レ立タル利刀ニリクテレカ用ニ
ト者ヨリ長ナ細ク○其長十ハレイニ又幅最ミ
廣キ處ニ於テ三レノニ其尖端ヲ去ル。六レイ

ラ加ヘハアルトヘールヘリ
ラ加工又丈ワノラルハ加工
ラ加工又丈ワノラルハ加工

ニノ処ヨリ尖端ノ方ニ至ルヲ一レニ半ノ向ラ
同輻ニスルノ外漸次ニ夫カラシナ〇
夫他ハ鈍ニナ刀背ヲ成ニ角形ハ柄ヲ着ク第一番
以刀ラ用テ以テ術テ施サニトスルニ先夫術
以刀ラ用テ以テ術テ施サニトスルニ先夫術
ラ施スノ手ノ三指ヲ以テ此ラ握リ余ノ二指ハ
患眼ノ方ノ顎額上ニ置キ〇夫刀ノ背ヲ上ニ向
テニ直ニ角膜横往ノ稍上ニ持キ未タニ夫眼
静ルラ待テ剛膜ヲ去フ半レイニノ處ヨリ夫尖
端ヲ入レ速ニ正横ニ前室ノ全往テ亘テ相對セ
ル部々ノ同上ニ至リ以テ角膜ヲ截断ノ半規形

トナニ夫創口外ニ向テ垂レ下瞼ニ申テ支ラル
ニ至ル若ニ夫眼カノ為ナニ押ニ寄セラレテ
夫刀既ニ前室内ニ在シ寸ハ宜ク夫動キニ従ヘ
最夫其刀引クノナク此レ水様液ノ溢出ラ防
カニカ為也又夫刀ノ虹彩ニ抵觸セサラニ丁ラ
要ス可シ〇若ニ夫虹彩ニ觸ル、ノアルスハ宜
リ夫術ヲ止メ指ヲ以テ軽ク眼ヲ摩擦シ以テ此
ラ前形ニ復セシム可シ〇若ニ又夫角膜ノ創口
狭クナ術テ施スニ難キノ有ル寸ハ宜ク剪刀若
クノ刀ヲ以テ大ニスヘシ〇夫角膜ヲ截向ク寸

酸弱向ラ前室ニ若ハル、
又タ此レニ及メ瞳孔縮少ヌ、
弱本位ニ止ル者
亦屢々此レ有リ○以テ終リ、
病ニ於テハ眼瞼
ヲ仰ツルニ由ラ偶々善症ヲ得シ、
有リ何ソヤ
其再ニ眼テ同ク寸虹膜間テ弱ノ角膜創口ニ在
ルヲ見ル、
屢々アレハナリ○若シ又弱ノ
移動セタル者又固瞳孔ノ牽症様ナル縮小ニア
テナルスハ宜クキスナトナカニテ入しテ其小口
壺ヲ功リ破レタ要不可ニ○又針ヲ入ル、ヤ又
又マル火ノ水器壺上辺ニ至ルカ為メニ鉤背ノ
及

方ヲ以テ火ラ瞳孔ニ抑ム○此レニ用ニル火ノ
者ハニカルハヘ、ノ針若ク、^ウエニセル、^ゴウ
テ詳未テ最ニ佳トス○又水器壺ヲ功破テ又墨弱
マル水器体ヲ脱离セシムルニ、^ウ軽ク押柞スル
ラ量ニ佳トス又押柞スルマ眼ノ上部剛膜上ニ
於テ前ヨリ後ニ向テ押スルマ眼ノ上部剛膜上ニ
ニ押柞セラレテ水器体向ラ道出セタルドラ得
ス○如其ノ押柞スルシ、硝子液尋常流出し易
ミ道出スル、恐ナシ
○若シ又弱ノ骨性又硬度ヲ以十ニ寸ハ押柞ヨク

又醫ヲナ位置ヲ度セシムルヲ得ス假令ヒ然
テオルニ硝子液於ラハ溢出ス溢出ラ防カント
欲セ宣ノ此方ノ施ス可キニアラス○硬性ノ
醫ラ取除ク適宣ノ方法ラナサニカ為メニハ曾
テタニグキース器械、名以テ此ラ抑ムラ癸
明セリ若ニ此ニ反ナ其醫歎ニナ文体中ニ溶解
シ且ツ丈ノ膜ラ切破スル寸徧様、水液ノ溢出
スルラ見ル寸ハ宣ク温湯ラ以テ水銃法ラ施ス
可ク而ナ其囊亦タ疾ムコラ見ル寸ハタニク臺械
若クハタニクレイヘル器械テ以テ此レ

ラ取リ降クベシ
○ウエニセルハ其眼ノ前室ラカリ開ク後ナ
立キアーストウリイ器械ノ十ノ尖端ラ轉々瞳
孔内ニ挿シ水銀囊前面ニ抵テ以テ此ラカリ
○

少方術) 簡約捷徑十九 固ニレ 徒レ刀槍(シテ)經
驗ニ由テ得ル處ニト金モ而レ其虹彩ノ傷以
ナ易ク因テ歛衡ヲ眼ノ内部ニ發スル、恐ナキ

ニ
ア
ラ
ス

諸外科者流 / 本方 テ 療棄 ナ 遂 ニ 同 ヒ 一 ハ 七 カ 者

○サンタレルリハニ種ノ方術ヲ施セリ又一
種ハ後レ向ラ椅上若クハ机上ニ居テ患者、頸
ラ又胸ニモタレシテ能クシラ固定シ○角
膜ノ上部ヨクラニセト状、而及、刀ヲ貫キ又
刀ノ端ヲ水呉囊、前部ニ届カシテ此ラ力少
ニ○次テ又カラ抜キ軽ク押捺、翳ヲ除ケリ○
往レ此法ヲ施ノ功ヲ得ル、三回遂ニ是ラ捨テ
又方術ヲ改ムル、左ノ如シ
先ツ患者ヲ椅子ニ坐セシメ、又椅、欄檻ヲ高メ
又頭ヲ以シニ繫持シテ以テ補者ノチノ不定ナ
ルニ任ス、ラ避ケ○刀一クスニ一ケル墨穢ラ
以テ又眼ヲ固定シ、上瞼下瞼、向ラ又横径ニ
過オシテ、又墨穢、柄ラ一手ニ取り前頭上ニ抵
テ固持シ○術者患者ノ前ニ居テ又坐ラ患者ヨ
リ高スル刀一足羊一キニ丈長一梅羊ノ「スト
ウリ」墨名リクテル、コトテ取リ○又カラ尋常ノ法
ニテ前室内ニ入レ後ニ向ケテ又水呉囊ヲカリ合
干而ナ又カラ内皆方ニ出シ○而ナ后ニ又柄ノ
端ヲ以テ軽ク眼ヲ押捺シテ又弱ノ外方ニ出
ツルコラ得サル者、又刀ノ端ヲ以テ又創口ラ

ルニ任ス、ラ避ケ○刀一クスニ一ケル墨穢ラ
以テ又眼ヲ固定シ、上瞼下瞼、向ラ又横径ニ
過オシテ、又墨穢、柄ラ一手ニ取り前頭上ニ抵
テ固持シ○術者患者ノ前ニ居テ又坐ラ患者ヨ
リ高スル刀一足羊一キニ丈長一梅羊ノ「スト
ウリ」墨名リクテル、コトテ取リ○又カラ尋常ノ法
ニテ前室内ニ入レ後ニ向ケテ又水呉囊ヲカリ合
干而ナ又カラ内皆方ニ出シ○而ナ后ニ又柄ノ
端ヲ以テ軽ク眼ヲ押捺シテ又弱ノ外方ニ出
ツルコラ得サル者、又刀ノ端ヲ以テ又創口ラ

大ニシハリキリ刀ヲ以テ又水呑体ヲ曳出スヘ
ルハ又囊中ニ包裹セル水呑体ヲ一頓ニ取
リ除クフラナマリ是レ更待各スル後弱ラ防ア
為ナリ且ツ若シ又弱、性硬軟ノ中间ニ在ルす
愈ニ妙方ラ佳トセリ○又用ル處ノ刀ハ彼自ラ
癸明スル處ノ者ニノ(ハ畜)第一板先ツ其刀ヲ水平ニ
弱中ニ刺入レ指ヲ以テ上ヨリ下ニ動カド又軸
ノ間(ヨコ)ラ半轉ニ以テ又囊ラ諸相繫屬スル處ヨリ
高内割ニ弱ト共ニ外ニ曳出ス
○キツソニハ患者ノ高年ナルカ為メニ又角

膜ノ扁平ナルカ若クハ又眼深ク眼窓内ニ在テ
剔出方ノ施ニ難キ軟弱ノ症ニ於テハ一種ノ重
施スル方術ナマリ又術タル尋常ノ挤压針ヲ
以テ剛膜ヨリ貫入ニ又水呑囊ノ前部ヲ功令ケ
針ヲ種ヒノ向方ニ從テ眞体ニ刺シ透シ以テ又
多分碎破シ○因テ水様液自由ニ注入セシナラ
又碎片ノ溶解ラ進ナシム○而ノ若シ仍テ又弱
ラ残在スルラ見ルガニ「エストリル」刀ヲ以テ
又角膜ヲ功用ニ以テ剔出スレラセリ又方次
參ノ如シ

患者ノ坐ラ安定セシムルフ尋常割出方ニ於ク
ルカ如クシ廣幅リーストウリ一アラ取テ以ラ外
皆方ヨリ前室内ニ入レ又其キ入ル處ノ則膜ラ距ル尋常ノコトニ○若シ
前術ニ於テ又水晶囊未タ十分ニ功令セラシナ
心下ラ疑フホ直子ニ又刀、端ヲ轉テ瞳孔内
ニ挿ミ尚ラ此ニ大ニ功令ニ○而ナ又刀ラ引キ
總テ眼球ヲ壓迫スルヲ避ケ○固テ以テ水晶
液自ラ又碎破セル水晶体ノ一二分ト共ニ溢出
スルヲ得ル○其后一個レヘルキテ取
テ創ロヨリ瞳孔ノ側ニ入レ此ラ以テ又晶ノ残出

在セル部介ラ取除キ以テ瞳孔ニ微ニモ障碍ナ
カラシム○此レラ取除ク寸ハレイペルノ釣背
ラ以テ微ニク硝子液方ニ押壓スルニ由テ大ニ
以レラハ刀ハラスフ辱ミヨクマノ○或ハ時ト
ラスノ少ニク又術ノ功ヲ失スルフ有リ而レ
此ノ如キハ甚メ稀ナリ处トス
○アクリムス、ハ捨下法扁ニ著セル彼レノ方法
ラ以テ一種ノ術ナマニ其術キフソニノ如キ
童施方ニ○往レカ此術ヲ聲明スルヤ水晶囊ノ

碎片り浮泳スル者ヲ剔出セルト硬性ノ弱ラ溶
解セシナニカ为テニ前室内ニ移動セシナ以テ
虹彩ラ壅迫、害テナマル者ヲ剔出、奇効ヲ得
シトニ由ル。此法術ハ彼レ就中丈弱ノ核羅^{ロウ}
ニタ硬固ナル者ニ於テ此ラ施セリ○而ナ丈術
ニ二個ノ時限ヲ定ム即ナ丈始ナヘルラドニナ
ラ用テ瞳孔ヲ開ケ全弱ラ前室内ニ出ス丈向珠
レ第一時トシ角膜ヲ開テ弱ヲ除スルニ至ル
ラ第二時トス
丈術ノ始ナヘ用ユル處ノ針ハ其長殆ント一挫

又幅十三分母、一許丈針ノ全体ヲノ眼膜ヲ貫
クニ境ケレ、無クナ強ニカ为ナニ僅微ノ弧
度ヲナシ丈尖ヲ創、如ク十ニ丈弱傷ラ鋭利ニ
ナ切レ可カラニナ其向ラ全長十四分ノ一トス
弟ニ板丈鋭利ナル處ヲ距ルニ従テ漸次ニ太カ
ラニナシテ又水様液ノ溢出ラ防ケニ適ス
○施術ノ前晚、ルラトニナ稀溶水ヲ眼ニ滴
スルラ以テ彼レ自ラ无比ノ方トス是レ又靈験
セル水昇体温ノ前室内ニ出ル後丈瞳孔當ニ自墜
大ニ後ス可ケレハ之若又ノヘルトニナリ溶水

強キニ過クル乎又施術前少時向ニ其ヲ用九寸
ハ此事成リ難シ

○患者ヲ椅上ニ安セシメテ兩刃ノ針ヲ取リ虹
彩後一レイン許ノ處ニ其針ノ扁面ヲ虹彩沿ヘ
テ正横ニ後室内に入レ而后ニ丈刃ヲ後ニ向ケ
テ水星体及ニ其囊ヲ力少ツ
○而ルニ若し其翳硬固ニナカ少ケ難キオハ更
針炎ヲ少シク引テ水星体横径ノ中筋下ニ至ラ
シノ丈扁面ヲ以テ又傍ヲ押壓シ以テ又上邊ヲ
前ニ頬ケテ瞳孔ヨリ前室ニ出セシナ次テ又後
前室ニ

面ヲ全ク前方ニ向シナ終ニ其全体ヲ瞳孔ヨリ
前室ニ來ラシムルニ至ル○此ノ如ク術ヲ施メ
又水星囊丈ノ体ト共ニ出ル寸ハ仍ラ其囊ノ残
摺セシ部分ヲ針炎ニ功破ル又功破ル大ニハ又
散向セル瞳孔ノ大ノ如クナシ以テ後筋ノ各ス
ヲ防ケ○而テ其針ヲ拔テ第二術ヲ施ス又
方左ノ如シ

○患者ヲ机上ニ仰卧セシメテ又頭ヲ稍高クシ
縁ニ一コラ向キ一個ノ小刀細クテ鉤レル者

細クナ鈎レト者ヲ取テ矢口ヲ上下・切リ廣ケ
大矢ノ箭ヲ容易ク出スニ透マシナ○丈創口
ヨリ小刀ハトキテ入レテ又扁面ヲ箭ノ前
部瞳孔ノ中心ニ当ル處ニ至テシナ丈鈎レル次
リテ上ニ向テ箭ニカケシク當ナク以テ外ニ
出ス○殊方ニ放ケルマ害ラナシ易キノ壓迫ラ
ナサス又又箭ヲ出スノロ尋常ノ剔出方ニ放ケ
ルヨリ小刀○若シ丈箭ヲ出スノ間ニ又箭破
碎スル寸ハハナカ若クハレキテ以テ
各々丈碎片ヲ取除ク○若シ丈片々毫タ微ノ
ラ得ルニシル

○アタムスヘトストエイヘス、ト其世ヲ距ル
フ百年ニ過クト金ニ又方術エイヘス、說ニ從
テ此レラ巧ニナマリニ
角膜ヲ貫テ施ス割出方ニ於テ続發スル處、諸
害及ヒ虹彩^形、又維持ヲ失テ祀後スル者ヲ防カ
ニ為メテ彼レ未詳マタ半規形、截開ニ代テ角膜

下部ヲ稍大ニ截向キ又創口ラノ宣ツ水呉休テ。

客易ク出サム

○此レニ同ニル處ノ刀ハベリ翁アニナ又

背ナ滑沢又尖端ヨリ本ニ至ルニ從

テ漸ク之ラ廣大ニス(第一枝)又術ヲ施スマ先ツ

其刀ニ油ヲ塗リ空驗子(第一枝十一面一名)

(第一枝十一面一名)

ラ以テ

上瞼ヲ固定シ指ヲ以テ適宜ク又眼球ヲ内背方

ニ按定シ刀、尖ラ角膜横斜ノ柄上又縫ラ距ル

コ一レイニ許ノ處ヨリ瞳孔ニ向テ貫キ入ル○

又次ノ將ニ虹彩ニ届カニトスル才乍ラ稍々

後口患者ノ後方ニ曲ケテ以テ又ノ尖ラ上ク相對スル
部分ニ向テ微ニク斜メ下方ニ進メ内背方ニ
貫ク又貫キ出ス處ノ處ノ則膜ヲ距ル、度又入
ル、處ノ距度ニ同シカラシム○而メ又刀ヲ又
ラ正直ニ截向ク○又刀ノ漸次ニ大ナリカ為メ
ニヨク又水様液ノ速カニ溢出スルヲ防キ以テ
常ニ半規形ノ截向ニ於テ脣ニ易シ虹彩ノ弛緩
ラ又セシナス
メタルニ至ルト記者ノ記述ニ由テ此ラ知ル
説其

ノ日七十餘夜ヲ療
ト皆奇効ヲ得クリ
レイオニハノコエリニヘホウルテアウリイフ
ノゴエリニヘ名前ヨイニ元弟ナリ和蘭外科医ハニウエイヘ
ノルヘンキーハシエミニトヘホカ光明セル器
械ニト丈眼ヲ固定セニカ为ニ及ニ角膜ヲ穿洞
セニカ为ニ製造合リ又方ラ異ニス即○レイシ
フノコエリニヘガ器械ハタングノ状ラナス○
ボウルデアウクスツノエリニヘカ器械ハ扁
ナル柄ヲ著ク又柄中ニハニルラ備フヌヘル
ハ刀ニ勤ラ共フル者ニ常ニハ一ノズハニ子
ルノ如ク

ルラ以テ歎ラ押ス○又上部詳ニ全輪ヲ著ケテ
レラ以テオノクスヒケルノ如ク角膜ヲ用ム
ニ備ヘ○外面ニラレクテアッ備テ指頭ノ微押
ニミ又カラ運動セシム○コロニニケニトノヘ
ニテリクスハ此器械ヲ少シ改メテ善シ眼毎
ニ度ノ其輪ノ數ト大小異ニサリ
○シニモニトヘノ器械ハコエリニト相符ス唯
其邊フ處ハ角膜ヲ穿ツニ其向方ヲ直ニスル而已
○ハニウエイノ器械ハ又形刺俗ノス子ツヘ

下部ヲ穿洞スルニ道ス
○サハナールヘヨク寶ニ古今、妄說ヲ去テ
ナ考ルニウエニセルヘノアハ宜ク用ヒスニハ
アル一カラオル者ニナ諸症同方ニ用ニシ一
ル、勤キ如キハヨク此ノ柔和ノ方術ニヨク
馮倚スヘキ処ニ於ス○旦ツウエニセルヘカ言
曰ク如是器械何ソヨク脆弱萎弱ノ器即チ眼
於テ容易ク又用ラ成ストテ得ルニト○而レ凡
又タ他ノ処、於テヨク丈夫逞フナ巧手ナリ
セハ又タ能ク次方術ヲ成し得ルミノ有ニト

剔出法第二

論貫以膜施術者

夫レ人ノ才智タル固ヨリ敏顛ニテ諸登見ニ冒
ナリト金ニ而エヌタ時トナハ量ニ大異要事
件ヲミ塵芥ノ如ク考テ謾リニ看破之或ハ僅微
ノ害アルヲテ見ル寸ハ全體ノ可否ニ拘ラスナ
レテ棄置ナ取ニ用ヒナルヲアリ或ハ又狀レニ
爻ノ无用ノ事件モ偶々誤認テ無比ノ登見トシ
強ニ貴堂信用ナ次方済色ヲ成メ誇ルコトア

○今吾輩先哲、卓見、由テ眼界、諸術ヲ知ル
ヲ得ル者、固ヨリ謝マスニハアル可カテサ
ル也。○而ルニ亦タ尚ラ先哲、卓見、淺ルノ處
ノ者無キニ非ス故ニ吾輩今登見ニ奉ヒテ考究
ニ始ト、剔出方、角膜ヲ貫テ施術スルモトラ
論之以テ又誣ラ取ル。○尋常、如ク角膜ヲ穿テ
施ス处、剔出方ニ於テ辱々難忘ラ兼登入ル。ト
アルカ为ニヘル、則膜ヲ穿ラ欲レラ施ス可
キトテ登見セ。其方已ストウク、刀ヲ則膜上
角膜、縁ヲ距ル。十分母之、一ノ火ヨリ虹彩

後一刺し一個、ハリキ（第二板）テ以テ大筋ニ
カケラ曳出ス〇杖レ以爲クガ方ニ由ルヤ虹彩
、鼓傷ト視聴ラ害スル瘢痕（星レ箕角膜方ニ
ワツラ得ルト似レ又曰此方”殊ニ歎美ニ施ナ
希代ノ偉効ラ得タリト〇ロニテニ一、外科医
ナルヨエテルヘカ千八百十一年ニ登明セル一
個、方術ハ殆ニト古件、方術ト支數ラ一ニス
唯夏弱ラ出ス、術少シク差ヘト〇即干支方タ
止持下針ラ以テ剛膜上角膜、縫ラ距ルト一レ
イニ余、处ニ一口ラ向キ〇此創口ヨリ一種、

ノハキキ

(第ニ板)

テ入レテ水呑嚢後又嚢ノ

中心ニ当ル處迄テニ至テシナ○若ニ更ノハ

リキテ前ノ方ニ刺ニ由テ又蜀ノ硬性ナルヲ

知ルヨハ以シテ又翳ニカケ引テ眼膜ノ以テ妨

クル處ノ處ニ至ロ○茲ニ於テ眼球ヲ眞方ニ向

ケラル、寸尋常ノ蜀針ヲ取テ又剛膜ヲ截向ク

○其截向クヤ其始ノ十ヤル創口ヨリ始テ

正ク前額骨ノ外陽ニ向テ斜ナニ眼膜ノ間ニ入

ル○其創口大ニナ又蜀ノ十分ニ通ル可ナシ

リキリ端ヲ以テ固ク以シテ徐テ外ニ出シ

○

又創唇ヲ密ニ合着シノ

眼瞼、闭シム○而シ若

し続聳スル歛衝創ニキオハノトロ引カ

テ以テ角膜ヲ向テ水様液ヲ排泄スル一種ノ方

ニ於ケルノ如ク此ヲ治ス

○イ、ナノ大学士曰才ヘニスライニロカペ

ル人立タ右件、如キ方術ヲ考定ノ唯其差フ处

ハ其截向ク位置ノ異ナル、ミ○従カ此ノ方ノ

施スヘキツテ聳是スルマニ次第ノ事件ニ由テ支

曾テ辛苦セル疑御ヲ脱セシニ

○立歲件ノ児一個、筆刀ヲ手ニ持ツトキ其友

此レラ奪ハニトス強テ此レラ支エニカ為メ
又臂ラ引キ固ラ其ガ端ラ己レ、眼ニ衝入ス○
ロオ一ニスラインロカヘ、人自ラ往ク、此ラ檢索
スルニ則膜ノ下部角膜ラ去ルトニレ、イニ許
ト處ニ莫大ラ六分抄、一許十ル創ニ有テ水様
液溢出シ角膜皺縮セリ○又水晶液ハ又況、向
テ掩、處、布片中ニ在テ水晶液ノ小部創唇、
間ニ挿シ○是ニ於テ尋常外科術ノ法ニ於ケル
如ク待帶セル、猶ラ白内弱ノ施術ヲ受ル人、
如ク十六日向ニ十分全愈スルヲエタリ

○此事件ニ由テ則膜脈膜毛狀韌帶及ニ硝子液
ノ損傷最テ記者ノ常ニ云カ如キ重症ラ祭セサ
ル、テラ知、由テ腎若ニ崎下スル力向スルカ
為メニ甚大若クハ甚硬キスハ則膜ヲ穿テ割
出方ラ施ス可キヲラ聰明セ、彼ニ此方術ヲ貫
後眼室割出方ト名ク○又方術左、如ニ
○カラ尋常椅下方ニ於ケルヨリ稍阜クリ入レヌ
夫ラ側動シテ水晶体前部ニ至ラシナ距離ラ差
ハス正直ニ又麻口ニ引ク量ラ虹彩ヲ毀傷スル
トナク且ツ又動ニ由テ水晶囊キノ破壊マニカ

為ナニ〇而ナ後ニ輕ク上臉ヲ押捺ナ水品体ト
囊トラ外ニ出サシナ若ニ又囊薄クナ剔出方ト
成ニ難キ寸ハ以テ吸収管ノカニ仕マシム
〇口才ヘニステインロオヘル、此方術ヲ名明
スト矣ニ唯白内翳、初茶及ニ貴角膜方、施ニ
難キ者ハ或ハ又翳、ヨリタ硬性トナルカナルニ
過テ功詞及持下共ニ施スフラ得サル者ニ此ラ
施スリニ〇而レド又善ク偉効アルカ為メニ能
ク眼科ヲ研精スル人ラト大ニ以テ注意スルヲ
タ得シナタリ

〇人尚ヲ坊ノ方術ノ成ニ難クリ且ツ功ラ奏セマ
ラニフラ疑ヒコレニ加ルニハトノノ外科医カ
ブニニ、カ歎羨ニ試ニ及ヒ人ニ誠ニテ共ニ施ニ
難キフラ云ト全ニヤルシヘ既ニ十八百一年ニ
屢々此方術ヲ施ナ往効ヲ得申テ以テ他ノ諸方
術ニ十用無ニトセリ〇ヤレレヘカ用ル處ノ器
械ハ其幅四レイニ許ナル一種、ラニセトニナ
文末造宣ノ角形ラニシテニ一横ノダニキナ
ラ副ヘ〇又柄中ニハニキラ入レテラニセトラ
上下ニ動搖レ隨意ニ進退セレムルニ便ス〇此

カラ眼ニ入ル、ヤ則膜膜ラ貫テ深ク虹彩後ニ
至ラシナ星ニ於ラハシキニキテ又ニセトヲ
退ケタニカラ眼内ニ残シ○尚ラ其クニクヲ進
ナテ其扁面ノ瞳孔内ニ見ハル、ニ至ラシナ星
ニ於ラ微シクサレラ退ケ又端ヲ向キ固メ鶴ラ
抑ミ木トヨク又維持メ肩脱、創口ヨク外ニ生
ス

○若ニ又弱ナ外壁カラスナタニケノ壓迫ニ破
碎マラル、寸ハ別ニラニセトヲ副マサルクニ
グラ創ロヨリ入テ又弱ノ片ミラ外出ス○或ハ
レ易カラシム

○テキイシツニ於テクワートリ、ナハ百十五
年ニベル、ハ考説ニ由ラロカーネズライニ
ロカール、カ其方術ヲ登明スルヤ彼レ自ラ
丈偉効ヨリテ知ラサリシトヲ証し自ラ方術ヲ
登明セリ又ノ方丸ノ如シ○又弱ノ抑ムタナニ
用ユル器械ハ剪力ノ如キ一種ノタニグノ又本
ラ窄レニキテ端ヲ向ク可カラシム

○先ツウエンセル、ノカラ以テ剛膜上角膜ヲ
距ルヲニレイン許、処ヨリ虹彩後、武向ニ便
大創ロヨリ以ノタニクラ入レテ又股ノ一方ヲ
水晶体後硝子液前、向リニ挿入ニ他ノ一股ハ
水晶体後毛様体後ニ入レテ瞳孔内ニ見レント
而ナ以テ又晶ラ挿ニ出ス

○従し此方術ニ由テ屢ニ艾効ラ得ルト多シト
虫モ亦タ自ラ以为ク殊ニ良箭、愈着セル者若
クハ數片ニ破碎スルモノニ於テハ「此方」触ス
ル處ニ非ス従レ立タ以为ク破碎スル症ニ於テ

ハ宣ク丈術ラ従タビセスニハアラスト
○論施術無効者、起因○凡ソ方術ラ施ス功ラ
得マル者ハタク合併病ニ申ル者アリ或ハ丈部
ノ異形ニ由ル剔出法ラノ功無カラシムル固ハ
硝子液、溢出虹彩、弛緩性丈眼、小ナ深
ク沈ナル者前眼室、小ナル者及、瞳孔、小ナ
ル者并ニ角膜ニナセル創ロノ愈着ニ難キ者是
シナク

○硝子液、溢出スルヤ眼球、諸筋、痉挛ニ因
ル者アノ弱ラ角膜、創ロヨリ出サレテシカ為

ナ = 押捺スル = 固ル者アリ若ニ又創口過度ニ
小ナル寸ハ其押捺愈ニ強カラサルヲ得サル
カ为ナニ愈ニ硝子液ノ溢ガラノ大ニ容易ナラ
シム况ニ又硝子液ノ漏露性ナルラヤ○或云次
症ニ於テハ宜ク角膜ノ穿孔ラ上部ニナス可ミ
ト○翁ラ先ナニカ為ナニ押捺レ由テ結朶スル
シ尚且ツ脱症ラ続朶スルヲアリ○若ニ又脱症
ラ発マサレハ必斯時ニ往過ニ従テ漸ク視暎ヲ
創唇間ニ間マリテ功迎セラレ又部ニ擦衝ラ登
スル處ノ虹彩ノ祀復展延スル者ハヨク角膜ノ
失ハシムルニ至ル或ハ又更創殆ニト愈着スル
後チニ至テ此ノ虹彩展延ラ発スルヲアリ○凡
ソ施術前ニヘルラトニ十石クハヨシアモス
ラ用ルオハ多ク此因ラ免レシムルヲ得ルト
金ニ立タ全クミナ些ルニアラス
○眼目ノ茎ク小ニノ深ク眼窓中ニ沈ム者ナ
及々眼窓ノ縁ノ茎ク隆起スル者ハ共ニ剔出法
ニ於ケル無功固タリ是レ丈截^用スルヲ難ノ且
ツ弱ラ出サシムルニ押者アリ或ハ又タ種々ノ
他ノ疾病アリ寸方術ノ施スニキシ者アリ○今

支施術元功、因ラ知ル可^ナ、症一一タ拳テ学者
ニ示サントスルニ先ツ椅下方ラ以テ此レラ始
メニ

○若シ墨翁セル水浸体ラ又囊ラ被ルトナク破
トフナク硝子液母ニ押入スルヲ有ル寸ハ此ラ
消散セシムル吸收力甚タ薄若クハ全ク無シ○
曾テ其体一年ラ越テ猶溶解セサル者有ルラ見
タリ○此体若シ細膜ノ内ニ置カル、カハ必ス
多少ノ重症ラ登ニ尚且加之ニ瞳孔経ノ广瘡病
ラ登○若シ此レニ及ナミク水浸体ラ効用、東

又片ニラ前室中ニ出スヲ得ルハ速ニ十分
ノ吸収ヲナシシムルヲ得ル
○椅下法ニ於テ又翁再ニ上テ又一部分若リハ
全痕ノ裏本位ニ復スルヲ有リ○是レ又硝子液
ノ彈力ニ因ル刃若クハ他ノ原因アルニ固ル子
未タ之ニ明記スルヲ得ス而レバ又ノ椅下
セル翁ノ硝子液内ニ上リ入ルヲハ最テ此レナ
キ处ニナ唯、瞳孔底ニ自己ノ量カラ以テ
懸垂スルヲ常ニ此レアリ此症ニ於テハ又翁
ノ維持ナクナ動搖スルカ為メニ歛衝ヲ登ニ次

テ瞳孔、合着ラ起ス此症メウエニセル、カ云
ヘル如ク火候・非レハ治スルヲ得ス○若ニ
又弱硬性ナル時ハ其レヲ破碎セハ此諸症ヲ預
スルヲテ防得ベシ挙テナサ、ルヲ得サレハ

ナリ押挙、言前ニ見ニ

○此症、於テハ椅下法ヲ剔出法

ヨリ優レリトス

○角膜ノ創、常ニ速ニ愈着スル者ナル、偶ニ
又創ロノ久ク愈サルヲ有テ水様液常ニ是ヨリ
溢出ニ因テ虹彩、展延ラ登ニ或ニ又創唇脱症
ニ変スルヲマリ

キ衰スルヲアリ

○偶ニ辛ニ鐵錐痕ノ過多ニ此部ニ渗出スルニ
因テ自ラ愈着スルヲアルミ又合降ニタ厚フナ
瘢痕ラナニ角膜ノ翳トアリテ大ニ視聴ラ妨害

スルニ至ル

○論施術向及又後ノ傍症○凡ソ施術向若クハ
又後ニ登ス諸症ハ挤下法若クハ剥法ノ方術ノ
異ナルニ達テ種々百般ナリ○脇下法ニ於ケル
必有ノ瘡症ハ眼膜ニ徳行セル脈管ノ毀傷ニ因
テ発スル出血ニ若ニ又血結膜ト剛膜ノ向クニ

溢此スルオハ必青班ヲ全ス此班ハ一二口、往

過ニ由テ消散スルヲ得ル〇虹彩ノ毀傷ニ因

テモ亦タ出血スルヲ有リ又血過多一ノ一二日

後仍テ消散セサレ者ハ罕ク角膜ヲ穿ツテ其

溢血ニ去路ヲ失フ可シ〇此ノ出血若し施術中

ニ登スルオハ直キニ排泄スルヲ佳トス

〇針ヲ入ル、ノ深キニ過テ不快ノ症ヲ發スル

ト常ニ量モ多シ加之ニ網膜、穿通ニ用テ里内

筋ヲ登スルヲアリ是レ毛状靭帯、移動及_ビ筋

ヲ挿下スルノ深キニ過ケル者多々”次レ_テ登

セシム

〇割出法ニ於テ眞瞳孔筋、通行ニ壓張セラレ

破裂ノ大ニ弛緩ニ終ニ其ノ彈力失_ク由テ以テ

視カニ妨害ヲナスアリ〇此術後ニ残ル視カ

乏弱是レ光線聚縮ノ適宜ナラサルニ因シ者ニ

ナ〇尚ラ且ツ之ニ加フルニ硝子液前面水呂体

ノ割ナサレシ端處、光線ヲノ散漫セシムルヲ

常度ニ過ケルニ由ル

〇水様液ノ溢出ニ由リ岩リハ他ノ因ニヨリテ

虹彩死後展延_シ金下し或ハ瞳孔ノ卵形テナス

者ニ亦タ剔出法ノ術後ニ全スル一個ノ症也而
レニ癰症ハ硝子液溢出ノ過コトナルヨリ全スレ
ニ非レハ敢ラ重症トセス何トナレハ其水様液
溢出ヨリ全スル者ニ於テハ和ラカナル摩擦ラ
眼上ニナスカ若クハサイスケントロニ人カ方
如ク強キ充輝ニ觸レシムルニ申テ後治スル
ヲ得ヌ故ニ又ナ硝子液溢出ニ因ル者ハ必ス
不治ノ癰症ラ続全ス
○凡ソ挤压法剔出方共ニ相違全スル諸傍症中
於テ最モ第一トス可者ハ焫衛之法症ニ多ク
刺戟衝動ニ由ラ全ス其刺戟衝動ラナス其因種
ニアリ或ハ器械ノ穿入及ニ此ラ眼中ニ止ムル
時間ノ長短ニ由リ或ハ虹彩ノ縁ニナマシ挙捺
ニ由リ因テ以テ虹彩ニ燐衛ラ全ニ其燐衛ノ度
ノ基ニキハ視聴ラ妨害ナ失明スルニ至ラシメ尚且
ツ他ノ内部ノ諸症ラノ消散スルニ至ラシメ尚且
○挤压法及ニ剔出法ノ傷症トセル處ノ後内器
ハ其状ノ様々相差一ルカ故ニ別ニ詳カニ考究
セスンハアラス

○論後内弱○夫し後内弱ハ医家ト患者ト共ニ
希望スル處ノ施術、善効ヲ失クシナ患者ヲト
再々不異ノ人トナスト金ニ全ク失レテ不治ノ
傍忘ニ列ス可キニアラス○此病ハ施術後一二
日ヲ経過ニ更ニ癒スル暈弱ニナ或ハ視聴、一
分ヲ妨ケ或ハ全ク以レテ失セシム又痕水晶体
ヨリ成ルモノアリ又囊ヨリナル者アリ或ハ又ノ
近傍ヲ回繞スル諸部ヨリ成ル者アリ此症多ク
ハ一種ノ内因ヨリ癒ス

○若ニ硬性ノ弱ニ於テ其痕自テ破碎シ若クハ

・レラ功向ニテ又碎片残留セル水呑囊中若ク
・虹彩後ニ止ル寸ノ視聴、一分ヲ妨ケル症ヲ
癒ス此症ニ於テハ又弱瞳孔後、水様液中ニ渦
泳ス或ハ又タ此症拺下セル弱ノ一二日ヲ経テ
後自テ其縁ヲ瞳孔後ニ出タスニ由テ癒スル者
マリ

○若ニ水呑囊ノ一分施術後ニ残リ燐衝ヲ収メ
葡萄膜ト愈着スルオハ全ク視聴ヲ失スル症ヲ後發ス
○此ノ後内弱ハ白色ニ瞳孔後ニ懸シ銀色ノ
徐若リハ点ヲ見ワス○後内弱ノ一種水呑体及

・又囊ラ挤陰セル部分ニ卷スル者ハ煥衝ニ由

ラ渗出スル纖維質ヨリ生スル者ニナ濃ク重厚

トナリ

如ク收縮マル瞳

孔後ニ見ハル或ハ亦タ水晶体及々又囊)又ノ

本位ヲ矢フ後ナ仍ラ墨羽ラ残ス者有リ是し良

病必ス硝子液内ニアル者也或ハ硝子液前ニ進

テ瞳孔ニ近ヘン固ラ以テ視聴ラ妨タルマリ

○或ハ未タ血痕ノ後内弱ナル者アリ膿痕ノ後

内弱ナル者マリ○後内弱ニ於テ全ク内部ノ奈

因共レ無キ者ハ挤下法若クハ剔出法ラ以テ治

スルヲラ得ベシ而レド宜ク其方術ラ速ニセス
ノ吸收力ノ発ニコラ待ツヘシ何ツヤ此弱屢
ニ自ラ吸收シ去ラルノ有レハ也

○論術後ノ治法

夫し兩種ノ方術其差フ然ニ微ニトキニ又治
法ニ於テルヤ宣ク各々可今ノ治ラ論マカルフ
テ得ス

○挤下法ニ於テハ針ラ技ク後速ニ眼瞼ラ闇ス
レラ要トス或人共ニ軋縛帶ラ施スラ往トマリ
但シ眼ニ壓迫ラ(成カ、ラニコラ等ス)又方患者ラ暗室ニ入ヒテ薦中

・半坐セシテ、掌ヲ頭中ニ着ケテ、挙傳シ、従テ体
ヲ舉動スルトテ、禁ス何ソヤ。若し、挙動スルトア
レハ、水温体ノナ再々、上ラシムルトアレハ、
患者若し、眼ナニ歛迫テ、覺フル寸、棉繖絲組子、白
明巻ヲ薔薇水、和スル者、浸メ、此レ覆ク、此
ミカル、入名一方ニ、眼瞼、愈着ヲ防カシ為ニハ、宜ク、四
ニ二三回、其侍帶ヲ改易ス可レ、而レニ又服ヲ向
リ、寸謹テ、光輝ニ觸レサラシム可ク、三四日ヲ
リ、寸謹テ、光輝ニ觸ル、トテ、諱許過クル、非テ、サレハ、敢テ、光輝ニ觸ル、
トテ、諱27勿レ

○剔出法ニ於テハ、速ニ、更創口ヲ愈着セシムル
テ、旁一トス、更創唇下、瞼ニ妨ケテ、合着ニ難
キ者、屡々、其レアノ。若ニ、其症ニ於テ、更治テ急
ル寸ハ、膿漬ノ卒ニ、醜惡ノ、瘢痕ニ、残ニ、患者ノ視
聴ヲ害スル、至ルトアリ。若ニ、更創唇タニ、一分
愈着メ、十分ニ合マサル寸ハ、水様液、常ニ溢出メ
己ニス、創口治シ難キ、至ル
○是故ニ、施術後三日若ク、四日ニ於テ、和テ、カ
ロノ、向ナガラ、保持サル、者及ニ、虹彩ノ創面

= 展延スル者ヲ防リテ得ル〇若し又虹彩創
向ニ展出ニ諸薦効ナクノ入ル、フタ得ルキ
ハ或ニ又展出セル部分ヲ除去メ其形状ヲ変マ
シナ或ニ收縮ナ後ニ腐蝕ス可干創ヲ施ナシラ
治スルヲ得シ而レ氏外腐蝕創ハ燒鍉ノ全ク
去しル者ニアラヤシハ施スヲ得ス若ニ此症
アルニシテ施スヽ必ス大害ヲ及スレハニ
○凡リ諸施術度ニ従容スル燒鍉ニ於テハ大部
ニ緩和、創ヲ外用シ防歛衛創ヲ内服セシムル
ヲ要トス○加之ニ刺浴水蛭ヲ又近傍ニ施シ飲

食ヲ謹マシムル寸ハ莫知殊ニ多シ〇虹彩ノ歛
衛スル者ニ於テニ亦夕又療法同シ而レモ若ニ
又虹彩將ニ近傍ノ部分ト愈着スルカ若ウ^タ瞳
孔縮小セニトスルトキハ一ルウトニ十若ク^タ
ニミスアムスラ用ルテ佳トス由ラ以テ瞳孔ヲ
開キ既ニ召スル愈着ラニ右高セシムルヲ得
ル

論内弱眼鏡
失亡セル水呑体ノ用ヲ補テ其視力ヲ助ケニカ
為ニハ内弱眼鏡ナル者アリシテ先締ヲナガ角

膜ニ入ラニトスル前ニ屈折セシムヲ裹末セシ
ムルノ墨ニ而レド此墨ハ速ニ因レラフ禁ス但
ク貞視力本ニ従テ其復スレ始ナハ速ナシニ度ニ至テハ速リ遲ナ視瞻
一度ノ定止スルラ揆ツ可シ。而ナ若ニ次シラ
用ニナル可ラサルヲ見ル寸ア視カ力強
度ニ従テ此レラ蟹シ共フ可シ

○論諸方術之比較
夫シ詣術、言ラ举示ス、猶ラ又利ラ示スハ同
一般ナル者ニトツ今又何レノ方カヨリ何レ
シ

ノ症ニ清スルヲ明カニマントスルオハ従ノ
方術ヲ比較セサルヲ得ス
○人以為ク術ヲ施スノ位置角膜ニ非レハ必ス
危害多ク且ツ器械ノ穿入ニ由テ常ニ内部ニ嵌
銜ラ登スル者ハ則膜脈膜及ニ虹彩裏面ノ損傷
状症殊ニ視瞻ノ寺ニ由ル者ニト出血ハ内部
管ノ毀傷ニ由ル者ナリト此出血ハ常ニ多ク施行
リル者ナリ○硝子膜及ヒ硝子液ノ毀傷器械ホ通ニ
由テ起サル者常ニ挿下法ノ妨害ラトシ殊
ニ膜齧ニ於テハ又水只囊後部ノ除去スルヲ難

之若ニ莫一介残在スルハ必ス後内翳ヲ生ス
○又タ軟弱ヲ椅下スルハ殊ニ難ニトス此症ニ
以シ少戻スル以テ適當此方ヲ施ス寸ハ長ク刀ヲ
一方トスル處、者ナリ此方ヲ施ス寸ハ長ク刀ヲ
眼内ニ保タサルヲ得サルカ故ニ必ス危害ノ
症ヲ徳登ス若シ椅下ノ功ヲ誤ル寸ハ再施セサル
ヲ得ス術ヲ再施スルハ寔ニ患者ノ忌姪ナ從
く難キ處ナリ

○貫入角膜方ニ由テ登スル害ハ寔ニ稀ニトス而
レ凡全リ其しナキニアラス○骨様晶ニ於テ此
レテ角膜ヨリ培下スルハ則膜ヨリスル者ニ比

スルニ危害多ク且ツ其器械、虹彩ニ壓迫スル
ア為メニ此膜ニ歛衝テ脅ニ易ヒトス加之此法
ニ於テ屢々里内翳ヲ徳登スルハ又是し支固
水晶体ノ網膜ヲ壓迫スルニ在ヒ者ニト就中良
翳ヲ鼻方ニ椅下スル者ニ於テ此ノ登スルハ
マハ必ス其レ網膜ニ觸レサラント云ヘ
ルモノ豈此ノ班ナラスヤ
○角膜ヲ貫テ剔出スル者ハ其害危ニ傷痕ヲ發
スルカ為メニ椅下法ト並一論シ難シトス○何

ソヤ良截詞スル處、創假令如何、巧手テ以テ
之如何ノ善法ヲ得ルニ莫瘢痕ヲ失フトナリ〇
旦ツ種々ノ難症ヲ召スレハナク即水様液、溢
出ニシテ虹彩ヲ伴ニ出テ其レヲ端ニ解レテ
毀傷セムル者是レ殊ニ言ノ傍
疾ラ脅スル者ナリ〇施術後患者者、
謹三十キ举動ニ由ルカ或ハ術者ノ水昇体ヲ生
サニカ為ニ成サレフヲ得マシ押捺ニ由テ硝
子液、溢出スル者是レニ旦ツ此ノ押捺ハ器械
ヲ入ル、者ト同クヨク剝ク煥衛ヲ増ス若ニ
其歛衛ハ屢々ヨク眼内諸部、淤蔓ノ常ニ膿潰ニ

易キ者ニ〇コツチングーナニアンデル、四
ク此方術、ベールヘノ如キ乃習、チラ借ルト
金ミ尚テ施ニ難カラント
〇角膜ノ壞症ニシタノ割出法害中、一ナ
ツウノイレ、曰此症、本病輕易、ニシニ於テ
驚ク可ク速ニ進行シ末ル者ニメ又因ハ角膜頂
中、養液管ヲ截断スルニ在リト。○是故ニテウ
タルハ白内翳ノ割出法、於テミ瞳孔ノ穿開
術ニ於テモ其角膜ノ創口ヲ甚小ニセノ
〇剛膜ヨリスル割出法ハガブニシニ等謂ラク

唯々施スニ難キノミナラス全リ施ス可キノ術
ニアスト○夫レ剛膜ヨクスル下法ニ於テモ
既ニ其脈膜及ヒ毛様挺ノ致損必ス危害ノ徴兆
ヲ召スルヲ貫角膜剔出法家ノ常ニロスル处
ニ況ニマ哉同ニ由テ毀傷マラル、之大ナル
者内ツヤ、出血及ヒ硝子液溢出俱ニヨク寔ニ召
ス

○右件ノ諸論ニ由テ已ニ諸方術各々官ラ知ル
トテ得ルトイヘニ而レキ亦タ其方術各々良病
ニ忘ナ各自ノ利アルヲ検索スルヲ残セリ

○側方摘下法ハ諸種ノ向内弱ニ於ルニミナ施
ス可ニ唯ク骨様弱ト振搖弱ニ於ルハ此トシ禁
ス○此方術ニ於テ屢々實驗ニ知ル處ノ大利ハ
丈弱ニヨク硝子液内ニ溶解スルトテ術ノ剔出
ニ比スルニ施シ易キトニ

○前方摘下法即貫角ハ假令ニ巧チナラサルニ
ヨク此レ施シ得ルト毛様靭帶及ヒ挺ノ毀傷
スルトナキト旦ツ此レカ为ナニ歛衝及ヒ疼痛
ノ甚タウナキラ以テ大利ノ多キヲ固ヨリ論ナ
シ○此方術ニ由テ亦タ水昇体ヲ適宜ニ哉同分

碎ニテノ、碎片ヲ前室ニ曳出シ若レクハ唯其囊
ヲ哉同ノ其他ヲ吸収管ノカニ仕セテ除ニ消
散セムルヲナス

○此法ノ利多キハヨリ誠^験ナ又知ノ倅、較
著ナルカ為ニ此レ定ム

○十八百十四五六年间内弱ノ治療ニ於テ術
ヲ施ス者三百六十四人ニメ又ニ百三十人ハ唯
此、貫膜方ニ由テノミ全治ヲ得タリ

○前方剔劣方ハ其施スニ右件ノ術ノ如リ知覺
無キ角膜ヨリスルト支弱ノ再々發見スルノ元
キラ以テ利多シトス○且ツ此法ハ唯文勘衛ノ
剽キ者者ノ外總テ他ノ諸方ヲ施シ難キ者ニ施
ス可ク或ハ眼目甚^タ運動ニヤスキニ及眼球
若クハ近傍ノ部ノ異形ナリ若ニモ施スヲ得
ル

○硝子液ノ少シク溢出スル者ニ施術ノ功ニ於
テ妨害ラヌト無ク旦ツ辱^ニ其患者ノ元未近
視眼ナルモノニ於テハ却テ視力強フセシム

念フニサルノ変化ニ生レ硝子液ノ水呑ム体位置ニ
進出ナ後眼室内眛隙ヲ充ツルト水呑ム体ノ生ラ
盈ルニ優ルニヨルミナラニ○而ルニ夫翁ラ
挤下スルカ若クハ少碎スル寸ハ水様液ノ能ク
丈部ニ充填スルカ故ニ其后眼室内ニ眛隙ヲナ
スフ剥出法ニ於ケルカ如ク著ニカラス是故ニ
近視眼ニ於テ“剥出法ニ佳ト立遠視眼ニ於テ
ハ挤下法若ク”分碎法ヲ施スラ佳トス
○弱ノ大ナルモノ乎若クハ骨膜ノ若ニ於テハ
丈通行ニ由テ虹彩ヲ麻痺セシナ或ニ破裂セシ

ムルフアレニ則膜ニワスル剥出法ニ於テト此
ト如キ縫痕ヲ登スルトナキカ故ニ諸哲後タ此
方ヲ再与ノ丈利ヲニ其利ヲ保病アリレド未タ
丈經験ノヲキヲ以テ十全功寔ノ確論ナシ

○決定

予今ニ一言テ贅ナ以テ右件ノ諸論ヲ決定セニ
夫山人ノ性クレ合其熟得ナ妙ナトナカ或ニ
習慣セル處ノ者アルスル以ス外レニ偏倚スル
者ニ

○故ニ方術ニ於ケルニ各人ニ十丈已レア取ル

處ノ法ヲ称ナヌ如レニ及スル者ナレハ必ス禁
レラ拒防ス

○而レ斥良諸方術ミナ各々害アリ利アリ宣ク
一病ヲ擇取テ他ノ諸法ヲ棄擲スルノ無カル可
レ○是故ニ眼科ニ研精セント欲人ハ諸方術ニ
十詳ニ覈知スニハアラス何ソヤ若シ他病ト合
併スル者ノカ爾ノ實質大小他ニ異ナル者ア近傍
諸部ノ非常十ニカ若クハ一術ヲ施メ巧テ得ケ
ル才伎此ノ方術施シ難キアレオハ諸方術中
ニ於テ尤用エ可キモノヲ擇セルトア得サレハ
ニテア

ニ○而ルニ予ハ尋常伎是ノ方ヲ取ムトナリ且
ツ十分効寔ナラカル方術ヲ分別ナク諸症ニ施
スフナク唯ニ角膜ヲ貪テ晶粒碎スルノ力若ク
ハ莫外異体ヲナ位置ラ變移セシムレトナク唯
ニ其囊ヲ破截ノ水様液ノ吸收ニ任スル者、
ニテ用ニ就テ後方ハ瘻瘍ヲ発スル更ノ量ニ少
ナク利アルヲ量モ多キカ故ニ殊ニ此ラ選用ス

一允有入者人名也

一允有一者地名也

一有丁者国名也

