

富士川文庫

496.3

Ka

3



F カ-2

496.3

Ka

3

No. 69



富士川文庫

3182

錄附  
穿瞳術集論 目次 終

錄附  
穿瞳術集論

目次

總論

第一術 穿入方

第二術 穿出方

第三術 截離方

第四術 離除方

附  
穿瞳術集論  
錄

(一) 総論

盲眼ノ因其種甚久考ク又方術ノ以テ之ヲ治ス可ラサル者亦少十カラスト矣凡而レ凡瞳孔ノ竊閉ヨリ発スル者ハ尙幸ニ治スヘキノ方術有テ視瞻ヲ復治スルヲラ得ベシ其病タル或ハ焮衝ヨリ発シ或ハ他病因アルヨリ発シ終ニ全ク光線ヲ射入ラ妨ケ患者ラメ視瞻ヲ失ハムタルニ至ル此時ニ至ラ天癸ノ瞳孔既ニ失セリト余先尚ラ人造ノ瞳孔ヲステ之ヲ補ラベシ而メ其

更ニ瞳孔ヲ造ルノ部位及ニ方術共ニ家々各々  
相差フテ未久一定ノ法則アルトナエ故ニ予今  
自内翳ノ方術ニ於ケルカ如シ古今ノ諸方術ヲ  
集論メ爰ニ附錄セントス  
ヘ、凡人ノ説ニヨク鍼ヲ眼内ニ刺メ自内翳ヲ  
除スルノ術ハカレニユス人ノ時未タ真病ノ处在  
ヲ詳ニセスト矣ニ既ニ此アリシニ瞳孔ヲ旁テ  
既ニ失ヘル處ノ視瞻ヲ復治スル術ニ至テハ特  
リ前世未タ曾テ此レアラサラン「矣ニ異ムニ  
堪ヘタリ是レ全ク解剖學ノ未久足ラサルノ致

（人ナリテ明カリト）

セルナルカ將久眼ヲ毀傷スルヲ恐レテヨリ無  
ルカ之ヲ詳ニスルヲ欲セスト矣ニ此方  
術ノ施ス可キフラ始テ発見セルハセルデ<sup>ノ</sup>蓋  
シ此方術ハ必スレモ唯自翳施術後ニ発スル處  
ノ瞳孔縫肉ニ於ケルノミナテス其他瞳々ノ症  
ニ於テ之ヲ施スベシ假令ハ角膜ノ殆ト全ク曇  
翳セルモノ及ニ翳ニ剔出方若クハ全<sup>下</sup>タ方ラ施レ後  
スル假膜ノ瞳孔ヲ陥バメ若グハ全ク之ヲ闕ツ  
ルモノ及ニ翳ニ剔出方若クハ全タ方ラ施レ後  
チ水晶囊ノ虹彩ニ愈着スル者等ニラケルカ如

又々此方術ヲ施メ切ナキ者ハ角膜ノ全ク星翳  
セル者ノ光彩ト角膜ト全ク愈着せんモノ硝子  
様巻及ヒ支膜ニ疫病アルモノ毛状敷帶ニ疫病  
アルモノ真ノ黒内翳ラ甚ル者及ヒ其視瞻ナヲ  
妨ケサレクメ久しう耶、視ニ至ラサル者寺ニ  
瞳孔ヲ穿ツノ術ニ四種ノ方アリ支一ヲ穿入方  
トミア】ト云ヒ其ニラ穿云方トナヒ羅甸名コレ  
其ニラ截離方【羅甸コニニア】トモ云ヒ其四ラ除方ト  
モ云フ【羅甸コレクト

○第一術穿入方

此方ハ唯虹彩ニ截入ルノニメ支膜ノ寔眞ラ  
穿テ取ルトナキ術ニメ即チセルテニ人カ始テ  
穿物スル处ナリ而レ此方術ヲ施ス人  
唯白内翳施行後ニ穿スル处ノ瞳孔端閉ニ於ケ  
ルノニ其之ラ施スニ用フル處ノカハ長ク細フ  
メ且ツ薄シ之ラ尋常ノ持下方ニ於ケルト同  
處(即チ角膜ヲ距ル)ヨリ横ニ眼後室ニ刺シ入レ  
カ尖立室ノ中心ノ部位ニ至ル片横ニ後甲リ前

= 向テ虹彩ヲ截ツキ而メ又刀ヲ又久而ルニ  
此術ニ於テ又穿孔ノ再セ肉着シ易キカ為ニメ  
辱ム又後ラ誤ルノサル<sup>人</sup>各ノ説ノ如レサル<sup>人</sup>  
入<sup>名</sup>ノ説=曰ク假令之ラ眼前室ヨリ施スト無凡  
唯截リ入ルノニメハ必ス再ヒ肉着スル者ニ  
ヤニ<sup>人</sup>各此方術ヲ學ヒ施メヒ久誤限ラナセル  
後テ自ラ偶爾ニ一癖ノ方ラ発明セリ即チ彼し  
白内翳ノ方術ニ於テ誤テ虹彩ラ傷ツク毎ニ其  
創口終ニ愈ヘサル者辱ヒ布テ而モ又創虹彩纖  
維ノ條理ニ從フキハ必ス愈ユルラ見ル此ニ由

テ以爲ラク瞳孔ヲ穿ツニハ亘シク上ヨリ下ニ  
截ルヘクイ横ニ截ルヘカラスト之ラ進者ニ試  
ムルニ立回ニメ終ニ方術ヲ定ム又方先ツ翳ノ  
別出方ニ於ケルカ如クニ角膜ヲ切ク開キ其創  
口ヨリ剪刀<sup>(其一葉ノ夫ラ)</sup>入ヒ其肉着セル瞳孔  
ヲ距ルノ一レインノ處ラ堅ニ截リ開クナリ彼  
レハ此方ニ申テ能効ラ得タリト余氏之ラ學フ  
ノ人ハ同効ラ得シ者ナシ云々<sup>向之譲外傳</sup>  
セ子ノ九地ノマウノイル<sup>人</sup>力発明セル處ノ方  
術ハ解剖術ニ本ツケル即チ彼ノ実驗説ニ從フ

虹彩ハニ種ノ纖維ヨリナル者ニメ一ハ光艺  
状ラ為レ一ハ輪状ラナス而メ又光艺状ノ纖維  
ハ虹彩ノ周圍ニ位シテ中央ニ向ヒ輪状ノ纖維  
ハ其内ニ位メ輪ノ如クニ瞳孔ラ圍繞スルモノ  
ナリ

彼レ次ノ纖維ノ條理ニ從テ先ツ其穿ツヘキ瞳  
孔ハ當ニ如何ナラシメ又穿ツヘキ部位ハ當ニ  
輪纖維ノ中心ナルヘキガ外圍ニ近クサルヘキ  
カ中央ニ近カサルベキラ完ム後シ以為テク纖  
維ノ條理ニ從フノ刺ハ愈病ニ易ク斜刺ハ其筋

ソ处ノ纖維ノ多少ニ從テ其創口ヨリ少相隔クヘ  
ク正横ニ浙ツトキア創縁五ニ寧端ノ又孔大ナ  
ルコラ得ヘシトマウノイハ名曰ク予カ此方術  
ヲ施スア先ツ患者ヲ仰臥セミメテ其頭後ニ居  
リ角膜ノ緣剛膜ヲ距ルノ一レ不ニ許ノ處ラ刺  
メニレインニ許ノ創口ラ造ル(但シ其部位ニ墨  
翳ノ有ト無トニ拘ラズ) 其創口ハ宜ク角膜ノ緣ニ從テ弧形ラナサムベシ  
既ラ既スルニ剔出方ニ於ケルが如ニメ唯甚小  
ナルトモト

而メ後ニ彼レカ用スル處ノ器具ハ剪刀ニ

オニ板  
一喬

其剪刀兩葉ノ長ハ大ハ大極セハレニニメ甚々  
薄ク其又文ニ近ナ處ニ於テ度折ス其度折百四十度  
而ヘ丈一葉之ラ眼前室ニ入レ可キ處ノモノハ

其端ヲ微少球状ニナシ化ノ一葉虹彩ヲ刺メ眼  
後室ニ入レ可キ處ノ者ハ其尖ラ最モ銳ニシキ  
其端一レイニノ四歩ニ許用ニ及ラ備工具全長  
ヲ他ノ一葉ヨリ微短フス

具施用用ハ此剪刀ヲ取テ前ニナセル處ノ角膜  
ノ創口ヨリ入レ其尖端ヲ新久ニ瞳孔ラ旁ツ可  
キ部位ニ至ラシム其入ル、ア亘シク剪刀ノ扁

面角膜ト虹彩トノ間ニ正直ニハサマル可アラ  
シメ直チニ丈端ヲ微シク用テ先レル端ヲ虹彩  
ニ刺シ貫キ剪ミ截テ適宜クス其用ニ思想ラ  
シテ達隙スルナカルベレ

○此方術ハ実ニ簡約ニメ施スニ容易ク且ツ角  
膜ノ創ヒ小ナルカ為ニ眼瞼ノ達即ニ由テ創唇  
ノ離人ノ患ナク内翳ノ剔出方ニ於テミベタ見  
ルカ如キ害一モ此レアルヲナシ加之上ラ其利  
ヨキノ美ニ裝置ヲ要セサルト術後直ニ眼ノ  
運動ラ許メ可ナルトナリ唯患者ラメ施術後ニ

三四日先輝過度ナラサル室中ニ居ラシムルヲ  
口テ足レリトスルノニ此時日ラ経ル後ハ大陽  
ノ光輝ニ觸ルト凡售ナク水様液触ク聚ラ故ニ  
復ス「マウノイル」人此方術ラ數人ニ施メ皆大ニ  
功ラ得タリ「カルバ」各曾テ「マウノイル」人ニ書  
ヲ報メ又法術ノ美ラ賞譽レ且ツ曰ク此ニ「ウエ  
ニセル」名ノ方術ラ合セハ益々可ナラニト即チ  
其意ニ以爲ク先ツ「エニセル」各ノ方術ノ如ク始  
メニ角膜ラサストテ其刀ヲ以テ共ニ虹彩ラ横  
ニ切リ次ニ剪刀兩端おノ端共ニ微小ラ眼前室ニ入レ  
球状ラナスマノ

テ虹彩ラ前ノ創口ヨリ豎ニ剪ミ以テ三角形ノ  
瞳孔タラシムベレヌタ以爲ク角膜ノ創口ハ亘  
ク外眞方ニ偏ス可ク虹彩ノ穿口ハ内眞方ニ偏  
スヘレトアタムム食ノ方術ハセハルテ人有ニ  
ニ本ツク処ノ者ニ入其用フル処ノ刀細クメ薄  
ク其長短ニト一寸ノ四歩三許其幅ハ半レイン  
許ニメ本末狭廣ナク一側ニ及アツテ其尖端長  
カラス微凹形ナス四國此カノ及ヲ後ニ按  
患者ノ後ナリ向ケテ剛膜ヨリ刺レ其位ハ白内翳ノ精下方ニ於ケルト同フス  
其諸膜ラ貫キ入ル片直チニ後ヨリ前ニ向テ虹

彩え縁ニ近キ部ラ刺貫テ刀失ラ眼前室ニ出  
ニ次ニ刀柄ヲ已ノ方ニ倚セルナクメ尖端ノ刃  
ヲ以テ虹彩ノ全横径ヲ截断ス其截断スルヤ輕  
ク壁メ纖維ノ一々ラ断ル内如クスルヲモ要ス  
如クニメ截断シ終ル所モニ尚ラま々十分十ラ  
サルヲラ見ル所ハ復々刀尖ヲ前ニ向テ前ノ  
如クニ之ヲ截ル是ノ時其創唇自ラ纖維ノ繩力  
ニ由テ相離肩スニシ白内翳ヲ兼スルヲラ見ル  
キハ其刀ヲ以テ直ニ水晶襄ヲ分截ミ一ニノ碎  
片ヲ眼前室ニ出バシテ其余ハ其本位ニ残ス然

ル所ハ自ラ新造ノ瞳孔ニハサマツテ轡ノ如クヨリ  
其用着ラ防ク  
此施術尙少許ノ血溢出メ水様液ヲ溷濁ニスト  
金矢後テ衝ク崩散シ尽メ透亮トナリ新造ノ瞳  
孔横径ノ精凹トナツテ明カニ見ハニハ光線ノ  
射入自在ナルヲラ得ルニ至ル  
角膜ノ瞳孔セル症ニ於テハ其瞳孔角膜ノ中心  
ヲ距ルヲ三分ノ一ニ過ル所ハカ处及剛膜ヲ縫  
ニ近ク虹彩ヲ穿チ毎ニ水晶体ト其襄トヲ截テ  
之ヲ其孔ニ挿ム若ニ又其瞳孔甚フメ残ル處僅

ニ一レインニ過キサル片ハ外眞ノ方ノ上部  
リ前ノ如クニメカラ入レ(是レ術ナニ水様辰ノ角  
膜ノ透明上部ニ對スルラ防アニ為ナリ)  
開クラングニベクノク人以脅ク殊ニ虹彩ノ強  
ク牽張スル症ニ於テハ角膜ヲ刺メ之ヲ施サバ  
アタクス人ノ方術ヨリ施スニ皆易カラニト由  
テ一種ノ小刀ヲ製ス(セ国) 其夫端ニハレイニ  
若クハニ三ヒイニ開ニ其幅ラ半ー生シトミー  
側ラ又ニニ其尖ラテンセット状ニメ甚々銃利ニ  
シ余ハミナ翳鍼ト同フス之ラ角膜ヨリ眼前室

=刺ニ入几ヤ内翳ノ剔出方ニ於ケルカ  
又ラ下ニシ背ラ上ニメ入レ其尖端眼前室内ノ  
相對スル一方ニ届ク件又ラ虹彩ニ向ケ柄ヲ起  
メ抜キ十カラ虹彩ラ内眞方ヨリ外眞方ニ截リ  
開ク但ニ其截開クヰハ少ニモ壓迫ナカラニ  
ニ截リ離ルトアリ此事アタムマノ方術ニ於  
テハ後ヨリ前ニ截ル件其牽張ノ度ラ失フルニ  
由テ常ニ屢々此マリ而レニ其眼前室甚久小ニ  
メ虹彩張セスル者ニ於テハ角膜ヲ傷ヘトナク

此刀ヲ前眼室ヨリ刺し入ルベレ (梅ニ之ヲ角膜ニ  
ベク者ノ按ニメ述者) 此方術ヲ施スフ三四ニ人其ニ回  
ノ諸ニアラス

以下ハ唯テニケニ

ノ者ハ瞳孔全ク閉着メシモ痕ナキ者ナリニ  
ニ之ヲ施メ兩十カラ共ニ切ラ得ス故ニオ一回  
ノモノニ於テハ復タビ真角膜ノ創口ヨリ小鈎  
ラ入テ閉着セントスルラ勿離ニカニ回ノモノ  
ニ於テハ復タビ截離方ヲ施セントナリ

(○オニ術穿出方

此方術ハ虹彩ラ截奪ツテ而人後ニ其寢質ノ一  
分部ヲ除去スル者ナリ

「セルデニ」各ノ法ニ從テ穿入方ヲ施スニ誤治也  
久須クメ願フ处ノ功ノ得難キヨリ人皆確々ノ  
工夫ラナシテ其新造ノ瞳孔久シク保ツ可キフ  
ラ考ヘ白内翳ニ於ケルカ如ク或ハ剛膜ヨツヒ  
ラ施シ或ハ角膜ヨリ施シ或ハ種々人方術ヨリ  
各々一家ノ法ラ主テ此ヲ試験スル者甚々多シ  
クニエリ人名此方術ニ於テ治ラ誤ル者甚々多シ  
ク且ツ以名ラク若クハ白内翳ラ眞人フアルニ  
アラズニバ眞水見裏及ヒ水見体ラ致傷スルノ  
害少カラサテニト由テ先ワ角膜ラ截開テ其創

ヨヨリ穿瞳ノ器ヲ入レニテラ考ニ尚且ツ以為  
テク然カサルキハ出血スルアルモ其血排泄  
シ易ク器具ノ動作甚々容易クメ十生歟ニナスキハ瞳  
ラナスニ便ナラニト但ニ十字歎ニナスキハ瞳  
孔殆ト円形ラ得ル者ナリ  
ウエンセル人ノ亦クエリニ人ト同クセ、ルデ  
ニ入ノ方術ニ由テ脣ラ誤ルノク且ツ凡テ創  
唇ノ相因着セントスルハ是レ自古ノ常態ナハ  
フラ考ヒテ以テラク虹彩ノ一分ラ降キ去ルニ  
アラサレハ此レラ禦キ難カラニト由テ之ラ患

者ニ試ム人ニ其効ラ得ル者多ニ丈方術左ノ如  
シ先ツ刺角膜刀ヲ以テ横ニ角膜ヲ刺メ眼前室  
ニ入ルノ内翳ノ剔出方ニ於ケルカ如クニ其力  
尖ノ瞳孔ノ部位ニ近近スルノ半レインニ許十八  
片カラ持スル處ノ午ヲ起シナカニ其動ラ以テ  
虹彩ラ刺ニ貧キ半レイン次ニ之ニ及スルハ  
動ラ以テカ失ラ眼室ニ見ハレニスル片ハ其余  
ヲ截ルノ一レインノ四分三許而メ後ニ角膜入  
斯全ヲ截リ開テ對スル處ニ至ラニ此ニ由テ  
其角膜ノ未タ牛ハラ断サルトキ虹彩既ニ穿孔

ヲ得ル此ニ至ル迄テラカ一術ト名久  
第ニ術ニ於テハ細キ剪刀ヲ角膜ノ創口ヨリ入  
レ之ヲ以テ虹彩創口人丙唇ヲ剪ミ取ル若シ其  
鐵維連ニ牽縫メ創縫ニ互ニ相離ルノフ有レハ  
ナナルモ引ラ入レ或云メ之ヲ截ル此穿孔久其  
負実ノ一部ヲ失フカ故ニ再ヒ肉着スルヲナク又ヨ  
ク先衆ヲ射入ラ縦ニス  
テモウルス人ハ角膜ノ疊齶スルヲ甚シキ者ト  
金氏尚ラ僅ニ残ル處アツテ其部全ク愈着不<sup>ト</sup>  
ニ非レハ尚ラ僅瞳ノ施スヘキコラ謹ス即チ其

書ニ曰「サウハゲス人君嘗テ二十二歳ノ時創ニ  
キ眼焮衝ラ患ヒ辱々再発メ角膜ニ膿腫ヲ発ニ  
其腫瘍ヨリ水様液ノ溢泄セルモノ數回卒ニ丙  
眼共ニ角膜全ク疊齶シ唯左眼ニ於テハ其殘ル  
处僅カニ五分ノ一許有テ虹彩全ク角膜ノ裏面  
ニ固着シ毫モ水様液ノ留マル位置ナク下ノ論ニ合マ  
ス暫ラク原文ニ從テ  
疑ラ存ス  
此レカ為ニ全ク盲トナルモノ四年予以為ラク  
右眼ハ既スヘカラズト金氏右眼ハ尚ラ其上部  
ノ外眞方ニ於テ瞳孔ヲ旁タバ幸ニ見ルヲ得

ニト是ニ北テ剛膜ニ近キ部位ニ北テ醫刀ヲ角  
膜ト虹彩トニ刺ニ但ヒ虹彩，創口ハ角膜ノ創口  
痕ノ售ラナサニラ恐レテナリ  
次ニ其創口ヨリ直ニメ細キ剪ラ入レ其一葉ハ  
翁孺子様浪中マテ至ラミメ一葉ハ虹彩ト角膜  
裏面トノ間ニ抑但シ互ニ相雜レテ  
固着セサル處ニハサムニタ剪ニ  
截テ其虹彩一小部分ラ降キ去リ以テ視瞻ヲ得  
セミウルニ至レリト

其面ラ見ルニ此ノ新造ノ瞳孔橋田ニメ恰モ猶  
ノ瞳ノ如ク唯其横径ナルラ異ナリトスルノミ

又テモウルスノ言ニ曰ク北小孔矣ニ眼ノ視点  
(原名ケレフト)外ニ在リト雀氏患者ニ致ニ習慣又  
全ク刪ラ得ルニ至レリト  
セセルテニ各ノ方術人唯先天ノ瞳孔縮肉ト虹  
彩纖維ノ牽張程度ナル者ニノミ施スヘクメ水  
旦体及ニ其囊毛状勒帶ノ毀傷庭クヘカラサハ  
カ為ニヘルヤニ各力角膜ニ大孔ラ造テ虹  
彩纖維ノ條理ニ從ニ穿ソノ方術ラ修正ニ更ニ  
一法ラ立直ニメ細ク銳尖ナル小刀ラ上ヨリ下  
水向ケテ角膜ト虹彩トニ刺ニ入レ以テ残ク寧

張マル虹彩繖維ヲ横ニ断ツ故ニ虹彩ノ創口ハ  
角膜ノ創口ヨリ微ニ卑キフ得人彼「是術ニ  
申テ功ヲ得ル者甚多ニト尙凡諸症ニ通又皆  
適当スル者ニ非ス既ニ虹彩ノ角膜裏面ニ愈着  
スル者ニ於テ為リ何トナハ諸症ニ処ラ必ス  
ヒモ皆常ニ牽張スル者ハアラサレハナリ彼レ  
此ノ術ヲ緯々ノ症ニ施メ直ニ瞳孔ノ閉着スル  
モノアルヲ見ルカ故ニウエニセル入ノ方術前  
玉ツニ従テ之ヲ試ムレニ亦タ其利ノサナキラ  
見ル是ニ於テ以為ラク虹彩ノ一部ヲ奪キ出ス

ルニハ亘ク小鉤用フ可キニト之ヲ患者ニ施ス  
ニ其効最モ大ナリ

其術ヲ施スヤ先ツ角膜ヲ截ヘ剔出方ニ於ケ  
ルカ如クニ次ニ小鉤ヲ其創向ニ入レ虹彩ノ一  
处瞳孔ノ本位ニ最モ近キ部分ヲ鉤ケテ之ヲ外  
ニ曳出シ外ニレル人剪力ヲ以テ之ヲ截リ除ク  
彼レ自ラ曰此方術ニ於テハ出血スル「甚少  
ナガトキフ」ノ各内翳ノ剔出方ニ於テ虹彩ノ  
外ニ脱垂乞易キト此ヲ細キ剪力ヲ以テ截リ除  
ケテノ難カラサルト見テ弁瞳術モ此法ニ由テ

施スヘキラ考ヘテ方術ヲ立ツル」左ノ如シ先  
ツ眼瞼ヲ併持固定スル」内翳ノ剔去方に於ケ  
ルカ如ク之次ニ廣幅ノ翳刀ヲ取テ角膜ニ<sub>距</sub><sub>膜</sub>  
<sub>レ</sub><sub>イ</sub><sub>ト</sub><sub>ニ</sub>三イレニ許ノ孔ヲ効テ眼ヲ壓迫スル事  
併<sub>スルノ</sub>眼<sub>ヲ</sub>持<sub>ミ</sub>走ク皆之ヲ云テ徐力ニ支カラ抜  
ク此時水様脣自ラ溢泄メ虹彩創肉ニ進<sub>ミ</sub>之ヲ  
闇ツ是ニ於テ示指ト中指トヲ以テ輕ク眼珠ノ  
上部内方壓迫<sub>ス</sub>シハ虹彩此レカ為メニ漸ク張  
出メ其創外ニ牛ツル「大ナル」<sub>ス</sub>ベルアエノ<sub>ロ</sub>  
詳<sub>未</sub>ノ大ニ至ル其時細キ曲剪刀ヲ取テ挺<sub>ム</sub>セん

部分ヲ截リ除キ壓迫ヲ止メ虹彩ヲ其本位ニ歸  
テシムレハ殆ト凹形ノ瞳孔ヲ得ル其施術ノ時  
虹彩及ヒ其近傍ノ部分異常ヤルニアラサレハ  
其穿孔必ス併續スト云フ「ミユテル人穿瞳術」  
於テ水見体及ヒ其囊ノ毀傷ラ禦カニカ為メニ  
虹彩ノ外圍ニ近キ處ニ穿タニ「ラ歎ス何トナ  
ヒハ眼後室ハ微令ヒ小ナルモ必ス周圍ニ於テ  
ハ弱滴ク且ツ虹彩ノ外圍ニ近キ部ハ肉着スル  
力弱<sub>ク</sub>レハナリ尚且ツ其角膜ノ中央疊翳ニ  
テ瞳孔ヲ本位ニ穿ナ<sub>ミ</sub>キモノモ於テハ此方最

モ適当ス其施ス其方術左ノ如レ

鴨ク角膜横往並端合際ノ處ニ於テ剛膜那部ニ

刺ス其特術者ニ要ア彩ソ縁ヲモ状勒帶ト

截リ分ツ如クナラシフヲ要ス旦ツ其鍼ノ水見

休ニ至ラサルヘキ様ニ意ラ用フズ而メ後ニ  
△一尖ハ醫鍼ノ如薄ク且フ銃ナラシノ

具鍼ヲ抜キ細キ剪刀ハ一尖ラ鈍ニメ凹形十ラ

ミヌ彈子ヲ以テ兩葉ノ間ナサニメ其周度四  
レイニ過クルフナク且ツ兩葉ラメ相平行セ

ニム此剪刀ラ用フルヤ其鈍尖ヲ以テハ角膜

= 刺入ル申テ虹彩ラ兩葉ノ間ニ挿ミナカラ瞳

孔ノ縁ニ至ラニメ兩尖ラ微モク下ケ示指ラ以

テ押テ之ラ合ニ以テ虹彩ノ全幅ラ断ツズノ孔  
ノ縁ト云ヒ又虹彩ノ全幅ト云片ハ是レ瞳孔  
全ク閉着セル者ニ非ス之ニ由テ是ラミレハ此

施ハ唯角膜中大星翳セんモノニ

其兩葉眞子ノ為ニ開ク時再ヒ尖端ラ上ニ向ケ  
テ又タ之ヲ断ツ以レニ申テ虹彩ノ一部三角形  
人切毛トナル者ハ剪刀ヲ抜キ直チニ小釣ラ入

レ之ヲ曳玉ス

北方術ニ於テハ其剪刀ヲ抜クニ至ルマテ水様  
液溢泄セス故ニ眼内ノ諸部位置ラ乱タサスメ

醫具ノ効用亦久容易ニ又々其創口ハ假令ヒ虹  
彩ノ切毛ラ出スカ為ニナ分ニ廣潤ラ得ルト角  
丸ニレイニニ過キス旦ツヨシク其角膜ラ刺シ貫  
クキ及ニ剪刀ノ開闔ニ意ラ用フ人キハ創口正  
クメ其唇亂レヌ角膜ノ縁ヨリ前僅カニ一レイ  
ニニ過キサルズレ是故ニ假令ヒ瘢痕ラ残スモ  
著シキニ至ラス  
其水見休既ニ方術ニ由テ除去マル者ニ於テ且  
ソ其角膜ニ墨翳スル處ナキ時ハ其瞳孔ラ本位  
ニ空ツナ佳トセリ

其術タル幅ニレインノ小刀ヲ以テ角膜合隆ラ  
距ルト一レインシ許槽中径ヨリ土ニ徧スルフ一  
レイニノ处ヨリ角膜ヲ刺シ其尖ラ虹彩全幅三  
分一ノ處ニ貫キ其尖ラ以テ虹彩ノ裏面ヨリ前  
面ニ向テ復タヒ截肉ノフニレイン其尖ノ前面  
ニ見ルノ片直ニ再ヒ其部ヨリ之ラ虹彩ニ刺シ  
カラ引ナカラ截テ前處ニ帰レハ虹彩ノ一部自  
ラ横歎ノ切毛トナルカラ抜ギ剪刀ヲ以テ此切  
毛ヲ除キ去ルモシ水樣体未タ除去セナル者ニ  
於テ此方術ラ施サニトスル件水樣休ノ既ニ墨

窮セハラ見ルノ有レハ共ニ水足裏ラ刺メ水様  
液ラ渗入セシメ日ラ經テ后テ時宜ニ從テ其水  
具休ラ除去スルノ方術ラ施ヌモレ又タ虹彩水  
具囊ニ愈着メ奔瞳術人施ニ難キフアムリハ教  
々鍼ラ虹彩ト水足裏トニ刺メ之ラ小片ニ截分  
チオキ後チ再ヒ術ラ施メ其小片ラ除去シ而  
メ后ニ瞳孔ニ適宜ノ大ラ得セシム  
チニセシケニ地ニ於テ一女兒數九歳痘瘡ニ由  
テ其角膜全ク疊窮ス此ラメ視瞻ラ得セシメニ  
為メ先ツ獸美ニ於テ眼ノ剛膜ニ瞳孔ラ造リ視

ルノ得ヘキヤ否ヤラ試ミシ人アリ即チ猫眼  
五個ニ施メ二個ハ其孔傍失し余ハ皆全径一  
イニ許ノ凸起セルハ黒点トナリ唯明暗ラ分ツ  
ノミナラス遠距セん者呂ラモニスルフラ得タ  
リト云フアウテリテ人此試驗ラ又テ一書ヲ  
著セリ或人云フ此瞳孔ラ造クルニハ宜シク三  
角形ニ截テ其隅角ラ剪刀ニテ除キ去リ其全ノ  
膜モ同ク截肉テ光線ラ直ニ硝子様限ニ入ラシ  
ベレト

七術ハ虹彩外圍ノ一部ヲ翦鍼ラバテモ状敷帶  
ヲ截リ離ツノミニメ毫モ其寢膚ヲ除去スルヲ  
無キ方ニ以方ラ始テ癡明スルハシカルパ入ス  
タミツトノ兩名家ニメ兩家各々其先ナルヲ  
拿フ蓋レ此方術ノ利多キハ時宜キニ從テ剛  
膜ヨリモ施スヘク亦タ角膜ヨリモ施スヘキナ  
リ

カ人ノスクニツイノ兩家共ニ解剖術ニ於  
テ虹彩ト毛状敷帶トノ繫着ノ甚又脆弱ニメ僅  
微ノカニモ離浙ニ易キラ見テ以乃ラク穿瞳術

於テ既繫着ヲ截リ離タバ施スニ容易カラ  
ニト由テ之ヲ寢膚ニ徹スルニ亦却アルヲ見ル  
其方術左ノ如レ

患者ノ坐ハ内翳ノ方術ニ於ケルカ如クニ次ニ  
翳鍼ヲ以テ剛膜ヲ刺ス其部色ハ外背方ニ於テ  
角膜ヲ距ルニシイニノ处ナツ而メ其鍼尖ヲ  
微ク前ニ偏クメ虹彩裏面ト水旦休前面ノ間及  
帶ニ近近スル處ノ处ヨリ貫テ鍼尖ヲ眼前室ニ  
見レシム是時其鍼尖ノ出ルカ處及女ナカテ

ニコラ要不是レ角膜裏面ラ損傷セサラニカ為  
大ニ而メ后ニ其鍼尖ヲ以テ上ヨリ下ニ向ニ内  
背方ヨリ外背方ニ向テ排メ虹彩縁ヲ毛状執帶  
ト離折セシメ其離折遍宣ヲ得ル片鍼尖ヲ創向  
ノ下端ニ下ゲ虹彩ヲ顎額方ニ曳テ以テ好處ノ  
大ラ得セエメ而メ后ニ鍼ラ抜ク其術中出血甚  
タ少ナク其始メ硝水様辰ヲ濁スト雀尾瘻ク吸  
收セラレテ再ヒ透亮ナルトヲ得ルヘルノ各ノ入  
鍼ヲ以テ將ニ瞳孔ヲ穿タニトスル部位ニ相反  
對スル方ヨリ角膜ニ刺ミ横ニ眼瞼前室ヲ貫テモ

状執帶ノ外ニ至リ以テ虹彩ヲ離折シ入ルノ片  
ハ同ニ向方ニテ少シク其鍼ヲ引キ如其スルノ  
數次ニ人其術ヲ終ルニ至ル  
テニケニベク人及ヒレインシゲル人ノ三家此  
刺角膜截離方ヲ大ニ変革マリテニケニベク各  
刺角膜截離方ヲ大ニ変革マリテニケニベク各  
ケナカラサルトヲ実驗セルヨリ宜ク穿瞳術ハ  
刺角膜翳鍼ヲ以テ之ヲ施セリ但レ其鍼ノ钩リ  
ハヨク虹彩ヲ刺スト之ヲ毛状執帶ヨリ離スト  
ニ便ナラニム而メ此ラ角膜ニ刺スヤ外背方ヨ

リニ鉤背ヲ角膜ニ向ケテ虹彩ノ毀傷ヲ禦キ其  
尖端ノ眼前室ニ入ルヤ否ア鍼ノ向方ヲ轉メ其  
持ツ處ノ子ノ丸ヲ内翳ノ剔出方ニ於ケルカ始  
クニ又テ其鍼ヲ進メテ尖端ヲ虹彩ノ一方ニ至  
テニメ刺メ之ヲ毛状靱帶ト離折ス  
「ニゲシノ入又々此也ニホテモ剛膜ヲ刺メ  
施ス者ニ抗ケルカ如ク新造ノ瞳孔屢々縮小ス  
ルヲアルヲ実験メ以為ク適当スルト適當セサ  
ルトノ症アリト且ツ水漫体ノ既ニ曇翳セんモノ  
ハ於テハモ様挺亦久光線ノ射入ラ妨クル」

有ルラ実験ニ死屍ニ於テ一輝ノ試験ラナマリ  
即チ翳鍼ヲ以テ先ツ角膜ニ創口ヲ造リ「トル  
各人ノトヤ鉤ヲ入レテ虹彩ニ鉤ケ毛状靱帶ヨリ引  
キ離ツニ其功当ニ准ナハヘキラ見ル由テ之ヲ  
患者ニ施スニ亦タ大ニ功アリ後ニ麥草入方術  
ヲ定ムハト左ノ如レ  
先ツ神者ラニケリツ入ノテトケニホウテル  
緒糸ニ定候子ノ属ス按スラニテ上験ラ保固セシ  
メ翳刀ヲ角膜ニ刺メ小鉤<sup>六箇ニ及</sup>板ヲ入ル可キ通  
宜大ノ創口ヲ造ル真創口ハ特ノ亘<sup>亘</sup>キニ下<sup>下</sup>可<sup>可</sup>キ通

或ハ側也而メ其小鈎ヲ持ツフ 齋鍼ヲ取カ如  
クレシ鈎ノ尖ヲ下ニ向ケ円欣ナル鈎背ヲ上ニ  
シ円端ヲ瞳孔ニ向ケテ角膜ノ創口抑ニ眼前室  
ニ入ル片直ニ斜メニ前ニ向ケテ之ヲ進ムルノ  
恰モ角膜ヲ虹彩ヨリ遠ケニメテ眼前室ヲ潤ク  
ラミケルカ如クニ其端ノ虹彩外縁ニ届クヤ  
否柄ヲ挽テ其尖ヲ虹彩ノ縁ニ当ラシメ柄ヲ已  
ヒ人方ニ向ケル意ニテ強ク虹彩彩ニ鑽入セレシメ  
微ニ曳テ其鈎ノコノ固キヤ否ヤヲ試ミ而メ后  
ナ指ヲ頬ニ当テ之ヲキノ支柱柱トナシ意ヲ用

ヒテ徐々ニ曳キ去セハ從テ玲瓏タル黒色ノ瞳  
孔ヲ生ス而人其虹彩ノ鈎尖ニ鈎レル部ハ之ヲ  
角膜ノ創尙ニ抑ミ達ラ用ヒテ其鈎ヲ去リ其形  
恰モ虹彩脱空ノ症ニ於ケルカ如クナラミム由  
テ固ク角膜ニ愈着メ厚ニ復スルコトナレ  
フニゲンヘク人千八百十七年中此方ニ申テ弊  
瞳術ヲ施ス凡三十人皆ヨク全功ヲ収ムト矣夫  
自ラ云フ其小鈎ニ鈎ル處人虹彩纖維ノ條理ニ  
従テ破レ易ク且ツヨク熟練セルノ事ニ非レハ  
之ヲ度出ス片弛離ニ易シト申テ又久一種ノ畧

ヲ発明ス此器ハ角膜ノ創口ヲ大ニスルヲ要  
セス虹彩ヲ破綻セモハルノ患ニ少ナク之ヲ外  
ニ曳出スモ前ノ如ク難カラヌ  
其器ハ一個ノ銀管ニメ其面外ヲ粗糙ニミ其中  
ニ小鈎ノ柄ヲ含ミ其端ノ細キ處ニ金ノ細管ヲ  
捲ク其細管ノ端ハ鈎ノ腹ニ合久可ク側面ヲ以  
テ鈎ノ失ト密合ス可クナガシム(星虹彩ノ孔離)  
第ニ及三枚又久其小鈎ノ柄ニ銅ノユノビ(セサラニカタメ)  
ス  
即ナ三枚ノ符ナリレ捲ケテ之ヲ銀管ノ塗ニ在  
ラニメ此ヲ以テ其鈎ヲ進ケルヲホトロートペシ

キ、詳商稿ヲノ如クニ又タ銀管ノ太キ部分ニ於  
ナフ<sup>ノ</sup>各ノ各ノ各ノ各ノ各ノ各ノ各ノ各ノ各  
テ鈎柄ノ圓ニ備ニ安ラ以テハ其鈎ヲメ自ラ退  
カシム(オニ友ニ)先ツ<sup>ノ</sup>鶯力ヲ以テ角膜ニ小孔ヲ開キ  
此器ラ<sup>ノ</sup>鶯鍼ヲ取ル如クニ持ツ但レ示指ラ「ユノ  
ピ」<sup>ノ</sup>三枚ノ後ニ置クヘシ而メ丈器ノ端前室ノ  
中央ニ至ル件ニ示指ヲ以テ「ユノビ」<sup>ノ</sup>指メ鈎  
ラ進メ以テ虹彩ノ外縁ヲ鈎ケシメ指ラ丸メナ  
カラズ々ニ其器ヲ曳ケハ鈎首ヲ退ケテ管端ト  
合ス故ニ虹彩自ラ丸離タ原ニ復ルノ患ニナシ  
如クニメ之ラナ方ニ外ニ曳出斯時再ヒ鈎ヲ進

メテ之ヲ死ニ去ル  
ランケンベツクノ方ラ死屍ニ試ルコ教田終  
ニ之ラ患者ニ死メ全知ラ得ナリトニフ  
ル各ハ一輪ノ小鉤ヲ以テ眼球ヲ固定シ兼テ下  
瞼ヲ曳下ケ又タ別ニ銀線ギヤクジンノ小鉤ヲ以テ上瞼ヲ  
掲ケ但シ其上瞼ヲ掲ケルノ鉤ノ補者ノ子ヲ假  
ラサルカ為メニ強キ繻針ヅヅバリヲ以テ之ヲ患者ノ頭  
巾ニ固持セシム而メ辰ニ「ニセト」状ノ翳刀ヲ  
以テ内翳ノ剔去方ニ於ケルト同シ部位ニ一レ  
イニ許ノ創口ヲ造リ甚少ノ鉤ヲ入レテ虹彩ノ

故ニ之ヲ合スルハ  
尋常ノ鉤トナルノイ

毛狀散帶ラ距ルノ一レインノ四分一許ナル處  
シ鉤シ鉤テ之ヲ離折マシム下同シ余ハラニケニヘツケルレ  
シケル人カ發明メ自テ難症ニ於テモ施用スヘ  
キヲ謹スル處ノ器ハ毛引ノ一粒ハナミニメ  
真端鉤レリハサミ真兩葉ハニカミハ本ニ至ルニ從  
テ漸ク太ク全畠ラ長大抵四寸度五厘許其レム  
メルハサミノ長ハ一寸ニ步五厘許能ク相密合ス  
可カラシメ外部ハ牛ハ裏方ヲ覆ハシメ合スル  
卉八角形ノ柄トナルノイララレムハサミ彈子ハサミ  
ノ刀ハ鉤端ノイラ開クノ四レインニ過干サラニ

ムベクス而メ安器ヲ鉤毛<sup>ヨウモ</sup><sub>リ</sub><sup>原名ハーカタシクハーカハ</sup>

鉤ノ義タニクハモリノ義ニ

ト名

其術ヲ施スアテニセト」状ノ醫刀ヲ以テ角膜ノ  
外側縁ニ一ヒイニ半差クハニヒイニ半許ナルヲ  
造クル其刀ヲ刺ヤ、創ロ一ヒイニ半許ナルヲ  
ヲ得ル片必ス之ヲ抜クヲ要スモニ創ロノ大  
ナラニコラ歟スル片ハ其抜ク片ニ截リ罔々次  
ニ膾ヲ微房サニメ鉤毛引ラ弱刀ノ如クニ持チ  
其尖ヲ下ニ向ケ小指ヲ手ノ支柱トメ之ヲ眼前  
室ニ入レ角膜ノ裏面ニ沿ラ特テ離指セレメン

トスルノ部位ニ至ラミメナルタケ毛状歛帶ニ  
近接メ其尖ヲ虹彩ニ向ハシメ是ニ於テ其鉤端  
ヲ開ク其開クマ一レインニ許ヨキモニヒイニニ  
過キス而メ其鉤ノ円端ヲ微毛状歛帶ニ撞干ヨ  
セテ鉤尖ヲ虹彩ニ刺入レ之ヲ合メ其繫着ヲ折  
カシメ以テ徐々ニ曳キ出ス其間帯ニ鉤背ヲ角  
膜ニ向ハシメテ此膜ニ鉤尖ノ鉤ラサランヲ  
要ス而メ其角膜ノ創口ニ出ツル片鉤ヲ弛シ速  
ニ膾ヲ内サシム是レ創唇ラメ之ヲ挾挫セシメ  
ニカ為ニ申テ以テ三角取ノ瞳孔ヲ得ルニ三分

時我邦ノ半特ラ六ナニ過キテ後チ之ヲ點檢  
スルニ若シ真擬造ノ脱造ノ脱垂未成ラサル  
ヲラ見ル片ハ再ヒ之ラ曳キムタシテ創面ニ挾  
拌セミム若シ真膜ラ開ク片角膜創口ノ大ニ過  
クリカ為メ虹彩ノ原ニ復ヘルモノナルヲ見  
ルキハ更ニ曳キメ之ラ截リ除ク又其眼ノ轉  
動ニ易キ者ニ於テヨク術ノ全功ラ収メニカ為  
ト再ヒ虹彩ラ除去スルノ容易ラニカ為メニハ  
一確ノ十鉤ラ結膜ニ鉤ケテ以テ真眼球ノ向方  
ヲ固定ス由テ施術甚タミカ然ナルドラ得ルレイ

ニシケル人云フ此方術ハ角膜ラ疊翳スルヲ委  
火大ナル者ニ於テモ角膜ト虹彩ト愈着スルモ  
ノニ於テモ水具体及ヒ其囊ノ健康ナルモノニ  
施テモ疾患アルモノニ於テモ三ナ此ヲ施スヘ  
シト

角膜殆ニト皆疊翳メ虹彩愈着シ旁出方モ截離  
方モ施メ功アル可カラサルモノニ於テハ内翳  
ノ有無ニ拘ラズ刺膜角翳鍼ラ角膜ノ中央ヨリ  
虹彩ノ中央ニ刺シ貫キ水具体ヲ擠下シ若クハ  
截破シ次ニ翳刀ヲ以テ真鍼口ラ虹彩ト共ニ

ヒイニ許ニ截リ潤ケ此創口ヨリ鉤毛引先眼後  
室ニ入ヒ角膜ノ透明不失部位ニ於テ裏面ヨリ  
毛様挺ト共ニ虹彩ニ鉤ケテ剥離セシム曳出メ  
之ヲ截除クモニ虹彩ニ鉤ケテ剥離セシム曳出メ  
歩ニ若クハ四分三ニノ眼前室尚ラ一部分残ル  
所アルキハ將離拆セントスル部位ヲ距ルノ二  
レイン若クハ三レインノ処不透明头部ニ創口  
ス造ル是ヒ雲翳ノ増サニノテナス為メナリ  
若シ一二ノ病因有テ虹彩纖維著ニ久牽張スル  
ト有ルキハ此方術ヲ施ステ無益トス唯ニ其纖  
維

維ノ牽縮ニ由テ離拆復ヒ縮小シ易キノミナラ  
ズ擬造ノ虹彩脫垂ニ由テ生ニ易キ處ノ角膜ノ  
疊<sup>高</sup>大<sup>高</sup>ニ増大スル患アリ

瞳孔ハ尚テ健康ニシテ角膜ノ雲翳之ヲ蓋ス者  
ニ於テハ先ツ戻若越幾剖引用テ後刺角膜翳鍼  
ヲ角膜ノ中央ヨリ刺シ水気体ヲ擠下シ若クハ  
截破シ次ニ角膜一小創口ヲ截開テ鉤毛引テ入  
ヒ虹彩ヲ毛状鞆帶ヨリ離拆セテ之ヲ截除クメ  
此ノ方術ハ兩鉤ノ相合スルカ為メニ虹彩ノ創  
口他ノ截離方ヨリ大タル可及得ル而ヒ其虹

彩脱垂人角膜唇ニ愈着スル處ニ於テ必ス少ニ  
久墨翳ヲ残ス

以、鉤モ引ハ其作用<sup>ミナマツヨウ</sup>客旁ニ太且<sup>タク</sup>參鉤トモ

引、而用テ蓋子又同合ニ由テ虹彩ノ創口所好  
、大小ヲ得又曳出スニ向在ノ向方テ浮截除ク  
ニテ亦好所ニ適スルトテ浮ル尚<sup>シ</sup>ツヨク意  
テ用ヒテ之ヲ拔フトキ當水具体及<sup>シ</sup>其囊テ破  
傷ノ内翳ニ生マシムルノ處<sup>シ</sup>無しニイシニゲル  
人自テ此墨テ種<sup>シ</sup>ノ病ニ用ヒ且ツヘリ人サ  
ニ<sup>シ</sup>ク人等<sup>シ</sup>名家ニ十此レ<sup>シ</sup>同<sup>シ</sup>テ益<sup>シ</sup>大利<sup>シ</sup>

甚<sup>シ</sup>タ多キラ見ル

ヘルリニ<sup>シ名</sup>地ガラ<sup>一</sup>人又タ更ニコレオニニ才  
ニ<sup>シ</sup>未詳<sup>シ</sup>名護ト名クル所ノ一種ノ新墨テ發明スルヨ  
リ此截離方益<sup>シ</sup>貲キ<sup>シ</sup>浮ルニ至<sup>シ</sup>リ此墨ハ<sup>(二)</sup>第  
板<sup>シ</sup>土<sup>六</sup>七及<sup>ハ</sup>面<sup>面</sup>二寸許<sup>シ</sup>細キ兩銅條ヨリ十<sup>シ</sup>モノ<sup>ノ</sup>ノ<sup>シ</sup>

貯一<sup>シ</sup>件<sup>シ</sup>固ク柄ニ着テ拉<sup>シ</sup>トナク其端<sup>シ</sup>鉤度  
量タニカテサル<sup>シ</sup>鉤トナニ他<sup>シ</sup>一<sup>シ</sup>件ハ其鉤<sup>シ</sup>  
文<sup>シ</sup>ラ復<sup>シ</sup>ニ備<sup>シ</sup>ル所<sup>シ</sup>ナ<sup>シ</sup>進退<sup>シ</sup>ベクニ側<sup>シ</sup>一  
種<sup>シ</sup>輪アツテ鉤<sup>シ</sup>抱<sup>シ</sup>而<sup>シ</sup>柄中<sup>シ</sup>於テ<sup>シ</sup>其<sup>シ</sup>  
ニ小<sup>シ</sup>ナ<sup>シ</sup>横柱<sup>七</sup>面<sup>面</sup>通<sup>シ</sup>  
テ接<sup>シ</sup>ナ<sup>シ</sup>扁輪<sup>八</sup>面<sup>面</sup>通<sup>シ</sup>

指ニ以テ扁輪、追ニ扁輪ヲ正クレバ共ニ退  
リ可ラシム又追ムル片鈍端ノ鈎丸ニ合スルフ  
モ引ノ合スル如クホラシム而ノ又柄、一端ニ  
ハ又タガナルニセト、忙、小刀ヲ附ス  
火方術先ツ患者ヲメ内弱ノ施術、於ケルカ  
如ツ居ラシム輔者ヲメヨク之ヲ固持セシム柄  
端ノナアラ角膜ニ刺入ルヲ一レイニ許、更部位  
ハ刺角膜割出方ニ於ルカ如ツニ之ヲ抜クキナ  
シク下ニ截ト、間ケテ創口ノ太ワコレオニシ才  
ニノ端ノ一信タラシム是レキニテ极ツノ密

易カラニガ為メニ而レニ慎テ大ニ過ス可ラス  
大ニ過クレハ虹彩剥レハサヘリ唯ニ豈時水  
様逆溢世ノ虹彩張出ニ以テ又創口ラ園ツア眼  
ミニ感觸吾タ強キ片ハ一タニ其瘻テ開カシメ  
之ニ生スサルサニ立ニ虹彩ノ旁折ラ十ス又術  
左ノ如シ

先ツ按指ト中指トヲ以テヨレオニシカニラ取リ  
(手筋ハ放ツ房)二根十圖小指ヲ觀骨ニ当クキノ支柱トナ  
墨ノ端ヲ合シナカニ角膜ノ創口ニ末ラシメ創  
唇ラカグリ潤ゲテ正直ニ入り易ラシム次ニ柄

ラハ横ニ向ケテ 微ク側動ニナリテ 鉤ヲ 虹彩ノ  
將ニ離折セニトスル 部位ニ届テシナシ 持ラ  
テ柄、輪五箇、ニ觸レテ又ヘ條ラ退ケ鉤尖ラ  
毛状靭帯、縁ニ刺ニ之ラ鉤ケラ又タ手筋ニテ  
輪ヲ追メテ其端ヲ合セニメ恰ニモ引ラ以テス  
ルガ如クニ虹彩ヲ輕ク往々ニ曳テモ状靭帯ト  
离折セシメ以テ角膜ノ創口ニ出シ其創唇ニ持  
テ之ラ弛ス

以器種々ノ試験ニ由ラ 其ノ術ニ適當スル  
ラ見ルト全氏力鉤、暨タルカ為ナニ 虹彩

ラモ状靭帯ト离折スルヨリ 唯纖維ノ性理ニ送  
テ破リマスキノ害アリ而ルニ「一イニニケル人  
ノ鉤毛引ハ其鉤端ヲ相向クカ為メニ虹彩ヲ破  
ルニケニミ害アル更ナニ故ニカラリ人再ニ鉤  
モ引ニ做テ其創部ヲ改革シ其鉤ヲニ條ト十セリ  
第ニ板尤及十箇是ニ由テ其用益ニ大ナルヲ得ル其  
ニ條ノ鉤ハ甚タ細クナニラ合スルニ猶テ已前  
ノ一鉤ヨリ大十ラス一レイニ許、尚キヲ得ベ  
キ遇宣ノ彈カヲ有ロシメ且ツレイニケル人ノ器  
ノ如クニ又内面ヲ平坦ニメヨク密合ス可テニ

大丈夫スル 井恰ニ一絆ノ鉤人如キラ浮セシム  
其他ノ前ニ差フ所ト、唯銀輪<sup>九二</sup>有テ兩鉤ヲ  
抱キ追ナハ其鉤互ニ相合ニ退ケル 桐向リ可ラ  
シム但ニ此輪<sup>ハシマ</sup>減金トナスヲ殊ニ佳トス  
此墨ニ由テ施スノ方術<sup>ハシマ</sup>更瞳孔ヲ穿ツ、部位  
必シモ完シルニ非ズ宜ク時ノ宜ニ従テ上下左  
右ヲ取ハス之ヲ施シ可ト、此墨ニ又タ内輪施  
術後ニ翳<sup>ハシマ</sup>、碎片ヲ除キ出スニ至<sup>ハシマ</sup>是タ復ト

#### ○第四術離障方

此術ハ虹彩ヲ毛状靭帯ト離折ニ之ヲ角膜<sup>ハシマ</sup>ノ創

口ヨリ外ニ曳出メ截障<sup>ハシマ</sup>ニ

アツカリ<sup>ハシマ</sup>人曾<sup>ハシマ</sup>テ虹彩ハ大状靭帯トノ繫着ヲ  
破シ<sup>ハシマ</sup>トナリニ齧折スベキコラ見テ穿瞳術ニテ  
之用ユ可キヲ<sup>ハシマ</sup>今明マリ、次第ニ用フル術ノ墨  
ハ役レガ曾テ十七百八十七年ニ用ヒ之術ノ<sup>ハシマ</sup>  
ノニナ即<sup>ハシマ</sup>ヤル<sup>ハシマ</sup>人小刀之其刀ハ又本圓ノ柄  
ニ國有ニ側ニ甚<sup>ハシマ</sup>タ細クノ尖銳十<sup>ハシマ</sup>一葉ヲ附メ  
毛引ノ如<sup>ハシマ</sup>ニ<sup>ハシマ</sup>子ヲ以テ之而合ス可リサニ  
ナ<sup>(第三回)</sup>又夫端<sup>ハシマ</sup>互ニ相合スル面ニ<sup>ハシマ</sup>齒<sup>ハシマ</sup>拉<sup>ハシマ</sup>テ  
テ合接<sup>ハシマ</sup>密<sup>ハシマ</sup>テニム此輪<sup>ハシマ</sup>ハ虹彩ヲ挾<sup>ハシマ</sup>毛状靭

常ヨリ離折ニ角膜ノ創口ニ出タ以テ哉障スル  
ニ備フ又タ柄ノ一端ニハ<sup>上名</sup> 翳刀ヲ附スアツサリ人  
又ノ翳カト毛引ト<sup>ク</sup>ヒル人ノ剪カトテ以テ種々  
ニ方術ニナニラ施マリ又离障方ニ於ルミノ左  
ノ如シ

若ニ内翳固リ虹彩ノ裏面若ク瞳孔縁ニ愈着  
ナシ考セニヨ難キカ若クハ瞳孔ニ假膜<sup>開</sup>ラ生メ  
全リ闊仰スル日ノ先ツ又翳カヲ以テ贝毛引ラ<sup>開</sup>キ十ガラヌ  
少ノ孔ヲ向キ指ヲ以テ贝毛引ラ<sup>開</sup>キ十ガラヌ  
勤<sup>レキ</sup>章<sup>キヲ</sup>眼前室ニ入レ小具併シ中ニ若クハ假膜

ラ刺ニ貝<sup>ス</sup>キ豆ニ角膜ノ創口ニ引テ復タ又不動  
ノ葉ト共ニ入レ虹彩ヲ挾ミ壹ラ用ニテ或テ毛  
糸或帶ト离折エニナ角膜ノ創向ニ出ナ<sup>ク</sup>ダヒ  
レ<sup>ル</sup>人ノ剪カラシテ之ヲ截リ降ク  
瞳孔ノ全ク隔開セル症ニ於テ内翳有無ニ  
拘ラズ角膜ヲ刺ス<sup>ト</sup>内翳ノ割出方ニ於クルカ  
如クニ自家ノ毛引<sup>板五箇</sup>ニテ以テ虹彩ノ中央ヲ  
大創向ニ曳出し剪カニテ之ヲ截<sup>ク</sup>隆キ而ノ后ニ  
内翳アレラ見ルトキニ新造ノ瞳孔ヨリ捨下  
シ或<sup>シ</sup>剔出ス

角膜 = 大班若クハ瘢痕ヲ生ナ尚ラ大縁ニテシ  
リ透明ナル處ナハ角膜ニ創口ヲ造リ刃モ引テ  
入レテ更明ノ部ニ封スル所人毛様挺<sup>9</sup>陰云ニ  
以テ先導ニ自在ノ射入ヲ得マシム

或人ニクノツナリ<sup>10</sup>人ノ墨ハ共テ入ルニ=角膜  
ノ創口他ノ方術ニ於ケルミリ甚<sup>11</sup>大十ラマシ  
トラ得スト<sup>12</sup>アオニツ<sup>13</sup>人ノ書ラ翻訳メ  
東洋說ニ微些ノトラ云ヘリ而レニテ以爲ラリ  
其卷ハナシク火製ヲ度マバ小孔ミリ入レテ大  
孔ヨリスルモノト同巧ナルヲ得可キ<sup>14</sup>トキニ非

ズ

前ノ截齋方中ニ<sup>15</sup>举タル所ノレ<sup>16</sup>イニケルノ方術中  
宣リ共ニ列舉不可キモノ有リ金ドリ方術全リ  
高陞<sup>17</sup>方ラ主トセサムカ故ニ爰ニ列舉スレバ却  
テ類次十キニ至ル

何テヨリ穿瞳ノ方術種有リ耶<sup>18</sup>何カ他ノ方  
術ヲ瘻シ特ク取リ用エ<sup>19</sup>キ者アリヤ曰ク又答  
宜リ較幽<sup>20</sup>タラスニハアル可<sup>21</sup>夫レ第一術<sup>22</sup>即  
入院ニ一タク瘻癒セラレタリト金<sup>23</sup>トウノイ  
レ<sup>24</sup>人トガタム<sup>25</sup>人ニ由テ行<sup>26</sup>復久ビ世ニ行ハトル

心、至ラスマ又タコカルハスグニツト人室ニ  
セル人キブリニユテルアツサリ等ハ他ノ方  
術ニ由テ至善ノ大功ヲ得ニ、アラスマニニ由  
テ共ラ觀レバ一方ニ拘テ他方ヲ療棄スレハ甚  
タ宣シカラス各自ノ志ニ達テ各々相違キスル  
ノ方術アルモノニ  
穿入方ニ諸人ニ十功十ニトナ之ヲ廢棄し全ノ  
之ヲ方術ノ規矩ニ築ヘマスベールサニク等ノ名  
家ステ皆其施ス可ラサし例テ書ニ著セリト全  
氏一ウノイルアタムス人兩家ノ手ニ由テハ量上ノ  
ノ方術トナツテ再ヒ賸術ノ一方ニ備レリ即チ  
アタムスグレーンウイフ眼科地ノ病院ニ於テ施ニテウ  
ノイル人ガ其ノ他ニ於テ之ヲ施ノミ十全ノ善功ヲ  
得ニテ昭ニキトニテ明白ニ  
アタムスノ方ハセルテニ人ミリ出テ一ウノイル  
方ヤニニ人ヨリ出テヒト虹彩ヲ截開クニ在ト  
矣ニ而ヒテ其術ニ至テハ各ノ大ニ相差ヘリ其  
差フヤ唯ニ墨黑ノ真ナルニヒ十ラスセルデニアムス  
形ラナニアムスノハ甚タ細ク立タ大施方ニ於テ全ノ相反ス即チセ  
一侧ノ耳ナヒ立タ大施方ニ於テ全ノ相反ス即チセ  
セルテニ人虹彩ヲ後ヨリ前ニ截リアタムス人ハ

之ラ前ヨリ後ニ截ル且ツガタムス人ノ刀ハ東一

種形ナルニテテ水桶ノ硝池原名ワーテルアフナラ溢世

一ガラスホクト

ヤシナス従ノ説ニ田ルニ此池溢泄セザシハ虹

彩ヨク張テ截ルニキタ復シト云フ

ヤニニ人ノウノイル名トハ共ニ鐵維ノ條理ラ云フ

ト金石而レトニ其差フ祐ハヤニニ人ハ虹彩ノ鐵

維テ横斷ニウノイル名ハ其鐵維ノ條理ニ逆テ

之ヲ断ツニ在リ按スルニウノイルノ説ニ從エ即非タ横斷スルニ鐵維ノアリ又方術修ニ此考スヘシ今夫

レ先天ノ瞳孔縫開ニ在テリテル人ノ説ニ逆

テ人皆虹彩ノ罩截

ウノイルアクムス

按ニ雅ニ截セラク而已ニ

方術弊ニ屬ス

陰玉ニカヘル故ニ此名アリ

ヲ佳ト之且ツニナニニ由テ害功ヲ得ルニ非ズ  
マ又タリクテヒ人ノ説ニ之虹彩ノ脱出ニ由テ瞳孔  
眼ノ中ニニ在ルヲ得ズ角膜ノ縫ニ偏ニテ縫  
開若クハ些テサルモノニキテ新タニ瞳孔ヲテ  
本位ニ穿クセルヲ得サルキ若クハ内膜ヲ持  
下ニ截歛ニ或ハ割出スル後ナ瞳孔ノ一部縮開  
スルキハ虹彩ノ罩截ラ殊ニ自ト不向トナリ  
其筋ノ大き大ナヘラ得レハシトヨリシ人ニ之ヲ  
其筋ノ大き大ナヘラ得レハシトヨリシ人ニ之ヲ

ウカリ利ラ云バアリノイル人アタクス人ノ方ニ從フトキ  
ハ角膜ノ墨翳退タニキミ一六六テリツ透明  
部ニ換スルニ患ニ無ニ他ノ角膜ヲ截ヘテノ方  
術ニ在テニ屢々以言アケラ見ヘ穿出方ハ休ニ  
虹彩ノ水晶襄ニ因テ愈着スルニ仕トス空ニヤル人ニ方術ニ従テ虹彩ト水晶襄トノ一方ヲ  
除エシ又孔ニ水晶体ヲ剥出スルトキハ瞳孔正ニリ又位ニ成ルヲ得且ツ角膜ニ穿設有スル事ニ大ナ唯又縁ノ一部ニ透明ラ有スル寺ノ症ニ在テ双方ノ術ノ善功アルトテニウルス人ニ書ニ

云ヘルカ如ニ(前) 出ツ凡ソガ方術ノ利ハ虹彩ノ一部分ニ陸ニスハカ故ニ又孔復タニ猶尚スルニ患ナキト虹彩ノ中央ニ穿ツフテ得ルトニアリヒイニケル人曰ク(年八百十六)若ニ穿出方ノ適當スル症ニ於テ虹彩ノ中央ニ正圓ノ瞳孔ヲ穿クハ方術也ニ若クモノナシ故ニ第一種ノ器ヲ工夫セリ又器久ル先ツ角膜ニ創ニラ造ク後之ヲ入レテ瞳孔ノ締開セル部ヲ擣ケ上ケ以テ虹彩ヲ穴形ニ隆起マニテ之全截ルニ但此之ヲ极ムニ片手テ以テ可ラシムト

而レニ此畠ハ唯考按ノミニメ未タ之ヲ人ニ試  
ミニアラス矣ニ真早ク全成セニ「吾輩ノ希  
望スル處ナリ截離方ハ虹彩ノ白内翳小固ク愈  
着セル症或ハ虹彩ノ一部角膜ト愈着ノ眼前室  
ニ十分ノ罅隙ナク且ツ瞳孔ノ位置真愈着ノ中  
ニアル症或ハ角膜ニ大斑アルカ或ハ蒲桃腫有  
テ殆ト全ク虹彩翳ソ其残ル處ナク故ニ角膜ラ截  
開カハ其暎翳ラ透明ノ部ニ増サンラ恐ル  
、症ニ適当スル者トス

(自註)

「子シクト」入ハ此ノ終リノ症ニ

ニ於テ剛膜線ラ截リ開キ此方術ラ施メ  
大ニ効ラ得タリト云フ宜ク其書ニ就テ  
見ルベレ

「一ル入ハ穿孔方ラ因熟スルノ入シト角ニ自  
ラ真方ノ必スレモ諸症ニ皆適當オサ者ナラサ  
ルフヲ知レリ故ニ其書ニ曰ク千八百零六年ノ  
著書

予カ此方術ニ由ルマ即穿孔セ、ルテシノ方  
術ラ棄テ唯一方ヲ以テ諸症殆ト皆治スヘ  
シト金瓦ホタ予カ案ラ以テハ次方ニ由テ  
治ス可ラサルモノ一二アリ即チ角膜ノ大

班毫フメ其縁ニ些々透明部ヲ残サシル者  
ト其墨翳スル部状ニ由テ角膜ヲ截リ肉ヲ  
ノ難キモノト是ナリ而レ此其終リノ症  
ニ在テ虹彩ラモ状散帶ト離折セハ尚ヲ治  
ラ得ベレ其方ハスクホツト人カ光明セル  
处ニメ今既ニ眼科術ノ一方ニ備ヘリト  
截離方ノ目的ハ旁ツ处ノ瞳孔ノ大ナルニ在リ  
而メ其愈ニ大ナルヲ得ルハラニケンヘツク  
入カ虹彩ノ一部ラ角膜ノ創唇ニ抑テ擬造ノ脱  
垂ラ生セレメ以イ再ヒ矯正スルラ防ケフラ発

明セルニ由ル处ナリ此故ニ此方ノ貴價ヲ得ル  
者ハ其効果ニテニテニヘツク人ニ在ルヲ疑ヒ  
ナシ

離除方ハ角膜腫瘍後ノ瘢痕若クハ大班ニ由テ  
其墨翳スルノ甚ミテモ毛様挺ラ除キスルニ非  
レハ視力複スルヲ難キ症若クハラニゲニベック  
レイシニゲル人等ノ方術ニ由テ擬造ノ脱垂ラ  
ナストキ若シ其虹彩ノ端角膜ノ創唇外ニ出テ  
其愈着後必ス瘢痕ヲ残レ固有ノ墨翳ヲ増サシ  
ラ恐ル、片ニ過当スト

「レ」イシニケル入日ク  
(ナ八百十六年ノ著)毛状輪原各  
ニクレセ説ニ申テ之ヲ見レハモ状敷帶トト離赤セ  
同一ナルモノニ似タリ  
ル處ノ虹彩ノ端モニ角膜ノ外ニ出ツル片  
ハ之ヲ截除メ可ナリ即チ是ヒ截離方三旁  
ニ方ヲ合スル者ニメアツサリ人力離防方  
ト名クル處ノ者ナリ此方ニ於テモ尚鈎毛  
潤クメ之ヲ曳キ出タスニモ甚久便ナリ而  
レ此方ニ由テ得ル處ノ瞳孔ヘ其大サ角  
膜割唇ニ愈着シムル者ノ如ク大ナル

ヲ得スト

穿瞳術施後ノ療法ハ其部服即ニ於ケル者モ其方  
術ノ異ナルニ應メ名々相差フ或ハ白内翳ノ施  
術後ニ於ケルト同フメ可ナル者アリ或ハ虹彩  
ヲ毛状敷帶ト離赤スル片ニ発スル處ノ劇痛之  
レニ繙発スル處ノ出血及ニ劇キ擦衝等意ヲ用  
テ各自ノ治法ラ施スヘレ其擦衝ニ於テハ刺絡  
ヨリ急ルベカラス一部ノほ血ハ固細キ撒糸ニ冷水ヲ浸レ眼上ニ置  
クニ勝サルモノナシト宜ク屢々相更換入術ハ  
ス眼内ヲ冷ニスベレ一二分時ノ間ニ熾然消散

メ患者軽状ヲ覧ユル者ナリ其刺上ノ全ク止ム  
ニ至ルマテ必ス之ヲ憐ケルノ勿レ冷水ヲ眼焫  
衝ニ用フルハ往日ヨリ此アル處ニ且ツカラ  
トレ<sup>入</sup>名ノ言ニ曰クチハ百十五年著書物ノ其中ニ在テ刺  
戦スニ非レハ眼焫衝ヲ治スルノ割冷水ニ勝サ  
ルモノナレ唯痛凡毒ニ由ル者ニハ功ナレト又  
タラシアニデル<sup>入</sup>名曰クチハ百十七年著書冷水ヲ綿布  
ニ浸シ眼上ニ置ハセ愈ナリ多ケレハ愈々善ク  
其歎衝ヲ痕退メ旦ツ眼瞼閉着ト濃漬ニスム  
トラ防禦スル者ナリト

夫レ予カ此著ヲ作スヤ唯々諸ノ方術ヲ集メテ  
以テ此レカ記録ヲ為スニハ非ス宜取用テ利功  
アルヘキ处ノ諸方術ヲ集メ其原ラ正クシ当今  
在ル处ノ白内翳治穿瞳術トノ法則ラ廣ク示人  
天下ニ益アラン<sup>フ</sup>ラ願フノ微意ナリ看官ヨク  
此レラ摹セヨ尚ラ庶義クハ外科家能ク勉強メ  
眼科ノ學ヲ研精シ其力ノ有スル处ヲ以テ幸ニ  
アカヌ微志ヲ助ケン<sup>フ</sup>ラ

藥草歌集卷之三者十九矣。刻本ノ全ノ體也。  
是人等ノ歌之ヲ解クル子勿地水也。歌歟  
詩也。其道古文碑經古可也。妙アハ處ニ生ツガテ  
歌事ノ聲韻極體也。其妙西之藝術ノ學中必有幸也  
也。」  
歌事ノ聲韻極體也。其妙西之藝術ノ學中必有幸也  
也。夫子ニ蓋不妄乎。不亦歌也。歌也。歌者音也入  
耳也。父々白舌類皆與歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。  
十歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。  
此歌者ノ歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。  
其歌者ノ歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。歌也。

