

家藏要約



k 69

F
カ-48


醫藏要約

490.9

Ka-24

No. 2592

12 K 69



富士川文庫

1523

家藏要藥序

予之祖父以以孫多病予遂新其方家
年一以祖玉問一難子一得私者一藥云得
驗一奇方以這云此方在後書以自健強
凡子者也世上世世一藥云不絕之病也
予一書云予不疑予一今後身健如
產却云云然一病云予而少少
一騰寫予馬而自云云不信也
世人哉

拆白山序

○甲斐德木秘方抱膽丸

治狂證

水銀 貳錢 辰砂 一錢 乳香 一錢 黑鉛 貳錢
右糊在臨病者口對石多口傳



○狂證癩症妙丸

芒硝 石膏 明礬 鈆 汞

右五味等分糊丸

此丸其藥狂症大半愈後
辰砂黃連石膏三味糊丸累試數驗
黑錫製有傳錫入土
火三トカニ飛同入火
上以置地上十之成灰

○難產奇方

滑石

細末 黑胡麻油 蜜 少 難入 煉 芋 百 叶 霜 入 可 也

橫產逆座

胞衣不下 等之難症 右到一用 試驗

○

催生

冬葵子 滑石 末 可 也

○惡阻用半夏瀉心湯經驗下

產後嘔逆目暈二黃連一味煎服

○脚氣腫滿之一方

赤小豆大麥木瓜猪苓澤瀉以上五品

水煎温服

○諸疾吐方

俗菜莖漬下之每年三冬之時剉之至春味酸氣臭取其汁也温與半夏並許飲下則吐又

○補骨脂丸

治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱欲所致此藥壯筋骨益元氣

補骨脂

四兩炒

兔絲子

四兩酒蒸

胡桃肉

二兩去皮

乳香

沒藥

沉香

研各二錢煉蜜三

右丸如梧子大每服二三十九空心塩湯温酒三任下

自夏至起冬至止日三服

此乃唐宣宗時張壽大尉知唐別得千方西蜀人

右詩曰

三年時節向邊隅人信方知藥力殊
奪得春光在手青娥休笑白髭鬚

○經驗方

烏藥

四兩

陳皮

四兩

乾姜

一兩

當歸

一兩

白芷

桔梗

枳殼一兩

白善蚕

木瓜

威灵仙

月桂一兩

右十味為末白湯三送下二

此藥氣平順之去痰平氣之藥
治婦人血積血積
痛又筋骨
痛
白濁
白濁
白濁

家傳磨積丸

生漆 無油氣者 和蕎麥粉為丸
名之謂磨積丸 治婦人血積血積
并小兒胎積 疳積 若婦人血積者
臨症可用數百丸 無効則又宜用後
丸百丸 百中之妙丸 具効驗不可
勝算也
一方

乾漆 要賣漆家乃縣匠所貯漆桶中自然
乾者為佳 用時搗研炒烟盡為末

午漆 以野漆所有俗名伊乃古津知者
為佳 去其屑頭水三洗到

大黃 取華船載采者為佳 細剉

右三品各等分 為末 以蕎麥麵糊如小
豆大 丸衣蕎麥粉

四生丸 治吐血熱毒行

生北何葉 生艾葉 側柏葉

生地黃 各等分

右搗爛為丸 如雞卵大 每服一丸 用水二鐘至
中 去渣服

○ 茜根湯 治吐血咯血嘔血等證

四物湯加童便浸香附子 茜根二錢五分 茜草二錢五分 水煎三服立愈

○ 治吐血

黃連末一錢 生芩汁一合 水半鐘煎五六沸服 即愈

○ 治吐血甚且日運不止

人參一兩 為末用雞子清調如稀糊以此服能 盡效

○ 奇方

治飲酒多熱胸膈以致吐血衄血

葛花二兩 黃連四兩 為末以大黃末熬立 為如 梧子大每服百丸 溫湯下或煎服亦可

○ 犀角地黄湯

治血積胸中吐血衄血

犀角鎊 赤芍 牡丹皮 生芩各一錢

右水煎服此方若有痰者又氣逆不降不服之皆不効
每用四枳殼枳仁滑石効

○ 拔萃犀角地黄湯 治熱甚而血積胸中

生芩二兩 黃芩二兩 黃連各一錢 大黃上

服一 水一 鐘後 服

○ 戴元礼云吐血者榮氣溢入咽道留聚胸膈則吐血名曰
內衄直蘇子降氣湯加入人參阿膠飲酒太過傷胃吐血用理
中湯加青皮枳子乾薑

○ 咯血

喉中常有血腥一咯血即止 或鮮或紫者是心又
如細屑者是 治法

四物湯入姜汁童便善 飲之効

○ 衄血 四物汁加阿膠升蒲黃佐以以熟子降氣吐便血瘕之下

○ 凡行水動氣行血液治治者知血未以治衄而不知氣降則血屬經古人所以血未中以加氣菜一二味如上所認熟子降氣吐之類也

○ 右赤水玄珠十一卷諸血條二出

○ 腋臭妙藥 名清礬散

○ 蜜佗僧

白卷

伊勢白粉

輕粉各下

右等分三味為末擦之

一本四唐土

後懷ラスリ又ハニ

○ 癰疽一功腫物切方

壤蛇

蟹各陰乾末

鹿角末

以上為末温酒送下已潰未潰望時有介量之是云

○ 下胎解虫瓜散

治妊婦有病欲去胎

蟹瓜 桂心

瞿麥各一兩

午幣

兩為末空心温酒

○ 陰疽二血丸

治小兒痘瘡未出者稀已出者減

用 鹿血免血

各以青紙盛置灰上晒乾

乳香 沒藥各二兩

雄黃黃連

硃砂

麝香一錢為末

煉蜜丸綠豆大每服十九空心酒下見小者減之

○ 擔宮丸

治小兒胎毒遇凡寒即發痘疹昭之可免

雖出亦稀用

兔

二隻 膝月刺血於添盤內以細麵炒熟和勻

拍入經筒方四硃砂三酒下名免砂丸

○ 續斷湯 瘧疾

續斷 常山 煎茶 各等 木香

續斷 各等分 丹牛 一匙

煎茶 以老 載瘧疾

○ 煎和一眼 霍亂具 治 双眼 同然 白眼 二為

濕熱 一 素法 一 通

濕熱 一 素法 一 通

○ 霍佳香正氣散

既大人得驗

當歸 川芎 黃連 一味

○ 婦人十四五下 者小便道 白キ

下三ノ下ノ十通ス 婦人白血

長血 下 同症 之 脾胃 一 濕熱 一 通

事 一 素法 一 通

○ 霍佳香正氣散

午膳 山虎子 一味

○ 右 爲 骨 各 等 分 傳 齒 血 煩 齒 血

病 者 齒 下 肉 下 間 一 血 黒キ 綿ノ

十日 一日 以 手 以 氣 七 八 合 之 貴 素 法 一 通

通 一 家 君 瘧 疾 也

新王旧四服用過半收尋
蘇子降氣湯四物以合位五之能
全收

○ 并麻葛根

面分吹出物竹陽下服之亦
所系為所系方不

○ 大黃 硫黃

當分細末 批胡麻油
煉盡之油

○ 疥癬系

蛇影乾 粉批尋以吹也 是此系

○ 毒吐系

大黃、葉干、粉、不、力、力、力、粉、而
右二味當尋能海三、月、吐、逆、之、八、下
是此系

○ 同吐系

可、去、之、身、多、地、下、也、ト、上、之、色、為、牙
衣、下、上、之、張、中、人、地、之、夕、八、ア、丹、ウ、セ、三、の、ケ
指、之、又、八、條、白、ノ、丁、丹、玉、ハ、多、シ、去、之、早、末、也、ハ

○ 犀、角、心、熟、煎、也、

香附 為系 山色 各半 黃連

枳殼 香根 年一石 多好 以老熟之

血痛

玉子ノキニ斗リム者大細糸

右或味百子土錫之并リ附其具也糸

傷寒以痛

額痛、目明經以、學年以之痛、
少陽經、目、少陽痛、少陽經、

夜痛

蒸熱言、故標言、起脹言、
貫膿言、收斂言、

於身手足之何、也、痛、之、入、系、熱、湯、
振、可、之、系、

思、之、食、難、扶、更、肉、主、美、法、

台、馬、之、

危、後、陰、陰、數、シ、タ、ハ、二、給、ノ、ラ、ウ、目、ヲ、
血、ノ、系、ト、シ、テ、附、是、也、

弛痛

悲、張、下、粉、ノ、之、傷、之、弛、也、

婦、人、乳、中、稀、ノ、カ、リ、ル、一、出、毒、業、也、

乳岩トナリ後之ニ香ナリト云乳中採ルニ
眩々奇ナリ具節ト云ゆんも木石
石ナリ

青皮

一味厚の如一此ニ用ニ法厚の如ク
和みく一味散ナリ木石ナリ

小児乳積年呈指レ痛

香薷散

コレトナリト云此ナリ

少三十三天

硫黄

滑石 各五子未ナリ

急散

平胃散

加筆杜母ニ云

慢驚

同 肉豆蔻 五子ニ云

肩臂痛

コレトナリ至ヨク痛テ少綿巾ニ包

痛所ニ云ナリ

コレト痛名也

瓜瓞子

平胃 一散 或月 輕粉 至

右マゲニニテ

確ニ云ニ 粉子 瓜瓞子 入

輕粉以之入外殼能粉之
物之切或
布之包以之能熏暗
石之包以之亦不
百之之

○ 升木 兩景

善要黃仁 未上
所

○ 石月排以教

治風虛以
神以
合意
銘記

屏木斤為桂香
白鮮皮月

早口仗
各三身

善入水煎服

○ 宝鑑系示斤
治風之
善新
日明
經口
以

因 昌參
益身
凡足
屏一
桂之
各三身

○ 三化湯 有便溺
胆痛者
以

朴
洞
毫
各三身
水煎

○ 稀瀉散 治
延
中
凡

山
各
一
角
水煎
善

○ 文底湯 治
風
眩
暈

四物湯
兩
秦
凡
善
各
三
身
水煎

○ 書曰列一不厚子

治男子婦人多氣之癰痛及
瘰癧盤吐涎沫及小兒驚風
主治

白朮 田七 白生 川烏 生

善不以糖和者丸 生薑湯下

○ 呃逆 治方又痰塞咽喉

可立 細刺 以產後為限

諸病 均長證之下 膿血或如死 循所 色
或五色 崩下 類此 惡寒 腹痛 絞痛

○ 六柱歌 昂六柱肉
俗由 創膿 此乃 惡病 慎處 時
欲得 故賜 胃下 膿 若 投 斬 藥 則
誤 立 六 柱 歌 為 陰 或 可 一 藥 且 二 藥 一

人參 去蘆 小次 全 去皮 熟地 子

南木香 白豆蔻 小次 各半兩

一 下 五 七 十 本 有 許 子

每服 四錢 水 一 盞 半 薑 三 片 棗 二 枚 煎
七分 大 枳 實 從 服

○ 痔漏方

當歸 五 芍藥 五 北芪 五 川弓 五
秦艽 五 皂角子 五 防風 七 肉桂 五
九品細末 食前白湯送下

○ 檢台奇匙

北浦 五 石羔 五 辰砂 五
右私考經驗 大人小兒口舌瘡或爛腐或舌上生瘡
搽臍清疼痛即愈食難下者以指頭頻擦此
藥效也 試回系効

○ 十全湯 神氣血進飲食

黃芪 五 下 淨 芎 芩 各 五 芍 藥 五 木 陳 五

可 參 桂 心 五 味 各 五 烏 藥 七 錢

右 咬 咀 每 服 一 兩 生 薑 七 片 棗 二 枚 水 煎 丹 溪 云 十 全 湯

看 年 之 老 花 質 之 強 弱 証 一 緩 急 時 一 寒 熱 加 減

○ 黃芪人參湯 脾胃虛弱時多為病 功効云

黃芪 一 錢 自 汗 過 多 加 淺 人 參 一 錢 日 中 各 計 十

白 木 芍 蒼 朮 羊 脂 搗 皮 下 黃 柏 酒 洗 三 十 枚 腎 水 煎

神 曲 三 分 木 喙 子 九 粒 走 門 冬 三 分 當 歸 三 分 升 一 下

右 以 酒 候 作 一 服 一 水 二 盞 三 盞 一 盞 去 渣 食 遠 或 空 心 服 湯

○ 木香覆盆丸

流 濕 腳 燥 推 凍 致 新 散 諸 邪 結 活 血 通
經 及 治 婦 虛 喘 嗽 白 帶 不 利 脾 濕 人
疝 宿 食 不 消 一 切 瘕 証 不 能 悉 述 婦 人

調和氣血小兒驚風疳積壯一以可一量輕重用之

木香 檀香 香皮 陳皮 廣茂 枳殼

黃連 各半兩 黑胡椒 黑胡椒 二兩

神芎導水丸 治疥癩停濕二陽病疔瘡疔

黃連 一兩 黃連 半兩 大黃 二兩 川弓 半兩 滑石 二兩

薄荷 半兩 黑胡椒 半兩 四頭末

何謂疔 疔一切疔症其功不可言述或久病疔疔無問瘦肥老弱疔疔
証可下老始自十九以和為度常服此藥除腸垢積滯不得和氣疔
疔致新得利便快或婦人血疔下惡物加桂半兩八子半兩二頭末

舟車神祐丸 淺水濕

白蘆 一兩醋炒 大黃 二兩 廿一廿化 一兩醋炒 黑胡椒 半兩

頭末 大黃 一兩醋炒 輕粉 一錢 香皮 半兩 木香 一兩

檀香 半兩 香皮 半兩

取盡如甘無藥 半兩香末水空口服

何謂依仲景十疔疔 疔到衣出此方 主療一切水濕 疔病數人云十束 疔該水 上丹系之所謂濕疔

下者是之如中滿、腹脹、喘嗽、淋閉、水疔、虫疔、留飲、癖積、
氣血壅滯、不得宣通、因起燥熱、疔体麻痺、疔疔疔疔、
久新疔疔、疔疔人經疔疔下疔令疔疔疔、疔疔疔疔、
疔疔疔疔、疔疔疔疔、疔疔疔疔、疔疔疔疔、
疔疔疔疔、疔疔疔疔、疔疔疔疔、疔疔疔疔、

大聖濟川丸 疔疔疔疔 疔疔疔疔 疔疔疔疔 疔疔疔疔

大黃 一兩 煨 白蘆 半兩 黑胡椒 半兩 木香 三錢

蘇木 半兩 仁術 三錢 疔疔 三錢

面浮

夫濕在表者目面黃浮在下者收膝腫在中者肢滿痞痛
痿逆在端不去者久則化氣上流不去者久則成形世俗
不詳內經所言留者攻之任執神燥之劑一悞則轉
加而病愈見之法當戒病之所任而為施法酒實神
虛除邪養正以平為期而已

○ 海藏十全散

治男子婦人不足女骨七傷不進飲食久病
虛損時發潮熱在甚遠精面色痿黃膝
脚無力咳嗽中滿脾胃氣弱心煩胸膈
宜以治之

肉桂 百中 芍藥 黃芩 白朮 川芎

白朮 茯苓 地各一名

右為底末每服二大錢水一盞生薑三片煎至七分不抱

長治湯并弱法天地之成數故名曰十全散

○ 熊膽丸 一名曰烏金接

苦參 地黃 連 各一名

治小兒一切虫積驚風疳積

右左不知出所 小兒善行 柳云繚 妻常令下 以三石

見本書右左和左之 數用致驗 善得

○ 四味肥兒丸 金銀心鑑出

蕪黃仁炒 神曲炒 麥蘖炒 各一名 糊丸

黃連炒

主治詳本綱蕪黃附子可考

○ 龍王湯 金瘡失血產後諸疾一切難病食傷吐血痢疾最妙

川芎 當歸 甘中升麻 滑石生芩 黃芪 石古旨

蘇不 蘇桂 夏枯 下子 茯苓木香 薑渣 磁砂金

紫胡 黃芩 各五 白芍 薤白 人大黃 縮 檀 蒲黃

桂枝 川芎 沉香 各一 桂枝 人參 桂枝 去心

以上二十名各一點一錢入袋內熟湯三碗出用又法服

世上方類多不一先以未六方傳之藥味有四五味其大概藥多大同小異

○ 木香丸

黃蘗炒十 香附 些炒正 木香 和 胡黃

以上各名為末糊丸

○ 安胎清血

條芩 白朮 每服五十九丸白朮下

凡妊娠調理以四物去芩加白朮黃芩為末為服其法

○ 八珍酒

和氣血養藏府調脾胃解宿醒除精神 和顏色助勞傷補諸虛久服百病消除

當歸 白朮 升麻 白芍 川芎 肉桂

五加皮 石菖蒲 甘中 紅棗 去核

右十品各等分以咀者入袋內投酒中春秋五日夏二三日冬七日 取酒二升服之 溫酒三五小盞 此法子回春八珍酒大同小異主治又相同

○ 試血

七世水盤可浮者肺血沉者肝血半浮半沉心血本細白及下

惡心胆欬食者白惡胆白間因痰少而然者宜

○ 加廿如 姜連 姜色 以如 烏梅 以收飲依証如 當考

○ 清晨 二三次 數脾胃厚者間有痰氣 証用回春

烏冬通氣散 往一奏效

獨行丸

○ 虎 十 巴 永 各 五 右 糊 打 蜜 炒 分 量 諸 方 合

○ 醫法明證 中風 門 痰壅 西 石

瓜 蒂 散 稀 涎 散 呼 石 灌 入 之 下

○ 諸病卒病 小兒急 慢驚 風 等 証 牙

藥物不能入者 照 鹿 射 檀 丁 圖 氣 之 劑

董 口 鼻 洞 氣 自 入 神 口 不 閉 用

右証 藥 不 可 入 者 令 病 人 穴 口 以 前 湯 送 入 氣 則 可 未 入 則 氣 開 牙 固 有 開 此 法 祖 又 時 行 之 得 效 言 得

撲汗法

○ 白 木 薑 本 川 白 芷 各 二 錢 半 烏 末 入 米 粉 一 兩 半

和 勻 以 絹 袋 盛 貯 固 身 撲 之

汗 下 後 氣 虛 痰 壅 者 凡 喘 多 痰 以 宜

陳 如 姜 汗 竹 瀝

○ 加味 生 味 氣 虛 手 足 厥 冷 脈 伏 喘 促 者 危 姑 以 此 救 之

味 子 三 錢 人 參 五 錢 門 杏 仁 陳 皮 各 二 錢 姜 五 片

老 三 枚 小 前 胡 三 枚

○ 瘡毒出藥

高麗 百五 括棧 五 治風 下

沒藥 下 乳香 下

左五味十匙 方一日二匙之 煎用 藥二
追出 膏二三日 過之 增之 凡 藥可用

○ 名藥云

苦竹 下 苦連 三上 石 苦 為

東川 藥 多 藥 而 下 藥 紅

三上 下 下 成 水 三 三日 亦 白 三 下 成 程 紅 花 也

○ 下方

梅干 三 黑糖 巴 豆 三 調

糊 二 在 酒 送 下 十 分 下 下 以 下 下 下 下 下 下

○ 舌 三 下 水

石 南 曰 生 粉 二 下 酢 二 下 研 下 下 下 下 下 下 付

○一書子二十餘歲患痘瘡醫謝忽患口瘡不開四五強直不能屈
是別瘡病

文無餘容 川片 香皮 釣藤 烏臣 白朮 陳皮

斗中 烏依 桂枝 木香 正芳 連 烏使 紅花 少許

煎十二匙而安

○愈心丹

皂角 一斤 去皮 弦對以在斤酒浸一宿 澆出同新 泔水一大碗

苦參 以初為末 蟬蛻 以尾全用 陰乾為末 以砂鍋 慢火熬膏

右 二味末以皂角膏名如桐子大 每服七丸 忌用防小通 散並 或送下
日三服 服二三劑後入浴出汗 病重者不過一料 疔微者此用魚稍地不

明蟬蛻

○紅花散 万丹毒 去赤明 內系之 又妙素之

平并立開云 小以公十千 一ケト云ニ妙之 公十千リケトハ 疥瘡

氣急ニケト 卒ニ死スル 但此毒在キケトケト云 妙アラハ 外感之

今十千リケトニケト 醫者枯レハ 輕キケトニケト 死之云 俗ニ云ム 十千リケトハ 別是 馬牌

病入ニケト 是ケト見ルニ 今俗ニ云ム 十千リケトハ 別是 馬牌

素者 木香 丁子 雀香 各一ケト 羊 沉香

少ホ十ケトニケト 半 桔梗 一分 甘十少

右 采ノ 湯ニケト 出ニケト 是ケト 出後ニ 渣在 一ケト 下

ケト也

○ 芝田云 不香倍更耳中 (云) 百根土穴亦入于香根去
ツホヤウ大ニハニシ 若端急ウヨキニハ益 (云) ツホヤウ
八ニハ可
ツホヤウ 鐵連草ノ草ニ 某店ニ求ル

○ 雞翼 牛乳食寸命散

治 少時 帳端 涌胸 腸 起急 兩脇 筋動 喘下
作 抗 兩鼻 穴數 注同 亂 嘔 喘 聲 嘎 而 不 鳴 痰 從
前 如 塞 一 俗 云 鳥 解 公 若 不 治 死 在 旦 夕
白 牽 牛 黑 牽 牛 各 一 兩 半 生 羊 糞

川大葉 瀉膏

右 為 細 末 三 歲 以 下 每 服 二 錢 冷 漿 水 調 下
涎 多 加 臍 粉 少 許 每 時 加 蜜 丸 牛 糞

暴 喘 而 脈 滿 四 氏 云 暴 喘 俗 傳 為 鳥 解 公
也 大 小 便 硬 宣 急 下 之 用 年 長 者 食 寸 命 散
後 用 白 朮 湯 平 之 馬 解 公 在 百 日 內 者 不

治

○ 葛 花 丸 治 男 女 淋 病 疼 痛 如 速 白 豎 是 之

以 糖 苦 粉

○ 辰 砂 散 治 瓜 痰 驚 癇 狂 之 妄 走 精 神 痰 惚 忘 慮 迷 亂
不 守 醫 藥 之 驗 疾 余 什 代 吐 沫 戴 月 之 患 66

辰砂 一两 酸枣仁 煅炒半两 乳香 半两

各為末石量患人能飲為幾許、先令忍飲、但勿令吐、至靜室中以新桑都作一匙温酒調下、作一匙調之、令飲飲如欲酒素少者、但隨量取醉、服茶飲、便安置床枕、令卧病淺者、半日至一日、病深者兩三日、令家人伺之、鼻息勻調勿喚者、亦不可驚驚、須待其自醒、則神魂定矣、甚一尋、亦不可得治

寒水石散

治因驚心氣不行、驚悸生、怔結為飲、怔不自勝、特少遇者、則發石室、慎之

寒水石 煨 滑石 水花 各五分 生耳中 一錢

右藥末每服二錢、煎別煎服、水下、怔下、則甚、天得下、則龍膽、少許、心佳

一車子小便日數十回如稠米泔色必神

桑螵蛸散不終一劑而安此藥能安神魂定志治在

桑螵蛸 遠志 菖蒲 龍骨 人參 茯苓 當歸 龜甲 一諸各五至各一兩為末以人參酒調下二錢

初生子胎毒白下大便結

二日小兒前後心手足內疔七夜三四日及了者婦人

吸也輕粉羊角淺蜜也 濕中 溶之於水少之與

大便通下度去

小兒好下泥土

輕粉一分下沙糖二和麻子石

厚而愈

○ 乙小便者ニ結ラ服帳モ夕子三四日ニ十レハ人

ヲ殺ス 豎粉一錢生麻油一合ニ和ミテ空心服ス

○ 魚ノ皮ヲ破ヒ生姜ノ自然汁ニ和シ知ル搽ス又レ

更ニ痕ナシス

○ 場疥瘡ニ痛便毒下方

大黃ニ一粒 巴豆一粒 胡椒ニ粒 丁香七粒

縮砂ニ粒 右五味末ノ巴豆スリノ粉ニ用之小便ヨリ通下ス

