

家藏理書卷

X

k 68

F
カ-49

490.9



Ka-23

No. 2591

1A K-68


種本

家之生理書之序




富士川文庫

1522



林本



上海圖書館藏

1952

Book in the collection of the Shanghai Library

家藏理盡集

卷第一

拔萃



醫者至病家之法

勤弁



允醫人至病家而對患者則脩放心魂魄萬識之別誰忘氣而守正心主一無適可為業而後四知術為先小便之吉凶問明百病有血有氣可弁百病有血則大便有妨有氣則小便有妨次益夜之發起問明百病因陰分因陽分可弁百病因陰則夜
發起因陽則盡分發起次寒熱問明百病常變可弁百病惡寒
則常也其熱則及治為主其變則從治為主所謂及治寒病溫治義也從治寒病施寒涼劑熱病施溫熱劑義也次食不食
問明中集之正氣邪氣可弁次施診諶之法浮沉遲數通四者百病虛實三集之有無可弁百病之虛實知則外感內傷之因證掌明也內外因證覺知則乃病本源皆得此故上代神醫不步病名直內外之依虛實百病窮根允施百某治奇神照見是未代醫流不易之法雖當世為醫者本業未仁德故以醫
損醫定可謂醫法之賊

左 三部見浮數者血証之實熱也
 右 三部見浮數者氣証之實熱也
 左 三部見沉遲者血中之氣虛也
 右 三部見沉遲者氣中之血虛也

右四脉之法古今不易而他流雖立此義病元通達之不一與正理故明事而暗理當流傳授之悟入各異而深室得入耳

右左三部之脉皆有神以為實無神以為虛

百病及定理愈定理之勘并

內經所謂肝有浮無補腎有補無浮矣

然俗醫滯經語矢治術腎有余則濕不足則補此醫之意也何止此經語常病可不知及乎內經所謂有故而無損云

是故句醫安之一也假令疼泥膈溫潤之証而地黃當飯之不能施潤劑証雖共血枯而溫變証何潤血之茶味去乎明通理

家藏理盡集 卷之三

校萃

傷寒的治勘并

古賢仲景曰

採証而不採脉法亦無余說

一大陽發熱頭疼項痛而腰脊強

一用明身熱鼻乾目疼不得卧

一 女阴胸膈痛耳聾往来寒热而吧

一 大阳咽乾腹满自利而不渴

一 厥阴烦满而囊缩

一 小阴口燥舌乾而渴

右六经之见证唯非伤寒耳六经之外因皆同之因见证施治勿因脉

一 大阴之证而清涕流汗者大阴证也

以 败毒散

参藜散

香薷散

胸膈不快加吧者以香薷散尧之咳喘而加痰者以参藜散尧之热甚而头暈者以败毒散尧之

一 阳明之证而渴者以

不渴者以

外广葛根汤救之

五苓散渗湿

一 少阳之证而无恶寒热者以

寒热全往来者以

黄连解毒汤解之

小柴胡汤解之

一 大阴之证而渴者五苓解毒合以解之

不渴者以藜香正气散解之

一 厥阴之证而寒热者以小柴胡汤解之

不寒热者以五苓散渗湿

一 小阴之证而狂言妄语热甚者以小柴胡汤急救之 狂言

妄语不為者以升葛根湯解之



右六经之常变二者细理并证而通此理而可治勿因脉

右之主治冬遇此症则傷寒之治也 春遇此证则温病治也

復遇此症則暑病之治也
秋遇此病則溫病之治也
病雖無違變時氣轉變之各異也信而求正理耳



脈解動弁

夫脈者先天後天之妙理而非氣非血離血氣而木血氣醫教
大理玄妙之奧儀之故難得而神故亦在掌



凡脈於一指一動之所藏者有考右傳認難經具外曆代之
醫書皆藏符之品說雖其多其理數量而非得理故內經脈
要悟レ依故言具理述愚意見察而傳永久

一藏血也腑氣之氣浮血沉之藏阴之腑阳也



右動脈以氣血知部位明記也他流守舌傳之言立流義

當流離古傳言守理為流儀故五藏六腑名言不用直達三
焦氣血之虛實動者也因各為工夫則明病吉凶是近
一左寸浮則上集之知熱証

關浮則左眼中集為熱症
尺浮則左下集之為熱症

遲沉則寒數浮則熱有

一右三部之脈如此

右之脈傳者雖非至理入奧室之妙理記死生吉凶之序也
深心而學者達正理

家藏理盡集卷第五

被華

夫萬病之證累不百端雖其數量無窮古聖之心法內外因證
推揆則神妙在易簡中



是六淫云外感因是也

喜怒憂思悲驚恐

是謂七情內傷因是也

右外因內因之解也外因皆有矢感入則傷血從外入內病
因也內因皆有氣作病則人傷氣從內發外病因也有內外
十三名目共當流別傳之解感在十三合為四因此理易曉
而易達也

凡濕結散四者內外因證也
寒暑燥火四者皆風濕之用非正因

散々結々々散々
喜怒哀思悲驚恐

結散二者七情之本也七情內因病證皆氣之結散從生謂也
如此略而通本元當流別傳解感也因此學者可病窮因證

一外感主治癸散滲濕無效
一內傷主治補浮之無效
私曰補者行者止理浮者止行之理也

癸散凡濕散結滲濕補浮

依之外感內傷之求正治

當流日用之治方動并

- 四君子湯
- 十全大補湯
- 滋陽降火湯
- 四物湯
- 二陳湯
- 六君子湯
- 六經討湯
- 八物湯
- 平胃湯

右九品之方七情內用之的方也
依証施劑則愈病効甚降也

- 敗毒散
- 五苓散
- 小柴胡湯
- 右拾二品之方外感六淫之的劑也并証用之甚其効妙也
- 參蘓飲
- 除濕湯
- 大柴胡湯
- 香蘓飲
- 滲濕湯
- 枳實大黃湯
- 霍香正氣散
- 黃連解毒湯
- 小養氣湯

家藏理盡集卷第五拔華終
右一紙先生德本老人之撰書拔華而今具傳授者也

万治三子九月吉日

水味奇應臨

默本書

婦人動弁

女子之百病男子無異也唯月事胎

產耳

月事虛實動弁

一月事不通

實腹痛而能食而不熱
虛腹痛而不食而熱

婦人百病皆從心生脾之母故心病則脾為之疾是以婦人
百病心脾之疾二藏余藏受虛實鮮實証不通者補血順氣
為主四物湯加木香縮砂香附子虛証不通者補血除氣
為主四物湯加空切柴胡
亦之月事混雜之証可推耳
右虛實二証通而百

胎前

動弁

胎孕之婦人六味地黃丸以胎前可保養無病之雖為婦人至
七八月此丸用產難除患臨產

一動弁

向產婦人通身直含氣不可急息離經頻而出生近時兩眼
之下抱坐帶令離呼吸入力息時即生

難產動弁

不生之難 而不平產時
木通 瞿麥 牛膝 紅花 紫蘇 香白芷 榆白皮
中各 枳壳 白朮 黃芩 各小

右拾味大服調合而天日八分目一度用假為胎死共三服
之後出生是家劑之妙方也

產後動弁

產后一臈之內

有病施治 一二茶別

當飯 人多 黃善 白木 柴胡 各女
右六味調合而先三服或五服用右症隨可絕某俗醫產後
不窮正理此故初劑施病症通達某還括笑者有產後五藏
六腑三焦皆正氣之位離外浮散故右一方正氣補備浮散
氣良劑也先之後治症術其義明効也 名傳神醫之醫案
而為當流之法亦得

九月吉日

水味存應臨

默本書

家藏理盡集卷第六

核華

小兒之部 撮口疳風動弁
凡小兒誕生之日一七屋一腸之內藏疳氣血未全故病

疾無諸症唯撮口疳之二証而已

一 小兒一腸之內發熱通身赤或紫色成牛足握搐眼見結
如死撮口發熱事如火是撮口云故撮口書此病出生而受
アラス在胎中其母倒或心氣動支積驚搖故其氣兒之体中
止出生之時發而作撮口

療治法雖在種令非直或亦振某或亦煎湯或凡某亦之亦品
雖在數十一二之症七八皆在害施之考治療之法有七八
之害藏疳氣血不全故 雞為某力効故也是故當流不用
剛劑之某水効散耳執二數程乳先付可也如是一晝夜之
中及十度用時撮口立消散而其兒全是當流之秘義之臨
病可見其奇耳

一 疳凡之証大槩雖似撮口病因在易疳緒効時從効口凡邪
入心肺二經疳成此病兒腹從中通膈上顯青筋則病之
雖施百治無効某劑止為異灸治 青筋從上方口可
灸效成程女而亦其下可灸如此段々下灸下跡青筋消也
住筋法有限可灸切是其治也筋消後敗毒散水効散振也

女為調法此筋登鳩尾連後心則不治之症也古傳云令誠實也

痘疹動弁

凡小兒出生之日男子十六歲女子十四歲皆小兒云此年
月之丹從生下日每三十一日熱氣苦也是非病先天之真
氣後天之邪氣混雜故其文氣之時亮熱是骨髓真邪二氣
含入故也不榮治自一歲至五六年此証外雖知十年以後
其証難見此轉愛之氣腎命門入天道火氣之運逢時作痘

一 小兒凡症之如咳嗽或吐乳亮熱或牛足搐搦眼見結或渴
或不渴等之証痘疹多痘疹之見証一同也雖邪中氣中血
之有不同中氣者為疹中血者痘成痘序病不強疹甚
強死入事有度夕証多

療治痘疹共不出時 外廣葛根湯 敗毒散
參蘊飲 右三方撰而可亮散物快見後茶止

三方之異

渴甚者 外廣葛根湯 以亮不
風証甚清涕或搐搦多者 敗毒散
咳嗽甚夾疼者 參蘊飲
右三方之內 因証撰可亮散

表裏虛實之動弁

痘疹不亮時而後熱甚二便結者表裏共實証也熱甚大便
瀉表裏裏虛也 大便結熱少者裏實為虛 表裏之
實症氣降血可涼 枳壳 枳實 黃連 連翹

表實裏虛之証散瓜那可補胃防凡獨活白朮陳皮
裏實表虛之証血破可補中氣大黃枳實黃芩紫胡耳中
右臨時從其症可施茶劑右方付大槩述至病非為必之表
裏虛實非瘡疹耳小兒渡諸証不可失此理

痘疹始狀中比。變惡証成事在表裏兩實之者。八水効散。九
用。有效兩虛之者。八物湯或補中益氣湯以可救色赤凸成
為吉

瘡疹出耳尻熱甚惡証也

瘡疹眉之通額多見惡証也
大底實証為吉虛証為凶

瘡疹兩者皆兩腎之變化也
寒天之時節當瘡疹難出

其外涼寒之法。此理可弁俗醫過瘡疹難出
理中湯等施溫劑誤人不女可動弁

錢氏異功散之屬以溫可
非他藏

驚風動弁

凡小兒不時俄絕入眼見絕不轉牛足搐搦熱甚是驚風致所
也。發醒在發時牛足握上鼠如死入是母胎先天動搖
之氣後天爪疼致所也

治驅痰散凡以為主。敗毒散。雖為王方當流別傳之
有治方。南子丸為煎湯用間南子丸用全。是急驚治也

慢驚云唯不發小兒顯病后病也見証急驚同併急驚唯見病
症慢驚病後發以是可弁慢驚脾虛生

四君子湯。主之挾痰者。六君子湯佳也元氣下陷而在
浮下者。補中益氣湯之品慢驚之治也可動弁

馬脾凡之一証在不異急驚見証同雖然山嵐之障氣或感風
濕而發是馬脾凡云治方急驚治主之可弁

右驚風之治也。古傳又十之雖有之小兒之內內因女
故先天後天之理推為本故急慢之二証驚風之極也風之
一字可考

丹毒丹疹之動弁

凡小兒熱甚通身赤丹毒云所々有赤紋丹疹云形田由俗語
知言物也二証皆熱毒証也。心肝腎三藏相火扇動淫
故

治方。去參茸廣湯。以救三五點而不効者危可動啟
疳病動弁

凡小兒撮口將凡變熱熱痘疹驚風丹毒丹疹此外皆疳病也

痺五法有脾胃之虛實所究云云可極痺之一字為冠年
 書也 耳中焦脾之味也故痺名什然俗醫台傳名目十
 々成惑品々說立皆非也當流者五痺真說為本依理直可
 極正治枝葉勿為法
 五痺眼見眼中青色見乳食氣肝膽滯痺虫生白見肺大腸
 滯痺虫生異見腎膀胱滯痺虫生皆乳食積所成之謂也可
 動并

治方之大底

錢氏白朮散 主之
 木丁 藜蘆
 參苓薤木 各等

一 肝痺 實見 虛見
 青皮 枳壳 麥芽 加
 當歸 神曲 加

肝 實熱而眼中青
 虛涼而眼中青

一 心痺 實見 虛見
 黃連 生地黃 麥芽 加
 當歸 遠志 麥芽 加

心 實熱而驚眼中赤
 虛涼而驚胸中怔忡而眼中赤

一 脾痺 實見 虛見
 葛根 益 山查子 加
 白朮 益 當歸 山查子 加

脾 實不能食而渴眼中黃
 虛不食而眩脹泄瀉眼中黃

一 肺痺 實見 虛見
 桑白 防瓜 山查子 加
 桔梗 五味子 山查子 加

肺 實喘咳而眼中白
 虛面色白フサケテ眼中白

右五痺之治大方如此當流之醫案也雖然醫者守常趨變臨
 機應變術也 五痺百千之治非此外無余說此義十六七
 全餘症臨時可設其治耳
 右小兒亞科之術先師寫記錄授焉 矣

九月日

水味存應臨

默本書

家藏理盡集卷第八

後華

奇効茶劑勸并

九散之部

一水効散

滑石

土瓦破ヲ去テ真白之物用清水ニテ細末ノ已之劑ヨリ至申之劑三交
水ヲ替テ水ヒヒノ乾也

耳草

黃丹

十糸交水ヒヒノ乾也

右三種細末而滑石耳之二種合後黃丹也入是茶之色

桃花色程加減用入此方古傳天水散加料黃丹加者
也

功能之事

一 切上突頭痛或目赤等証小便淡或色變

一 凡証清淨等流

一 小兒一切之病瘡瘡色惡變

一 婦人胎氣難產婦人每產逆子或不生等者臨產期日五分

一 服一服平產然其婦虛証躄瘦常不食証可斟酌

一 雖平產然其婦虛証躄瘦常不食証可斟酌

一 切之熱証

一 切之渴証

右此能習用此外百病有効神方然共可用証目當有至
虛証之者不食常成無効有甘共熱小便碍在渴証ナト見不
六虛凡凡用テ有効

右暖水冬湯而可服

一通神丸

黃連、黃芩、大黃

其終不用又火之折リテ上皮果ム程燒テ火ヨリ取出シ
刻ム生ト黒燒ト之中令ニ火カラ用燒過ハ茶カ弱
成テ初ナシ火タラ子ハ茶カ強テ証ニ依テ料
敵多シ此燒加ケシ依テ方中之妙在リ

右三種等合細末食糊而●丸大人小兒婦人不撰病人之
大小依丸散料可用此方古傳之三黃丸虎之製法料也

功能之事

大便澆或秘結

切之熱虫之証

瘡之類或小兒頭瘡或當世之肥前瘡鮮瘡ナト云証

百病実成者甚有効 虛成者ハ効ナシ

白湯ニ逆下ス

嚴効丸

大黃 乾姜 巴豆

皮ニクヲ去紙ニ包打ヒシキ油ヲ取更七返

右三種等分細末糊以●丸二枚或三枚白湯ニ逆下ス此方
備急圓也 食傷其外鳩尾下腹内急痛者用吐下在後依
方補養此丸蓋一通之權茶也

神効散

山梔子

不抱多也皮ヲ去仁ヲ黒ク炒ル

右一味細末生薑之皮ヲ摺湯入辛味甚而其中五分入批
立用是心痛胃脘痛俄欲死救之神方也

大室丸正月之代ニ陰乾皮肉核共用香色炒細末拾分

連翹

木香各五

檳榔子

黃連

山查子

各二分五分

右六味細末

糊丸病人大小依丸散料十枚或二十枚

塩湯而逆下ス

功能之弁

一 痰咳湯用

一 厥痛

一 痢疾利急後重

一 食傷

一 疝氣温酒以下入

一 寸白 蕎麥粉

一 損傷高所

一 能不可勝

薄茶一服程入抗立其湯下下入
落或倒息不足肩息不三温酒下下入其外功
計是秘方也

一 南子丸

和 小人多 白木 茯苓 半夏 陳皮 天广 羌活格
年 中 女 青黛 衣 入

右細末，糊丸，拾枚或二十枚宛白湯而逆下，此方六君子湯，天广，羌活，加夕儿者也

功能之并

一 風疾或頭上攻炸眩暈頭痛等之証常用甚在神効
一 小兒急驚慢驚馬風等之急証甚有効其外百病用不妨

小兒丸 青黛 夜常用養性之一助也

右六方之丸散常用日用之劑也 玉室之二方上焦之元氣降中下之二焦而百病在効神方共上元六十年中百病在効中元下元不宣全

一 驗效散

二 酢漫乾少炆

香附子 三兩 一兩酒漫乾少炆

二 褐色二炆

白木 三兩 褐色

右二味細末，冬夕一服十廿一夜，温酒或白湯而逆下

功能并

一 婦人百病甚有効血証 胃子佳也
此方伯別 逢世之修行僧相傳受方也 方中制法有所誤
故常婦人之頭痛，氣重眩暈 用得神效寔神方也

藥品用捨之勅并

| | | |
|---|----|----------------|
| 潤 | 人參 | 茶性潤性故潤名付 |
| 魂 | 芍藥 | 肝入故魂名付 |
| 補 | 黃芪 | 餘茶雖有補浮補一返成故補名付 |
| 徹 | 川芎 | 血中外降走茶徹走心故名付 |
| 標 | 半夏 | 痰之標治故名付 |
| 溢 | 地黃 | 水益故名付 |
| 水 | 黃柏 | 三集之水通膀胱浮故名付 |
| 枯 | 黃芩 | 茶性カク性故名付 |
| 燥 | 黃連 | 茶性口カク故名付 |
| 魄 | 吉更 | 肺中專入故名付 |
| 養 | 當歸 | 血中陽養陰う生茶少故名付 |

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| 滲 | 茯苓 | 水下濕ラモラス故名付 |
| 屈 | 山芫子 | 三焦遊行ノヨコニ能通火浮故名付 |
| 利 | 陳皮 | 氣利カ力故名付 |
| 緩 | 耳草 | 脾ユルヤカ成ラ主故名付 |
| 除 | 白朮 | 濕ラカワカス内ニモスキトカワカス故ニ除ト云 |
| 端 | 蒼朮 | 兩端ラ汎ラ濕ラモラス故名付 |
| 泄 | 厚朴 | 氣上濕ラモラス故名付 |
| 消 | 神麴 | 食、氣能消ス亦久服スル真氣ヲモラス |
| 磨 | 麥芽 | 食、タマリラミカク |
| 琢 | 山查子 | 食、カタマリラタ、キヘラス |
| 中 | 香附子 | 血中、氣茶トテ氣ニモ血ニモ中ユク故名付 |
| 醒 | 縮砂 | 脾胃穢食ケカレタルアラタメ調 |
| 頤 | 葛花 | 解毒ラサカス |
| 衝 | 白豆蔻 | 是、家ノ古來カウノ作名付 |
| 吐 | 木香 | 殊上氣ヲツキノホス |
| 結 | 生薑 | 是モ作り銘 |
| | 乾姜 | 中焦下焦氣ヲケツマスル物 |

損 温 益 温 洒 左 右 温 益 温 洒 損

青皮 沢泻 麥門冬 五味子 肉桂 柴胡 草豆蔻 羌活 獨活 防風 何子園 丁子 山茱 薏苡仁 篇豆蔻 蓮肉

能胸膈ノ真氣ヲソコナフゾ
膀胱水ヲソ、キタテ、通クダスゾ
心肺元氣火制セラレテ衰ラウルラスゾ
肺中氣腕腎中モ陽スクナクナルヲマスゾ
偏血寒ヲ温ムルゾ
下縮陽氣ヲ右柄引伸セラ胃中ノ本位ニ還スル
左ヨリ伸テ同シ
作リ銘ゾ
上焦ヨク行ジ中ニモカイナヒナクノ痛風温ラムク
風ヲ能サスルゾ
能氣血ノ絶スルヲキツ、クルゾ
淡テスルハヤワラカナラ堅ムル心ゾ
能寒氣ヲ温ニテシカホル様ナリ
腎葉ノ内毛取分テ腰ニト、マルラツヨクスルゾ
能脾ノ氣浮メテ暈ヲヨクスルゾ
作リ銘ゾ
腎中ノ精氣ヲ益ゾオトスルゾ

快 發 切 歛 寔 問 盛 寧 藎 巖 潤 實 清 滯 理 渴

藿香 葛根 草菓 烏梅 遠志 桂心 酸棗仁 茯苓 牡丹皮 附子 廣黃 大黃 蒺藜 枳壳 枳實 白芷 知母

脾胃中ノ濁氣ヲキヨクシテ快スルゾ
經中藏中ノ惡氣ヲソ、イ、出スゾ
茶性能物ヲ切心有ソ瘰ノ切葉ニテ心得ルゾ
能サニワシノヒ氣血ヲ斂ムルゾ
心中ノ真氣位離テ浮ミ怔忡スルヲ寔ムルゾ
表ヲ能閑ルゾ
心肝ヲ強ク盛ニナスゾ
心中ノ氣トクト上スハラヌラマスクラクゾ
作リ銘ゾ陰中ノ火ヲ浮スル心ニ作タゾ
茶性毒熱有テ能クシク通ゾ
腰理ヲヒライテ能汗出スゾ
理名也實証ナテハアタヘヌト云心ゾ
頭目ライサキヨクスル本位ノ性ゾ
滯氣ノ証ニ專用ソ無滯氣手ハ損真氣ヲ
能大腸ノ中ノ熱ヲ浮シ下スゾ
血証寒氣ヲ能ラサムルゾ
膀胱ノ中ノ邪熱ヲシカハクテワルラスゾ

| | | |
|---|-----|----------------------|
| 令 | 猪苓 | 下ノ字ノ中ノ一ツヲトルゾ |
| 澄 | 薄荷 | 某性ヨクスミテカロク往來スルゾ |
| 排 | 連翹 | 能膿血ヲ排心ノ經ニワサワイナカラシム |
| 平 | 杏仁 | 肺中高下ノ氣ヲ能タイラカニスルゾ |
| 狂 | 十排仁 | 血乱ノ証ヲ治スルゾ然故ニ狂氣ヲ治スルゾ |
| 狂 | 細辛 | 頸腦ノ濕邪氣血疝ニ重キヲカロクスルゾ |
| 兼 | 前胡 | 風痰ノニ方通シテカ子治ゾ |
| 乱 | 紫菀 | 血風氣風ノ胸膈ニ乱ヲ散ハテウゾ |
| 腫 | 大腹皮 | 根本ノ某性血滯ヲ流通スルゾ故ニ腫ニ專通 |
| 蒸 | 地骨皮 | 骨蒸ノ熱ヲ治スルゾ第一也 |
| 新 | 紅花 | 瘀血ヲ破失シテ新血ヲ生フ生長ノ方ヲリテゾ |
| 津 | 滑石 | 津ヲ生出ソカハクヲウララスゾ |
| 焦 | 石膏 | 三焦ヲ能治熱ヲサマスゾ胃熱ヲ治程ニゾ |
| 甲 | 鱉甲 | 下ノ一字ヲトル |
| 四 | 青蒿 | 爪疼濕寒ノ四ヲヨク通治スルゾ |
| 更 | 粳米 | 古來カラ家ニカク名ヅキタルゾ |
| 屑 | 犀角 | 屑云心ソミエタルゾ |

通

芒硝 能大腸ノ滯結ヲ泻下ゾ
 皆用禁戒品味
 川芎 沉香 丁香 縮砂 良香 乾姜 桂心 茯苓
 酸枣仁 白附子 黑附子
 右諸動熱証忌

枳壳 枳實 枳實
 右下氣虛脫之証忌

沢瀉 香薷 猪苓
 右自痢眼疾忌

防風 烏朮 香附子
 右燥証忌

生地黃 地榆 黃連
 右胃寒虛弱不食ノ証忌

大黃 芒硝
 右諸虛証忌

荊芥 薄荷
 右頭輕眩暈症忌
 蒼朮 白朮
 右陰血虛症忌

短瀆

指不足

沉細

心ヨクツ者ハトナクドエヤラ氣味相ニシフル心有瀆ト云
浮ト中トノ指ハ全不當骨髓指ヲ押付テ全覺ニ沉ト云
又ラカトハナクテナクカトエマカニ當ラ細ト云

木水火土金

外感 肝腎 心脾肺三焦 風濕

內傷 解

心肝脾肺腎 喜怒憂思悲驚恐

結散

白露ノ己カスカタラソノマニ
紅葉ニラケハリレナヒノタマ

万治三子ノ九月

黙本書ス

古今得効方功能

- 四君子湯
- 六君子湯
- 四物湯
- 八物湯
- 十全大補湯

証二便如常無餘証而唯氣脹々トノ不食者主之
証兼物不食見疼者主之
証兼疼通身裏瘦而百節痛外排者主之
証形体悴氣脹鬱之者主之
証百損氣虛耗或寒見或熱見等者氣血阴阳虛
耗也故主之

二陳湯

証百病不除實疼之者主之

六鬱湯

証久病者百病非効或性盛而常不収者主之

平胃散

証依食滯腹痛或食後不収者主之

滋陰降火湯

証血疼見咳嗽裏純者主之

敗毒散

証大陽之証見清涕有者主之

參蘓飲

証大陽証見咳嘔有者主之

香蘓飲

証小水淡或色變者皆主之

五苓散

証在濕症如熱者主之

除濕湯

証有濕症如不食者主之

滲濕湯

黃連解毒湯

証實熱者主之

小柴胡湯

証少陽証寒熱去來者主之

大柴胡湯

証表証未除裏証見者主之

枳實大黃湯

証便難如痞者主之

小養氣湯

証少陽之証實而火

熱者主之

一實熱

甚而無間斷

則外感也

一虛熱

蒸々而有間斷

則內傷也

一實熱

黃連解毒湯

主之

一虛熱

浦中益氣湯

主之

三粒摺碎

若實熱者解毒不効則方中加五味子

是從治之方也

右二十二方之良劑者皆古方之中有効者採而常用依之求

九月吉日

默本書

萬物始終動弁

天地未分之時有真無極不可得以號理此理大極而一氣始而動而生陽靜而生陰別陰陽而作五行五物成而生萬物之形於是體用全故五行相生萬物相剋而成萬物此故醫者本五行推萬物不知無理有氣冷寒平溫熱有色青黃赤白黑有形圓三四半圍有味酸苦辛鹹有方角東南中央西北水火土金水之以用得真儀惟萬物始終醫之以所為宗也夫醫者始陰陽見五行對萬事發萬理本常而起變化是以人身稟病之治救亦則之分離五行而無所為醫是死生吉凶弁之術也無志之士者聞見聞耳百病起窮根源動弁內經所謂心出血肝納血肺出氣腎納氣平且從實一天至午剝而行陰之分也心師主百病

行陽

恐寒六腑氣不足心火有余

發熱心血不足肺氣有余

脾虛胃實

胃虛脾實

行陰從午刻至己一
行陰之分也肝腎主百病

兌熱肝血不足腎氣有余

惡寒腎氣不足肝血有余

脾者諸血之本胃者諸氣之本也

右兌熱惡寒以謂之其兌熱惡寒而已

百病皆行陽行陰以候兌起則瞭然識病藏是當流義之要術也唯授一人之醫案敬而可秘

五藏虛實百病之因證劄弁

行陰

肝

實則生風熱脾為之虛

虛則生眼疾肺為之實

心

實則生兌熱肺為之虛

虛則生惡寒腎為之實

脾

實則生脹腎為之虛

虛則生世浮肝為之實

肺

實則生喘咳肝為之虛

虛則生熱痰心為之實

腎

實則生水病心為之虛

虛則生燥病肺為之實

右五藏虛實之轉變明察之解也

五藏主脈劄弁

以弦長候肝虛實

以洪大候心虛實

以遲緩候脾虛實
以沉細候腎虛實

右十件之脉者考五藏虛實之妙術也 當流日用診候

以短濇候肺虛實

五邪動弁

肝兇虛則脉無力
見弦長

之見弦長兇實則脉有力

心兇虛則脉無力
之見洪大

之見洪大兇實則脉有力

脾兇虛則脉無力
之見遲緩

之見遲緩兇實則脉有力

肺兇虛則脉無力
之見短濇

之見短濇兇實則脉有力

腎兇虛則脉無力
之見沉細

之見沉細兇實則脉有力

證見肝病脉得短濇者尅賊之難治危

證見心病脉得沉細者尅賊之難治危

證見脾病脉得弦長者尅賊之難治危

證見肺病脉得弦長者尅賊之難治危

證見腎病脉得遲緩者尅賊之難治危

右尅賊察有無考其旺介而吉凶死生可理
假令春而見肝病脉得短濇者雖過尅賊有免秋而見肝病脉
得短濇者必死餘皆例之可推
右十件之脉以病者之安危吉凶死生考之故解也當流之公
案也喜不可說

百病氣血痰三都動弁

行阳行阴之考兇起百病有氣有血可知
行阳行阴之兇起不偏混雜而兇起者皆痰証之一也考虛實
以可施治

右當流見解之妙術也可秘

虛痰實痰之動弁
能食而見痰証者實也若見熱証者實中虛痰也消痰清熱

而名補脾為主

不食而見疹証者虛疹也若見寒証者虛中寒疹也補脾而后可消疹

右虛實二証之疹由之可知百病之虛實亦由之也

三焦通達之氣味動弁

心肺上焦之藏脾中焦之藏肝腎下焦之藏氣熱達上焦溫平達中焦涼寒達下焦味辛達上焦耳達中焦及上焦酸苦鹹達下焦百藥能毒辛而溫是其藥之非正氣辛而熱其藥之正氣則氣味全肺氣血全通達而其氣味不流餘藏辛溫其能有肺而兼脾氣通達氣味以為體以氣為用此理推餘皆倣之氣味功能可弁一藥之能知其藏病事知則從此理明可知味辛熱酸苦鹹寒耳平溫兼是皆能辨用備一藥中異此氣味皆兼他氣味是百藥功能知其藏百病功能明真法也可秘也

當流奇功之動弁

熱証甚強無新間通而熱外感之熱病也有堯醒甘之不强蒸々々熱凡內傷之熱病ナリ

外感之熱ハ 黃連解毒湯

主之

內傷之熱ハ 補中益氣湯

主之

內外之熱病雖絶百治熱不去則於主方之中五味子三粒摺碎合亦不去無熱當流奇功神劑之

當流的方動弁

流証ハ五流共一可截

小紫胡湯加常山二三貼而試而截此不抱脉寒熱往來之証百堯百中之方也

吐血衄血皆熱証ハ火外上而上盛下虛也大使小使數利下盛上虛也

口鼻出血之証清熱之劑主之

二使數利之証外上之劑主之

吐血 生芩 木 生耳葉 木丹 芩 栝 版 各

衄血 莖 芍 藥 丹 各 生耳小

大使泄瀉新病五苓散之類水濕下

後補中益氣湯以補益

小便數利八物湯或十全大補湯或補中益氣湯
隨証補益

一神靈丹 揔秘之方

- 靈砂 人參 炒沉香 當歸 酒制 白朮 福色 益智 去皮各兩
- 黃連 毫 桔梗 去芦 黃柏 去皮 連翹 去肚 防風 前胡 各二分
- 丁子 去頭 青木香 香附子 福色 白豆蔻 去皮 白豆蔻 煨 紙包
- 陳皮 去白 茯苓 去皮 良香 炒 訶子 煨 天 各二分 川芎
- 細辛 射香 著先煎ノ油ヲ付 竜腦 辰砂 水干 竜腦 燒
- 各一朱 右二十八味 揔抹而白蜜煎抹去火氣出

涼而練

功能

中凡小兒驚凡 疹証皆生 姜摺湯 執立其外 凡病用疹
切氣付之 然故急証用吉常 可用氣血至 襄惡寒患者 亦宛常
用吉然 凡多用或久服禁

右之一紙 匠人日用之 公案之當流之 秘藏之 然而如有一掌口
岡唯真之一而已

惟時万治三年 庚子十月日 水味存應默本書

醫師

寺嶋俊安

