脚氣新論

k 28

F
カー53

493.13
K2-4
No.2493
1R K28

慶應義塾大學醫學圖書館

慶應義塾大學醫學情報センター
昭和47年7月12日

富士川文庫

2871

與三原良適書

過日脚氣新論御恵借被下早速一過讀辱存候
三浦子數十年經驗イタシ候實際ノ論ニテ臆斷
ノ卑キヲ感服イタシ候但シ唐侍中ノ
方越婢加朮附等ハ先輩後進トモ比ニ効驗ヲ得
テ吾人ノ親試目撃スルトコロナルニ此二方ヲ用ザルハ
缺典ノヲベシ更ニ桂枝木香呉茱萸烏頭附子
ヲ缺ノ用ヒズト云ヘルハ此翁ノ癖ニテ通論ニ非サルニ似
タリ其他ハ先間然スル事鮮キ欤ト覺候其試用ノ方
必定唐宋以還ノ方ナルヘケレモ其出典ヲ擧ケズ且方
名ヲ改タルハ享保以來ノ弊習ニテ未靴ヲ隔テ痒

九折堂山田氏圖書之記

ヲ捻クノ識ヲ免レズ今其出典ヲ探リ得タル方ノミ
ニヲ識シ御目ニ掛候審ナラサルモノハ他日ヲ俟テ
補ベシ余ハ面晤ニアリ不一明治九年一月椿庭老
人
池田全蔵スルトコロノ一貫堂方論ト云フ書文化五
年奥州白河ノ醫盤瀬策君民著ストコロ其書ヨ
レト大同小異ニメ醫案稍多シ今改ルニ浦道齋著
ストコロ冠スルニ方技ヲ稟粹トイヘルヲ見ルニ恐クハ他人
ノ書ヲ稟粹メ稍已レガ意ヲ加ヘタルモノナラン欤磐
瀬子ノ方論ハ自序モアリテ頗ル備ル他日更ニ熟攷
スベシ椿庭又識

脚氣新論諸方出典攷

獨活散邪湯 獨活 檳榔 木瓜 紫蘇 大腹皮 川芎 陳皮
白朮 沈香 生薑 甘草 右十一味

即和劑局方三和散去羌活代獨活去木香加生薑
卷三諸氣門 ○按三和散原出孫用和傳家秘寶名大
三脘散用獨活不用羌活

大檳榔湯 檳榔 木瓜 紫蘇 防風 沈香 木通 枳殼
生薑 甘草 李仁 桑白皮 羚羊角 右十二味

婦人良方桑白飲可若乃卷四桑白皮散方中去防已木
香紫蘇子青皮加紫蘇防風沈香枳殼羚羊角
犀角茯苓飲 犀角 茯苓 沈香 烏藥 川芎 甘草 右六味

黑豆檳榔湯 桑白皮 檳榔 茯苓
即外臺崔氏療脚氣遍身腫方
犀角檳榔湯 犀角 檳榔 厚朴 枳實 沈香 半夏 茯苓 防己 蘇子 紫蘇 陳皮 川芎 生姜 甘草
右十四味

道寸水大腹皮飲 腹皮 陳皮 沈香 枳實 鳥藥 紫蘇 蘇子 檳榔 子 犀角 右十三味

即濟生方大腹皮散 枳殼代枳實加犀角 卷一廿二ウ ○醫方類聚卷九十六引杜壹

降氣旋復花湯 旋覆花 犀角 前胡 半夏 紫蘇 桑白皮 茯苓 生姜 右八味

即聖濟總錄旋復花湯去杏人加半夏 卷八十二ノ十二ウ
○聖惠方旋復花散有大腹皮枳殼無桑白皮紫蘇

鷄鳴散 紫蘇 檳榔 半夏 厚朴 木瓜 茯苓 陳皮 姜 右九味

犀角蘇子湯 蘇子 陳皮 厚朴 前胡 當歸 半夏 犀角 沈香 檳榔 右九味

即蘇子降氣湯去甘草大棗桂心生姜加犀角

旋覆代赭石湯 旋覆花 茯苓 代赭石 絲瓜 右四味

隆毒犀角飲桑白皮沈香防己木通厚朴郁李仁茯苓檳榔蘇子犀角生姜右十一味

七石鎮氣散大黃乾薑龍骨寒水石滑石白石脂紫石英赤石脂石膏牡蠣甘草右十一味

即金匱風引湯去桂枝

天台烏藥散烏藥木香甘草香附青皮良姜檳榔川楝子右七味

聖惠方懷香散方藏香子苦楝子檳榔木香青橘皮本事方治小腸氣不可忍者方烏藥良薑甘草右十六味

薑苗香青皮按蓋合此三方名天台烏藥散

加味蒼柏散蒼木麻黃白木知母黃柏黃芩檳榔木通犀角白木甘草生芎藭防己右十味

即蠲痹湯入門加味蒼柏散

防己飲防己蒼木黃柏生芎川芎檳榔木通犀角白木甘草右十味

即壽世保元防己飲

當歸黏痛湯當歸羌活猪苓澤瀉黃芩知母蒼木葛根升麻防風白木甘草右十三味

即蘭室秘藏拈痛湯去人參茵陳

大犀角湯犀角白木防己黃芩陳皮茯苓大豆前胡蘇葉紫蘇梁白皮生姜麝香右十三味

即千金卷七大犀角湯去香豉大棗桂心加大豆麝香

小犀角湯犀角麻黃防風獨活防己川芎白木當歸黃芩杏仁石膏生姜羚羊角甘草右十四味

即千金卷七犀角麻黄湯去桂心

脚氣新論

道齋三浦茂樹　輯録

蓋シ今世脚氣ト稱スルノ病上古ニ在ルヲ聞カズ故ニ黄帝内經ニコレヲ論シタマハズ中古ニモ其症稍輕ク稍少シ兩漢ノ間コレヲ綏風ト名ケ或ハ脚弱ト云然レトモ未タ治法ヲイハス後漢ノ仲景金匱要畧ニ始テ脚氣ノ目及ヒ治方ヲ挙タリト雖トモ全カラス唐ノ孫思邈千金方ニ其治論ヲ立テ、曰ク此疾ハ風毒ニ感スルニ因テ致ス所也ト純ラ王壽

ノ外臺秘要嚴用和ノ濟生方及ビ聖惠方聖濟總
錄等ニ審ニコレヲ辨シ其他元明諸家ノ論說治
方多シト雖トモ脚氣ノ行ハル、ヤ古今齊シカ
ラス土地ノ殊ナルアレトスルニ或ハ簡ニシテ
ハ繁ニシテ其要ヲ摘ムコトアタハス是ヲ以テ
今世此症ニ遇テ治ヲ誤ルモノ少カラス此レ無
他其候他病ト異ナルコトヲ識得セサルカ故ナ
リ予竊ニ其診候他病ト異ニシテ同シカラサル
所以ヲ精覈スルニ脚氣ノ病タルヤ其因地中陽
濕ノ濁氣發升シテ人ノ脚脛ニ中ルモノ是也其
邪地中ヨリ來ル然ルトキハ人コレヲ覆ムトキ
ハ其氣脛脚ニ中リテ病コレヨリ起ル故ニコレ
ヲ脚氣ト名ク其邪ニ感スルヤ多クハコレヲ覺
エス初起輕微ニシテ他ニ苦シム所ナク飲食氣
力平生ニカハルコト無ク唯脚脛微シク痲痺ス
ルノミ或ハ一紙ヲ隔テ、コレヲ摩スルカ如ク
ニオホユ或ハ微シク浮腫スルモ有リ此ノ如ク
微患タルニ似タリト雖トモ遂ニ大患ト成テ死
スル者少カラス其劇症ニ至テハ卒ニ兩脚屈弱
シテ動クコト能ハス或ハ兩脛腫滿シテ小水通
利セス或ハ心中忪悸シテ大ニ悶エ或ハ少腹不

仁シテ痛癢ヲ知ラス或ハ擧體轉筋シ遍身痠痛
ス或ハ大小二便秘澁シ或ハ兩脚痿弱シテ起居
スルコト能ハス或ハ兩脚及ヒ少腹頑痺シ或ハ
掌急ス或ハ食臭ヲ悪ミ食ヲ見レハ直ニ嘔吐ヲ
發ス或ハ壯熱憎寒シ或ハ胸滿氣急ス或ハ心胸
ニ動ヲ發シ毒上テ心ヲ衝ク其急痞ニ至テハ旦
ニ發テ夕ニ死シ夕ニ起テ旦ニ斃ル或ハ卒ニ發
テ其死踵ヲ旋ラス又ハ待タサル等ノ類其痞多端
ニシテ枚擧スヘカラス又蛊トモ無慮皆一脚氣
中ニ係屬シテ悉ク地中瘴濁ノ濕氣ニ感スルニ
因ル其痞ニ緩急輕重ノ分アルト感スルト感セ

サルトノ差アルコトハ土地ニ瘴毒ノ淺深アル
トト人ニ蘊毒ノ厚薄アルトニ由ル故ニ此疾上世
ニ曾テ有ルヿ無ク中世ニ漸ク幾發シ後世ニ多
ク殊ニ都會ノ地ニ行ハレ邊鄙寒鄉ニ在ルコト
少ナシ其行ハルヽヤ春ノ末ヨリ發シ夏秋ノ間
ニ盛ニシテ冬ニ至テハ絶テ有ルコト無シ然ル
所以ノモノハ上古ノ人ハ質朴ニシテ節ヲ守リ
度ヲ失ハサレハ氣血ノ順行ヨク身ニ飲食ノ蘊
毒ナク又覆載ノ間ニ在テ陰陽二氣ノ升降滯リ
留ルコト無レハ土中ニ瘴濁ノ毒氣ヲ生スルコ
ト無キヲ以テ也今モ亦邊鄙寒鄉ノ地ニ於テハ

草木蕃茂シ家居君少ニシテ地中自然ノ隧道ヲ閉チ塞クコト無シ又ハ鬱濁ノ氣ヲ生スルコト無シ都會ノ地トイヘトモ冬ニ至レハ其氣伏シテ發セサレハ其病絶テ有ルコト無キヲ以テ見ルヘシ此病中古ニ幾發スト雖トモ近世ニ較シハ至テ少ク其症モ亦輕微ニアリシニ近來此病流行スルコト中古ニ倍蓰シ其症モ亦隨テ重ク最東都ニ多ク皇都浪花ハヲノ地ニコレ有リト雖トモ希ニシテ其症モ亦輕シ此ノ如ク近來此病ニ罹ル者多キ所以ノモノハ明德昌平ノ御代ニ生レテ恩澤身ニ餘リ飲食腹ニ滿レトモ飽クヲ知ラス恣ニ膏粱酒肉ヲ味テ形體ヲ勞スルコト無シハ腸胃ニ飲食ノ鹽毒ヲ畜ヘ氣血コレカ為ニ壅閉シ腠理密ニ成テ營衛アシク或ハ慾ヲ縱ニシテ精氣ヲ耗散スルコレニ因テ地中ヨリ蒸騰スル所ノ鬱濁ノ毒氣其虛ニ乘シテ脚脛ニ中レハ也地下ヨリ生發スル濕濁ノ氣ナルヲ以テ上ニ位スル頭面項背ノ如キ陽氣ノ會スル所ニハ犯シ入ルコト能ハスシテ下ニ位スル足脚ノ陰地ニ中ルモ亦同氣相求ル自然ノ理也故所謂陽氣地氣中ニ鬱蒸シテ濁毒ノ濕氣ト成テ脚氣ノ病因トナル其義ヲ

明ラメント欲セハ先此病ノ風土ニ由テ殊ナル
コトヲ識ルヘシ我カ　皇國ニ於テハ三都ノ地
ニ今世此病ヲ患フル者ノ多キヲ以テ見ルヘシ
最東都ニ多キコトハ其繁昌ナルコト貴キ賤キ
驚ヲ爭ヒ棟ヲ雙ヘ咫尺ノ空地ナク方三十里砂
石ヲ聯子テ地面ヲ堅メ隧道ヲ塞ヰ草モ木モ生
スルヿ無ク風モ通スルコト能ハス京師浪花モ
亦コレニ準ス是ヲ以テ天地升降ノ氣自ラ否リ
地中ノ陽氣コレカ為ニ阻隔セラレテ升發スル
コト能ハス地中濕液ノ間ニ欝滯シテ濕濁ノ氣
ト成リ春夏ニ至テ伏陽上升ノ氣ヲ得テ其毒氣
モ亦隨テ發出ス是ヲ以テ察スヘシ春ノ末ヨリ
夏秋ノ間都會ノ地ニ限テ此病ノ多キコトヲ以
テ此氣尋常ノ濕邪ニ非ス陽氣濕ヲ含ミテ欝ス
ルヲ以テ其毒尤猛烈也此氣始メ人ノ足脚ニ中
リ上テ心ニ衝クヲ以テ終トス所謂脚氣ノ毒是
也此病或ハ浮腫シ或ハ腫滿スル者アリト雖ト
モ水腫ト其病因同シカラス同シカラサルカ故
ニ治法モ亦從テ異也所謂今脚氣ト稱スルモノ
ハ蓋シ古脚氣ト呼フモノト同シカラズ世醫多
クハ此義ヲ思ハス其治方ヲ見レハ千金方ノ論
ニ本ツキ動モスレハ小續命湯或ハ越婢加朮附

大棟柳木蘇
九奇驗少カラズ是説篤信ニテ

湯其衝心ニ先テハ大黄檳榔湯木葉九ノ属ニ過ス或ハ姜附辛熱ノ方劑ヲ投シ反テ其陽毒ヲ扶ケ或ハ大黄甘遂巴豆等ノ丸ヲ用テ犬ニコレヲ下シ或ハ蔘附ノ方劑ヲ与ヘテコレヲ温補ス各其理ヲ得ルニ似タリトモ反テ損多ク益少ク遂ニ人命ヲ促スニ至ル此レ其意思ヲ医事ニ精クセス其病因原陽鬱ノ濁氣ニシテ他病ト異ナルコトヲ辨明セザルノ弊也吾カ黨コレヲ思ヒコレヲ察セヨ

痲痺

脚氣ノ症ハ其脚必ス痲痺ス然ル所以ノモノハ鬱濁ノ毒氣下部ニ中テ足脛ノ絡脉ヲ壅遏スル證ヲ為ス然レトモ營衛絶テ循通セストモ云フニ非ス若シ絶テ循行スルコト無レハ不仁シテ痛癢ヲ知ラサルニ至ル唯氣血ノ運行渋滞スルノミ

此症ヲ診スルニ訣アリ其初起ニ在テ脚脛ノ痲甚キモノハ必ス腫滿スルコト無シ假令小水不利シテ浮腫スト雖トモ足脛獨微腫スルノミ其腫周身ニ及スコト無シ又初起ヨリ痲痺劇シク或ハ頑痺シ或ハ両脚痿弱シテ行歩スルコト

能ハスト虫トモ悪候ノ三症ヲ兼子サルモノハ
緩症ニシテ毒氣上テ衝心スルノ患ナシ若シ三
症ノ一ヲ兼ルモノハ急症ニシテ毒氣上テ心ヲ
衝シト欲スルノ兆也其死旦夕ニ在リ況ヤ三症
具足スルモノニ於テヲヤ急ニ其主剤ヲ与ヘテ
其急ヲ救フベシコレヲ忽ニスルコト勿レ
又其初起ニ在テ脚脛大ニ腫滿スル者ハ必ス麻
痺劇ク成ルコト無シ假令微シク麻痺スルコト
有リト雖トモ脚脛獨麻痺スルノミ其痺ハ腹ニ
走リ或ハ上テ心ヲ衝ク等ニ至ルコト無シ又麻
痺ナクシテ腫滿スルノ症其腫イマタ微少セト
雖トモ其脉沉實ナルモノハ此レ水脉ノ閉塞劇
キノ候ニシテ腫脹将ニ周身ニ滿シントスルノ兆
也急ニ其主剤ヲ投シテ其水ヲ利スヘシ蓋シ大ニ
腫滿スルニ至ルノ症ハ必ス麻痺強ク成ルコト
無ク麻痺強キニ至ルノ症ハ必ス大ニ腫滿スル
コト無シ此レ其初起ニ於テ預メ腫ト痺トノ二
症ヲ診察スル吾黨ノ祕訣ナリ初學コレヲ辨明
スルコト能ハス誤テ腫セサルモノヲ腫滿セシ
メ痺セサルモノヲ頑痺セシム或ハ衝心セサル
ノ症ヲモ亦衝心セシメ遂ニ救フヘカラザルノ
症ニ至ラシムルコトタシ恐ルベシ慎ムヘシ

レヲ審ニセスンハ有ルヘカラズ
蓋シ其腫ナクシテ麻痺スルモノハ鬱濁ノ氣ヲ
感スルノ初メ毒氣水血ニ絡ノ間ニ走リ血液ヲ
渋ラシ水液ヲシテ水脈中ニ流布スルコトヲ得
サラシム水脈コレヲ得サレハ枯燥シテ腫ル、
コト無シ血液渋滞スルヲ以テ麻痺ヲ生ス其麻
痺輕キモノハ邪毒血分ニ併スルコト薄ク血中
ヲ、清淨ナラサルノミ故ニ血ノ渋リモ微ク麻
痺モ亦隨テ輕シ其麻痺甚キモノハ邪毒血分ニ
併スルコト厚ク血液渋滞スルカ故ニ麻痺モ亦
從テ重シ是ヲ以テ腫ナク脹ナクシテ小水不利スルモ
ノハ預ニ麻痺甚キニ至ルノ兆ナルコトヲ識ル
ヘシ又足脚大ニ腫脹シテ麻痺少キモノハ邪毒
血分ニ併セサルカ故也是ヲ以テ血中ノ水液ハ
水脉ニ分利シテ滞ルコトナシ然レトモ邪毒ノ
為ニ水脉鬱シテ水液ノ通利アシク腫滿スルト
雖トモ血分渋滞スルコトナケレハ麻痺少ク唯
腫滿スルノミ也此義ヲ理會シテ其初起ニ於テ
腫レテ痺セス痺シテ腫レスト預メコレヲ識得
シテ其昔ヲ病家ニ示シ且七十日ヲ期シテ癒ユ
ヘキ由ヲ諭シ病者ヲシテ安心セシメヨ此レ脚
氣ヲ治スルモノ、先務也

三候

脚氣初起ニ於テ其輕重緩急ヲ決スルヲ要トス
コレヲ決スルニ三候アリ三候トハ脈ノ候膚中
ノ候皮膚ノ候是也此レ脚氣家ノ先務ニシテ預
メ其輕重緩急死生吉凶ヲ定ルノ祕訣也

脈候

蓋シ脚氣ノ候ハ他病ト異ニシテ其脈候ニ於ル
ヤ緩ナルモノヲ以テ此レヲ緩症ト為シ數ナル
モノヲ以テ此レヲ急症ト為也假令ハ風寒ニ感
シ邪氣外表ニ客シテ腠理ヲ閉塞スルカ為ニ閉塞
シテ悪寒發熱等ノ外症ヲ發シ其脈必ス浮數ヲ
見ハス此レ外感ノ常也脚氣ハ邪氣外表ニ在ル
コト無ク水血ニ二脈ノ中ニ客シ腠理閉塞スル
ニ非スシテ其脈數ヲ見ハスカ故ニ悪寒發熱等
ノ外症ナシ外症ナクシテ數脈ヲ見ハスモノハ
此レ感スル所ノ濕濁ノ毒氣下部ヨリ逆行シテ
脈路ヲ壅遏スルカ故ニ其脈氣下部ニ循行スル
コト能ハス中途ヨリ戻テ心ニ歸ル由テ脈ノ往
來モハヤシ是ヲ以テ逆行ノ毒邪盛ナルトキハ
脈モ隨テ數ヲ見ハスコトヲ知ルヘシ此レ外表
ニ邪氣ナキヲ以テ脈數ヲ見ハスト雖モ浮ヲ
帶ルコトナク悪寒發熱等ノ外症ナキコトモ亦

推テ知ルヘシ此レ其候他病ト異ナル所以也サレハ緩急ノ二病ヲ決スルニ脈ノ緩ト數トヲ以テスルモノハコレ本ツク或ハ脈緊數或ハ緊大ノ脈ヲ見ハスニ至テハ此急病中ノ急ナルモノ、候ト為ス此乃逆行ノ邪氣劇ク上テ心ヲ衝シト欲スルノ脈候ナレハ也

又脈緩ナルモノハ緩病ノ候ト為スモノハ此レ鼓力ナク或ハ細微ナルモノハ難治ノ候ト為ス此レ他病ト其候同シカラサレハ也其初起ニ於テ其候ヲ審ニシ其病ノ輕重緩急ヲ明ラメ病ニ從テ其主劑ヲ与ヘハ萬挙萬當ノ效ヲ奏スヘシ總テ諸病ハ愈ク穩也ト雖トモ若シ三候ノ一ヲ見ハスモノハ急病也速ニ其方劑ヲ与ヘテ其急ヲ救フヘシ必ス其機ヲ失スルコトナカレ又脈沉實ヲ見ハス者ハ將ニ周身膿滿センントスルノ候也其主劑ヲ投シテ其水邪ヲ利スヘシ又脈沉大或ハ沉遲ヲ見ハスモノハ此レ衝痂ノ候也脚氣ト混同スヘカラス

膿中候

脚氣病ニ於ルヤ膿中靜ナルヲ以テ緩病ト為シ動アルヲ以テ急病ト為スコレ此動靜ヲ以テ緩

急ノ二症ヲ決スルノ候ト為スコト深意アリ辨
明セスンハ有ルヘカラス蓋シ心ノ臓ハ動脈ノ
起ルトコロ血脈ノ収ル所ナリ然レハ心ノ臓ヨ
リ逆射スル処ノ血液陽気ノ運動ヲ得テ経脈ニ
灌注スルヲ名テ動脈ト云フ経脈ヨリコレヲ
細絡ニ運輸シ一身百骸ニ布キ及ス其注キ極ル
トキハ又心ノ臓ニ復ル其復ルヤ細絡ヨリ経脈
ニ流レ大幹ニ集リテ心ノ蔵ニ納ル其カヘルモ
ノハ静ニシテ動ナシコレヲ名テ血脈ト云フ膻
中両乳ノ間ハ動血ニ脈ノ大幹動脈ノ源血脈ノ
會スル処ニシテ大経ノ所在也是ヲ以テ臂濁ノ

毒氣經脈ヲ壅遏シテ逆行スルコトキハ營氣循行
スルコト能ハス陽氣邪氣ノ為ニ激シテ膻中ニ
動ヲ發スル故ニ膻中ニ動アルヲ以テ急症ノ候為
スソノ緩症ニ於ルヤ邪毒下部ヲ侵スト雖トモ未
タ壅遏逆行ノ勢ナク唯血液ヲシテ渋滞セシム
ルノミ經脈ノ循行ニ妨ナク滞ルトコロナク陽
氣激スルコト無レハ膻中靜ニシテ動ヲ生スル
コトナシ膻中ノ動氣有無ヲ以テ邪勢ノ緩急ヲ
測ルモノハ此ニ本ツク其動ヲ發スルヤ初ハ臍
上水分ノ地ニ動ヲ生シ其邪毒盛ナルトキハ其
動心下ニ止リ遂ニ膻中ニ及ス其急症ニ至テハ

直ニ膻中ニ動ヲ發スル有リ最危急ノ重症也假
令諸症ハ悉ク穏也ト雖トモ此動ヲ發見スルモ
ノハ急症ノ候為ス殆ンド危篤ニ至ルノ兆ニシ
テ脚氣第一ノ診法也此候ヲ見ハサハ速ニ其方
劑ヲ投シテ其危急ヲ救フベシ若其機ヲ失スレ
ハ立トコロニ死ニ至ルコレヲ恐レヨコレヲ恐
レヨ

總テ諸症劇シト雖トモ膻中ニ動サキモノハ衝
心ノ患ナキコトヲ察スベシ然レトモ若シ三候
ノ一ヲ兼ルモノハ毒氣將ニ衝心セントスルノ
幾發也其幾發ヲ察シテ預メコレヲ治スルトキ
ハ邪毒ヲシテ必ス深重ナラシメスサレハ大方
實ニ執七家ノ緊要也其幾ヲ知ヲスシテ毒氣既
ニ衝心スルニ及フ始テ其危篤ナルコトヲ知ル
豈晩シト謂サルヘケンヤ此期ニ至テハ岐黄扁
鵲ノ神ヲ以テスト雖トモコレヲ如何トモスル
コトアラシ吾カ黨コレヲ忽ニスルコト勿レ水
腫モ亦内攻スルニ至テハ胸間ニ動ヲ生スルト
雖トモ脚氣ノ動ト異ニシテ簫鼓ノ差アリ脚氣
ノ動ハ掌ヲ彈クノ力アリ水腫ノ動ハ其數ヲ減

レ且カナレ此其區別ナリ混同スヘカラス水腫
ハ其閉塞スル処ノ根元水腫ニ在テ血脉ニ在テ
スヲ是ヲ以テ其内攻スルノ急症ニ至ルト雖トモ
水脉ノ根原タル心包絡ニ逼テ敢テ心ニ入ルコ
トヲ得ス脚氣ハ心包絡ニカ、ハラス直ニ心ニ
入ル是ヲ以テ其極ル処水血ノ差アリテ大ニ異
ナル所以ノモノ也世ニ此義ヲ苟且ニシ通シテ
此レヲ衝心ト称ヘ脚氣水腫ノ差別ヲ云フコト
ナシ吾カ黨コレヲ區別シテ水腫ハ内攻ト云ヒ
脚氣ハ衝心ト云フ也

皮膚候

脚氣ノ症ニ於ルヤ皮膚ノ滋潤ナルヲ以テ緩症
ノ候ト為シ枯燥スルヲ以テ急症ノ候ト為ス然
ル所以ノモノハ既ニ侵入スル処ノ瘴濁ノ毒氣
經脉ヲ壅遏シテ逆行スルトキハコレカ為ニ營
衛循行ヲ妨ラレ細絡ニ運輸スルコトヲシコレ
ニ由テ皮膚滋潤ノ常ヲ失テ枯燥スルニ至ル是
ヲ以テ此レヲ急症ノ候ト為ス又皮膚滋潤ヲ失
ハサルモノハ邪毒既ニ經絡ヲ侵スト雖トモ猶
マタ營衛ノ循行ニ障ナケレハ皮膚其運輸ヲ得
ルヲ以テ滋潤也是ヲ以テ此ヲ緩症ノ候ト為ス
也假令諸症ト雖トモ皮膚枯燥スルモノ

ハ急症也吾カ黨コレヲ苟且ニ見過スヘカラス

不治候

脚氣ノ症ニ於ルヤ三候ノ外ニ又不治ノ候ト為スモノ五症アリ知ラスンハ有ルヘカラス五症ト ハ一ニ脉細數ニシテ鼓力ナキモノ二ニ不食スルモノ三ニ大便下利スルモノ四ニ嘔吐止マス自汗出ルモノ五ニ口鼻ノ氣冷ユルニ及ヒ手足厥冷スルモノ此レ其五症也此五症ハ脚氣ニ於テ最悪候ト為ス所也假令諸症ハ悉ク穩也ト雖モ若シ五症ノ一ヲ帶フルモノハ死症也治ヲ許ス コト勿レ蓋シ脚氣ノ候ハ他病ト異ナリ水腫或ハ雜病ニ在テハ五症ノ候ヲ見ハスト雖トモ悪候ト為スニ足ラス虚スル者ハコレヲ補ヒ冷ナルモノハコレヲ温メ各其症ニ隨テ此レヲ治スルニ妨ナケレハ也脚氣ノ症ニ於ルヤ參附ノ方劑ヲ用フルニ宜シカラス澁藥モ亦与フルコトヲ得ス此レヲ用ユルトキハ其陽欝ノ邪カヲ助ケ反テ衝心スルノ勢ヲ増ス是ヲ以テ五症ノ虚候ヲ見ハスモノヲ悪候ト為ス也其脉細微ニシテ鼓力ナキモノハ虚候也此レ元陽虚シテ經脉ニ布キ施スコト乏キカ故ニ脉氣衰ヘテ細微ト成リ且鼓力ナシ元陽虚スルトキハ其虚ニ乘

シテ邪毒益盛ニ成ル也元陽既ニ虚スルト雖モ參附ヲ以テコレヲ補ヒ難シ故ニ死症ト為ス其不食スルモノハ升降ノ氣下降セズ穀胃ニ入ルコトヲ得スシテ皆吐スル也食氣ヲ受サルハ胃ノ氣衰テ藥力ヲメクラス力ナシ故ニコレヲ死症ト為ス其大便下利スル者ハ胃ノ氣下ニ漏レテ邪毒ヲ防クノ力ナシ由テ邪毒恣ニ上逆スルヲ以テ嘔吐止マス自汗出ルモノハ邪氣實シテ元氣虚ス是ヲ以テ勝理衛護ヲ失ヒ汗自ラ漏ル且逆氣ノ為ニ嘔吐止マス故ニコレヲ死症ト為ス其口鼻ノ氣冷エ四肢厥冷スルモノハ胃ノ氣虚寒シテ胃陽ノ氣ヲ布キ施スニ乏シ是ヲ以テ口鼻ノ氣冷エ手掌ヲ口鼻ニ覆テ候フベシ四肢厥冷スル然リト雖モコレニ參附桂薑ノ如キ温補ノ方劑ヲ与フルコトヲ得ス其邪原陽欝ノ濁氣ナルヲ以テコレヲ与フルトキハ反テ其陽欝ノ邪力ヲ助ケ速ニ衝心セシムルニ至ル故ニ死症ト為ス也サレハ右五症ハ脚氣ニ於テハ悪候ニシテ悪ク不治ト為スノ義ヲ明ムヘシ然リト雖モ今脚氣ヲ患フル者ヲ見ルニ多クハ實症ニシ

テ虚候ヲ見ハスモノ少也概スルニ其百人中ニ
二三人ニ過ス
禁下
脚氣ノ邪初メ人ノ足脚ニ中リテ其細絡ヨリ水
血ニ脉ニ注キ逆行シテ心ヲ衝クヲ以テ終トス
故ニ其邪毒水血ニ脉ノ中ニ容テ腸胃中ニ在ル
ニ非レハ下劑ヲ投シテコレヲ逐ニ由ナシ假令
大便秘澁スル症也ト雖トモ巴豆芒硝等ノ屬ヲ
以テコレヲ峻下スルニ宜シカラス脚氣治法ニ
於テ大ニ禁スル所也然レトモ世挙テ此レヲ謂
フコトナク動モスレハ大黄甘遂巴豆等ノ類ヲ
以テ大ニコレヲ下スニ由テ其逆氣ヲ折勢カシ微
ク緩ムニ似タリト雖トモ全ク邪氣ノ退クニ非
ス反テ小水不利スルニ至ル尚下ノ不及也ト愈
下セハ愈劇ク終ニ不起ノ症ト為シ思ハサルノ
死ヲ致スモノモ亦世ニ少カラス吾カ黨ノ士愼
テ禁戒ヲ犯スコトナカレ

禁補
脚氣ハ氣実ノ病ニシテ氣虚ニ由ラス故ニ治法
ニ於テモ亦補劑ヲ禁ス此レ其病因陽欝ノ濁氣
ニ感スルヲ以テノ故也誤テコレニ參附温補ノ
方劑ヲ与ルトキハ反テ陽欝ノ邪力ヲ助テ上逆

ヲ促シ衝心セシムルニ至ル也故ニコレヲ禁ス
若シ虚候ヲ發スルニ至テハコレヲ如何トモ為
ル術ナシ然リト雖トモ此病ヲ患フルトキハ必
ス其病實ス此レ氣實ノ病ナルカ故也平生ニ虚
弱ノ人タリト雖トモ虚候ヲ見ハスモノハ少也
竊ニ此理ヲ精覈スルニ此病ニ於ルヤ邪氣下部
ヨリ壅過シテ漸々ニ上部ニ逆行スルヲ以テ元
氣コレカ為ニ逼テ實スルナリ是ヲ以テ其脉微
弱四肢厥冷大便自利スル等ノ虚候ヲ見ハスモ
ノ有ルコト少シ假令コレ有リト雖トモ其百人
ノ中ニ一二人ニ過キス外來ノ邪ハ初メ上焦ヨ
リ閉塞シ漸々ニ下焦ニ及フ是ヲ以テ虚人多ク
ハ下利ニ至ルコト有リ甚サレハ此理ヲ以テ脚氣
ノ症ニ虚候アルコト少キヲ知ルヘシ若シ下利
スルモノ有リト雖トモ水瀉或ハ滑便五七行ノ
如キハ害ナカルヘシ表ニ氣ヲ導クトキハ其泄
利自ラ止ム若シ下利止マス數十行ニ及フモノ
ハ不治也必ス死ス治ヲ許スコト勿レ

老人

七十有餘ノ老人ニ至テハ脚氣ノ病ヲ患ルコト
ナシ若シコレ有ルモノハ其常ヲ越ユルノ人ニ
シテ其百人ノ中ニ一二人ニ過キサルノミ世上

一般ニコレヲ患フルノ時ニ當テ獨老人ノミ此レヲ患ヘサルモノハ犬脚氣ノ病因タル陽欝ノ濁氣ト稱スルモノハ一種ノ濕邪ニシテ俗ニカビト云フモノヽ屬也此カビ生スルコトナシ少シニテモ滋潤アル物ニハ必スカビヲ生ス老人ハ血液自然ト乾テ潤ナク肌膚枯燥スルコト其常也肌膚乾テ潤ナケレハ其カビト成ルヘキ処ノ濕邪粘着スルコトヲ得ス是ヲ以テ老人此疾ニ罹ルコト少キノ理ヲ辨ヘ知ルヘシ

予嘉永戊申トイフ歳齢既ニ七十アマリ一トセヲ歷タリ秋七月下旬一日脚脛微シク痲痺スト思ヘハ卒ニ少腹頑痺シ兩脚痿弱シテ行歩スルコト能ハス胸腹ニ動ヲ發シ呼吸短息シ煩悶ヲ生スル事數次ニシテ旦ニ起テタニ斃ル、ノ急症ナルモノト速ニ降毒犀角飲ヲ服シ七石鎮氣散ヲ兼用ス其夜小水三合余ヲ通シ始テ生意ヲ得家族少シク心ヲ安ンスル朝ニ至テ諸症半ヲ減シ十劑ニ滿タスシテ胸腹ノ動止ミ呼吸其生平ニ復スル由テ治方ヲ犀角檳榔湯ニ轉シコレヲ服スルコト一百余劑漸ク少腹ノ頑痺退キ兩脚モ亦其半ヲ減シ少シク行

歩スルコトヲ得タリ治方ヲ獨活散邪湯ニ轉シ
五十余劑ヲ服シテ全ク愈エオノレ都會ノ地ニ
住ミ常ニ膏粱滋味ニ飽キ摂生ニ戻レルコトハ
敢テ謂ハス齢既ニ七十ヲ越エテ此疾ヲ患フル
ヤ尋常ナラス未タ津液枯燥セサル処アレハ也
ユクスユ恃アリナントイヘ共我ホノスルモヲコナ
リキ

小兒

十歳未滿ノ小兒脚氣ノ病ヲ患フルコトナシ然
ル所以ノモノハ小兒ハ七情ノ感觸ナク陽氣熾
ニシテ氣血ノ運行ヨクシ元氣一身ニ充滿シテ怠
慢スルコトナシ故ニ濁邪粘着スルコト能ハス
是ヲ以テ小兒此疾ヲ患フルコトナシ假令大人
タリト雖トモ元氣盛ニ氣血ノ運行ヨロシキ者
ハ瘴毒薫騰スルノ地ニ居ルトイヘトモ毒邪ヨ
レヲ襲フコト能ハス元氣内ニ守ラハ邪氣何ヲ
以テカコレヲ侵スコトヲ得ンヤ

婦人

婦人常ニ脚氣ヲ患フルモノ少シ男子ニ比スレ
ハ十中ノ一二ノミ適コレヲ患フルコト有リト
雖トモ其症輕ク且治シ易シ婦人ハ經水期ニ應
シテ順行スルヲ以テ營衛ノ運行ヨロシキヲ得

ルコレ男子ト異ニシテヨレヲ患フルコト少キ所以也或ハ産婦久シク産床ニ坐シ形體ヲ運動スルコトナキトキハ内外ノ氣血鬱滯スルヲ以テ營衛ノ運行アシク其虚ニ乘シテ鬱濁蒸騰ノ毒氣侵入シテ此疾ニ罹ルコト有リ然リト雖モ産後ニ泥ムコト勿シ脚氣ヲ治スルニ宜シ脚氣ノ治方悉ク順氣清血ノ劑ニシテ産後ニ用テ害アルコトナシ

禁忌

脚氣ノ病魚肉膏粱ノ品ヲ禁スルコレヲ食スレハ脂膏以テ脉絡ノ隧道ヲ壅閉シ水血ノ運行コレカ為ニ留滯シテ汚濁ヲ生シ鬱濁蒸騰ノ毒氣ヲ增スヲ以テコレヲ禁ス又房慾ヲ戒ムコレヲ犯セハ精氣ヲ散シ元氣衰フ其虚ニ乘シテ邪毒上テ心ヲ衝クニ至ル病者ヲシテ堅ク禁戒ヲ守ラシムヘシ病癒テ後ニ五十日コレヲ慎ムヘキ旨ヲ諭スヘシ此ヲ敗リ犯スモノハ実ニ元命ヲ私ニスル輩ニシテ癡愚トヤ云ン痴漢トヤ云ン

食法

脚氣ノ病滋味膏粱ヲ食スルニ宜シカラス麤食ニ宜シ故ニ其重症ニ至テハ吾家三味ノ稀粥ヲ作テ此レヲ常食ニ充サシム

稀粥方　赤小豆一合六麥五勺粳米五勺

右三味合テコレヲ煮熟シテ稀粥ト為シ三度ノ食ト為ス

治方

獨活散邪湯　脚氣初起ノ方劑也其症飲食氣力常ニ異ルコトナク、足跗微ク痲痺シ或ハ脚脛一紙ヲ隔テ、摩スルカ如ク或ハ微ク浮腫シ或ハ浮腫セス或ハ小便不利或ハ脚弱或ハ痲痺漸ク膝ヲ過キ其脈緩ナルモノ此湯ヲ主ル

獨活散邪湯方

獨活　檳榔　木瓜　紫蘇　大腹皮　川芎　陳皮　白朮　沉香　生姜　甘草

右十一味毎服三錢水三合ヲ以テ煮テ合半ヲ取リ滓ヲ去テ分チ温メ一合ヲ服ス以下煮法コレニ倣ヘ方中獨活ハ漢産極上品ノ物ヲ撰ヒテ用フヘシ和産ノ物ハ用フルニ足ラス効ナシ其方意ニ於ルヤ獨活ノ芬芳專ラ濁気ノ欝塞ヲ散シ水血ヲ脈ノ中ニ在ル濁液ヲ利ス ルヲ以テ此方ノ主ト為ス也白朮木瓜ノ二品濕水ヲ流通シ沉香ノ芬芳逆氣ヲ降シ血液ノ欝結ヲ通シ諸藥ヲ導ク紫蘇陳皮ノ二品經脈

ノ隧道ヲ開テ氣血ヲ順ラシ腹皮檳榔ノ二品
脉外ノ氣道ヲ通シ溢ル、所ノ濁水ヲ利シ氣
垢ヲナカス此ニ川芎一品血芍ヲ配スルコト
深意アリ脚氣ノ毒邪初メ脉絡ニ位スト雖ト
モ其邪欝スルニ隨テ動脉ニ併レテ血中ニ欝
塞ス川芎血中ノ欝塞ヲ開テ水液ヲシテ分利
セシムルノ能アルヲ以テ也生姜水濁ヲ清利
シ甘中諸茅ヲ調和シ且急ヲ緩ム是ヲ立方ノ
本旨ト為ス

脚氣足脛微腫アリテ麻痺スルモノ獨活散邪
湯コレヲ主ルコレヲ久服スヘシ其麻痺膝ヲ
過ルニ至ラスシテ愈ユ

脚氣足脛麻痺アリテ腫滿スルモノハ獨活散
邪湯ニ小半夏加茯苓湯ヲ合ス其腫周身ニ滿
タスシテ愈ユ

獨活散邪湯ノ症ニシテ脉力アルモノハ液分
ノ欝強ク經脉渋滞スルカ故也水方ニ麻黄ヲ
加ヘ經脉ノ渋滞ヲ利シ水道ヲ開クヘシ

獨活散邪湯ノ症ニシテ小便渋テ利セス其色
赤濁ナルモノハ水脉大ニ欝結スルニ因ル本
方中腹皮白朮ヲ去テ蒼朮薏苡仁茯苓ヲ加フ
ヘシ或ハ汗下時トノ悸スルモノハ下部ヨリ

逆行スル脚氣ノ邪ニ固有ノ飲邪觸冒シテ悸ス前ノ加減ノ上ニ半夏ヲ加ヘ茯苓ヲ倍加シテ急ニコレヲ与フヘシ

獨活散邪湯ノ症ニシテ痲痺甚ク膝脚攣急スルモノハ濁液筋血ヲ壅遏スルカ故也本方ニ羚羊角木通ヲ加ヘテコレヲ与フヘシ其痲痺少腹ニ走ルコトヲ得スシテ愈ユ

凡脚氣ノ症脚弱頑痺スルモノ他ニ治方ヲ需ルニ及ハス皆悉ク獨活散邪湯ニ宜シ此等治ヲ誤ルニ非レハ必ス死ニ及フコトナシ此レ予カ三十有余年經驗スル処也

或ハ頑痺甚ク其毒氣動脈ニ傳ヘ上テ腹ニ入リ少腹不仁攣急シテ痛癢ヲ知ラサルノ症ニ至ルト雖トモ三候ノ悪症ヲ兼サルモノハ其毒衝心スルノ患ナシ此症多クハ烏頭附子等ノ熱劑ヲ投シテ熱ニ熱スルノ誤治ニ由テ日ヲ延ヘ月ヲ累ネ終ニ是ノ如キニ至ルコト有リ此等ノ症ニ遇ハ、少シモ恐ル、ニ足ラス此レ原緩症ナリシテヲ治ヲ誤テ頑痺甚キニ至ラシムルノ症也獨活散邪湯ニ烏犀角ヲ加ヘ血中ヲ清スレハ愈ユ此亦予カ從來經驗スル処也

大檳榔湯　脚氣兩足麻痺シ微ク浮腫スルモノ
小水不利ニ其腹ヲ按ズレバ候フニ物ナキカ如ク久ク腹皮
枯燥シテ滋潤ナク或ハ腹筋漸太ク其脉少ク
力アルニ似テ數ナラス膻中未タ動アラスト
雖モ此レ三候ノ一ヲ兼ルノ急症ニシテ邪
毒將ニ少腹ニ走ントスルノ兆也急ニ此湯ヲ
与ヘテ其急ヲ救フヘシ其機ヲ失スルトキハ
少腹頑痺シ殆ント危篤ノ症ニ至ル

大檳榔湯方

檳榔　腹皮　茯苓　紫蘇　防風　沈香
木通　枳殻　生姜　郁李仁　桑白皮

羚羊角

右十二味煮法獨活散邪湯ノ方ニ依レ其方意
ニ於ルヤ逆氣ヲ降下シ濁水ヲ通利スルヲ以
テ主トス方中ノ檳榔腹皮ハ脉外ノ氣道ヲ通
シ滯ル処ノ濁水ヲ利シ桑白皮木通茯苓ハ粘
綢スル濁水ヲ通利シ枳殻ハ欝結ノ氣ヲ散シ
郁李仁ハ逆行スル水ヲ降利シ紫蘇防風ハ外表
ノ腠理ヲ開キ經脉ヲ通シ生姜ハ水ノ濁ヲ清
シ羚羊角ハ攣急ヲ緩メ且毒氣ヲ降下シ沉香
ハ逆氣ヲ降シ諸藥ヲ導ク小水ヲシテ通利セ
シムルヲ立方ノ本旨ト為ス

ノ脚氣而足麻痺シ或ハ手掌熱シ脇腹ニ青筋ヲ帶ヒ其脉大ヲ含ムモノハ動脉中ノ血微ク鬱スルカ故也小水利セスシテ膿滿シ膿中イマタ動ヲ生セサルモノ大槇榔湯コレヲ主ル或ハ犀角茯苓ヲ兼用シテ佳也

此症下部ノ閉塞強クシテ水道ノ水下焦ニ行ルコトヲ得ス動脉ヲ壅テ逆行スルヲ以テ其脉大ヲ含ム然リト雖トモ邪毒血分ニ併スルコト薄シ故ニ膿中ニ動ヲ生セサル也

犀角茯苓飲方

犀角　茯苓　沉香　烏藥　川芎　甘草

右六味煮法前方ニ依ル其方意ニ於ルヤ血中ノ濁濕ヲ清利シ鬱々タル氣ヲ利スルヲ以テ主トス

黑豆檳榔湯　大檳榔湯ノ症ニシテ心下痞鞕シテ盤ノ如ク久其脉沉實ナルモノハ周身膿滿スルノ兆也此湯コレヲ主ル

此症水路悉ク壅閉シ水氣通リ溢レテ心下横膈膜ノ本ニ結聚スルカ故ニ心下痞鞕シテ盤ノ如キニ至ル是皆水氣留滯スルノ所為也急ニ此湯ヲ投シテ小水ヲ誘フヘシ

外臺崔氏療脚氣遍身腫方

此湯ヲ用フルニ秘訣アリ此症動作スレハ氣急迫シ安居スルトキハ氣急息迫スルコトナシ此レ乃チ水氣專ラ心下ニ結聚スルカ故也或ハ脉沉實ニシテ主ルトコロ也若シ安居動作ニ由ラスシテ氣急息迫スルモノハ毒氣衝心スルノ兆也此湯ノ主治スル処ニ非ス

黑豆檳榔湯方

桑白皮　檳榔　茯苓

右三味每服三錢黑豆汁三合ヲ以テ煮テ一合五夕ヲ取リ滓ヲ去リ分チ温メ一合ヲ服ス晝夜ニ二劑ヲ盡スヘシ

黑豆汁ヲ作ル方

新黑豆一合半ヲ以テ水ニテ洗ヒ水一升二合ヲ以テ黑豆ヲ煮テ六合ヲ取リ滓ヲ去リ其汁ヲ用フ即二劑ノ煎汁也

其方意ニ於ルヤ留滯スル処ノ濁水ヲ通利スルヲ以テ主トス此湯ヲ用テ小水通利シ心下痞鞕去テ獨脚弱麻痺ノ症ノコルモノハ獨活散邪湯ニ轉シ久服スレハ愈ユ

犀角檳榔湯　脚氣麻痺

走テ少腹頑痺シテ不仁シ或ハ頑痺上テ膻中ニ走リ心胸ニ逼ル其症小水通セスト雖トモ

膿脹セス或ハ小水微ク通スト雖トモ不利シテ滴ルカ如ク其脈數急ニシテ膻中ノ動氣手掌ヲ彈クカ如ク或ハ嘔吐シテ飲食口ニ入ルコトヲ得ス氣急息迫煩躁スルモノハ此レ皆毒邪衝心ノ候也此症初起緩症也ト雖トモ其治ヲ失スルカ為ニ悠悠此症ニ過ハ、急ニ此ニ及ヘルモノ多シ終ニ此湯ヲ与ヘテ其急ヲ救フヘシ、

犀角檳榔湯方

犀角　檳榔　厚朴　枳実　沉香　半夏
茯苓　防己　蘇子　紫蘇　陳皮　川芎
生姜　甘艸

右十四味毎服三錢水三合ヲ以テ煮テ一合五夕ヲ取リ滓ヲ去テ温テ一合ヲ服ス晝夜ニ五六劑ヲ服シ盡スヘシ其方意ニ於ルヤ沉香枳実厚朴倶ニ逆行ノ氣ヲ降下シ半夏茯苓蘇子檳榔防己倶ニ濁水ヲ通利シ犀角川芎濁血ヲ通シ毒氣ヲ降解ス然リト雖トモ香氣ノ品ヲ以テ經脈ヲ開キ皮膚ノ渋塞ヲ通シ氣ヲ發スルニ非レハ各其効ヲ全クスルコト能ハス故ニ紫蘇陳皮ノ二品ヲ配合シ經脈皮膚ノ渋塞ヲ通シ諸薬ヲシテ其効ヲ全カラシム生姜水

濟生方大腹皮散枳殻代枳實加厚朴
類聚九六ノ廿二オ
濟生一ノ廿三ウ

ノ濁ヲ清シ甘中諸薬ヲ調和ス是ヲ立方ノ本旨ト為ス此方陰毒解毒ノ効アル厚朴ヲ配スルヲ以テ妙アリ他家ニ用フル処ノ方ト異ナル也

此症此湯ヲ与フルニ先テ緊脈変シテ微緩ノ脈ヲ見ハスコトアリ此レ必死ノ候也百ニ一生アルコトナシ其脈微緩ヲ得ルヲ以テ邪氣微ク緩ムトユメユメ思フコト勿レ其死踵ヲ旋ラスヲ待タス是ノ如キノ症ニ至テハ治ヲ施スモ死シ施サヽルモ亦死ス医術ノ及フ処ニ非ス方技家コレヲ察セスンハアルヘカラス

ス、

導水大腹皮欠

或ハ其腫少腹ニ走リ小水不利膿中微動アリテ其脈數ヲ見ハスモノハ衝心セント欲スルノ兆也此症邪氣專ラ水脈ニ在テ血脈ニアルニ非ス故ニ麻痺微ニシテ足脛腫脹シヲ投シテ降氣利水スレハ愈ユ

導水大腹皮欠方

腹皮　木瓜　烏薬　紫蘇　蘇子　檳榔
陳皮　沉香　枳實　前效　桑白皮
蘿蔔子　厚朴　角

右十三味煮法服法前方ニ依ル方中ノ沉香犀角極上品ヲ撰テ用フヘシ然ラサレハ効ヲ奏シ難シ其方意ニ於テルヤ蘇子蘿蔔子枳実烏薬倶ニ上逆シテ胸膈ニ逼ル処ノ水氣ヲ降利シ木瓜桑白皮ハ濕水ノ粘綢スルヲ利シ荊芥芳血液ノ欝滞ヲ散シ腹皮檳榔ハ氣道ヲ溢ル濁水ヲ通利シ紫蘇陳皮ハ外表ノ腠理ヲ開キテ經脉ヲ循通ス犀角ハ衝心スルノ毒氣ヲ降解シ沉香氣ヲ降シ諸薬ヲ導ク是ヲ立方ノ本旨ト為ス

導水六腹皮欠ト犀角檳榔湯トコレヲ用フル二區別アリ麻痺微ニシテ腫脹多ク小水不利スルモノハ導水六腹皮欠ノ症也腫脹微ニシテ麻痺劇ク小水不通ノモノハ犀角檳榔湯ノ症也此レ二方ヲ反對シテ腫ト痺トノ偶方ト為ス也

降氣旋覆花湯　脚氣腫滿其症外表ニ在テ其脉數ヲ見ハシ膻中微動アリテ頻ニ水飲ヲ吐スルモノハ水氣心包絡ニ臨ムノ候也急ニ此湯ヲ与ヘテ其急ヲ救フヘシ

此症水氣既ニ心下膈膜ノ本ニ結聚シテ動脉ヲ壅塞スルカ故ニ動脉中ノ血渋リ逆氣下ヨ

聖恵方旋復花散去大腹皮枳殻加桑皮紫蘇葉類聚方十六ウ 聖済總録旋復花湯去各人加半夏、 ㊀十二ノ十二ウ

リ膜ヲ推ス是ヲ包絡ノ水逆シテ吐ヲ為ス也、

此症水逆シテ吐ヲ為シ脉數ヲ見ハスト雖ト
モ呼吸短息セス呼吸短息セサルヲ以テ未タ
衝心セサルコトヲ知ルヘシ、

降氣旋覆花湯方

旋覆花　犀角　前胡　半夏　紫蘇
桑白皮　茯苓　生姜

右ノ味煮法前方ニ依ル其方意ニ於テヤ旋覆
花ハ水氣ノ逆行スルヲ止メ半夏茯苓ハ水邪
ヲ降利シ桑白皮ハ痰液中ノ濁ヲ清シ紫蘇ハ經
脉ノ欝ヲ散シ生姜ハ濁水ヲ清シ水毒ヲ解ス
犀角ハ血ノ濁結ヲ緩メ前胡コレヲ通ス是ヲ
立方ノ本旨ト為ス此湯ヲ投シテ嘔吐止シ小
水通利シ動氣靜リ其脉緩ヲ得ルモノハ鷄鳴
散ニ轉シ久服スヘシ、

鷄鳴散方

紫蘇　檳榔　半夏　厚朴　木瓜　茯苓
陳皮　羌活　生姜

右九味煮法獨活散邪湯ノ方ニ依ル

犀角蘇子湯　降氣旋覆花湯ノ症ニシテ水飲ヲ
吐セス獨乾嘔ヲ頻ニ發シ呼吸短息スルモノ

蘇子降氣湯去甘草大棗桂心生姜加屑朴沈香枳殼

此湯ニ宜シ

此症ハ降氣旋覆花湯ノ症ニ類シテ大ニ異也此症ハ邪氣水脉ヨリモ血分ニ欝スルコト強クシテ動脉膈膜ヲ剔ク上ニ煽リ食道気管ヲ推スヲ以テ乾嘔ヲ發スト雖トモ水飲ヲ吐スルコトナシ

屑角蘇子湯方

蘇子　陳皮　厚朴　前胡　當歸　半夏
屑角　沉香　檳榔
右九味煮法前方ニ依ル其方意ニ於ルヤ蘇子ハ水ノ粘綢ヲコルメ胸中ニ畜積スル所ノ水ヲ降シ半夏ハ此症下部ヨリ動脉ノ逆行強ケレハ香氣降散ニアラサレハ全ク利スルコト能ハス是ヲ以テ沉香陳皮厚朴ヲ配シ上逆スル所ノ氣ヲ降散シ屑角毒気ヲ降解シ且血分ノ欝濁ヲ緩メ前胡コレヲ散ス檳榔脉絡ノ氣道ヲ通シ水垢ヲ流ス此方ニ當歸ヲ配スルモノハ血中ノ欝濁強ク流利スルコト能ハスシテ上ニ逆スル其血欝ヲ潤スト雖トキハ潤ヲ得テ欝濁コルム其機ニ臨ンテ降気ノ品物ヲ以テコレヲ散利スル意也是ヲ立方ノ本旨ト為ス此湯ヲ投シ小水通利シ乾嘔止テ其脉

緩ニ復スルモノハ、鶏鳴散ニ宜シ、コレヲ久服スレハ自ラ安シ、

脚氣兩足腫痺或ハ少腹不仁小水不利其色赤ク胸中煩シ短氣乾嘔飲食下ラス、其脉數或ハ大ヲ帶ルモノハ、犀角蘇子湯コレヲ主ル、

旋覆花代赭石湯　脚氣誤治ニ因テ嘔吐ヲ發シ食ヲ聞クコトヲ悪ミ藥ヲ聞クモ亦嘔シ水藥倶ニ咽喉ニ入ルコト能ハス、此レ全ク誤治ノ咎為ニシテ脚氣ノ邪上逆シテ然ラシムルニ非ルコト多シ、能々三候ヲ審詳ニシテ其一ヲ兼見ハサヽルモノハ全ク誤治ニ因ルコトヲ知ルヘシ、此レ淡散ノ藥味ヲ以テコレヲナダムルニ宜シ、此湯コレヲ主ルコレヲ与フレハ三劑ヲ過キスシテ其嘔吐止ム、

旋覆花代赭石湯方

旋覆花　茯苓　代赭石　絲瓜

右四味煮法前方ニ依ル、其方意ニ於ルヤ逆行ノ水ヲ利シ鎮逆シテ逆氣ヲ降スコレヲ立方ノ本旨ト為ス、此湯ヲ用テ嘔吐止ハ症ニ隨テ方ヲ轉スヘシ、

旋覆代赭石湯ノ病ニシテ其嘔吐劇キモノハ、本方ニ半夏ヲ加フ、

隆毒犀角欠　脚氣邪毒上テ心下胸膈ニ壅塞シ
衝ホセントト欲スルモノ此湯コレヲ主ル速ニ
コレヲ投シテ其急ヲ救フヘシ其機ヲ失スル
コトナカレ
凡脚氣ノ症ハ其初メ足脚ニ起リ上テ心ヲ衝
クヲ以テ終トス然ルニ所ノモノハ心ハ動脈
ノ起ル処血脈ノ收ル所ノ臓也然ルヲ脚氣ノ
病因トナル欝濁ノ濕氣足脚ノ脉絡ヲ侵ス是
ヲ以テ脉絡中ノ血液渋ルカ故ニ脚脛麻痺シ
或ハ微腫ス其邪毒細絡ヨリ動脉ニ傳ヘ上テ
腹ニ走ルトキハ少腹須臾或ハ不仁等ノ症ヲ
為ス其毒劇キモノハ經脉ニ從テ逆行シ心胸
ニ衝キ逼ルヲ以テ胸中煩悶シ呼吸息迫スル
等ノ急症ヲ見ハス此レ世ニ多ク行ハル、処
ノ脚氣是也其劇症ニ至テハ其死速ニシテ踵
ヲ旋スヲ待タス然レトモ其症多端ニシテ一
ナラス初起飲食氣力常ニ異ルコトナク唯足
跗或ハ足脛微シク麻痺シ或ハ微腫シ或ハ卒
ニ胸腹ニ動ヲ發シ或ハ忽然トシテ吧吐乾吧
ヲ發シ食臭ヲ聞ヲ悪シ或ハ俄ニ両便秘渋
シ膝腿頑痺シ或ハ少腹不仁身體麻痺或ハ百
節攣キ急糞體疫痛シ或ハ俄ニ胸中忪悸シ光明

ヲ見ルコトヲ得ス或ハ乍チ精神憒憒ト肩息
短氣スル等是皆脚氣ノ急症也其急症ニ至テ
ハ旦ニ發シテタニ死シタニ起テ旦ニ斃ル其
疾キコト瞬目ノ間ナリ其初起ニ三候ヲ以テ
其緩急ヲ決シ其機ヲ失スヘカラス既ニ病成
ルニ及テハ岐黄扁鵲ノ術アリトモコレヲ救
フコト難シカ、ル急症ハ他邦ニ在ルコトヲ
未タ聞カス三都ニ限テ最多シ愼ムヘシ恐ルヘ
シ其然ラシムル所以ノモノハ其陽欝ノ濁氣
初メ足脚ノ細絡ヲ侵スト雖トモ其毒氣厲ク
直ニ動脉ニ傳ヘ逆行シテ胸膈ニ逼リ動脉ノ
本源タル心ノ臟ヲ衝テ動脉ノ出ル所ヲ壅塞
シ動脉ヲシテ出サレメス是ニ於テ動脉ノ峻
勢心ノ臟ノ内ニ在テ出ントス欲シテ出ルコト
能ハスコレニ由テ懊憹悶乱精神憒憒シ運動
止シテ其人死カ其死ニ先テコレヲ脚氣衝心
ト称カ此期ニ先テ未タ心ヲ衝カ其邪毒胸中
心下ニ壅塞スルモノコレヲ救フヘシ降毒犀
角欠コレヲ主ル七石鎮氣散モ亦コレヲ主ル
兼用スルニ宜シ假令暴急ノ症タリト雖トモ
コレヲ与ヘテ小水三合ヲ通スルモノハ治ス
ヘシ此症ニ臨テ三候ノ診法ヲ失スヘカラス

膻中ノ動氣奔馬ノ如キモノハ獨此症ニ限ルト知ルヘシ降毒犀角欠七石鎮氣散ノ二方ハ脚氣暴急ノ手當ト為ス吾カ家ノ妙劑也秘スヘシ秘スヘシ

降毒犀角欠方

桑白皮　沉香　防已　木通　厚朴
郁李仁　茯苓　檳榔　蘇子　犀角
生姜

右十一味煮法前方ニ依ル生姜ハ摺テ汁ヲ取リ烏犀角ハ細末ト為シ倶ニ茶ヲ服スルニ臨テ若シ犀角ノ香ヲ悪ムモノハ諸茶ト倶ニ煎シ服スヘシ其方意ニ於ルヤ桑白皮粘液ヲ清シ防已茯苓木通コレヲ流通ス郁李仁濕欝ノ逆スルヲ降シ犀角毒氣ヲ降解シ血中ノ凝濁ヲ緩メ諸茶コレヲ降散ス沉香厚朴ノ芬芳ヲヌイテ血液ノ欝結スルヲ散シ更ニ逆氣ヲ降シ諸茶ヲ導ク蘇子檳榔濁水ヲ流シ氣ノ隧道ヲ通ス是ヲ立方ノ本旨ト為ス

降毒犀角欠ノ症ニシテ瞳脹シ衝心セント欲スルモノハ本方中ノ木通ヲ去リ蘇莖半夏ヲ加ヘ經脉ヲ通シ上逆スル水ヲ利シ水氣ヲ表ニ推スヘシ或ハ一時ニ瞳脹表ニ發スルモ

ノハ吉兆也右加減ノ方中ニ麻黄ヲ加ヘ更ニ
水氣ヲ表ニ推スヘシ
七石鎮氣散　脚氣上テ心ヲ衝キ膻中ノ動氣掌
ヲ彈キ胸滿短氣乾嘔喘息肩膊強急スルモノ
コレヲ主ル此ノ症ノ如キハ其死旦夕ニ在リ
急ニコレヲ投シテ其暴ヲ挫キ急ヲ緩メ危篤
ヲ挽回スヘシ
七石鎮氣散方
六黄　乾姜　龍骨　各一錢
滑石　白石脂　紫石英　赤石脂　六分　寒水石
石膏　各二錢
四分　牡蛎　甘草　各八
分

右十一味麁末ト為シ毎服三錢水三合ヲ以テ
煮ルコト三沸滓ヲ去リ温テ一合ヲ服ス其方
意ニ於ルヤ逆氣ヲ鎮遂シテ其暴ヲ挫キ急ヲ
緩ムヲ是ヲ立方ノ本旨ト為ス其心ヲ衝クノ暴
急ユルマハ其症ニ從テ治方ヲ傳フヘシ
上ニ擧ル処ノ暴急ノ症ニ降毒犀角欠及ヒ七
石鎮氣散等ノ主方ヲ与ヘ小水通利日々ニ半
合ヲ増シ五日ヲ過キテ一合ヲ増スヲ以テ順
ト為ス十五日ヲ期シ膻中ノ動靜ルモノハ獨
活散邪湯或ハ鷄鳴散其宜ニ從ヒ烏犀角ヲ加
ヘ久服シテ安シ必ス心モ他ニ方ヲ求メサレ

乾脚氣

脚氣痿痺麻痺シテ腫脹スルコト無ク其劇キニ至テハ反テ贏瘦シテ小水不利スルモノ、コレヲ名ケテ乾脚氣ト云フ又コレニ反テ腫脹スルモノヽコレヲ名ケテ濕脚氣ト云フ也其腫脹スルコトナキモノハ邪毒水血二脈ノ間ニ客リ水血トモニ壅塞スルヲ以テ血中ヨリ水ヲ分チテ水脈ニ布キ施スコト能ハス、レハ何ヲ以テカ腫脹スルコト有ンヤ是ヲ以テ經脈水液ヲ得サレハ乾テ瘦ルコト必セリ邪毒二脈ノ間ニ在テ血管ヲ籠袭テ血ヨレ為ニ渋滞スルヲ以テ頑痺スルニ此レヲ患フルトキハ、膝理滋潤ナク皮膚枯燥痂ハ其初起ヨリ緩痂ニシテ漸ニコレニ及フモノ也上ニ論スル処ノ暴急ノ痂ト異也其初起ニ頭痺イマタ少腹ニ走ラサルモノハ獨活散邪湯ニ宜シコレヲ与フルトキハ頑痺膝ヲ過ルコトヲ得スシテ痊ユ或ハ頑痺少腹ニ走リ其脉緊數ヲ見ハシ膿中ニ動ヲ發スルモノハ衝心セント欲スルノ兆也犀角瀉櫛湯ヲ与フヘシ湯ヲ得テ其氣下降シ小水通利スルトキハ安シ若シ其邪

毒劇クシテ愈サルモノハ、降毒犀角ヲ与フヘシ

衝疝

衝疝ト称スルモノ、脚氣衝心ト依稀トシテ疑似決シ難シ、其症足脛浮腫シ、或浮腫ナク、卒然トシテ呼吸息迫煩悶シ、水分ノ動大波ノ如ク、其脉沈大ニシテ、休作時アルモノハ、脚氣衝心ニ似テ脚氣衝心ニ非ス、コレヲ名ケテ衝疝ト云フ也、初學ノ士脚氣ノ衝ぶト水氣ノ内攻ト衝疝トノ三症コレヲ区別スルコト能ハス、其症彷彿トシテ相類スト雖モ、其病因ニ至テハ霄壤ノ差アリテ治方モ亦異ナルコト、喩ヘハ薫蕕ノ相反スルガ如シ、区別セスンハアルヘカラス、衝疝ニハ麻痺ナシ、脚氣ニハ麻痺アリ、衝疝ハ脉沉大、脚氣ハ脉緊數、衝疝ハ呼吸息迫ニ休作アリ、脚氣ハ呼吸息迫ニ休作アルコトナシ、衝疝ハ臍中ニ動アリ、脚氣ハ臍中ニ必ス動ヲ發ス、コレ其異ナル所也、脚氣ノ症麻痺ナクシテ衝心スルモノアルコトヲ未タ聞ス、麻痺ナクシテ衝心スルモノハ、衝疝也然ルヲ已別スルコトナク、相混シテ治ヲ施ス、何ソ全スルコトヲ得ンヤ、

蓋シ衝疝ト名ルモノハ、腸胃外ニ溢ル、処ノ水

邪疝氣ニ激シテ逆上シ心下ノ横膈膜ニ迫ル是ヲ以テ膈膜水邪ノ為ニ上ニ扇テ心ヲ衝ク故ニ呼吸息迫煩悶ス膈膜既ニ上ニ扇クトキハ膜下ノ迫水少シク亡ルニ至テ沉ム然レハ上ニ扇ク膈膜モ亦從テ緩ムヲ以テ暫ク心ヲ衝カサルニ至ル此レ休作時アル所以也此病北方寒國ニ多ク辺鄙寒郷ニアルコト希也然ルヲ已別スルコト能ハスシテ治ヲ誤ルモノ少ナカラス

衝疝ノ治方ニ於ルヤ萬峯萬當ノ奇方アリ予從来經驗スル処也其方天台烏茱散ニ鐵將軍ノ冷水ヲ加フルコト秘中ノ秘也吾カ黨ノ士是ヲ用テ其急ヲ救フベシ

天台烏茱散方

烏茱　木香　茴香　青皮　良薑各五錢

檳榔三枚　川楝子二十枚

右七味水煎

風毒脚氣

脚氣ノ病ハ上ニ論スル如ク地中陽欝ノ濁気初メ足ノ孫絡ヲ侵シ經脉ニ傳ヘ逆行シテ心ヲ衝クヲ以テ終トス此レ真ノ脚氣ニシテ兼ル所ナ

聖惠方　懷香散　香附子　楝子　檳榔　木香　青橘皮　本事方　治小腸氣子奇忌者　烏藥　良薑　茴香　婦人方　名天台烏藥散

キモノ也今風毒脚氣ト稱スルモノハ鬱濁ノ毒氣足ノ孫絡ヲ侵シ又更ニ外表ヲ風濕ニ襲ハレテ上部ヲ閉塞セラレ上下相感シテ病ムモノ是也其症多端ニシテ一ナラス或ハ微シク寒熱ヲ見ハシ足脛麻痺シ或ハ浮腫シ或ハ骨節煩疼シ或ハ攣急シテ屈伸スルコト能ハス或ハ憎寒發熱シ或ハ汗出或ハ汗ナク或ハ脚節煩熱シ或ハ舌上ニ白胎ヲ生シ又胎ナキモアリ或ハ小水不利呼吸短息シ或ハ傷寒時疫ニ類シ寒熱頭痛大渴引飲スル等ノ症皆コレ風毒脚氣症ニシテ真ノ脚氣ト同シカラス治方モ亦從テ異ナル也混同スヘカラス然ル所以ノモノハ脚膝骨節ノ錯綜凹ナル処筋ヲ以テコレヲ繫キ接續セシム其間隙ニ常ニ循行ノ水液アリテ筋骨ヲウルホシ用ヲ為ス此レ病サルモノ、常也然ルヲ鬱濁ノ毒氣其間隙ニ粘着シ水液ノ循行ヲ妨ケ筋骨ヲレテ潤サレメス其水液常ヲ失シテ經脉ニ溢レ膚肉ニ注テ腫脹ヲ為シ筋骨ハ滋潤ヲ得サレハ乾テ攣急疼痛ス且又風濕外表ヲ襲テ腠理ヲ閉塞スルカ故ニ發熱悪寒等ノ症ヲ發シテ傷寒時疫ニ類スコレヲ混同スルコトヲ勿レ真ノ脚気ト

異ニシテ上下ヨリ相侵スヲ以テ也

治方

加味蒼栢散　脚氣發熱悪寒足脚力ナク屈弱麻痺時ニ疼痛シ小水不利其色赤濁或ハ脚節掌急頽痺上テ陽陵泉ニ至ルモノ其脉浮數膿中ニ動ナキモノ此湯ヨロシヲ主ル

加味蒼栢散方

蒼朮　麻黄　白朮　知母　黄柏　黄芩
當帰　芍薬　生苄　木瓜　檳榔　羌活
獨活　牛膝　防已　甘草

右十六味煮法獨活散邪湯ノ方ニ依ル其方意ニ於ルヤ麻黄羌活膝理ノ閉塞ヲ開キ經脉ヲ通シ風濕ヲ散ス蒼朮檳榔木瓜防已ハ濁水ヲ通利シ黄柏濕熱ヲ清解シ當帰地黄ハ血中ノ乾ヲ潤シ白朮知母ハ津液ノ濁ヲ清シ筋骨ヲシテ潤サシム芍薬急ヲエルノ獨活ハ關節ヲ利シ風濕ヲ散ス牛膝諸薬ヲ下ニ行シ膿濕ヲ消ス甘草諸薬ヲ調和シ芍薬ニ雙テ急ヲ緩ム黄芩熱ヲ解ス是全ク表裏閉塞スルヲエズテ血脉俱ニ欝シテ熱ヲ畜フ常ノ脚氣ト異ニシテ風毒ナル故ニ黄芩ニ非サレハ血管中ノ熱ヲ解スルコト能ハス眞ノ脚氣ニハ熱

アルコトナシ血中壅塞スト雖モ犀角ヲ以テ
其壅濁ヲ通シテ黄芩ヲ用ヒス此レ上部閉塞ス
ルコトナキニ由テ熱セサル也今此方ニ黄芩ヲ
配スルモノハ血中ノ熱ヲ解カ為也是ヲ立方ノ
本旨トナス吾家此湯ヲ以テ上下分散ノ剤ト為
シ他ニ治方ヲ求メス是ヲ与ヘテ小水五合余ヲ
通利スルモノハ寒熱微ク解シ諸症ユルムト知
ルヘシ寒熱去テ其脉浮ヲ減スルモノハ防已欠
ニ轉スヘシ小水快利シ十五日ヲ過キ其便色清
白ナルモノハ全ク痊タリト知ルヘシ
防已欠　加味蒼柏散ノ症ニシテ外邪去テ寒熱
退キ其脉浮ヲ減シテ諸症残ルモノ此湯ヨレ
ヲ主ル

防已欠方

防已　蒼朮　黄柏　生苄　川芎　檳榔
木通　犀角　白朮　甘草

右十味煮法前方ニ依ル其方意ニ於ルヤ蒼朮
白朮防已檳榔木通トモニ水ヲ通利シ黄柏濕
熱ヲ清シ生地黄血ノ乾キヲ潤シ犀角川芎血
中ノ鬱濁ヲ通シ甘草諸薬ヲ調和ス是ヲ立方
ノ本旨ト為ス

當帰粘痛湯　脚氣寒熱甚シク或ハ頭痛骨節疼

壽世保元

蘭室秘藏
拈痛湯去人
參茵陳

痛シテ足脛麻痺シ或ハ腫痛攣急小水不利舌上淡白胎アリテ肩背沈重及ビ強急スルモノハ外表ノ濕鬱強キカ故也濕鬱ヲ發散スルニ宜シ膻中ニ動ナキモノハ此湯コレヲ主ル此レ肉分ノ閉塞スルヲ通シ小水ヲ利シ濕熱ヲ解スル方也

此症ハ加味蒼栢散ノ症ニシテ外表ノ閉塞強キモノ也ト知ルヘシ

當歸粘痛湯方

當歸　羌活　猪苓　澤瀉　黄芩　知母
蒼朮　葛根　升麻　防風　白朮　甘草

右十二味煮法前方ニ依ル此症邪氣上下ヨリ閉塞スト雖トモ上部ヲ閉ルコト下部ノ邪毒ヨリ強シ其邪ヲ逐フモ亦上下ニ分散スヘシ其方意ニ於ルヤ葛根升麻羌活防風ハ肌肉ノ閉塞ヲ通シ肉分ノ邪ヲ發シ經脉ノ濁氣ヲ表ニ發スルヤ脉絡間ニ粘着スル濁液ヲ發表スルコトヲ得サレハ蒼朮ヲ配シテコレヲ流利スル猪苓澤瀉白朮ハ膻脹スル処ノ水ヲ小水ニ導キ知母當歸ハ津液ノ乾キヲ潤シ筋ノ攣急スルヲ緩メ黄芩鬱熱ヲ解シ甘草諸薬ヲ調和スルヲ主トス

大犀角湯　風毒脚氣ノ痂寒熱微ニシテ周身腫
滿シ小水赤渋大便秘結シ脚膝攣急シ或ハ膝
骨熱痛其脉浮數膿中微動アリテ精神恍惚ト
シテ爽ナラス腹脹スルモノハ上下ヨリ水脉
ヲ閉塞シテ血中ニ併セント欲スルノ痂ニシ
テ水道ノ閉塞甚キモノ也膿中微動アルモノ
ハ衝心ニ近シ急ニ此湯ヲ与ヘテ小水ヲ通利
スルニ宜シ
此痂外表ノ閉塞輕ク下部水道ノ閉塞重シ加
味蒼柏散或ハ當歸粘痛湯ノ痂ヨリ來テ此痂
ニ至ルコト多シ内ヲ利シ表ニ發シテ寒熱去
リ遍身腫滿スルコトヲ有リ大犀角湯ニ轉シ一
時ニ水ヲ通利スルニ宜シ

大犀角湯方

犀角　白朮　防己　黄芩　陳皮　茯苓
大豆　前胡　蘇葉　紫蘇　桑白皮
生姜　麝香

右十三味煮法前方ニ依ル其方意ニ於ルヤ犀
角動脉中ノ濁気ヲ降解シ防己白朮茯苓桑白
皮生姜外表ニ在ル邪ノ濁水ヲ下シ水脉ノ閉
塞ヲ利ス大豆ハ其垢ヲ流ス陳皮蘇葉紫蘇
經脉ノ閉塞ヲ通利シ前胡黄芩麝熱ヲ清解

千金巻七大犀角湯加去香豉大棗桂心加大豆麝香

レ、广香ノ芬芳香發ヲ以テ、下部ノ閉塞ヲ開キ、諸茎ヲ導キテ水道ヲ利ス、是ヲ立方ノ本旨トナス、此症ニ誤テ桂枝麻黄ノ類ヲ以テ、コレヲ發汗スルトキハ、小水益不利シテ、終ニ衝心スルニ至ル、愼ムヘシ、恐ルヘシ、

小犀角湯　風毒脚氣ノ症大ニ腫脹シ、骨節攣急甚ク、足脚麻痺シテ、坐卧スルコト能ハス、夜ニ至テ益強ク、小水不利シ、或ハ寒熱喘咳シ、其脉浮數、水分ニ微動アリテ、胸熱劇ク、微渇スルモノ、此湯コレヲ主ル、

其人素ヨリ元氣実スルモノニシテ、常ニ胸間ニ汚液ヲ宿畜スル時ニ風毒脚氣ヲ患ヘ、邪毒上下ヨリ相侵シ、經絡閉塞シテ薫熱シ、宿畜スル処ノ汚液ヲ動カスニ由テ、水脉ヨリ包絡ニ水ヲ注クコトヲ得ス、是ヲ以テ肺氣乾テ、胸熱喘咳ヲ發ス、此レ脚氣ノ毒氣逆行スルノ所為ニ非ス、下部ハ唯脚弱攣急腫痛甚ク屈伸坐卧スルコト能ハサルノミ、他ニ治方ヲ求ムヘカラス、此湯ヲ用テ、經脉ノ閉塞ヲ開キ、筋骨ノ攣急ヲ緩メ、小水ヲ通スルトキハ、愈ユ、

小犀角湯方

犀角　麻黄　防風　獨活　防己　川芎

白朮　當歸　黄芩　杏仁　石膏　生姜
羚羊角　甘草

右十四味煮法前方ニ依ル此方專ラ經脉ヲ通シ水道ヲ利シ惡熱ヲ清ス其方意ニ於ルヤ麻黄獨活防風經脉ヲ通シ肉分ヲ利シ腠理ヲ開テ風濕ヲ散ス石膏胸熱ヲ清シ渴ヲ止メ杏仁肺ヲ潤シ喘咳ヲ退ク防已白朮生姜表裏ノ水ヲ利シ小水ヲ通ス川芎血中ノ欝ヲ散シ當歸コレヲ潤シ犀角血中ノ惡濁ヲ清シ毒氣ヲ降解ス羚羊角甘草攣手急ヲユルメ黄芩欝滯ノ熱ヲ解ス是ヲ立方ノ本旨ト為ス此湯ヲ用テ外熱去リ喘咳止ミテ獨足脚ニ攣手急瞤痛等ノ症殘ル者ハ防已ヲ欠ニ轉シ久服スルトキハ安シ

小犀角湯ト大犀角湯トノ二方コレヲ用フルニ區別アリ大犀角湯ノ症ニハ腹脹アリ小犀角湯ノ症ニハ腹脹ナシ此レ其區別也

近來三都ニ風毒脚氣ル熱症ナルヲ以テ世醫多クハ脚氣ナルコトヲ知ラス柴胡大黄ノ屬ヲ以テ專ラ其熱ヲ清解スルトキハ邪毒上テ心ヲ衝キテ死スルモノ少カラス然ルヲ醫者モ病家モコレヲ

知ラスシテ謂ラク熱疫解シテ元氣未タ復セサルニ脚氣ノ邪ニ感シ衝心シテ救ヒ難キニ至ルト此レ其理アルニ似タリト雖トモ脚氣ノ邪氣ハ外邪ト倶ニ初メニ感シ今新ニ來ルニ非ス其診察ノ足ラサルニ由ル吾カ黨ノ士コレヲ忽ニスルコト勿レ其初起ニ臨テ三候ヲ審ニシ其輕重緩急ヲ決スルトキハ萬擧萬當百ニ一失モアルコトナシ

大凡脚氣ノ治法ハ其初起ニ於テ三候ヲ審ニシテ以テ其輕重緩急ヲ量リ邪毒逆行ノ位ヲ論シ治方ヲ定テ其主剤ヲ投スヘシ其部位足跗ヨリ心胸ニ至ルマテヲ先假ニ十分ト定メ其一分ヨリ三四分ニ至ルモノヲ總テ獨活散邪湯ノ主ル處ト為ス其症足跗ヨリ邪毒漸ク上テ膝ヲ過ルニ至ルモノ是也五分ヨリ七分ニ至ルモノヲ大檳榔湯及ヒ黒豆檳榔湯以下ノ諸方竝ニ主ル處トナス其症邪毒進ンテ少腹ニ走リ心下ニ動ヲ發スル等ノモノ是也八分ヨリ九分ニ至ルモノヲ降毒犀角及ヒ七石鎮氣散ノ主ル處ト為ス其症邪毒進ンテ上テ心下胸膈ニ逼リ將ニ心ヲ衝ントスルノ急症是也其十分ニ及フモノヲ難治ト為ス其症邪毒上テ心ヲ衝クモノ是也此レ處

方ノ大概ヲ臚列シテ口授ニ代ヘ予ニ医ヲ
問フ童蒙ノ便覧ニ備フ敢テ通博上工ノ士ニ告
ニ非ス仏脚氣ノ症七十日ヲ歴サレハ愈ス知
ルヘシ是亦初学ノ心得也其由預メ患者ニ諭ス
ヘシ

藥能

肉分ノ濁水ヲ通スルニハ赤小豆黒豆ノ属半表
半裏腸胃外血液間ノ大腹皮ノ属外表ノ腠理ヲ通スルニハ紫蘇麻黄
羌活ノ属胸膈ノ水ヲ下スニ蘇子蘿蔔子旋覆花
ノ属逆上ノ氣ヲ降スニ沉香烏薬厚朴ノ属逆上
ノ水ヲ利スルニ半夏郁李仁ノ属胸熱ノ甚キニ
ハ石膏風毒脚氣ニ多ク此症アリ脈弦數或ハ舌
上赤久或ハ紫色ナルモノハ血欝ノ症也血欝ニ
ハ犀角筋骨攣拳急疼痛ニハ羚羊角水通ノ属也此
ニ擧ル処ノ薬能ハ吾家脚氣ノ症ニ用フルノ大
概ニシテ敢テ雑病ニ渉ルノ義ニ非ス世医専ラ
用フル処ノ桂枝昇薬黄水香ノ類ハ吾家ニ忌テ
用ヒスマシテヤ烏頭附子等ノ熱剤ニ於テヤ

附録

灸法

風市　膝ノ上七寸両筋ノ間ニアリ正シク身

ヲ平直ニ立テ、両手ヲ外腿ニ垂レ下シテ中指
ノ止ル処ノ陥カナル中是也此穴俗ニフシト
云、

伏兎　正シク跪坐シテ見レハ、膝ノ上ノ肉高
ク起リ兎ノ伏タル形ニ似タル、其起肉ノ陥中
ニアリ髀關ノ下、陰市ノ上、即膝蓋ノ上六寸是
也髀枢ヨリ膝ノ横紋マテ一尺九寸ノ法ニ依
ル弱腰ノ横紋ヲ髀枢ト云、

犢鼻　膝蓋ノ下、三里ノ上、両骨ノ間大筋ノ中
ニ在リ膝ヲ立テ見レハ、牛ノ鼻ニ似タル陥カ
ナル中ヨレ也、

三里　骭骨ノ外膝蓋ノ下三寸、骭骨ト筋トノ
間陥カナル中ニ在リ膝ノ正中横紋ヨリ、外踝
マテ一尺六寸ノ法ニ依ル膝ヲ立テ、足ノ指
ヲ張リコレヲ取ル、

上廉　直ニ三里ノ下三寸、骭骨ノ外側ヲリ膝
ヲ立テ、足ノ指ヲ張リコレヲトル、

下廉　直ニ上廉ノ下三寸ニアリ、膝ヲ立テ足
ノ指ヲ張リコレヲトル、

絶骨一名懸鐘　足ノ外踝ノ奥中通外踝ノ上三

寸動脉ノ中ニアリ外踝ノ上ニ細長キ骨アリ
此レヲ絶骨ト云フ其骨ノ絶テ分ル間ニ此穴
アリ

以上八穴ハ孫真人ノ千金方ニ由ル皆脚氣
ニ効アル処ノ灸穴也

羔山 足ノ腨ノ肉ノ高ク起テ止ル処ノ肉ノ
サカヒ陰カナル中委中ノ通ニ在リ即チ立テ
壁ニ向テ両手ヲ伸テ壁ニ取リ付足ノ指ニテ
強ク地ヲフミ前ヘモタレカヽレハ自ラ此処
ニ肉ノ隘ミ見ハル是也此穴脚気ノ諸症轉筋
ノ類スヘテ下部ノ筋攣拳急スル等ノ症ニ奇効
アリ十五壯灸スヘシ

于時嘉永二年己酉冬十一月冬至之日草稿し
終ヌ七十二翁道齊三浦茂樹自筆

明治九年一月兒秀俊鈔寫同八日白逗
一讀過了椿庭老人