割症全書


二卷

K 64
東京都立中央図書館 富士川文庫
494.28
Ka-1
2
F カ-59 2

494.28
K2-1
2

No.2577
12K64





富士川文庫

3008

調治割口傷口規則

調治割口傷口指向

割口傷口並指、慎勿以字害意、

英文、割口傷口、祇用一字、故傷口二字、下文屢見、或指傷口、或指割口、或

調治割口傷口之向、乃欲清除有礙埋口之害、茲將各害列後、

一、傷口沾染各種汚穢、因霉爛之種、藉此而入、令傷口流質變壞、所有發炎成膿、受傷熱症、與及傷口一切連累之患、其原皆本於此也、

免此患之法、惟潔淨與辟毒、若已沾汚穢、則有殺毒之法矣、

二、血水積聚於傷內、因此等血水、分隔傷口、而性又格外易

於變壞也

免此患之法、惟有仔細止血、疏通傷口流質、勿使傷內有窩、與及敷裹提溼物料以壓之、使傷口乾甚、

三、傷口張開、因此能阻傷口、不獲膠黏而生埋也

然使傷口按時貼合、如縫傷口、可免此患、

四、傷口各種混擾、如動作撫摸、弄傷、不當有之驗看、捺壓是也因此能阻礙埋口之功、或有流血發炎等患、

然豐益傷口、敷裹的當、及勿常換藥、可以免之、兼之令受傷之處安息、如用布帶、布夾弔架、與乎敷裹牢固、安置妥適等類、若果受傷深重、則宜安眠靜養、勿擾傷口、至於不當有之探驗與捺壓、亟宜免之、

五、阻止血液迴路、即積血、因此足令血液由微絲血管與吸液管滲入傷口也、

免此患之法、可高舉傷處、與及免卻各種箍壓、所有箍緊之衣服裹紮、一並去之、

六、當埋口之際、爲霉爛之種所入、或藏在內、即感毒、

用辟毒敷裹藥物、並勿常換藥、可免此患、

七、傷處發炎、與發炎之後患、

此必須用吸熱安息、舉高、與乎輭壓等法、方足以克之至若骨節發炎、則宜將其伸扯、令兩骨面互不相貼、

論潔淨之道　蓋以霉爛之種、即霉毒之微蟲、無處不有、天氣有之、水

亦有之兼以依戀於各物、故每當割症之際、與割症之前、或敷裹傷口之際、與敷裹之前、必宜將此毒去之殺之、或使之變爲無害方可、

是故潔淨一道、必宜於傷口與傷口之隣、愼爲洗淨殺毒、甚至與傷口沾連者、如天氣人手器具、與敷裹藥物、亦須如此、始於潔淨一道無虧、

論醫者與各輔理者之潔淨之道　凡摸傷口、割症、與及敷裹以前、所有醫者與各輔理者之手與臂、必須用枧刷等件洗淨、後用加播匿酸水（一開二分、）或汞綠水（一開一千分、）洗之、當割症之際、醫者或沾不潔之物、如糞溺膿等、必須重洗、

傳染之毒、每易黏於黑絨衣服、故不獨醫者、卽凡有各輔理者、當在醫院辦公時、宜穿新洗白竹布衣爲妥、

凡割症所用之圍裙、套袖、以樹膠布製者、俱甚適用、惟每割症以前、必須用加播匿酸水洗之、可以殺毒、

潔淨器具之法　凡割症與敷裹傷口所用之器具、須要仔細洗淨、妥爲殺毒、用之之後、須交與曾練辟毒法之副手、用熱水與刷洗之、後浸於加播匿酸水（每百分三分、）方用潔麻布抹乾、此等器具、宜安置於妥爲防護之所、免爲天氣之所沾、與好事者之亂動、割症以前、所有器具、用潔玻璃盤或磁盤盛之、內載加播匿酸水（每百分三分、）惟刀不宜久留於此水內、恐刀鋒爲加播匿所

侵、所以宜另盛以小盤、內載火酒、
所有器具宜光素、以少槽鍠爲貴、因易藏垢故也若夫刀等、全
身是鋼者、較之木柄或牙柄者爲更佳、

清淨天氣　天氣常含霉爛之種、而在醫院之陳舊、不善通氣
與及人住過多者爲尤甚、故凡割症換藥、務要殺除天氣之毒
此可以噴水露器爲之、內貯殺毒藥水、（如每百分三分之加播匿酸水輕養等類、）
向傷口與醫者之手而噴、
若因故須暫爲止噴、當是時、可用紗墊醮加播匿酸水蓋住傷
口、免爲天氣所沾、
但經各精明醫者歷練、指明凡割症雖不用此器、亦可收全效、


故這不便之器、可以不用矣、

洗淨病者　凡割症或敷裹新傷口以前、病者之身、若可施洗、
須用帨刷在洗身盤內透徹洗之、
將近割症之際、所割處與傷口之旁、須再洗兼殺毒、
其始先將傷口鄰近之毛髮薙去、因霉爛之種每黏於此、若在
頸上、須將靠傷口之髮薙去寸半、
然後傷口之鄰、用棉花醮衣打酒、或松節油、擦之、以去皮膚油
膩、後用帨刷洗之、末用加播匿酸水、或汞綠、殺毒、所割處、或加
搽方散衣打酒、（方散一分、衣打酒七分、）亦可、
凡手足之割症、未割前、其上層厚皮、宜用帨洗、使之變輭、然後

用硬刷或銼去之指甲指鎊之垢更當細心洗去
凡口內或近口之割症未割前宜用牙刷規將牙刷淨所有牙垢腐牙宜除去口須屢洗以釩釩養炭輕養輕養卽釩醋鹽水
凡肛門與下陰鄰近之割症未割前先數日宜用輕瀉藥或節射水入肛門將腸瀉清
若有疝靨爛瘡與及毒肉芽在於傷口或在所割之處宜先以利簧匙刮去後用鍠綠水每百分八分殺毒按此而爲若覺痛楚則嗅哥囉方迷藥然後爲之
割症與敷裹所用之桌理宜甚潔每凡割症後所有膿血等類須愼爲洗淨兼之殺毒樹膠布用以蓋割症桌上之墊甚屬有

用惟用之以前應洗淨兼用加播匿酸水殺毒
病者臥桌上每以赤體爲宜而裹之以樹膠布此布有口將割處露出
洗淨傷口 凡割症之際須用海絨或抹球以拭血而此等物須浸在加播匿酸水每百分三分或汞綠水每五千分一分

第十五圖



更妙因椰衣性韌能免棉花成爲實團也抹球用後必須毀去
裏外兩層之中多置一層去毒椰衣似爲

海絨內含穢垢、若未細爲去淨、割症時、萬不能用以拭血、
使洗身海絨變淨之法、宜先夾在布內打之、乾時椎以木椎、直
至沙石去淨、然後數洗以滾後温暖之清水、熱水能令之縮、故不用、後浸
在凍鈑錳養水、每一千一分、內二十四點鐘之久、此水至十二點鍾
時、必須更換、及後再洗以滾後温水、便浸在鹵磺輕養輕養水、
每百分一分、此水另加五分之一濃輕綠酸水、每百分八分、而以木枝透
攪之至失其粽色爲止、若在此水太久、則質變霉而易於撕破
矣、後又洗以清水、直至無氣味、大海絨二十五塊、約需一百七
十五安士鹵磺輕養輕養水三十五安士輕綠酸水、
若要殺海絨裏之乾仁、因以上之法不足以使之無害也、當長之際、浸以温水、


而置於暖處、其熱約九十五度至一百度、三五天之久、每日將水更換、或烘
之以局爐亦可、
隨後浸於加播匿酸水、一開二十分、或汞綠水、一開一千分、每兩日更換
一次、留於此直至用時、此水後須兩禮拜更換一次、而海絨至
少浸一禮拜之久、而後可用之於割症、
割症之際、有血之海絨、必先以清水洗之、而後放回在加播匿
酸水或汞綠水、搾乾後、方遞之於割症者、
無毒割症所用海絨、須數洗以規與蘇打、即鹵炭養以去血塊油膩
後浸於加播匿酸水、一開二十分、一禮拜之久、方合下次割症之用、
若夫傷口有傳染之毒、或乃霉爛與變死肉者、其所用之海絨、

則須立時火化海絨切勿用以擦傷口之隣與及換藥時拭膿此等事祗可用抹球爲之


灌水筒　灌水筒者用以洗淨傷口與傷口之鄰兼有殺毒之用者也見第十六圖其器以錫或玻璃爲之下孔有樹膠管接連管端有嘴由此一縷殺毒之水可達於傷口矣

水流之大小壓以拈管之二指便可較之矣或將其器舉高放下隨勢變遷若不用此器時即將嘴放在器內見第十七圖故此嘴宜以玻璃或鑞錫爲之使之重而能留於器內也若用水制則不必矣

第十六圖



第十七圖




若灌於傷口鏠隙所用水力太大則險矣因水能透入連綱故也爲此用水節以洗傷口甚屬不宜因水出之勢不能管制也

有以酒樽而爲灌水筒者將樽底打去入樹膠管於樽枳之孔而以繩倒掛之見下第十八圖

接膿盤　接膿盤以五金片硬樹膠或玻璃爲之隨人身各處

第十八圖



而成樣用接膿水

當換盤時空盤須放在滿者之上便將滿者蓋而不見可無瀉注之患膿水滿盤須卽傾於盛臟水之缸


止血之法 割口未合與敷裹未施之先所有流血須細心止之其法將受傷之血脈或迴管用有制鑷拑住然後以去毒貓腸線妥爲緊繫而繫血管所打之結須用一字結見下第二十六圖平常之十字結勿用見下第二十七圖因易脫故也線尾約離結一寸八分之一剪去

若割症用壓血之法血管則不易於尋覓因血不流也爲此四肢剖開圖能指明最要血脈迴管腦筋之地位未割以前試一觀之誠大助也

若練習熟悉則雖細小血管亦易得之惟中等血脈之養肌肉枝最爲難覓因其縮在肌肉腹內過後流血多由此等血管也此等血管枝多得之在橫割肌肉之中在分隔肌絲連網粗層相遇之所成一如星之樣

凡割去肢體鋸骨之後宜用有制之鑷見第十九二十圖將所有割傷之血管拑住當繫之時容其垂弔先將上處繫起繫後


第十九圖



第二十圖




第二十一圖




若血管不獲分隔清楚與乎伶俐扯出以便於紮繫則用帶線彎針穿過流血處四週之質然後用線將血管與肉一並繫之見第二十二圖

用鑷再尋餘脈而拑之見第二十一圖

第二十二圖



第二十三圖



若無去毒繫血管之線則扭血管之法亦足以堵之用有制鑷將血管拑住稍爲扯出然後扭六次或八次按血管之大小而分血管露處之中必先用手指或另用一鑷執住見第二十三圖如此則血管內衣撕破而捲起如門閉上血管也凡難而長之割症而地位或迴管若見則宜分隔之用探針入於管之下面而以兩有制鑷鉗住在兩鑷之中將管割斷而繫其兩端

貓腸線　去毒貓腸線用以繫血管縫傷口者具能化之性故奏功後在傷內鎔化全行被吸

製鍊貓腸無毒之法　謹將其最簡便而成全者詳後

平常行市之貓腸第一號至第三號先以輭規和水用刷細洗之後洗以清水便捲以玻璃線輾浸於汞綠水一開一千分中十二點鐘之久然後乾貯於緊嚴封固之玻璃器內

用時以器盛之內載汞綠酒一開二千分又浸於汞綠酒一開二百分火酒中十二點鐘之久然後乾貯於緊嚴封固之玻璃器內

用時以器盛之內載汞綠酒一開二千分

其始以加播匿油製之貓腸性質較硬多時始能吸去故於有種割症此更爲適用如去婦人卵核之割症用以繫其蒂是也

製法先浸在加播匿甘油每百分十分內四十八點鐘之久後浸在輕鹼養水每百分半分五點鐘之久

有以柏子油而製貓腸者其質亦甚堅硬於去毒亦屬可靠製法將貓腸浸在柏子油內二十四點鐘之久然後浸於火酒合傷口之法　往昔常用嗎膏以合口之法亟宜拒棄因其將口緊合使皮膚激攣不舒而發炎且與辟毒之道相反

極淺而小之傷口亦可以英國嗎膏封合或用紗條蘸火綿酒亦可但必須先用藥水殺毒

皮膚淺傷若因口處打痲不宜縫埋可用入漿紗帶溼以加播

匿酸水將口扯埋但勿令傷口血水積聚爲要

有種傷症如頭皮之傷用兩頭布帶裹之似爲妥妙因傷口兩邊皆有壓埋之力見第二十四圖惟新而潔之傷其最妙之法乃用線將口縫埋也

二十四圖



二十五圖




縫口法


縫口乃用直針或各種彎針爲之而所用之線乃貓腸線絲線銀線鐵線馬毛鬣鬃等類俱皆全行去毒者

斷而不續之縫法見第二十五圖乃最常用之法若要割口連合妥貼如各種補缺症如補崩口補鼻之類此法推爲至善至於打線之結須用可靠而不易脫之結是故宜用一字結見第二十六圖此結之打法線之兩端穿過兩線圈以一樣之方向惟十字結見第二十七圖則線之兩端穿過線圈以相對之方向所以易脫也


二十六圖



二十七圖



二十八圖



若傷口甚脹打一字結起首之圈可多穿一度此名爲醫者之結見第廿八圖

續而不斷之縫法見下第廿九圖較斷而不續者爲省事今多用之按此有一稍爲更易之法屢見有用見下第三十圖此法

或用新割出肢體之皮、或新死者之皮、而補亦可、

以皮補傷口之法、割皮一片、比丁方二寸大些、所有皮底油網、用剪剪去、使皮之兩面、像乎白皮手套之皮、以一片或數片、將傷口蓋住、用貓腸線將邊縫妥、然後數裹以去毒藥物、按此法、有將補鼻後額上之割口、以兩片臂上之皮補上、而獲即埋口之功、

凡每步未扯緊時、反扣前步、

若傷口破爛太多、不能將口縫埋、皮膚與頭皮之傷、而意又欲其口能有即埋之功、無乃在病者臂上剪皮一塊、即補於傷口、


論去流與深縫等法、

傷口未合之前、宜細看無水能積於底、引水從傷口出、有出流之法、


去流法　凡毒傷口、大膿瘡、與割去大腿節骨等類、每懼成膿過多、故於傷口之低處、入一樹膠管、管身有數孔、見第三十一圖、此用以去傷口內窩之流也、

凡入樹膠管於深傷口、有用長身鑷子領之而入、見第三


二十九圖




第三十圖



第三十一圖



第三十二圖



十二圖、以方散摻管、然後入之亦是善法、

新潔而無毒之傷口、不宜用去流管、因其有如外物之作用、令傷口激攣不舒、又因霉爛之種、從而入內、並須早以換藥、如是便混擾傷口矣、欲免此弊、須用化輭之骨管、因此種之管、性如貓腸、奏功後、卽化而被吸也、

此種骨管、以獸骨爲之、浸在輕綠酸水（每百分內十二點鐘之久、使之變輭、後貯於汞綠酒（一開五千分火酒內、當緊急之際、貓腸線去毒馬毛、或玻璃線綑成一札、亦可用之以去流、

凡無毒極新之傷口、去流似屬不必、惟要謹愼矣、

一、勿令傷口之底有窩、爲血水所積聚、

二、勿令皮處之傷、封固太嚴、則傷口內成之水、易於流出至外、


三、敷裹之壓力、必須均勻、及所用之藥物、易將流質吸提、兼能助溼氣飛散而變乾、

深入之縫法　此縫法能將傷口深處壓埋、可免成窩、深入各縫法詳後、


摺起之縫法見下第三十三圖、用以連合薄而鬆之皮、極爲有用、如縫眼蓋是也、因其將皮摺起、令貼合處寬闊、

縫褥之縫法見下第三十四圖、如摺起之縫法一式、惟深入些、將傷口之兩面、在底壓埋、

三十三圖




三十四圖




傷口壓埋、針之兩端、用剪剪去、兩針相隔處、亦可加用數斷而不續之縫法、令口更爲貼合、翌日可用鑷以旋轉勢將針拔去、但線多爲血膠住、須隔數日然後去之、此種縫

三十五圖



編扭又名補崩口之縫法見第三十五圖、用針爲之、針尖須椎扁、離傷口少許、將針穿過、後用泡桑絲水之棉線、編成英8字之樣、將


三十六圖



法、極合張開割口之用、於面部補缺割法常有之、

鵝毛管縫法見第三十六圖、用圓條、如鵝毛管或放溺管之一截、將傷口深處壓埋、然後以銀線或絲、將管扯埋、


三十七圖



鉛片縫法見第三十七圖、以銀線爲之、將線穿過鉛片當中之孔、然後在鉛片捲邊之上、將線編8字樣數度、


珠縫法見下第三十八圖、乃用銀

三十八圖




線先穿過鉛片、然後再穿過玻璃珠、線端以小木片如火柴之類扭住、

三十九圖




若有脹緊、則須幫輕淺縫法之壓力、直至傷口已經黏合、故入深入淺之斷而不續縫法、可兼而用之、見第三十九圖、

第四十圖




四十一圖



如是、則連而不斷與縫褥縫法、亦可以兼用、其餘皆然、

若以傷口深處壓埋爲要、以致所有窩穴全行堵塞、則用貓腸藏縫法爲最妙、見上第四十四十一圖、其法先以貓腸將傷口之深處用斷或連縫法縫之、而後始縫以尋常之淺縫法、線靠結剪去、而所用之貓腸線留在傷內、聽其吸去、如紮血管一式、鉛片與深入兩等縫法、在深處之功力、觀第四十四十一兩圖便知、雖用深入各種縫法、而傷口之底、斷不能定以無水流出、所以宜於皮外至低處留一口、或於合宜處用刀開數孔、總宜與傷口同列、因淺縫處扯

四十二圖



緊、令此等小孔開而不閉也見上第四十二圖、皮孔內裹之肥
質、宜剪去少許、毋令從內將孔堵住、孔之口、亦可以貓腸線縫
之、使之反出、　此等小孔奏功後、甚易埋口、
未後、傷口須全行蓋以敷裹之物、而此物須輭而柔韌、至於壓
傷口全處、亦須均勻、依此可以免血液之滲、即不能免、亦可減
少、敷裹之功、吸提流水、宜快且易、兼之令水之溼氣飛散、助其
乾透、是故閉氣防水各種物料、一概不用、柔韌布帶、其始綑於
敷裹物料之外、用以增壓力者、數點鐘之後、必須去之、
未敷裹以前、經縫之傷口、須再灌濯以辟毒藥水、直至各孔流
出之水、清而不濁爲止、見上第四十二圖

然後用海絨或抹球緊揸傷口、將內裹之水全行揸出、而此壓
力切勿間斷、直至上敷裹第一重之物、然後將海絨替出、至於
第一重之敷裹物、亦須緊上、

論敷裹之道

敷裹傷口、須如後者、　一、緊護傷口、勿爲外害
邊緊貼、此即防護敷裹之法、　二、宜易於吸提傷口流質、如血水膿是也、
又宜使之易乾、乾敷裹之法、　三、宜阻止流質變壞、辟毒敷裹之法、　以上
所論各法、有許多物料適於其用、至於有阻止流質變壞之性
者、更爲多焉、

敷裹物料

敷裹物料須要、　一、十分潔淨、即無毒、　二、輭而

柔韌、祇用些少壓力、便可貼合於身、三、吸提流質速而易、即有大吸提之力、四、切勿閉氣、則所吸之流質、速於飛散、而爲天氣中之養氣所毀、五、須含能使霉爛種變爲無害之質、即辟毒之物、

茲將最宜於用者列後、

一、紗、即疏棉布也、以蘇打即鋪炭養煲之、使去油膩、而便於吸提溼氣、用法、甲、有數層者、此即防護敷裏之法、乙、有數塊輕輕摺埋者、而有做成大小袋、以去毒棉線縫之、內載別種敷裏物料、如草皮柴苔木糠等、以作墊用者、此即以墊敷裏之法、丁、有剪成布帶者、寬約二寸至五寸、先醮以辟毒藥水、如加播匿或汞綠水、然後用以裹紮防護敷裏物料、爲此將紗入漿格外合宜、因溼時細上、乾即黏埋、而所敷之物不能脫也、

二、棉花、用法、甲、棉花將油膩去淨、吸水極速、因此做成棉球、或抹球、最合洗淨身上污穢之用、但祇可用一次、亦用以墊身之各處、如腋但不宜敷貼於傷口、因沾流質、便成一層硬而不可透之物也、乙、平常不去油之棉花、有墊夾之用、有做成棉塊裹帶、寬約四寸至六寸者、用以封密釀滿敷物之邊、極爲合式、因棉花仿如沙漏之隔水、能將傳於天氣中傳染之質隔出、不容入內也、

三、木糠、性能受壓吸水速而善、誠敷裹之美料也、而且令之

無毒、亦屬不難、或以局鑪烘之、或以滾水淋之、毒蟲便死、且價亦廉也、木糠之中、鳳尾松者、有最大之吸力、而杉木者具有辟毒之性、草皮柴苔、與木糠、麻纜麻、等物、以之作墊、或充實囊袋、甚屬有用、其法、以紗袋一、止半釀以此種之物、如是使其能以易於搖鬆、按身之各處、所以用墊有大小各式之分、其中有種須有處裂開、以合所墊處之用、

所有各種大小墊之尺寸度量、不便全列於此、惟將要者列出、凡最大敷裹所用之墊、如用於胸、腹、大腿、髀、等部者、須長二十八寸、寬二十寸、厚從一寸四分之三至一寸零四分之一、宜有裂縫深從四寸至八寸、須先將裂縫邊縫埋、然後充塞以物、而開裂縫、須按傷部或割處、或開於長邊中處、或於絃邊中處、不等、

小敷裹所用之墊、從二四八至十六寸丁方、


墊夾之墊、須長二十寸、寬六寸、

未將墊上以前、須將內物搖動、令其安合隣近窩陷、使傷部俱得均勻壓力、是故宜將物多沉於低處、如敷胸腋等部之傷、則物宜多沉於背、

宜將墊角摺起、有如敷裹已割肢體之頭、醫者須試將傷部緊隨用紗帶、溼加播匿或汞綠水、將墊緊紮於其處、務要整齊、再閉、

以棉塊帶將敷物之邊封固，如此可免天氣入傷口矣，末後用紗帶加細數度，但勿貼於皮，祇在棉塊帶之上便妥，見第四十三圖，所有窩穴（如腋之類）須先以沙勒先酸製之棉花或摺疊之紗填滿，然後用帶綑過。

四十三圖




倘用壓血法以割症除敷裹以外，其始一二或三點鐘，須加細薄樹膠帶，以增壓力，而此種之帶，於肛門鄰近之割症，亦須綑在敷裹物之邊，以防糞入。

論病者之位置　凡上藥換藥病者之位置，甚為要緊，必須置之使上藥之處四邊可及，而上藥時，須置身於自然之地。


若論將身承起，割症桌可助些少之效，而承下部之墊，見第四十四圖，亦屬不可少之物，壯者所用者，須高八寸，有時須要兩個輔理者，須將身扶置於合宜之位，承腳蹲之器具，於有時上藥，亦覺有用。

四十四圖




如下第四十五至四十九圖，乃指明人身上藥各處之位置。一、第四十五圖，乃上藥於上身之位置。二、第四十六圖，乃上藥於胯部前面之位置。三、第四十七圖，乃上藥於胯部後面之位置。四、第四十八圖，乃上藥於腹部之位置。五、第四十九圖，乃上藥於下部之位置。

第四十八圖




第四十九圖




論辟毒

去毒之法、使敷裹物料變爲無毒之至穩當法、莫若以乾熱或蒸汽而殺毒、用以殺毒之局鑪、其熱漸遞至一百九十四度、而物料鋪開在鑪內鐵線罩之上、俟以乾熱烘十五分鐘


四十五圖



四十六圖



四十七圖



之久、入熱蒸汽於局鑪內、使熱至二百十二度、此熱度留半點鐘之久、然後容蒸汽洩出、代以乾熱氣半點鐘後、容其漸涼、而物料之溼氣於是飛散矣、凡物料以此法去毒者、必須卽裹以漆紙、貯於五金片或玻璃箱內、至用時始出之、或俟浸以殺毒藥水、然後出之、

割症時用以洗割口之水、久煲之、亦可以殺蛆去毒、

淡水能甦激網質、而使之脹起、故宜每千分水中加六分之鹽、使像乎血汁、

在深處所汲之海水、亦適此用、但必先煲之、或加淡水、將鹽減至以上所論之分度、

在許多免腐物質中、今用以調傷辟毒者、謹將其最宜於用者列後、

一加播匿酸、○此乃甚力大之辟毒藥、一開一千分水之長力、能阻微蟲之長、而一開二十分水、二十四點鐘久之力、能全行阻微蟲之生、

此藥以酒或以油開之、有謂不能辟毒、加播匿酸乃毒藥、不獨食入內爲然、爲傷口吸入甚速、在皮亦然、於小子爲尤甚、於弱而血薄與患腎病者、常致發有受毒利害之狀、此病狀或新或緩、新者如神傷、緩者如混擾消化之功、嘔吐消瘦是也、

亦能甦激皮膚、用溼者更爲然、能致生紫癜瘋、水蛭癩、常兼有發燒、濃加播匿水甦激傷口、致增其流質、甚而至於成膿、因此、現在用之不及從前之多矣、若依李士打醫生之法、則辟毒之法、加播匿酸可推爲首、

用方、甲、有淡者、每百分水三分、用以去人手、器具、傷口鄰皮、傷口、與及海絨、天氣之毒、乙、有濃者、一開二十分水、用以殺有毒傷口之毒、丙、有用以泡製敷裹物料者、於紗更多、因其性甚易飛散、所以物料內含之加播溯、飛散極速、故以臨用時製之爲宜、

二、汞綠、○凡用以殺毒之藥、此藥之力、推爲最大、一開二萬分水、足以殺微蟲、而一開三十萬分水、亦足以止其長、此藥無味、惟極毒、若用濃藥、或長用淡者、足受其害、此藥不獨甦激皮膚、使成水蛭癩斑裂、亦可致令發出身內受毒之病狀、如口內發炎、流涎、大瀉、裏急下重、大腸下迴與直腸發炎且潰、內腎發炎等類、故用濃藥、須十分着意、

此藥一近五金卽變、故不能以之去器具之毒、亦不能以五金器盛之、若置於灌水筒、其器必以玻璃爲之、而盤則以玻璃磁或紙爲之、

用方、甲、有淡者、一開五千分水、用以去人手與傷口鄰近之毒、或以之浸海絨、抹球與及灌濯未縫之傷口、乙、有濃者、一開一千分、用以灌濯有毒傷口、較之用加播匿酸水、一開二十分者、更爲可靠、且不

若如是之險　丙有製爲酒者（一開一千分）用以保存貓腸線絲線海絨與及去流管　丁有用以泡製紗及別種敷裹物料者配法以汞綠一分（食鹽一百分甘油四十分）水一千分將此水傾在物料上其過多之水用手或機器搾出後將物料以微熱烘乾之　汞綠水或此藥所泡製之物時有觸激皮膚之患而且過些時藥便飛去故有用馬血汁參之（一分汞綠開一百分馬血汁）將紗泡於內如此則並無激鬱之患而又不失辟毒之物也

三鋸綠○此乃力大之辟毒藥兼乃丹藥但不侵未破之外膚無氣味無毒而價亦廉

用方　甲有濃者（八分鋸綠開水一百分）此藥能將有毒之肉（其時兼有成膿霉爛

全行將毒殺淨　乙有與水對半開者用以浸棉花團敷於醫院中之死肉症誠乃極妙之丹藥也　丙有淡者（一開二千分水）用以泡製辟毒敷裹物料與辟毒小墊　丁有製就小墊者乃辟毒敷裹之廉物也　其法以鋸綠三安半開熱水四十四安而以三十五安之（即蘇之類印度所出）浸於水內至將藥全行吸盡然後將蘇鋪開晾乾或局鑪烘乾用以鋪蓋傷口

四方散○此乃不甚力大之辟毒藥因其不能抵禦血蛇症但以不大鎔化與乎不甚飛散故其力甚長此藥不觸激傷口且能減痛斂水

但用此藥不能全行無險故於老者患內腎病者患心病者常

遭甚重之害、如混擾消化之功、嘔吐、發狂、神昏、是也、祇用些少便有不可救之患、爲此不宜用太多也

用方、甲、用以摻新得之傷而無即埋口之望者、如礮子傷是也、亦用以摻近口肛門與陰戶等處之傷、因此處難免受毒也

乙、開伊打酒、一分開酒七分、用以洗割症處　丙、以之製紗、用以蓋新縫埋之口、在各數裏物之下、又用以塞口鼻喉嚨直腸陰戶、膀胱溺管、諸傷處、俱是開而不閉者、故不能用全辟毒之法也、製方散紗之法、以十一碼每碼二尺四、紗置盤內、摻以三安士即二兩四方散、而以淨手搓之、至紗有一律黃色爲度、若用於涎膜房內、以方散粘紗爲最妙、因其黏貼於傷口、雖數禮拜之久、亦可以免霉爛也、製法、以六碼半紗、先拖過三安士松香開一安半甘油、及三十六安士火酒、每百分火酒內有五分水、俟乾後、始以七安士方散搓之

製方散紗之捷法、合於各樣用者、即傾方散伊打酒、方散一開伊打酒七開、於紗上、然後搓之、至伊打飛去爲止、但此製法、較以上之法、於價爲昂矣、

五、硼養酸、○此乃中等力量之辟毒藥、不大觸激肉質、又無毒性、

用方、甲、有開水者、每水百分開三十五分、用於腹與直腸等處之割症、以代加播匿酸、又方、沙泌先酸二分、硼養酸十二分、水一千分、

用法一式　乙有製鍊布者用以鋪益小傷極其適用於面部者更宜製法硼養酸一分滾水三分將練布浸於水內製綿花製紗亦用此法　丙硼養酸膏用以敷縫口之傷其傷不能用大辟毒敷裹物者如面部補缺割症是也亦用以敷有肉芽傷口　製法硼養酸粉一錢二分白蠟一錢二分杏仁油二錢四分巴剌苏二錢四分　又法硼養酸二十分花士玲或甘油膏一百分此法易而耐久故爲更妙

六釩鈦養炭輕養輕養○此乃力大之辟毒藥甘五分開一千分水不但止微蟲之長若用廿四點鐘之久能敗其生養之功能辟傷口流質與夫皮膚津液之臭味性無毒而價廉祇可開水而用因醋強酸乾時飛去祇留下釩輕養也但因其侵器具而令人手粗澀故不宜於割症惟其斂性能止血若以之溼抹球亦非不善之法也

用方　有開水者每百分水開一分至五分以紗墊醮之作溼敷藥用亦用以洗淨成膿變死肉或臭惡諸種傷口爛瘡又用於水蛭癩皮膚津液臭味如腋下肛門腎囊等處若夫用以長灌濯變死肉膿瘡霉爛肉死肉眾辟毒藥中此爲最美

製每百分一分之水藥法　水三十五安釩六錢鉛醋酸八錢五分浸二十四點鐘之久

七沙泌先酸○沙泌先酸乃力大之辟毒藥也不大甥激傷口

而性無毒，但能從敷裹物料脫出，變爲塵埃，令人咳嗽噴嚏矣，且價亦不賤也。

用方，沙泌先酸水，一開三百分，水，用以灌濯灌濯者，卽以灌水筒流水而洗濯之意，傷口，參以硼養酸，作爲辟毒灌濯之水，因用加播匿酸，或汞綠而起之水蛭癩，用沙泌先酸水，一開五分，或沙泌先酸膏，每百分花士玲或甘油膏開十分，沙泌先酸，甚爲見效。

八，鋅二錳二養八，此藥性易鎔化，無毒，價廉，而乃力大之辟毒藥也，五分開一百分水，便足以殺毒，而傷口霉爛之臭氣，因此藥灌濯片時，亦可全行辟之，但藥力不耐久，卽爲傷口流質所變，而化成一粽色墜下之物，不久卽出臭氣。

用方，鋅二錳二養八，水，一開一百分，至一千分，水之濃淡，按霉爛多少而計，其免較紅酒稍爲深些。

九，炭輕十四養，又名泰模，○此乃辟毒之妙藥，雖用一開二千分之水，亦可止微蟲之生長，氣味美，不大甥激皮膚，能減少傷口流質，性微有毒，但價極昂矣。

用方，泰模水，一開一千分，如十分醇酒，二十分甘油，泰模紗製法，鯨油，五百分，松香，五十分，泰模十六分，紗，一千分，湯火藥，卽常用之湯火油，胡麻油與石灰水對開者，每百分加一分泰模，能止痛兼辟毒。每一分開一千分之水，推爲漱口之妙藥。

十，衲地連，○此乃極妙之辟毒藥，不甥激皮膚，性無毒而價廉，

但不幸有不美刺鼻之氣味、
用方、製散、以摻不合之傷口、殺毒甚速、且能耐久、製紗、乃敷裹藥物之甚適用者、
十一、輕養、○此乃力大而無毒之辟毒藥、以三分開水百分、用以噴臭傷口與病房、能殺毒且力甚大、但價過於昂、不宜於用矣、
十二、醇酒、○此乃中等之辟毒藥、以之辟器具之毒、甚爲有用、於刀更爲然、因刀鋒不爲所侵故也、
十三、碘酒、○用方、碘酒、二錢、清水、十二兩、用以洗傷口與海絨、但不宜於金類器具、

辟毒藥散　宜摻辟毒藥散者列後、一、在靨下埋口之傷、如折骨穿皮、鎗子傷、輕湯火傷、是也、二、新瘡而爛破之大傷口、被開花炮子炸傷、或機器弄傷者、此傷乃不縫埋、而無卽埋口之望者也、又宜於湯火傷之重而大者、摻散所以免霉爛也、三、成膿之傷摻散所以減少流質、而發無毒易成疤之肉芽、四、有毒與死肉傷、摻散所以辟毒、
此等藥散、不宜摻於新傷應用線縫者、因其或有如外物之作用、阻止相黏之埋口也、
祇有不甦激傷口之辟毒藥、堪作散用、卽不加流質而滅之者、故推列後之藥爲最、

方散○因此藥其力不但大且耐久也故極推之於摻小鎗子傷此傷乃不可望透爲殺毒者也若用以摻甚大之傷（如開花炮子炸者）須要小心因受此藥之毒有時露狀也是故若無方散紗或別種之物在手以作辟毒敷裹用者用之則宜參以別物如石粉雲母石木糠草皮紫等類

連鍠養　鉍養（輕）加播匿酸粉　加播匿製之灰　納地以下之藥亦可作散

氣味價亦廉且有些辟毒之力惟鉍養則有時有毒但此兩藥若摻在有窩之傷必積而成塊也

沙泐先酸不宜用作散以摻傷口因其甦激傷口太甚且致痛多用之則有毒且不能抵禦血蛇之患

論換藥　敷裹潔傷口之藥物若果可以則留而不動直至埋口或不能總之不宜常換

若要不失換藥之時宜常驗看於傷之最低處更當如是須常用寒暑針以探熱度並察看病者情形

若流質溼透敷裹之物以至外面一與天氣相沾即變而壞由此直過層層敷裹之物而抵傷口爲時甚速欲免此患流質所溼透上層敷裹物之所須即洗以汞綠水以辟毒然後以辟毒之墊將溼處蓋過

若溼透之處大於手掌須將外層除去俟以多汞綠水灌濯內

層之後、重換新鮮大墊、

須要換藥諸故詳後、　一、傷口內覺甚痛、　二、熱症兼有身上各種不妥適、此則傷口大概有毒矣、若情形依然是好、雖熱度升起、而皮舌俱潤、則傷口必無毒也、　三、臭氣由敷裹物而出、

四、用樹膠去流管在傷口內、數日後（四或五日）必須換藥、務使合時除去、若久留在內、則令流質加增、但凡換藥、以速爲妙、故所用一切、宜先期預備、

未去舊藥以前、須妥置病者、令新藥易於敷上、所臥之牀須以樹膠布蓋護、免沾穢溼、

凡欲速割細紮之帶、則大而壯之剪、每適其用、

若傷口無毒、則不必灌濯鄰近之處、祇用抹球或棉花醮汞綠水拭淨、隨速將新藥敷上、


若有樹膠管在內、須爲拔去、若壓傷口、而尙有流質從深處流出、則將其洗淨、重放入內、

若傷口已埋、祇賸上層有些肉芽、可用硼養酸製之花士玲、抹在片紗之上敷之、或用些硼養酸練布亦可、若傷之旁有水蛄癩、發炎處須厚敷以沙泌先酸之甘油膏、或沙泌先酸花士玲、若尙無卽埋口之功、可敷以別種辟毒藥物、及稍爲常換之、


若傷已成毒、或發炎、或成膿、與乎露有吸液管發炎、膿瘡、血蛇等患、則所縫之線步、宜立卽剪去、將口大開、透爲洗濯殺毒、

發炎治法　安息、放高、與及敷涼凍之物、此三者、乃治不與天氣沾連諸肉、所發炎症之大綱也、至於種種傷口之炎、辟毒法足以克之、○安息一道、或綑帶、或用夾、諸如此種、另詳別處論放高之道、凡將各處放高、則助紫血與液之迴流、減少赤血之來、所以拒積血、而令滲出之水連於被吸也　將手放高諸法詳下、第五十圖之活斜板、或置於近牀之桌上、或在牀上一板上、其安置之法、能引灌水筒之水、落於接水之器、觀第五十一圖便知、凡欲竪懸手臂、必先用夾將全手夾住、所用之夾、或五十二圖之懸夾、或平常去肘節所用者亦可、而以布帶綑之、其綑法用螺絲紋、但不互疊、後以索繫其下端、將之竪懸、見


第五十圖



五十二圖



五十一圖




五十三圖、放高下肢之法、爲此而製諸具、如雙斜板等類、可擇一而用之、或將其肢敷裹以硬法、後用索懸之、或用木承之、使足較全身爲更

五十三圖




高見五十四圖爲此故凡傷背處宜面朝下而臥至於傷頭頸等處亦宜高舉之

第五十四圖




五十五圖



敷涼凍之法乃欲吸熱而使熱度減低也其法一以溼墊若要不斷吸熱此須常換如是則傷處易受攪擾若久留而聽之變暖則反爲行氣矣二以乾冷至善之法乃入冰於樹膠袋而敷之也冰袋之口須要緊閉故將閉口用窄布帶緊環繫於木枳見第五十五圖若過乎冷可用數層絨布或紗隔開冰袋至於豬膀胱能容水透出兼之快壞若免水透出須用豬油內外抹之以後適於用免壞則每用時先以辟毒藥水洗之玻璃瓶與馬口鐵箱內盛冰或涼水於吸熱較之樹

膠袋尤爲見效、但不大貼合於身耳、於窮苦之家、與打仗之時、則凍玻璃瓶、每每有用、四肢發炎之熱、以長樹膠管盤繞炎處、見上第五十圖、可大減之、管之一端、有穿孔鑞錫嘴者、置於冰水盤內、而一端垂在空器內、在下端啜之、便有水流出、若要管之下端、或鬆或緊、便能制之、若上器之水流盡、可將下器所接之水傾回、曾有以此法、減大熱症之熱、其法將一長樹膠管密排、而縫於被單、將此被單鋪於病者赤身之上、而令一縷冰水從管內流過、片時之久、熱度卽大減、而且有免溼病者之身、與及離牀之便矣、有以薄而柔輭之鉛管爲之者、以此吸熱速而有勢、因五金較樹膠爲易傳熱之物也、見




五十六圖

端啜之、則水自流矣、小玻璃角筒、或小五金類管、亦可作是用、見五十七圖、此滴水法、能減熱許多、因水氣飛散故也、所以水

第五十六圖　三、以水滴在患處、此法以灌水筒安置高於牀處、而令水滴在患處、惟先以絨布蓋好、使水佈散於此布上、水滴之快慢、可以禾稈草插入灌水筒之嘴以較之、若不用灌水筒、可以樹膠管爲之、一端有水制、一端有鑞錫嘴、將此管置於盛水器內、從管之下

五十七圖



七十二度之水極有涼凍之功至於加涼水以較冷熱莫若聽之熱度不必甚低流出之水須載以斜板見上第五十一圖或防水布而引其下流於接水器四浸以冷水凡新傷手足之熱此乃退之之極善法也而水之熱度不必太低因力甚大也若浸些時六十八度至

之於病者治舊炎諸患如血水滲出連網變硬肌筋相粘骨節髀硬以上或因受傷而致或因割去骨節之後用梗裹紮之時太久摩按一法用之有效其法或壓或搥或以指醮油而扤使敷皮膚下所滲之血水相黏處爲之鬆開吸管疏通然後或擦或扤使解鬆之質向心而去也

所有樹膠布諸般活動電氣與夫行氣之墊俱有加增吸提之力者也

神傷形狀　患者倒地不動不省人事言語昏亂或答非所問全身發顫皮作白色發汗略稠脈快無力而細呼吸失常忽速

忽慢或突作歎氣聲神貌不安眼力倦亂大小便自遺覆以寒
暑針覺熱低抽筋則孩子比大人尤甚或作吐若吐則爲欲愈
之徵以上病狀患各或輕或重病甚者或數時數刻卽死受傷
部位若闊或傷胸腹則爲最險死必速傷若輕腦力能漸復原
全身體質漸復功用則數點鐘亦可復原而安　腦部受傷有
祇傷神而未傷身者如受嚇死或聞凶耗憂死或身未死而祇
失力失神發汗割大症亦有因痛楚而神傷者醫生凡遇割大
症應時刻關心流弊

治法　神傷身未傷者醫者應慰以好言令安臥將息飲以暖
茶熱水樽熨腳蓋以氈條止此些須提理卽可期復原傷若輕
則用此慰理以期復原傷若重病人臥下頭應比身略低宜用
熱水布敷身熱水樽熨腳爲之搓擦手足令血運行飲以些須
美酒然切勿多傷口應洗理整潔裹紮如法受傷若極危險不
省人事應由糞門節射美酒以松節油擦身敷貼芥末甲膏或
施電法或令嗅輕滲或用罷蘭地酒數滴入口切勿多蓋病人
不省人事則忌酒及水恐錯入氣管也病若不死而復神越數
點鐘則必反强失平而轉熱以是醫者應格外留神切勿過與
熱茶湯酒宜令安臥投以利二便藥熱水布抹身以減發燒患
苦令轉平毋越神傷輕者卽漸次復原若重則必發燒矣以是
凡遇身傷神困之首日定應割截者本日內不宜動手

受傷後發熱　受傷或症經割後、多有身發熱者、人身強弱、受傷輕重、所發之熱、各有不同、患者身強壯、則所發之熱盛、脈快而有力、熱度高、面目作紅色、喉渴口乾、燒時或發譫語、若酒徒則譫語盛、聲高而狂、忽忽如有所見、且惶懼、所思所見皆謬亂、臥下仍左右反側、起動不安、傷部亦不知痛楚、亦有狂笑者、第多係狂怒難提理、

治法　此症應放血、或用蜞吮、以雪鋪頭、利二便、食物應些少、宜粥、或牛奶、忌一切發熱之物、及鴉片劑、　患者若身弱血薄、平素多病、則所發之熱不同、脈快而細無力、舌具黃胎、皮作白色、汗沾手如有膠、神貌不舒、若譫語則含糊而慌亂、如中酒、

治法　宜先利大便、瀉後每三點鐘、服鴉片劑一次、至安臥爲止、如身弱宜加酒少許、食物應易消化有益之物、如雞蛋、牛奶、牛肉湯等、有譫亂、宜令安臥勿起、好言勸慰、忌激抑、如不受勸而發狂法、宜衣以長袖、由背而穿之、服以繩並袖口而腰綑之、俾手不能妄動、切忌與角口舌、　以上壯弱二等、受傷發熱、均屬要凝、醫生應細審患者身之強弱、抑中材、細心施調、此等熱症並宜頻探以寒暑針、緣有忽或身熱改常者、若或身熱由凝改常、醫者應細察致凝之由、　凡傷後經有發熱、愈後身難復原、每易沾病、或多病、

內傷發瘧　血蛇　此二症譯詳內科全書

膿毒入血致患膿瘡、症緣患者身弱受傷後或症經割後、傷口發膿、膿毒入血因致別部患生膿瘡、此症病者身熱而衰弱危險、血內白輪多、身縱愈、亦需數月方能復原、沾此症迴管內衣能發炎、發炎時則成險候、蓋發炎則患處迴管、能令血凝作團、團若流行至脈管、或心部、則積而阻塞、劇成險候、此症將起時、瘡口乾、膿少而稀、脈及呼吸快、身熱而略有寒瘧、發大汗、經汗則身熱減症發數日之後、面作黃色、或鉛色、眼縮深、舌作棕色、且乾、脈雖快、然無力、呼吸亦速、所出之氣略甜、且有青草氣味、外週皮略溼潤、時或背發寒瘧、身有遊痛、寒後發大汗、身劇瘦、略譫語、尿或略酉蛋白、

所患之瘡、次瘡也、發於內則在肝在肺、或近骨節處所、全身內外皆可發、若患在臟腑、則尤險而易致命、瘡若發於骨較肌肉肉筋、則數禮拜數月或可愈、或致命、傷口膿若臭、則症重而險、

治法　症緣生氣不敷、如屋窄人多、或傷口失整潔、故療受傷等症、或割症以房屋寬廣、得生氣多為要、近房屋陰溝須在在起清、免成毒氛侵入、傷口尤須整潔、洗以解毒之品、食宜有益易化之物、牛肉汁、牛奶、雞粥、羊肉粥、并宜少飲美酒　服劑宜輕淡、炭養金雞納、等補之、皮有瘡、應放膿、敷潤皮劑、如麥糠甘菊花類、

鎖喉瘡、詳內科全書、

癰瘡論

癰瘡分兩種、一未潰、一已潰、初起由發炎、詳上文炎症論癰瘡、癰瘡所發之癰有數種、一色白而略黃、無臭、非稠非稀、此屬好癰、以顯微鏡察之、見有清水、內函圓珠、聚以試紙、具蛤蜊力、瘡發好癰、易收口、惡瘡所發之癰、或帶些血、色略紅、質或稀、能累附近好皮、其函有稠而成塊者、卽瘡中所發之明汁、不能變肉者也、惡瘡所發之癰、時或略臭、或臭甚、醫者見慣、立能看出係癰、抑癰中混有別質、可用鈹養水攪入癰中、癰卽變稠而易見、察以顯鏡、立能判是癰否、發癰之處有三、一內皮發炎、卽能生癰、一外皮發炎、損爛能發癰、一肌肉連綢、或臟腑發炎、能令發癰瘡、然無論瘡發何處、須分新舊、新瘡或數日或十數日方愈、舊瘡或數十日或數年乃愈、

新癰瘡病狀　患處皮色紅而略腫、皮緊且滑、痛處跳動、過二三日、或四五日、用指按瘡之左右兩側、若能動、卽屬有癰瘡、初發時、略有身熱、且全身不能自如、胃不思食、寒暑交作、

新癰瘡治法　外敷潤皮劑、兩三日、至按之覺輭、可用刺法放癰、放後仍敷潤皮劑、貼生肌膏、若變潰爛、須用加播匿水洗一方、加播匿珠一錢、清水四兩、和化洗患處、又方、忝綠毒三錢、清水四兩、和化洗患處、又方、忝綠毒三匁、布醮敷患處、或插入瘡口、又方、加播匿珠一錢、生油四兩、和匀、布醮敷患處、或插入瘡內、

舊膿瘡病狀　略腫不覺痛、指按不覺動、至將潰外皮則覺痛、漸潰出膿、變爲爛瘡、

舊膿瘡治法　瘡中若有腐骨、或有誤入針釘彈丸廢木竹器之類、必須逐一取淸、倘留些須、定必不能收口、其生膿之處、無論新舊、都有發膿、宜照上文炎症法治之

潰爛瘡　外皮患瘡、多發於腳、患處先發炎、繼成潰爛、所患之瘡分二等、一具疔毒、一否、無論患否、皆分六種、

一易治類、卽易收功、

一舊瘡、乾者、

一弱瘡、

一發炎、

一痛楚、


一遠年延久、

易治瘡　所生肉芽好、膿好、能漸自生窄、卽所生之肉芽幼密、血管多、瘡週色略藍白、

治法　此等瘡、能自然收口、宜加播匿水洗、或鏗磺養水洗、外貼藥膏、早晚換、瘡口若闊、應種皮、種皮法、以鉗將本人皮鉗起、或割症取得無毒之餘皮剪取薄薄少許、放於患處、上蓋練布、再貼合口膏、法宜種每數處、患處若闊、宜種數十處、皮每粒應大如粟、厥皮宜剪取薄薄、不須剪至內皮也、

弱瘡　瘡若患久、不能收口、則變爲弱瘡症、緣病者身體欠佳、或所用之法、未盡妥善、此症所生之肉芽作白色、芽或高低不平、或大小不勻、所發之膿稀、

治法　宜銅礦養水洗或用淡硝强水一方硝强水四滴丫片酒六滴清水八錢和塗再貼生肌膏紮布帶並服補血劑食宜有益補身之物患如在腳一法以隔紙膏數塊闊約寸餘長以能橫纏圍過患處有半爲度先以膏尾將患處蓋過貼實乃將膏斜纏過背收口卽在患處互交見五十八圖五十八圖



上左右不等患處色白滑且硬膿稀瘡邊皮硬白而厚近瘡之肉則實

舊瘡　患者多年邁患多在腳或腳背或腳眼

治法　患處打弔膏或異或用上文之硝强水法或銅礦養水俾令患口之肉發力生肌新生肌片畢貼生肌膏紮布帶或用上文之貼隔紙膏法

痛瘡　患處淺瘡邊薄所生肉芽高低不平色紅黑緣血管多也略輕揩卽作痛而流血所發稀膿能醃爛四旁之肉衣服無意揩擦亦痛而損

治法　應洗極整潔護蓋瘡面以免衣服揩擦宜磨銅礦養或銀丹一方丫片酒一錢鉛霜水一安和勻早晚塗再貼鉛膏或膏或生肌膏內服瀉劑利大便瀉後服補劑痛劇宜服止痛藥

發炎瘡　瘡邊紅腫而輭揩擦易爛多發惡水患處痛熱兼略

有身熱身體欠安

治法　病人宜安臥薦高患處外敷熱水布或潤皮劑內服利大小便鹽類俟紅腫退後塗銅磺養或鋅磺養水貼生肌膏

快發瘡　第五種瘡旁之肉炎盛則發變速或成此種之瘡或因疔毒或小便有疳則亦或變爲此種之瘡此症患處劇痛全身有病臟腑所發之汁不美血不好舌有胎

治法　瀉劑利大便戒口身有熱應服退熱之品熱清宜服補劑患處宜用强水或丹塗再敷潤皮劑貼生肌膏餘治如上法

迴管大所發之瘡　瘡多由舊患所致

治法　治此瘡應先將大迴管治妥如不能愈宜常紮布帶以免恆聚多血　紮法有二　一用長布帶　一用舒縮膠作韈厥韈開前或後開處聯扣以繩如中國之戰靴　治此瘡紮妥後宜恆將腳放平墊高忌多走動瘡口所塗之藥應照上加減貼生肌膏

火丁瘡　初起外皮一處色紅略腫痛發炎過三五日則作膿由一口而穿潰亦有延至十餘日而發炎者皮實作膿不多患者或數瘡齊起或一瘡未愈繼起別瘡病原血質不美或多食少行動或忍饑或食品不美或作工肌肉受壓如擔夫篙工粵孩多發於夏季發多在身或膊或臀及皮厚處所

治法　先服瀉劑利大便戒口瀉後服補劑如鐵劑金雞納外

敷潤皮之品，至炎紅退盡爲度，韞膿應割放，貼生肌膏。

背癰 發多在背，或頸尾，患處略紅黑而腫，底闊痛劇，越三四日則發膿，齊潰數口，潰後瘡面之皮隨腐爛，闊寸餘，至三四寸不等，其潰脫直爛至連網，故成深闊之穴，患者身帶微熱而弱，神衰困，此瘡能生大而闊，頂平發膿，連潰數口，患者多自四十五歲至年邁，然止發一瘡，齊發二瘡者少。

判症 年邁身弱，臟腑不好，瘡大者險，臟腑有症，如內腎壞老更險。

治法 先服瀉劑，再服些須，解毒發肝大小腸津液之品，便利清，熱退，舌無黃胎，則服補劑，夜候服止痛藥，俾安臥，食物宜精美有益易消化之品。

患處 患處敷潤皮劑，有膿應早割放，割法宜十字，或兩十字，若能早割，可免腐潰皮多，割後洗加播匿等解毒之品，再敷潤皮劑，腐盡貼生肌膏，然瘡既闊大且深，腐縱除盡，亦需一兩月方能收功。

斷筋或斷肌肉筋或肌肉 症緣忽發越度之力，患多在手足，然足跟之筋，亦可致斷，轉筋若猛，則身之肌肉條忙有致斷，

病狀 患處痛，斷際有聲，聲如物斷，患處失力，斷處有窩凹，

治法 其法有三，一須令肌肉鬆，一令所斷之肌肉續復，一月內令病者不可妄動，越一月後，用人幫扶，漸次舉動，若斷腳踁筋，則一月內應將所患之腳，以繩自鞋踁起，牽連至大

腿底、俾腳常屈、庶腳踵筋可期生續、初復行時、鞋踵應比常加高、以輔佐之

扭傷筋　骨較忽受牽扯、即能傷筋、筋原有二、一肌內首末之筋、一牽連骨較之筋、此症外皮連網肌肉、俱或有受傷、患處倏腫且痛、然須擔延時日、方能痊愈、第宜及早調理、不然、則成腐骨、或骨較壞、

治法　患處應放高、勿舉動、敷凍溼布一兩日、以免傷處發炎、敷溼布一兩日後、如尚發炎、宜改敷潤皮劑、或用蛲放血、俟不熱不痛、則擦藥酒、或以手搓擦、俾明汁散而腫消、若患部原有風溼、須服鈲劑、即鈲炭養鈲淡養以解風溼之毒、腫如略消、須稍舉動、以復該部原舊功用、若傷腳之下較、患者須安臥、紮布帶、勿行動、或用合口膏八九條貼之、貼法如上、見五十八圖、傷若重、宜以凍溼布、或熱溼布、試敷、擇合而用、或先擦藥酒、後敷溼布、或袋盛雪粒敷之、症如稍痊、應將腳較使之動、以免生梗、此症須數禮拜、或數十日、方能收功、

指尖骨疽　症緣骨衣發炎、生膿痛劇、致日夜不能安臥、腫由指連腕、所生膿龕在骨衣、潰時膿自骨衣透肉達皮、方能外出、故潰時骨亦或隨之腐脫

治法　日夜敷潤皮劑、手須用帶過膊盛之、此症膿既龕在骨衣、成膿時、膿鼓骨衣四週、離骨時、或骨亦因而枯死、故始作膿即癒刺放、刺宜深、直至骨方能外放、法刺癒由指邊、若刺正中

則愈後有礙知覺矣　內服瀉劑利大便發炎痛劇服止痛宴睡藥骨如已枯卽應割除不然則不能收口骨取出後應用小板條紮輔至愈乃已此症炎若發於筋衣治以上法炎退後筋衣若或粘筋則指不能伸動若然應以番槻開藥酒搓擦可期稍舒如仍不伸應令嗅蒙藥醫者力扯舒之如少愈患者宜常將指伸動庶免牽梗或仍不愈有礙工作則惟有將患指割去矣指發炎時炎或及掌至腕應外敷潤皮劑服瀉藥戒口

腕筋函膠成癟　症有二一單一孖連

單者患於筋包衣孖連者函於筋包衣內函者白而膠稠狀若蛋白此症不痛不炎患體漸次而起

治法　一用堅硬物敲擊令所函逼散以布墊壓外紮布帶數日如不能散應用尖窄刀刺放放後貼合口膏壓藥布紮布帶孖連者症略重此症不能敲擊使散惟搽碘酒紮布帶如不能散止可用割法然割後或發炎生膿則必至全腕生梗不能屈伸以是醫者應小心酌度勿妄措施

骨衣瘤生筋較肉　症或舊經擊傷或作工壓擦因而發炎致該處津液靡常轉成袋瘤此症患於腳掌骨交凸處或膊凸手踁凸生骨凸膝凸處所症緣患處津液逾常則或變作膿瘡患處撫之作痛皮紅發脈數舌有白胎大便結身發熱

治法　發炎時病者應減食勿肉食服瀉劑利大便患處應放

高、以板輔紮、使勿錯動、外敷潤皮劑、或用蜞放血有膿癒刺放、患如在膝應刺膝骨正中、刀口向下餘與治膿瘡法同、膝發舊炎、則腫而不痛、板輔膝後、外再紮布帶、外搽碘酒、或水銀膏、或汞碘膏、或打弔膏、治如不愈、應用割法、

骨癟　詳上文外、骨癟原有二　一實硬如象牙、一形如鬆骨、外有脆骨硬衣函之、硬者患於扁骨、鬆者患於長骨、如腿骨腳腕骨上截、患者之年、多自二十至四十歲、一身或不僅一癟、多緣舊傷位發炎、因而成癟、一或患於筋頭粘骨之處、或筋癟脆骨癟、輾轉變成此癟、亦有無故忽成者、

形狀　癟初起不痛、大則逼壓貼近筋肌、此癟外滑而圓硬、且

實緊粘不動、所占部位、或闊或窄、而有頸、

治法　以鈑碘汞劑作改病藥、無甚功用、徼幸或不發耳、患部宜勿勞動、以薄板紮輔、發炎應用法解散、恆或該癟不甚長大、患久亦然、如縣長大、即宜割除、（割法詳下第　篇）割後復發者少、

骨輾症　症成於小孩初學行走時、韌此症、長骨變曲、骨之兩端發大、腳之大小腿骨短曲、突向外、前胯盤淺闊、至十餘歲脊骨亦隨曲、凸向左或右、沾此症則病體不能承上身、下壓跨盤及腿額部、亦變高闊、至二十歲、骨曲處內鈣燐養積聚已多、則下能承上而症自愈、

病原　症緣先天不足、或所吸之乳質點有虧、或食物不精美、

致全身骨內鈲燐養不敷骨因輭曲、

治法　此症孩子住房、癒多得日光生氣食物癒精足及易消化之品、衣服尤須輭煖、日浴全身、浴宜煖水、或冷水、鹹水浴畢、宜手擦全身、俾血暢行、并令皮肉各核發津液、時教行動、誘其手足發力、內服利大小便補益之劑、鐵劑、魚肝油、牛乳加石灰水、患骨輭際、不可久站、無安歇睡、席地使蹲、出外宜乘小車或用人背負、初起一兩年內、宜睡比行多、俾得長育、如不能多睡、癒用鐵架撐輔、庶免加曲、鐵架有各款、有幫承上身、免重勢下壓者、有以螺絲牽骨令直者、醫者宜細心配合、

輭骨　此症患於成人、尤多在婦人、十八九歲臨盆至四十歲者、多骨變輭且脆、所患或僅數骨、或全身病者之尿、燐質比常人較盛、卽由骨所外放者也、死後骨輕且輭、油多易斷、以刀可任意割截、骨內鬆眼散大、中函之油稀、沾此症由漸深重、服各藥無甚功用、治法宜食有益易消化之物、及多得生氣、

骨衣發炎　症緣癆後、或經跌打傷、瘰癧、疔毒、風溼、其發炎之骨衣、所粘近內骨、亦連而發炎、

病狀　新症由骨衣積血、發明汁生厚、患處痛、撫倍痛楚、外皮紅腫、越二三日、骨衣之內生膿、致骨衣離骨、膿則占居正中、

辨症　此骨衣發炎新症、身熱頭痛、舌有胎、若發舊炎、則現風溼、或疔毒病狀、

治法　新症患處應放高以蜱放血敷潤皮劑有膿宜卽刺放後再敷潤皮劑無論放膿自潰其骨將必或腐或枯如覺骨有動勢醫者應早鉗取不可延待自脫服藥戒口照治新膿瘡之法

骨衣發舊炎　患處腫硬若瘤痛劇夜間尤甚多由疔毒（俗名疔墜）實卽骨疽也發於首則成膿穴或變腐骨發於下部則發膿少

治法　患處搽碘酒或打弔膏如疔毒服鈲碘汞劑

骨發炎　症分新舊新炎多發於長骨骨若全心發炎則連延全骨矣孩子瘰癧多患之症緣食物不精足或住處臭溼

病狀　初起乍寒乍熱患處骨心痛劇且外腫皮色略紅越數日則作膿所發之膿內函有油覆以顯鏡卽可判爲由骨所發者外皮所潰不僅一口或二三處不等成膿後骨漸變腐或多或寡若全骨心發炎則延累厥骨首末兩端

治法　新炎症服瀉藥利大便宜用鎂磺養鈲葡酸解熱另以丫片鈲溴等藥安睡患處癒放高敷潤皮劑或用蜱放血有膿宜早放放後再敷潤皮劑

舊炎症則骨漸生厚或長患部骨變實硬形若象牙

治法　內服鈲碘患處搽碘酒或打弔膏服藥須久方見功效


沾發舊炎之後骨或作有小膿瘡厥瘡多作於小腿骨上下處所患部皮不變色或略腫骨內覺有一處痛或作或止夜間病

尤劇、病者以手自按、能覈痛之所在、治法先按上法施治、如未得功效、應於患處外割十字、復以錐深鑽至骨、纔能放膿、腐骨腐骨多由於上文所論之骨炎、骨內先患小膿瘡、繼則骨內鬆處、間有變死、由患口以小探針探覈可覺、骨衣經有離脫、外皮略腫、且紅、膿由數口潰出、質敗且稀、有此徵可知骨內發炎、敗骨有些未能自脫、

治法 先覈病人有疔毒否、曾患瘰癧否、血薄否、若然、應按上文各法解毒調治補血、新腐骨症、若能細心理身補血、亦可漸次而愈、以是應選上等食物、并以補劑調理、外備鐵架、或木架、安所患肢體、庶免牽錯、圖見下六十二及六十三內服鐵劑、碘劑、魚肝油、患處搽碘酒、擦藥酒、或打雷膏、按上法如不能治、應用割法、先由潰口、以小探針探覈、測確腐骨形狀、取出探針、繼以小坑針帶刀、割闊潰口、隨用圓口或平口鑿、將有腐敗之骨、盡行鑿去、餘按上法治之、恆或大塊骨竟全變腐者、

骨腐急症 此乃骨之新炎延蔓多屬少者、恆於長骨患之、其患延蔓全幹甚速、此症常見於衰弱小兒、與因缺養而壞身子之輩、第五十九圖、卽此症也、

五十九圖



病者乃十三歲之女子、宿具瘰癧之毒、圖乃其小腿爲患此而割者也、究其發病之由、多因感冒寒溼而起、將抽戰發燒、

熱度甚高兼有水腫時皮面亦發赤其炎勢速至成膿而潰於多處白獭仁醫生云若膿發自炎骨者則寥有許多小油泡此乃辨症之要竅也苟病者經此患而復愈則其骨必腐多少矣

治法 利其大便隨服鹽劑以滅其熱狀至於止痛則用鴉片表散與別種安撫之藥可提高該處而不斷敷以熱水布時用蜈吮血亦著有效俟膿一成宜卽割而放之隨施敷藥

骨髓發炎症 乃骨之炎症其患多在髓管此乃鎗砲傷最常連累之患也故非在軍營則不常見之縱有亦非重症而或隨鋸割之後與骨折兼傷皮肉而發其原多因感毒無疑凡割治骨後或隨骨折傷皮肉有毒入傷口卽露有血毒發燒之狀如此之症每終於不起

治法 須捷而靈若有膿則割而放之而入放膿管於內但必須是應用者然後用之更宜多用殺毒藥兼以愼調病者身子爲要

大腐骨 症多患於臂腕骨大小腿長骨

形狀 骨發炎患處紅腫痛劇隨發膿此徑發膿炎之骨恆或過半或多寡變死厥骨由漸與無病之骨判離骨既死未脫則礙肌肉致不能收口常發膿水該骨且恆爲新骨所函連函者或多或寡或函半截此徑發炎變死之骨需數月或年餘纔與無病之骨相離應離處所好骨漸生肉芽推離敗骨患處若發

膿多、病人身弱而發熱、則終或致命、

治法　身弱或有癆癘疔毒、宜解毒補身、食宜精美之品、患處宜恒放高、洗以解毒藥水外敷潤皮劑、或搽藥酒、腐骨未離之先、醫者不能知所腐敗大小形狀、以是於腐骨離時、須割開潰口鉗取、鉗法或難或易、如不能鉗、應將潰口再行割闊、連錐數孔開作骨坑、庶可設法鉗之、倘長骨中有變瘤勢、可延連厥骨首末、如皮肉並腐敗甚、則或竟須鋸截矣、