

活
戸



-243

F
カ-62



國立中央圖書館

1961

490.9



K2-22

No. 2887

1A K 223

活民療法

癩療法



富士川文庫

1521

夫癩病者受天地間殺物之氣故也古今
因之謂癩風焉氣受之則在上者其疣瘡
與瘡上軀先見者多多者是也血受之則在下
者其疣瘡下軀先見者多是也其症有五
而千變万體矣其証肌肉麻木瘡癬疣瘡
濃汁淋漓眉髮墮落手足指脫頑痺痛痒
白皮脫落鼻梁坍塌倒眼爛齒豁色枯唇揭
聲啞足心穿膝虛腫耳鳴嗽々耳弦生瘡其初
發則氣逆上面赤頭痛或面紫虛腫肌膚潤動
手足肌肉不仁者也其面色不變而惟手足屈曲

或十指脫落此謂風曲即病輕者也其症有五
者赤癩黃癩風曲黑癩白癩也病症之惡無越
乎此肩此病者百無一生切戒房室公私無務
一切口味悉且屏置嚴禁戒務治療可得
萬一之僥倖焉

赤癩

是証手足俱腫赤肌膚敗爛也

黃癩

此症如黃胖虛腫眉毛脫落

風曲

是症者色如尋常眉毛不脫只手足
屈曲也

主方

四物湯加減口傳

傳云荆芥人參

六果各等分

黑癩

此症總身黑斑眉髮脫髮

白癩

此症一身白癬皮膚乾燥

今俗云志良古者白癩之甚也

惡症須知

耳有

フクサカ垂肉

從足大指腐爛

眼目開豁

顏色有錢斑

總身紫色

全身白色

手足乾枯

筋肉乾燥

○療此病以煎劑用丸藥一日三度空心服
十日一度以雷同丸取利以五十日為
一周焉

○土茯苓湯

以此湯用鎮衛丸

土茯苓

一斤但百六十日

右一果領為五十服一服水一合半煎取一合
再煎水二合煎取一合參煎水二合半煎
取一合先嚼鎮衛丸三粒煎汁一合頓服

○鎮衛丸

大黃

唐

黃芩

黃連

木瓜

木香

大風子去皮

各三兩

右糊丸梧子大每服三粒土茯苓湯而空心
服日三服以五十日為周

○雷同丸

下利方

巴豆

一兩
太急膜

大黃

半兩

牽牛子

一錢

右糊丸大豆大每服三粒先以煎湯用鎮衛
丸十日而次用此丸早一粒以白湯服次二粒

將白粥服服後勿令飲食食項而利惡
膜穢膩勿怨若質弱體虛之人者懼多利
欲止利則喫粥及飯乃止若不止者黃連一味
為末冷水服一周之間利以五次為常虛
怯人不可過二三次

○龍膏散

目藥

龍腦二分

石膏

一錢五分

右二只極末點目背些少二日一度若不用
之則大風子之毒損於目也

○雷粉膏

貼藥

大風子大蛤蜊粉少

右二只練合身麻木不仁之處或紫
黑斑色之地塗之曰一次臨寢臥貼

○洗浴方

雷托皮

右一品葉葉燒灰水煎日三次洗之

○貼方

蛤蜊粉

右一品紫萁自然汁融和身躬肌膚敗脫之處貼之日二次

○患癩人鼻孔窒塞者

大瓢霜一兩

蘇香油三分

大風子油

十錢

右煉合臨用火融和晨一度服每服梧子大塊食頃含口而後嚥下又以鐵鏞時吹入

鼻孔

口傳云

鐵粉極細末佳

○面發疣瘡者

蛇骨

石灰

雷丸皮霜

各等分

右三品酢和貼之

○又方

唐土

大黃

反鼻霜

各等分

右三品香油和貼之又治癰効

○快中散

生眉毛方

葎草霜

溫石

蔣霜

右為末胡桃油煉先真菰草燒灰水洗眉其後貼此藥也日二次

○洗藥

入目者目爛疼者

揀宜

右一品藥洗目及目胞

○硫黃散

癰瘡生虫者即此方貼瘡上

硫黃

三兩

雄黃

一兩

苦參

同

皂刺

五

紅花

二兩

輕粉

一分

右為末

是病近年多矣又治此病者許多皆謂以七日得効或云五十日百日而應有奇効貧金要利假令雖有得全治者暫時而再發矣若欲此病得全癒則莫如此方雖然無即効三年服此藥則無不全治尤依病之輕重

一年或二年而雖有全治者三年之間不服之則不佳又歷三年得全快之後亦寒暑之時或春秋可服二三劑如是者則雖有惡忘無有不全癒必有奇効矣此藥雖多服無為害身心壯健而有莫大之功焉

○將軍湯

以此煎湯服祛凡托

大黃

炒

防風

升麻

炒

苦參

牛膝

炒

右各一兩

如常割細一服一錢七分水二合煎

取七拘

再水一合五拘煎取七拘又水二合煎

取芍药每服以祛風丸三粒早午晚頓服

○祛風丸 以將軍湯服此丸

大風子 去皮炒 大黃 一兩半 防風 升麻

苦參 牛膝 各同上

各五品為末大風子膏為丸彈丸大每服三粒取將軍湯早午晚服

大風子 ハ 炮烙 ハ 至黑可炒能炒則以一二粒投雷盆可摺碎心中焦黑則不殘投入摺之千萬遍油脂出而粘着和末為丸口傳

口傳云大風子兼焚速可摺冷則不能摺夏則柔軟也務求多佳冬則堅強也末亦少佳

○平愈散 利下惡血方

大黃 三錢五分 蕎麥 二錢五分

右為末臨臥以無灰酒服五錢吞酒至醉及臥殘一錢之末藥中加入牽牛子頭末一分巴豆去心膜油為末一分及曙白湯頓服大便惡血瀉下多則延命丹或梅黑散

止血散服

○延命丹 止血藥

射干 牛膝

瘦米

各五錢

艾葉 四錢

蒼朮 葉四錢

古為末 白湯服

○梅黑散 血止方

梅諸

乃無女僕失為霜二錢

右一品為末 白湯服

○止血散

大麥

養精為末

葛粉 各二錢

右二品為末 白湯用

○白明膏

雷凡油 寸目

石灰

一錢

文蛤 一錢

右煉合貼 疔瘡死肌

稀莖散

角石 黃連 稀莖

右三品為末 香油和貼

又方

角石

羚羊角

右二品為末 漆和貼

○洗藥

荷葉

忍冬

槐枝

杉枝

右水煎可洗浴

亦方

浮萍草

右水煎羊日許漬洗

○靈丸

大風子

去皮炒
百五十目

鹿頭

牝牡合皮腦血為霜
十六錢

口傳云若無鹿頭則用鹿茸代

烏蛇

二錢

白蛇

二錢

片腦

八分

右五品粘丸

○安體圓

常服

大風子

百四十目

土茯苓

廿目
木香

川芎

十錢
大黃

十二錢
甘草

龍腦

黃柏

二錢

蘇香油

楊梅皮

各四錢

古為末大風子膏煉

○珍珠丸

真珠

辰砂

各二分

黃芩

黃連

各三分

土茯苓二兩 阿膠二兩 紫梗一分 雷丸二錢
右大風子煉為丸白湯用

○臧粉湯

臧粉

甘草各五分 黃芩 茯苓各一分

天瓜粉一分 土茯苓一分五分

右煎服

○連翹丸

大風子一斤 連翹 黃芩 荆芥各一兩

蒲黃一分 以上五品粘丸

○候莎湯

候莎一匁 荆芥五分 枳實 當歸 白朮

菊花 牡蠣 天麻 桃仁各三分

右煎服

○風祛丸

大風子一斤 風藤四十目 櫟實金二十目

翹 芸 密 勝 大 賓 皂刺各二十目

右粘丸每日三十錢服

○苦參丸

大風子^{二斤} 苦參^{各一斤} 桑葉^{各一斤} 風藤^{十斤}
牛膝^{二斤} 此胡^{二斤} 人參^{一斤} 五方

右粘丸^{三十三日}用

○雷丸丹

大風子^{一斤} 生地黃^{二兩} 辰砂^{當飯} 黃芩^{各一兩}
黃連^{大黃} 芎藭^{木香} 白芷^{各一兩}
阿莫藥^{一兩} 人參^{一斤}

右粘丸^{二劑}用至三劑則加烏蛇白蛇^{各一兩}
凡一劑^{二十一日}服

○家傳真珠散

縮砂仁^{高陸} 枸杞子^{厚朴} 靈天蓋^{紫河車} 真珠^{龍眼肉} 金箔^{乾生薑}
小麥^{十羅} 甘草^{十一品各五分}

右為末白湯^{七日}服

○白檀湯

白檀^{黃柏} 大黃^{山茨姑} 柴胡^{肉桂}
玄參^{鱉皮} 各^{一斤} 甘草^少

右水^{三升}煎取^{一升}四合^{七日}服

○蘇香丸

大風子十四百八十目貝母各一苦參各一芎藭各一

蘇合油人參各一大黃九黃連四

土茯苓八梗承春秋二十目
復冬十目

右為末粘丸六十三日後方煎湯而服

山飯來三川芎一苦參五茯苓一

右水三合煎取二合再二合煎取一合三服

○神即丸前方數服后覺容色安則此丸服

山危子香色炒
黑炒二色石菖蒲地骨皮生芩

兎絲子牛膝以上六味各五

右蜜丸每服三十丸七日服

○迅速散利下方

大黃一白丑一羊生羊炒爵金五皂刺一

右為末曙取藥五分白湯服

○黃連散留泄方

大黃黃芩黃連芍藥白朮茯苓

當飯前苦參各一

右為末冷粥而服一錢

○辰砂丸 仕上方

大風子 葛根 白檀 辰砂 卮子

黃柏各一兩 金箔五十枚

右大風子膏月蜜和凡梧子大金箔百枚
為衣每服一丸日三服如是以次用藥慎
禁戒則必莫有不治者矣

赤癩 加益母霜 胡椒

黃癩 加山梔子炒 芩苢霜

風曲 加荊芥

黑癩 加真珠或風藤霜

白癩 加風藤

○灸穴 膈腧 肝俞 騎竹馬 養漿風市

足三里 懸鍾 即絕骨 曲池

○餌食 麥飯 粥 粟 大麥 小豆

黑豆 大根 牛蒡 獨活 胡麻

薯蕷 柏味醬 昆布 鱖

○禁哺 生薑 川椒 薤子 麵 蕨 薇

蕎麥 養餅 芥 蒜 葱 韭

胡蒜 油脂 酒 菓 魚 鳥

戒房事三年息思慮三年

輕治方

防風通聖散
補氣瀉榮湯

回春
當飯飲
臍瘡門
壽世一方

濟世
當飯飲
入門火証
生血潤膚飲

