家傳療治集

k 3

F
カー65

490.9
Ka-1

No.2356
旧 K3

慶応義塾大学医学情報センター
昭和47年7月4日

富士川文庫
1484

家傳療治集

一 三匁

[illegible]

[illegible] 竹布 [illegible]

一 二 [illegible]

生綿 [illegible]

一 三 [illegible]

一 四 [illegible]

〆 九匁

江戸 [illegible]

[illegible]

[illegible]

一 三匁八卜

〆 [illegible]

[illegible]様

[illegible]

一 四匁 [illegible]

[illegible]様

一 弐匁八卜

[illegible]

[illegible]様

目録

一薬性之事　一丁
一六陳八新　五丁
一灸当りし薬　廿八丁
一目薬忌之　廿九丁ト　卅二丁上（但シ山之薬　洗薬内薬）
一東山丸（小児薬）　四十八丁
一目薬四方寿　八丁
一諸病加減　四丁
一打身之薬方　廿七丁　又四十四丁
一痔薬　廿五丁
一癪之薬　四十六丁
一ひぜん炒薬　同所
一（目薬）明星散　四十八丁

秘傳療治

夫醫療者以ス散テヲ々不傳以ス
傳々不傳レ以ス心ヲ々不傳不
變也

凢寒熱之両證爲ニ人命ニ見
證以ス寒トモ不レ念熱トモ不レ念是不
思非不思不定々々ナ剌風ハ
西ヘ南風ハ北ヘ靡諸病之療治
信妙不傳通レ心也

目録

一中風　五丁　一傷寒　六　一咳氣　十丁
一諸痰　十二丁　一瘧疾　十三丁　一痢病　十五丁

一諸虫（ヂウ）（付腹痛）十八丁　一霍乱（クワツ）二十一　一腫（シユ）氣 廿四丁
一麻病 廿五丁　一腫物 上同（灸）　一歯痛（口中）上同
一発熱 廿八丁　一田虫 上同　一疝氣 廿九
一寸白 廿九　一眼病 廿九
一婦人 三十七丁　一小児 四十　桔梗湯
一妙方色々

秘傳療治　帰本口傳

病証之心持

一病証之虚實　一脉（ミャク）之虚實
一寒熱之虚實　一氣血之虚實
一風寒暑温（シツ）之虚實

右虚實之心持病ヲ先見立其ノ上薬之能毒ノ虚實ヲ心得病ニ隨ヒ分別シテ使也諸病同病也見立ニ上手下手有リ病ヲ不知シテ薬ヲ自由ニ使事ナカレ念ヲ入テノ病ヲ見知リ心ヲ以テ心ニ考其病證之寒熱ヲ一大事ニトリ留テ十ノ熱ナラハ七八ホトサマシテ病人ノ氣

色ヲ可見也ソレニ随ヒ連々ニ薬ヲ使ヒ病証ノ虚實ヲ可考也食モ病ノ虚實ニヨリ可食過食ヲ第一ニ忌也本病ヲ十ニ六七其ハ疾ヲ残テ養生スルモノナリ百病ハ心得次第ニ療治スル妄ニ薬ヲ不可用凡薬ニ毎師病ニ有師寒ニ病有リ熱ニ病有虚ニ病有リ實ニ病有リ風ニ病有リ暑ニ病有湿ニ病有リ諸病ノ見立一大事也

○傷寒四季用薬方

貴　頭　ト　ソ　氷　前

右六味サムケ立汗ナキニ用上熱ヲ上ル

薬ナリ

行　芍　圭　貴　ト　頭　吉　木

右八味是ハ汗シテ後用加減痢ツカヘハ木ヲ去テ氷ヲ加ル熱少ノ有モ用

右ノ六味初發ニ用ル時心悪ハ二三服モ又用熱ハ夕ヘニ上リ胸ホトヨリ心少ノトカニナリ頭痛和キ有ハ右ノ八味ヲ可用也再發トハマミカヘシノ事也其ハ時又サムケ出有ハ又初發ノ六味ノ本薬ニテ熱ヲ上ケノ又煩セ其後八味ノ薬ヲ可用快氣メ食ノ味出心能ヽウニ成時甘草ヲ少ツヽ加用也諸病ニ熱ヲ上ル時ハ此加減ニ療

治スヘシ熱氣腹中ニ有テ胸ホ
トヨリ喉乾キ有ハ芩ノ柴胡
ノ類ニテサマシ可見心悪ハ此薬ヲ
去リ右八味ノ類ノ薬ヲ用ルヿ
可也右ノ初發ノ薬ニテ熱上リ
ルヿナクハ圭ニ永川木トノ類
ノ大熱ノ薬ヲ薬味ニ随ヒ可用也

一心熱脉ツヨシ浮テツヨキハ風熱
沉テツヨキハ湿熱汗有ニハ汗
止ル薬汗無ニハ汗出ル薬剤病
此外諸病同心持也

一虚熱脉カイナシ浮テモ沉テモ
カイナシ心熱ニモ上中下有リ虚
熱ニモ上中下有

一汗有ニハ桂心芍薬（不忌用ル大事ノ心持也）

一汗無ニハ陳皮香附子右同断

一カワリノ痰ニハ紫蘇荊芥陳皮
香附子右同断

一痰有ニハ白朮半夏黄耆右同
右朮半痰有ニ大形去ル痰切レ
サル時此二味ヲ使痰有過ル時右ノ

二味ヲ使名誉ニ瘥キレ吉此ヲ秘
事ト云傳也

一干姜ハ（リヨク〆キ下スモノナリ秘傳ニサハラニ テタメテ下シニ下ル䏙用レハ名誉ニ留 ル此ヲ知ルモノナレ）

一甘草加ル事（薬性ヨワリシタツキト薬キカセヌヤウニ 用ル心持也）

一芍薬不加事 血ヲヤフルモノ也気力有䏙ハ
破テ也ニ気分悪キニヤフリテ
アシヽ

一人参之事（躯介ニ不可使ヨワリタル病人ニ 用ヿ以外ナリサレモ大事ニ）
及䏙ハ可使タトヘハコウハリツヨクテ家ヲタヽヌ
心持也口傳

一甘草之事（国老ト云煎薬ニ不入シテ不叶 ヿヤウニスルヒカヽナリ子細ハ）
病凡ト見テ品々アリ諸ノ病因前也然ニ甘草ハ
諸ノ薬ノ性ヲ和ケソレヽヽニ導ナリ見付相違ノ
䏙ハ薬ヲ悪導キ病ムツカシク成也トクト病見
付薬廻ル䏙ニ甘草入ヿ大事ノ心持口傳右
人参甘草川芎三色ノ薬使事大事口傳
多申傳也

一川芎之事 能ク薬ヲキヽカスルモノ也是モ
甘草心持見キワメナキニ
薬ヲ用ヿワリ過テハ病ヲ重ク成ヿ大事ノ心持口
傳

一婦人懐妊ニ去ル薬之事
桂心 肉桂 沈香 麝香 丁子
甘松 惣メカラキ物不用タトヘ方中ニ
有モ去也

一薬之名本字之事
人参 甘草 芍薬 當皈 陳皮
厚朴 白朮 桔梗 香附子 蒲黄（ホヲワウ）
葛粉 茯苓 木香 莪（ガ）朮 蒲黄（ゴレ）
丁子 桂心 黄蘗 大黄 黄芩
干姜

地黄 紫蘇 麻黄 半夏 荊芥
柴胡（サイコ） 枳實（キジツ） 枳殻（キコク） 香薷（コウジユ） 川芎
前胡（ゼンゴ） 檳榔子（ビンロウジ） 白芷（シ） 黄耆（キ） 防風
沉香 杏仁 大腹皮（ダイフクヒ） 肉桂 升麻
車前子 薄荷（ハツカ） 知母 麦門冬 附子
若辛（クシン） 桑白皮（ソウハクヒ） 芋松 木通 五味子
貝母（バヒ） 黄連 山梔子（シ） 葛根（カツコン） 牡丹
澤瀉（タクシヤ） 午膝（ゴシツ） 遠志（オンジ） 烏薬（ウヤク）
紫河車
紫梅ヤウ下ルト則川ニテ竹ノサキト
ケテサシ通シ血ノケヲヌキト去テ洗カ
ケテエニシテ酒ニテムシサテ粉ニシテ
使ナリ後産ノ事也

一 薬之名一字書之事

門（ハクモントウ） 卜朴（コウボク）日 圭（ケイシ） 枳（キコク） 苓（ブクリヤウ） 荊（ケイガイ） 栢（ワウバク） 山（サンシ）
梔 日 大（ダイワウ） 參（ニンジン） 芎（シヤクヤク） 朮（ビヤクジユツ） ソ（シソ） 洋（ハンゲ） 沢（タクシヤ） 吉（キキヤウ）
鍚（ホウフウ） 若（リクシン） 麻（マワウ） 羌（キヤウクワツ） 猺（トククワツ） 葛（カツコン） 知（チモ）
連（ワウレン） 兵（ビンロウジ） 芩（ワウゴン） 玄（ゴミシ） 姙（セウテ） 杏（キヤウニン） 芷（ビヤクシ）
實（キジツ） 耆（ワウギ） 芪 日 帰（トウキ） 竹 日 頭 沙（コウブシ） 日
陳（チンピ） 貴 日 川（センキウ） 𧾷 日 蒴（サイユ） 萌（センコ） 薷（コウジユ）
永（カンキヤウ） 姜 日 芋（ロンソウ） 國 日 柴（サイコ） 通（モクツウ） 苛（ハツカ）
木（モツカウ）

一 薬使様秘傳 一大使ツカヘ心二六

其ハマヽ生ニテ使一大使[illegible]（シケリノメ）下ルニハ
アブリテ使一汗毎身カワカハ其ハ
マヽ使生ニテノ一身ニ汗有穴ヲイ
有ハアブリテ使一喉乾ハ其儘生
ニテ使一喉乾スハ炒テ使フ一小使
ニフリ不通ニハ其儘生ニテ使一小
使下ルニハ炒テ使

茱性

微寒（スコシカン）微温（ウン）
一人参
気血ヲ補多ハ気ヲ補フ也
気ウワニ不用

微温
一黄氏
気ヲ補汗ヲ止気ウツニ不用

温
一白朮
胃ヲ補食ヲスヽメ湿ヲカハ
カス胃寒ヘメカワクニ不用

平寒微
一麦門冬
胃カハキ咽カハキヲ止肺ヲウルヲス

寒大寒
一山梔子
肺ノ火ヲ浮ス虚煩（ホトヲルヿ）ニ用ル
小使ヲ通ス

寒
一黄芩
肺ノ火ヲ浮ス上焦ノ熱ヲ浮ス

寒微寒
一黄連
中焦ノ熱ヲ去ル目ヲ明ニス
血痢ヲ治ス

後
寒大温
一黄栢
腎水不足ヲ補赤白痢治ス
諸病ニ用但粉末ニシ吉シ

温大温
一當皈
血ヲ補アタヽムル

寒
一地黄
血ヲ生ス胃弱キ人ニ不用
腎ノ熱ヲサマス

平微寒
一柴胡
熱火ヲ去胃ノ気ヲヒイテ
上ル胸ノ熱ヲサマス

微寒
一前胡
半表半裏ノ熱ヲ去ル寒熱往来ニ

微温
一独活
凡ヲ治ス上焦治頭痛ニ

同
一羗活
風湿ヲ治ス邪ヲ治ス

平
一猪苓
小便利〆茯苓ヨリモ甚シ

寒
一沢瀉
小便ヲ通ス燥（サウ）ノ人（ロカワクノ）ニハ不用

平
一木通
小便ヲ利ス九竅（キウケウ）ヲ利ス（キヤウフウノ〻）

平
一茯苓
小便利ス汗多ニハ不用

温
一檳榔子
虫ヲ治ス諸薬ヲ下ス気ヲ下ス大便モ瀉ス

温大温
一厚朴
中ヲウルヲス胃實ヲ瀉ス

微寒
一枳殻
胸モトノ急病ヲ消スル大便ヲ通ス多用下ナカレを極大虚

温
一荊芥
凡寒表ニ在ヲ消ス産後ノ中凡ヲ治ス

温
一紫蘓
汗ヲ発シ毛穴開キテ广黄ハヨリカロシ

寒大寒
一大黄
瀉シ年老虚シタル人ニ不用
咳嗽痰結スルニハ悪シ

温
一陳皮
脾胃ヲ補凡寒ヲ去ル汗ヲ出ス

温大熱
一干姜
嘔吐ヲ止ル腹痛ヲ止

微寒
一桔梗
痰ヲウルヲス上ニ有テ下ヘ不レ下ノ気ニハ吉

一（微寒）香附子
頭痛治汗ヲ出シ血ヲ散ス
氣ヲ下ス氣血ニ吉モ血ニモ

一（温）川芎
頭痛ヲ治ス血中ノ氣ヲ散ス
多用レハ正氣損ス心得有

一（平微寒）升广
汗ヲタウシ肌肉ノ間ノ熱ヲ
サマス表虚ノ人ニハ不用

一（平）甘草
薬力ヲ丸クス諸薬ヲ引
テタシカニス

一（平微寒）芍薬
血（ヲケツ）ノ腹痛ヲ治ス赤ハ血ヲ破
ル白ハ止ル血虚ニ不用

一（温）木香
血ヲケルヲス虫ヲヤハナケ句月
ハラノ滞氣ヲ瀉ス

一（平微寒）良姜
胃冷テ腹痛ヲ治ス宿食
ヲ消ス

一（温）莪术
胸腹ウツキ痛ヲ治ス虫ニ吉

一（大熱）桂心
中焦ヲアタヽメ血脉ヲ通

一（温）三稜
血積ヲヤフリ血ノ脹（チヤウ）消ス
虚スル人ニハ不用

一（平）紫草
九竅（キヤウ）ヲ利シ水道ヲ通シ
痘疹ヲ治

一（温）丁子
脾胃ヲアタヽメ腹内冷テ
イタムヲ治ス

一（平）葛根
肌熱表発シ汗シ温
ヲ止

一（温）防风
身半上ヘノ风ヲ治

平 一 葛粉　渇ヲ止ム

温 一 五味子　嗽（シハブキ）ヲ治シ煩熱ノ証ニ用
壓熱ヲ生ス

寒徹寒 一 枳實　利下ル

平 一 午膝　血ヲヤフリコシヒサセホ子ノイ
タミヲ治ス

寒徹寒 一 牡丹　血ヲ破ガ癥（カタマリ）ヲノソク

温 一 半夏　熱痰治脾肺ヲカワカス
姙ニ不用

寒 一 栝樓根　燥疾ヲ治小使止大使カワク
ヲウルヲス

温 一 杏仁　咳嗽ヲ治シ氣ノ道ヲウ
ルヲス

平 一 桃仁　大使ヲ通血ヲウルヲス血
ヲマワル姙ニイム

温 一 巴豆　寒積ヲ破ル生冷ニ傷ラルヽヲ
治寒積ナキニ煎メ不用

平 一 蒲黄　ナマニテハ血ヲヤフリ炒メハ血ヲ補
炒ハアフルヿヽ

徹温 一 沉香　益積ヲ邪氣ヲ去テ薬カヲ引

温 一 香白止　心腹血刺（サシ）痛宿血破新血
ヲ補

徹温 一 艾葉　婦漏血止ル崩血ヲ止ル安胎
赤白痢ヲ治

一 伏竜肝　婦漏血崩血ヲ止ル安胎
カマトノヤケ土ナリ

○諸病加減

一 痢シケクハ
木圭　白止　姜

一利ケツセハ
枳姜大梹實青皮（貴ヨリモツヨシ虫ニ吉）

一小使ツカヘハ
木通沢茯梔

一汗有ニハ
圭白止木芎耆

一冷（ヒユル）ニハ
姜圭貴朮卜頭耆

一熱（ねつ）（熱）ニハ
柴芩門梔大連

一サムケ立ニハ
貴荊ソ頭姜卜朮

一口乾咽乾（カワキノト）ハ
柴芩門梔

一トキマツニハ
芩姜木霍香

一不食ニハ
朮芎姜茯（熱ニハ兵芩山ミ、冷ニハ圭姜卜）

一腹痛ニハ
朮芎芋（熱ニハ栢芩柴梔冷ニハ圭姜卜木）

一嘔吐（ヲヘト）（アワヲハク）ニハ
葛貴姜半

一痰（タン）
熱ニハ芩梔
寒ニハ貴頭吉ソ荊

一六陳
狼毒　广黄　枳實　半
橘皮（陳皮イ一）　呉朱萸
右此六味イカニモ古キヲ用テ吉性強ク毒有故也

一八新
紫蘓　薄荷　槐花　沢蘭
菊花　赤小豆　欵冬花　荊芥
右イカニモ新キヲ用ユ

一中風
加減四物湯　口眼ユカミ手足不叶舌コハリモノ言ス ナクナマクシ発サメ汗出ル眩
當皈　芍茉　陳皮
桔梗　紫蘇　香附子　荊芥　各ホ分

右七味煎シサツ〳〵細々用ユ気付心ヨキナラハ人参川芎サツ〳〵加ル悪キ時ハ人参川芎不可入右ノ加減ニテマツ用ル也又右七味ヘ厚朴ヲ加ヘ可見自然アタリタラハ朴ヲ引白朮ヲ加フ此茉ニテモ登リタルヿナクアタリタラハ右ノ本茉七味ヲ可用ユ也

一傷寒　表證（セウ）悪寒シ頭痛項コハク腰痛発熱汗ナク脉浮ニシテカ有ヲ治ス

麻黄湯　汗毎ニ用
广黄三分　桂心二分　杏仁　甘草各一分
右生姜ヲ入煎シ用

香蘓散　汗毎ニ用
香附子　紫蘓各三分　陳皮二分
甘草一分
右生姜葱白根入
煎用

加減香蘓散（身熱ミソヽロ寒ク汗無ニ用ヒ又ニ瘡門ニ）（入腫氣ノ如クニシテ息アラク雖発スルニモ吉）
香附子 陳皮 麻黄 桂心（各ホ分）
甘草少 右六味煎用
桂枝湯 汗有ニ用 桂心 芍薬（各二分）
半夏 甘草（各三分 アブル） 右四味煎用
同方 汗有ニ用 桂心 芍薬
陳皮（各ホ分） 甘草少 右五味煎用
裏證陰證身冷ハ
當皈湯 當皈 芍薬 陳皮
桔梗 紫蘓 香附子 荊芥
厚朴（各ホ分） 右八味煎用（桂心ヲ加ヘ可也）（汗有時ニ用）
加減 利ツカヘハ干姜ヲ加ル自利
セハ 白朮 桂心ヲ加ル

半表半裏ニ三日過テ頭痛悪寒
発熱ハヤ退キ咽乾キ小便結シ脉中ニ
シテカ有リ
柴胡桂枝湯ヲ用 柴胡 芍薬
黄芩 甘草 桂心（各一分）
（胸痛ニハ半夏ヲ去桔梗ヲ加熱有咽カワキ大便不通ニテ）
（姜麥門冬桔梗ヲ加半夏人参ヲ去食ナラスハ）陳皮
（ニテ姜桔梗ヲ加）
半夏 人参（各半分） 右七味煎シ用
（半夏人参ヲ去 耳不聞ハ知母ヲ加ル）
裏證六七日過テ悪寒ニセス汗ナク咽
甚乾キ小便赤ク大便通セス脉沉ニ
シテカ有リ
大柴胡湯ヲ用 柴胡（二分半） 大黄（三分）
枳實（一分） 黄芩 芍薬 半夏（各二分）
右六味生姜ヲ入煎シ用

小承氣湯　大便不通狂言スルヲ治ス
厚朴（三分）大黄（五分）枳實（二分）
右三味煎用生姜ヲ入ル
暑ト温ト氣トタヽカイ頭甚痛ミ胸ニ
汗多ク脛冷ヘ妄語ス脈濡ニメ弱ハ
陽證少ニメ急ハ陰證

茯苓湯　茯苓　干姜　白朮
桂心　甘草（各等分）右五味生姜入煎用

諸證加剤　胃冷テ咳逆セハ參
永貴
脈浮洪ニメ熱メ咳逆（シヤクリ）セハ連芩甘
表證ノ時咳嗽セハ貴杷麻杏ソ
裏證ノ時咳嗽セハ芩柴玄圭

表證ノ時嘔吐セハ　葛貴半
裏證ノ時吐嘔セハ　芩実ト生姜
半表半裏ノ時嘔吐セハ柴芩貴半芍
表證ノ時自利セハ　紵葛芍圭甘
裏證ノ時甚熱メ自利セハ　芍芩
自利メ咽乾ハ　葛知芍
自利メ渇セサルハ　臓ノ寒也
參朮永圭甘
汗スヘカラサルノ証脉遅ク弱クハ亡血咽
痛ミ小便シフルニハ汗スヘカラサルノ証也
下スヘカラサルノ証脉浮テ弱嘔吐咽ノ穴
フサカリ小便黄ナラハ下スヘカラス

紫蘇湯　傷寒熱甚有テ身ア
タヽカニ喉カワキ小便黄ニ
シフリ大便不利サムケ立汗無ニ用之

香附子（共マヽ）陳皮（ウカラン）厚朴（同）紫蘇（大ナ忌）
荊芥（同）右五味煎用汗出テハ芍薬
桂心ヲ加 大便秘ハ干姜枳実
檳榔子ナトヲ加 小便不通ハ茯苓
木通沢瀉山梔子杯ヲ加 裏熱
メ手足膚ヒ心ナル故ハ干姜
桂心ヲ加ル 熱アカリ胸ホトヲルニハ
黄芩柴胡ヲ加可見
傷寒ノアカリニ用ル薬
貴頭ト圭朮吉草

桂枝湯 汗出テ身熱モナク心ク大便小便下リ頭痛スルヲ治ス
桂心 芍薬（少炒）白朮（同）陳皮（同）厚朴（同各一）
甘草 右煎用 疼有ハ桔梗
香附子ヲ加 熱有ハ柴ヲ加
傷寒傷風咳気ハミカサマシ過シ
諸病フラメキ脉カイナキニ用
介芎貴頭朮圭吉
傷寒傷風諸湿ヒヘテ虫痛ニ吉
圭芎姜介貴ト朮頭荊

又方 陰湿熱頭痛利ツカヘ小便赤クシブリ汗出不食スルヲ治ス
芎桂朮貴朴、氷茯ソ頭
各ホ分煎用
寒ヽ気ニアテラレ胸痛ミ熱内ニコモリ
タル時用
竹芎朮頭貴荊柴苓甘
脛（スネ）ニ腫気有時用是凡湿也
貴芎竹ト荊頭圭吉
桂枝湯 汗出身冷頭痛スルニ用
咳気ニモ吉
桂心芎䓖厚朴荊芥白朮
當皈（各ホ分） 甘草（少） 右煎用 痰ナルハ桔梗香附子ヲ加フル
敗毒散 人参柴胡前胡茯苓

川芎 羌活 獨活 枳殻 桔梗
木香（各ホ分） 甘草
右煎用熱甚シク上気ナト又ハ小児
ニハ人参木香ヲ去ヘシ人参木香ニハ
心得有也大形常ニハ参木二味ハ
去也生姜ヲ入煎ス
延命湯 凡寒ヽ暑湿内傷外傷諸
病ニ吉
當皈芎䓖白朮厚朴香附子
陳皮荊芥（各一） 桂心 干姜（各半） 甘草（少）
右煎用
消滞丸 湿熱ノ物ニマフラレ痞満悶
乱スルヲ治ス
大黄（一両） 枳実（半両炒） 神麹（半両炒） 茯苓（二銭）
黄芩（二銭） 黄連 白朮 沢瀉（各二銭）
甘草（一銭）

右細末メ餅糊ニテ●是程ニ丸湯ニテ用五十粒モ八十粒モ其病人ノ様子ニヨリ用也利下リタル服ハ此薬毎用

一咳氣

白朮湯（咳気ノ後セキ切ニ出テ不食シテ心悪ニ用又女ノ血ノ道ソヽロ寒クフルイ立ニモ吉）

芍薬　白朮　陳皮　厚朴　荊芥
紫蘇各一　右煎用

病証寒熱不知ニ四日食ナク
熱甚有大便ツカヘ汗ナキニ用頭痛
ニ食傷腫物瘀血亦久シキ諸腫
物ニハ山帰来薬能ナリ

當歸　芍薬　陳皮　香附子　厚朴
桂心　干姜　荊芥
各等分如常煎用　一日ニ一貼宛

橘蘇散　咳嗽痰有ニ吉

陳皮　紫蘇　杏仁　五味子　半夏
桑白皮　貝母　白朮各一　甘草半
右生姜ヲ入煎用

加薬
香附子　苦参　厚朴　黄耆
芍薬　川芎　升麻　麦門冬
茯苓　桂心　黄芩　梔子　人参
檳榔子　枳殻　黄柏

咳氣ノ後セキ切々出ニ用

廿一

芎貴頭ト吉荊ソ

敗毒散　咳気ニ用

人参・茯苓・前胡・柴胡・川芎

羌活・獨活・桔梗・枳殻・香附子

右各ホ分　甘草少　煎用

右ハ傷寒ニ頭痛
痰咳嗽鼻フサカリ声ヲモク四時ノ
病ホツ子ツ諸ハニツウトク小児ノ
キヤウ風イモハシカ子ツトク各用ユ
能々弁ヘ可用但シ発散ノ剤也

咳気ニ用

頭・貴・吉・荊・芎ト甘

煎用セキ出ハソヲ加疱瘡ハシカ
ニモ初ニ吉

貴頭ト姜吉ソ荊

熱サメツル跡ニ姜ソヲ引圭芎

朮ヲ加・貴・頭・吉・荊・芎ト甘

セキ出白月ホトシルニハソ紫梔ヲ加

一諸痰

清氣湯　諸痰セキ有テ痰毎
ニ息キウミ行スルニ息キレ
ソロサムクロ乾クニ寒熱トワス此薬ヲ
用ルナリ

香附子・陳皮・桔梗・紫蘇

當皈（各一匁生 ヲツカフ） 甘草（半） 右煎用

熱有時ハ柴胡 山梔子ヲ加

痰切レカヌルニハ 半夏ヲ加 白朮モ時ニヨリ少加ル

桔梗湯

痰乾ヲケルヲスニ吉

咳氣ニモ用エ

當皈 芎茦 陳皮 香附子

桔梗 厚朴 紫 荊芥

右各ホ分煎用

咳痰ニ用茦 陳皮 香附子

紫蘇 荊芥 各ホ分 煎用

胃ホトシリ口乾ニ柴胡 梔子ヲ加

胃冷咽乾ズハ 白朮 厚朴 干姜ヲ

胃冷咽乾ズハ 白朮 厚朴 干姜ヲ加ル

二陳湯

湿痰ヲ治ス

陳皮 半夏（各等分） 茯苓（三分） 甘草（一分半）

生姜ヲ入 煎用

加減二陳湯

痰ニハフキスルニ

當皈 芎茦 陳皮 桔梗 香附子（各等分）

熱有ニハ柴胡 麦門冬ヲ加 冷ニハ干姜

桂心ヲ加 食アル時 半夏 白朮ヲ加少宛

快ナリテ 甘草ヲ加

一瘧疾（キヤクシツ）

生料五積散 陳皮（六分） 白芷（二分） 厚朴（四分）
枳殻（一両二分） 川芎 桔梗（各六分） 甘草 茯苓（各二分）
麻黄（六分） 蒼朮（一両四分） 干姜（四分） 半夏（二分） 桂心
芍薬 当帰（各二分） 右十五味生姜葱白ヲ入煎用ユ

桂枝黄芩湯 柴胡（六分） 石膏（四分）
甘草（一分） 黄芩（二分） 知母（一分半） 桂枝（一分）
半夏（二分） 右七味煎用
汗無ハ汗ヲ発スヘシ 貴葛氷ツ
一荷葱

一汗有ハ汗ヲ留ヘシ 芍耆圭柴芩

白朮湯 諸瘧寒熱共ニ用 汗有ニ吉
白朮 当帰 芍薬 陳皮 厚朴
黄耆 桂心（各一各生） 煎用一日ニ
一貼ツヽ小便服甘草ヲ加胸ツカヘ
腹ハリタル服 干姜 厚朴ヲ加

瘧大小人虫腹痛ニモ吉 帰本秘傳瘧名誉ニ落ル方
竹芍 貴 頭 卜朮 圭 氷 吉
荊（各ホ分） 右十味煎用
サマシタキ服用 傷寒霍乱ニモ吉
右ノ方ノ内卜朮圭姜ヲ引 柴芩梔ヲ加

癰落テ後用　右同方也
川芎貴頭木吉（各等分）圭（半）甘（少）
右八味煎用
桔梗湯　諸癰汗毎ニ用寒熱陰陽トモ用
當皈芎䓖香附子陳皮厚朴
桔梗荊芥（各一各生）　右煎用
自熱ツヨキ時ハ　柴胡黄芩ヲ加
甘草ハ少使時加
虫気ノ時ハ莪朮檳榔子ヲ加ル時モ有大形ハ
シンシヤクスヘシ何ノ癰ニモ此加減ナリ日ヲ經テ
重クナルトモ此薬用ヘシ毎早効トテ加減有
ヘカラス此両方ハ第一ナリ
胃ツカヘ腹ハルニハ厚朴ヲ加
疝氣癰ノ薬
楊梅皮（二匁）五倍子（一匁）甘草（少）
右細末メ癰発ル日薄茶三服ホト空腹ニ
水ニテ用ユ
癰腫氣サシセキ痰ニ用
當皈芎䓖陳皮茯苓香附子
荊芥桔梗（各等分）紫蘇（等分）
此薬ハ養胃湯ノ内厚朴ヲ去テ茯苓
紫蘇ヲ加
大便ツカヘハ干姜ヲ少加
大便下ラハ白朮ヲ紅色ニメ加
小便ツカヘハ木通ヲ加
小便シケクハ茯苓桔梗ヲ去テ厚朴
桂心干姜ヲ加
右ノ方毎之ハ本方十日計用可快
同方
當皈芎䓖陳皮香附子荊芥
茯苓桔梗（各等分）紫蘇（等分）八味
右ハ食スヽミ少快クナリタラハ腫氣ハ連々
ニ引ヘシ痰多ク出氣ヲトロヘハ茯苓ヲ去テ

人参半夏ヲ加

同方

當歸 芍薬 陳皮 荊芥 香附子

白朮（各ホ分） 桔梗（半） 甘草（半）

手足冷脉伏スル時ハ肉桂 川芎 干姜ヲ

加気ヲトロヘハ人参ヲ加

小柴胡湯　柴胡（二匁） 黄芩（一匁）

半夏（七分） 人参（七分） 甘草（少）

右生姜ヲ入煎用

瘤名叅言ニ並洛ル方　口傳アリ

地黄（半） 當歸（一） 芍薬（一） 川芎（一）

甘草（少） 右五味ニダイ〱一包ニ半

分程ツヽ入煎用

一痢病

道氣湯　下ノ後重スルヲ治ス痛ニ用

木香 大黄 檳榔 黄連 黄芩

枳殻 芍薬 當歸（各ホ分） 右八味

木香黄連湯　木香 陳皮

木通 黄連 枳殻 黄柏（各ホ分） 右六味

芍薬湯　膿血多ク下リ後重スルヲ治ス

芍薬 當歸 黄連 黄芩

桂心（各三分） 檳榔子（一匁二分） 甘草（一分）

木香（八分） 大黄（一匁二分） 右九味煎用

芍薬黄連湯　芍薬 黄芩（各一両）

甘草（半両） 右三味腹甚痛ニ桂心ヲ加

加減　一腹痛ニハ芍薬 甘

一熱セハ百 一冷ハ圭永

一腹ハルニハ卜兵ニ氷　腹皮
一熱ニハ苓芍連　栢
一咽乾カハ葛門圭
一小便シブルニハ通苓
一小便赤ハ栢通連
一吃吐セハ葛貴半生姜
一身重ハ　羌苓蒼

脉之弁

一微小ハ生　一浮洪ハ死
一滑大ハ吉　一強急ハ凶

平胃散

過食メ泄瀉スルヲ治ス
蒼朮（三分）厚朴陳皮（各二分）甘草（一分）
右四味煎用泄瀉トハ下リ腹也
竹ノ筒ヨリテツスマウニ物也

益中散

白朮（一両）陳皮芍薬
茯苓（各五分）干姜（三分）甘草（一分）
咽乾カハ葛粉ヲ加ヨ

理中湯

中焦虚シ胃冷（ミフリハラニモ）泄瀉ヲ治ス
人参白朮干姜甘草茯苓（各ホ分）
腹脹ニハ卜兵貴ヲ加ル

芍薬湯

後重シブリ痛ミスルニ用
當帰芍薬陳皮厚朴紫蘓
香附子荊芥（各ホ分）右七味煎用
加減　一胸ホトヲルニハ柴苓山

一甘草加ルヿナカレ痢痛モノナリ

一痢ナヲリ食アル時甘草ヲ加ル

温中湯　冷テ腹痛スルニ用

桂心　陳皮（各五分）　干姜　厚朴（各三分）　甘草

檳榔子（各二分）　右六味煎用

香附散　香附子　良姜（各示分）

右二味粉ニメ塩湯ニテ用

附子散（寒ニアタリ急ニ心痛スルヲ治ス）

附子（三分）　桂心　當皈　白朮（各一分）　干姜

半夏（各一分）　右六味煎用

理中湯　冷腹下ルニ吉

人参　白朮　干姜（各一两）　茯苓　厚朴（各二两）

甘草少　右六味煎用

加減　不下シテシフリ痛ニハ白朮ヲ去テ

黄連　大黄　黄芩　檳榔ヲ加ル

禁物　ヨモキケシノ類ニラ堅ク無用

白丸圓　巴豆ヲ　墨　香　生　三色

ニシテ●是ホトニ食糊ニテ丸シ菖ノ粉ヲ衣

ニシテ一粒ツヽ用呑汁ハ、ウル米ヲ水ニ入スリ立

天目半分ホト一度ニ右ノ丸薬一粒用一度ヨリ

外ニハ不用トイヘ𪜈様子ニヨルヘシ但食一時

ノ間前後イムナリ腹和キサハラニ成ル其後

又一粒右ノ通ニ用ル也ニ粒ト用ル事ナカレ小児

ニハ一粒ヲ四ニ割一ツヲ用ユ

補中益氣湯　（痢病快ク本利ニナリテ後気分フラメキ悪キ時）

此薬ニテ補ナリ

黄耆　當皈　陳皮　柴胡（各一匁五分）

人参　白朮（各一匁）　甘草（五分）　升麻（三分）

右八味煎用
痢病ニ用
皈卜芎貴頭圭姜荊
熱有ニハ柴苓ヲ加
又方　頭貴卜芎姜荊
但シ凡ノ上ノ痢病ニ用テ吉

一諸虫付腹痛
安虫湯（虫痛身冷寒霍乱ノ如ク ハキ身スクミ難義ノ時）
當皈芎茱陳皮厚朴桂心
荊芥　香薷（各一 各生）干姜（半）右煎用
痢下レハ白朮桂心ヲ加ル
氣色少快ハ甘草（少）加不快ニハ甘（少モ）
不加諸病甘草ノ加減如此卒尓ニ
不可用

虫気ニ吉但シヲ血ニモ吉
頭芎亇貴卜甘圭朮
右八味煎用
虫食傷霍乱諸虫ニ吉
貴頭卜圭荊　五味煎用
調胃湯（虫痛腹コハリナンギスルニ用 粉茱ニテモ不快時用ユ）
白朮陳皮厚朴桂心荊芥
紫蘓桔梗（各一 各生）　右八味煎用但シ
虫カフリヲタムナラハ茱ソロミ、可用但シ
用様加減ヲ一ナリ痛トキハ少ツ細々
可用諸病ニ茱用マウ如此ナリスルキモ
アシ、アツキカンヨミ
調中散（諸虫痛ニ此粉茱吉シ凡 寒暑湿諸不快ニ用）
當皈芎茱香附子陳皮桂心忌（姙ニ）
厚朴干姜白朮（各一匁 各生）黄栢（十匁 ソロ色ニイル）

甘草（少）　右十味粉ニメ一度ニ耳カキ三ツ
ホトツヽ湯ニテ用ニメリテノ細カニ不成トキハ
イク度モアフリ茶研ニテヲロスナリ右ノ方ニ
莪朮ヲ加ルモ吉

正氣散

男女心痛腹痛虫霍乱食遠ヒ
腹下リ胃アシク吐逆諸病ノ気ニ付
諸病ニ用テ吉

當歸（一匁二分 一夜浸洗剉）　香附子（上同 甚ミ）　白朮（上同）
芍薬（上同）陳皮（上同）厚朴（上同 甚ミ 上皮ヲ去）桔梗（一匁）
莪朮（八分紙ニ包 ヌラシ火ニ入 温メ剉）　丁香（三分）　甘草（七分）　黄柏（二匁 イル）
右十一味　剉粉ニメ耳カキニツホト究湯ニテ
毎日自茶ニ二三度ツヽ可用當病ニハ茶ニ
三服程ツヽ熱湯ヘ入カキ立テ可用
右合様カケ合セ炭ノ火ニテアフリコニテ炒メリ
ヲロシフルイシメリタラハ又炒粉ニスル也能キ
妙茶也

調中散　粉茶

黄柏（七両 アフリ）　干姜（一両）　枳殻（一両）　白朮（半両 アフリ）
陳皮（一両）　香附子（一両）　甘草　以上七味
右細末メ挽茶半服ホト究湯ニテ用ユ
産前産後腹虫不食頭痛気重ニモ
小児乳ヲ吐カンカハラニモ痢病霍乱傷寒ヽ
傷風ニモ虫コハリ腹ニハ塩湯ニテ可用萬
病ニ吉シ

養胃安虫丸

腹痛虫霍乱食遠ニ吉
大人ニ五粒宛小児ニ半粒ツヽ湯
ニテ用

木香（六分）　莪朮（同）　白朮（一匁）　陳皮　厚朴
桔梗　干姜（各一匁）　黄柏（二匁）　葛粉（一匁五分）
丁香（五分）　甘草（少）　以上十一味

調胃安虫散

秘方霍乱虫ニテ腹痛ニ吉シ
男女心痛ニ吉シ食遠吐逆ニ
惣身冷ナンキスルニ吉食胃ニツカヘ食ノ味ナシ

胃アシキニ吉　腹下リシブリ痛ニ心アシキニ吉心痛
ニ吉小児ノカンカハラニモ腹痛ニモ吉瘦裏ヘ穴服
汗出ニ吉
白朮（十三分白水ニ一夜浸剋アブル）　陳皮（上同）　芎藭（上同 鉄ヲ忌）
厚朴（日上皮去 火ニアブル）　桂心（十一分其ママ剋上皮ヲ去火ヲイム）　莪朮（六分白水ニ一夜浸シアブル）
丁子（三分其ママ火ヲ忌）　干姜（六分其ママ）　甘草（五分其ママ）
黄栢（二十分剋アブル）　右十味細末メ一度ニウ
ス茶半服ホトツヽ湯ニテ用自茶ニ耳カキ
ニツホトツヽ湯ニテ用小児ニハ乳ニ付テ用ユ

冷テ腹痛スルニハ
桂心　陳皮（各五分）　干姜（二分）　厚朴（三分）
甘草（二分）　檳榔子（二分）　煎用
寒湿ニテノ脾胃アシク腹痛ニ吉
朮　貴　卜　圭　荊　ソ　吉

香附散　冷テ虫腹痛ニ吉
香附子　良姜（六分）　塩湯ニテ用
附子散　寒ニ當リ微ニ心痛スルヲ治
附子（三分）　桂心　當皈　白朮
干姜　半夏（各一分）
桂黄散　脾胃不足痰虫不食ニ用テ吉
當皈　芎藭　陳皮　桂心　干姜
枳殻（各二）　厚朴　白朮（各三）　黄栢（大）　甘草（少）
右煎茶ニモ散丸共ニ吉シ一度ニウス茶半服
ホト湯ニテ用ユ小児ニハ耳カキ一ツホト乳ニテ
用ユ痢病霍乱カンカハラニモ吉シ
理中湯
人參　白朮　干姜（各一両）　茯苓　厚朴（各二両）

甘草（少）　右煎用

白朮桂心湯　當皈　芎䓖　陳皮（泄浮ニモヨシ渋リ腹痛ニ吉）

白朮　厚朴　荊芥（各一）　桂心（半）・七味

右ハ腹節ハリ痛ニ吉シ不食ニ吉食傷ニ

吉シ湿ニモ痰ニモ吉噯気ニテ身ホトヲリ頭痛

ニ吉

不食之時用茶（煎茶ニナリ候　粉茶ニナリ候）

白朮（一半）　芎䓖（一）　桔梗（二）　陳皮（一半）　香附子（一）

厚朴（一半）　茯苓（一）　荊芥（一）　紫蘇（一）

大便カタクハニ亍姜ヲ加汗出ハ桂心ヲ加一平生

用テ吉萬病ニ吉

一

霍乱

理中湯　冷テ腹痛スルヲ治

人参　甘草　亍姜　白朮　陳皮（各ホ分）

香需ヲ加ル　右六味煎用

加減　芎　亍　卜　苓　圭　枳

吉葛　頭（各ホ分）　右九味煎用

陳皮湯（一切腹痛之寒熱候ニ　虫ニモ吉シ）

陳皮　桔梗　香附子　芎䓖　當皈

亍姜　厚朴（各ホ分）　右七味煎用

又方　桂心　白朮　桔梗　亍姜

荊芥　甘草（各ホ分）　右六味煎用

又方　陳皮　白朮　厚朴　芎䓖

亍姜　桂心　甘草（各一分）　右七味煎

用ユ

加減　一痢ツカヘハ　枳永ヲ加ル

一汗有ハ　芎　圭　耆　参ヲ加　一汗無ハ

貴頭柴ヲ加 一胸ホトヲラハ苓柴
ヲ加 一食ナクハ竹苟苓ニ水ヲ加

黄連香薷散

（身冷足冷腹痛吐瀉スルニモセヌニモ心悪ニ用）

香薷（六匁） 黄連（一匁） 厚朴（一匁） 白ヘン豆（一匁イリテ）
右四味末メ塩湯ニテ用右黄連
ヲ去テ三味合叓 秘傳ナリ
霍乱第一ノ薬也

（返氏）通魂湯

霍乱第一ノ妙薬儀ニ死セント
スルヲ治（干生姜ニテモ塩ヲ入煎用妙也）
生姜（大） 塩（中） ホ分ニメモ吉 ホウロクニテ
香イロニ成程イリマケンニテヲロシ（スリ鉢ニテスリタルモ吉三）
天目ニ水七八分ホト入スリ立クラ〻ト成
程ワキ返シアツクナクヌル〻トサマシテ
用ル則吐テ吉吐スハ二三度用大吉叓又ノ
妙薬也身冷手足冷ハ霍乱ト知ヘシ
冷ハ湯ヲアヒスル也身アタヽカナル者ニハ
行水不仕ナリ湯ヲアヒヌルヿ不成ハ
湯衣ヲアツキ湯ヘ入ヨクシホリ病人ノ
腰ニ巻付冷ハ又巻カスル也如此アタヽ
メテ吉

又方

枳殻 桔梗 二味煎
ヌルクシテ用吐瀉シテ吉

香薷散

（霍乱吐瀉スルニ用虫食傷ニ積暑気ニ何モ用ユ）

香薷（三匁日ニ干ス火ヲイム） 厚朴（其侭刻）
白篇豆（一匁水ニ浸上皮ヲ去リ炒）
右調合メ日ニ干テ薬研ニテ細末メ茶一服ホト
ツヽ湯ニテ用陳皮白朮干姜ヲ加吉

廿

大霍乱茶

（名方茶精ツヨシ大霍乱心痛急ニツマル）クイ付虫食傷惣テ急病ニ用ル秘茶ナリ

當皈一　芎茶一　白朮二　干姜二　厚朴三

茯苓二　桔梗二　枳殻三　陳皮三　桂心二

甘草一　香需五　右十二味

常ノ煎茶三包ホトヲ一包ニ大服ニ合テ如常煎用立所ニ生ル也手足惣身冷ハ大霍乱ト可知其ハ腹ハ湯ヲ後ノ一ノ骨ニ手巾ヲタヽミ盃アツキカニシメニ三桶モカヘル名誉ニ吉灸天ノ腹分食遠ナトニテ大霍乱ナトヽ云ロコゴヘ虫胃ヘアカリヒシトツマリ大切ニ見ル腹此茶用希妙也

又方

食傷ニテ腹痛発熱シ霍乱ノ証用茶精少ヨハシ後ニ用茶也痢病ニモ吉シ

當皈一（少アフル）　芎茶一（同上）　陳皮一（同上）　桔梗一（同上）

枳殻一（少アフル）　白朮一（同上）　厚朴一（淇）　桂心半（同上）

干姜半（其ママ）　香需一（其ママ）　右十味

常ノ煎茶三包ホトヲ一包ニ大服ニ合如常煎用吐逆シ下ストモ此茶用ニ痢病ニモ吉シ熱有ハ柴胡　山梔子　黄芩一加可用　秘方口傳

清心丸

霍乱腹虫何病ニモ吉

黄蘗十両　木香一両　桔梗一両　白朮五両

陳皮両　枳殻三両　甘草一両　干姜三両

右八味粉ニメ●ニ丸シ一度ニ十粒ツヽ湯ニテ用散茶ニモスルナリ

調中丸

霍乱腹虫不食セメヘリニ（吉内ノツロワナリ万病ニ吉）

黄蘗十　厚朴三　枳殻二　干姜一

桔梗一半　桂心一　陳皮二　甘草一

一人参（一半） 右九味粉ニメ●ニ九一度ニ
五粒ツヽ湯ニテ用又粉茉ニメウス茶一服
ホトツヽ湯ニテ用惣テ是ノ茉ナリ久ク持
（ニハ丸茉ニスルナリ）
霍乱ニハ熱キ湯ニテ用不食々傷ニモ凡引
気重キニモ女ノ血心ニモ熱キ湯ニテ用虫ニハ
塩湯ニテ用シブリ腹ニハ米ヲスリタメテタ
ル水ニテ用サハラニハ食ノトリ湯小児
惣テ是煩ニ万病ニ吉サユニテ用

アキ炎 クイ付虫ノ茉心痛ニ吉
楊梅皮 良姜 葛粉（各四両） 胡椒（一両）
クシン（二両） 右五味ノリニテ●ニ九シ塩湯ニテ用

調胃安虫散 秘方粉茉小児ノカン
カハラ腹痛マセヲトロヘ子汗出ルニ吉シ

胃女心痛ニモ霍乱虫ニテ腹痛ニモ食遠
吐逆シ惣身冷難儀スルニモ食胃ニツカ
ヘ食味ナク胃悪キニモ腹下リシブリ痛ニ
心アシキニモ吉小児カツ病ニテ湯水ヲ呑暮時
分ヨリフツト目不見クヒホソク腹大ニテ鼓
ニ病ニ此茉ニテ名誉ニスキトヨシ女ノ血ノ道
産後諸病ニ吉鳥目ノ小児ニ吉萬病
不治ト云ヿナシ
白朮（十三匁） 陳皮（同） 苟茉（同） 厚朴（同）
桂心（十一匁） 莪朮（六匁） 丁子（三匁） 乾薑（六匁）
甘草（七匁） 黄蘗（二十目） 右十味粉ニシ
テ一度ニウス茶半服ホトツヽ湯ニテ用
自茉ニハ耳カキニツホトツヽ用右ノ茉
味ノ内桂心 莪朮 丁子 乾薑四味
ハ火ヲ忌ナリ別ニ粉ニシテ合スルナリ

廿四

○一腫氣

當皈 芍薬 陳皮 荊芥

香附子 茯苓 桔梗 紫蘇 各一

以上八味煎用（大便ツカヘハ干姜ヲ少加 小便ツカヘハ木通ヲ加）

補中湯 積聚ノ腫気凡毒温気ニモ瘡気内ヘ入ニモ用

當皈 芍薬 陳皮 厚朴 桂心

香附子 紫蘇 荊芥 各ホ分 煎用

利ツカヘハ枳殼檳榔子干姜ヲ加

利シケクハ白朮桂心ヲ加ル

積聚ノ腫気凡毒ニモ湿気ニモ瘡気内ヘ入タルニモ右ノ本方ニテ用白月ホトヨリアラハ

柴胡黄芩ヲ加

○一淋病

當皈ニ 芍薬ニ 桂心一 陳皮一半 厚朴ニ

茯苓ニ 甘草半 七味煎用

熱有ハ桂心ヲ去柴胡ヲ加ル

利ツカヘハ枳殼干姜ヲ加ル

利シケクハ白朮ヲ加ル

小便ツカヘハ木通沢浮ヲ加ル

虫痛ハ荊芥香薷ヲ加ル

又方 梔子 茯苓 當皈 木香

芍薬 各ホ分 甘草少 煎用

○諸腫物

調經湯 癰疔諸腫物ウミ出後気不快ニ吉

當皈 芍薬 川芎 黄芩 黄連

大黄 檳榔 甘草 沉香 茯苓

地黄（各一匁）　山帰来（四匁）　以上十二味
是ハ不断ノ加減ナリ
右調合メ一包ヲ五度ツヽ煎シ不断ノ包ナラハ一日ニ
一包ツヽ可用大病ノ時ハ山帰来百廿目十包ニメ一包
ヲ二日ツヽニ廿日用也別紙ニ可見山帰来不入ニモ用

又方
本茶十包ニ調合スルナリ
大黄（一分其ヽヽ）　黄芩（同）　當皈（同）　川芎（同）（火忌）　沉香（同）
檳榔（同）　人参（同）　地黄（同）（ヲ火忌）　杜仲（二分）（炒火）　黄連（同）
甘草（同）　茯苓（同）（其ヽヽ）　山帰来（百廿目ヲ十包ニ調合スル右十三味／ヲ十包ニメ一包ヲ二日ツヽニ用ユ）
以上廿日分ナリ
煎マウ　用マウ
初日ニ用ル
一番煎ニ水天目ニ二盃半入一盃ニ煎シ
三度ニ用
二番煎ニ天目ニ水一盃半入一盃ニ煎
三々　同水入一盃ニ
四々　同水入一盃ニ
五々　同水入一盃ニ
六々　同水入一盃ニ
右一包ヲ以上六度煎テ一包ヲ二日宛ニ
可用十包ニメ廿日分ナリ其ハ追煎シカス日ニ干テ
後粉ニメ可用也右ノ茶用ル内可食好物之
㕝
鰹節　アヂ　コチ　塩ニメ　キス　セイコ
大根煮テ　イモノクキ干テ　干菜
午房ヨク煮テ
禁物之㕝　メンルイ　青キ物　油ケ
四足　二足　菌（クサヒラ）ノ類　辛キ物

芎茶湯（養經湯氏去／肥前瘡イタムニ用）
當皈　芎茶　陳皮　厚朴　白木
香附子　荊芥　山歸来（各一）
右煎用

腫物ノ秘灸

首筋ヨリ頭ニテハマイメノ通リ頭ヲマハシ寸ヲ
トルナリ肩ヨリ腰迠ハ乳ノ通ヲマハシトル也
腰ヨリ下ハ両足ヲ蹈付ソロヘ蹈付ノマハリヲトル
ナリ
右寸ヲクビニカケシヘノトニキメル処ニ後ニ点ヲ
付其人ノ口ノヒロサヲ寸ヲトリ其寸ヲ二ツニ
折々目ヲ右ノカリノ点ヨリ腫物出来ノ方ヘ
点シテ灸百壮スユル也

妙香正氣散　諸病ニ吉

當皈　芎䓖　陳皮　桔梗　厚朴
香附子　白朮（各一匁）　甘草（六分）　黄栢（一匁五分）　蒼朮（六分）
丁子（五分）　以上十一味　右細末メ用ユ

桔梗湯

打身節氣ニテノ手足痛ミ
アルハ皆血虚ヨリ出ルニ用茶
當皈　芎䓖　陳皮　厚朴　桔梗
白朮　荊芥（各一）
以上八味イツレモホ分ニ調合メ一日ニ一包ツヽ用ル
加減ハ紫蘇ヲ加ル

桂枝湯

當皈（一）　芎䓖（一）　陳皮（一）　白朮（一）　香附子（一）
桂心（半）　厚朴（一）　紫蘇（一）　干姜（半）
以上九味煎用先桔梗湯ヲ七日ホト用又
桂枝湯ヲ七日用快ト存ルヲ細々可用

禁物ノ事

トソ草ニテタテ申事アシヽ
水風呂ニタツ何モアシヽ湯治モアシヽ自然
少ツヽ灸ハ能シ

養経湯　右日断

竹芎川半貴木柴苓荊芥

打身ノ薬
大黄（一両）　桃仁（廿一箇　目二ノ分也）（一杏仁ヲ用）
右二味粉ニシテ寝ルトキ酒ニテノ酔ホト用ヒ身
冷不申ヤウニシテ衣多着テ寝ル及五更
小便出ルニ血交リ下ルヲ験トス此薬一度
ニ用ヒ血下ルト則本腹ス

○一口中歯痛時用薬
當歸　芎藭　升麻（各一）（白水ニ浸シ天日ニテ干ス）
葛根（同二）　陳皮（二）　香附子（二）　紫蘇（二）
荊芥　以上八味（升麻葛根湯トス）

○含薬　茯苓（三匁）　甘草（五匁）　石菖根（四匁）
菖蒲根（五匁）　ラシノ木ノ核（三匁）　松ノミトリ（手三束 葉ニテモ）
右煎一日ニ五度十度モ含吐ス

○発熱
紫蘇湯ヲ可用　方傷寒門ニ有リ　利ツカヘハ
小便シブラハ桂心干姜ヲ加イマダ熱シ胸腹
ホトヲリ咽乾ハ右ノ桂心干姜ヲ去柴胡
梔子ヲ加フ此二味ニテサメズハ黄芩ヲ加
痰出ハ七味養胃湯
痰多出ハ七味ヘ半夏ヲ加見テ未腹筋ツリ
白目ツカヘ心アラハ右ノ半夏ヲ引枳殻ヲ可加
右ノ薬用状ハ七味湯紫蘇湯ヲ取替ニミ
可用加減ハ右ノ通ナリ自然此二方ニテ
無効目マイ心有ハ人参川芎甘草此三味
ニテ氣ヲ引タテヘシ諸病如此心持ナリ

又方
當歸　桔梗　芎藭　茯苓　陳皮
荊芥　香附子　紫蘇　白朮
以上九味煎用
大便カタクハ干姜ヲ加
口中ホトヲリ咽乾ム子ホトヲリ有ハ

柴胡麦门冬ヲ加ル

汗出ハ　桂心ヲ加ル

此茱ハ内ヲアタヽメテ熱ヲ外ヘ発スル茱ナリ萬ノ煩熱ヲ外ヘ押出スハ吉寒ヽ茱ニテハ内熱外ヘ不出ナリ心ホソク気ツカレハ右ノ茱ヘ人参甘草川芎此三味加ヘ用ル気付タラハ此三味引本方九味ヲ可用指引如此ス灸アタリタル処ニ風寒暑湿ノ四ノ外ノ証出来ルモノナリ夫ニ付茱用最ナリ此外ノ証何モソヽロサムクトリ膚立テ其上ハ大熱出テ煩也水ヲ飲汗ヲ出スモ有之此証ハ外ヨリ内ヘ入ル四証ナリ何モ此茱ヲ用ル可也

一田虫之茱

當皈（二分）　川芎（一分）　黄芩（一分）　白芍（二分）

地黄（一分五リン）　沉香（一分）　クシロク（二分）　甘草（五リン）

右八味煎用此茱ニ七日程用ル内

青菜油ケ不可食

○一疝氣茱

川芎（三匁五分）　羌活（一匁）　紫蘇（日）　沉香（日）

大腹皮（日）　木瓜（日）　陳皮（九分）　甘草（少）

白朮（九分）　檳榔子（日）　木香（日）　右十一味

加減　梔子（中）　青皮（大）　香附子（大）

ゴシユツ（大）　此通右ノ茱ニ加テ一日ニ三服ツヽ

三廻リホト可用手足痛ニモ

センキニテ痛ニハ吉少宛ブラ々ト用テハ

相應セス

同方　朮　芍木　朴キヨク　貴桂　茯各　甘半

右九味煎用ル

○一寸白ノ薬

良姜一両（コマノ油ヲ少加ヘテコウ色ニイル）　甘草半（上皮ヲ去）

ケタテ一両（ヨク洗古キヲ）　木瓜ノツル一両（カケテ三ニシテ古キヲ二三年ニモナルカヨシ）

右煎用

同　カイーコノフン能酒ニヒタシテ。テノソレヲ一日ニ三度

宛酒ニテ用上戸モ下戸モ同断此薬ダイ

ジノ薬也中風黄ダンノ病ニモ吉用様右

同断

○一眼病

陽泡湯　何目ニモ吉ムシ薬也

赤芍薬　當皈　黄連各ホ分

寒ニハ黄栢ヲ加　熱ニハ黄芩ヲ加ル右煎

昼夜ニ五度モ十度モムス也ムシヤウ口

傳右ノ薬ヲ徳利ノヤウ成器ヘ入其ハ口

ヘ手ヲ當其ハイキヲ目ヘ當ムスナリ

成程アツクフカシ器ヘ入ル初ハ目ノハタヘ

血ヨリハル、ナリ其ハ血段々引治ス十五

日モムシテ扨内薬ヲ可用ハマク用ル

吉又ナカレ

補眼湯　内薬

當皈　赤芍薬　茯苓　白朮

枳殻　陳皮　香附子　厚朴

柴胡　山梔子各一　川芎半　甘草少

右煎用

虫気又ハメツコニハ柴胡梔子ヲ去ル風ア

ラハ厚朴ヲ去リ防風ヲ加フ姙者ニハ川芎

ヲ去ル

洗薬　マミ目赤目ニ吉
黄栢（大）　黄連（中）　芍薬（小）　梔子（中）
クコノ木（一ツカミ半入ル上皮ヲ去リ　長サ一寸一束）
右煎シマウ水一盃半入七分ニセンシヨリノ
ナキマウニコシテアツキ時メウバン耳かき二ツ
ホト入テサマシ日ノ内ニ細々目ニヌル秘薬也

洗薬
チヨクニ水入シキヒノ葉アトサキヲ切テ十葉
斗ツミ切右ノ水ニ入但シチヨクニ依テ葉多
入ナリ右ノツモリハ少キチヨクノツモリ也
新銭一文塩ニテヨクノミカキ右ノ水ニ入ル焼塩
耳カキ二ツホト入焼ミマウバン塩一バイ入カキ
マワシ目ブチニ細々ヌル名誉ニ吉

洗薬
當皈　芍薬　黄連（各等分）
右三味煎洗妙ニ吉

洗薬
當皈　芍薬　川芎　黄芩
黄連　地黄　焼メウバン　ヨモギノクキ（各等分）
桃仁（右キハ半分　キサミ入ル）新キハ三ケ一　右九味
衣二重ニ包湯ニテフリ出シ細々目フチヲ
洗薬包衣ヲホツコリト目へ當ル也

風眼以ノ外痛ニ吉
土リウ（名焼一匁）　リウノウ（五分六七分モ　痛ツヨキニハリウノウ多入ル）
右二味ナルホトスリ水ニテトキ目ノアタリへ
羽ニテヌル名誉ナリ

タヽレ目食粮生
川ウナキ　車前子（根葉ﾄﾓﾆ黒焼　粉ニシテ）右ノ
ウナキニ付串ニサシ焼テ食スル名誉ニ吉
小児ノカンカワラニ求一吉

ツキ目ホシ目ノ薬

水センノ根　黒焼ニメヒ子リカクル

タヽレ目ニ付ル妙薬

カタバミ　モミ出シ一夜盃テ付ル

神効明目湯　目ノ内薬

細辛（二分）　蔓荊子（半五分）　防风（一匁）

葛根（一半　一匁々外）　甘草（二匁五分）　黄芪（一匁）

柴胡（一匁）　香附子（一匁）

右八味煎シユル〻ト用目フチニ悪血

ヨリ物出来タヽレニ吉

目洗薬

黄栢　クワツ石　石菖（生ノ根赤カ子色丁ニテ　剤子ハ皿ニ土ケヲ　ヨソ去テ）

右洗ヤケ衣ニ包アツキ湯ニテフリ出シ其

キヌヲ目ニアテヽ洗ナリ大切ノ薬方色々執心メ許之

丗八

目ノ内薬

茯苓（大々）　羌活（大）　當歸（中ノ大）　柴胡（中）

升广（中）　木香（中）　厚朴（中）　川芎（中）

陳皮（中ノ大）　人参（小）　白朮（中ノ小）　甘草（少ノ小）

右十二味煎用女ノ血ノ道諸病ニ

吉

一婦人　懐姙メ七月ヨリ十月ニ

至ル迄用ユ

枳殻散

枳殻（五両）（小麦ノアラカスニテ炒）　甘草（一両半）

香附子（三両）　右細末メ朝暮ニ耳カキ

一ツ宛湯ニテ用ユタタツ眼スレハ子ツヨクツカ

レ却テ難産ナリ

参蘇飲　傷寒ニ発热咳嗽声重

ソロ乾キ或潮热往来

丗二

或能散表熱脉細ニメ浮ナルヲ治ス又
婦人胎前ニ与フ又小児疱瘡子湯ニテ
補ハニ用出ソロイテハ四君子湯ニテ補フ
木香（七） 紫蘓（二半） 葛根（二半） 半夏
前胡 人参 茯苓（各二半） 枳殻
桔梗 陳皮（各二分） 甘草（少）
右粗末生姜束ニ入煎用ユ
気サカンニハ木香人参ヲ去産ノ前後
サムケ立有ニ吉小児ニハ木分ニ調合メ用ユ
惣メ四時メ咳気ニ吉男女氏ニ

四君子湯

人参 白朮 茯苓（各二）
甘草 生姜束ニ入煎用

養胃湯

産前後寒ニモ熱ニモ備寒ニ熱病ニモ
諸虫ノ痛ニモ痰痢病ニモ男女氏ニ用
當帰（一半） 芎藭 陳皮 荊芥
香附子（各一） 厚朴（一半） 桔梗（半）
右七味煎用
大便ツカヘハ 干姜（一） 檳榔子 枳殻（半） 一味加テ吉
大便シケクハ 白朮（半）サイル
小便不通ニハ 茯苓（一） 木通（半） 沢瀉（少）
是ヘモ一味加ル
虫痛ニハ 莪朮 木香 檳榔子 胡黄連
苦参惣メ虫ノ薬用イナカレ右ノ七味ヘ
干姜 白朮 桂心ナトヲ入ルナリ虫ツイ
タメ申薬不可用
小便シケキニ 茯苓 木通 沢瀉 不可用

汗有ニハ 白止 黄蓍 白朮 桂心加ル

汗無ニハ　右ノ七味ヲ可用

大便下ルニハ 白朮少 干姜ヲ加ル

熱有テ身アツクハ 柴胡 黄芩加ル

身冷ヘ痛ニハ 桂 貴 敀 香附子ヲ加ル

悪寒有ニハ 紫蘇 荊芥 陳皮 香附子ヲ加ル

喉乾カハ 白朮ヲ去リ 紫胡 山梔子ヲ加ル

熱痰有ニハ 紫胡ヲ加ル

痰ニ 白朮 半夏 南星ヲ不可用

右ノ養胃湯此薬 血虚疝氣節氣脾胃ヲ能ス諸病ニ吉 眼病ニモ吉シウハ

（ヒツコヒイカヤウノ目ニモ吉）

目赤ク成ホト　申仍ハ、此洗薬吉

當敀 芍薬 黄連一各 山梔子ニ 黄柏五 右五味

天目ニ水一盃半入七分ニ煎シテ明礬ヲ耳

カキニホト入カキ立鈴ノ器ニ入塵不入マウニシテ

一日ニ十度ニ及目ヘヌルヘシ内ヘモ少入マウニ

ヌルナリ

同方　目ノ悪キ時用ユル内薬

當敀 芍薬 陳皮 香附子 厚朴

桔梗半 荊芥 甘草少

産後　（子ハ二三月以前ニ胎死シ後生ス血下ラス久腰冷子下ラス不食シテノ）

時ニ熱出盗汗有テ身冷ニ用ユ

當敀 芍薬 桂心 陳皮 厚朴

紫蘇 荊芥 香附子一各　煎用ユ

熱膚ヘ出ル時桂心ヲ去リ香附子ヲ加ル

痢ニ三日不通ニテ姜ヲ加ル翌日下テ

則可去ル

清氣散　（妊者ノ時匈目アシクロクス水タマリ不食シ心アシキ時用）

白木 陳皮 厚朴（各其マヽ） 枳殻（炒）
當歸 桔梗（各一） 甘草（半）
右細末メ一度ニ耳カキ一ツ程宛湯ニテノ
一日ニ二三度モ用煎メモ用ル
寒熱𪜈ニ風引時香附子紫蘇荊芥ヲ加
熱有時ハ紫胡黄芩ヲ加

婦人 胃ツカヘ不食ノ時此薬耳カキ
一ツ宛朝暮晩湯ニテ用多不可用
枳殻一 甘草（半） 香附子一 粉薬ニテ用

芎帰湯　産ノ時用ル薬
川芎（中其マヽ） 當歸（大其ハマヽ）水分
右二味調合煎シ一番ヲワケ置二番
二番ヲ腰ケノ時少宛用ナリシキリニ
イタミモハマヽ生レントスル時盃一ツ程ノ薬ノ中
ヘ酒少加ヘ煎シ返シ冷マシテ用ル子生レテ
ハ右ノ薬一口二口計宛細々産毎ニ用古血下リ
気分能ナルナリ自然後ノ物不下時ハ右
ノ薬酒少入テ可用二度マテハ可用其上六
毎用ナリ後物五日十日或一月二月モ乃至
三ケ月マテモ毎度ニテ不知落ルモノナリ

産前産後（薬）　腹痛ニ吉
仃芍 川貴頭 卜荊 甘（少）
胃痛咽乾少熱有時芩吉門冬ヲ
加テヨシ利下ラハ姜圭一味宛加可見
仃芍木 川貴頭 甘
懐孕ノ時九月目ヨリ木ヲ去リ朴吉
ヲ加フ

清氣湯　産後血心サムケ立寒ヽ熱ヽヲ
トウス風寒暑湿𪜈ニ此薬ヲ用
當歸 芍薬 [illegible]皮（各其マヽ） 香附子（炒ヲイム）

桔梗　白朮　荊芥　紫蘇（各一各其ミ）

右煎用一日三包モ二包モ可用病人ヨハクハ一包宛可用病人ヨハリタラハ人参　川芎少宛加ヘ服々可用

甘草ハ気合快ナリタル服可加未悪クハ不可加古血下ラハ　伏龍肝

カイマウヲ加（三月三日ノヨモキムシテ使ナリ）　伏カイ諸病血ノ下ルニ用ユ

産後ニ用腹不痛ニ用ユ

仃芍貴頭　吉　荊　甘

妊者内熱シ不快服用

仃朮芍川（半）苓貴門紫

妊者六七月メヨリ少ノ宛用ユ

枳（一）甘（半）頭（一）粉薬ニメ用

妊者八九月メヨリ少ノ用ユ

朮　川　仃　芍　貴　枳　頭　甘（少）

清氣散　惣（諸病ニ用ル粉薬寒ニ熱ニヲ不思気付ニモ湯少ツヽ細々用）

當皈　芍薬　白朮　陳皮　桂心

枳殼（各一各其ミ）　甘草（半）

細末メ甘カキ一ツヽ湯ニテ用ユ

痰アレハ香附子桔梗人参ヲ加良方也

産後ノフルイ立無言ノ者ニ用

仃芍貴頭朮卜枳甘（少）

氣附散　（産前産後金瘡一切ノ気付ナリ）

蒲黄（一両炒）　人参（一両炒）　葛粉（一両ニテ水ヒヒ）

（右各ハコセウノコ少入ル産後ニハ不入

香蘇散　（汗ヲ發シサマスナリ産後ノフルイ立ニ可也　咳気ニモ吉）

香附子　紫蘇（各三両）　陳皮（一両）　甘草（二分）　荊芥（二）

炸ノ（二）　桔梗　紫胡　枳殼

右煎用

痰カハカハ　桔梗ニ杏仁ニ柴胡ニ茯苓ニ

諸病寒熱ヲ不知用ル薬

芎藭當皈陳皮厚朴香附子

白朮　桔梗枳殻荊芥

右等分ニ調合メ煎用粉薬ノ時ハアフリコニテ

アフリ荊芥ヲ去テ黄柏ヲ加フ煎用ル時ハ本薬

九味煎シ一日ニ三貼可用諸病ニ吉

傷寒傷風諸痰有ニモ無ニモ諸患痛ニモ

霍乱ニモ諸痢赤白𪜈ニ産後悪地無言

ニメサムケ立ニ文一吉

加減　痢不下ニハ干姜ヲ加　下痢ニハ

甘草ヲ加　不食ニモ吉

清氣散　諸血道ニ吉

當皈　芎藭　陳皮　白朮　桂心

桔梗　厚朴　香附子　莪朮（半）　甘草（少）

以上十味細末メ湯ニテ細々用

清氣湯　婦人血虚ニ用　頭痛目眩ニ腰

痛手足冷虚損ノ人ニ用エ目ノ

ウハヒソコヒ吉

當皈　芎藭　陳皮　厚朴　白朮

香附子　荊芥（各一）　桂心（半）（妊ニ忌）　桔梗（半）

以上九味　右ノ薬シコリニ用ル時干姜木香

加テ寒熱ヲ見ル熱出ル時木香干姜ヲ引テ

柴胡梔子ヲ加ル此薬凡寒暑湿虫服産後産

前諸痰ニ咳虚実ロウサイシコリ痢病傷寒ノ久

病不食メ脹ヤセヲトロヘ諸瘡イモハシカ小児カンシカ

ワウ男女ノ諸病寒熱𪜈ニ脈ヲ不見𪜈用之歯痛ニ

モ吉

同方　婦人月水滞常ニ不快ニ用

工自薬之

當皈 芎䓖 陳皮 厚朴 白朮
香附 荊芥（各二） 桔梗（半） 以上八味煎
用ユ

婦人 （月水滯リ大便結シ不食シ不快ニ用ユ）
个貴 頭 朴 朮 姜 荊（各一） 廿
以上八味 氣分快ハ 圭 芎 枳（少ツヽ）加フ

當皈湯
（吐血衂血虛メ喉乾キ飲不食シ大切ニ煩吉）
當皈 芎䓖 桔梗 厚朴
陳皮 荊芥（各一） 茯苓（半） 以上七味
右煎用病快服 廿草少加ル妊者ニモ
不苦 氣ウタヒレ目マイ心有ハ 人參 川芎加

婦人血多下リ目マイニ用
當皈 人參 川芎 白朮 香附子
陳皮 桔梗 干姜（各二） 以上八味煎用ユ

氣付 人參 廿草 芎 各等分
干姜（半） （右煎用 粉茶ニメモ用ユ右ノ清氣湯養胃湯用ル服ニ加減目マイ）
氣ウタヒレ大切ニ煩ニ此四味加ヘ用ユル氣色能
次第ニ十カラ引

婦人血ノ道ニ用ノ寒熱通用
當皈 芎䓖 陳皮 香附子 厚朴
桔梗 荊芥（各等分） 右煎
氣強ク八川芎加ル

八物湯 （氣血モニ虛シタルニ用ユ）
人參 白朮 茯苓 廿草

當皈　川芎　芍薬　熟地黄
此薬癰疽疔瘡ノ類ニテ久ク病ミ虚
シタルニ吉気ヨハキニハ人参白朮ヲ去リ陳
皮厚朴ヲ加
入姜東ニ水煎

同方　熱ニ用ユ
當皈　芍薬　陳皮　香附子　厚朴
黄芩　柴胡　　右煎用
加減寒ミケ立有ハ紫蘇荊芥ヲ加
身ホトヲリ熱有ハ黄芩柴胡茯苓加
ロヒカワツキ乾カハ桔梗遠門冬ヲ加フ
ロウルヲイ痰有ハ白朮半夏ヲ加フ
汗有ハ汗ヲ留ルマウニヨシ
汗無ハ汗ヲ出スニハ香附子陳皮シソ
荊芥
気色能時　川芎　人参　甘草ヲ加
アシキ時ハ川参甘去ル

婦人諸病ニ用　・寒ニ用ユ
當皈　芍薬　陳皮　香附子　厚朴
桂心　白朮　甘草　右煎用

反魂丹　産後息引ツムルニソリノ付タルニ吉
益母草（一両）　當皈（半両）　桃仁（一分）
右三味粉メ煉蜜ニテ合セ湯ニ童便少入テ
可用但シ十歳ヨリ内男ノ童ノ便ナリ
但シ血下リ目マイニハアシ血ノホリテ目
マイニ吉　歯ヲクイツメ目マイ息引ツム
ルニ妙也

白仙散　血薬
葛粉（百目）　茯苓　蒲黄（各一両）　木香
甘草（各二分）　右細末メ産前産後ノ気付血ニ吉
秘傳ノ薬方也

清氣湯　婦人月水滞リ血虚シ常ニ不快ニ用ユ
當皈一　芍薬一（洗剉炒）（各白水ニヒタシ）　陳皮一（白水ニ浸テ白ミヲ取）
白朮一　桂心半　干姜同　厚朴一
桔梗半　荊芥一
加減　右ノ薬ニテ不効ハ厚朴ヲ去香附子ヲ加
又加減芍薬一陳皮一白朮一桂心一干姜半桔梗半
香附子一荊芥一厚朴一以上十味
胸ツカヘハ干姜ヲ去リ枳殻ヲ加
此薬血虚ノ中風ニモ吉中風快クナリテ後
右内姜吉ヲ引甘草ヲ少加ヘ用ユ
治血湯　月水滞リタルニ能薬ナリ但シ
二廻リ分ニ六三匁ナリ此薬外ノ
薬種此ツモリナリ但シ自薬也
當皈　一匁酒ニヒタシ薬ニ酒ニシミテ土ケヲ洗イ
剉カケホシニシテ水ケノカハキタルトキ
ホイロニテイル

白芍薬七分　白水ニテ洗剉鉄ヲ忌
黄芩四分　常ノトヲリ刻ス其マヽ剉
川芎七分　白水ニテ洗其マヽ剉
白朮七分　同断
甘草一分　上皮ヲ去剉
治血散　但シ此三味加取ハ本方當皈一匁ノ
ツモリニ合スルナリ
檳榔子七分　上皮ヲケツリ剉
莪朮一匁　皮ヲ去ル酢ニテ煮剉
虫出不食腹痛申取此三味ヲ加右ノ本方
用申内ニ一包ツヽ可用右ノ薬用ヤウハ朝昼ハ
湯ニテ寝サニハ酒ニテ少酔程可用一日ニ三
包ツヽ可用
長血白血名誉止ル秘方ノ妙薬
紫河車大　フクベ黒焼小　焼塩少
右三味粉ニメ少ツヽ湯ニテ用ユ此薬
播州ニ加以シナキ薬也

長血薬　益氣湯ニ芎薬
麦门冬　二味加テ用
血ツワイノ薬　クロモジノ木
マウシニツカフ妙ナリ

妙香正氣散　秘方ノ粉薬
婦人ノ血ノ道心悪ニ產前產後惣
身冷サムケノ立湯水ヲ呑ノトカワキ吐
逆シ腹痛ニ難義スルニモ吉心痛ニモ
月水滞リ腹痛ニモ小児ノ疳諸病ニ吉
萬病不治ト云事ナシ
當皈十二匁　芎薬同　桔梗十匁
厚朴十二匁　香附子同　甘草七匁　黄栢十五匁
白木十二匁　莪木八匁　丁子三匁
右十一味粉ニメ一度ニウス茶半服程ツヽ
湯ニテ用自薬ニハ耳カキ二ツホトツヽ用ユ
小児ニハ乳ニ付テ用諸病ノ気付妙薬
也煉薬丸薬ニモスルナリ右ノ薬種ノ
内莪丁二味火ヲイムニ依テ別ニ粉ニシテ
後合スルナリ外ノ薬ハアフリコニテ火ヲ
アテ粉ニスルナリ

〇小児
正氣散　疱瘡ノ時初中後用之
人参　一味剉湯ニテ出シ唇ヘ度々ヌル
　口ノ中ヘ入テモ吉シ
風疱瘡ハシカ初発ニ用
竹芎頭貴ト圭姜吉
右煎用　ハシカホツハンカセ熱サメテハ
木耳ヲ加
参蘇飲

當皈　芍薬　陳皮　香附子　紫蘇
荊芥　桔梗　各ホ分　煎用ユ
加減　利ツカヘコロハヨシ
痢下ラハ　桂心　白木ヲ加
痢ツカヘハ　枳殻　大黄　紫胡
熱ニハ　紫胡　黄芩
咽乾ハ　葛根　麦门冬　紫胡
瘡出テノ手足寒ゝ自利セハ　人参　白木
テ養
右大小人𪜈ニ寒ゝ熱ヲ不同用也但シ諸病
不知時ハ此薬方ナリ

一大便秘結

蜜導
方火ニテノ蜜ヲ子リ水ヘ入テ
○是ホトニ丸シサウカノ粉ニヌミヤカウニ
色ヲ衣ニシテ油ヲヌリテサスナリ

十六味流氣飲

當皈　川芎　白芍　黄蓍　人参
宮桂　厚朴　桔梗　枳殻　烏薬
木香　檳榔　白芷　防風　紫蘇
甘草　以上十六味
惣〆虚老ニ吉シ此内ノ薬指引〆用
氣種ニ吉シ腫瘡虚冷ニ吉
大人小児小瘡出来瘡ノ毒内ヘ入テ
腫氣ノ様ニ惣身ハレ息ツマリ痰有
死ナントスル時ノ薬小児イモハシカニモ吉
悪寒ゝ有時腫物ニモ痰ニモ傷寒ノ初
発ニモ可也
紫蘇　香附子　陳皮　荊芥
芍薬　當皈　各ホ分　甘草少

右煎用ユ自汗有ハ不可用汗ヲ発スル
茉ナリ
汗有ハ芍茉桂心白朮白芷ヲ加ル

驚風ノ茉　（大小人気付ニモ吉粉茉ニメモ用ユ）
人参　干姜　川芎　陳皮　香附子　各一
甘草　桔梗　各半　（以上七味煎用但シ気不付内ハ各ホ分ニ調合ス）

消食丸　小児食傷ニ用ユ
砂仁　陳皮　三稜　神麹　麦芽　各炒五銭
香附子　炒四銭　白朮　炒五銭
右細末メシンキノ糊ニテ丸ス麻ノ核ホトメ
白湯ニテ用ユ煎メモ用ユ

疱瘡山ヲ上ケカ子瘡ニウルヲイナクハ
此茉早ク可用

行芍貴頭ゾ薊　各ホ分　吉半
右七味煎シ少宛細々可用何ホト悪キ
疱瘡ナリトモ名醫ニ吉シ度々有験ニ依
テ書記也大小人腫物ニモ痰ニモ熱病ニモ
可用小児ホトヨリ何トモ不知病ニ用一妙也

桔梗湯　（諸病ニ吉大事ノ茉方気ホウゝトメ悪ク不食シベントー病ニ吉ロシ）
當皈　一半　芍茉　一　陳皮　一　厚朴　一　桔梗　一
荊芥　一　白朮　一　右七味煎用ユ
此内朮ヲ去テ頭ソヲ加テ用ハ痰ニ吉ク
咳気ニモ吉痰ノカワクヲウルヲス折身
節気ニテノ手足痛時此七味ニ香附子ヲ
加テ各ホ分ニ調合メ一日ニ一包宛用テ吉
痢シケキニハ圭朮
痢ケツスルニハ枳水ヲ加
痰有ニハ半夏ヲ去ルキレサル時此二味ヲ入
痰多キ時此二味ヲ入ヿ大事ノ秘傳

痰心ヨリキル、ヿナリ
汗有ハ桂心ヲ加ル
咽乾カハ白朮ヲ去テ柴胡ヲ加
熱有ラハ柴胡黄芩ヲ加
冷有ニハ桂心黄耆ヲ加
右気色快ク食ナリ大方本腹ト見ル收
人参甘草ヲ加ル

老人ニ用ル薬

仃一 芎一 貴一 荊一 頭一 ト半 朮半 吉半
姜一 以上九味

老人ハ痢結シ申アシ、痢緩ニテルヨシ腹中ソロ
キ可快ソロ〳〵ト此薬可用ツヨキ薬下薬
下ル薬ナリ、心ニ不可用エ腹中和キ作ヘハ
腹ノ塊モ虫ノカフリモ可快血結シテウルヲイナ
ク病気出ナリ

當皈湯

方有婦人門ニ此薬ハ血ヲ一作モ之
大産ニ病女ニ用エ血虚ニモ用気色能成次
モハキ咽カワキ水ヲ呑不食ニ
力ニ甘草ヲサツヽ加ル懐人ノ女ニモ不苦

諸病寒熱氏初発ニ用薬

仃 芎 貴 頭 ト 姜 荊 圭（各ホ分）
右八味煎用熱盛ニ出ハタヘホトヲリ咽乾
キ頭痛セハ圭姜ヲ引柴胡芩梔门ル
イヲ可使此加減ニテ熱サノ心能ハ亦圭姜ヲ
一味ツヽ可加見ル又熱上ル眩ハ又右ノ柴芩
ノルイヲ一二味ツヽ加ヘ熱ヲノケヘシ此薬味ニテ熱ノ
数有ハ又圭姜朮ヲ加熱ヲ上ケヘシ其眩ハ右ノ
柴芩梔门ヲ引熱成程上ル眩又加ヘ可見
指引ノ加減身一ナリ

白朮湯

病付ソロ寒ク頭痛ニ胃ツカヘ不食ニウカヽト病ニ吉　婁水ヲタヽ呑夜イヌルニ手足ヲ冷シ汗多ク出シカナク煩モノナリ肉熱モ躰強股ハ汗多テモヨワウサルナリ肉証湿ノ病ナリ

介芍ト・圭・頭・荊（各一）・朮（半）・貴（一半）
姜（半）

右九味煎用痰ツカヘハ吉半加ル

并身ノ薬

振薬ナリ

川骨（忌鉄）・白朮（イル）・肉桂（忌火）・黄連（イル）
大黄（忌火）・桂心（円）・當皈（酒ニ浸剥テアフル）・黄芩（イル）
木香（忌火）・人参・川芎・芍薬（忌鉄）
良香（イル各等分）・甘草（少）。

節ヲ切落シクルニハ・梹榔子・丁子此二味加テ本薬三分一加フナリ

瘡ノ妙薬

阿魏・辰砂（水ヒヒノ各四匁）

右細末メ糊ニテ○是程ニ丸シ毎日ノ朝食前ニ人参五分程煎シ右ノ薬一粒人参ノ湯ニテ用大形落ル也

阿魏製法酒ニ浸シやハラケテ吉

痔之薬

介芎・枳・貴・芩・柴・苓（右等分ニメ煎用）

女ノ乳カ入又完草惣テ腫物ノ々丘入ルニ吉

黄栢（少其ハマヽ）・ウルシ米（黒やき）・レイテンカイ（黒やき）

右三味粉ニメ完ヘヒ子リ入ル妙ナリ

安栄湯

千㞍血道女身ノ産後ニモ吉

振薬

人参（一炒）　大黄（一灰ヲイム）　川骨（一泉ニツケ刻アフル）　肉桂（火忌）（一熟有ハ扣ヨ）

黄連（酒洗）　檳榔一　丁子（一服下ルニ炒マス）　甘草（ケ炒 化シ五分程入）

當皈（一アフル 酒ニヒタス）　黄芩一　川芎（一灰ヲイム）　木香（一灰ヲイム）

當皈（一アフル 酒ニヒタス）　白朮（一炒）　右十四味煎用

加減　大使ケツセハ大黄ハヲマス

小使不通ハ木通ヲ加　腹イタハ大黄ハヲ

川頭痛ニハ羌活サイシンヲ加　腹痛ニハ

芍薬加　血走ハミタンシ蒲黄ヲ加　但ホヲウハ

カウ色ニイル上気ニハ香附子加　産後大血

下ハミタンシヲ加　惣身腫有ハタクノシヤ茯苓

チヨレイヲ加　禁物川魚タコニミサハイワシ

カラキ物油ケクリキミニハトリソハコノシロ河

此薬ハ保母湯ト云

調合ノ口傳ニ先火ヲ不忌炒ト炒テノサテ火ヲ

イム薬ト右ノ炒タル薬ノ中ヘ入テカキマセ

フタヲシテ暑火ヲ忌薬種トモ右ノ炒タル

薬ノホトヲリ[illegible]ル同前ニテ薬ヨリ

キクナリ秘　桂（一炒ニ 仁ム 火忌）　各ホ分ニテ吉

益元散

クワツ石（水ヒモメ）（六匁）　甘草　一両（一ニ匁）

右二味粉ニメ少ツヽサユニテ用アツケニ當

タル時サハラニ下ル時痢病痳病女ノ血ノ

ノ道霍乱何ニモ吉暑気ニアタリ小使ニシ

ブリ腹下ルニ吉小使ヲ能通シ湿熱ヲ

去ル

小児シタサコノ薬　桑ノ木ヲ黒焼メ

舌サコヘヒ子リカクル

白舌ノ薬　小児舌ニ物出来テハ死ヌル

モノナリ蚯蚓ヲ生ニテシホリ其汁ヲ舌ニ

付ル妙也

カミカサノ薬　サイカチノツノ大黒マキ

ヨワウ中　ハラマ少
右ゴマノ油ニテ付ル

小児アサノ薬
カル石ニテアサヲスリテ
巴豆ノ油ヲスリ付ルフクレ
タル跡赤ハマベノ汁ヲモミ出シソレニテ
ハラマヲユルゝト子リ付ル

瘡ノ薬
ウコン五匁　茶日三年ニ成ヲ
ハラマ二分　右三味粉ニメ丸ル衣ニ鍋スミ吉
●是ホトニ丸シ一日ニ六十粒ツヽ但シ
一度ニ二十粒サユニテ用ユ瘡ニ四年ニテモ
タトヘ何ホト久シキニモ廻三廻リ用ルトキハ
吉耳キコヘサルニモ

肥前瘡ノ薬
ライヅワン十八匁皮ヲ去　イセヲシロイ一匁三下
セウノウ一匁三下　タンハン三下
右四味合テ布ニ包細々瘡ノ上ヲヌリテ吉

川芎茶調散　諸风上リセメ頭目クラメ色頭痛
鼻フサカリ声ヲモク傷风壮熱肢躰
痛ミ肉月ニ熱有タンサカンニ婦人血风セメ
申ニ吉其外风気ニアタリメルニ吉
川芎　荊芥各二　薄荷　香附子各四
羌活　白芷各一　防风七　甘草少
右剉細末メ食後ニ茶ニテ用ユ

散邪湯　瘧初発サムケ立熱サカンニ
汗ナキニ用頭痛身痛ニ吉
白芍薬　白芷　麻黄　防风
川芎　荊芥　紫蘇　羌活各一
甘草少　右生姜一へキ葱ノ白根一寸入
煎用此薬ヲコリメル羽立日
ヨリ用ユ

又方　柴胡　芎藭　陳皮
肉桂　霍香　右等分ニ煎用ユ

三神圓　諸肢中ノ薬
カウシ（但シ寒ノ内ノカウシ三色ニメ細末メ食ノトリ湯ニテノ耳カキ三ツホト）
ツヽ一日三度ツヽ用ユ

大霍乱ノ薬
黄栢（拾匁 三神圓ニメ）　葛（五匁 サラス）　胡椒　三分
右三味細末メ湯ニテ用

霍香正氣散（食傷吐瀉ニモ腹痛ニモ風寒ヽ頭痛発熱汗ナキニ吉）
霍香　紫蘇　陳皮　厚朴
半夏　白芷　桔梗　大腹皮
白朮　茯苓（各一）　甘草　少

右生姜束ニ入煎用霍乱吐逆暑ニ當リ
ムネアシク吐逆スルニ吉久ク咳出ルニハ
半夏ヲ去リソワロウシツヲ加

婦人長血ノ妙薬
當歸　芎藭　陳皮　香附子　白朮
干姜　桂心　黒大豆　地黄　菖蒲
各等分　虚證ニハ　芎藭小　當歸大　黒大豆大
腹中下リニハ　地黄小　虫出ハ　干姜大　目マイ
頭痛有ハ　菖蒲大　四肢冷ハ　桂心大

薬山丸
ヘナン（一両鉄ヲ忌 鮫ニテ剉製）　ロウハク（三色ニメ何モ 一両ツヽ）
セイタイ（三分 生ニテ）　リシン（一両 生ニテ）　リロ　三分
トウマク　一分　マウハイヒ（一分 生ニテ）
右細末メ・是程ニ丸小児ノ年ノ數可用也
萬虫ニ吉　腹中ニ吉　霍乱ニ吉　目悪ニ吉
惣メ小児ノ疳ニ吉シ第一ノ薬也大人ニハ

十粒ツヽ以上口傳ハシブトノ黒マキ五分入テヨシ但シ
寒ノ中土用ノ中ノ爲也

屠蘇白散
防風（五両）　白朮（一両）　桔梗（一両）
右調合シテ紅絹ノ小キ代衣ニ包梅ノ木
ノ枝ニ付ル

目薬ノ方
明星散
メウバン（焼テ六匁）　辰砂（ミト但シリウノヲ少シ入）
タンハンミト　ジマコツ二分
右粉ニシテ水ニテトキ洗薬何目ニモ吉此薬
拵様ハ天目大キ成ニ皿色入テ角ニテ随分能
スリテ用ユ　（血目カスミ目上気目ウチカメ目）
久シキ目ツキ目マミ目ニ吉

聞書
疝氣ノハリ薬
大黄（生）　天南星（生）　黄栢（生）　鹿角（黒焼）
各アラ皮ヲ去リ剉何モ一匁ツヽ
川芎　胡椒（各五匁）　明礬（少生疝気脚気ニ付ルニ明礬ヲ加其外之証ニ不用）
右細末メ成程ツヨキ酢ニテ糊ニ交痛処
ヨリ少上ノ方ヘカケテ付ル其上ニクイサキ
紙ヲ蓋ニメヲクナリ
疝気胃ニ上リ苦ミ悶ユル時上ニ付テ押
下スナリ　脚気ニ付テ吉
萬吐逆色々粮生メ不止ニ付テ吉但シ
胃ニ付テ吉
産後吐逆有ニ付テ吉　産前ニハ忌
胃虫ツヨク痛ニ付吉
産前又ハ風気ニ忌

コカシノ方　不老仙薬
籼（氷餅ヲ用二十目）　陳皮（五匁）　山椒（六匁）　茴香（三匁五分）

右炒テ細末メ用

同方　トヲボウシ（十両）　薏苡仁（五十匁）

山椒（二両ニテモ三両ニテモ）　茴香（二分）　陳皮（二両）

右炒テ細末ス椒ハ炒ヲヒカユ

安虫丸

ホレイ（十匁）　耳草（五匁）　胡粉（三匁）

右細末メ糊ニテノ丸ス丹ヲ衣ニス虫氣

食傷霍乱泄浮ニ吉叓ハ胡粉ヲヘス

淋病ノ茶　強痛ニ吉

上野砥ノ粉ニ　大黄一　葛粉一

右ノ茶末メ小豆ノ大サニ丸メ一度ニ十粒十五

粒ツヽモ紅花或ハ梔子ノ煎湯ニテ用

又方　チシマ（上皮ト米ノ白ミヲ去テ刻大）　川芎（少）煎用ユ妙也

又灸　（足ノ大栂指ノ上七ツモノ処ニ俞有リ三壮灸ス）

大衂血止

地黄　芎茶　ホ分ニ煎用ユ妙也

諸ソサノ茶

霊天蓋（其てヽ）　赤ニシカラ　白焼

右粉ニシメホ分胡广ノ油ニテ子リ付ル但シ

愈カヌル二八ハヲシロイ少加ル熱有ハハコベノ

汁ニテ煉リ付ル　痛強ハ油ニテ子リ付ル

又方　黄連（大生）　明礬（少焼ス）

二味粉ニシメ胡广ノ油ニテ子リ付ル瘡カハカハ

ハヲシロイ少加ル

龍王湯

人参 比ホ胡 大黄 ウコン 黄芩
縮砂 薫陸 肉桂 木香 せキカ（各二匁）
良香（イル） 當皈（酒ニテアフル） 丁子 防風
川芎 赤ミテツシヤ（塩水ニ入イル） 桂心
沈香 犀广 黄耆 甘草
莪朮 滑石 霍香 熟地黄（各一匁宛）
右二十五味細末ノ一貼一匁宛ニ成シテ
産前産後手負狂乱一切ニ振出シ用テ凡タ
シノ外萬ニ吉

二白散

腹中ニ吉 泄瀉痢病氏ニ用
天南生（寒ノ水ニサラス） 蕎麦粉
右ホ分但シソハコ少多ク入ル

フスベ茶

百草二匁（百草毎之吹鍋炭ヲ入ル） 唐胡广ノ皮ヲ去（五匁） 沈香（五匁）
真木綿（六匁古キヲ用ワタサ子氏ニ）
右一ツ合綿ハ刻ミマセ合スル切疵ホノ身ニ吉（コマノ油少入テヨシ）

毒虫サシタル咬ノ茶

毒虫サシタルニハ鉄炮ノ茶ヲ付テ吉マムシノ
サシタルニハ鉄炮ノ茶ヲ畳其上ヘ火ヲ付ル
毒気出テ吉マケトノ療治ニ成

達者茶

ツウウツ サイシン ボウフウ
右細末ノ水ニテトキ付ル胡广ノ油ニテトキ付ルモ吉 右三味ニ加減カウホン ケイカイ
是ヲ入レハ猶以

清法院　コカニシノ方
熏米　五十目　陳皮　十二匁　山梔　五匁
茴香　五匁
ヨソイニシ五匁
右コウ色ニイリテツロス

マテリや膏薬

一胡麻ノ油　弐合（壱斗）
一唐蝋　四拾目
一松脂　四十目
一タハコ蝋　四十目
口傳タハコラウ夏秋ハ赤色タハコノ葉ヲ
コマカニキサミスリ鉢ニテスリ潰シ入

葉ヲウキタルヲスクイアケテ目ニテオテ
粉ニメ
膏薬煉ヤウコマノ油ヲ鍋ニ入唐蝋ヲ入ト
ケし時松ヤニタハコラウヲ入ル二時斗煎
扨サマシ又一時程煎サマシテ又一時程セシニシトし
三度程ケ様ニイタシテ布ニテコシトし子リカケ
ニヲ見トしニハ少水ニ入カタマリトし程ヲ見トし
炭火ニテ子リテヨシ火ツヨキ悪クい松脂裂
みく有んね　加減ニ日湿熱ニハ石膏龍脳
ヲ加寒湿ニハ肉桂附子ヲ加

癒膏薬

一猪ノ油　六拾目（辛匁）
一松脂　五拾目（二十九匁）
一ハラヤ　五ノ匁（二匁）
一丹　八匁（め七）

炭火ニテソロ〳〵一日程練テ能口傳抜油
退シ程ヨシ但シ丹ハ練上ケル時入テヨシ毎
方ヨリ入ル時ハ色黒クナリテ悪シ丹ヲ入テ
跡ニコシベキ也

馬ノ添蕩抜薬

一ハンメウ ト 一タンハン（一分）　一水金（一分）　一辰砂（一分）

一巴豆（十五）

右何モ粉メ絹篩ノリニヨシマセ添蕩ノ上毛ヲ
ハサミ右ノ薬ヲ付ル其上ニ糊入紙ヲモミテフクミ
付ル其上ヲ竹ノコノ皮ニテ包其上ヲ雑巾ニテ
ヨクマキテヲク也春ハ三時半夏ハ三時秋
冬ハ五時斗リ付置也水ニテ洗イ落シテ
一度ニテヌケヌ時ハ又付テヨシ

焼ドノ妙薬

一右き玄秋ノ黒焼茎ノ汁ニテ付ル生茎
無之時ハ干茎ヲ水ニテ出シ其水ニテ付ル青
葉ヲモミテ其汁ニテ付テモ吉ハラヤ少加ヘテ吉

馬打目ツキ目ノ薬

一椿ノ実ヲ細ニキサミ乳ヲサツヽ入テヨク
スリ鳥ノ羽ニ付テ目内ヘサシ〻〻ハ目
白ク成ル二三日モ〻トサシ〻〻ハスキトノキ申候

白竜丹

亦号万力去疼血消

外障愈睛之五術亦療一切眼目
實熱腫痛火眼翳痛

一石羔（カウ）（十二匁）　一戸甘石（八匁）
一竜脳（リウノウ）（五分）　一寒水石（五匁五卜）
一塩硝（エンシヤウ）（三分）

右五味各為細末白蜜煉也

赤竜丹

亦号大刀一切去血

一石羔焼（一両）　一戸甘焼（一両）　一黄連（右三味水飛而）
一竜脳（少）

為細末白蜜煉也

金明膏　亦号臣方除外障
一活石十两　一黄連一两　一永樂銭
三十三水五分入煎二度日乾為
末掛藥也

無盡膏　亦号圭方愈疵
晴昧補虚切
一戸甘石　一寒水石　一石羔
各焼四匁宛　一前砂フカセ同　一辰砂
水飛同　一滑石同　一真珠　三分
一牡蠣三分　一竜脳四厘半　別為末
各為細末白蜜煉也
右四方眼目一切家秘

小児五疳并急慢驚風秘

蛤蚧安部傳
治急慢驚風煮疳癖諸痢如神
全蝎浸水去塩炙一匁三分
一真珠（シンジュ）一匁八分　一香附子二匁五分　一竜脳一匁三分
一甘松五分　一莪朮一匁　一木香二匁五分
一麝香（シヤ）八匁　一蛤蚧五匁　一甘草五分
一来添木五分　一辰砂五分　一丁香五分
右一十三味各為細末糊丸或亦為
丹剤湯解用也
會津加藤式部殿一子相傳

無家秘治小児万病
一蝦蟆（ヒキカヘル）去頭足為霜三匁　一鰻鱺（ウナギ）同為霜　一夜明砂（ヤマイシヤ　コウモリノフンナリ）同
一青黛（タイ）同唐　一胡黄連同　一莪朮同

三稜 同 一木香 同 一香附子 同 一青皮 同
雄（オロウ）水飛 一常山木（クサギ）虫（六月土用中取 為霜六匁） 一麝香
一真砂
各十四味為細末糊丸粟米大毎止々
數白湯下予常用之治万人無一失
最不可他見秘也

桑山秘治小児此方世間多之
一ニナン（サメニテヲロシ 生ヲオロクロ） 三色
一天南星 同 三色糊丸一切痳

奇應丸 治万病氣付
一麝香 一匁 一熊膽 同 人参
一沈香 各二匁 一金箔 十五枚
此方常世間流布故記之

白寳散
一寒晒米 二十目 一白朮 十匁 一香附子 十匁
童使製最可
一甘草 二匁
右四味為細末常服婦人百病
血道百癈無不治秘

阿蘭陀膏
ムスラキニフス
ミシ コロハ コアオビ 五ノ匁宛
油ニテ煎
一トリスミレ 五匁 一ミツヤニ 七十匁 一ロウ 八拾匁
一ウコン 粉ニテ色能ホトニ入ル也
一切腫物ニハシリコン付上ニ是ヲ付

カンフラトン
一ヤシ叔ノアブラ 五匁 一イノシヽノアブラ 同
一ミンテイーカノアブラ 同 一ロウ 二十匁 一ヲシロイ 同

シラシボリ 十五匁
右シラシボリ煎水ニオトシ玉ト成
マシホイノアブラニシテイカヲ入
ロウトケテ後コシ白粉ヲ入ル也
竜脳少粉ニシテサメテ入

アホストロウン
ロウ（十四匁） ミツマニ同 アブラ 五十匁
煎コシテ サメテノチ
ミウコウ 三匁 モツマク 同 ロクセウ （酢ニテトキ入）
メンハン少明バン少入一切腐

ハシリコン
アブラ半斤 ロウ （四十匁） ミツマニ 同
ミシカノアブラ 十匁
右煉治方腫瘡疽口傳

テキステイ

イヒリコン油（一合） テレメンテイ十弐両
ロウ（弐両） 右子リコシテサマシ
テレイケイルハン 黄ハメ壱ツ入
モツマク ニウカウ 弐両宛
アブラ半合水ニ落シ玉ト成 モツマツニ
ニウカウ入煎トキテサマシ右トヒトツニ合
一切ノ金瘡折傷愈妙也是外無量膏
アリトイヱトモ不入不可他見努〻禁

金瘡血トメ四物湯
白芍薬 當皈 熟地 川芎
加香附子如常煎臨服少入用他ニ不可
相傳之妙也

三一承氣湯治肝經玉莖中痛不
可忍諸血效欲死者
大黄 厚朴 芒硝 甘草（各等分） 水煎

一切疔抜
桃仁（去皮尖）朋几（ヤキ）各等分
乳汁疔廻（ニヌリ）上ニハシリコシ
鼡喰亦癰疾発日朝用水
烏毛千　萩古キヲ黒焼ニ末丸

三氣湯
治一切癌疽瘡癤無名腫毒瘡
土骨（七分）櫻皮（同）大黄（一分）酒製
忍冬（三分五厘）連翹（同）甘草（三分五厘）
山皈来（生ヲ色）黒三色也
右調合腫物在上焦一貼七分在下焦
一貼（三分二分）實大黄（少々）可也
保命圓（酸粮骨　辛粮筋）（鹹粮筋　苦粮氣甘粮肉）
香附子（黒五分）皮（三分）茯苓（三分）梔（同）

姜（三分）丁（一分）良（三分）

食積
和虫飲　食傷霍乱虫痛
ヒハヨウ（大）ゴシユ（中）肉桂（小）木香（小）
ミシキク（小）サンザシ（小）ガジユツ（小）藿香（少シ）

小児
啓脾丸（消食止瀉止吐消疳清黄）（消脹定腹痛益脾健胃）
人参　白朮　白茯苓　陳皮（各兩）蓮肉（兩五分）
山査子　山薬　澤瀉　甘草（各五分）
右為末煉蜜為丸三十丸空心米湯ニ用
小児瀉不止治
五棓子細末陳キ酢ニテ煉臍上貼即止水瀉痢
疾方
生薑　眞香油（各四兩）黄丹（二兩）

熬成膏薬貼臍立効

右之通以上

文政三庚辰秋九月廿三日

一天黄　壱匁

ナリセ　人参

黄芩（わうごん）　弐匁　右之中丸

一黒丸子

楊梅皮　八匁

當薬　壱匁五分

唐胡黄連　一匁五分

胡椒　七分五厘

片脳　七分五厘

右細末糊丸ニシテ其上クヘノイヲ

衣ニカケ天日ニテ也

一サンソウニン末ニメ能茶ニテ用子ム

リヲサマシ夜モ子ムキ丁ナシ

田虫ノ妙薬

硫黄　弐匁　蛇床子　二匁　雞冠石　二匁

密陀僧　一匁　キワウ　一匁　佗粉　五分

右粉薬酢ニテ煉付ル

かうけし薬　一日用五分

一葛根（ぶしう）　三ケ日ト

同七番入中皿ニ黄
かけ汁ニ小豆を入る
一小豆　五合
一虎獅子（こしし）　五本ツヽ
同三番入ニ重ニ黄
小豆積ヽ間〻ニ香の物
梅ニ柚とんれ塩からき物
生姜ハめうかニ漬物
以上　ゟ
覚
一志んのいなみ以前又ハ志んぶきよ
しいたけと胡椒茶を用てよし
よいさん切て醂茶を用ゆ
一ゑし　一こんぶ　一梅ぼし
一まんじゆう　一さん茶
一右月方ニ味噌ニ而て
一豆ご房五合
右よき古味醂（こま）五合ニみの五合
ニ玉子戸入汁酒（ざん）ニて能炊ひ
後をときふハ切の料理酢その
用るへし　麦の内ハ玉子を
除き二而切の黒砂糖の内ニ
かいり切ニ而とくを用るへし
いりなり
右者伝今
伴し

一あひるたまご　ましらかい　壱つ

はだめのぶん　三ツ

あつきこはが　そし［illegible］　不ぇ八龍のぶん　三ツ

さけかし

金たく三粒　外内銭数こき天くし

壱数ハ［illegible］

付さゆゑ周田（飯すくたて）

古三尽くゆゑあいせてと

かく我うりる知まうらい三匹

一［illegible］　壱分拾

一［illegible］　壱分拾

一［illegible］　壱分

一かん花子　弐卜

一大ちよ　出し卜

一みかん［illegible］丸　壱し

一さんやく　壱し

一かくはく　弐卜

一くぎ番の　弐卜

一すたま　弐卜

一ちふく　弐卜

一ぼう［illegible］　かし

一きんろうじ　かし

一帯やく　すし

一きうかし　すし

一わんそし　すし

一ごろしく　かし

右二拾筆

妙振出之

一人じん　一はこら　一陳皮

一甘草　一黄柏　一桂心

一ヒハやう　一山ざし　一香附子

一麦芽　一ブクリウ

右

道引風によし　此外諸病によし

文政三辰年
九月吉日
青山氏