家方口解　上

k 8-2

F
カ一69

此一紙本君ニ無之為ニ私ニ君 加ル下同例

當莊菴口解上

一 四君子湯 諸虚 熱病 脾胃 産前後
三 香砂六君子湯 脾胃
五 八物湯 諸虚 熱病 婦人
七 八解散 諸虚 熱病
九 八味丸 諸虚
十一 加減金匱腎氣丸 （八味丸加膝車）
十三 補中益気湯 此両目ヨシ
十五 茯苓補心湯 雜症
十七 滋陰降火湯 補陰 降火 或熱病
十九 芎皈湯 産前後
廿一 滋陰至宝湯 虚労
廿三 正気補虚湯 諸虚
廿五 七味白朮散 （脾胃或加丁香名銭氏白朮散）
廿七 平胃散 脾胃雜症

二 六君子湯 諸虚 （脈四君子異功ノ用ニ同シ心得ソ 心下痞メ弱好裕）
四 四物湯 諸虚或婦人
六 十全大補湯 諸虚 熱病 婦人
八 六味丸 諸虚 或熱病
十 加減八味丸 （去附加玄） 諸虚
十二 内外傷弁
十四 啓脾湯 諸虚
十六 逍遥散 雜症
十八 清離滋坎湯 上同
廿 加味大補湯 中風 痿躄 痛風 脚気
廿二 雲林潤身丸 諸虚 或為湯 ・
廿四 参苓白朮散 脾胃
廿六 理中湯 脾胃諸虚 （加之名附子理中湯 仲景金匱人参湯ニ）
廿八 不換金正気散 雜症 風湿

3冊
490.9 Ka-2 1
No 2363 旧 K8-2
慶應義塾大学医学情報センター 昭和47年7月4日
富士川文庫
1485

廿九 人參養胃湯 瘧
卅一 二陳湯 痰
卅三 香砂養胃湯 脾胃
卅五 香蘇散 風 雜症
卅七 荊芥敗毒散 雜症
卅九 驅風解毒湯 風 咽喉
四十一 八解散 諸虛 熱病
四十三 香葛湯 風 （十神湯去广加芎蒼）
四十五 芎蘇散 （十味） 風
四十七 前胡湯 （四味） 風 小兒 諸症
四十九 小柴胡合周脊湯 熱病
五十一 風喘方 （九味喘自得方）
五十三 加減沖和湯 風 熱病 （羌活湯去蒼加蒼朮十味也）
五十五 疎邪實表湯 熱病 （即桂枝湯自加減法）
五十七 加味小柴胡湯 熱病 加牡蛎
以上五十八方也

卅 加減正氣散 飲食
卅二 枳實大黃湯 飲食
卅四 行氣香蘇散 雜症
卅六 人參敗毒散 （玄参常ニ用） 風 雜症
卅八 消毒飲 痘疹 諸瘡 （加犀名犀角〻）
四十 芩連消毒飲 熱病 雜症
四十二 十神湯 風 熱病
四十四 清解湯 風熱
四十六 升麻葛根湯 熱病 痘疹
四十八 杏仁散 （十味） 風喘
五十 萬殊湯 （十二味自得方敗毒去芎合平胃）
五十二 九味羌活湯 風 熱病 （六合如去地 胸中飽悶加吉）
五十四 升麻發表湯 （六合熱病即广黄湯 自有加減法）
五十六 柴胡湯 熱病 雜症
五十八 大柴胡湯 （六味） 熱病

當壯庵家方口解巻之上

四君子湯
八物湯
八味丸
補中益氣湯
滋陰降火湯
滋陰至寶湯
七味白朮散
人參養胃湯
香砂養胃湯
荊芥敗毒散
八解散
芎蘇散
柴胡合周脊湯
加減沖和湯
加味小柴胡湯

六君子湯
十全大補湯
加減八味丸
皈脾湯
清離滋坎湯
雲林潤身丸
理中湯
加減正氣散
行氣香蘇散
消毒飲
十神湯
升麻葛根湯
萬殊湯
升麻發表湯
大柴胡湯

香砂六君子湯
八解散
加減金匱腎氣丸
茯苓補心湯
芎皈湯
正氣補虛湯
平胃散
二陳湯
香蘇散
驅風解毒湯
香葛湯
前胡湯
風喘方
疎邪實表湯

四物湯
六味丸
內外傷弁
逍遙散
加味大補湯
參苓白朮散
不換金正氣散
枳實大黃湯
人參敗毒散
芩連消毒飲
清解湯
杏仁散
九味羌活湯
小柴胡湯

一　四君子湯　諸虚　熱病　脾胃　産前後

一四君子之脉ハ洪大無力或虚微細或數無力或脉緊弦按メ不軟心下弱ク

一大補セント思フハ唐白朮可之大躰ハ和モ可之小児ハ和ヲ用テ能ト覚タリ唐ハ白アシキ故ニ虫ニサワルヿアルトミルカ口傳ソ太熱シ氏大虚ニ及處ハ生死ノサカイソト云氏ハ小児ニテモ唐ヲ用テ可之加熟附子

或作気

一急ニ虚ヲ補ハ独参湯ハ一匁ニ生姜三分疼ツヨキハ生姜五分入ルヿモアリ独参ハ二匁三匁四匁用ルモ生姜其心得ニテ用ルソ独参ノ次ハ四君子湯之人参五分入レハ独参ニ近シ大体ハ人参三分可之或二分加テ見合ニテ三分入ルヿモアリ養生第一或病後食進出ル氏ニハ人参一分ニテ可之食進ム病人ハ自カラ力ツク者ソ内経中焦ノ元気ヲ云ニ元気ハ穀気ト合セテ身ニ滿ルトアリ

一独参湯ヲ何程用テ元気ヲ付ケルトイヘ氏食不進ハ不治ソ如何トナレハ人参ハ元陽ヲ救フ第一ソ元陽復スレハ命門ノ気ニシツカリトナル程ニ脾胃其力ニテ食ヲ思フ意出来ル力順之元気ハ穀気ト合セテ身ニ充ルト云処ソ人参能人ノ命ヲ延ルトイヘ氏食ヲ絶メ人参ハカリ服ソ数日ヲ經テ命ノ有者ニテハナキソ穀気ト合スレハ命ヲ延ルト知テ穏テ補スル意味所カ口傳ソ

一四君子湯ハカリスラリト用ルハダラリト草臥テ眼睛キロリトメ弱ク憊シタルニ向症ニテモ可

同気相求ル故ニ真ノ火ノ浮散ヲ内エ呼入ルソ

和

敎

一汗多ハ加黄芪肉桂之急ニ草臥ハ附子ヲ加フ虚ニ寒ヲ主ニテ脉遅緩ナルニハ乾姜肉桂附子ヲ加ルソ此三味ヲ加レハ命門ノ真陽ヲ補スルソ気虚ニメ汗多出レハ命門ノ真陽浮散メ肌表大熱メ汗多ク出汗ノ穴ヨリ真気脱メ死スル程ニ急ニ附子肉桂乾姜黄芪ヲ加テ命門ヲ温レハ其温ニ引レテ外ノ熱ヲ呼入ルソ寒涼大過メ命門之真火衰ルニ此治法ニテ適中スルソ外ノ手又ルキヿニテハ不治ソ此症ニ六味丸為湯加知柏ヿモアリ

一脾胃ヲ補業此外ニナキト可知外ノ業方ハ多味ナルユヘニ功ウスシ大躰ノ脾胃虚ハ加永宿脾胃大虚ト云ハ命門ノ真陽衰ルユヘニ胃気ノ本弱シ此ハ附桂姜ヲ加ヘテ速ニ真陽ヲ助クレハ陽復シテ脾胃ヲ蒸ユヘニ食能消和スルソ補脾補腎々々補脾此一剤ニアリ補腎ト云ハ腎中ノ温ナル者ソ真気ヲ補之或ハ房労過度ニシ腎中ノ真気下ヨリ脱スル者此剤ニアラサレハ腎気不生ソ腎間ノ動気必弱ク或緩或散大之或細数此皆命門ノ気虚之

一大体ノ医ハ肺ハ気ヲ主ル肺ノ気ヲ補スルト云者多シ是ハ気ノ本何方ニアルト云ヿヲ不知者ノ云ヿソ気ノ根元ハ命門ノ真陽腎間之動気ル之

一胃気ト云ヿヲシツカリト知ラヌ者ハ中焦ノ気ヲ補スルトハカリ思フ胃気ノ根元ハ命門ノ真火腎間之動気之

腎 朮 緩

一小児泄瀉後痢後諸症トモニ草臥タルニ可之
一脾胃虚冷シテ水穀不分利或下焦ノ元陽衰テ気不順而暁瀉スルニ
四君子人参五三分或一匁附子三分肉桂五六分乾姜四分木香三分或
丁子三四粒車前子五分 泄瀉ニ肉豆蔲三分余ニ調合シテ昼夜ニ服
用テ大功アルツ世人皆虫積ニテ腹瀉スルト思ヒ不知脾胃命門虚冷
シタルハ脉緩或弱シ虫積疝気ハ脉ニ力アルツ
一大体汗アルニ黄耆建中湯ヲ合シテ可之
一癰疽潰後黄耆建中湯ニ合シ飴ヲナト知加ヘ用ルコ右
一豆痘瘡色淡キニ此テ可之肉桂ヲ加ルコモアリ大便溏スル気味アルニ合
黄耆建中湯木香ヲ加ヘテ大功ヲヱタリ
一熱病瘀血ヲ下シ草臥テ熱残リタルニ加連テ大功ヲ得タリ
一諸病トモニ虚冷気脱ニハ四君子湯附子或ハ姜附之諸症トモニ手ツメノ時ハ命門
ノ真陽ト腎間ノ動気ヲ察メ補陽スルツ
一胃気ヲ補スル家上ノ方ツ惣テ脾胃ノ陽気ヲ補ユヘニ食進出力出来ルツ
脾胃ヲ調ルノ天ハ山薬連肉ナトヲ入テ調ルツ調ト補トノ意アリ補ハ無形ノ
気ヲ補ツ調ル意ハ味ヲ以テ調ル意アリ

一胃気虚ヲ温補ナラテハ大便ノ瀉スルモ調難ト思フニ脾胃虚メ熱アル者脉必
緩長之緩ハ虚長ハ熱ト知ヘシ加連或七味白朮散又ハ啓脾湯
一産人腹痛ニモ用ルツ加陳テヨシ
一陳皮ヲ加テ五味異功散ツ四君之方ヨリ尒補力ウスシ陳皮ヲ入タルユヘニ
ク本ノ気少ク成意ツ少ノ違ナリ故ニ四君異功トモニ功ヲ一處云タリ
一産前胎動或五七九月ニテ小産シ或産スレトモ子不育或産後常ニ血暈多ク
アルモ危シト云モノアリ皆以異功散阿膠縮砂當帰ヲ加ヘテ常用産後必気
カヨキツ 牧田氏家内蔵進妻ニ三子トモニ九ヶ月ニシテ死胎ニテ生シ或十
ヶ月ニ産ノメモ死胎之沈保養ヲ好タル故ニ此加減ニテ胎アリテ三四ヶ月ヨリ
人参一分或五分入テ用タシハ十ヶ月ニテ安産シ母子トモニ无恙タリ後又用テ
二子无恙ニテ人メニ人参モ大戒ニ恐テ不用ユヘニ又死胎ニテ生タツ故ニ又未ノ子
ノ時ハ此剤ヲ用テ母子无恙是ヨリ予胎前ノ養生薬ハ是之ト決テ常ニ
用大功アリ産後ニ目ニイ甚ノ独参ヲ用漸ヨキコアリ或枳多トヒカヌ
コモアリ是ハ俄ニ補ユヘニトヽカヌツ如此ノ言人ハ胎前ニ異功ニ阿膠縮砂
當帰ヲ加テ用レハ必産後違者之
一産後血暈四君加附子ヲ小黒炒乾姜テ必効アリ黙ヲ加ル意ハ丹渓ノ見之

本陳皮三分ニアリ

産後ハ陽気浮散スルユヘニ乾姜黒炒ニテ用トアリ予此見ヲ以テ産後陽気浮散傷寒ニ汗下ノ後脱血ノ後ノ陽氣浮散ノ症ヲ自得シタリ 産後又ハ脱血ノ症ナトハ生ル、𪜈丹田ヲ動カス者ナレハ陽気ハツト浮散スルソ丹田ノ地腎間ノ動気陽之根本ナル故ソ其浮散シタル陽ハ人多クニテ帰ルソ脉モ絶タヲハ姜附肉桂ヲ加ルソ内ヘ温剤ヲ入テ浮散ノ陽ヲ呼カヘス之入門云虚而無寒モノハ多ク芎帰湯ニテ寒有モノハ附主乾姜ヲ添ルトアリ此心エ人多ノ肝要ノ格ニ湯而無寒ニ少内熱ナト残リタルニ姜附主ヲ添レハ少キ氣ニ姜附ノ辛キ熱ニテノ動テ散ルトアリ故ニ此意ヲ以テ脱血ノ症ナトニ用ルソ或ハ辛味ハ血ニ走テ動スト𪜈アリ太シレ𪜈脱血ニツレテ元陽モミナヌケハツル𪜈ハ附姜ヲ添ル東垣脱血ノ症ニ温補ヲ用

升陽挙経湯　治経水不止如右尺脉按之空虚是気血俱脱大寒之証軽手其脉数疾挙指弦緊或渋皆陽脱之症陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渇此皆陰躁陽欲先去之當温之挙之升之浮之燥之此法當大升浮血氣切補命門之下脱也

圭（盛暑勿用 秋冬用）　芍　紅（各五）　細（六分）　参　熟　芎（各一）　独　走炮　炙甘（各一分五）　羌　芸

藁（各二）　本　斤　蒼（各三）　柴（三ト）　桃（十ケ）

右㕮咀毎服三戔若痛勢頃當漸加至五戔毎服水三盞煎至一銭空心熱服

以是真陽之下脱浮散ヲ知ル

一脱血ニ四君子湯多ク用テ自血脱益気古人之法之補陽陰血生スト尺日々ニアリ　殊ニ今世間温補ヲ多ク好ム者皆云コト之此意東垣ノ意ヲ以可知血脱ニ黄連解毒湯用テモ有是ハ熱故ニ脱血スルニ用人多ク血脱ニ用ル意ハ血ニツレテ陽カ脱スルユヘニ陽ヲ失シト思テ用ルソ陽気弥脱スレハ弥用ルソ血脱益気ト云モ此本ヲシラ子ハ偏ナルソ熱ツヨクテ脱血スルニ強ク温補スレハ狂ノ如クニナルコトアリ

一産後熱アルニ人参多用レハ発狂大熱スルアリ心ヲ附テ可用ソ脉按メ力アルニハ無用ソ無力ハ用テヨシ

一惣テ四君人参大剤用ルニ上気ス痛ムルトヒカヘテヨシ悪心アラハヒカヘテ好ソ

一人参ヲ用ル中ニ食進出レハソロソロ減スルソ食減スレハ一ミシ進ハヒカユル心リ人参応スレハ胃氣タシカニナルユヘ食ス丶ムソ陽壮ニナレハ進陽減スレハ食減スル合点スルカヨキソ

一中脘ニ動気アルハ熱之人参応カタシソレモ陽気浮散之動ハ無力之脉モ無力

一虚人腹痛ニヨキソ　異功ニ加木香ヨキコトモアリ　甘キヲ好ハ四君ヨキソ

一池泻虚人調カヌルニ四君加木香痘ノ泻ニモヨシ痘ノウラハリ出テ弱キモ好ソ木桂ヲ加テモヨシ

一痘ノ気ニモ色ウスキ血スクナク陽気弱キソ痘ノサキトカリヒラムハ気ハ弱ソ痘ノ弱ソミルハ四君ニ黄耆肉桂モヨーシャム剤ニサシヒキテ心テ用ルソ痘尖不穏。

紅為吉

一痢病ハ七八日過テ弱キニハ異功ニ加減スルコトアリ或七味白朮散ナトソ痢ハ努力後重

流滞或大便臭ハ熱ヲツヨキト云モ状ニハ知カヌルリ脉ト労カ大便臭ト裏急後重トヲ熱ト合点スルカ好リ然レ氏胃風湯ノ症モアリ人参ノ症ハ熱スクナキリ熱アル中ニ一脉モ弱ク気力弱クハ五七厘試ニ用或人参又人茶ト黒功ナト加減シテ互ニ用テ好リ

一霍乱吐瀉ノ後用ルヿ多シ其外何症ニテモ気乏ノ草臥ル主方ト知ヘシ神氣ノ剤ノ第一ノ加減多ケレハ功ウスキト可知

一傷寒ノ草臥ミニモ此ノ主方ニ合スルヿ多キリ

二　六君子湯　諸虚　脉四君子異功用同シ心得リ心下按メ弱好按ヲ

湿

一氣虚メ湿痰アルト云ニ用ル目付ニ氣虚メ湿痰アレハ不食シ或ハ脹ナトアルリ湿痰アル人養生茶或脾胃虚冷温燥茶ヲ加ヘテ四君子湯ノ加減ノ心エリ四君子ニ合ニ陳湯シテ六君ト名付ル程ニ其心エニテ用ルリ

○久患瘧痢若覚内熱或飲食難化作酸属虚火可加炮姜

一痰乾クハ半夏ヲ貝母ニ可ユルリ

一尾陽ノ那須心菴ハ六君子ニ附子肉桂干姜ヲ加ヘテ建脾湯ト名付テ常ノ虚人主方ニシメリ附子ハ心菴熟附子ノ法ハ甘草汁ニ浸シ四ツニワリ又甘草水ニツケテ甘草湯ヲ煎シ附子ノカツカツヲ見合テ甘草中ヘ入レ右ノ附子ヲ煎テトロトロト煮ツメ甘草汁ニ附子一吸込ノ程ニ煮ツメテ取出シ陰ホシテ剉ム是ハ附子ヲクスレトモナル功ハナシ少シアタヽムル意アレハ討見タリ附子ヲ多ツカリトツカヒテ

アタ〆ヲセヌヲ人ニミセシ為ノ意モアルリ附子ノ功ヲ用ルハ甘草水ニ一夜浸シ四ツニワリ又一夜浸シ湿紙ニ包アツ灰ニウツミ紙ノシメリトレル比ニテ陰干シ剉用是少加テヨシ養生茶ニハ心菴ノ熟附モヨシ

一眩暈アルハ天麻縮砂ヲ加テヨシ

一不食ニハ縮砂或白豆蔲ヲ加フ・虚冷ニハ姜圭ヨキリ或走

斤弓木宿

一中風ノ左右ヲ不問養生茶ニ加骨弓木宿圭用テ連名功アリ熱アルニハ姜連或酒炒黄柏加ルモアリ虚冷ニハ熟附子加ルリ常ノ中風ノ養生茶ニ用ルリ

一瘧後ハ湿痰アルユヘ二必用ソ虚人ノ瘧ニ炮姜一匁程入テ発日之朝用テ解スルヿモアリ

一肥満ノ人不食気虚スレハ炮姜ヲ加テヨキヿモアリ

一惣テ人参剤ヲ用ルニ甘キ味ヲ好ム人ニハ能応スルソ攻撃ノ剤ナト用テ不食スルニ六君子ニ炮姜ヲ加ヘ甘キ味ヲ好テ食進モアルリ腹痛モ此心得ニテ用ルリ

虚冷

一脹満脾胃虚寒湿症ニ附子姜桂ヲ多加倍人参朮草灯心ヲ加ヘ大剤ニシテ用ルヿモアリ

一氣虚ニテ湿痰ナキニハ四君子異功カヨキリ一熱アルニ黄連ヲ加或黄柏酒炒ヲ加ルヿモ有

三　香砂六君子湯　脾胃　六君砂乃藿

一脾弱ク心下モ弱キ中ニ少ノ塞ル意アルニ用ルリ

一痢後或不食或食傷後熱病後熱スキト去リテ養生ヨシ脾胃弱キ人ノ養生茶ニヨキリ

一霍縮霍ニテ食ヲ進ル心又ハ食滞ナトノコリ又ハ虚人ニテ不換金ニ藿砂ナト

モ用カタキニ可用ソ香砂ノ六君ナトハアシライニ用ル意ヨシハツキリト功ノ
ヲミル薬ニモアラス是ヲ用シヨリハ香砂ノ養胃湯ヨキソ香砂養胃湯
ト六君子ヲ用ル間ノ薬ト知ヘキノ香砂養胃ヨリハ補剤（ツキテヤウカヽ）
六君子ニ姜香砂ヲ加ルヨリハ補脾ニハヌルキソ必竟補薬ノ中ノアシライノ薬之

尊方
主治

四　四物湯　諸血症或婦人

一脈進弱或有微力心下弱ク好按ソ

一四物湯ノ四味分カリ用ルハ功ナキ者カ入ルソ當帰血ヲアタヽメ血ヲアミシ熟冷ナル
意ニテ燥ヲ潤ス燥疼ニモ潤スソ芍藥ハ血熱ヲ濇シ血ヲ收斂シテ收ソ味
酸ユヘソ血ヲシメヨスル意ソ川芎ハ血中ノ気ヲ順ス三味ノ凝滯シテヲモキ薬故
ニ川弓香氣ヲ取用テ血中ノ氣ヲ行ラス意ニ必竟燥ヲ潤上可知條下ニ煩燥
不寐胸膈作脹脇痛ニトアリカヤウノ症ニ他医イロヽ用テ不治ニスラリト
四物湯本方ニテヨキヿモアル（キソ六味丸ノ煎湯ナト用ル意ソ

一大便泄瀉スルニハ用カタキソ涼薬故ニ陽氣ヲ損スルソ

一打身ニ四物湯ニ苓連將木圭ヲ用ルヿモアリ是ハ和流之

一疹ノ不食ニハ四物湯ニ加神麹テ能ト云傳ソ養愚イハレタリ疹ハ血中ニ入
血ヲ燥スユヘニ四物湯ヲ何レノ主方ニモ合スル心得ヨキトイワレタリ血熱ニハ四物湯ニ黄
芩紅花ノ加減和ニシテヨシ疹ニハ決メヨシ斑ノ血熱ニモ心得ニテ加減スヘキソ
疹ノ治法壽世保元ヨシ

尊方
主治

一四物湯ノ本方ハ大形人々不用ソ加減シテハ用ルソレユヘニ四物湯ノ條下ニ忌ヲ
付テスラリト本方ヲ用テ思ノ外利ヲ得ルヿアルソ

一傷寒汗下ノ後熱血分ニアルハ四物湯ニ合小柴胡ヲ用テ能ソ陽明アルニヨミレソレニ
テ不治ニ合六味丸料或黄連解毒湯ヲ合スルヿモアリ解毒ヲ合スレハ殊ノ外
服シカヌルソ病人病家ヘ呑ニクヽ覚ハ加減スヘキトモ云キカセテ可用ソ小貼
ニシテヨシ虫アル症ニハ不可用四物湯ハ虫アルモノハイヤカルソ虫アルモノハ
當帰ノ白モキラフモノ有地黄ヲイヤカル有又地黄ヲスクモ有但地黄ヲ
スクハ必竟甘キヲ好ム者カスクソ川弓虫ニ毋ハル薬ソ芎藭モ青クサ
キ香アリトテノイヤカル者多シ補血ノ剤ヲ用ルハ虫積アルモノニハ用捨
スヘキソ是非用テミタキ氏ハ小貼ニシテ三剤方ノ間ニ淋出シ用テミテ風味
ヲ問テ用ルモヨシ悪ナル氏ニ用テエ応不応ヲ知ルハ悪心アラハ不可用心下按
メ不好按モノハ必補陰ノ剤ソカユルト可知ソ口舌ヨリ乾燥スルハツカヘヌソ
内強ク乾燥スル中ハ虫モ積モ動カヌソ

一牡丹皮山梔子ヲ加ヘテ加味四物湯トアリ寒熱煩燥ナトニハ柴胡ヲ入テヨキヿ

蒼

アリ牡丹皮血熱ヲ清スルゾ是モ白ヲ去ノイヤカル薬ゾ

一血崩之症ニ四物ニ合黄連解毒湯用ルゾ

五　八物湯　諸虚　熱病　婦人

一氣血両虚ニ用ル剤ゾ気虚ニシテ血燥キ熱ヲ生スル時ニ用ルゾ未發ノ火ナトニ一盞ニ用ル相應スル宜キゾ

一病後熱少残リ血燥キタルニ必用ルゾ　一瘀血ナト来リテ後弱キニ用

一熱病熱大半去リ弱ミアリテ津液乾クニ必用テヨキゾ或加柴危ヨキゾ

一弟之姪熱病危篤久譫言耳衝聾耳乾擲足揚手大柴胡承気湯ノ收節ニミユレ然心下モ弱クトコヤラ顔色ニ瀉剤ノ用カタキ処アリ脈進撃ニシテ弱シ此服八物湯ニ人参三分入用テ快其後元氣草臥久リ独参湯ヲ兼テ大功ヲ得タリ人参ヨク応スルト思テ独参ト異功ヲ兼用レハ譫語多クナリテトコヤラ熱セスヤラナリソコテ八物湯ニ人参二分入独参（六七分）煎メ兼用テ運モ静ニナリテ本復シタリ後独参ヲヤメテ八物湯ニシタリ是ニテ熱入陰分テ陰火ト云ヿヲ可知ゾ補陽ハカリ多クレハ陰火ヲマス故ニ不静ゾ、コテ八物ヲ用地黄ハニテ潤スユヘニヨリ合テヨキゾ此八物湯陰陽如權衡ト云方ゾ

一癰疽潰後用ルヿアリ

一産後主方ゾ安栄湯ハ八物湯ニ木沉香附吉芷芪一雀ヲ加テ十五味ゾ産後血

産后　血暈

スズ

産后

血中

有川

暈四君ニ行ヨ黒汞ノ功ウスキ時安栄湯必ヨキゾ

一八物加芩テ連翹木香丁嘴ヲ如山田振薬ト云ゾ産後少弱ク熱アリテ身サシクトメ叔痛上氣脈數有力或寒痛スルニ妙アリ是公血中熱アルト云ヲ目當テ必用ゾ其外血中熱アリ瘀血アル婦人ニ公血崩帯下ヨ四子ノ瘀血或下血ナトニモ爵血アルニハヨシ婦人腰痛惣テ熱アリ血積アルニハ思ノ外ノ功アル薬ゾ

一脈洪ニ数按メ没ニ或弦按メ無力心下空ニ好按ニ用ゾ

一痘收靨スル比面乾キ心アルニ必用ノ剤ゾ血ヲ潤シ気ヲ補スル薬ニ一ゾ大補湯ノ症ヨリハ少熱アルニヨシ

一大便瀉スルニハ用カタシ地黄アルユヘゾレモ熱アリテ瀉スルニハ症ニヨリテ可用ヿモ有

一諸症時ニ血中之燥火ヲ潤シ気ノ虚ヲ介クルト云目當ニテ用ルゾ其中虫症黄ハ疸ナトニハ難用ゾ地黄ハ湿ニハヨコシカラス但シ一概ニハ難云　湿症モ牛足痛アルニハ必用ゾ何レノ道ニモ凡寒暑湿ニ依テ後気血衰タルニ用ルゾ黄ハ疸一症ハ用カタシ虚疸ニハ用ユルゾ虚疸ト云ハ虚症ノ黄色ニ見ルゾウス黄ハ色之小便不黄色ゾ小便ノ色黄ハ湿熱脾胃ニ鬱滞シテ蒸ユヘ胃口ニ鬱滞アル程ニ地黄アシキゾ

十補

有志

一八物湯ヲ用ル意十全大補湯之症ニトコヤラ熱アルト云用テヨシ清補ノ剤ノ

一身瘦テ熱少有之口不苦外邪無之其人地黄モ不泥心下好按無力氣ゝ虚而陰火アルニ用ル剤ソ

六　大全大補湯　諸虚　熱病　婦人

一氣血両虚ニメ虚冷シタルニ用ル剤ソ虚甚則加走

十補
目當

一脉法進而無力中弦緊按メ不鞁或大無力或微細緩遅心下空虚好按或以熱手心温則快キヿヲ覚ルヲ目當トスル也

一此症畏寒足冷眼睛ウツナリトメトコヤラ少熱モアレ𪜈實熱ナキハ十全大補湯主ヲ討世保元之條下ヲ看ソヘテ可知ヲ

一人參養栄湯ハ十全大補ニ加減シタル方ソ心虚シタルニヨキソ去芎加陳遠志五味ソ

一加味大補湯ハ中風門ノ剤ソ　大補ニ加減シタルソ

十補
全忌

一十全大補ハ假熱ヲ去ル剤ソ　一虚人ノ腹痛アリト云ニ能ヿアリ

一四君益氣ハ六君ナト用ル中ニトコヤラ血燥キ涸セタキト思フヤウナル𪜈用ユ又ハ下焦陰火ノ漸アルニモ熟地當帰有故ニヨキソ

一病後熱スキト去リテ保養ニヨシ

産前
臨交骨
開閉

一産前臨産ノ𪜈弱キニ用テヨシ臨産交骨不開モ虚ニ大補湯産後交骨不閉モ虚ニ大補湯トアリ必用ノ剤ソ交骨ハ陰門ノ上ノ骨ヲツカイメアリテ向ハ骨ヒラケテ生ルソ生レテ後又閉ルソ

産后
血暈
脱血

一産後血暈クラキヽトスヘテ脉弱キニ用ルヿアリ先四君子斤弓默ト獨參ヲ用或安栄湯ヲ用テ其中見合ニテ用ルソ

一脱血之脉黒炒乾姜ヲ加用ルソ血多下ルキハ肉桂ハ去テヨキト云ヿソ太ダシ𪜈血下リ尽ミ手足冷東垣ノ語ノ如ク陰火モ𪜈ニモフル𪜈ハ血ニツレテ陽脱スルユヘ亡陽症ニナルハ圭附ヲ加用ルソ

一

戰慄

一産後戰慄テ人參三分入独參多附ト兼用ルソ惣テ脱血シテ戰慄ニ用ルソ碗ヲ手ニ持ヿナラヌヤウニフルフ者ソ甚則ハ剛痓柔痓トアル痓ニナリテ速ニ死スルソ戰慄甚テ後反張スルソ産前後虚ニハ必用ノ剤ソ

一癰疽潰後必用ノ剤ソ補中益氣湯四君合建中湯加飯弓口渇ニハ六味丸ニ桂玄ナト煎ニ交用ルソ医圭ハ表ヲ固イヤスハ意ソ内ヨリ托ス意之内托散モ用ユ癰疽潰後内托散ハ定リタル剤之太ダシ𪜈虚多ハ内托散ニハ無用ノ茱味モアル故ニ偏ニ補ヌソ故ニ十全益氣四君ナトニ加減スルソ虚ノ治法ハ何レニテモカハラヌソ

痘気血
両虚痘
乾

一痘漸収靨セントスル𪜈弱ケレハ用ルソ痘ノ乾クニ涸ヲカケル剤ソ水膿ノ間ハ大形不用ソ何レノ道ニモ氣血両虚ニシテ痘乾クニヨキソ

瘧

亡陽

一久瀉ニ加附子必用ソ危積アルニ青鼈甲附子ヲ加ヘテ用ルヿモアリ
一諸病𪜈ニ補スル𪜈ハ大補湯ノ症カト意ヲ付テ可施治ソ
一傷寒汗出不止亡陽ト云テ汗ニツレテ元陽脱シ死スルアリ故ニ汗出テ不已𪜈ハ此方主薬ソ熟附子ヲ加ルソ其症汗出テ不止悪風心胸苦悶動氣冲上テ胸中臍辺無動氣奔衣則汗臭欲絶独参十全大補兼用或加附子則丹田ニ陽気復シ假熱頬ニ去リ多ハ虚冷ノ假熱ヲ実熱ノ療治メ寒ニ凉ヲ過用スルユヘニ真陽浮散シテ亡陽スルソ胃中ニ九熱不入ニ白虎湯ヲ誤テ用或陽虚ニ黄連解毒湯風通聖或滋陰降火或大承氣ナトヲ用テ攻撃手ヲ得テ正氣丹田ニ及ニラレスメ胸ニ上リ汗ニツレテ脱セントスル𪜈ニ用ルソ初発有汗而悪風スル傷寒ノヿニテナキソ是モ表虚有汗症ソ誤麻黄湯ナト発汗スル剤ヲ過用シテ表ノ開キテアル上ニテ発汗スル上ニ亡陽スルモアリ何レモ十全大補或熟附ヲ加ルソ独参合附ヲ兼ルソ如此症下焦陰火アリニテ上焦陽虚シ胸上頭汗出不已十全ヲ用独参ヲ用ルニ猶不已ヿ十之二アルヿ有是ハ釜ノ下ノ薪火ヲ減セ子ハ釜ノタギリ不已如クナルアリ汁是六味丸煎ニ知栢ヲ加テ妙ヲ得タルヿ有

寒

下焦陰
火上焦
陽虚

脱肛子
腸

一脱肛收リ女子或産後子腸出テ不收ニモ用ルソ補中益氣湯肉桂加テ用ルソ

七　八解散　諸虚　熱病

腎ノ
全精

一自汗悪風脉進弱キ風邪ニ用ルソ加味益氣湯補中益氣湯ヨリ輕キ剤ソ益氣ヲ可用ト思ヘ𪜈トコヤラ心下塞ル処モアリ先八解ニ人参一分モ入レテ可用ト思テ用ル剤ソ人参ヲ拋スレハ異功益氣ナト後ニ用ルソ
一八解散ハ和スル剤ニ補ニハヌルシ瀉剤ニアラス補瀉ノ間和スル剤ト可知ソ食傷後ナトニヨシ不換金ニ藿香ナト加エ食進出テ艱生薬ナト上ニ人参入レタキ𪜈可之
一諸症𪜈ニ補ヲカロク試用ヘキト思フ𪜈ニ用ルソ
一八解散スキノ医ハ大補ノ場モ危ク覚瀉スル場モアヤウク覚ル者好ムソ
一此剤ハ和ト云ヿヲ知テシツカリト大切之場ヲナラス薬ニハアラスト云ヿヲ知テ用ルソ
一他医大補湯八物湯六味八味ナト手重キ療治シテノハカドウヌ虚症ニハ八解ニテ治スルヿアルソ是カ八解ノ功ソ

八　六味丸煎湯　諸虚　或熱病

此方金匱六味地黄丸

一本方ニテ用レハ燥ヲ潤ス薬ソ腎中ニ火生セントスル衝アル𪜈ハ燥ニ其𪜈ハ未発ノ火ソ乱ニ本方ニテ用ルソ真陽モ弱クハ異功散四君子ヲ用火氣衝動ク𪜈ハ四君ニ肩

洒

栢ヲ加テ兼用ルソ陽氣ヲ補シ火動ノ𪜈ハ六味丸ヲ用陰陽如權衡ト云ヲツリヲシテ用ルソ
一腎水ト云テ腎ノ臓ニ水多ク満ルニハアラス人ノ交ル𪜈感動ニヨリテ身中之津液ノ粋

ナルモノアツマルソ命門ノ水ト云ハ陰ヲサシテ云リ　故正腎中ニ常アル精水ト云ハ子ヲ種ニ草木ノ実ノ意之ニ三度交ル程アリテ交ワ後又入カヘノ精水蓄ルヿソ人種ハ人外ヨリ生ルモノニアラス

口舌　歯痛
一口舌或歯痛大便結スルニ加知栢テ其功神アリ

風熱后
一風熱ノ後咳不已ニ加減瀉白散ナト用同然ソ時ハ六味ニ知栢好杏宿ナト入テ妙アリソ

咳不止　風熱后
一風熱後咳不已ニ加好杏宿或加永咳止ムヿ多シ或肉桂ヲ加ヘ永ヲ不用ヿモアリ

咳不已
一咳嗽喘急ニ滋陰降火湯ニ好杏沈雪ノ加減田ノ喘急ニアリ其ハ意ヨリ弟子夫メ多

一小児痄食ヲイソクニヨキヿアリ或宿伽ヲ加リ（寿世小児門ニ出）

一産ノ催ニシアル時加桂用テヨキソ産後時ニヨシ地黄ヲ不好モノニハ号飯湯ヨシ人参白朮ナト加ルヿモアリ十全大補モヨシ寿世保元小産ノ部ニ用テアリ

口舌　痛
一舌痛ノ症ニ用テ功アリ四ノ口舌門ノ論可参考ノ一（熱病口舌乾心下不安燥疼ナトアルニ知栢ヲ加テ妙有）

一熱病口舌乾燥不能出于唇外心下按メ痛不好按大兼氣湯ヲ用ル間ニ煎盞テ大兼氣ニ度用六味知栢入タルヲ一度用如此交用テ功ヲ得タルヿ多シ

一熱病遺尿秘タ湯ノ間ニ本方ニ桂门玄ナト加ヘテ人参（三分）入兼用テ功アルヿアリ

久汗不止
一下焦ニ熱有リテ久汗不已乃熱入于腎中タルニ加知栢ヲ汗頻ニ止タルヿアリ

一熱病胸中煩悶奈何ヒシカタキニ用テ頻ニ止タルヿアリ心下好按ニ用ルソ不好按ハ大小兼氣ノ属ソ

一小便頻数ニ加益智或宿砂功アリ

一小児瘦ルニハ六味ノ子リ茱ヨキヿアリ

一热病汗下ノ後小柴胡ニ合メヨキヿアリ

一淋病ニ用ル久不愈ヨシ热残ラハ栢ヲ加阿膠栢ナト入レルモアリ

中风便结
一中風大便結スル症ニ主方ヲ用ル間ニ子リ茱ニシテ用テヨシ

遺精白濁　八味六味ノ分別
一遺精白濁（参考）或八味丸ヲ用テ却テ夢遺多キヿアリ此即腎中ニ火ノ機（キザシ）アルニハ以六味丸ヲ煎湯ニシテ酒栢ナト加ヘ用テヨシ

一婦人帯下热アルニヨシ酒栢ヲ加ルヿモアリ

一男婦ニ不限下焦ニ火気ノ機有テ諸病ヲナスニヨキソ火沖壮ナラハ知栢ヲ加ルソ

一大便溏スル症ニハ用捨スヘキソ夫ハ八味丸ヨキヿ有（一双痛甚止ヒ発加知栢功ヲ得タルヿ多シ）

軽　淋家用
一軽ク用テ見ル時ハ淋出シ用テ煎シテヨキソ（一本知）

燥疼
一胸中燥疾アリテ不食或ツカユルニハヨキヿ有

又
一燥疾アリテ六君或燥薬ヲ服スレハ則呕吐甚シ六味ニ雷栢加ヘ妙ヲ得タリ

一眼カスムニ火ノ機アリテカスムハ六味丸ヨキソ俗ニ云六味丸保養ニ服メ老人早ク盲シタルト云ヿアリ余此理不可有ト思タリ然ルニ五十六十ノ男ニ左積アリテ肝経鬱セ目スル有如此症ハ六味丸不宜ソ却テ鬱滞ヲマスソ消痞湯浄府湯ナト応スル症ハ不好甘ソ、レニハ六味丸ハ却テ目弥カスム理アル

一痔痛ノ狠生ニヨシ但虫痔トテ肛门ヲ喰アリコレニハ不宜

脉浛

、脉浛ハ進テ尺微カ有ゾ心下好按ニハ不泥ゾ不好按欝滞アルニハ不可用
心虚疾、欝食イソキスルニモヨキヿアリ

九　八味丸煎、　諸虚（六味腎気丸主附）

、脉浛遅緩或微細小或中診弦緊按而不鼓心下空虚好按臍中動気進無力
或浮散大或全不見

、命門ノ眞陽ヲ補フ剤ゾ必竟腎中ノ陽虚ヲ補フゾ
命門ノ元陽ヲ補フハ、釜ノ下ノ薪ヲマス意ゾ脾胃ハ、釜中ノ如シ元陽壮ナレバ食ヨク消化ス古云補腎不如補脾又云補脾不如補腎ト云モ此理ゾ腎ヲ補ニヨリハ脾胃ヲ補カヨシ如何トナレバ参朮ヲエテ胃陽全ケレバ食消化シ腎水モマタ自生ト云ノ心ゾ脾土ヨリ肺金ヲ生シ肺金腎水ヲ生スルト云意ゾ此ハ相生之道理ニカケテハツレヌ故ニ云タ者ゾ参朮姜圭ヲエテ脾胃全ケレバ食進ゾ必竟津液ハ脾胃ヨリ生ス精汁ナレバ津液ノ粋ナル者也此理實理也又八味丸ヲ以命門ヲ補ハ下焦ノ陽タレカナルユヘニ胃気本ハ元陽ナル程ニ参朮ヲ以脾ヲ補ニヨリハ直ニ命門ノ眞陽ヲ補ハ脾胃ヲ蒸テ食進ト云ヿゾ故ニ不食ノ病人ニモ八味丸煎ニテ食進ムヿモアルゾ

、男年近四旬夢遺白濁脉緩脊中寒ヽハ八味煎投之三月歩如常然夢遺却多余以為此男命門之陽気虚然水火供ニ虚シ前醫参附投之一年脊中不温歟、、厚衣一日之間大半臥参附不應ハ火之幾有故也趙子醫貫曰参附腎経ナトニ非ト仍八味煎ヲエテ起テ健也歩如常而却夢遺止（不者陽ヲ復メ火ノ氣アル之）以是命門ノ衰不衰如此上云可知ゾ参附主命門之虚冷ニハイカニモ腎中ニ入テ眞陽ヲ補ゾ火ノ幾有ニハ不應ゾ久服則耳鳴上気シテ久服シガタキゾ以此可知八味丸ハ沈テ命門之陽ヲ助ト見タリ

、大便不調ヲキヿ有朝ニ瀉スルヲ脾胃瀉ト云此ニモ必用ゾ参朮姜附ヲ兼テヨシ

、頭痛眼赤頭汗三人頭ヲカヽヘテ居タゾ余命門之火衰ト云ヿヲ思出シテ廿八之歳八味煎ニ貼ヲ用タレハ静ニナリテ數貼ニテスキト本復シタゾ脉緩ニテ足冷タゾ

、口舌為痛大便不調走理中湯ニ兼テ用ゾ必死ノ婦人タスカツタゾ

、下焦ノ虚冷ノ養生薬ゾ

、腫脹ノ症ニ倍附圭沢令加車適中シタゾ

、小便不通ニハ加膝車ニテ妙アリ

、男歳五十腫脹呼吸速迫不能偃臥余以八味丸煎加牛膝車前倍附桂而愈

、婦年五旬腹脹以枳實厚朴而汗出心胸苦悶以八味丸煎倍附圭加縮砂車前而愈

、小兒痏身如此不思食息大便瀉不能起挙家以為必死以八味丸煎而全安

一兒二歳齒遅八味丸煎用之齒生

、二三年如痢不已ニ的中シタゾ

、腰不立者ニモヨキゾ加味大補或参朮姜桂附子當帰ナドニ兼用テヨキゾ

、婦人帯下虚冷ニヨキソ　、何ノ病ニテモ命門ノ眞陽衰ヘ下焦虚冷ト云ニヲ付用ソ假熱自退ソ
、虚冷ノ淋病ニモヨキソ　、熱病小便不通ニ加車前用ヌ或獨參〻附兼テ用ルコアリ
、臍下ウ子〻痛冷ニヨキコアリ
、心虚疾、鬱之症ニモヨキコ有食イソキスルニヨキコ有リ六味丸ノヨキコトアリ八味丸ノ
ヨキコト有
、下焦虚冷小便頻數ニヨシ　、壽世保元ニ八味八味ノ論委ニ可參考

十　加減八味丸　（去附加玄）　諸虚　圭一両玄四両

、、加減八味ハ煎克渇スルソ
、、渇症食倍ニ咽モ乾ニヨキソ七味白朮散ニ參三分入兼用テ大功ヲエタリ渇症ハ此方ヨキソ
、五十ノ男渇ヲ患ヒ津液口ニテカハキ糟ノ如クニ匕タ物湯茶ヲ好ミ能食ス余六味丸ニ玄愛
官ヲ加參一分入且七味白朮ニ參二分加晝夜四貼交用之本復シタリ肥人渇ヲ患ハ後必
疽ヲ病ト云コト古書ニアル故ニ後腫物出ルコ有ヘシ不絶加減八味ヲ用ユト教ユ十年
無恙七十歳ノ、ニ脊中ニ癰出來タリト云ヨト云癰ニテナカルヘシ疽ナルヘキソ必
ズ死セント病家ニ云病人モ十年前ニ云レタル病出來タレハ覺悟シタリナト云タル
由ヲ疽ト云モノニ三人見タリ常ノ癰ハ腫上リ膿テ潰肉ト皮トヘタ〻ト不成ニテ
潰ル分ハ潰生肉ノ分ハ生肉ニテノアルユヘニナヲルリ疽ハ針シタルアトヲ見ニ鯨皮ノ如

古書ト八
蘭室上
消渇門之

○分五七分程ニアツク見ハ肉ト皮ト離レニテケモノハ皮ヲ肉ヨカケテ切タル小口ヲミ
ルヤウナソ外料ニ問ニ悪肉ヲ切ント思ヘハ生肉モツヽキテ針サワレハ血ヲ出シ二重下ハ
潰其下又生肉其下又潰淡半腐肉半生肉ユヘニ針ニテイコイカタシト云タソ其中ニク
サリテ腫不痛腫物切下ヲ臥ス者ソ腐肉ユヘニ不疼ソ
一狼生茶ニ用ル心ヘハ八味丸モ用又ハ加減八味モ用テ見テ快ク覺ルヲ用タカヨキソ

十一　加減金匱腎氣丸煎　八味丸加膝車

一八味丸ノ外ニ云盃タリ虚人小便閉ニ用ルソ鼓脹水腫ニモヨシ　一小児腫脹ニモヨキソ

十二　内外傷弁　諸虚　壽世保元ニ出ル

一人迎之脉大於気口爲外傷氣口脉大於人迎爲内傷○外傷則寒熱齊作而無間○内傷
則寒熱間作而不齊○外傷悪寒雖近烈火不除○内傷悪寒得就温援即解○
外傷悪風乃不禁一切風寒○内傷悪風惟悪些小賊風○外傷症顯在鼻故鼻氣
不利而擁盛有力○内傷者不然内傷症顯在口故口不知味而腹中不和外傷者無此○
外傷則邪氣有餘發言壯厲且先輕而後重○内傷則元氣不足出言懶怯且先重
而後輕○外傷手背熱而手心不熱○内傷則手心熱而手背不熱○外傷及痛
常々有之直須傳裏方罷○内傷頭痛有時而作有時而止○若顯内症多者則
是内傷重而外感輕宜以補養爲先○若顯外証多者則是外感重而内傷輕宜

外傷證顯在鼻氣故云氣不利而擁盛有力

以發散為急

一論飲食労倦傷脾則不能生血故血虚則發熱〻〻則氣散血耗而無力或易飢或肚

飽悶不思飲食變病百出端始渇外感重者則先理外感六分而治内傷四分見功則住

如外感症則内傷薬用六分矣能治萬病其効如神

一東垣云夫飲食不節則胃病〻〻則氣短精神減少〻氣不足以息言語怯弱腸中不和

口不知穀味或胃當心而痛或上支両脇痛甚則氣高而喘身熱而煩胃既病則

脾無所稟受故亦從而病焉若形體労役則脾病〻〻則怠惰嗜臥四肢不

収或食少小便黄赤大便或秘或泄或虚坐只見些于白膿或泄黄糜無氣以動

而懶倦嗜臥脾既病則胃不能独行津液故亦從而病焉若外感風寒但無（天俱）

此證故易分別耳

一虚実之症不可不知因往〻以内傷不足之病悞作傷寒外感有餘之症汗之吐

之差之毫釐謬之千里実〻虚〻之医殺人耳

一夫傷寒之為六淫之病風寒之始於表而漸傳於裏則初病頭項強痛發熱悪

寒之身疼當汗之及其邪入於裏熱盛内実譫言狂妄當下之不愈則發班

黄厥逆變生〻諸症ヲナス

一夫内傷因七情鬱結飲食労役為不足之病始生于裏而發于表也其病

倦怠四肢不収頭疼時作時止其熱始盛于心膈間次發于肢體稍遇風寒則畏〻畏

懼氣短喘促懶于言語脉必微細或弦而数或虚大而数只此分辨則内外易見矣

一論中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節労倦身

熱脉洪大無力或頭疼惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微細軟弱自汗体倦

少食或中気虚弱而不能摂血或飲食労倦而患瘧痢等症因脾胃虚而不能

愈者或元氣虚弱感冒風寒而不勝發表用此代之或入房而後労役感冒

或労役感冒而後入房者急二加附子〻患謂今之一身以脾胃為主脾胃氣実則肺

得其所養肺氣既盛水自生〻水升則火降水火既済而全天地交泰之令矣

脾胃既虚而四藏俱無生氣故東垣先生著脾胃内外傷等論諄〻太然皆以

固脾胃為本所制補中益氣湯又冠諸方之首観其立方之本旨可知矣故曰

補腎不若補脾正此謂之前所治症槩挙其略餘當敬之而類推之是方之妙ヲ弁註

以表明之

春圃云是龔氏壽世保元之論則東垣之意之内傷外感之目付ケル是之

知之則内外傷ヲ不誤ソ内傷ハ補中益氣湯而已ト心得ル少麻工ノ了庭論

アルエヘ三補中益氣湯ハ内ヨリ生ズル病ニハ何レニモヨシト思フ益氣ノ三加

減スルソ左三ハアラス内ヨリ生スル病ト外ヨリ入ル病ノ弁之内ヨリ生スル病

此主劑ニアル補薬ノ中ヨソロヘト見分テ用ルソ益氣ノ功ハ左ニ記ス通リ益
氣ノ本方ハ功ウスキ劑ソイルソトモナク粮生薬ナトニヨキソ（六合）

十三　補中益氣湯　（此両目ヨシ）

芪（蜜炒）　朮（竹）（酒洗各一戔五分）　参（一戔）　貴ハ七分　升柴甘各五分　姜棗

（ウン栢炒テ加ヘ合肝水ヲ　枚ヲ以テ陰中ノ伏火ヲ瀉ス　紅花二分入心ヲ　血ヲ生ズ）

一此益氣湯ハ自汗或汗出易ソ表虚ト云ニ功アルト知ヘシ（主）衣ヲ能固ムル劑ソ

一升麻柴胡ヲ以多（テ）芪（ノ）ノ氣ヲ升セルソ故ニ升提スル劑ソ下陥ノ氣ヲ升提スルソ

一氣高ニ喘シトアルハ痰アリテ一ツニツ咳スル而アトノ無力咳キ痰ヲ咳切ルカウスキニ此劑ヲ用テセキ切ルカ出来ルハ咳モ止ソ益氣ニ力キラス人参ノカソ

一身熱而煩トアルハ陽虚ニシテノ假熱ノ意ソ内寒（ヒエ）テ外熱アルニ加附桂テ則假熱去ルソ是ノ見遠テ陰虚而腎中生火ニ身熱而煩氣高ニ喘トアルト云テヒタ物用テモ無功却而咳嗽ヲマシ熱ヲマスソ東垣ハ腎火ニハ知栢酒炒ヲ加ヘラレタリ

一脉法洪大無力或微細無力心下空虚按無力好按腹承而少脹之属皆氣虚之甚則加附姜桂

一益氣ニ功ハツキリトスルハ附ニ主ソ附一味桂一味加ヘ或永宿ニ味ヲ加ルコトモアリ

一胃ノ氣ヲ補スル薬ハ胃陽ヲ補之升柴ヲ以胃氣ヲ升セル仕立ソ脾胃共補ト云ニツレテ兼エハ調ルモ補モ一ツニ覚ルソ調ルハ大便溏ニ安キヤフナルヲ蓮肉山薬縮砂ナトニテソロヘ調ル意ソ胃氣ヲ補ニハ本方ニテハスルソ（キ）姜桂附ヲソヘ子ハ補陽（不全ソ）

、速ニ胃氣ヲ補シテ元陽ヲ全スルト云ニハ芪升柴ナト却テ不入ソ参ノ功ウスクナルナルソ故ニ速ニ功アルハ四君姜桂附ト可知ソ

、世俗不詳モノハ脾胃ヲ補ト云ハ益氣ニ限ルヤウニ知ソ是ハ本理ヲ不知モノソ脾胃虚冷シタルニ益氣湯本方ヲフウフウ用テ居ル中ニ連々衰ソ升柴アルユヘニ功ウスシ胃氣弱クハ直ニ参朮姜桂附ソ

、脾胃虚大便周歳不調脉緩ナルヲ以温補ス熱ルニ長脉アリ長ナルヲ以脾胃虚而熱アリト知テ七味白朮散啓脾湯ヲ以自調ソ如此癥ニ益氣湯姜製連ナト加テ用ルコト有本方ヲフウフウト用ルコアリ

、益氣ヲ能升提ノ功ヲエシト思ハ、熟附ヲ加エテヨシ

痘回水ノコロヨリ表虚シ色白或額ノ痘色薄キニ必用ソ桂ヲ加或木香ヲ加ルソ痘ノ瀉ニハ功十分ニモ不見訶子肉豆ヲ加ヘテ瀉ヲ止ルカヨシ外ノ瀉ハ洪ル其外久瀉ニアラ子ハ不用ソ或甚大瀉カニモ千ユルナク痘ノ瀉ハ早ク止ルカヨキソ痘ノ氣ル下陥スルユヘソ

、痘收靨ヨソキモ氣ル虚之用之或桂朮ヲ加フ、産後子腸不収或交骨閉カヌルニモヨシ或加姜　、胎前ニモ胎腸下ニサカリテ心下弱キニ用テヨキソ四君ニ帰省

膠ヲ用カヨシ此意ヲ益気ニ合テモ可用ソ
、婦人帯下血崩或經水久不止色蒼々氣下陥ニ用ルソ
、熱病汗出不止ニ合黄芪建中湯ニシテ用ユ
一虚症小便不通ニ人参ヲ倍シ用ルコトアリ升提シテ膀胱ノ氣ヲ升スル意ニテ
通スルコトアリ下陥ノ氣ヲ提テ通スルコト多
一大便不通虚症ニ加杏仁テ通スルコトアリ
一熱病汗多下焦熱アルニ加知栢テ大効ヲ得ルコトアリ心下空虚ナルニ
一熱病上焦ノ陽気弱熱中下焦ニ甚キニ黄連解毒湯ヲ合スルコトアリ
一血崩ノ症或下血熱アリテ不止ニ合解毒湯ヨキコトモアリ
一中風多アリ人手足麻痺ナ指ノ木スルニ加附子木香或肉桂ヲ加用テヨキソ
一何レノ病ニテモ久ク病テ気下陥シタルニ升提セント思テ用テ功ヲ得ルコト
間々アリソレ此ニ五味ヲ好ム人ニハ能癒スルソ
一虚人風寒ニ感シ發熱頭痛スルニ加芸芎芷各一戔羌七分汗多加著二分
春圃云栢ヲ入ルコトモアリ
一汗不止ニ去升柴加酸棗仁一戔　夜間不睡ニモ亦加之
一心刺痛者乃血渋不足加飯五分白豆蔲七分亦加減モアルコトソ

一用心太過神思不寧ノ証怔忡驚悸加茯神酸棗仁栢子仁一戔遠志石菖蒲各七分
一精神短少者倍加人参　更加五味子十粒麥門一戔　一五心煩熱加生地黄
一圃云益氣湯論ノ功能程ニハ不効ソレハ功アル場ヘ用ヒヌユヘソ方ノ意氣虚スルユヘニ表
不堅固故恐風寒或汗多身倦ヤウナルニハ適中スルソ本方ニテハ効ウスシ故ニ
姜附桂ノ中ヲ加ルソ
一腫物潰而後膿モ衛ウスクナリイエ肉ヲアケント思フトキニ用ルソ桂ナト加テヨシ
一小児ニツカフモ此心得ヲ以テ用ルソ
一上焦ノ陽虚シ下焦ニ火ノ旺アルニ補中益氣六味丸ヲ兼用テ早ク功アルコト多シ熱　太
シ此是ハ病人ノ未臥床病人モ見エテ又此ノコトニ之尤床ニ臥テモ咳嗽ナキニハ人参ヲ倍
シテリ熱アルニハ六味丸ヲ兼用ルソ虚冷ナラハ八味丸不宜ソ姜桂走多不宜ニテヨキソ
一燥生火ト云ガ多ノ求生甘草ヲ入テ六味丸ニ加子ニテヨキコトアリ六味丸ヲ不用コトモアリ
一以年後之云意之知ヘシ生甘草ノ寒冷ニテ火ヲ緩スルソ

十四　歸脾湯　諸虚

一心氣弱キ症思心脾傷ニ痛怔忡ナトアル症ニ主薬ソ
一健忘六久シキコトハ覚テ當分ノコトヲスキト忘ルルニ用ル主方ソ
一熱病ニアイトノコト忘ルルアリ心熱アルユヘニ安神益志湯浮志導赤飲ナト或ハ

皈牝參連ナト入ル剤用ルソ瘀血アル症ニモ好ミトアリ是ハ大便ノ色也ニテ黒ク溏スルヲ以テ瘀血アリト知リ

一予試ルニハツキリ上功モ見ヱズ又剤ヲ世間ニハ論ミツキニテ補薬ヘ入キハ益氣湯帰脾湯ヲ常ニ用ユ太ソレ氏四君異功理中八物十全参養栄湯六味八味ノ功程ニハ無ソ

一心虚ニ茯神（同）遠志（上）皈酸棗仁ヲ四君異功益氣ニ加減スルモ同シ心虚シテ兆ヲルニハ連生地心煩ヲ去ルト可知リ

一失血ノ後ナトソ養生薬ニヨキソ

一心虚痰爵ノ症ニ世間ニテハ定テ皈脾湯ヲ用ルリ心虚痰爵ノ驚悸怔忡ハ心ノ上ヲ痰カ無隅ナユヘナレハ皈脾湯ヲ心虚ヲ補スル意トハ緩アリ皈脾湯補心ハ心ヲ労シ或ハ心血ヘリタルヤウナルキニ怔忡健忘スルヲ治スルソ心ニ君ヲ痰爵ニモ用テ見テヨキヿモアルリ

一爵痰ハ心虚ト真ノ心虚ト可知怔忡ニ虚実アル也

十五　茯苓補心湯　雑症　（茯参朮皈地酥芍麦貴連各木分廿三分烏梅一分）

要薬四物参蘇君合方ヲ姿参補心ト可直

一参地黄ヲ入テ用ルハ補心ノ理アリ虚ノ症ノ熱アリテ大便結地黄ナト不足症ノ痰アルニハ本方ニテ用テ功アリ

一常ニ用ルハ地黄ハ人参ヲ去リ或木香モ去テ用ルハ婦人男子心虚痰爵

ノ症ノアニシテフイニヨニ永風ナトヲ引ツメルトキヨキソ

一頭眩ニハ去多地黄ハ木香加定香芎藭ヲヨキソ

一弱キ婦人ノ少肌引ツメルト云ニ去地黄蜜多加呆羌雀ヲ用ルソ咳アルニ好杏ヲ好ソ

一灯下集ニ補心湯ヲ用タル功能ヲ昏ミシテアリツレヒソ見合テ可知カ補心ヲ用ルハ右ニ記ス心学ソ

一傷寒ニ熱病外邪モ収弱リ内熱モアルニ柴今連ナト加ヘテヨキヿモアリ

十六　道遙散　雑症　（参多帰柴朮木余令）

一此ハ和剤メ病ヲミツカリトナヲスサホニアラス和シテヨキヿ右サキソ病後調理ニヨキソ

一道遙散ニ合温胆湯ヲ夜不眠ヨキソ或悪多痰爵ナト眠カ子テ少ク熱アルニ此加減ヨキソ熱病後ニモ此加減吉ソ

一補ヲ用ント思ヘハ咳嗽（嗽字衍文）痰多テ人参モ用カタシ地黄ハモナツムヘキト思ヘハ（思ヘハ衍文）云耿ヤルセナサニアタラスサワラスニ用テ置、異和剤

一強ク補ヲスコシシ又ハ瀉剤ヲ誤リタル氏ニスラリト用テヨキヿアリ

一婦人帯下ノ虚症ニ合五味異功散テ本復シタリ或厄ナト加タリ是ハ香ヨキ薬ソ婦人薬キラフイニシテ補薬ヲ投スレハサハリテ不能服或薬香ニクキト云テ久臥床帯下アルニ異功ヲ合シ或股ハ厄ヲ入テ半年用テ本復シタリ三年ノ病治シタソ人参白朮陳皮茯苓少ノ心モアリ参一味加レハ和ナル補之平和ノ剤ヘ

一牡卮ノ二味ヲ加ヘ加味逍遥散ト云牡ハ血熱ヲ清シ上瘀血ヲ去ル功アリ二味ヲ加減スレハ血熱ヲ清スルソ

一風疹出没ニ加紫羗玄蝉ナト加ルコトモアリ　一風疹汗出ルニ芪云ノ加減ニテヨキコトモアリ

一傷寒熱病ニ汗下後虚煩而譫言アルニ合黄連解毒湯テ常ニ用ルソヨキ加減ナリ竹茹温膽湯ナトニテ虚煩ノ不止時ソ

一血崩或下血ニモ合解毒湯ヨキソ柴胡アリテ升提スル意モアルソ

一産後食弥進養生薬ト云ニ芎小雀委小ナト加テ用ルソ薬ヲ用テモヨシ不用トモヨキ位ノニ用ル加減ソ

淡°

一婦人小腹重墜シ水道澁痛スルコトアリ小腹ヲモクノ物アルヤウニテ小便渋痛二色ヲ加ヘテフラリト用テヨキコトアリ芎ナト少加テモヨキソ

痢

一痢病大半愈テ薬ヲヤウラケシト思フトキニ桃奴ナト加ヘ或ハ熱少シ残ラハ芩ナト入テ用ルニヨキ方ソ

一八物益氣ナトモ近キヤウナル症又ハ虚ソ補ニテ見ント思トキニ人参ヲ加テ用テヨキソ

一此ヤウナルスタリト云ル薬方ハ功者ニテハ随テ加減シテ自由ニ用ルソ

十七　滋陰降火湯　補陰降火　或熱病

一陰虚火動ノ主薬ソ薛己張介賓丹溪ヲ相手ニシテ補陰ノ誤リヲシカル剤ソ然レトモ症ニヨリ大功ヲ得ル剤ソ一偏ニシカラレヌコトソ

一虚労咳嗽ニ主ト方トシテアルハ誤也予之未発已発ノ火ノ論ヲ見テ可知ソ此剤ヲ常咳ニハ不宜ソ大便結スル症ニ用テモ後溏泻スルソ初発ニ真陰虚シタル故ソ大理ヲ不明シテハ未発已発ノ火ノ道理不分明ソ○治級心法痘ノ論ニ気ハ血ノ論アリ此処ヘ痘ノ療治ハ不出コトナレトモ其亘之物モノ道理同シト云コトヲ知セン為ニ伸之ソ心法蓋気体天而親上血体地而親下痘之出也其ハ高起之泡気之位之上之気宜充焉其血暈根脚血之位之下之血宜附焉其泡尖大面色白潤是気充而居其尊親上之尊守之四囲有暈而色紅活是血附而安其親下之分之気居其尊其血安其分気血和順而載毒而外此最吉之痘可勿薬而愈之然ルニ項陥則気反親下以気弱虚而不能充之此項陥ハ先陽気ノ虚スル筈アルノ末ニテ血熱アリトテ実寒涼ヲ用レハ先ニ陽気衰タル処アルニヨツテ寒涼ヲ得テ弥痘不起発シテ死スルトアリ此降火湯ヲ虚労咳嗽ニ用レハチヤウト其理ト同シ初メニ真陰ノ気虚シテ腎中火ヲ生スルユヘニ降火ニテ火ヲシメセハ真陰弥衰ルユヘニ脾胃ノ陽気モ衰ヘテ食消化シカタク大便必溏シテ後足跗浮腫シテ死スル之故ニ火気ハ未発ノ時其筈ヲ見テ可治之熛ト云方ハ崩ス前ニ此ソ後ニハマタ真陰モサノミ不衰ソコテ云味

カサリ以ス燥ヲ潤シ又多ク本ヲ以テ真陽ヲ助ケ燥不潤シテ熱煎ハ酒炒ノ黄栢ヲ少加ヘ前ニアル益気ニ少知栢ナトヲ加テ真陽ノ不損ヤウニスルカ至極ノ療治ソ故ニ発熱咳嗽吐痰盗汗ト云ニ病症ノ外ニ見ル様ニナリテ降火ヲ与レハ実々虚々ノ誤リトナルソ脾腎ノ両臓熱アリテ虚スルユヘニ降火ニテ弥疲ルハソ

一降火湯ハ腎一臓ニ火アリテ脾胃全モノニヨキソ喘急痰嗽不能偃臥ニ沉香杏ヲ加テ本復スルソ　回春ニアリ

一熱病熱入テ腎中痰咳モアルニ按之則能熱退クヿアリ汗下之後サメカ子テ口ニ舌乾燥スルニヨキヿアルソ

一頭痛脹疼止甚難忍心下無實滞両尺脈按有力ニ用テ火ヲ降シヨキヿアリ

一常之元邪之後咳嗽不能偃臥加減瀉白散用テ無効胆加冬杏功アルヿ有旦灯下集ニ順氣和中湯ハ降火湯ヲ用シカト冬ヲ用ニ無咳嗽ニヨキヿナリ又痰大冬モヨキトアリ

十八　清離滋坎湯　仝

一滋陰降火湯ノ症ニ同シ降火湯ヲ用ル中ニ心付テ取カヘテ用ヘシ熱病汗下ノ後熱不解ニ用テ大効ヲ得ルヿ有

一熱病熱入テ腎中火ト云ニ用テヨキソ

一喘急ニ沉香ナトヲ加テヨキヿモアリトカク燥痰ヲ潤シ腎火ヲ涼スル剤ソ脾

参三
皈十匁
弓七匁

胃ノ氣弱キニ強テ用レハ瀉ルソ

一注夏ト云病トニテ春末夏初熱アルヿ有口ニ舌乾熱ソヨク小児ニシテ用ルヿモ有

一虚労ニ用ルトアレ氏不宜ソ未発ノ脾陽衰ルユヘソ

十九　芎皈湯　産前後

竹六ヲ弓四戈 入門臨産門名紫弓皈湯 局方婦人諸疾 正傳婦人胎前 壽世婦人通治 名佛手散 丹壽名治血散 紅花湯同服

一産前ニ用ルソ産ノ催ニアリ彔ト頓ニ努カセハソレヨリ用加肉桂テモヨシ

一産前弱キニハ合四君人参（五厘一分）入テ用ルソ四物湯ニ冬圭滑甘ヲ加テ臨産ノ時用テ妙アルト云傳アリ六味丸ニ圭ヲ加テ用テヨシ弱キニハ十全大補湯モ用ルソ

一氣力ヨキ産前ハ芎皈湯本方ヨシ

一産後血暈ニ合四君子湯加黒ニ水ヲ必用ルソ

一後産トテ胞衣ノヲリルヿノツキニ加圭テ用ルソ六味丸ニ圭モヨキソ

一後産ニ三日モ不下アリ切者ナルハニナテサセカシ出ス心ニシテ努力サスルリ胞衣ニ瘀血入テ大キニナレハ下リカ子テ死スル者モアリ気力ヨキハ別儀ナキソ産婦心ニカケヌヤウニキカセテヨシ

一虚人臨産ハ芎皈湯ニ人参ヲ加用ユ或産後血暈ノ用心ニ独参湯（五七分）煎シ置道モヨキソ急ナル時ハ人参ヲ剉淋出シ用テヨシ

一産ニ向テ未生前ニ瘀血来ルハ産ムツカシキヿ有

一臨産ニ虚人ハ腸リ上ノ交骨開キカヌルユヘニ子ノ回ヒテ居テモ生レカヌルヿアリ

ソレニハ大補湯ヨキト云フソ産後ハ骨不問モ虚之大補湯トアルソ

一婦人頭痛ナトニ弓皈湯ニ陳湯ナト合シテアシウイニ用テモヨシ凡実ノ頭痛常ニ不正血ノ道ナト云ノ痛ハ肝ニ発シ或ハ内傷ヨリ発スルユヘソ

一打撲ナトニテ肩脊（天背）ナト痛ムニ加羌用ルコアリ

一胸痛ニ九気湯トテ鬱（ウコン）崔茸ノ三味用ルコアリソレニ合スルコアリ胸痛多ハ瘀血ユヘノ者アリ後吐血スルソ

一吐血後弓皈湯ニ黙ヲ加用テヨシ

一惣テ脱血ノ後眩暈スルニハ人参ヲ入テ必先用ルソ其中ニ戦慄ナトツヨキハ十全大補独参ナト用ルソ十五味安栄湯モ用ルソ

一脱血スルハ血ニツレテ元気ヌケルユヘニ人参ヲ加ヘ又ハ独参ヲ用ルソ血脱益気古人ノ法之ト云理ソ

一當帰ハ血ヲ温血ヲ生シ血中ノ気モ補ルソ皈ニ香気アルカ血中ノ陽ヲ助ルソ芎ハ血中ノ気ヲ順ルソ佛手散トモ名テアリ（四奇ニ芎帰ト加益母草名佛手散）

大補ニ杜仲牛膝各三分 独各五分 蜜爪附各三分 李 枳殻各五分 姜棗入

廿 加味大補湯 中風 痿躄 痛風 脚気 牛木

一中風左右癱瘓ニ用ル剤必用ルソ

一痛風虚冷々湿（冷湿）ニテ手足為痛ニ必功アリ麻緩或枯而無勢或進而無力

一久々腰ヌケテ不起ニ虚冷ナレハ決而起ソ奇方ソ

一寒湿ニアタリ久虚人手足痹或痿久ルニ妙アリ

一小児ニモナシ意ヲ以可投之

一腰痛ニモ神効アルソ　一脚気或鶴膝風虚人ナレハ神功アルソ玄白ノ家秘ソ

廿一 滋陰至宝湯 虚労

一滋陰降火湯ノ症ニ涯ク困ミト思フ氏男婦ニカキラス用ルソ

一咳久不已ニ用テ功アリ　一痰火ノ症ニ用テ神功アルコ多シ

一久痛ニヨキコアリ此ハ下焦ニ火アリテ上ニ痰アリテ久痛スルニヨシ

一瘀血ニ加阿膠ニテ治ニシタルコアリ

一熱病ニモ用ル脉アリ虚煩ニシテ温胆湯竹筎温胆湯ナト用ル氏ニ加減シテ用ルコアリ

一婦人虚労ノ主薬ソ熱ノ氏脾胃ノ陽已ニ弱キニハ門冬敷アルユヘニ脾胃ニサワルソ但大便結スルニハ脉ニ用テ陰火ヲ凉スルニヨシ人参ヲ加ルコモアリ

一身疲乾キ痰モアリ熱モアリ胸ナトイレ田日熱モアリ順気和中ナト用ル中ニ心ニ付テ用ルコアリ

一衂血ニモ用テヨキコアリ

一雲林潤身丸ナト用ル症ニ心ヲ付ヘキソ至宝湯ニ人参ヲ加フレハ脾胃ノ熱モ凉ニ真陰モ助クル意ソ雲林潤身丸心脾ニ熱アルニ用テヨシ虚中ノ火ヲ清スル意ニ加減シテ用ルソ

廿二 雲林潤身丸 或為湯 諸虚

（皈芍白朮白苓参雀貴貝連宜袖各二両参風菜）

（蓮肉各三両 皂莢一両耳土弐）

一心脾ノ補ヒ熱ノ清スル剤ハ虚中ニ熱アリ痰ナトアルニヨシ
一脾胃ヲ温補シテ不快症ハ必脾胃ニ熱アリ或痰火アリ　故ニ此剤ヨキヿアリ
此症ヨハキハ七味ノ白朮散ヨキソ前医多附白朮ヲ用テ綿延トスル所ノ心ヲ付
ヘキソ順気和中湯ナトノヨキヿアリ
廿三　正気補虚湯　諸虚（入門）（参陳皮苓耆朮當芎下冬芷半五味木附麦丁水　甘姜棗）
一此剤ハ十全大補湯ヨリ出タル剤ト見ヘタリ入門ノ剤之温補ノ剤ソツカ
ヱナトアルト云冷タル男婦ニ功アリ此方條下ニアル功能老テ可投之奇
効ノ有タル剤ソ丁木永圭朴爵滞ヲ順スル薬ソ
廿四　参苓白朮散　脾胃
一脾胃ノ調ル剤ソ胃気ヲ補ト云ハ多朮姜桂走ソ　脾胃ヲ調和シ瀉ヲ止メ
ヤハラカニソロソロト調ルハ此剤ソ
一虚而有寒者ハ多附姜桂朮之属虚而無寒者ハ多朮苓ノ心持之入門ニ
此意味アリ此格言之
一虚而少熱アリ或無寒無熱人ノ脾胃ヲ補ニヨキソシニ強テ姜桂走ノ
用レハ却テ脾胃ヲ燥シ熱ヲ生スルソノハシク云氏ハ脾胃補陽脾胃ノ潤
燥之潤燥ノ時ニ補陽スルハ不宜ソ

一痢病後熱病後養生薬ニヨシ　一大便不調ニ主剤ソ
一脾胃気ヲ補ニハ多朮姜桂走朮宿ノ属唯湿脾ニハ姜桂走朮宿丁香調脾
或微熱アルニハ参苓白朮散啓脾湯七味白朮散或異功加姜製連
一必竟脾胃ヲ補スルト云ハ冷カ熱カヲ知テノ可施治ソ脾胃ヲ補スルト云ナレ
ハタ温補トハカリ泥テ偏ニナルソ
廿五　七味白朮散　脾胃　或加丁香名銭氏白朮散
一脾胃ニ少熱アリ口ナト少乾大便不調ニ用ルソ大人小児治法同シ
一渇症ニハ六味丸門玄圭ヲ兼テ必功アリ
一大便結スルハ虚ノ必用ソ脾胃ヲ潤スユヘニテ自通スルソ加片或桃奴ナト加ル
ヿモアリ気秘ニハ杏一味加ルモアリ中凡十ト云中久ク通シカヌルニハ桃将或
杏将加ルヿモアリ
一必竟脾胃ヲ潤ス剤ナル故ニ色々ノヿニ功アルト可知此ノ本トシテ可用
一虫ナト下リ或吐蚘ニハ丁ヲ加ルソ
一心下ヒハクトシテ如思食不得之状咽喉セハマリスルヤウナルニ用テ功アリ
一熱病痢病後ノ調理津液ヲ生スル意ニ用テ脾胃ヲ潤シ功アルソ
一前医温補シテノ大便一年不調脉緩ナルユヘニ予モ亦虚冷ト思フテ多附姜圭

参四五分入テ用ル中ニ却テ少浮腫シ色蒼〻不可治ト思ヘルニ心下モ不和スル
アリ脉モ緩ニテ長ナレハ胛胃ニ熱少アルト思テ此剤ヲ用大功ヲ得タリ多附
ヲ倍加スレハ脉カサ出来脉長ニナリ又ルユヘニ熱ト知タリ

一口舌為痛症ニ用テアルリ理中湯用ニテ不宜却テ此剤ヨキヿアリ

九六、理中湯　胛胃　諸虚　加走名附子理中湯仲景金匱今多湯

一胛胃ヲ温ムル剤ソ故ニ多ク雑欠（カキ）剤ソ

一大便不調ニヨニシ虚冷ナレハ必治スルソ　加圭木ヲ陶節菴ハ加味理中飲ト名或附不子

一霍乱吐瀉咳逆脉弱虚冷スルニ多附湯ニ兼テ走理中湯ヲ用ルソ虚冷
ナレハ必治スルソ但伏熱アリテ嘔吐咳逆手足冷ルヿアリ伏熱ニ而胛胃
虚心下空虚好按ソ食滞残リ呕吐スレハ心下痛不好按メ是ハ枳実大黄湯
不換金正香砂之類ソ伏熱ハ多連湯之属異功加姜連

一竹葉石羔湯胃熱咳逆如神人不知之春泰得中景之意始投知假虚知実中
之虚ヲ虚中之実ヲ明ニ知ツテ石羔ヲ用レハ必高適中

一吐蛔虚冷ハ仲景以来用来ルソ

一吐蛔脉虚或虚微走理中多附ニテキル、症アリ此是心下按メ痛不好按或悪心
吉巴音有根

、附子理中参附ノ場ニ至リテハ生死ノ岐ナリ予常ニ云心下ノ虚実腎間ノ動
氣声音有根無根面ノ神色是ヲ以虚実ヲ正ヘシ走理中場ト決スルニ思ノ外爵
滞残リ或蚘虫塞或胃熱アル二三症アリコレニ能ミ可心付ソ

真虚、熱病熱サリ元気弱脉緩一次遺尿如死走理中参三四五分八味丸ヲ兼テ数人
愈タリ且参附湯理中六又用之

、男五十霍乱吐瀉間ミ咳逆脉虚数附子理中参附湯ヲ兼テ治タソ

假虚真実、四十男霍乱吐瀉ノ後咳逆不止走理中無寸功以温胆湯加姜連而安ミ

、、男廿七八霍乱吐瀉脉絶手足冷煎ニ吐不止服参附則吐冷汗出手足氷冷ニ言
語有根有神色以三味淋出頓安手足温ニ汗止脉出

、、男四十霍乱吐瀉脉虚微如無冷汗手足冷氷言語気カ不衰灸丹田気海吐不已
而吐青汁投究以平胃散加連参査吐已脉和而安

假実真虚、婦年廿七産後口舌為痛大便不調周歳及于宴而投究前醫以投冷補ミ
張手足浮腫死在旦夕一次気絶食ノ須而甦予走理中加参三分兼用八味丸三
十日而歩其妙如神回春口舌ノ部ニ論委有

虚中之実、享保初年丙申ノ夏男年五十吐瀉腹痛始用枳実大黄湯痛ヤ、和未全
手足微冷声嗄瀉亦有之以四君子ノ氷宿圭服之則却而腹痛而吊渇好冷水

假虚真實、

不浮腫而垂死

頻予以為右云腹痛冷熱不分則與水一椀而痛甚則冷痛却得冷水而痛和則熱痛也今雖脉弱好之甚此男過房腎脬有燥因吐瀉燥為挑而渇頻予隨好処與冷水一椀腹痛和而気爽仍以異功散冷飲則安瀉止而後温服全安

同年高岡代右衛門中冬感風寒咳嗽不已勤仕而労役三医侍医也従 公遣之與藥也異六君益気之剤之仲春未愈自京師阿部玄隆来診脉曰脾胃弱大便亦取、不調顔色衰備到于四五月則腹脹浮腫而死矣挙家驚公亦驚駭而求治其剤参附姜桂也倍加人参而貼之数貼吐瀉甚而卧床漸不克起全絶食仍招予、云心下有鬱滞九之心下積之端也頭脉雖大按不絶是實似虚之温補不有効挙家乞某以浄府湯去甘加姜連服之不用人参二貼而也思食数貼食ヤ、進ヤ、歩未克勤仕季夏飯田玄仙自京来自公診脉玄仙曰今得春圖之治而雖漸愈其脉大後必発而卧床矣 公驚求治玄仙之藥至剤六君加宿服之不快仍又求予之薬予亦投前方服加参一分初秋漸安咳亦止予診脉滑而進關尺有力投浄府湯心下之積漸和肚有腸胃之熱而未去之仍予順気和中湯適中而九月出勤到于冬呈有食進形肉潤咳亦不来全愈予所以知虚中之實以心下巨之旦腎間之動気在臍中而不啓其変其脉滑大按而不接雖顔色衰気勢不衰以此暁之也不怨心下之虚実不論脉按而無力有力唯見脉浮脉止脉大之状為脾腎之陽虚者甚誤也

一治法二ヲ挙而言之也走理中之場ハ生死之岐ナルコト多シ虚冷ニ寒シハ温補而則治スルコト手足冷之脉弱キニ驚テ不正虚実シハ実々虚々ノ誤アルコト世俗多々此場ニ臨テハ温補トハカリ限ルヲコニ意ヲツケテ施治則大功ヲ得ル場リ

一虚人凡熱或不思食或身寒或感寒之属則熱足冷恐凡実或胸中煩熱脉按而無力或進而弱中診弦緊而按而弱全無心下空虚而好梅其舌黒色世医見舌之黒色為熱而投寒涼則死矣是理中湯之症之或加附子或不加熟附走倍加人参則肌表之熱劫而去且好食手足温和仍微汗而熱速去矣舌鮮氏十六種金鏡録二十六舌之圖中有走理中湯之舌雖有圖難名状予正其舌以其ハ色其ハ色黒色也雖太熱非実熱之黒色実熱則舌表燥焦黒強舌裏舌端有血色之鮮明也今虚寒之舌色微黒者舌之表裏有血色黒而不鮮如所謂撲之色紫而不光澤譬之則凌霜雪而其色實ノ身戦慄之脉其色帯微紫真其色也仍可知之

○裏

真虚

痢病咳逆脉弱則走理中湯間々効十二三治スルコトアリ多ハ難治食病体ニヨリ能咳逆脉発脉止ハ必死

一本此下七字十二

竹葉石湯
加連只假
屋

局方婦人
門四順理中
圓ト有

一痢咳逆或呃吐其ハ脉ハ不虚心下寒按則悪心或ハ不好按以不換金加青皮今且以三味淋出交用之安是因痢不咳逆之聚蓄之積動一

一痢咳逆眩止時發脉進弱心下危塞而不好按此因心虚痰留飲之以不換金合三味或三味淋出与之或二陳合平胃加奴参

一産後血暈ヨキソ食ナレツカヱテ眩暈スルニヨキソ吐ニシテ血暈并且此症ニ不換金黄（大全）或三味淋出用ル症アリ和劑局方ニハ産後ニ用テ妙アルトアリ

一瀉久不解ニ走理中ニ加青丁有神功

一脹満腫脹ニ走理中ニ三主宿本車灯心丁ヲ加ヘ人多一匁或五分或三分加ヘ一貼（五匁ニ調合ニシテ昼夜ニ二貼用之大功ヲ得タリ人多一匁 入テ他薬五匁ニ）調合スルハ昼夜一貼ニテヨキモアリ

丸七 平胃散 脾胃 雜症

一本方ノ心ニ脾胃ノスカスソ唐蒼ニスレハ能去湿ソツカユル時本方ニ和蒼朮ヲ入レスヲリト用テヨキコトアルソ或合ニ二陳湯或合三味テツカユル時或虫積ノアシライ心虚痰留飲ノアシライニ用ルソ呑ヨキ茶ナルソ茶ノ味ノミヨタスルニハ和蒼ヲ用テヨシ不食或呃吐ニモヨキソ

一井関玄説ハ平胃散ニ氷主ヲ加テ不食或腹痛或虫積ニ用タソ然ナキ

一本省ヲ加氷ヲ去ヘ

加

二陳加減ヨキソ

一死胎不下ニ用テアリ其功ハシカト不知死胎不下ニ用ナラハ生附ヲ加ヘ用テ可大ソ

一何ヲ用テモ呃吐或腹痛不止時ハ用テ思ノ外ニ功モアルソ

一凡熱モアリ胃モツカユルニ小柴胡ニ合スルヿモアリ

一高橋亭運玄ハ物湯大補六味八味ナト用ルトキニツカユルトニ陳ニ合シテ用ルト語ルアモ聚モ其心得ヲシテ用スルヿモアリカヤウノヿハアシライソ

丸八 不換金正気散 雜症 凡湿

一唐蒼ヲ入レハ能去湿ソ凡モ去ルソツカユル症ニハ必和蒼ヲ用ルソ

一凡湿ニ感シテ汗ヲ出サント思ハ二唐蒼羗活紫蘇ナト入テ用レハ輝ソ温散スルソ強ク温散セント思ヘハ朮圭ヲツヘテヤルソ

一食傷大体ノハ加藿宿テ加減正気散ト名付ルソ或加朮ソ食傷大体ノハ必用ルノ劑ソ甚凶キハ同將湯ソ

一吐逆ニハ加藿朮或加令ニテ妙アリ茱ソ白ヲイヤカル症ニ妙アルソ 吐逆ナラハ何症ニモ用テヨシ産後吐逆ハ必用ソ 産後吐逆ハ産ヲ催スル時ヨリ湯カユヲ多用ルユヘニ胃ニヤヽシテ居ル中ニ産ヲシテ後悪心呃吐不止者ツ故ニ吐ニシテクルシカラス此劑ヲ用産後吐逆ニシツメト云ニ淋出シ用ユルソ

産後吐逆右治瘀血冲胃トアリ此症ハセウソクニテハナキ亊ソ兎角瘀
血胃ヲ冲ニモセヨ不換金ハ胃中ヲ和スル程ニ四日中ニ血モヨク行ヤルソ

一腰痛スル症好甘味甘味モノニ加芍倍甘味甘クシテ用テ有効

一男年廿内外腰痛或両月ニ微痛不能偃臥何ケ薬ヲ服シテモ痛ニ廿ハリテ不安寧以不換金加芍倍甘味ヲ甘多シテ用痛止偃臥ニ本服シタリ胸虫ニモヨシ痢病久不調肛門痛ニ此加減ヨキ亊モアリ胸虫ニ芍甘ノ二味ヨキ亊アリ胸虫ニ甘味ヲ好ム者ニハ心ノ代ニテ薬ヲ甘クシテ用必神功アリ

一風邪ニ加柴葛或香薷或西汗サセヨト思フトキハ唐芷蒼朮ヲ加フ四肢ヒユヨキソ起ツ寐ツスル風邪ニ用ル少シ風気アルト云ニハ香ソ散ヲ合シテ用ルソ

一咳嗽ニハ加杏仁桔梗吉西虫積アリテ咳呕スル亦加フ或兵ヲ加テモアリ必用ルノ薬ソ

一咳嗽脉浮ニテ上方ヲスルニ加氷宿杏ニテヲタヘ分ル心ニ用テ功アルソ必用ルソ

一咳ハ逆ニ加丁或柿蒂ヲ加用ルコトモアリ　一咳嗽虫積アリ猶モ少アルニ好杏ニ進テヲ加用ルコトモ有

一虫積ノ咳逆ニ合三味の用三味淋茱用之妙アリ吐逆ノ治法同シ

一虫積症九或腰痛何症ニモ此剤ヲ主トシテ加減シテ用テ能主方ソ

一不食スルニ加兵令妙アリ或胃口冷テ不食スルニハ加氷宿ヨキソ

一合六味湖テ風熱アルニ用ルコトモアリ或加厄偶寒補瀉温涼ノ間ニ変スル剤ニ用ルコトモアリ

、不換金ハ和スル剤ソ加減ノ色々ニ用ソ

、脾胃ヲ和スル剤ナル故ニ主方ニシテ加減メ用ルソ補薬ヲ用タクハツカエルトヲモフ甘参ナトツカイタクハ不換金ニ参苓ヲ入テ投コアリ

、瘧フルヒ日悪寒出テ後汗出热頭痛ノ中ニ加柴芩葛或此朮兵今葛ナトヲ加テ用淋出シテ用テヨキソ発ル日ノ早朝加草兵一番煎ニ貼用テ瘧ヨク解スルソヲ瘧ニ草兵ニ味一番煎ニ貼用テ瘧ヲ解スルニ神功アリ間日ニ熱有ハ柴朮文或連ヲ加テヨシ不換金一方ニテ瘧大体ヨキソ

、痢病渋滞ニ加連奴テ能渋滞ヲサリ奇ナル加減ソヲ常ニ用之能程ニ通利スルソ血痢ニ桃奴連加減スルコモ有桃ハムカクスルニハヨカラヌコモアリ痢渋滞木兵ハ河間カ主芍ナレ毛渋滞ヲ和シテ利スルニハ奴妙アリ兵ハ八味止渋ルユヘニスラリトセヌコアルソヲテ誠テ得タリ

、黄疸ニ唐蒼ヲ入レ茵連同ナト或猪沢ナト加テ用コアリ黄疸ハ先茵陳将軍湯ヲ用テ心下ヲ和シ大便ヲ利シテ後ニ用ルソ但茵陳大黄湯ノ大黄ヲサリテ加減シテノ調理スルモヨキソ

、水腫湿ニヨルニ唐蒼ヲ入レ猪尺車通灯心官ナト加ヨキコアリ　○小児治法モ不啻

、小児風熱咳痰不能咳胸迫欲死服不聞他医此甘参ヲ用ルソ不換金ニ

好杏茯苓ヲ加熱アラハ芩連ノ中ヲ見ハカライテ可加其心下ヲ見ニ按中イヤカルソ此虚實ソ脉ニテ虚実ハシレヌソ心下ヲ以テ虚実ヲ正シテ白キリ

、七歳女風熱ノ後苦悶身ヲ悶シテ声ヲ立テ或ハ眼顔色サウ〳〵二医ニ六君子ニ加減シテ用テ心下ヲ按ハ甚シイヤカルユヘニ實ニ患テ脉不抱ハ三ニ此米香日兵ヲ加テ治シタリ熱アレハ又或葛色ナト加テヨシ此湯ヲ見タガエテ補スレハ危ルソ

、實似虚ハ假虚真実ニヘ此ヤウナル時和シテ見ルニ不換金ニ加減シテノミルヿアリシッカリト心下ノ虚實ヲ正シテミツケタラハアシライヲ用マシキソ

、六君ニ加減シ死スル病イキカヘルヿ有ハ前医心下ノ虚實ヲ不知シテ補マシキヲ補スルユエソ懲テ病人ヲミルニ元気コリ衰ヘ病シテ疲レタルカ内外ノ病生シテソレヨリ元気ヲ害スルカ故ニ此二ツヲ考ヘシ邪カニテ元気ヲ害シ疲レタルハ邪ノ實ヲ去レハ元気自安内ヨリ生スル病外ヨリ入病ノ弁東垣内外傷ノ弁ヲ常ニ能々ソランスヘシ

・六君ノ属ニテ食ヲ進ムルト云ハタトヘハ口ニハ味ヲシレ𪜈悪心アリテ不思食或食スレハ心下支胸中胃口塞ルユヘニ食ヲウトムニ用テヨシ實之虚病ノ不食ハ口ニ味ナク食ス〳〵クヲホヘ（物）ムツカシク味ハナケレ𪜈食シ食スレハ飽リソ口ニ味ヲ不知ハ皆陽気弱脾胃ノ運用ヌルキユヘニ故ニ補陽ミニノ気ミシッカリトナレハ食ヲ好ムソ食ヲ好ミ出来テモ脉シツカニ食スレハ飽ハ元陽ノ冷ルユヘナレハ多附姜圭ニテ脾胃ノ陽ヲ助クレハ其暖ニテ食能消化スルソ是ニテ不食ノ虚ト云ヿヲ可知且虚ハ心下空虚ニテ好按ソ実ハ心下実不好按ソ心下実ナルニ脉緩ナラハ温薬ニテ和スルモアリ弱キハ温補シ温補シテ心下塞リ悪心アラハ分コテ不換金ヲ

一癰疽瘡疹或何レノ病気ニテモ病中ニ食滞アラハ先不換金ニ蒼朮ヲ加減スヲ加ルモヨシ肉食滞ラハ査ヲ加淋出ニ可用ソ

一病人ヲ見テ虚実寒熱見分難ノハ不換金ニ加減シテスコシ食ヲ進メテ見テ居ル中ニ其病根知ルヿアリ奇功ノ神剤ト知ヘシ

九九　人多養胃湯　瘧

一不換金ニ参苓草菓烏ヲ加テ名ヲカヘタル者ソ虚人ノ瘧ニ用

一虚人瘧三四発ノ後ニ参三分入テ用レハ瘧解スルリ

一予養胃湯ヲ用テ見ルニ瘧ニハヨシ其外寒熱如労症ニ用テヨキトテ世俗多用ム是本ヨリシラヌ医ノ用ルヿソ根本瘧ニテフラ〳〵ト虚症ノ様ニ煩ヒ何イモ瘧ヨリ発リタルニハヨキソ草菓アルユヘニ虚労又ハ労役傷寒ヲ治スル剤ニアラスソレハソレ〳〵ノ主方アルヘ草菓一味ハイヤナレ𪜈外ノ剤ハ解散ナルユヘニ八鮮散ノ功ハアルヘキソトチラヘモツカヌ療治ハ病ノ根ヲシラヌモノ、

用ルヿソ灯下集ニ色々ニ用テアレドモソノ症々ニ因テ功ウスシ世間ニハ傷寒ノ弱キ症又ハ虚症或春夏ノ間日ノ注夏ノ病ナトニ用ルソレニハ菓イラヌ茶味ソ菓ヲ去テ用ル人参養胃湯ノ本意ニアラス益氣湯ニ蒼ヲ加テ用ルヤウナモノ也養胃湯ノ草菓ヲ去テ用ンヨリハ八解散ヲ主トシテ加減スヘキソ益氣ノ蒼ヲ去テ用ンヨリハ異功ヲ用テ加減スヘシ

一瘧ノ症ハ輕クテモ重クテモ不遠ソ朝晩ノ時ハ遠ヘドモ日々發スル格或間日之格アリ○虚症ノ寒熱ハ晡時手足不冷シテ肩或腰下少寒ケタケテ熱来ルソ脈弱○瘧ハ輕キモ發スル前アクヒノヒシシ或手指冷足冷居リテ孚夜寒ケ出テ多眠ルソ或左ヨリ積塞ルソ虚症ノ心下ハ格別ニ虚心下痞好按瘧ハ必左積アリテ心下実スルソ○虚症ノ寒熱ハ極リタル時分ニテ朝晩ノ時不遠ソ瘧ハ前發シタル時ヨリ連々遅クナル者多或三四五日同時ニ發スレドモソレヨリ前ヘ發シテ朝ヨリ夜ニ入昼ヨリ暮ヘナリテ夜ヘ入リ或嘔吐悪心アルソ瘧久ク解カネテ数月ヲ経テ脈進ミ労症ノ様ニナレドモ多ハ是理中ニ青日ヲ加ヘテヨキヿアリ温薬ニ応スルヿアリ或久瘧大補湯ニ走モヨキソ

一世間ニテ熱病ニ人参養胃湯ヲ用ル医多シ其根ヲ不知人用ルソ労役又ハ虚人ノ熱ナレハ八解散加味益氣加味理中飲ソレ〳〵ノ主ヲアルヿソ庸医古語ニ用ハツリテ云ヿ有熱症ニ熱薬ヲ用レハ熱ヲ以テ熱ヲ治スル理アリトテ其本ヲ不知温薬ヲ用ルモノアリ人参養胃湯モ其ハ意ニテ多用ユル医アリ是ハ前ニ云假虚真実假実真虚假寒真熱假熱真寒ヲ不知モノナリ労役ノ虚症肌表大熱真寒ニ内寒アルユヘニ熱薬ヲ投シテ其温勢ニテ陽氣之浮散丹田ニ復シテ外熱去ル之内ノ寒タル所ヘ熱薬ヲ入レテ外ノ熱ヲ内ノ丹田ヘ呼カヘス意之内熱実シテアル処ヘ熱薬ヲ用ルハ実々之熱弥甚シテ死スルソ又云麻黄湯ヲ傷寒ニ初發ノ肌熱ニ用ルモ外ニ邪氣アルユヘニ内ヨリ温散ノ剤ヲシカケテ蒸セテ汗ヲ出ス意之裏表熱アルニ麻黄湯ヲ用レハ却テ熱ヲマシ衄血シ發汗シテ死スルト云テアルリ此等ノ道理ヲ以テ引合テ可知ソ發汗シテ死スル理ハ内熱ソ甚キニ熱薬ヲ用ルトキハ至極熱ツヨクナリテ苦悶シテ汗出ソレニツレテ真陽モ發シ浮散ノ真陽汗ニツレテ脱スルユヘニ死スルソ亡陽ト云ソ

卅 加減正氣散　飲食

一不換金ニ加藿砂タルソ不換金之所ニ詳ニ云述タソ食傷ニ輕重ヲ分テ可治ソ輕キニハ加減正氣散甚シキ腹痛心下塞不好按ハ枳実大黄湯ソ

一大便瀉調カヌルニヨキヿアリ

一食滞ニ永查ヲ加用ルヿアリ藿砂二味ノ加減ニテ用ルトキハ宿ニツ大ニ加テヨシ

一凡後咳ニ加好杏テヨキソ

世一　二陳湯　痰

一二陳湯ハ痰ノ主薬ソ回春ノ二陳ハ加減常ニツラシテ居ルヘシ虫積痰ソ三症胸胃支悪心或腹鳴ルソ同シモノユヘニマキルヽソ故ニ痰ニ痰ノ療治虫積ノ療治スル中ニ痰カ虫積カト心ヲ付ニアシライテヨシ

一二陳湯ノ本方スラリト腹痛不已ニ用ルコアリ

一ソ吉奴西ヲ加テ鬱痰ニヨシ或心虚痰鬱ノ症ニモサシ引シ用ルソ

一同連杏ノ三味ヲ加ヘテ痰ニテツカヘ熱アル症ニヨキソ咳ニモヨシ熱ニスル也虫積ニモヨシ傷寒ノ後熱残リツカユルニモヨシ竹茹ノ加減ハ養愚傳ソ

一合三味テ心虚痰鬱或悪心吐不已或産後吐逆ニヨキソ

一吐セント思フニハ二陳湯ノ本方ヲ度々用テ探吐スルト石探吐ハ鳥ノ羽或尾ヲ咽ヘ入テサクル如クスルト胸アシクナリテ吐スルソ

一好杏ニ永宿奴ヲ加テ冷痰ニ用ルコモアリ

一二陳湯ハ痰ノ標ヲ治スルソ六味丸ハ痰ノ本ヲ治スルソ六味丸ハ痰ヲ潤シ腎中ノ燥ヲ潤シ火ノ生セントスル処ヲ治スルソ惣テ気血痰ノ三ツニテ人ハ病ソト丹溪ノ語ソ痰ハ食ヨリ生スルソ予見ルニ食消化シテ津液トナリ粹ハ精トナリ次ハ津液トナリ血トナルソ血ハ津液ノ色ノ赤クナリタルナリ故ニ補腎補脾ト云ソ惣テ肥タル人食物ノ津液皆肉ニ滞ルナラハ日々肥大ナルヘキニ食吉又六七分ハ津液トナリ三四分穢濁ノ気ハ痰トナルソ気血令陰陽和平ナレハ痰ハ不滞シテ咳ニ出テ或セキハライニシテ痰出ルソ或風ヲ引テ咳出ルニヨツテサツハレテ出テ痰ニモ散シ尽ルソ痩人ハ燥クユヘニ痰ニモカハリソ故ニ樓貝或地黄丸或地黄ニテ潤スソ膠痰トテ久ク鬱滞シタル痰鳥モチノ如クナリテ箸ニテマキ出スコアリ中風又ハ癇症ナト吐痰スル時アルソ痰出ル時マキ出スヨシ婦人産後ニ癇ノ症発リテ搐搦シテ喘急今ニモ死スルカト思タルニ一口吐痰シメアトツマクユヘニ箸ニテヒタ物マキ出ニタレハ能ナリタメソ惣テ痰ハ熱ハツスソナルソ熱サメテ痰カタマレハ能切レテ出尽ルソ虚労ノ症ハ腎中ニ火アリテ痰ヲトクユヘニウスクナリテ津液ノ如クナルカ出ルソ故ニ津液上リテ痰トナルトアリ燥痰ハ楼貝ヲ以潤ソ湿痰ハ守星ヲ以燥スソ

、二陳ハ何レノ薬方中ヘモ多入レテアルソ痩人燥痰ニハ守ヲ貝ニカユルソ痰経絡ニ滞リ手足ニ滞リ痛或為核ハ竹瀝ニアラサレハ不達ソトアルソ左脇ニアル痰ニハ白芥子ニアラサレハ不退ソトアルソ竹茹ハ胸ノ煩ヲ涼スルソ痰火アリテ不眠ハ茹酸ヲ与レハ寝ルソ

、青柴奴兵ヲ加テ氣鬱或ハ虫積ニモ用ル劑ノ呑ヨキ剤ナルソ

卅二　枳實大黃湯　飲食　同將朴伭斗

、食傷腹痛欲吐不吐或吐而後腹痛不已或食滯心下按則痛惡心而欲吐者此方決テ的中スルソ俗ニ云食傷ト云ノ主剤ソ急ナル時ハ先淋出用之ソ吐シテモ腹痛ム中ハ食滯残ル心ソ脉ナキモアリ弱モアリ是ハ心下欝滯アリテノ按テ痛甚按ヲ不好ムカクヘスルニハ必用ルソ人不知之脉弱ニ恐テノ手ヌルキ療治スルユヘニ死スルソ典藥タナト用テ消ヒスルト云ハ緩ミトシタル時ノコソ急ニ欝滯メ攻ニ心下ルハ吐瀉セ子ハ死ソ奇妙ノ方ニ食滯腹痛ニハ主之先可用之医多不知此場皆々殺ルソ

玄治ノ秘ソ遅キ食傷ハ六三霍宿木香或ハ水車ニ食傷ノ腹痛シテ手足厥冷スルハ必此剤ソ

璟業ニ殘　不通ニ云　者ト續ヘニ　ニモ

、常腹痛虫痛疝氣ニモ大黃テ用大切アリ

、俄ニ脹滿シテ心下按痛ハ此剤ヲ用テ下シテ能コトアリ連ニ脹脉緩ニテサノミ不苦ハ虚冷ソ敷肬ソ

、大便不通ニモヨシ桃ヲ加ルソ

、同將湯ハ食傷ノ毎貝ニ用ルソ瀉アリテノモ腹痛惡心ニ下不好按ハ必用ソ脾胃ニテクレハ瀉自止ソ理中湯ハ虚ノ症ノ腹痛瀉ニ用ルソ虚ハ心下空虚好按ソ腹痛スレ圧天枢ノ左右ニアルソ腹モ滿テ柔カナルソ

卅三　香砂養胃湯　脾胃

一此劑ハ遅キ補ソハ解散ナトノ意ノ補少鬱滯アリテ弱キニヨキソ必竟胃口ノ冷痰ヲ和スルニ依テノ食ス丶ム意ソヒユヘ白豆蔻ノ大ニスルソ故ニ胃口ノヒラキ胃陽ニカヲ添ソ

一虚人腹痛ニ必用ソ虚人ノ腹痛ハ心下空虚好按或痛処ヲ按セハコラヨキト云或熱手心ヲ以熨セハ心ヨシト云ニ必用ソ

一心虚痰ニ鬱ノ虚症ニ必用ソ三味淋茱天香二陳湯ナト兼ルソ

一病後ノ調理ニ第一用テヨキソ大病後熱モ去リソロく補シト云脾ニヨキソ

一大便瀉シ易キ症ノ脾胃ヲ調ルニヨキソ必用ソ痢後熱モ去リソ大便モ昼夜五

●七行ニナル氏用テヨシ症ハ黄蓍不來中ハ人参不宜ソ但ソレ氏ニ強ク草臥レハ主方々ニ少ツヽ入ルヽソ

卅四　行氣香蘇散　雜症

一氣惱ニ食ヲ挾ニ用ルト云カ主ソ一ヒ氣鬱滯シテツカヘ食ナトツカユルニ玄ノ用ソ

一胸脇イタムニモヨシ脊中ナト痛ムニ玄ノ合ニ陳用ルヿ右

一疝氣攣痛ニ加我削青茴木ヨシ疝氣ユヘニ瘇氣脹滿スルニハ加車通灯心行言。

一積聚ノ症氣ナトアル症ハ引ツルニモ吉一手足シヒレ痛ムニ疝気或気鬱滯メ經絡ヿ。

一腹痛ニモヨキヿアリ　一久瀉アトニ残ルカ好キトヲ云ニスラリト順ノヨキヿモアリ
一頭痛ニモヨシ何ヿモ鬱滞ヨリ發リタルト云カ曰アテノ燥剤ソ

卅五　香蘇散　風　雜症

一風ノ引テ茶ヲ用ルカ不用カト云位ノニ用ル剤ソ
一前医地黄人参ナト或温補メ久ク不愈ツカユルニ用テ功ヲ立タルヿ有
一必竟アシウイ茶ノ主方ソ此剤ニ加減シ或他茶ニ合シテ用ル茶ソ
一芎芷ヲ加猩キ頭痛ニ用ソ又ハ何トメモ頭ニ痛止ヌニヨキヿアリ

卅六　人参敗毒散　去参常ニ用　風　雜症

一風邪寒熱頭痛アル氏ノ主方ソ虚人ニ人参用ルヿアリ加蘇葛
唐蒼ノ能汗ヲ出スソ羌独唐ヲ用テヨキソ熱アルニハ加芩敗毒
ニテ不効ハ十神湯ニ加紫空熱ヨク去ルソ此ニ方用テ餘熱不解内熱ヲ
ホト強ク熱痛ニナラント思ハ其肢清解湯必用ルソ世医此時ニ小柴胡ヲ
用ソ大ニ毛敗毒十神清解ト用テ小柴胡ニ加減メ用其後大便モ不通内
熱アリ心下鬱滞不好按瀉アリテモ大柴胡ソ此方順ナルヨキ治法ソ吊ハ常ノ如此ヘ勇
一痢痛ノ初発ニ茄連用ルソ疫利ノ主方ソ禁口痢ニ加陳蒼朮テ用ルソ
一痛風ノ如ソ手足一身ニ痛ムニモ用ソ風毒ニモ用ルソ

一足腫痛ニ加蒼將テ妙アリ四脚ノ氣門ニアリ吊常ニ大功ヲ得ルソ
一膝瘡ニヨキソ久不已ニ常ニ用テ妙ヲ立タリ
一腰痛不愈ニ加薏膝妙ヲ立タリ是ハ風邪滞リテ久不退腰痛ニヨキソ
風湿ヲ兼ハ加蒼　唐　音アリ
一瘟疹ノ初発毒氣ツヨキニ合消毒飲或ハ射カ用ルヿ多シ或合并ノ葛根湯
一腹痛不止ニ用テ功ヲ得タルヿアリ吊此理ヲ若ルニ瓜疹ナトノ滞リニテ腹痛モ
或血ナト鬱滞メハライタムニヨキソ必竟散シ行スユヘソ
一気鬱ニモヨシ木香ナト加テ順スルソ
一此剤ハアツコフニ氣血鬱滞メ経絡不順ナル実症ニヨキト可知ソ散シ行スソ
一久浮ニ用テヨキヿモアリ是モ散シ和スル意ソ風湿ニ限ラス何ニテモホトクヿ意ソ
一井上専菴ト云医アリヤレハフラ〳〵シメル症ノ実シタルニハ先何ニテモ用ルソ見
角何ニテモムスホレタルヲホトク意ニ用ルト云タリ
一眼目アカク血ヲ多タルニ加艾云芩或芩連將ヲ加テ用ルヿモアリ或柴胡ヲ飯湯モ宜ソ
一下血ニモ用ルソ腸胃ノ風ヲ去ルユヘソ芍酒梔ナト加或芩一味或芍ヲソユルヿモアリ
一痔ノ痛ニモ同シ加減ソ　一毒虫ニサヽレ痛或鼠ニクハレ或蛇ニサヽレタルニ必用ルソ
一耳ノ痛ニ加芥リ扉空射用ルヿ有　一脊中痛ニ合陳用ルカ大附腰ヲ順スルハ氣活

一漆瘡ニヨロシ惣テ俗草氣ト云及瘡或一身ニ瘡出或楊梅瘡癰疽ノ初発ニアレハ芩
ヲ加或升葛或合消毒飲或合驅風解毒湯用ルソ
一咽痛ニ合驅風解毒湯ヨキソ
一風疹出没ニ加葛云力或蟬用ルソ是ハ鬱血アリテ風温（湿）ニ誘テ外ニ出テ痒クカキク
テ外ヘ不見寸ハ悪心腹痛スルニ散シテヨキソ大力子ハ消毒スルソ惣テ消毒スルト
云意ハ熱アリテ悪血滞ルユヘニ咽痛或腹痛スルソ大力子ヨキ道理ハ血瘡門ニ
モ其意アリ保元ニ大力子又能胃口ノ瘀血ヲ去ルトアリ以是可知ソ毒氣ニテ咽痛
或腹痛スルト云本ヲ知ラヌハ不詳ソコヲ考テ好之
一小便不通咽下ニシコリアリテ金匱腎氣丸煎湯益氣其外用テ不效服加白芷用テ
置テ通ジタルヿアリ井上専菴治之是モホトキバツト散スル意ソ血崩止カ子帯下
ナトニモ用ルモバツトチケテ氣ヲ散スルユヘニヨキヿアリ必理ニアラス色々治シテ
モ無功時ニ此心得ニテ妙ヲ得タルヿアリ
一吐ニカヌル服用テ探吐スル二陳湯ノ意ヲ以用ルモヨキソ
一胸ナト痛色々ノ治法シテ後ニヤルセニ用テ奇有是モ散和ノ意ソ
一消児多發焉ニ加天台烏薬用ルソ　一小児小瘡出瀉木トアルニ加木丁用ルソ加味五香ノ類キ之意ヲ
一股横又処俗イヌコ処ト云々股ノ小核常ニアル処腫テ寒熱アルニヨキソ行氣

餘

香ソ散モ用ルヿアリ行氣香ソ散ニ莪削青通茴木ニ疝氣ノ加減ソ
一乳ニシコリ痛寒熱ニモ用ルソ行氣香ソ散ノ本方又ハ去ニノ倍シ姜用ルヿモアリ

卅七　荊芥敗毒散　　雜症

一癰疽小瘡初發ニ世医必用ソ太熱レ𪜈癰疽初發腫痛ニハヌルキソ芩連消毒
飲ヨロシ熱ノ淫重ニヨツテ芩一味ニテモヨク去連テ用ルソ熱強クハ二味𪜈ニ入ルヘソ
一眼目赤痛ニハ此剤ヨキソ或芩連ノ類加減ニシ或柴胡弓敗湯ソ

卅八　消毒散　　痘疹　諸瘡　　加犀角（无芩連）犀角消毒飲

一消毒ト云ハ前ニ云如ク熱悪血ヲ以シテ咽喉ニ滞リ或心下ヲ攻或腹痛スルソレニ用ル主方ソ
一痘疹毒氣アルハ咽痛ノ腹痛スルソ或ニ悪心嘔吐スルニ此剤ソ毒氣裏ヘ入タルハ木香
散十二味異功散ニテ温メテ外ヘ発スルソ但回水黄貫膿ノ時ハリ出シ弱毒氣内ニ
伏スルニ木香散十二味異功散ソ消毒飲ハ欲出或漸出回水ニテノ中ニ多ハ用ル剤
ソ黄膿シテハ内ノ毒外ヘ出タル之出不尽ニシテ内ニ伏スルハ虚也故ニ消毒飲ハ不
用ソ痘ハ七日以前ハ内ヨリ外ヘ出ルヿ七日以後ハ出尽スルニヨツテ内虚スルソ収
靨ノ後ハ又消毒飲ヲ用ルヿアリ是ハ餘毒ニ用ユルソ発熱出痘果貫膿収
靨三五ノ十五日ニ発シテ収ルソ十六日以後ハ餘毒ト云ソ
一痘ノ順ト云ハ三日見熱強ソニテサムル比ヨリ少ツヽ紅点見四日ノ朝サメテ食ニ出五

六日ニ出尽ニシ六日ノ夕ヨリ水ウミ少ツヽカヽリ七八日ニ回水ト云テ水ウミヨリ本ウミニカヽリ九日ニ十八分ニ満チテ一十二三本膿収ルソ十日ノ晩方ヨリ初出タル痘少乾キ十一日メニ漸乾キテ十二日ニ面漸収ル比手ノ痘ハリ黄色ヨリテ足ノ痘ハレテ乾クヲ順トスルソ十日ニ面乾クハ少早ケレ𪜈手弥ハリテ痛ムハ順ソ十三四五日ニスキリト結痂スルソ

痘始出如順痘而後貫膿不快者有

一痘出ル時紅点不細漸出痘大ニシテハツトシタル状アルハ貫膿ノ時不尖而膿平ニシテ皮ノ下ニ一膿アリテ収靨スル時夕ハシル出牛足不快発者大虚ニ不以温補則不可治此格ノ痘出痘ノ時不多ヤフニ見ヘレ𪜈回水ノ比ヨリ頭粒無ヒラ弁ヘニ隣ノ痘トヒトツヒラニ面一面ニナルナリ如此則出痘ノ時ヨリ其ハ赤シ知テ頭粒ノツホツトナキハ弱シト可知毒気回水ノ時ニ快発セヌユヘニ貫膿ノ時腹痛嘔吐或泄瀉而死此痘ハ不多トイヘ𪜈ヒラ弁ヘニ多ナルト可知痘ノ出ルヿ不多弁ヘニ始推ソ思フ者ソ不可推之

死症

一痘出ル不分地見黒色ナルハ決而死黒気始ハ手フリノ如クナル様或面中地蒼黒帯状アリ

一痘皮ウスク面ツブリ破リ痒ク泄瀉必咬牙不絶シテ死始痘嬌トアルハ沙ウツクシクヽト

一ヤカニヨハソヘト見ヘル状ヘ痘ハヤカニテ手見エル分ヨキソ大夫ナル者ハイヤミ手状ヘ

一貫膿ノ時靨前日ヨリ面腫腹痛泄瀉嘔吐ハ死微則十二味異功散間々効有甚者薬不及

一吐血便血尿血必死不可治

順靨倒靨之弁

一発熱ヨリカソヘテ軽キハ十日之晩収ヨルソ重キハ十一日夕十二日ニ収ルソ順ニカセルハ面ノ痘黄ハ蝋色也蒼蝋色而アメ色ニナルハ上ヲカセ之痘能膿ニカセル前ニウミニアマリ出テカタマリ雛ノフンノナリニ靨ヲ雛屎堆ト云カセ之中ノカセ之トギ合テモチノ如クヒラニカタマリニカセルハ下也上カセモ膿ノ色也蒼蝋色アリテトチ合シツフリトナル也是上中下次第ハアル𪜈先也面少収ル時手能膿テ後足腫也是足順也

倒靨

一九日ノ夕面収ル如クニテ手足モ共ニ乾クハ不治是倒靨ニ

一九日或十日之朝痘ヨリニノ水出テ手足不脹痒者倒靨也

一十日十一日欲収発熱而手足一肢ニ収ルハ倒靨之不治

声唖

一声唖ハ毒在肺之或咽喉ニ多完者声カルヽ之発熱ヨリ九日十日比ニ声潤出食進ハ十日十一日ヨリ連々ニ声唖食減スルハ不治

有三四五日六日之間不快発而死者之弁

一発熱三日之間驚風甚発無當而熱甚心胸如烙脈数無力及汗者不出而死

痘漏ト別書。

一三四日痘出ルトイヘ氏黒色也上文或黒点見譫言煩悶是毒気発セス本因虚故発麻必窮百之一ノ為温補則有可生之理脈弱者清熱而不治之加味五香湯ヲ用テ救ル
コアリテ之見ス小瘡内ニコモリタル氏用テ発出シタル事常ニアルユヘニ吾人未言ト
イヘ氏理アリト思テ用テ功ヲ得タリ

痘状知虚

一尖ハ陽気ノ精一阳気弱則平之トカラサル処元（元）阳既（既）易後テ血熱アリトイヘ氏清熱シテ不易治死此清熱ノ中ニ阳気ヲ助クル心得肝要ソ故ニ根元ノ阳気ノ虚シタルユヘニ未ノ尖ヲサマシテモ元気不續之此理ノ活幼心法ニ云格言之

一痘ノ状阳気満則○如此尖処潤根ウス赤（赤）キツ根ノウス赤キハ気血相守之毒ナリハ血之滋蔭降大過ニ（ツ）アタ（合）中ニ気血ノ多クタリツツリノ処ニ是ヲ引出シタリ可参考ナリ

一額ノ色ウス色也ナルハ無血色也白色之多（タ）ル痘ノ類ノ色ウスキ（ウスキハ）阳気弱ソシテムツカシキツ

一痘ノ治法四聖寿世保元痘疹世医心法此治法婦具活幼心法ノ論モ可参考

痘漏

一痘漏ト云ハ痘瘡ノ七八日之回水ノ満日貫膿初日比ニ痘ノカサ膿（脹也）アカラス平ニ柔ニテ痘ヨリ水出ルヲ痘漏ト云夫而死症ニ回水ノ水カ膿ニ化スル事ナラヌユヘニ痘漏スルユヘニ痒クカキ破リタルアト皮無之タ（タレ）レタル如クニコハマリ額ノ痘ハ柔ニヒラメ

ニナリテ苦悶スルハ死症也前ニモ云雞屎堆ハ毎貫膿十分ニ満蒼蠟色ニテ痘ノ上ヘハリ出ルウニカタマリテノ雞ノ屎ノナリニナルソ初心ノ良痘ニ漏カト思テ久クヲ倍セシト云者アル　雞屎堆ハ少ルシカラ双（双）トニ云事ヲ不知ユヘナリ

出痘初日

一痘紅点ハラクト大粒ニ出ルハ不多シテ吉也赤ニ濃ク物ニカマシタル様ナル毒甚ヒ出ル事多シ必凶或コニカニテ地級ヲハカタヌモ凶也多ク出レ氏痘ノ状シツコリノトスルハ可治出ル時ハツト取シマミラヌ様ナル紅点ハ虚也ハツトスルハ陽虚也出ル氏額ノ色ウスキモ阳虚也多ク（則）ニテ額ノ色ウスキハ治スルトイヘ氏温補不応ハ不治ソ

回水貫膿

一水ウミト云ソ回水ノ色白ニ圓テ不過灰色也ナルハ大虚ナリ此時皮ウスク見ユルハ後必痘漏トナルソ此時大ニ可補陽

一回水之時水不満ヲ空痘ト云ソ空痘多キハ収靨ノ時尤甚凶而一時ニ倒靨スルソ気血ノ大虚也十全大補湯帰茸湯或肉托散ニ人乳好酒ナト加ル治法ソ多ハ難治ト心得テ可考

貫膿収靨

一痘熱ヨリ十日之夕面少ノ収十一日之夕或収ル状アリテ痘ニコクトカタマルソ面

収恐ナルトキノ膿ヨクマハリ腫テ後足能貫膿スルヲ順トスルソ九日ノ夕乾ハ逆
倒靨ヲ面収リ意ニナルトキ色モ潤食少〻多ナルハ順也是ト違ハ不治也愈テ瘡
ノ治法ハ出痘ノ状ヲ見テ貫膿ノ形如何ト考ヘ知リ回水ノ形ヲ見テ収靨ノ事
ヲ不知則皆誤治ヲ

一消毒飲疹ノ初発ニ柴胡弓飯湯ニ合葛根湯加芩或芩連消毒飲ヲ用ルソ
疹ハ血中ニ風寒ヘ入テ血熱アルユヘニ出ルソ故ニ血液ヲ乾燥スルソ消毒清熱シテ
疹セハ尽ニスソ三四日ニテ不出処ヘアトカラ出尽ス肢其中ニ血熱ノ様子ヲ見テ四
物湯ヲ主トシテヨシ疹流行トキハ寿世保元麻疹之部ノ治法ヲ能考テ可治
疹ノ不食ハ四物湯ニ加減スルソ温剤ニテハ必不進ナリ血熱ハ動テ津液カハクユヘニ
不食スルト見ヘタリ吃吐ニ四物湯ニ合黄連解毒湯用ルヿモアリ初発ニ発狂ハ甚防
凡通聖散ヲ用ルヿモアルソ柴胡弓飯湯ニ加減シテ用ルカ第一ノ心得ソ

一女子十四腹痛数治無効予与消毒飲而痛止後胸腹如小瘡物出安

一消毒スルト云薬ハ大力子射干玄参犀角ソ

一常ノ風ヲ引テ咽痛ムニ大力子ヲ必加テヨシ或合消毒飲ソ

　卅九　駆風解毒湯　風　咽喉

一玄治ノ秘方ソ十三方ノ中ソ喉痺ト云テヨシ咽喉腫痛湯薬通ミカヌル肢大カニシ
ヲ大ニ加ヘ射干ヲ加テ無理ニ呑下又中ニ自和スルソ咽腫退カ子ハ肩ノ中ニ紫点アラハ見
テ針ニテホリ出血シテヨシ少商ノ穴ヲサシテ血ヲ出シテヨキトアリ少商ノ穴ハ大指ノ外側
爪甲ヲ少シ去ル処ソコヨリ三アマキニテ小刀ノ尖ニテツキ血ヲニシホリ出シテヨシ

一小瘡ノ房出来テ毒気抜テ咽痛ムニモ必用ソ消毒飲ニ加竟毒タル者ソ

　卅　芩連消毒飲　熱病　雑症

一凡熱咽通腫進有力ニヨシ及痛シ耳根ハルニヨシ面ハルニモヨシ軽キハ駆風解毒湯ヲ
用ルヿアリ駆風解毒湯ノ症ニ此剤ヲ用テヨキヿアリ

一此剤ハ寿世保元ノ方ソ回春瘟疫之部牛蒡芩連湯ノ軽キ剤ソ芩連消毒ニテ
不治ハ牛蒡芩連湯防風通聖散ト心ヲ付ヘキソ

一熱病ノ初発咽痛面腫レ耳根ハルニハ蝦蟇瘟ト云軽キハ芩連消毒飲胃熱多ハ牛
蒡芩連湯凡熱甚譫語言妄語或走則防風通聖散ソ

一瘟疹熱強ク出カ子或多出テ譫言或未出シテ熱ハヨキニ必用ソ

一楊梅瘡ノ餘毒身痛ムニモ加減シテヨキ剤ソ

一楊梅瘡久ニ発痛如烈甚則中上而如絶予芩連消毒飲ニ退虫散ヲ兼テ奇妙ニ安

一小瘡或瘡疱凡毒腫熱アリ毒気アルハ必用ルソ

一ヨヤ凡熱ノ症熱ニ渇ニモ十ナラシカト思ハ必此剤ヲ用テ奇効アリ常々用之

一凡毒腫ハ膿アルカ無カトヱフヿ見ニクキ者ソ見ツケレハ自手ニ入ルソ先痛凡ノ痛ニ紛ルハソ忘レ氏大形ハ三ケ処ニ定リテ痛ム処雖堪ソ大形ハ股内外ニ出来或肘ノ前後ニ出来ルソ臀　腰脊中肩（肩膊）ニ出来ルヿモアリムツクリトハレテ痛甚シテ肉ト筋トノ間ニウミアルソ外ニテ漬ルハ未ノヿソムツクリト腫アカルニ始テアトツクハ不膿ソムツクリトシタル処ヲ按スニ何ヤラククリテ入タル如クニ中ヨリハ手キカヘス意アル氏カ膿アルニ外料（科）ノ功者ナルニ見セテ心ヲ付返シ外料モ不功者ナルハ不知ソ故ニ此方ヨリ膿カ不膿ヲ知ルカ功者ノ医ソ此ニテキレタル痛アリ俗疝気トヱソ痛処雖堪シテ後ムツクリトハ按而アトツキニテ決而ウミタルト思ソ忘レ氏アトツク中ハ不膿ソトヱフヿヲ知ソサテ膿カ不膿カトヱ中ニソノ腫凝テカタキ意ニナルハ不膿者ソ疼塊或疝気ユヘニ節ト血トノミコリタルヤ又其ミコリ散シテ後如凡疹物出痒カリ是ヲ見レハ痛処ニ気聚リ衆行シテ凝タル也芩連消毒飲ヲ用テ散タルモアリ三和散追凡遍気散ニ加減シテ散タルモアリ不膿シテ散モノ多シ散ルモノヲ誤テ針スレハ膿不出シテムツカシクナルヿ多シケ様ナル処ノ肝要ヲ見覚ユレハ俗モ目ヲ驚スソ

〇別本ニ　十三

一小児ニ用ルモ同シ意ソ　一痛風ニ用テヨキヿアリ

〇膿カ不膿ヲ試ルニ常ノ打鍼ヲ打コムニ膿アルハ父ラリト通リ不膿ハ常ノ処ニ打ト同シ手心ニテ知ルヽソ是亦ヨシ

四十一　八解散　諸虚　熱病　見于前此後補遺

一六君子ニ藿香厚朴ヲ加ヘタル者ソ故ニ凡邪ヲ去ルヿハヤウノヽ貴藿ノ二味ソ虚人少凡邪アルニ人参ヲ入用ルソ或ハ姜ナト加ルヿモアリ

一補中益気ハ君朮ヲ用キト思フ氏ニ人参不忘ヿモアルヘシツカユル程ニト思フ時ニ用ルソ

一傷寒ニ病後ニ用テヨシ逍遥散ヲ合テ用テヨキヿ

一補ト瀉ノ間ニ人参少入テ用和スル剤ソ前医重キ療治シタルアトナトニヨキソ

一瘧後ノ鞭生茶ニヨシ痢後ニモヨキヿアリ

一八解散香砂養胃湯ナトハ涯キ補薬也ト知ヘシニウキリトシタルヿハナラヌ氏医ノ工夫ヲ以テ涯キ剤ニテ重キ病ヲ治スルヿアリソレニ此両剤ソ

一傷寒汗下之後余熱衛（法）ニ補セント思フ氏涯ク用テ却テ食進出ハ後マテ用ツヘケテヨシ或初発凡寒ニ感シタル虚人脉モ不進気カ弱キニ人参ヲ入用ヨキヿアリ

四十二　十神湯　風　熱病

一汗ヲ発スルニヨシ敗毒ニ毒ヲ用テ汗出カヌルニ此剤ニ麻黄ヲ少多入テ用テヨシ前ニ云如ク敗毒十神清解ト比テ用テヨシ初ヨリ十神ヲ用ルヿヨシ久ハ柴苓湯姜ナト加ルヿモアリ

一寒熱頭痛身痛腰足タルキハ表ニ風寒アル也芩連ノ加減ハ不宜内
熱ノナキニ芩連ヲ加レハ汗不出シテ表ニ邪ノアル中ハ敗毒十神トリカヘテ用ヨ若
内熱モ有ト見ヘハ柴芩加ル咽痛ハ加力或芩連消毒飲ニ去連テ用ルニ咳アル好杏扁ソ

四十三　香葛湯　風　十神湯ノ去上ノ加唐蒼

一十神湯ノ涯キ者ソ上ノ何蒼君ニカヘタル也、和ノ蒼ヲ用テハ香葛湯ノ意ニテハナキソ凡
湿ヲ散スル故ニ唐蒼君ヲ入ルソ十神湯ニテ汗出カヌルニ香葛湯ノヨキヿモアリ湿多
交ルユヘト見ヘタリ或ハ香葛湯ニ麻黄ヲ入テモヨシ上ノ蒼君ノ二味能汗ヲ出スソ

四十四　清解湯　風熱

一敗毒草神ノ属ヲ用テ経中餘熱未散口乾脉数熱病ニナルヘキト思フトキ此剤決而
可也世医此剤ノ意ヲ不知小柴胡ヘカハルソコテ小柴胡ノ湯ニモアラヌユヘフラ〳〵シテ熱モ
不退也裏ヘ入ルソ穏テ小柴胡ノ本方ノ意ハ和解ニテ表邪中ニアルトキニ用ル芽ミテハ
ハソキリトキカヌ芽ソ清解湯ヲ用テ熱不退ハ小柴胡連雷ナト加心下按メ痛不好
按ハ合小兼気ニテ用ルソ

一予此剤ヲツカイ知テ風熱汗出不解熱病ニナリカヽリタル病人ヘ多治シタリ

四十五　芎蘇散　十味風

一風邪ス痛鼻塞悪寒敗毒十神ヨリ軽キニ用起テ居テ凡邪感シタルト云ニ
ヨシ少冷熱モアルニヨキソ

一咳アレハ好杏内ヲ加ルソ

四十六　升麻葛根湯　熱病　痘疹

一痘疹ノ初発熱アルニ用テヨキソ弱キ症ノ痘色淡キニハアシキソ実熱ノ状ニ用
痘実症ニハ七日中加減シテ用テアリ上痘疹世医忘法ヲ可見凡痘症ニハヨキソ

一痘行点見ヘテカラハ忌トアルユヘニ此語ニヨヒ用カヌルソ不太内熱ソヨク紅
点アカク血中熱アルト見レハ出痘ノ中ニモ加減シテ用ルソ

一此剤ハ清凡熱ニハヌルク発散ニハ茉気凡涼ナルユヘニ後シ血中ノ凡熱ヲ清
スルトニ云カ此意也胃中ノ熱モ清フスルソ

一痘疹初発ニハ柴胡弓飯湯ニ沙多入弱キニハ人多少入テヨシ升上ノ葛根
湯ハヌルキソ敗毒ニ合シテ用テヨシ

一熱病口渇半表半裏衝内ヘモ入タルカト云眼ニ加雷梢テ神アルヿア
リ汗下ノ後ニモ此意ヲ以テ用

一小柴胡ニ合セニノ小柴胡ノ場ニモ用ルソ其時ハ清解湯ヨシ

一黄連解毒湯ヲ合シテ清熱スルヿアリ是モ汗下ノ後ニナリ

一腹痛ニ用テヨキヿ有タルト語ル者アリ是モ可知ソ

一胃熱腹痛或瘀血腹痛ナトニハ和シテヨキヿアル筈ソ
一眼病ニ加減シテ眼中ノ血ヲ清スルソ
四十七　前胡湯　四味　風　小兒　諸症

西葛考并

一小兒風熱ニ加柴ソ或貴ヲ加用テヨシ
一惣テ小兒熱アルニハ此劑ニ加減シテヨシ連ヲ加ルヿモアリ小兒流ノ和ノ
劑ノ出ナト兼ルハ青連ナト加ルヿモアリ
一吐乳シテ熱アルニ此劑ニ貴ヲ加テヨキヿ多シ　一男婦𪜈ニ軽キ風邪ニハ加減シテ用
一驚風搐搦甚及熱ノ取ナト発スルニ柴青連ヲ加テ清熱シテヨキヿ多シ
一風咳ニ好杏ソ吉ロシ加フ咳ニ吃加フノ
四十八　杏仁飲　十味　風喘　（方彙ニアル処ノ二ノ外ヤ杏仁飲ヤ）
一喘急ノ土エカナルユヘニ風痰ニヨキソ素喘痰アルモノハ猶以初発ニ用ユ喘ハ呼
吸ニ沈ヤカノト云カ喘痰ソ奴ヲ同ニカヘテ用
一初発風寒ニ感シ咳ニ痰ニ咽セリクトスルニ用テ必効アリ予常用之
一此剤ハ風寒ニ肺ニアリテ疾ニ多キヲ温散スル意ナルユヘニ熱アリトテモ芩ヲ入
ル意ニアラス本方ニテ好杏ヲ大ニシテ用テ見テ其上ニ内熱ヨクハ芩ヲ加ルソ
此劑風痰ノ初発ニ用咳喘不止ハ玄治十味ニ柴芩同ナト加用喘急ナラハ加
減瀉白散ニ好杏奴苓ナト加減枳實湯或六味丸ニ好杏酉栢或好杏宕ナト加
ル心得ヲスルソ
四十九　小柴胡合升ノ葛根湯　熱病
一清解湯ヨリ茱味スクナキユヘスラリト清熱シテヨキヿアリ故ニ小柴胡清
解湯ナト用ル井ハ此劑モ其中ニ用ルヿソト知テ参考スヘシ
一疹未発衝出ル時用テヨキソ清解湯モヨシ
五十　萬殊湯　雜症　十一味自得方　敗毒去弓合平胃
一此劑風寒濕ニ用ル主劑ニ合茱ニシテ置テ加減シタルヿアリ是モ一段ヨキソ
一汗ヲサセント思ヘハ加蒼唐熱アレハ芩ヲ加咳アレハ好杏ヲ加是ハ病人
多イツカレキ取合茱ニシテ加減メ吉ソ
一疫痢取合茱ニシテ加連或倍奴或桃或桃將ナト加ヘテ用ルヿアリ先初発ニ用テ
置テ滋滞ツヨクハ不換金ニ連奴ヲ加用ルソ或桃圭將芩卅ナト用スラリト利
スルヿモアリ太柴胡ニ去守加桃或連ヲ加ヘテ利スルヿモアリ痢ヲ下スニハ將
ヲ用テ衝和スレハ去將代奴テ用ルソ又滋滞アレハ將ヲ加ヘ又去ルソ久ク用ルハアシ
キソ傷寒ノ用ヤウトハ違ソ熱病ハ一応スレハ大柴胡大便快通スルニテハ用
ツヽケテヨシ太柴胡ト竹茹温胆湯ノ二剤ニテ初中後ヲ治スルヿアリ

然

一症ニヨリテ腹痛ニモヨシ湿痰ニモ散スルソ敗毒ノ意味ヲ以テ用ヘキソ他薬ヲ
用無寸効時ニ此ソ主方ニ加減シテ理ヲ得タルヿアリ井上専菴ハ常ニ敗毒ヲ
主トシテ加減シタル医也但是ハ和ノ羌独ヲツカイタソ然レ𪜈和唐
羌活独活ノ意ト違タルユヘニ予ハ唐ヲ用和ノ古流ハ大形和ヲツカイタル
ト見ヘタリ和ハ発汗或止痛ノ功ナモツカアナトアル者ハ凡味ヲイヤカルヿ
アリ其ハ眼ハヒカヘテ入タルカヨキソ
（田代云弘云和ノ真ハソ羌ニ湯ヲ二三返カケテ用ルニ唐ニ違フヿナシト云）
五十一　風喘方　九味喘湯　自得方（蘋吉貴永岩杏載今井）
一此剤ハ予カ主方ソ凡咳喘アリテ草臥脉不進或進無力心下ノ様ナモトコ
ヤラ弱ク見ヘハ用テ功アルソ必竟虚冷ナル処アリテ胸中痰ニ喘アリテ
凡寒ニ感シタルニ用ソ小児ニ此症多キソ
一咳嗽止カヌルニ用テヨキソ
一凡邪少アリテツカアテ虚冷ノ症ニヨキソ此剤応スル症ニ同苓テ奴楼十ト用レハメ
タクト草臥ソ故ニ脉無力ト心下ノヨワクテ腹フクレ顔色眼睛トコヤ
ラヨハキニヨキソ心ヲ付ヘキソ
五十二　九味羌活湯　風　熱病　六昏　胸中飽悶　加吉奴去蚘
一四時凡寒傷寒初発ニ用ルソコヲ敗毒十神清解ヲ常ニ用ルユヘニ羌活

湯ハ常多ク不用如何ナレハ生地アル故ニソレコリナリテ呑ニクカル人多シ然レ𪜈
血中モ熱アリテ敗毒十神ヨリハ熱以痛モツヨクハ用ヘシ
、頭痛寒熱脉数唇乾或舌亦乾クニハヨキ剤ソ無汗ニ用ソ麻黄湯ノ代リソ
、風疹或疹出熱以痛悪寒モアリ血熱モアリ汗モ出タラスハヨカラント思ニ用テヨキソ
、痛風身痛寒熱有ニハ痛風門ノ羌活湯ヨリハ吉ヿアリ
五十三　加減冲和湯　風　熱病　羌活湯去蒼加芪白朮十味ニ
、有汗悪風決而用ル剤ソ汗アリテ熱不解悪風コモ渇ルニヨキソ
、汗不止ハ芍薬ヲ加ルソ黄芪建中湯ヲ合スルソ桂枝湯ノ代ソ
一麻黄湯桂枝湯ハ仲景ノ方ハスルトナルニヨツテ東垣此二剤ヲ代ニ選ヒタソ
陶節菴加減麻黄湯桂枝湯ヲ用テヨキソ
一凡疹或疹ナト汗アリテ熱ハヨキニモヨシ
五十四　升麻発表湯　六昏　熱病即广黄湯自有加減法
一治冬ニ月正傷寒以痛発熱悪寒脊強脉浮緊無汗為表証此足太陽膀胱
経受邪當発汗以頭如斧劈身如火熾者宜用此湯
麻　官　中　杏　升　弓　止　羌　芸
本経発熱悪寒以痛無汗而喘者本方加葛去周ニ广発熱悪寒身体痛者

本方加蒼朮去杏、悪寒、発熱、身痒面赤者以其不得小汗出故之本方去杏周杏加柴朮　以痛発熱悪寒自心忿飽悶者本方加奴括　感寒深重服湯不作汗者宜再服至二三剤而汗不出者死　汗後不解者宜再服量証輕重用广固分多寡為當　水二鍾姜三片葱白二莖煎法加江西豆豉一撮煎之熱服取汗如神宜百子被覆首凡中病即止不得多服則反加別病矣

一此剤節菴之加減ノ麻黄湯ソ壽世保元ニ出タルカアリ汗サセントスル思フヘシ剤決而ヨキソ虚人ニハ心ヲ付ヘキソ十神湯羌活湯ヨキソ

五十五　疎邪實表湯　熱病　即桂枝湯自加減法

一治冬月正傷寒以痛発熱悪寒脊強脈浮緩自汗為表証此足太陽膀胱經受邪當宜是表散邪無汗者不可服　枝　芍　甘　芸　芎　羌　朮

如汗不止加芪　喘加柴杏　胸中飽悶加奴吉　水二鍾姜三片棗二枚煎法

加膠飴二匙煎之温服

一此剤有汗テ不解ニヨキソ六脅ニモ羌活湯冲和湯ハ春其秋ニ用テアリ升麻発表湯疎邪實表湯ハ冬月用テアリ寒気ノツヨキ時寒湿ナトアル時ハ秋冬春中ニモ可用

五十六　小柴胡湯　熱病　雑病

一傷寒ニ熱病ハ口苦舌乾嘔吐悪心舌白胎耳稍聾タルニ用テ和解スルソ譫語夜不眠ソ合升麻葛根湯或加雷連或合温旦湯　加連ソ

一ソ前ニ云如クナレハ前ニ先清解湯ヲ用テノ後之

一小柴胡湯ハハキ〳〵ト功ナキ者也故ニ是ハ和スル剤ト思フテ先用テ置テ心下ノ虚実ヲ見ルヘシ心下満而按痛不好按者ニ何程用テモ功ナキソ心下ノ鬱滞ヲ下サヌ中ハ熱解セサルソ故ニ大柴胡ヲ用又ハ小柴胡ニ承気ヲ合スルソ世医小柴ハ用ヨク大柴胡ハ用ニクキユヘニ大柴胡湯ニテラク〳〵ト小柴胡ヲ用ルユヘニ重々熱（一旦解ル）ソヨクナリテ死ルソ

一此剤節嘔吐悪心ツヨク心下按而塞リ按フヲ不好ニ大柴胡ソ切アリ且三味ニ柴葛危或連ヲ加用テ奇妙ニヨキ丁モアリ是ハ虫積或食或於心下ニ塞ルユヘニ凡熱サメカ子テコモルユヘニサラリト心下スキテ熱和シ食ヲ好ム者ソ是等ハ家秘也ウツカリト小柴胡大柴胡テナケレハナラヌト限ルヘカラス

一改正虫積嘔不多半表半裏ノ熱嘔之不止ハ石羔ニテ止ソコア此弁召残シタルカト覚ル仍改正又昏ニ此段ハアリコア入テ此間

一大便黒色ニテ溏スルハ瘀血アル故之ヘ後必辟血来テ熱去ル丁アリ腹少痛丁アリ大便ノ色ニ心ヲ付ヘシ堅キ大便ノ黒色十ルハ結シタルユヘソ黒シ溏スルハ血ノ久ク滞リテ君タルヘソレニハ桃仁奴ヲ加ヘテソロ〳〵ト瘀血ヲ順シタレニテモ熱不去譫言唇黒色脉大小不齊古焦黒燥ソハ桃仁承気湯ノ場ソ論トモヲ能考テ可与之三乙美

吾

気滞圭ヲ加ルヿモアリ大柴ニ桃圭加ルヿモアリ小兼気ルニ桃圭ニテ先用ルヿモアリ

一大便瀉スル者アリ秘スル者アリ瀉スルニ小柴胡用テ置テ心下按而痛不好按ハ大柴胡ニテ下セハ瀉自止ソ必竟熱アルユヘノ瀉ソ心下空虚好按而瀉スルハ虚也虚冷ノ症ニテ外ノ熱ハ假熱也是ハ舌モ柔也胃風湯ニ加減シ理中ニ加桂枝ヲ名桂枝人参湯

一小柴胡ハ肝火ヲ清スル主剤ニシテ加減スルソ

一淋病ニ加竜胆艸車決通梔虵半井家ノ秘也予常ニ去虵用之神功アリ血淋ニハ虵ヲ加ルソ

一痢疾熱アリ渋滞ニ加桃奴或加連用ルヿモアリ

一熱病下而後アハテヽ不可補之小柴胡ニ加減シテ見合セヨトアリ人参ヲ加テヨシ

一汗出不止ニ小柴胡ニ芍圭ヲ加ヨキヿアリ　一熱病口渇スルニ加雷黒ヨキヿアリ

一熱ツヨキニ小柴胡合黄連解毒湯スルヿアリ　一心下塞ルニ同連ヲ加テヨキソ

一多怒ルハ肝火之加青皮用ルヿアリ　痰アルハ二陳湯ヲ合スルソ　寡婦ナト熱アリツカヱルニ用

一風熱不退咳強キニ加桑白皮杏奴功アリ　一腰痛熱アルニ加芍ヨキヿアリ

五十七　加味小柴胡湯　熱病　加牡危

一血熱ニヨシ肝火ヲ涼スルソ　一瘀血ナトアリテ脇腹痛ニ熱アルニ桃圭ヲ加ヨキヿモ有

五十八　大柴胡湯　六味　熱病

一熱病六七八九日大便不通或大便一日三四行溏舌焦耳聾譫言吧吐アルニ必用ソ心下按メ痛不好按ニ必功アリ世医大柴胡此場ヲ不知ユヘニ熱連〻ニ強クナルソ先ニ云如ク十神湯羗活湯清解湯小柴胡大柴胡ト順ニ用ルソ三四日ノ中ニモ大柴胡ノ症アリ十三四五日之後ニモアリ兎角心下ノ虚実ヲ正シテ知ソ

一仲景全書ニ心下痞鞕大便溏泄ニ大柴胡ト桂枝人参湯ノ両剤ヲ出シテアリ論ニ下利心下痞鞕腹柔ニハ桂枝人参湯ヲ用ルトアリ心下痞鞕下利腹堅キニ大柴胡トアリ世医此論ヲ見シモ心下ノ虚実ト引クラヘヌユヘニ其理徹セヌソ腹柔ト古人今モ腹ノ虚実ヲ正ス心下ノ様子委ク手ヲ取ヤウニナキユヘニ知ヌソ予心下ノ虚実ヲ知タソ虚ハ心下空虚好按是ハ下サレヌソ心下痞鞕按而痛不好按シテ医ノ手ヲ退タカルハ大便瀉スルニ不拘下シテヨキソコヤ同症ニ補瀉剤ヲ出シタルハ何レノ処ヲ目アテトシテ或瀉シ或補スルソト工夫ヲ費シテ其格ヲ知リ定タリ

一男子年卌大便数行不利耳聾咳嗽呕吐瀉中黒毛アリ汗多而脉弱腹脹〻痛衝　絶食

臥而十七八日前医人参ヲ用不効予心下ヲ案スルニ痞鞕按而痛栝スイライヤガルユヘニ瀉劑ヲ投シ瀉止汗止自愈タリ後竹茹温胆湯ヲ以調理ヨシテ安其六妻又患同症耳聾譫語心下按而痛不好按大便秘不通大柴胡湯中後用テ後ニ奴ニカヘニノ食進出テ本復シタリ

一男年廿五歳十日脉虚微譫語耳聾全不食大便求ヒ瀉ス脉ヲ以則人参ヲ与ヘサレハナラヌ脉也此脉ニテハ必死ト思タリ然ルニ心下ヲ按セハ手ヲ取テ退ケイヤカツタリ或面ヲ皺テ不好按眼ヲ見ルニ外ハ皆クタヒレ弱キニ眼目ノツヤ眼飽ノ上下トコヤニヽウルハシク神色アリ仍大柴胡数服ヲ与ヘタレハ食スゝミ出テ本復シタリ

一痢病ニ加桃奴用ルヿアリ

當壯菴家方口解巻之上終