家方口解　中

k 8-2

F 2
カ－69

當壯菴口解中

一　桃仁承気湯　熱病
三　小承気湯三味　熱病　雑症
五　三乙承気湯（大承気湯加甘草生姜）　熱病
七　六順気湯　熱病
九　安心益志湯　熱病失正
十一　益元湯　熱病（保元名復元湯）
十三　仲景炙甘草湯名復脈湯　諸虚
十五　黄芪建中湯　諸虚　瘧　雑症
十七　竹茹温胆湯　熱病
十九　三和散　気　病気　雑症
廿一　五苓散（去桂名四苓散）　泄瀉　暑　雑症
廿三　胃苓湯　泄瀉　痢　腫脹
廿五　浄府湯　虫積　雑症
廿七　龍胆瀉肝湯　雑症　下疳
廿九　心虚ト痨瘵之主方

二　大承気湯加甘名三乙承気湯方　熱病
四　調胃承気湯三味　熱病
六　黄龍湯　熱病
八　瀉心導赤飲　熱病
十　調栄養衛湯　熱病（六去益気湯加減）
十二　六神通解散　熱病
十四　升陽散火湯　熱病
十六　湿瘖湯　熱病　雑症（七味則陳湯加茹同酸）
十八　三白湯　調理　雑症　方ノ（加竹名當飯三白湯入門）
廿　九味柴胡湯　結核　雑症　小児
廿二　柴苓湯　熱病　雑症
廿四　痢治法證驗
廿六　九味清脾湯　瘧　雑症
廿八　正気天香湯　心虚　痨瘵　雑症　気
三十　柴胡弓飯湯　風　瘧　痢

490.9
Ka-2
2
No. 2364
旧 K8-2
慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47. 年 7. 月 4 日
富士川文庫
1486

卅一 消咳湯 咳嗌 吐血
卅三 双和散 入門内傷七味
卅五 九味理中湯 喘急
卅七 柴故散 小児雑症
卅九 痛風羌活湯 丸 痛風 脚気
四十一 消疳湯 虫積 雑症
四十三 寶鑑瀉白散 喘咳
四十五 五積散 寒湿 婦人 雑症
四十七 十六味流気飲 瘰癧 雑症
四十九 清暑益気湯 暑熱痛
五十一 散火湯 腹痛或嘔吐之治
五十三 當飯飲子 入門疥癬門
以上五十四方也

卅二 滲湿湯 以唐蒼 中湿
卅四 藿香正気散 風 暑 湿 雑症
卅六 分気補心湯 膧脹
卅八 胃風湯 泄瀉 痢
四十 清心蓮子飲 白濁 遺精 諸虚 婦人帯下 雑症
四十二 啓脾丸或湯 脾胃 瀉泄 小児疳
四十四 木香順気散 胸痛 気 雑症
四十六 瓜蔞枳實湯 痰
四十八 加減温胆湯 中風之治
五十 抑肝扶脾湯 小児疳 虫積
五十二 防風通聖散 熱痛 雑症
五十四 犀角升麻湯 齗爛

當壯菴家方口解中巻 五

桃仁承気湯
三乙承気湯
安心益志湯
仲景炙甘艸湯
竹茹温胆湯
五苓散
浄府湯
心虚疹爵之主方
雙和散
柴胡散
消疳湯
五積散
清暑益気湯
當飯飲子

大承気湯
黄龍湯
調栄養衛湯
升陽散火湯
三白湯
柴苓湯
九味清脾湯
柴胡弓皈湯
藿香正気散
胃風湯
啓脾丸或湯
瓜蔞枳実湯
抑肝扶脾湯
犀角升麻湯 以上五十四方也

小承気湯
六順気湯
益元湯
黄耆建中湯
三和散
胃苓湯
龍膽瀉肝湯
清咳湯
九味理中湯
痛風羌活湯
寶鑑瀉白散
十六味流気飲
散火湯

調胃承気湯
瀉心導赤飲
六神通解散
温膽湯
九味柴胡湯
痢治法經驗
正気天香湯
滲湿湯
分気補心湯
清心蓮子飲
木香順気散
加減温胆湯
防風通聖散

一桃仁承気湯　熱病

一瘀血ノ症ハ桃仁承気ノ條下ノトヲリソ惣而瘀血ノアル熱病ハ能食スルヿアリ消穀易飢トアル通ソ或好忘狂人ノ如ク唇色微黒ニ脈大小不齊ソ濇脈状也芤脈ノ状モアリ芤ハ⊗按ス処中ニ脈弱指ノワキニ○如此如有力

一大便ニテ知ル先熱病ヲ見ル時大便ノヿヲ問ニ瀉スレハ其色ヲ問黄色ハ常ノ瀉也其中ニ黒ミシルク牛糞ヲマツ黒ニシタル様色點々ニ交ルカ或ハ不残黒ク溏スルハ瘀血之甚状少アリテ耳聾舌焦黒堅硬心下按乄痛不好按ハ桃仁承気湯之

一瘀血ノ格外ニハ見エ子𪜈舌焦黒堅硬心下痛不好按腹ノ左ニ附テ何ヤランコリ気物積ノ少柔ナル如クアリテ呕吐スルニ瘀血ノ症アルソ桃仁承気ヲ用テ呕止急ニ血ハ下ラナ𪜈呕吐止ニヨッテ食進ヨキヿアリ

一臍ヲメクリテ硬痛スルハイヨ〳〵瘀血也

一小便ハ通スレ𪜈臍下張リテ痛モ瘀血ニ

一未下ノ時瘀血来ルハ命ントスル也不可下トアリ是ハソロ〳〵ト瘀血尽ルヤウニ八物湯ニ桃奴危又ハ胃風湯ニ桃奴芩危ノ加減ニテ用ユルソ

一瘀血数升下リテ歯ヲノヒニハリ色蒼君ク唇ノ白キハ安神散独参ヲ急ニ用ユルソ血ニツレテ元陽脱スルソ医按ニ云ナラハ血脱益気古人ノ法ト云ヿ

ソ或陽長則陰長ノ理ソ必竟ノ手進近キ理ハ下血スルニツレテ気力脱スルユヘニ脈欲絶今死スルカト云ヤウニナル其脈ハ脈静ニ虚微ナルカヨキソ洪数ハ不治ソ補ノ湯ソ独参ヲ兼ルソ

一脈洪数ニテ瘀血来テ後脈同熱ハ下血不止如死悶乱シテ死スルヲ黄連解毒湯ニ合四物湯用ユル湯ソ

一瘀血アル症ハ咳スニ血来リテモクルシカラヌソ虚労ノ咳ノ血トハ違ソ

一心下ノ虚実外ノ心得モ承気湯ノ心得ト同シヿソ

一痢病流行後重血痢腹痛ニヨキソ

一常ノ瘀血ヲ行ラスニハ芒硝用ユルソ瘀血渾下リテ草臥ルハ八物湯ヨキソ

二大承気湯　加減承気湯　熱病

一耳聾舌焦堅硬或不能出舌アチナタコナタヘ身ヲ轉シ手ヲ揚足ヲ擲無死脈カサアリテ不進心下按而痛按則皺面不進近手ハ必此湯ソ脈虚微カハクルシカラス多ハ生ソ死スルハ脈虚数撮空又汗ハ心下不好按トイヘ𪜈大承気ノ脈節ヲソンシ実極而虚故補則実熱却増瀉則元気弥虚故死

一大承気ヲ用ルヨリハ三一承気湯ヨキソ舌甚ヒ乾燥スルハ六味丸料ニ當白ヲ加ニノ兼用ニテヨキヿアリ

一久病ヲ治スルハ此場ヲトクトミテ子ハ補ノ場ヲアヤマルソ世医多此場ニ独参湯ヲ用ソ

一予ガ此場ニ度々出會テ心下按四層ヲ皺メ按ヲイヤカルトキハ必用テ神功ヲ得タリ

一独参湯ハ味九煎ヲ用ユル場ハ心下空エ扁按ヲ好ミ不痛或ハ痛ト云ヘ𪜈按ハ快ソ覚ユルソ三乙承気ノ場ト同シ只ハ心下ノ虚実ニアルソ

一理中湯独参々附ノ場モ同シ心下弱ク脉ト心下ト共ニ弱キ加大補湯ノ場ソ又十全大補湯或生脉散並連ヲ加用ユルヿモアリ虚実ノ岐医ノ大功ヲナスヿ或名ヲ得ル場此段ソ

一三乙承気ヲ用テ生タルヲ見ルニトコヤラニツヤ実シタル処残リテ神気未絶処アリ神気不絶ユヘニ脉虚微ナレ𪜈心下実スルソ脉緩ノ状アルハ决而生

一此場死症ハ撮空揗衣摸床脉虚数頭汗遺尿スルソ是ハ死症之

一遺尿アルニモ手足静ナルハ生タルモアリ三度取ハスシテ尿スルヿアリ脉虚数或細数ハ不治之

一薬ヲ服用中ニトコヤラ潤見ユルハ大棗三貼ヲ用ユレ𪜈コタヘ又ハ不治ソレ𪜈心下不和中ハ用テミルソ二十ノ一心下和スレハ吉出シヨソナリニトコロラ能ヿヲミルソ（一本吉）

一三乙承気湯　独参　参附　連理中湯　十全大補湯　防風通聖散　桃仁承気湯（生脉散加連）
大柴胡湯　四物湯　参芪　朮　貴　門　雷　熟附子　参連湯　八味丸煎
六味丸加　雷　百煎　三味柴葛　危　（或三味淋芋）　中暑人参白虎湯黄龍湯
六ニ順気散　何レモ久病ノ重キ死ントスル𪜈起死回生ノ功アル秘方之　石羔ハ渇スルト云カ目アニ之四日久ト云ヲメアテニテ又用ルソ心下ノ実ヲ見ルナレハ面ノ神色ニツヤアル処アレハ胸膈ヲヒラキ下ヌ陰陽交泰ノ通路ヲアケテレハ脉カサ出実滑数ニテルヲ心下弱脉モ弱キハ神湯之参附地黄ハノ力ヲ以テ助タルソ前ニ云死症具レハ不治リ

三小承氣湯　三味　久病　雑病症

一是ハ大承気ノ場ニテラヌ前ニ用ユルソ故ニ小柴胡ニ合シ升麻葛根湯ニ合シテ用ユルヿアリ

一サソニ久病ニモ不甚心下胃滞シテ不好按者ニ用ユルソ

一芒硝一味入レハ堅ヲ耎ニシテ潤シ下シ極熱ヲ清スル故ニ小承気ノ下ス力一倍ニナルソ

一此剤ハ前ニ云如ク小柴胡ニ合シテ大柴胡ヲ用又ハ是ヲ用ユルト云ニ功アリ

一常ノ病人大便結通シカヌルニ加桃用ユルソ

一食傷腹痛ニモ用テヨキソ

一其外ノ腹痛大便結スルニ吾大便瀉スレ𪜈如滞下ルト云ニハ用テヨシ

一小児不鬱滞アリテ大便ヲ下サント思ハヽ三モ吉ソ前胡湯ニ合シテヨシ高ヲ奴カ今ニ吉ソ

四 調胃承気湯 三味 熱病

一三手是ハ不用三乙承気湯ヲ用テ功ヲ知ル物ニテ三乙承気湯ヲヨキト云ヿアリ其サヲ入ルヘニ調胃ノ名アルト云ヿ之

五 三乙承気湯 （大承気湯加甘草生姜） 熱病

一此三乙承気湯熱病ヲ下ス決全吉ト知タリ六一順気湯ヨリハ功速之承気ノ一ツ名ニアリ

（浅井幸甫先年曰黄龍湯小柴胡湯也）

六 黄龍湯 熱病

一是瀉スル熱病ニ用テアリ心下不好按ニ用ユ三乙承気ト思ヘ圧上ヨヤラニ少弱キ処アレハ人参ヲ力ニシテ用ユルソ予度々功ヲエタリ

一大便瀉スルトイヘ圧心下実セハ三乙承気ヨシ大柴胡ヲ先用テ見テモヨキソ

一瀉スルニ泥テ人参ヲ倍加セント思フハアシキソ心下ノ実ヲステ人参ヲ去ルソ

七 六一順気湯 熱病 （大柴胡加芒硝 一）

一三乙承気湯ヨリハ芒硝加也六一順気湯四五貼ヲ用テ不効三乙承気ヲ用テ功ヲ収タルヿアルユヘニ予ハ三乙承気ヲ好タソ

一痢病熱強ク裏急後重ニモ一二貼用テ利スルヿアリ

一大柴胡湯ヲ用テソレヨリ六一順気湯ヲ用後ニ三乙承気ヲ用ソレヨリ大黄ヲ去テ用後ハ

小柴胡ニ小承気ヲ合シ人参ヲ加テ次第ヲ如此ニ用ユル症モ有

八 瀉心導赤飲 熱病 （白茯門冬参犀黄芩連甘姜棗）

一熱病不語ノ主方ソ或條下次第ヲ考テ可用之必竟熱入心下ト云ヲ目アテヽ用ユルソ熱心ニ入レハ食スレ圧味ヲ忘ルニ依テ病体ヨリ食ヲヨキト云ヿアリ夢幻ノヤウニ食スルハ多リニナラヌソ大ジレ圧食多ニ随テ外ヲ悪疽賊シ気カヨクナルハ食ヿ津液トルシ潤ニナル処アリ能食スレ圧カラ日ヽ労リ連ヽ無性ニナルハヤクニ立又食労症ノ食ト同シ熱ノ譫語ハトコヤラニ心脱シタル格アリテ熱アル中ニモ弱キ譫語ソ不語ト云モ心ニ熱アル故ソ不語ニニツアリ大承気ノ不語ハ舌焦黒堅硬ニテ舌ヿハラヌユヘノ不語ソ心熱ノハ舌ハサノミ不堅硬舌モ出セ圧口ハ不語ヲスルソ傷寒論ニ心ハ主血々ハ水之心者舎神々如魚々水中熱甚則魚驚躍ト云リ以是思熱ノ格可知心ノ神ウロクスル譫語ハ常ノ譫語圧遠フ処アリ故ニ睡中独語シトアルソロノ中ヘ食ヲ入ルレハ魚鳥ヲ食スルヤウナルヿヲ云ハ心ニ知覚スルヿ少モ常ノ譫語モトテモナキヿハイヘ圧又シッカリト知覚シタルヨキ処アリテ又ウツラ〳〵ト云是ハ必覚熱中ニトロ〳〵ト睡ル中ニ夢ヲ見テ云ニシッカリト呼サマセハ（和知若）又タシカナル処アル力常ノ熱ノ譫語ハ心虚而熱入タルハ全ク本心ナクテ不苦知処ッタク〳〵ソハ譫語ノ中ニ酔タル如ク面白ソウニ拍々ニヨク〳〵ト笑者ソ後ハ模床循衣撮空

遺尿脉数無力而頭汗出死スルソ
九安神益志湯　　九患病失心

置

一是ハ寫心導赤飲ノ前カタニ瀉心導赤ノ症ニテアルヘキト思フ前ニ半ヲ見ニテ用ユル故ニ此剤数度奇功ヲ得タリ九患入テ心多ルヲ清スル剤ソ

一労役シタル九患病ニ吉此中ニモ大柴胡ニテ和シテ置テ用ル丁モアリ清解湯小柴胡ニテ譫語モ不止者ニ心下モ弱キ処アルユヘニ人参ヲ三分加用テヨキ丁モアリ或心下鬱滞実スルハ大柴胡ニテ下シテ後用ユル丁モアリ

一風患不解清解湯ヲ用ユル中ニ譫語妄語トコヤラ心ヲ労シ心虚シ患アル状見ユルハ小柴胡ヲ不用安心益志ヲ用ユルソ其ハ中ニ心下鬱滞不好按ハ大柴胡ヲ用又益志湯竹筎温胆湯ヲ用ユルソ益志湯ハ奇方ナリ

一男年五十労心実患及痛甚譫語舌甚乾燥初発十神湯清解ヲ用患不解五六日程ノ内頻患勢甚防風通聖散四貼用之九患稍和譫語弱安神益志ニ人参（参五）三分加テ調理シテノ安後連々去実芋

一前ニ云残シタル程ニ患病ノ治法雖ヽ千ヲ又記如左

患病正徳五乙未之治

一初発十神湯或加柴胡或敗毒散合葛根湯耳根腫者芩連消毒飲発患、発狂防風通聖散無帯有風不甚者柴胡弓飯湯加空表散而不解者清解湯小柴胡湯

○枝人参湯
一本作未言十三不乃ニ

一小柴胡合葛根湯不効譫語舌乾不眠安心益志湯心下痞則加茴甘効如神

一発患譫語大便溏泄舌焦心下痞鞕腹満按而不痛好按或心下空虚脉弱者人参加桂湯○理中湯加桂枝之有虚有九則加柴葛危

一発患譫語舌焦大便溏泄心下痞鞕按而痛不好按者大柴胡其妙如神

一大便黒溏者有瘀血以大柴胡加桂枝桃或桃圭将三味煎服

○人参湯

一安神益志湯所以有妙者人参労心故凡九患速入于心胞絡故口舌乾譫語其人能食而不知味午則食之忘前食舌白尖焦顔色如此大或歛血不抱於大便漏泄或不通而子之安之数貼無効則伺心下之虚実而大柴胡或人参加桂之○属或以逍遥合黄連解毒湯能清於是亦有神効秋之間患病渇者中暑者人参白虎湯有神

正徳四甲午五月廿二日之夜記如左

患病雖有瀉以大黄之分

一患病六七八日大便不通者大柴胡可之必心下按而痛不好按但按空虚者不可以大黄大便（便）溏者亦心下按而痛不好按胸満則大柴胡可之大便黒色而溏者加桃圭以有瘀血之黒溏尽ヽ瘀血来而後大便変又千黄色矣熱病之治法見大便溏泄則世医只知補而恐大黄必補而死是所以不知心下之虚実也不知之則実ヽ虚ヽ大便色赤十ヽ或黒

溏或後重而如滞或溏瀉其瀉下如湯沕熱或臭穢或欲溏而臍边痛則到十畫之属皆熱瀉之心下按而不痛者不可下而唯清之好沸湯好冷水口渴則投石羔湯微和則太合石羔夫以石羔大黄者其熱藏十之六七則太之以黄芩代枳殻以石羔代黄連或黄芩此治法而三十年而不誤之真之秘法之嗚吁九熱病臨補之地而瀉之臨瀉之地而補之則決而死蓋好人参恐羔黄好羔黄恐人参此皆未熟之謂也

一補正邪自除邪去正気傷之語最誤ル事世間多補正邪自除ハ人参ノ場之假九ノ立証温補而補元気則命門浮散真陽復于臍下肌九熱自汗止而九熱去気正矣邪気去而正気傷ト云語ニ惑テ邪熱去ルにハや人参ヲ用テ元気ヲ補スルト忘世俗ノ意之故ニ人参ヲ用テ人ヲ殺ス者多邪気去テ正気傷ト云ハ表邪ナラハ仝篇ヲ用テ汗ヲ去ルハ邪去ニ之ニテカマハス物発汗スレハ邪ノナキ処ヲ発スルユヘニ正気傷也大熱ノ症石羔ヲ用テ邪熱去在石羔ハヲ去ルヿヲ不知序ニスキト熱ヲ去シト思テ過用シテ実熱ノ何程去リタルツトリ格ヲ不知命門ノ真陽ニアタルユヘ石羔ノ寒ニ真陽ヲ亡シ真陽之気内ニコラヘカフナニテ表ニ発假熱トナリテ熱弥強クミユルニ猶々九熱アルト思テ石羔ヲ倍加スレハ自汗弥出テ真陽脱テ頭ニ死スルノ旦邪気去テノ正気傷也故ニ瀉剤ヲ用テ九熱和スルト大瀉ヲ去リ和スルノ其中ニ食進出レハ食ニ洄出来テ自本復スルヲ食スニ出又処ニ二ツノ目アテノアリ元気疲テ食スヿヌハ吉モヤウヤク洄テ可食ニ汗多気ヲツカレテノ心下弱ク元気疲ルニ依テ不食ハ元気ヲ補ニ或寒涼ニテノ脾胃虚冷シタルユヘニ不思食モノハ温補スハ食進也且ニ汗下ノ後食不進ニ餘熱残リテ不食アリ痰アリテ不食アリ虫積横リ或瘀血残リ或疹子ノ餘毒アリテ不食モノ虚煩シテ不食モノ皆人参ノ症ニ非ス其症々々ヲアシラヒテノ食気好ム処ノモノヲ与ヘテ胃口ヒラケテ少ツヽ食気出来ルハ人参ニ不及ソノ人参ヲ用ユレハ却テ不宜ソ此ニツヨノ不知モノハ治療危シ

一故ニ節菴カ語ニモ下而後アハテ不可大補之先小柴胡ヲ与ヘヨトアリ此是可知之

故正九熱瀉ハ小陽陽明合病則瀉後自止々服ハ他経ニ傳也

実九熱変而為虚九熱　実九熱去而為虚九熱ト云ハ可也

予熱病ヲ語ル侭或医曰九熱病日ヲ経テ九熱不去後変而虚九熱トナルユヘニ不治モノ多シト云予実九熱変虚九熱ト云ヿ何レノ昏ニテノカ見タル様ナリヤ予熟慮シテ九熱病ヲ察スルニ実九熱不解シテノ経日則元気虚矣元気ハ虚ニシテモ不去所ノ実九熱ハ蓄テアルナリ是虚中之実九熱也世俗元気虚スルヲ以テノ実九熱変而虚九熱トナリタルト思ナリ治法実九熱ヲ去ルハ連芩知栢ノ属也元気甚疲テハ石羔ハ難用故ニ実熱ヲ去ル薬ト元気ヲ補スル剤参朮附圭ヲ交用之或一剤之中ニ補ト清熱トヲ兼テ施治也故一補陽一補陰或一補一清心得ヲ以テスルヲ第一トスル也虚熱ト云ハ実九熱ハ寒涼ヲ得テノ已ニ去リ命門ノ真陽浮散シテノ肌表甚九熱スルヲ

虚熱或假ナルトニ云之實ナルヲ清スル薬ヲ過用シテ實ナルハ頻ニサリテ後元氣
ツカレテ肌熱汗自出ルハ實ナルニ非ス實熱去テ命門ノ真陽衰テ
虚熱ノ生スル也故ニ此本ヲ不知モノハ熱病日久欲久熱不去實熱亦変而虚
熱トナルト思テ益氣又參附ノ属ヲアタヘ二三貼用ルハ大功アリ此是實ナルハ元氣ヲ
害シタル外ナルユヘ元氣衰ヘテカヲ得ルソレヲ是ト思テ温補ノ剤人參ヲ倍加シテ
用ユレハ實熱却テカヲ得甚ナリテ頭汗蒸々トシテ多シ是下焦蓄ナルハアリテ次ニ
上リテ出ル汗也（必或時九雷百千之或加多）ソレニモカマハス補ノ不及ヤウト思テ人參ヲヒタモノ用
テ用殺セレモ其理ヲ不知也必竟實ナルハ過半残テアル中ニ人參ヲ用ユルハ後ノカヽヘテ
為ニ實ナルスキト云リ然ル時ハ元氣疲レヌヤウニトノ心得ニシテ能程ニ寒涼ノ剤ヘ加ル分也
也ソレモ此理ヲトクト合点シテ用ルレハ實ナルニサワラヌヤウニサメ能様ニ人參ヲ少加ル也虚
中實ナルトモ云ノ見痢病ハ温ナルヲ受テノ病也六七月ニ死スル症ヲ見ヨ両脈絶シテ
手足冷テ百モ半日モ息アリテ心氣タシカニシテ居ルニ好冷水呕吐或脇左右上下痛
動氣小ニシテ弾手ヲ真ノ虚冷ナル也一両日モ前ニ温補スレハ治スレ根元下焦
ニ熱アルユヘニ温補ヲ不受シテ實ナル内ニ蓄テ元氣虚スルユヘニ雖補雖瀉
ナリテ死スル也入門云千虚易補者虚冷而無痛火之力交也雖補者在温
熱之兼攻者矣是真之捨言也

投人參則有四段之工夫入門云虚而無寒者不宜姜桂只投人參四君
異功益氣独參
熱病耳聾耳経日此男素虚人労則沖上干心下而牢眩暈或有噯気一日風熱
譫語而夜中鼻乾或遺尿大便四五行溏脉又遺尿身乾頰上漉両頰微紅
脉洪数按而無力而寸如有力食欲起而取箸喫一椀津經日不語問則懶答
耳聾不以大喜已則不通如有客ナル元気亦大虚以益気去茯与參三分如有功似無
以異功加姜附各五分与之三貼吉微乾而夜中遺尿三次再頰赤面色乾而鼻
亦乾此脉以為虚中有火且陽虚陰火也然脉洪数而乾按而無力以脉則気虚甚已
遺尿者脬腎之陽気虚脱也按腹察動気則在水分按而其動有力然脉数而洪
按而無力仍投異功宿砂少加升柴之属以与之三貼脉微和面少潤
察動氣則浮数ノ形ハアリテ無力弥知陽虚数貼而安故水分ニ動気
力アリ作弱クハ人參ヲ速ニ温補スルハ遠慮スヘシ
一虚而無寒者投姜桂則以辛散却散少火且燥之故四君異功益気独參之
属或熱ナル附ハ少加之助人參
一虚而有燥下焦有微火者八物湯或十全大補門玄或人參養栄湯或以六味丸加
參加有瀉者不宜地黄生脉散二四君益氣門玄独參湯

天下採尺

一虚而有実或実寒凉大過命門之火衰者参附姜桂之属以四君益気大補八味丸料ノ
之属加減之

一虚而有火者因同気相求容热入于腎則上焦陽虚而蓄張火於下焦之因東垣而治之
且因龍芸而一補陰一補陽令陰陽加権衡而安
治法益気湯加知百六味丸料加知百四君独参投之脉不洪大只虚而尺有力大便
秘動気不浮散則此四剤之中交用之

右四段　虚而無寒　虚而有燥　虚而有寒　虚而有火
正徳四甲午季秋九日自勢州来名帰程於船中記之

十　調栄養衛湯　　热病　六昏益気湯加減

一此剤ハ労役気虚ノ人感風寒タルニ用ユルソ加味益気湯ハ本方ニ加羌云百名ル者ソ

一益気湯ニ去升加蛇芎細羌云之

虚人風寒大概

虚人風热以痛面赤肌表甚热而脉細数或微或浮大按而無力或緩或遅比皆和又
温剤治之軽則逍遥散合八解散加芎ヲ或桂枝人参湯或加柴葛或加味益
気湯加桂或加柴葛或五積散或以六君子加永桂宿行ヲ柴葛之属或沃雪湯

十一　益元湯　　热病　保元名復元湯

一此方ノ條下ト予カ心ハ取カヘテノ用ソ條下心ハ載陽命門火衰ノ意ソ然ルニ立方ノ功ヲ予
工夫シテノ虚中ノ実热ニ用テノ大功アリ热病ノ薬ソ

一附甘永多玄温補也補陽ナリ大虚ヲ治スルソ連雷口訣ハ清热ソ実热ヲ清
スルソ此剤ハ元気虚而実热ノ残ル服ニ用ユルソ

一大便溏スルモノニ加木苓ソ

十二　六神通解散　　热病

一予此剤ハ不用ソ此剤ノ場ニ防風通聖散ヨシ張子和之方ソ六昏ニモアリ防
風通聖ヲ用カヌテノ是ヲ用ルハアヤマリセ
石羔ノ寒将硝ニテノ下ヘヤル故ニ胃脾ニタマラヌ理之通解散ハ下薬ナキ故ニ羔脾
胃ニアタルソ

一然レ氏瘟疫ハヤリテノ初発大便瀉シ甚口渇実热内外ニ甚以ハ用ニノ大功モアル世ホナル
ユヘニ出シタソ真陽ニサワラヌヤウニ用ユヘシカヤウナル薬試ニ用ユルハ小貼ニシテモ分
煎ニシテノ用

十三　仲景炙甘草湯　　名復脉湯　諸虚

一仲景ノ方ソ十全大補湯此剤ヲ本ニシテノ出シ名トナリ予此剤ノ組タテヤウ妙アル
処アルユヘニ大切ニ虚証热アリテノ草臥タル热病ニ用ユルヿアリ

一此方ノ意ハスヽシクシテ元気ヲ補スルソ温補ニハアラス平補冷補ノ間ナル薬ユヘ
ニ面白キソ温補ヲ用ユレハトコヤラ燥気ニサハル二用テ吉心ヲ補スルソ上焦ノ元気ヲ
補スルソ補心ソノ意人不知之

一陽気虚テ而火之義アリト云証ノ主ナカニ君加減シテヨキソ多ク甘桂助陽気補元
神麹麻仁門膠ノ潤燥ノ心ヲツケテ用ユル時ハ仲景カイサル気ノ功アルヘキ此剤ソ

一補ニ温補清補平補滋補補陰調補ノ味アリ

温補両段

補陽　参朮　四君朮圭　朮理中　益気朮桂　六君朮圭永
補陽（陰）湯　十全大補朮　八味丸加参朮湯　参　熟地朮　飯之属ヲ温剤ヲ
ソヘテ気血ノ両虚ヲ補ス命門之水火ヲ補スル意ソ補陽ハヒトヘニ温補スルソ

清補滋補之剤　（一云右白天火）少涼之而補気
八物湯　四君門玄或連　益気四君加知百　七味白朮散　仲景麦門湯
参連湯　六味丸参朮　加味帰脾湯　人参養栄湯　雲林潤身丸参麦飲益元湯
独参湯　清心蓮子飲
大概参朮熟ニ寒ハ涼ヲツヘ或少涼スル意清補ソ陽虚陽火或下焦ノ燥或下（天陰）
焦ノ火ニ云選用之滋補之中陰陽如権衡ニトヲ云心エアリテ用ユル剤ソ気モ虚ヲ血モ虚ニ
燥ソ故ニ熱ノ義アリ或已ニ已発ノ火トナルニ用ユルソ必竟補心滋腎清陰火

平補　此語ハシカト不覚ヲ平補ト云
独参湯　四君　異功　六君　益気　八物　大補湯　人参養栄湯　皈脾湯
先大概ソ温補清補ノ間ソ此方平補ソ来補心ヲ補スルソ腎ノ燥モ潤スソ

滋補
八物　十全大補　八味丸料　六味丸料　仲景炙甘草湯
大概ト心得ソ血ヲ潤ニ気ヲ補ヲ未発ノ間ニ心得テ用ルソ

調補　調脾胃ソ
四君　異功　山薬　蓮肉　扁豆　或啓脾湯　参朮白朮之属或入瀉（訶子肉豆）
蔲ナト少加テ瀉ヲ調ル意ソ或鳥ナト焼ノ鳥ナト用ル意調テ脾胃ヲ補ヘ補脾ハ胃
気ヲ補ユヘニ補陽ソ温補スレハ補胃気ニ調ルハ味ヲ以テヤシナイ調ル意ソ

補陰　降火
補陰補血ノ意丹渓ノ語降火ヲサシテノモ補陰ト云ソ降火
ハ補ニハアラスソ滋陰ソ抱テ補陰スルニハ血中ノ陽ヲ損セスヤウニ補血スルソユヘニ
清補平補滋補ノ心エニテ補陰スルソ又胃中有熱而脾胃全則降火ニテノモ苦ニ方
ラス是ハ熱病喘急挾熱痰ハナトノ属ニハ血中ノ気ハ虚スルニハ地知百之属不宜矣凝ヲ

述ソ処ヽ昏日ヨキタ几医按トアワセテ不足ヲ補ヘシ

一或云虚人之保養大温補ヲ投シテ後滋補之又温補ニシテ滋補之不如此則有偏勝矣似是不是嗚呼不知命門之衰不衰也真実之虚令公常投附姜多桂朮或分時十全走投之一年或二三年五七年亦可也病人復常食進形潤沢歩健則半年亜服或二三四五年以後為常得温補則胃氣復常々々則不可増釜中之温也旦神陽補陰之兼施者在陽虚陽火未衰之地乎患之而出未衰已衰假火之論者也矣阜婦人腹必脹得胎三年之後産矣産後腫脹百五十日数医治療無寸効乎八月中旬診脉六動按而弱不能偃臥一身腫大甚其腹欲裂衣両脇脊中痛甚而難堪痛甚者腫而欲裂之兆也予参朮令山走圭永宿朮或丁或車通昼夜多七分他茱七分合二貼投之翌年三月漸愈經道証百餘町歩来於大垣自此後昼夜一貼投之全安

補脾胃乎調脾胃其調補有深意或主調主補之矣

一補脾胃者補氣也素脾胃虚冷大便易溏或懶動作好温恐寒食不進口無味或腹脹此皆因虚冷以参朮圭姜走為大剤与之則思食陽復而安此是補命門之元陽助胃気之源也

一大便易溏食少或噯気心下満或渇或腹微痛肉削色蒼々此是以脾胃不調也予前以為脾胃不調者皆虚冷之非温補不可治之或曰脾胃弱則不食姜附圭之辛味辛者却瀉気乎以為非々真之理而後能以参附白朮姜桂調脾胃只恨温補之不及矣

一日有患脾胃虚大便不調者四君永宿異功益気之属数貼而罕効仍以理中湯附桂縮砂倍人参愈不調或加圭為大剤至人参六七分強与之則其脉長浮腫不退予始而悟之脉長温補之誤之其頃却食少大便亦溏覚微熱仍以七味白朮散啓脾湯加人参五厘服之半年諸症悉愈

一婦年廿五脾胃虚腹脹大便微溏甚其腹大而到臍不能動身両脇脹痛如裂挙声而泣声音弱是命門之火衰而脾土虚寒其気怯而消者矣非以丸湯解求何治之仍以人参七分走四分姜桂各六分宿五分朮三分丁五粒木六分車土六分甘一分為一剤分二貼進之日一貼夜一貼心下稍和思食連進一月手足浮腫悉去減腹脹十之二一日腹微痛故減人参与甘剤十日之後食漸減大便亦溏却心下脹堅足附浮腫予以為減多甘剤之誤之故倍人参其剤之分量如前与之日夜二貼七十日而微歩二百日之後不遂百餘町同歳而全安不知之則只知其調恐人多之大剤姜附圭嗚呼非其治之故調之則調脾胃之一臓之補之則補脾腎之二臓之臨其症知其理而可施治之補脾腎之気者多朮姜桂附子縮砂木香之属調脾胃者参朮令山茱蓮肉縮砂木香有瀉者澤瀉有微熱者葛根故調脾胃者異功散七味白朮散啓脾湯四味理中湯入門痘之部云有虚無実不可用丁香亘姜附又致九焦耗元気不

可限痘之論

温補平補之弁

一天食人以五氣地食人以五味是使氣味知于人之虚実者以多附姜圭木石之属是以辛熱之氣助陽也夫人之氣乎剛六爻陰陽亢乎是以方常人今脾胃弱大便溏形虚備憊羸瘦則陽虚而陰孤之不能陽令陽固之雖脾胃虚備必未大便溏則隨東垣或一補陽一補陽使陽陽如權衡而治之既脾胃虚而大便溏則難以熟地當歸之属是以味取難補陽之見其虚以多附姜桂則經日燥氣生九熱口乾上九熱却増瀉難如何而已此平補之取宜之以多朮蓮肉山茱之属之蓮肉山茱者以味補形之意之調脾胃則陰自星或四君異功參苓白朮散之属皆以調脾胃之剤之補脾胃者二七之以多附桂姜補胃氣使飲食消化之是脾胃相共虚冷之治法之以茱之氣助其陽之其二之調脾胃者以平和之剤之四君異功參苓白朮散啓脾湯之属之清補者七味白朮散虚甚者只兼以独參湯辛熱之剤却耗散少氣之故分温補与調脾而可施治之宏然則為医者偏温補偏調補則非其治見虚冷則速投多附姜桂之大剤且到于調補之地則瀉尚可緩調之補之

右正徳四甲午季秋九月日又柔名帰於船中記之

命門水火陰陽之治

一釜當長治郎年四十平素嗜酒今四年前二年此来脉沈盗汗壮年有在積或白濁今右心下塞鞕右臥（今左）則腹堅或支于心下麻後両弱以脉則全陽虚也去春以来三医温補之太熱則耳鳴眼翳或夢遺漏精白濁臍下無力春中悪風寒或清涕已以為趙氏医貫去春人参非腎経茱萸宜曰以人参補命門之真陽之此亦是而彼亦是之今此証命門之水火虚虽太然稍有火之也故以多附則却増燥今加九熱則耳鳴眼翳而不能久服此是隨趙氏之取言而可施治之仍以六味丸為陽倍桂加宿于之四十日前証大半愈歩七十町而不労虽太漏精夢遺白濁却多乎间之曰陽了不挙否曰陽了挙多矣此下焦之真陽漸傷而陽気行太然未其精堅固故漏之陽了挙者氣力之氣有力者火之渡之下焦之氣虽得力火走而動精之仍去桂縮于之五十日漏精白濁漸止微加肉桂或服去之旦加宿調理而愈予之辛韓医談可見之少火之氣衰者壮火食之之命門之真陽者少火之因命門之燥而生九熱者壮火依之壮火食少火夫火者取生之火之動則燥生火之真火者命門之真陽而守常之温之火生則温者為熱之惣而言之則血中之温真陽也血者陽之陽中之温者陽也而陰陽合為視聴言動之故上焦之元氣心之中焦之元氣脾之下焦之元氣命門之命門陽陽之為根而二之動在腎間之人参補命門之真陽者云虚冷之無火之也之人之或有火之也則一補陽也補陽以四君子湯六味丸料加減之或隨趙氏以六味丸料固真陽以八味丸料助真陽之可之腰桂不可鼓瑟之右両段之治法命門陰陽

桂

旁

之深意之世医多泥人参或泥丹溪而不暁蘊奥仍以治法為證

中脘動氣

一凡病中脘動氣者（寒熱）虚甚也虚甚則不治多実ル不受補之無大ナル動氣無力浮散則不実ル之補之温之動氣無力浮散者假凡有故受補

一虚人保養茉十ト望ムキ中脘動氣アルハ虚中之実多虫積凡ヨ世ニヒ或ハ実暑者湿之外邪兼虚不散微熱留肘而為動氣者多補之則補住之為火氣以和相則外邪不去而胃氣疲外邪必口苦不好塩味古少白悪寒悪風或手足麻痺小便赤丑根ノ肉果削内傷之虚者耳根肉削只淡不知味舌色常之分内傷外感可施治予療

一婦去冬産而後心下寒或舌痛咽亦痛形稍瘦今微咳日暮少悪寒中脘動氣ル舌少痛似虚労予為外邪在虚中而以柴胡弓皈湯加玄参白ノ以潤和散与之凡去咳止後温和而安

十四升陽散火湯　熱病　一本校辨

一予此剤ヲ以論ノ條下ノ證ニアタリテ用テ見ルニ無効今以為穏法ニ金銀首飾ヲ入テ煎ルトアリコア未穏法アトヨリニ不用若此症ニアフキハ至極不治ト云コヲ病家ニ申カセテ後金銀ノカザリヲ二朱ヅヽ程モ入テ煎シ与ベシ金三五分 銀三五分 薬ナヘ入テ煎シ用テ吉生姜ヲ入ル爲ソ常ノ金銀ハ交リタルモノアルユヘニ首飾トアリ太ヒ金銀ノ匕或刀ノムクノ切羽ハヾキノ属金銀ヲアツメテ入テ煎シ用ヘシ撮空揗衣摸床症ハ不治ソ　○撮空揗衣摸床症五段アリ

一初発無汗譫語如狂人欲走或揗衣撮空摸床脉浮弦数防風通聖散或疹子出而安

一大便不通心下按而痛不好按脉不虚数大小承気桃仁承気ニハ一頃気ハ黄龍湯之場ニ此症アリ脉潤アクリテ心下不好按ハ大便通而止又汗脉虚数而實熱不散ニテ元気ハ虚スル八死症之獨参湯無効

一撮空揗衣摸床及汗脉虚数遺尿ニ二次心下弱或多笑不知苦処則安神益志人参五分三分ヲ加ヘ兼用獨参十之九不治

一此症投究ル独参五七戔ハカリ用ヲイテ十之一愈ルコアリ

一散火湯ノ論ニアル八肝熱トアリ散火湯ニ人参五三分金銀ノ㒵七八匁相トモニセンジ用テモ三ルヘシ世間ニ金ヲ翦シ用テ痘熱病ナト投究ル十ニ百之一治スルコアリト云ニ此ヘテ可知撮空揗衣摸床及汗遺尿脉虚数ハ其日中或翌日死スルソ散火湯ノ金銀ヲ加テ治スル症ハトコヤウニ潤ヘル処アルヘシ此ホノ症ハ大カタ必死ニ百之一二治シテモ大功ニ病家エ悪症ト断テ治療シテヨシ　○（一人到不治絶食熱不解金一歩煎用少安ソレヨリ三四五両煎用治ス）

一散火湯ハ汗下ノ後ニ虚モアリ熱モ少残リテアルヤウナル片ニ金銀ヲ不入ニ用テヨキ撮空揗衣摸床ハ金銀不入ニハ何ホト用テモ功ヲ不知ソ

十五　黄芪建中湯　諸虚　痘　雑症

一表虚ヲ實スルト云カ此方ノ意ソ故ニ止汗之主トスソ氣虚ヲ治スル故ニ氣虚ノ人ノ保養ニモ吉人ハ参ヲ加ルコトモアリ此方ハ表虚ノ人ニハサマ〳〵ノツカイヒヤウアルソ此一書ノ外ニ加減シテ用テ功アルヘシ其身〳〵ノ工夫ニアルヘキソ

一汗出テ不止ニ必用ソ悪風自汗ニヨキソ故ニ九味羌活湯ニ代皁合スルソ小柴胡合スルコトモアリ

一飴糖ヲ加テヨシ加ヘヌコトモアリシルアメニヽニ姜（キヤウ）セニヲ入テヨシ

一腹痛久不已ニ飴糖ヲ加治シタリ

一大便不調ニ加朮治タリ痘瘡大便二三行溏腹痛アルニ多ニ分朮ヲ加飴餹ヲ去テ與ヘ治タリ痘ノ表虚ニモ用テ吉

一表氣虚シ氣虚シタル人ハ養生芣ニヨシ人参ヲ加或皈朮ヲ加ルコトモアリ

一中風或手足麻痺スルニハ君子ニ合シ皈弓ナトニ加ヘ或膝仲薏ナト加ヘテサシヒキシテ用ルコトモアリ麻痺不仁表氣ノ弱キユヘソ

一霍乱吐瀉ノ後手足冷眼睛弱有汗ヲ此剤ニ人参三分加用テ功得タリ

一婦人産後フラ〳〵シテ無力ニ用ルコトアリ参ヲ加或皈弓ヲ加或粮生芣ニ本方ヲソノマヽ用ルコトモアリ

一男婦トモニフラ〳〵煩テ何ヲ用テモハカトラヌコトアルニ此方ニテ功ヲ得タルコトアルソ

一痘ニ用ルコト多キユヘ序ニ前ニ云残シタルユヘニ痘ノ治ヲ記スコト如左

痘治法経験

一発熱三日敗毒散（荊活）唐弓用加升工葛根湯　熱甚紅点見則以升工葛根湯合消毒飲　猶甚則芩連消毒飲或去連或去芩当連或前胡湯加大力子紅花柴胡或紫草之属

一出痘熱不解者解毒清熱内托散加柴胡紅花芩或心法宝表解毒湯或四九味神功散　熱不甚已灰虚則七味白朮散猶虚則保元々々湯表虚有汗則建中湯去飴餹加乡　額色淡白保元湯桂皈或益気湯圭　欲出不出危則加味五香湯　虚冷而不能出則参朮姜圭丁走斤木之属

一起発四水之三日熱甚表虚則実表解毒湯　毒気盛則四九味神効散　熱不甚者七味白朮散　不弱者羌日芸斤艹　虚則保元湯　四君子湯斤圭　黄芪建中湯加乡　右澤則加朮　大便溏則理中湯　虚寒者加熟附或四君子加永木　益気湯加朮或附或圭

一貫膿同太熱

一欲收靨乾甚則八物湯　十全大補湯　益気湯　四君子加斤門

一発熱ヨリ十日之夜乾者アリ少早キ収之太熱レ氏面少乾心アリテ両手瘇ヲスハ順之手ノ瘇少減シテ足マタハルソ是ハ面ヨリ手々ヨリ足トウニカハル之倒靨ハ面手足氏ニ乾ソ之是

沸

ハ表裏弱毒気不発シテ内陥スル之枝究ルトキハ加味五香湯用テ見ルヘキソ十一日
二面少乾キ心アルハ可ナリ十二日ニ収ルカ頃之十三四五日ニ結痂スルソ然レ𪜈十日之夜十一
日ニ多ハ乾キ心アルソ其時大便瀉シ手足不腫面痩ルハ凶之
一発熱ヨリ十五日酒湯之浦湯ハタライニ滞湯ヲ入米泔ニテウメ合能カケシス面ニ酒ヲ一ツ
サシテ病人ヲタライノ中ヘ入リ次ニ俵ノ口ニアツルサンタワラト云ヲカフリテ其上ヨリ湯ヲサツ
トカクルソ但世ノ所々格モアルソ其地ニテ伺シッテ是ヲ大格トシテ吉
一多出タルハヌクイ湯ト云テ布ニ右ノ酒湯ヲシメシ面ヲヒタシヤウラム手モヌラセ拭フソ病
人ヲ臥テ酒湯自限ニテルハ笹ノ葉ニ酒湯ヲヒタシテ面ニ少カケテ拭フコトモアリ
一発熱ヨリ十五日ハ出痘ヨリ十二日目之必竟膝ノ辺マテニ収靨スルカ酒湯時分ニヘ
一小児ニ痘発熱嘔吐不已陳皮生姜二片淋出シテ与之常ノ嘔吐ニハ姜三片一
一痘固表　蔵ニ云芎圭能収表固（之止汗）乾燥者熟地図片口渇七味白朮散或四君門玄或
独多加門虚参ニ渇者多木姜片木之属木香散十二味異功散気虚脾胃弱四君
異功理中益気之中加木圭或（一本痘）熟附気血両虚者十全大補湯兼用独参湯有瀉
則木香散或主方ニ訶子肉豆蔲ヲ加テ吉少瀉アルトハヤ訶子肉豆蔲
ヲ加ヘテ吉外ノ瀉ト違テ先トムルカヨキソ但膿血ヲ下或瀉スルトイヘ𪜈渋滞腹痛ス
ルハ訶子豆蔲ヲ遠慮シテ木圭ナトノ類或建中益気四君ニ加減シテ吉

一虚熱テ乾弱ハ八物湯
一実熱消毒ハ大力子射干犀角山豆根　清熱ハ芩連
血熱甚ハ生地　犀角　大体ハ芩紅
一小児出痘欲出不出熱甚者不治出痘色不赤者多不治
一出痘ヲ見テ起発ヲ察シ起発ヲ三ニテ貫膿ヲ察シ貫膿ノ初ニ収靨ヲ察シ
テ可施治痘之治法ハ踏雪不知堅氷則其治不詳
一出痘額之色淡白而甚凶出者凶之大便瀉スル起発ヨリ貫膿ニウツル時分甚
痒抓破リテ死スル者多シ不瀉者収靨面ノ時分毒気内陥シ、ヤノカセヨリ前ニ云
倒靨ニナリテ死スルソ是額ノ色出痘ニ淡ハ白テルユヘソ気虚シテ毒アルユヘニ初発
治気虚消毒シテ血熱ヲ潤シテ治療スルニ脾胃堅固ニテ瀉モナクハ十之一二可治ソ
一痘ノ発熱ニ痘瘡ノ臭気アル者アリ是ヲ以痘ノ膚ノ熱ト知コトアリ痘ノ収靨スル時
ノ白発熱ノ時衣ヲアクルニ医ノ鼻ニ入ル気味アルハ决而痘ノ発熱之
一二便出血嘔血必死ソ　黒痘七八見ユルハ十之八九死スルソ
一痘出多譫言而食スルハ能食ストイヘ𪜈痘ノ出ヤウ起発貫膿ノ次第不宜ハ不
治ノ症モアリ食スル中ニテハタマト食シ食スルカ食セヌカ不知ヤウナルハ食多トイヘ
𪜈格ニテラヌコトアリ有熱病ナトモ心ニ熱アルニ同シ是モ心ニ熱アリテ叱ル大熱タルユヘソ故ニ能

食スト聞𪜈痘ノ狀心カヽリナル処アラ介抱人ニ問テ食スル体ヲ問テ可知惣テ病人貧ノ者ハ父母介抱スルユヘニ父母能知之大身或富貴ノ家ハ父母ハ病躰ヲ委不知アマツサヘアシキヿハ父母主人ニカクスヿアリ故ニハ父母ノ口ト介抱人ノ口ト多ハ違フヿアリ故ニ看病人朝夕側ニ居ルモノニ問テ可知ソ諸ノ病𪜈ニ同シ

十六　温膽湯　𤋮病　雜症

七味則二陳湯加竹茹酸

一此剤ハ不眠ニヨキソ寝入ラスル薬ソ胸中ノ痰ヲ去リ胸中ノイキレヲスヽシクスル故ヘニ子セルソ

一鬱症鬱痰ハ胸中ニアレハ胸イキレ氣ワクヽヽトスルユヘニ胸中不易ソレニ用ルソ

一心虚痰鬱ノ症不眠ニ用ルソ

一傷寒ニ虚煩ニ用ユルソ竹茹温膽湯ノ口解参考スヘシ

一傷寒𤋮去テ後痰アルニ用ルソ逍遥散ヲ合メモ用ソ

一痰咳ニ加仔杏用ルヿモアリ燥痰ニ去守加樓貝仔テ用ルヿモアリ

一黄連ヲ加痰ニ火ヲ清スルヿアルソ

一痰ニアリテ物忘レスルニモヨシ吉遠神ヲ加ルヿモアリ

一胸イキレ或胸イレテ俗胸ノコケルト云去酸テ加連ヨキヿアリ不食ニモ𤋮アルニハ吉

一心虚痰鬱𤋮アルニ合毒解湯用ルヿモアリ但シ連芩ノ卮ニ味加テ吉

一傷寒ニ虚煩ニ合解毒湯用テヨキヿアリ

一狂人ニ合解毒湯ツ子ニ用ルヿアリ

一痰ニ火ハ双痛𤋮アルニ加當百ヨキヿアリ

十七　竹茹温膽湯　𤋮病

一傷寒ニ汗下之後虚煩不眠譫言スルニ主ニ乃也ヨクク子入レハ譫言モ止ソ空躰其理ハ傷寒下後寒熱大半去リ氣力モ少臥ニノ實熱ノ中ニ不眠ニ今大半去タル故ニ寝入ラントスルトキ餘熱胸中ニアツマツテ心ヲヒヤカスユヘニ夢寐不安ト云テ寤寐クルシク夢見テ驚キ醒ニノモヽ夜ノ中ノヤウニテ子ナトホケタル面色アリテ謬語スルソ其中ニ薬モメクリ胸中ニモスヽシクナリテヲ子イリ能子入レハ胸中汗ナト潤胸熱ノ気散シテ連々ニ和スルモノソレユヘニ熱病後ノ盗汗ハクルシカラウヌソ熱散シテヨリナルソ胸ニアツマル熱腠中ニ汗ニナリテ散スルユヘニヲ子ナサメス、シクナリテヨキソ子サメニ胸ノ熱ノコルユヘニ謬語スルソ

一譫言三返四五返ノ工夫アリ○初発無汗シテ譫言ハ衰表邪也汗タツフリト出レ止ソ○大便不通心下按テ痛不好按實熱ノ譫言ソ通利シテ熱利スレハ止ソ○労役傷寒ニ汗モアリテ草臥ニテ譫言スルハ云語アトヨハク眼睛ウロリトシテトコヤラ弱キハ人参ヲ得テ能子入レハ汗シツホリト出テ止ソ○𤋮心ニ入テ譫言アルハ失心シタルヤウニテアト先ヲ忘レ食スレ𪜈アツハトアト前ヲ忘レ謬語スル

ワ安神益志湯瀉心導赤飲升陽散火湯ニ金銀ノ免ヲ入用ユルリ〇虚煩ハ譫言ハ前ニ云如ク欲眠不眠胸中煩熱スルユヘニ譫言多ク舌ノ色前ノ黒ニ残レ𪜈惣躰柔カナルソ實ハ熱大半去レハ舌ノ黒キ処ヘ去リ舌ノ縁又ハ舌ノ地モ色ウスクナリフックリトスル状アルソソレニテノ見分ヤスキソ

舌之初中後

一熱病寒熱無汗頭痛甚トキニ舌ヲ出サセテノ見ルニ常ノ風邪ハ舌常也傷寒初発ノ舌ハ白クサヽケテノ常ノ風邪ノ舌色トハ格別ノ故ニ是ハ熱ノ初発カト疑フ舌

一半表半裏ノ舌ハ白ク胎アリテ耳稍鳴少トヨキカト云位ソ小柴胡ノ加減ニテノ見合ハル湯ソ其時汗シテノ後ナレハ大汗シテモ内熱不去下スニハ早シソレユヘ小柴胡ニテ和シテノ居ニテノ大柴胡ノ時（待合スル治ムモ／ヤウニシテ不詳）ノ節ヲ待合也或又熱心ニ入タルカ安神益志湯ノ症カト見合テノ益志湯ナレハ益志湯ヲ用其中ニ熱同况ノ時大便不通或下清水又ハ心下ヲ按セハ痛不婦按耳聾舌乾稍付レハ大柴胡ヲ用ルソ大柴湯ノ舌ハ白胎ニテフスフスブリカヽリタルヤウニ中黒キ心アリ舌小大ノ前指ニテツキタルアトノヤウナル状強リ乾キソレヨリ乾燥スル始ガ大柴胡ノ舌ソ

此所追加以後之
〇黒ノ字羔ノ字カ

一舌少乾心下拒按小柴胡ニテノ不為ハ見合スルニ不及大柴胡之少瀉アリ唇乾ハ竹葉石黒湯ヲ合テノ有神

一労役感寒ト云加味益気ナト用ユル舌ハ白胎アリテノ急ニ不乾燥ソ真實熱ナキユヘニ舌ノ色地形ウスアカニアリテノ実熱ノ舌ノヤウニ急ニ乾燥セズソ眼睛ニ依無根ヤウス、脉大ニ而進無力ヤウス可参考心下トコヤウソヨハキソ

一大小承気六一黄龍ナトノ舌ハ焦黒乾燥地形トモニ乾スホニ熱丸クナルヤウソニテノ言語ニテハリカ子地形アカクソ中ノ焦黒堅硬也心下按メ痛不知按耳聾或ノ身ヲ轉シ色ヲアケテノ其闘眼ヲトシ色クノ見ユルヲ脉按メ潤アルハ下而安脉虚数頭汗心下痛ムヤウナレトモトコヤラフ乾キ弱疑シキ処アルハ実熱不去シテ元気草臥タルユヘ下ス時節三四日モ過タルハ多ハ不治ソノ通利ノ剤ニハ六味丸ニ雷百ヲ入湯トシテノ用ルヿモアリソ或降火滋陰湯ヲ用テノ通利ノ剤ソ遂通スルヿモアリ兔角心下ニ弱キ処ノ疑シキ処アラハ通利ヲ先止テノ滋陰ニ心ヲ付ルモヨシ六味知百门玄ナト加用ル中ニ心下弥寒不知按実見ヘハソヨニテノ三乙承気或黄龍湯ソ

一下而後ハ舌少潤前ヨリハトコヤラフマハリヨリ柔ナル状アリソレ𪜈ニ睡後ハ乾ク者ソ食シタルアト湯茶ナトノミタル後舌トコヤウ前ヨリ柔ニテノヨキソ此時安神益志或小柴胡ニ加減シテノ用或気力弱クハ八物湯六味丸雷百多クナト或独参ナト兼用ヿ有ソ

一虚煩ノ舌焦ルトイヘ𪜈実熱大半去タルアトユヘニ地形柔也睡後ニハ乾ク者ソ湯茶ヲ与レハ又ヨク潤クヘシキソ此時ハ竹茹温胆湯安神益志湯八物湯或火ハ気ル腎中ニ残ラハ

降火滋坎ヲ兼用或降火滋坎ヲ小貼ニシニノ用熱ハ稍和スレハ竹筎温胆或ハ八物湯ニナヲシニノ置ソ

一通利ノ後食ノヤウストコヤラ能ナルハヨキソ下而後食連々ニ減スルハ危シ是ハ補シテノ見或ハ三味ニ柴葛解ナト用アシライテ見ルソ

一熱病舌サノミ不乾嘔吐不食スルニハ三味柴葛解ノ揚リ

以舌色分虚寒ハ実熱

一季子秋之頭（不予頭）児七歳十日前風邪臥床今七日其症足冷恐風寒ハ好静悪人声且睡後煩悶而揚手擲足而後眠前吐蛔一ツ以後咳嗽声如嗄如有痰脉浮滑按無力其舌有白胎而帯黄表裏微黒小便赤大便溏三行以異功散加永圭熟子人参三分初中得投之三四五日ノ間全不食睡後煩熱不已又吐蚘一筒咳嗽和太熱其間多眠睡後煩熱経四五日而後瀉止手足温和肌表熱而能眠々後煩悶止次思食而安按此症小便赤舌微黒ツ睡後煩熱揚手擲足皆熱症也然ルニ悪風寒ハ足冷悪声好静吐蚘是亦冷症也小便赤ハ熱ニ似タリ然レ𪜈是小便ノ数減脬下ニ久シク滞リ度ヲ失スルユヘニ濁テ赤シ渋テノ赤キ色ノ如シタマリ水ノ無キ気ルユヘニ渋ル意ソ故ニ赤シトイヘ𪜈實熱ニアラス虚寒ハナリニ古之里黒トイヘ𪜈ウラヲモテ𪜈ニウルミタル色アリテ物ヲ撲タル色ニ似テノ血ノハナヤカナル色表裏ニ不見舌ノ表裏色寒ハキ水底ツクロニウルム色ニ似タリ此是沢而虚寒ノ舌也実熱ノ舌ハ舌ノ表皮黒ハ焦強リ端裏皆赤而有血熱之色也以是知實熱也且得補テ弥シツカニ多眠決而虚也實熱得温補則不眠或始狂是以可分虚實

一初冬之頃男年卅五六臥床十日初發如瘧手足冷吐蚘以後午前熱退午後熱来汗出于頭胸脇左右攣微痛手足懈怠如置之無地或如痛好熱飲口苦瀉一二行脉緩中如弦耳鳴舌微黒小便甚赤臍下冷及汗多或及痛十日之後肌表稍熱足冷心胸汗出脉進耳鳴舌本強小便弥赤病人言語則舌本不自由前医以之為客熱予分之

○耳鳴耳聾ハ熱也熱半表半裏ニ入レハ耳少ツナリテ後聾ルソ是實熱ニ然ルニ耳秋鳴時不鳴状アリ病人問テ知レハ実熱ノ耳鳴ルトハ遠フソ

○薛己十六種ノ中ニ傷寒金鏡録三十六舌ノ中理中湯ノ舌ノ図アリ然レ𪜈意味ヲ不述サレハ舌ヲミテハ中ニ得心シカタシ予今得タルニヨツテ具記之ソ

○舌微黒實熱ノ舌ハ血色アリテ赤ク舌上乾舌ノ前強始三分四分乾焦ソレヨリ連々ニ焦乾燥硬ルソ

○虚中實熱アルハ舌連々ニ九ノカタマリ始ハ表裏赤後ウルミ黒多心ノ虚而實熱不去也此舌大便瀉者多死不瀉者安神益志湯瀉心導赤飲六味雷百之属

○熱病之瀉少陽々明合病之瀉虚ニ非ス熱瀉也庸医多不知為虚

此段及呑追加之

舌虚寒ノ黒色ハ無血色ウルミタル色ニテノ舌ノ表モ裏モトモニウルミテノ微黒色アリタトヘテイハヾ黒カキ色ナト云ヘシ不堅硬此是虚而虚寒ノ舌ナリ舌本強ルトイヘ𪜈堅硬ニテノマハラメニ非ス何トナリ舌本不自由也初心ノモノ舌強ルユヘニ寒ハ熱ト思タカユル也虚而ノ舌モトヨリカヌルト云心ソ

○小便甚赤此是小便ノ度ヲ失スルユヘニタマリ水ノ赤キ心ソ水無気則法ル以是可知

忌胸者熱汗多此是膝下冷ルト云カ虚寒也實熱一盃ナルモノソ虚寒半分熱アリ半分ハ冷ルト云如クニ熱スルカト思ヘハ又冷タル処モアル也

予以理中湯加桂不則傷寒六合ノ加味理中飲之適中則数貼而安

此病人又云眼疪乾必痛不熟睡是亦陽明之症ニ眼痛鼻乾不眠ト云ハ熱症ナリ升麻葛根湯合小柴スル症也此病人眼イタムハ不眠ユヘニ疪シソクトシテ痛ナリ不眠症ニ虚實アリ力ナキユヘニ不眠ハ補ヲヘニテノ後能寝ルソ實熱アル症ハ補ヲヱニテ弥不眠シテ實熱ノ状次第ニアラハルヽソ

十八　三白湯　調理雑症　加斤名當飯三白湯入門方ソ（朮芍苓沢朴連姜烏梅生姜）

一此剤ハ補ノ人参地黄ナシニ補スル意ソ少熱ハノ残リタルヤウナルニ吉潤シニテノ直ニ飯ヲ加テ病後津液ノ乾ソニブラリト用ニテノ直方ソレモ食モヨクス、ミ出テ茉ヲ用ニテモ吉不用モ食ス、ム程ニ日ヲノヘハノ自ナカラモツク一キト云ヤウナルニ吉

一熱病後調理ニ用ル剤ソ

一痢病後ニ斤ヲ入ニテノ吉

一産後十ト熱ツノコリ或血崩後下血後ナトニ用テヨキソ

一腹痛不已ニ甘ヲ好ムモノニ用テ功アリ

一大便不調症補瀉シテ無功ハ用テヨキヿアリ加減ナトシテ用ヘキソ

十九　三和散　気　疝氣　雑症

一此主意ハ筋ノ攣ヲ和スルト云カ目アテソ故ニ疝気ハ肝経ニ滞ルユ強リ攣腰節ハリ痛或脇下攣痛腰脚痛ニヨキソ疝気ニヨキト云ハ俗ニ云ヿソ必竟頃気ルシテノ筋ヲ和ウクルユヘニ右ノ（諸）症ヲ畧（俗）皆疝気ト云ソ

一陰嚢攣痛或腫大ニ加青危通ナト或茴ナト加用ルヿアリ熱ナキトキハ其マヽ用

一腰痛シテノ俯仰テヤウヽ匍匐シテノ不起ニ妙アル茉ソ

一脚気胸中攣ニヨシ温脚気ト云ハ病足腫ルソ踝骨膝ハルヽハ三和之症ニアラス不腫シテノ攣痛スルニ吉

一頭痛不已脉五動トコヤウ（天イマテノ）カアルニ吉腰攣ニハ猶吉

一大便秘スルニ吉（気）秘ト云ニヨシ桃紅奴ナトヲ加ヘテ用ルヿアリ

一痢病主上リ二三上リヲ用テノ渋滞退サルニ桃奴芩ノヲ加ヘ或本方ニ奴芩ヲ加ニテノ

ヨキソ痢ニハヨキヿ多シ
一痢病後ニ腹痛強大便不快則臍下ニ丸キモノイクツカ見ヘカタキモノクリ〱ト丸
結糞ナリソレニ用テヨシ桃奴ヲ加テヨシ堅キ大便通シキレハヨキソ
一其外ノ病後ニテモ臍下左右ニクリ〱トカタキモノ糞ノ状アルカ手ニサワルハ此方ヲ用ソ
一気鬱滞シテノ胸ツカヘ不食大便結スルニヨシ
一産後日ヲ經テ後大便澀滞シテノ下リ腹裏痛スルニモヨシ
一常ノ大便瀉スル症ニ澀滞アリテノ大便残ルヤウナルニスラリト用テス凸（通）ハヨキソ
一身ノ中ニ結核ノ如ククリ〱トシコリタルモノアリテノ痛ニ順気シテノ鬱滞ヲ散
シテヨキヿアリ　一痛風ノ如ク手足痛不腫ニヨキヿアリ是モ気血ノ鬱滞ヨリ生スルニヨシ
一風毒腫カト云テ肘股或片腹ナトニシコリノ処アリ痰塊カトモ云甚痛アリ是ニ
不膿ヿアリ其不膿モノニヨキソ此症痛甚シキユヘニ可膿カ膿マシキカト評儀
トリ〱ナルモノソ外科モ不知ヿアリ按而アトノツク中ハ不膿ソ脉遅緩ノ中ハ
不膿ソ膿アル脉ハ数ニシテノ無力ソ腫タル処按スニテ手ヲハナテ手カヘス意ニテノ按ス
ニ中ニ物アリテハヤ按スアトカヘリテアトノツカヌカ膿タル也外科此時ナヲスルソ
風毒腫ハ皮膚ハ常ニシテノ肉膿ソ故ニ皮膚ノ下肉五六七分下ノウミ潰ルモノソ追
風通気散ノ條下可参考三和散ニテノチル症ハ気血凝滞シテノ痛ニ必竟ウムマ
シキニモノカ發ルソソレハ痛ム處ニ何ヤラ節ノシコリタルヤウナルカタキ意アル
俗疝気ト云ソ必竟結核ノヤウニ気血痰ノ鬱滞シタリト見ヘタリ三和ノ
用散ニシテノ風疹ノ如クナル痒キモノ身中ニ出タルヿアリ是ヲ以テ見レハ風寒
熱ヲウツミ血滞リ經絡凝滞シテノ痛ト見ヘタリ
一三和散ノ用ヤウ燈下集ノツ云ヨシ其外ノ方モ灯下集ノツカイヤウ引合セテ
参考ノスヘシ玄治ハ功者ナルツカイヤウソ
一小児モ同シ心得ソ小貼ニシテノ用ルソ然レ𪜈小児ハ気鬱ト云症ハナキソ七情ノ
気ハ小児ノ中ハ鬱セヌソ気血凝滞スルヿアルユヘニ此方ヲ用ルヿモアリ惣テ
虫積ニモ鬱滞スレハ気ノ流通滞ルユヘニ功アリ
一気虚ニハアシキソ気ノ散スル薬ナルユヘニ元気ヲ却テノ損スルソ三和ヲ養生
薬ニ用エレハ卒死スルヿアリト唐人医振甫カ云タト云此意ソ心下ノ虚實
ヲ見テ用ル薬ソ心下ニ[illegible]ノ虚ナル者ニ常ニ用レハ虚ヲ虚スルソ
一身麻痺シテノ不能起居手足屈伸スルヿナラス十指強リタル𪜈此剤ニ三味丸
ヲ兼テノ治シタソ予今以為右治シタレ𪜈療治ノ心ニ又三和ニテノヨキト思フハ
庸医ソ此剤中兵服ノ三味イラヌ薬ノ味ソ右入テノ用テモ外ノ薬ノウレニテノ不妨
トイヘ𪜈如此症ニ用ルナラハ白気散ト六味丸或煎兼用テヨシ道理ニ叶ソ

一疝氣ル腰痛ニハヨキヿアリ症ニヨリアタメルト云ヿアリ

一咳逆疝氣ノヨリ發スルニヨキヿアリ脉弦緊ナル狀アルヘ心下モ不按好ソ

一腫脹疝氣ヨリ發スルニヨシ脉カサアリテノ進按メ有力ツ~~數~~遅緩ハ虚之不可用滑数ナラハ危車灯心或木通ヲ大ニ加テ用ルソ

一乳核痛寒熱アルニ柴青危ナト加用ルヿモアリ

一咳久已カヌルニ加好杏ヨキヿアリ

一頸節牽子カヘリ成カヌルニ行氣香ソ散烏薬順氣散ヲ用ルカ主ソレヲ用テ不宜ニ此剤ヨキソ

一熱病熱去テ後ニ疝氣ルナト發シ或腰足牽ヤウナルニ用ルヿモアリ色々ノ手ノアル薬ト知ヘシ三婦祐元ト云医ハ此ヲヨクツカイ覚タリ

廿　九味柴胡湯　結核　雜症　小児

一此剤ハ龍胆瀉肝湯ノカロキモノソ肝經ノ濕熱ヲ散スルト云カ目アテソ

一肝經ニ熱アリテ頸節耳下處々ニ結核アリ或耳閉瘡宮或[illegible]結核或ヨコ子虐處イタミ一切瘡瘍ノ熱或陰囊便毒ナト九アルニヨシ小児多此症アリ庠ニアリ必竟肝經ノ濕熱アルユヘニ諸症ヲナスニヨシ

一淋病ニ去多代波多加車前灯心或通ナト加ヘ用ルヿモアリ小柴胡ニ牠胆艹車

通澤危ノ喊淋ニヨシ半井家ノ傳ソカヤウナル薬用ヒ和キタルトキニ用テヨシ

一身ニ結核処々ニアリテ痛熱アルニ妙アリ

二十一　五苓散（去桂名四苓散）　泄瀉　暑　雜症

一泄瀉ノ主方ソ大便水ノ如クニ下ルニヨシ夏ノ間多ソ

加黄栢テ膀胱ノ熱アル症ニ用テアルソ熱病汗下ノ後下焦ニ熱アリ小便渋痛ヒニ用ルヿモアリ

一起テ居ル病人ノ小便少渋ナント云ニヨシ

一小便不通時ニ加車通灯心倍圭用テ通スルヿアリ

一湿ナト感シ小便渋リ大便水ノ如クニ下ルニ木ヲ唐蒼ニカヱテ用テヨシ脾胃ニ欝滞アリテ瀉スルハ胃苓湯ソ是ハ脾胃ニ滞リハナクテ只水瀉スルニ吉ソ

一大小便不通ニ大黄ヲ加エ用ルヿアリ

二十二　柴苓湯　熱症　雜症

一陰陽ヲ分利スルトアリ瘧ノ主方ソ瘧ノ間日ニ合平胃散用テヨシ

一痢病ニ黄連奴テヨキヿ多シ胎アル婦人ノ痢ニ[illegible]別テヨキソイツトモナク用テ渋滞ツヨキトキハ倍連奴熱ツヨキニハ倍連苓用テヨキヿ多シ常ニハ人参ヲ去ルソ

一湿熱ニ感シテ汗不止ニ汗ノ薬ヲ用ユレト尼蒸ニトシテ汗出ルニヨツテ此剤ヲ用ル小便

ヲ通下焦ノ濕熱ヲ去タレハ蒸熱ミトムス熱ヲケタルユヘニ汗止タツ熱病ノ汗不止亡
陽セシトスルニ參附屬ニテ頭汗不止ニ一味ルニ加黄栢為湯テ用下焦ノ陰火ヲサマシ
タレハ頭汗止タルヿアリ其理ニ同シ
一大便水ノ如瀉シアツク覺ル熱瀉ニヨキソ芒ヲ加ルヿモアリ
一日ミ時ヲ定テ頭痛スル者ニ用テヨキヿアリ陰陽ヲ分利シタルユヘト見ヘタリ此ハ
瘧ノ屬ソ
一世医熱病小柴大柴ノ場或大小承氣ノ場ニ大便瀉スルユヘニ此剤ニ參ヲ多加ヘテ用ユ
[illegible]者多シ是ハ其場ミヲ不知庸医スルヿソ與ニ共大医ト見ユレ𪜈庸医アリ

二十三　胃苓湯　泄瀉　痢　腫脹

一四季𪜈ニ大便瀉スルニ方ソ熱ナキハ加木ヲ食モ少滞リ大便瀉スルヲ平胃散ヲムス
テ脾胃ヲスカシ食ヲオシテ分利スルユヘニ水道ノ色ギレシテ水流心ソ
一痢ニ加柴木苓奴テ用ルソ或連ヲ加玄ミノ加減ニ木兵トアレ𪜈兵ハスラリトセヌソ奴カヨキソ
一水腫脉進有力ニ加車通灯心ヨキヿアリ脉不進弱キハ脾胃ノ元陽虚冷ニ不可用
一疝氣臍下攣ミ陰囊痛ニ加木兵瓜ヨキヿアリ
一瘧嘔吐スルニ胃苓湯去圭加柴木兵ヨキヿアリ
一胸フクレ不食スルニ加兵ハヨキヿアリ是ハ脾胃モ少塞リ大小腸不和ユヘニムネフク

レ不食シ濕（シツ）ニモアタルユヘニ夏秋ノ間如此ヿアリ
一此參苓湯ヲ合シニノ主方トシ痢ニ加減シニノヨキヿアリ渋滞加連奴或桃或少
熱アリニノ大便モ不調ニヨキヿアリ

九四　痢治法經驗

一昼夜百（行）雖度多粥二三椀食之自到圊厠雖進有潤則可治周歳或二
三歳之児有娠顔而神不衰則易治到圊粒行欣渡似危而間々神色不衰（衰）
乳食亦不絶者非不治之屬告于史（父）母以危而可施治
○敗毒散加連倍奴疫痢流行之主剤
○甚渋滞大柴胡或加桃或桃圭將中或加柴苓　古云欲以大承氣者先可
投大柴胡是推重之意也回春痢門投六一順氣湯夫大柴胡且桃圭將ニ剤
者六一順氣湯之勢微者也
（此所追加頭書也）
○大柴胡湯竹葉石羔湯ヲ合スルアリ大柴胡ハカリ用ユルモアリ吃逆ニ竹葉石
羔湯有神其場々ヲ可工夫
○無熱者胃風湯加桃奴或苓ノ　○不換金加連（中）如大能通利（奴）
○黄芩芍藥湯則苓芍中加奴能和○和中湯加減飯芍苓連空桃中有九則
此剤好　○無熱渋滞三和散加桃奴有熱加苓ノ　○無熱而渋滞玄治九味

○調理七味、白本散、異功散
○寒熱痢數行以敗毒散倍奴加連陳蒼米投之後柴苓湯加連奴渋滞甚則以
不換金加連大奴大此治法好以此意所記前々之例可参考ノ
○痢者雖補湿熱鬱滞補住之則加裏急後重是熱也七日以前病人甚疲則主
方之内少加之五分一分之加参後重渋滞甚則減之夫不見黄糞之中雖用之黄糞
来而後可補之補而食盛則可太之七日以前雖有虚先以芩連桃奴之属
以人（加）参之意也間々三四五日之内有理中湯人参三分之症此是脈
弱咳逆而甚危可救十之一二
○痢度減之中頻腰痛雖堪有此是黄糞始而来或燥屎交来大腸
之道路爛而痛也以桃奴之属而可也黄糞燥屎来而後痛和
○六七月之間痢之初発似熱病而口甚渇譫言舌乾燥咳逆中暑人参白虎
湯三四貼凡熱去咳逆止是亦不可不知
右痢始中終之法治不惑岐而ノ進理予数年試之
○痢之病家去度数稍減矣然食脈如前則可附意到圊居之久五行而中
十行也或一行貴十行小児如此間々有
○小児痢嘔吐脈ノ進数無能乳三四之後不能到圊自利不起床者難治矣命

間虚人間々有之得補而治者以無熱之有熱則肛門渋滞努力而大便臭上中焦之之気
虚而下焦有湿熱之鬱則雖補雖瀉仍死補之則加嘔吐或加努力依嘔吐努力而
上中焦之気弥虚故不治
一噤口嘔吐有胃熱而冲上之雖治素有虫積而嘔吐者易治此是脈不虚数而心下
鬱滞仍知之且大便止渋滞努力甚則気々自肛門不行而却逆上嘔吐者間々有此胃
熱嘔吐之属肛門ハ和矣大便能利則嘔吐止

廿五　浄府湯　虫積　雜症

一此方ハ熱アル虫積ニヨキソ肺疳方或ハ六味ノ朮苓桂陳皮永丁ハ虚冷ノ虫積ニヨシ
一此方ハ余若年ノ時半井家ノ秘方ト云フヲ聞テヨリ心ヲ付テツカイ知タソ奇ナル剤ソ
一苦キ味ヲ好ムト云虫積アル者ニヨキソ常ニハ太胡連加姜制夜連テ用ルソ苦ヲ好
熱ハ強キニハカラ胡連ヲ加テヨシ眼ノアシキハ胡連ニモヨシ或代連或用ヒ差引ニテ吉
一胸ツカエ或腰痛アリテ熱アルニヨキソ　一大便瀉スルモ虫積ユヘニ瀉スルニヨシ
一咳アルニ加好杏ヨキ事モアリ虫積ユヘヨリ咳アルハ本ナカニテノモヨシ
一子熱ノ虫積ニハ浄府湯柴平湯ノ二方ヲ常ニ用ルソ
一童十三如上痛風手足痛々虚処ニ核ノコトクシコリタルムサ〱トシタル物アリ熱モアリ
胸ヒツカユルユヘニ虫ヨリナスト思テ用テ大功ヲ得タリ

一婦年卅産後浮腫腹脹（二十後害アリ）参朮ノ大剤ヲ用テノ不効心下ヲ按セハ分ヘトム子アシキヿアリ心下不好按大便赤溏コ虫積ヨリ此症ヲナスト思テノ則与テ之人参五両ツヽ加全安

一婦年三十五六常帯下アリ熱ハ少ツヽアリテノ不食或心下塞時々腹痛大便不調久臥床或咳有脉進腹胸ニハ潤アリテノ心下按テ胸中ニコタヘ強テ按ヿヲ不好此剤ヲ与テ時々人参ヲ加全安

一婦年卅三産後大便不調フラノヘト煩テノ疲臥床此前如此理中湯ヲ遊シテノ治タリ此度ハ不効連々ニクタヒレテ脉虚ヲヌ進脉ヲ見レハ生脉ニ非ス食減シテノ技究ルヿ心下ヲ按メ見レハ積横リ按メコタヘ不好按ヿア此剤ヲ用人参モ去リ退虫丸ヲ兼テ食進全安

一婦年五十腹痛時々止時発有左積連々腹脹無九其婦好苦味而此剤ヲ与ヘ退虫散ヲ兼テ用全安腹脹減而後腫気去身痩如此柴此剤ヲ其マヽ用人参ヲ加全安　一老婦七十五時々腹痛不食無九脉五ノ進此剤ヲ与全安

一婦年卅産後口舌痛以七味白朮散漸安以後大便昼夜五六行参朮姜桂ヲ以テ不効或水瀉以訶子肉豆蔲三日調トイヘモ調則腹脹或呑酸瀉時モ呑酸噯気アリ三和散ヲ以スカシテノ見レモ無効而浄府湯ヲ以去参与之大便調而呑酸止諸症全安

一男年廿五咳吃不已以浄府湯加丁子杏而安

廿六　九味清脾湯　瘧　雑症

一瘧ノ主方ソ大体ノ瘧ハ発日ノ朝一番煎二貼與ハテノ能解スルソ生姜二三片入テノヨシ

一瘧治法初発ハ十神敗毒清解ノ属ニテ汗ヲ出スヘシ始テ瘧フルウ者ハ急ニ不解ソ連ヒニ軽クナリテ解スルソニドメカラハ四発五発ノ間ニ解スルソ軽キ瘧ハ汗ニツレテ自解スルソ抱テ瘧ハ湿熱風寒ノ邪伏シテ発日ニ外ヘ出ルソ感スル処アサキユヘニ熱病ニナラヌソ四発メノ朝九味清脾湯十卜用五発メモ用テヨシ生姜一匁煎シテノモ解スルユヘニ煎湯ニ三四五分モ入テモヨシ虚人ハ参養胃湯ヨキソ或草果兵ハノ二味生姜ヲ入煎用テヨシ或兵一丁生姜又ハ石菖根一匁兵一匁煎用能解スルソ瘧日経テノ不退ハ理中湯柴朮青兵ヲ加用テヨシ尤積アリテ解カヌルニハ二三ニ柴朮青兵ニテ草十ト用虚人ニハ参テヨシ兵ハ一味生姜一匁煎発日ノ朝一番煎ニ貼用テ解スルヿモアリ虚人ニハ参一匁或五分生姜五分入煎発日ノ早朝用テ解スルヿアリ三四ヶ月半年モ不解ニ十全大補湯ニ加青熟附用テヨキソ三日五日ヲ隔ツル瘧アリ是ハ知レカヌルソ発日ニ寒戦アリテ翌日一日熱有テ三日メノ朝熱去ルソ如此格ヲ以テノ考レハ知ルソ病家ニハイナヿニテ寒ヽ戦熱アリテヨクナルカトヲモエハ又発ルト云モノソコニテ心ヲ付テノヨシ不解時ハ小便赤寒熱発スル時小便スム者ソ如此類ハ六君或ハ理

中湯ニ加青兵丁菓ナト加テ或大補ニ附ヲ加用ルソ
一癃灸処ハ九十一十二十三十四膏肓ヨシ左積アリテ久不解ニハ章門経門ヨシ
京門ノコカ
一刺病去菓加連翹或刺後ノ寒熱亦可ヘ亨之瘧躄之部可参考
一大公菓テ常ノ熱アルツカエニ用ルソ加兵萑テヨシ
ラフクト熱ナトアリテ咳アルニ杏兵ヲ加テヨキコアリ
一肝経ニ欝火アリテ左ツカエルニ兵萑ヲ加テノヨシ眼ナト赤キモ用ルコアリ
一酒後盗汗アリテ熱フラクアルニ大公菓テ用ヨキコアリ柴苓湯胃苓湯ニモヨシ
一小児左積アルニ大公菓加兵用ルコアリ浄府湯ヨリ軽キソ
一産後日ヲ経テ熱少ツヽアリテツカエルニ去菓用テヨキコアリ肝経ニ熱ノコリタル症ニヨシ
此剤去菓テ用ル症ハ少熱アルツカエニヨシ虫積ニモ欝症ニモヨキソ

廿七　龍膽瀉肝湯　雑症　下疳

一肝熱ヲ瀉ス剤ノ最上ソ故ニ眼赤キニヨシ實熱ノ肝ニアルヲサマスソ
一陰茎ノ破リ瘡毒トナランドスル時陰茎腫ルヽニ昼夜ニ貼ツヽ用テ瘡ノ洗薬ハ地骨
皮黄栢煎シ一日ニ三度ツヽ洗無憂膏ヲツケテ其上ニ葛粉黄栢二味則葛百散ト
名ツケテ此ヲフルイカケテ毎日如此シテ腐リ多ケレハ三年ニナルスカ味噌ニテ
一日ニ三度ツヽ洗ソ生肉出レハシミテ洗レヌソ生肉見ユレハキス口赤クナルソ赤

タケレハヤカテ愈ルソ愈ニ後頭脊中ニ小瘡出ルソ惣テツ子ノ草ニ気ノ状トハ遠ソ
綿花瘡ト云テ瘡ノナリキワタノ花ノヤウナソウミト肉トヒトツニマヒアカルヤウナリ
テノ出来ルソ愈タルアト赤黒クナルソ日ヲ経テ自消スルソ此傳秘方ナリソ何レ
ニ用テモ能愈ルソ膿多出テノ臭ヿ甚キハ悪症ソ
提耳談　委ス　参考ノ
無憂膏　ヤシホノ油ニ両二分　南蛮蝋（乃黄臘也）一両　川芎　当帰（赤メ各二匁五卜）丹卅匁　胡ユノ油ニ合
一番ニ胡ユノ油ヲヨクヽ煎シ余茶ヲ一度ニ入火ヲユルヽトシテ煉之
秘傳膏目葉（王子膏也）　會津蝋十匁　雞卵二ツ　松脂十三匁　右蝋ヲ鍋ニ入湯ニテ（不解）
能サマシ其上ヘ松脂ヲ入煮トロリト湯ニテリタル時鉢ニ水ヲ入布ニテノコシ何程モ
引ノハシ何反ニモスル也　私傳ニ云先松脂ヲ能煮テノ布ニテノコシ水ニ入煉
ル胡ユノ油能程ニ煎シ其中ヘ蝋松脂ヲ入ヨクヽ煮テサマシ其中ヘ卵ヲ入レヨ
ク煉合又煮ルニヨクヽ煉リ煮テ鉢ニ水ヲ入其中ヘ布ニテノコシ入ル也水ヨリ
上テノ焼物ニ入置並ナリ王子膏ヨシ膿多不愈時ハ無憂膏有妙
一淋病甚痛ニヨキソ甚則ハ必此剤ソ
一婦人甚怒眼赤淋痛ナトアルニ波テノヨシ
一田乃年六十小便閉三日不通若服如此一医用瀉肝湯而頻通ト云故ニ此剤ヲ又用
タレハ速ニ通シタリ　淋症痛ニシテノ後不通ニヨキソ

一男年四十余吐水並涎沫多為下已虚人多地黄附子亦之補無寸効仍与此剤頓安
一妾遺多湯ヲ挙多此剤為小貼投之有効是肝火
一ケ様之剤ハ人用カヌル剤ナルユヘニ此症アマルソ故心下ノ虚実ヲ正シ男婦憂
欝抑欝ノヤウスヲ考テ虚実アラハ可投ナリ

廿八　正気天香湯　心虚　痰ニ鬱　雑症　気

一此剤ハ鬱ノ気ヲ散スルト云カ主ソ男婦トモニ気ハ塞リ胸ト支或不食ニ必用ソ平常用之
一平心虚ニ痰ト鬱ト名ル症アリ此症虚実ハ癇ニ症也然レトモ癇ノ未発ソ何トシテ知ルヤ
ハ癇症ノ折々発リ度々絶入タル人ノ語ヲキクニ病症数ケ條アリ其症備ルユ
ヘニ未癇ハ不発トモ癇ノ治法ヲシテヨキソ病人ニハ癇ニナランスト云コヲキカセヌコソ
婦人ナト嫁セヌ女ハ医ノ一言ニテノ大ナルキズヲ儲ルソ其症　気沈陥而如絶気
如縲系而欠　怔忡　易驚　世コ不忘　何コモ気ニカカルソ　腹カナシ
食ヲイツキ　舟車ニノル如ク身ユラユラトシテ揺　咽喉物ツマルヤウニ覚　胸騒々
痛　ウラカブナシテ下ニ無力　驚則身戦慄シ　舌ナムヤウニ覚ルコアリ
夜々不眠　夢多　不寐　気逆上　眩暈　此症皆湿ト痰ト火ニテノ心ハ素弱キ
処アリテノ気鬱スルソ惣テ気鬱ト云ハ心モ気モ鬱滞スルヲ気鬱ト云
宜ツミ論ヲ入テ可知ソ三和散ナトニテノ順流スルソ是心ハ素弱キ故也

故ニ気鬱痰ハアルユヱニ心ノ驚ニツレテノ気逆上スルソ心弱キユヘニ気ヲ自由ニツカフコカ
ナラヌユヘニ気ハ塞ルソ必竟悪ト癖ナリト云モノソ然レトモヤマイユヘニ愚ト痴ナラヌニ
ナルソ心モ[illegible]出来痰モメクレハヨリナルソ是ニ癇ニ症未発ニシテイマタニ癇トナ
ラヌ也此症必後ニハ度々絶入テノ癇トナルソ惣テ男婦俄ニ絶入ッカ又冲上
ルト云ハ皆ニ癇症トシルヘシ虚人ノ絶入ルハ元気虚而クラクラト眩暈スル也是
者気虚而痰ノアル人ニアリ常ノ眩暈也是ヲ分テノ可知眩暈門ノ治法ニテ可知

廿九　心虚痰ニ鬱之主方

○実　天香湯合二陳湯或合平胃散　二陳合烏沉湯　三味貴苓
清心導痰湯　温胆湯　沉丹ハ生姜　二陳湯加ソ吉西奴紫青丹ハ沉同生姜
○虚　安栄湯　香砂養胃湯　半夏白朮天麻湯　理中湯　安神散
帰脾湯　六味丸煎　八味丸煎或淋出　沈香天麻湯　六君子加
定沉香　先大法如此ソ虚実兼アラハ此症多シ故ニ虚実ノ剤
兼用テ吉　悪心嘔吐ヲカヌルハ補ヨロシカラス多ハ人多不症モノ多シ故ニ兼用レモ後ニ
兼用テヨシ或代沙参ソ沉香天ノ湯ハ補ニアラス却剤トテノ痰ヲヒヤカシテ行
ルソ故ニ動気ノカアルニハ不宜ソ動気ノカアルニハ清心導痰湯ヨキソ沉香天ノ
湯ノ症ハ脈緩動気趺ニウツトリトシテ趺ナルニヨキソ食イツキスルニハ六味　八味

淋出シ兼用テヨシ安栄湯モヨキソ症ニヨリ人参養栄湯ノ應スルヿモアル
ソ清心柳胆湯ノヨキ症モアレ圧多ハ不適中症多シソレ圧ニ清心柳胆湯モ心ヲ補シ
痰火ヲ清シ肝火ヲサユル丿薬ナレハ其ハ症ニ淋出シ腟ク兼用テ功アルヿアリ
一吐逆不止ニ淋出シ或煎ニ用テヨシ天香ニ合平胃シテヨキソ
後一不食ニ天香ニ陳平胃湯トナシテ用テヨシ
前一腰痛（痛）ニヨキヿ多シ
一不食スル症（病）ニ心虚ノ疹ゞ爵時ノ症アリ此不食ハ不好米穀半難弐年不食スルア
リ不好米穀ユヘニ虫積ト思医多シ或脾胃虚トスルソ老人ノ膈噎ノ不食ニ似タ
リソレユヘ疹ゞユヘノ不食ト云ヿヲ予アタシカニ暁ル不食ノ中附ヲ食シタルモノアリ附
ヲ燒テ者ゝタルハツカユルモノナルニ却テノ食スルソ摠テ疹ゞ症ハ魚ヲ好ム者多
シ常ノ症ナト疹ゞアルユヘ魚ハヨク食スルモノソ豆腐小豆炒ノ米麺類酒ナトヲ食
シテノ形不衰シテ日ヲ経ル者ソ天香湯或ニ味其外心虚疹ゞ爵時ノ法ニ治シ中ヲ
アシライニノヲフク中ニ自食進出ル者ソ
一大垣ノ執權耳鳴甚シ上気或頭眩嘔吐不食年五十三労役之男也殺医投多不
或為脾胃之虚而无寸効予知此男素気強而形虚因労役怒爵乳
不順也仍天香湯合ニ陳或合平胃散与之三月全安

一摠テ男婦圧ニラフノ上煩テ補スレ圧不尤悪心アリテ不食スルニハ此剤ニ三恩ヲ付テ可施治ソ
廿　柴胡芎帰湯　風　瘧　痢
一柴胡芎帰ハ余工夫ヲ以テ自由ニツカイ知タツ方ノ主意血中ノ邪気ヲ陽分ニ出ス薬ハソ
然レハ血中ニ風寒暑湿入タルヲ發スルニヨキ薬ナルユヘニ用シメテミレハヨク応ルソ毎貫ハ陰
瘧ノ薬ナリ陰瘧ト云モノ風寒ゝ暑湿ノ気血分ニクヽレ伏スルユヘニ夜發スルハソレヲ
血中ノ気ヲヨメクラシ表ヘ發スル薬ヲソヘテヤルユヘニ表ヘ發スレハ陽分ニ出ルソ面白キ理之
タトヘハ血中ハ陰分之夜ハ陰分之皮膚ハ陽分之昼ハ陽分之以是可知汗ヲサセヒレト思フ時ハ上
黄ヲ加ヘ或加ソ羌有熱則加芩汗多則加圭或合黄芪建中湯常ニハ参ヲ去テ虚人
或平人ノ風熱ニ用ルソ加減シテ表ヘ早ク發シ風寒ヲ速ニ散セント思フ時ハ發散ノ
薬ヲ三味加ル内熱アレハ芩連ノ屬ヨシ
一血痢ノ初發ニ芩ノ奴桃ヲ加ヘテヨシ　一瘧無汗ニ必用ソ加ユルソ汗多則加圭
一風疹トテ俗風ホロシト云ニ加羌カ蟬用テヨシ
一疹ノ初發ヨリ熱去ルマテノ加減シテ用テヨシ疹ハ血中ニ風寒暑湿ノ気入テ熱
トナリ孚動シテノ出ルユヘニ一段ヨキソ熱強キニハ加芩連之屬疹ハ四五日出テ没
シ出残タル處ヘハ一ヘン出シテノ收リ脉シツカニナリ熱退クハ順ナリ疹一二三日而
收解毒為熱ハムツカシキソ清熱補血消毒スルソ疹ハ壽世保元ノ[illegible]治ヨシ血分ヲ乾シ血虚スルモノソ

一麻疹初発小柴胡芎歸湯　今連消毒飲　熱甚則防通聖散　升麻葛根湯合小柴胡大便甚結則大柴胡湯合四物湯　麻疹出後熱アルニ四物湯芩紅　熱甚嘔吐スルハ四物湯合黄連解毒湯或以逍遥散合解毒湯　犀角地黄湯　咽痛甚則加大力子射干或玄参　疹後之不食四物湯加曲或縮砂　疹者不宜補陽以滋補為主

解

無以人参八物湯可也先兒是大法也寿世保元或世医心法之治法可参考也且

汗゜

愈後湯ヲカクルト云ヿアリ変湯トシテ大変ノ前タル汗ヲ湯ノ中ヘサシソヘテ沐スルソ然レ𪜈熱ハ少スミテノモ残リタル中ハ不宜ソ小使ス、ニ熱去リ食能進出ニテサツトカヽリ或寒ニ気ル中ナラハ一身ヲ布ニ湯ヲシメシテ拭テヨシ多ハ瘟疫ノ気ニフレテ出ル熱毒也故ニ大形ハ本復シテノ湯ヲカヽリタルカヨキソ婦人ハ早ク沐セ子ハ肌悪ナリテノコセカサナト云ニモノニナルトテノ湯ヲ急ヿアリコセカサニハナラヌヿソト云ヿヲ云キカセ気ル分本復シテノ後沐シテノコセカサニナラフルト云ヿヲキカセ熱スキト去ハ小使ス、ニ食能進家内歩ノ行服沐シテ可也

風熱虚實自得之剤

一初発敗毒散加リ葛青或唐蒼或十神湯加柴苓ノ余熱不解脉数肌熱、頭痛清解湯或余熱不去咳嗽不能偃臥則加減瀉白散加奴令仔杏梁

一悪風多汗頭痛不止脉進加無力加減沖和湯脉弱者加味益気湯有咳加杏虚人咳喘不止六味丸前胡加仔杏或雷百或無熱則加永宕仔杏

一寒熱不甚夜分有熱則柴胡芎敀湯或芩夕子婦太紅或ソ巻

卅一　清咳湯　咳血　吐血

一咳血ノ剤ソ是ハ虚症ノ痰血ヲ治スル薬ニテハナキソ胸中脇十トニ痰血アリテ咳ニツレテ来ルニヨキソ

一此症ノ咳血ヲ労症ノ痰血ト思タカヘテ前医治療セレハカトラヌニスラリト此剤テヨキヿアルソ

一茯苓補心湯テ痰血ノ治スルヿアリ太公地黄加膠テ治タソ

一痰血ノ症火動ニテ来ルハ不治ソ心虚痰鬱ノ症ノ咳血痰ニ血サツト来ルヿアルソレハ脉緩ニテノ脉ニ火気ナシソレハ補心ニ太公地テ加減シ又ハ熱アラハ清咳湯或天香湯ヲ用胸中ヲ順スルハ自止ソ一口ツヽ吐血スルモアリ脉ノヤウスト大動ノ脉ト遠フユヘニシルシカラス是ハ滞タル血来ルアトニ嗽ソ血ナキソ

一労症ハ痰血ハ日々寒熱往来少ツヽアリ胡ハ間午前熱アリ気ル不快ソ陽分（一本陽）ノ煩エヘニ朝サメセヌソ日暮ヨリ却テ快キソ外邪ノ属ハ朝サメスルハ陽分ニアルユヘソ寒ハ熱盗汗脉進無カニシテノ痰血吐血少ツヽアルハ不治也日ヲ経テ後大便ツ四ヘト遣ミニテノ足跗浮腫シテノ死スルソ

一吐血ノ一格アリ吾見来ルニ未発ニ知テノ治七八十之三ヲ救フヿアルヘキソ一河之男或

胸脇ナト痛白男婦ニアリ吐血スヘキ者ヲ知ルハ二モノ色蒼々唇黒ニ而黒キハ必吐ノ後
ハ唇白脱血シタル顔色ノ如クナル色モ又キ下血多シタル者ノ顔ニアリ見合ヒテ病
体ヨリハヨキソ胸ヲケヒワクトシテ好合ヒ後毎節ハリ痛或腰痛ニ或脊中痛
胸ノ中ニ痛アルモノソ或胸中ニ食滞ル如ク或左半身痛面色蒼々トシテ能食シ
飲連々瘦耳輪爪甲唇色無血色ナリ是以知ル血虚肝脾ト云フ傷寒ニ脊
ニアリ當飯活血湯ノ條下ヲ可見此ハ大便時々黒ク溏スルソ是ハ瘀血アル症ノ
熱ヲ得タルセソレニハアラスシテ且酒ノ人或労役ノ虚人血肝脾胸膈ノ間ニ滞リニテ
血塊ノヤウニナレハ血外ヘメクラスシテ皆其所ヘヨルト見ヘタリ肌ニ血色ナクシテ内ニ
滞也人ト云者腹ノ内ニ積ニテモ血塊ニテモアレハ其所ヘ気モ血モ行ト云テ有気血
不行死血トナルハ自大便ニ来ルソ後ニ吐血スル症ハ肝脾ノ間ニ血滞リ其血ノ凡ル處ヘ留
リテ外ヘメクラヌト見ヘタリ是肝脾ノ気虚シテ血ヲ血脈ヘヤラス肉中ヘ流スト見ヘタリ
未発ノ時胸ナトキヤく痛ム時此理ヲ察シ後ニ吐血スルヿアルヘシ吐血ヲ防クヿ
ナリカヌルヿナレ圧其ハ保養忘ヲツケテソレニ吐血スレハ無是非ヿセト病家ノ親族ニ告
テ保養久ヘキヿソ後ニ医ノ見モ合テ吐血スレハ病家モ眼ノ白ケタル處ヲ却ニ感スルモノ
一吐血シタル病人多不治一婦年卅三胸痛ヲ知ル瘀血投桃圭将則大痛止三年之後夜
半大吐而手足冷脈虚微既如死仍招予々曰吐者不血否未知之取壷見之血二升

絶

余吐之予与沙参理中湯大便亦下瘀血一升迨明手足温三日之後又吐血ニ極旦
下黒物又脈弱猶以沙参理中湯加苓芍之類剤經日而思食半年而全安
予是ヲ見ルニ婦人ユヘニ活タルト見ヘタリ男子如此則多不治然レ圧乃酒之男吐瀉
升何イナキモノアリ兎角吐血ノ後脉不進ニシテ連々食進出ルヲヨキソ脾胃気コスタ
ル吐血ニシテモ治スル者十之三四モアリ脉虚数顔色無血吐而ノ後胸痛不絶者死
改正男子モ吐血ニシテ治スル者半也熱ハアリテ吐スルハ逍遥解毒湯加減ヨシ吐血ニシテ
後熱ナキモアリ気力大格ヨリ起臥食ヨキハ調理ニシテ治スルヿアリ
一熱病瘀血アルモノ咳血ハ不効モノ多シ
一吐血三口スレ圧気力常ナルハ苦シカラスカヤウナル者モアリ
一吐血ノ時分ハスル中ハ残血アリ朮苓黒炙氷雀中ナトニテアシラヒイテヨシ独参湯
ヲ煎シテカニ少ツ与ヘキソ但独参ヲ与レハ嘔スルニ害甚アルヘキソ独参ハ大法ナル
ユヘ煎シサセテヨシ或吐血残リテアルトモ兎角元気ヲ助クヘシ血脱益気ト古人之法
陽生則（一本補）陰長ストモ云医多ニ此理ニモイヤトハイワレヌソ吐血シテ血ニツレテ元気ヌケルソ
悪心アル処ヘ強テ用レ此ニカヨリ血ヲ誘テ吐カスル心アリ吐ケハ元気復スル様ニ
朮苓沙参黒炙氷耳ニテ和ニシテノナリ三利ヲ加タリヿアレハ此理モアリト参考
病家ニモキカセテ先必死ト心得テ居ラレヨナト云テノ療治ソ脉投ニテ熱アル又

可吐ソ是黄連解毒湯ナトノ場ソナ之一熱ニ云テ血下行スルヿアリ

卅二 滲湿湯　以唐蒼　中湿

一湿ニ感シテノ諸症ヲナスニヨシ何ヿモ湿ニ感シタルト云カ目アテソ加減ノ次第ヲヨク〳〵 ○可参考
一大便瀉シテノ調カヌルニヨキソ　一身浮腫スルニ湿ヨリ発リタラ台号ノ加車前灯心或通之属
一此剤ハ少カト心得テ医ノ心ノツカヌ剤ソ湿ニ感シテノ諸症ヲナスニ尚色々ノ病症ニ用ル剤ソ
様々ノ功アルヘシ　予ハ手足麻痺或痛或痿躄ノ症ニ未ノ加減ヲ用覚タソ故別ニ言ヲ奉タソ

卅三 雙和散（入門内傷七味黄芪ヲ官熟主芍ナ）

一此剤ハ四物湯 黄芪肉桂甘草加ヘタ者ソ則黄芪建中湯ヲ合シタリ面白キ仕立ナル
ユヘニ予多用ヒツケテ子氏出シタリ　一汗不止ニ用テ功アリ　一人参ナキ補剤
ソ或主ニテノ人参代モアル経ニヨキ剤ソ　一婦人産後ノ保養ニモヨキソ
一病後ノ保養ニヨキ薬ソ

卅四 藿香正気散　風　暑湿　雑症

一此剤ハ風湿暑寒湿ニヨキ程ニ四時ニ可用薬ソ　一夏ノ間不食ニヨシ吾止テ用
一夏ノ間ノ風ニハ柴葛ヲ加ヘテ功アリ　一大便瀉スルニ猪沢苓ヲ加テヨキソ
一痢ノ疰キニ加連奴用ルヿモアリ　世医ハ主ニカトシニ用ルモノモアリ
一湿ニ感シタルニハ唐蒼君ヲ加ヘ去木ソ

轉筋　草

一瘧ニヨシ加柴葛羌或加柴芩二ノ常ニ用発日ノ朝ハ加草果或前ニ云タル発日之
朝用ル剤ヲ用テヨシ
一虚症ノフラ〳〵シテ前医補剤ノ重キ療治ニシタルアトニスラリト用ニテ大利ヲ得ルヿアリ
一寒湿ニ感シタルニハ以木代唐蒼君加羌テ用レハ五積散ノカロキモノソ
一暑気ニアタリ風モ少シ添タルニハ加草果扁熱有ニハ柴葛或芩テノ
一腹痛ニ加木テヨキヿアリ　一霍乱轉筋トテコフラカヘリシテ筋ヲ引ツメ丸キ様ノ
大キナル物足中ヨリ上下シテ難堪痛ム有是ヲ見ル（三證）ニ熱ナリ加草果連瓜ソ或不換
金ニ加瓜兵連或加竹茹危霍乱轉筋ハ甚シク苦ソ腹ニ入レハ死トアリ三和散ニ等（[illegible]）
連ヲ加ルヿモアリ節華ルユヘソ節燥ニ搏節スルニ六味丸前ニ當帰ヲ加ヘ淋出シ兼ルヿモアルヘシ

百剤抄云

○水毒食毒ニ感シタル病人ニ必用○気ニ出タル病人ニ専用トス故ニ中気ノ症或不眠ニ
效アリ眩暈メ病証分別シ難キ者ニ先此方ヲ用ヘシ○凡治諸風湿就中湿気ノ痺
能治ス故ニ脾湿ノ者ニ専用之然ル故ニ腫気脹満ノ病ニ間用ルヿアリ故ナクメ
手足浮腫シ或ハ面浮腫シ或ハ腹脹実シ熱往来スルニ此方宜シ産后ノ腫気ニ（行）余
症ナキ時ハ先此方ヲ用○痢後瘧後等ノ腫気ニモ先宜用○食ヲ進気ヲ御
ラシ痰ヲ治スル功能多シ

卅五　九味理中湯　喘急

一此剤ハ喘急ノ無熱ハ呼吸速迫シテ不能偃臥痰アルニヨシ一冷痰ハアリテ不食スルニモヨキソ
一腰痛ニモヨシ疝気腰痛ニモヨキソ疝ニ気ノ痰ニ疝ト云アリ入門ニ見ヘタリ

膝

一膝痛ナトモ冷ニ痰ヨリ発リタルニハ加膝仲テ功アリ
一此ヤウナル剤ハ不尽ソ手相アルモノソ必竟冷痰ヲ順スルト云カ目アテナレハ症ハ何症ニテモ冷痰ノ根ヲ見付タラハ与ヘキソ
一人ニ寒熱虚実ノ生得アリト云ヿ此ナリソ心ニテモ知ルソ喘急ハ十之七八ハ熱ヨリ生スル者ソ肺熱腎火熱痰アリテ風寒ニ感シ発スルソ中ニ根ノ冷タルモナアリ此症ハ生涯温薬ハヨキソ熱カテナル生得ハ温薬ハ忌症セヌソ是ハ芩連常ニ用テモソル

心

ニカラスタトヘハ釜中ノ温湯ノ常ニ今ニヨリハ沸帰キ症ソ故ニ指ハ水ヲサシソ字沸己ルソ虚冷ノ症ハ温湯スルニヤスキソ故ニ指ハ火ヲツヽテアタヽメ子ハ常ノ温湯ニナラヌソ此理中湯モ常ノ虚ノ冷ナル人喘ノ痰ハ肺ニアリテ呼吸速迫喘急アルニヘニ温薬ニテ和スレハ速ニ上痰モ順スルソ痰ノ症ニ用レハ却テ喘ノ痰ヲマスソ
一男五十呼吸速迫而如欲絶肥白之男也脉進而弱一日無間発而汗有医欲以滋陰

素

降火湯予呈参虚者以当帰則亡陽而可死仍止服此剤加走適中諸症安

卅六　分気補心湯　腫脹

桑皮　茯苓　吉通　芎　茜西　青　奴　井　細木

善来之

一此剤ハ心気ノ鬱結四肢浮腫上気ノ喘急ヲ治スルトアリ補心ノ薬ハ不見大ニモ順気ヲ本ト程意モ按ヘキ腫気。
一男年五十一身浮腫甚医数方無効脉滑数ヲ此剤ニ加連テ功ヲ得タリ。ノ症ニ用ソ
一気鬱滞シテノ腫脹スルニ他薬無効キハ用テ功アル喘ノ痰喘急アルヨシ一疝気（腫気）ニモヨシ

卅七　柴胡散　小児雑症

一此剤小児眼胞ニ小瘡ナト出眼痛或赤眼中如銀白膜ナトアルニ用テヨシ
一熱アリテ腰痛スルニ功アルソ　一肝火アリテ怒易ク左積アリテ眼モアシキト云[illegible]用テヨシ

卅八　胃風湯　泄瀉　痢

一冷ニテノ瀉スルニヨシ冷湿腸ニ入テノ瀉スルソ腹鳴ルソ加木常ニハ代沙参
一痢病無熱渋滞スルニ加桃奴ノ熱アルニハ加柴芩桃奴弱キヨヤウナル痢ノ熱アリニ忌滞スルニヨキソ
一熱病痢血ノ棄ルニ弱キニハ加芩ノ桃テ和シテ罫道ヿアリ桃モ不用ヿモアリ痢ノ血ノ根ホトケテノ来ル中ニハ和シテノ熱アラハ合連ナト入テノ参ホツ見分カイテノ加用テヨシ
一水瀉ヲ留シト思フトキハ木栗米一撮ヲ加ルソ一虚人ノ臍下冷痛スルニ加木ヨキヿアリ
一霍乱吐瀉ノ後大便モ不調弱キニ人参三分宮木ナト入テヨキソ
一痘起発カイナキニ加木用ルヿアルソ或去芎ソ
一産後ノ瀉ニモヨキソ因ニ症加減スルソ　一小児ノ弱キ大便不調ニ用ルソ

一八物湯ニ云熱甚久キ者ソ其意ニテ可施治湿ニ感シ久キニハ去朮代唐蒼君ソ

廿九　痛風羌活湯　痛風　脚気

一痛風ノ主症ハ風寒湿ニ感シテ一身痛ニ痛處手足ニ節々ハルハソ左痛甚シクシテ
ヤハラケハ又右ヘウツリ痛強ニ痛テ和キ手ヘ注又足ニ流テ痛ム中ニ和クソ足ハカリ
久シク痛ニ節々ハルヲ脚気ト云ソ大形同シ屬ソ必竟足ハカリ久シク痛ヲ脚気ト云
ソ治法サノミ不替ソ熱アリ冷アリ熱ハ脉数弦緊ホノ状アリ冷ハ微細而無力悪寒足冷ソ

一痛風ノ主方ハ初発痛甚虎ノ如ク咬ヲ白虎歴節風ト云ソ防風通聖散ニ唐蒼梧ヲ
加用テヨシ稍和シテノ九味羌活湯或痛風羌活湯ヨシ熱少シ残リ久ル巻良生菜ホ
ト云ニ滲湿加減ノ方ヨシ大痛漸和シテ後用ルソ足腫痛強キニ敗毒ニ蒼君将ヨキソ
是風寒湿熱ニ感シ熱アル痛風脚気ノ治法也

一傷寒六書脚気類傷寒ト云ニ加減續命湯アリ是ヲ見レハ痛風脚気不替ヿ上ヨ
リ痛出ニ身痛ヲ痛風ト云足ヨリ痛出スヲ脚気ト云ヤウニ令感スル痛風皆脚
脚ヨリ痛出ルソ大シハ痛風初発脚気ニ在續命ノ加減ヨシ羌活湯ハヌルキ甚通聖散ソ

一加減續命湯治脚気類傷寒頭痛身熱悪寒支節痛便秘嘔逆脚軟屈弱不
能轉動但起於脚膝耳禁不用補剤及淋洗（防風芍薬杏川芎防己桂枝甘草麻黄芩蒼朮羌活）
暑中ニ三陽ノ服患必熱脉来数去附桂ニ黄加朮加黄芩ノ葛根　寒ノ中ニ三陰一服患

必冷脉来遅加附子　起於湿者脉来弱加牛膝木瓜　起於風者脉来浮加独活
元気虚加人参少許　大便實者加大黄　水二鍾棗二枚姜三片灯心二十茎煎之穏法會手調服

一虚冷ノ痛風脚気アリ肌熱強テモ悪風足冷脉ハ進弱痛ハ強シ此是温補シテ散風湿之業
トモニ用テヨシ故ニ古方温補之中ニ風湿ヲ去ル剤ヲ組入タリ　加味大補湯
大防風湯　八味丸　滲湿湯加減去蚰空加走　此剤ノ中必ヨキソ

一痢後ノ鶴膝風ト云アリ或手足甚痛アリ治法同シ

一不腫シテ足攣痛スルニ三和散ヨキヿアリ

一如痛風一身痛々處核アリテ痛ムニ浄府湯無熱者ハ肺疽ナリ或肝疽ノ熱ニハ九味柴胡湯
如此治法ハ数医束手タル後ニ見ルソ間々此癰症モアリ

一如痛風一身痛寒熱譫言或撮空シテノ全安性ナルアリ則ソレニ風毒腫アリソレハ後ニ痛處股内或肘後
片腋ナトニシコリ滞リテ心ヲ付ル中ニ知ルソ甚痛揚手擲足循衣摸床傷寒ノ悪症ノヤウナルニ
風毒ノ股内ニハレテ見エタルヿアリ一症後ニ節々痛ハ餘毒也加味五香湯ソ

一湿痰ニテ痛々風ノ如キアリソレモ痛處核アリ或痰核アリ清湿化痰湯

四十　清心蓮子飲　白濁　遺精　諸虚　婦人帯下　雑病

一白濁トテ小便白ク濁ルニ用ル主方ソ夢遺ニモ用帯下ニモヨキソ咽乾消渇トナルニ用テヨシ或雷吼ルヿモアリ

一此方ハ温平トアリ清補ノ剤ソ蓮肉参心ヲ清シテ補スルソ

一下焦ニ湿熱アリテ上焦虚シタルニヨキ薬也是カ此方ノ目ツケソ諸虚𪜈此意ニテ
用ルソ　一白浊遺精湿熱アリシユヘニ不止ヿアリ
一婦人ノ淋瀝（病）ニヨキソ婦ハ帯下アル程ニヨキソ男（男）ニモ用
一男年廿三歳ニ陽ヿ不挙故ニ不知夫婦之道白浊アリテ一个（カ）月（二一）両次尿中ニ小虫ハ
甚多白キウチ也夢遺多夜中両次夢遺スルヿモアリ色蒼々幼年ヨリ
保養無効予按スルニ夢遺或ハ張瘻湿熱ノ者アリト明医雑著ニアリ仍此
劑ヲ与ヘ或ハ異功ニ百酒ヲ加ヘ両剤与ヘ三年而安後有二子
一婦帯下不止気亦弱脉少ノ進ア人有力此剤ヲ与ヘテ安
一熱病後ニ用ル𪜈アリ　一心虚シテフラ〳〵煩熱ナトアルニ心ヲ付テ可用ソ
一婦ノ弱ク見ヘテ少熱モアリ色蒼々白帯下常ニ不止ト云ニ不絶用テヨキソ
一婦人ノ帯下ハ肥タル婦ニハイツレモ多キカスクナキカアル者ソ多キハ白淫白崩ナト云アリ
白崩ハ白キ米泔ノ如クヲシロイヲトキタルヤウナルモノ常ニ経水ノ来ルヤウニ多ク
崩下スルアリソレニ此剤ヨシ兎カク下焦ノ湿熱ヨリ来ルソ湿痰ノアル者或心虚
痰鬱ノ症ニナト多シ帯下ハ止濇ノ剤ヨカラヌソ予多ク見来ルニ帯下ノ症虚冷ハ
多不見皆下焦ノ湿熱湿痰也本方カアリテソレヲ治療スレハ自止ソ是非々々
帯下ヲナヲサント思フハ不宜ソ如何トナレハ帯下アル症外ノ病ニ気アレハソレニツレ

テツテヨリ多ク来ルモノソ外ノ気分ヨクナリテ自止ソ清心蓮子飲ナトハ何程用
テモヨシ或消疳湯ヨシ虫積アル症ハ浄府湯モヨシツカヘナキ症ハ六味丸モヨシ
虚冷ノ婦ハ外ニ虚冷ノ状見ルソ虚冷ハ温薬ヲ与レハ治易キソ

四十一　消疳湯　虫積　雑症

一浄府湯ノ名ヤハラカナル者ソ此剤ニハ色々ノ手相アル薬ソ必竟下焦ノ湿熱モ去リ
虫ニモヨクソ熱ノアル瀉ニモヨシ虫積アリテツカユルニヨシ小児ノ主薬疳ノ熱アルニヨシ
熱アル瀉ニヨキソ食ヲヒタモノ好ニモヨシ
一小児ノ疳ノ剤也然レ𪜈ソノ意ニテノ大人ニモ常ニ用テヨシ世人大人ニハ不用因（故）ニヨク
適中スルヿアリ　一疳瀉ノ症熱有テ食多ク好ムニハ六味丸ト兼用テ吉無熱シテノ食ヲ好ム。（八味丸煎也）
一消疳湯ヲ用テ効ナキハ浄府湯ヨシ
一孕婦風熱咳嗽ヲ用テ食レ不進熱モ退カネタル𪜈此剤ヲ用テノ大功ヲ得タソ
浄府湯ヲ用タケレ𪜈孕婦故ニ消疳湯ヲ用タソ
一婦人帯下ニヨシ下焦ノ湿熱ヲ去ルユヘソ
一婦熱病ノ中大柴胡適中シテノ熱漸和シタリ始ヨリ大便瀉ス大柴謏（胡）ヲソノマヽ
用ルニ未調予此剤ヲ与ヘテノ頓ニ功ヲ得タリ
一男年卅三夢遺三年不止六味八味或人参ヲ服スレハ遺夢却多甚（直）症不好塩味

時々心下支或惡心腹中少痛脉五動余形ハ不衰而以為下進（焦）溫（シツ）熱ハアルヘシ要遺不已得補テ却多キハ溫熱アルユヘン溫熱ノ久アルユヘニ虫モアルソト考テ此剤ヲ与テ適中安

一小児不食ニ或腹少痛或左積アリ或眼赤ナ凡ソ少アル小児ノ主薬ソ

一産後日ヲ經テ熱残リ不食或ツカヱルト云ニ与ヘテ功アルヿ多シ弱キニハ參少入ヿモアリ

一小児痢後疳痢ニ汎ルヿ多シ故ニ漸度減スル比ヨリ此剤ヘ肖奴ナト入テ用ルソ小児諸病後熱少残ル必用テヨシ

一大人ノ痢後ニモヨシ或大人小児似痢非痢大便ノ色朕々カハリ肛門痛或痒或腸下少ツヽコヽロヤウナルニヨシ入リ門虫ニ痔ト云アリ虫アリテ肛門ヲ食トアリ但傷寒ハ狐惑ノ症ト云ハ虫ニ症ノ上部ヲ食ヲ狐ト云下部ヲ食ヲ惑ト云トアリ鼻下ニ小瘡出来或唇ノ下ニ出来或肛門ニ痔ノヤウニ出来ルアリ是ニ与ヘテヨキソ肛門ヲ洗薬モアリ苦参ナト或黄栢ナト加ヘテノ洗ソ熱病後ニアラストモ小児大人中ニモ上部下部ヲ虫ノ食ヿア[illegible]ヘキソヒキシロウ病気ハ心ヲツクヘキソ

四十二　啓脾丸或湯　脾胃　泄瀉　小児疳　（異功ニ山薬蓮肉沢瀉山査子之）

一脾胃ヲ調ヘシツ補シ瀉ヲ止ル剤ト知ルヘシ山査子陳皮アルユヘニ食モ消化スルソ大人小児共ニ此意ヲノステ用ルソ何症ニテノモ此意ソ

一小児疳瀉ノ主方ソ常ニ不調ユモヨシ或丸散ニメモ与ナルソ

一病後ニ用テヨシ参苓白朮散ヲ傷寒ハ後痢病後ナトニ用テノ脾胃ヲ調ルトアリ予ハ異功散七味白朮散啓脾湯ヲ常ニ用テノ能ト覚タリ脾胃ヲ清調ルソ

一僧年卅常ニ大便不調大補湯ノ参大分与ヘテノ無効脉緩長也長ハ熱ノ多アルホトニ此剤ノ参五匁ツヽ入テ与ヘ大効ヲ得タリ

一婦産後大便不調半年此剤ヲ常ニ与ヘテ適中安全

四十三　寶鑑加減瀉白散　喘咳

一咳嗽熱アルニ奇方ソ　一咳嗽脉進不能偃臥加仔杏奴今大功アリ

一痰ニ火頭痛ニモヨキソ必竟風熱入テ竪日中咳嗽スルニヨシ不止ハ六味丸當栢仔杏加用テヨキヿモアリ必竟風熱或順気ハ和中湯ヨキヿモアリ熱ニテ咳嗽加減瀉白散和中湯ハ六味丸仔杏或當栢丸ノ脛童ニヨワテ用之喘急咳嗽ニ滋陰降火湯仔リ杏流雪ノヨキヿモアリ彼モ是此モ是ナル剤也

一痰ニ火ハアリテ上盛下虚ハ此剤ヲ用ヘキソ　田　（木砿苓官水母三分参藿呈貝母朴奴一錢）

四十四　木香順気散　胸痛　氣　雜症

一是ハ胸痛ノ主方ソ気ハ不順或食或痰胸中鬱肘シテノ痛ムニヨキソ必竟気痛ニヨキソ或加仔沉ヿアリ

一虫症気積冷テノ痛ム時ニ用テヨシ　一腹痛サノミ虚モ不見ニハ用テヨキソ

一氣血疝ハ鬱滞シテノ痛ニハ手足腰或脇脊中何方ニテモ用ヘシ必竟アタヽメテノ氣ト疝トヲ順スルソ血ノ方ヘヤラント思ハヽ皈コリヲ加ヘテヨシ

一産後ノアト腹ノ痛ムニモヨキソ加斤コリ

四十五　五積散　寒ヽ温　婦人　雜症

一寒ハ抑ニ感シタルト云カ主ソ春夏秋冬ニ寒ハ温冷温アル程ニ温散シタキト思フ𪜈用テヨキソ春夏秋ハムヲ羗ニ代テ吉

一中寒ノ主トカナレ𪜈是ハ瀉茱ノ方ソ中寒ハ多心下空虚ニ元陽虚スルユヘニ理中湯ニ圭木ナト或附子ナト加ルヿアリ心下鬱滞アリテノ寒ハ邪表ニアラハ五積ヲ用テ温散シテノ汗出レハヨキソ

一如痛風脚氣ニ冷温寒ノ邪ナレハ用テ必効アルソ

一冬ノ中虚冷多ク風ナト引タルト云ニ去ュノ加羗用テヨシ

一腹痛ニ加羗独木瓜ヽ香足痛ニモヨシ　一疝氣ニモヨシ加木瓜ヽ香

一婦人冷タル症ノ主ソ必竟血ヲメクラス程ニヨキソ瘀血モメクラスソ

一婦人腹痛腰痛或冷ルト云ヲ目アテニ用テ速ニ効アリ

一婦冷症帯下ニヨシ是ヲ用テ不効却テ多ハ温熱ナルソ

一熱ハツヨク見ユルニ柴芩ヲ加ルヿモアリ

一疝氣ニテノ身病（痛）ニ無熱ハ木瓜ヽ香羗独ノ加減ニテ用効アリ

癥ヽ瘕ヽ冷熱ヨリ発リタルト見ユル症ナラハ去ュノ加唐蒼テ何症ニテモ用ルソ

一婦經不順ト云ニ冷タル症ナレハ去ュノテ用テヨキソ

一死胎不下ニモ用ルソ去ュノ倍桂加附テヨシ死胎不下ハ胎臍上アリテ臍下脹多ハ小便不通水分處ユイキリタルヤラニテノ胎ヲ按テ見レニ氣ナシ肛門腰痛ムモ多或戰慄スルモアリ脉浮洪数弦按而無力モノ之遅緩ハ前カメソサ臥レハ浮弦洪数ナリ予理中湯ニ人参（三分）或（三分）入桂ヲ多加ヘテ用置テヨキト覚タソ皈亨ヲ加ルヿモアリ皈アリヲ加レハ理中ニ桂ノ切ウスクナルユヘニ死胎ヲ和セシト思フ𪜈ハ多桂永ニテモ吉ソ

比[illegible]

一婦アヤマツテト産スルハ必戰慄シテカテリヽトフルフモノソ胎三四五七月ノ此解テ墮胎スルモ強クフルフ者ソコナ痛ムユヘ欲墮キフルフト見エタリ五積ニ去ュノ与ヘテヨシ八味丸ヲ煎湯ヲ〆与ヘテ猶以テヨシ寿世保元小産ノ部ノ治法ヨシ

一寒ハ温ニ感シテ面頸ナト腫ルヽニ無熱ハ五積唐蒼ヲ加ヘテヨシ熱アレハ今ノ連迠消毒飲或駆風解毒湯敗毒茲芸カ射ナトヨシ

一寒ハ温ニ感シ麻痺スルニ先此剤ヲ与ヘテノ外ノ寒ハ温ヲ散シ加減滲温湯ニ地芩ノヲ去テ用テヨキソ湿熱ノコルハ加減滲湿湯地芩ヲ入テ其マヽ用ルソ

四十六　瓜樓枳實湯　痰ノ

一實症ノ痰ナドノ潤シ降スル枳實ヲ主トシタレハ墻ヲ倒シ壁ヲ破ルト云同ノ功ヲ知ルユヘ補ヲ好ム医ハ恐ルヽソ然レ𪜈枳實湯ノ症ニハ補ノ剤ハキカヌ者ソ或實似虚トモ云痰症場ナトニ用アハスレハ大切ヲ得ル剤ソ

一痰喘偏臥スルヿナラヌト云カ此方ノ目アテソ心下痞メ痛不好按必効アリ此症ノ心下弱ク然アルハ降気湯黄芩沈香ソレヨリ弱クハ六味丸黄芩宿大ニシテ用ルソ先証ノ用ニテ見ニト識ル時ハ加減ノ瀉白散ニ黄芩茯苓ヲ用テノヨシソレニミノモ不偃臥ハ枳實湯場ヨリヨク看テ可用ソ痰症ニ枳實湯ヲ用ルハ大小柴胡ノ心下塲ト同シ心得ソ一痰ユヘニ腫脹スル事灯心ナト入テ用ルモアリ少實アル所ヲ見コミタラ可用ソ腫脹痰咳多脈弱ハ必不可用大虚ソトカク腫脹鞭脹脈滑数按メ有力ハ寄積力痰ハ實力症（一天帰）気力ト可心付也虚微数遅脈芤大按メ不數按メ中弦（弦）緊無大陽虚之

一喘急熱アリテ呼吸速迫不能偃臥ハ必用テノヨキソ

一惣テ喘急ノ痰ハ呼吸速迫トイヘ𪜈其間ニ息長ク持病ユヘニ面色其外不虚處アルソ其ノ症ノ熱アルニヨシ

一男卅八歳之冬感寒ハ頭痛如裂為傷寒ニテ譫語以後吉色嗟吾色不能偃（譫愚）臥自汗甚出脈虚無力然レ𪜈心下不好按連二三日身痠汗多愚（譫語）治療之独多ヲ少テフ胸膈苦悶難堪六味丸與之則又心下苦悶大便亦溏予與枳實湯ヲ服シテ見タキト云テノ枳實湯ニ黄連ヲ加数貼服而心下和シ思食熱去痰和活矣是實似虚ナリ

一實症ノ熱痰ニハ用テ功アリ心下ノ虚實ヲトクト正而用ユヘシ痰ユヘニ身痛痰ユヘニツサヲナスト云ヲ目アテノ可施治

一枳實湯ヲ用ルトキハ疑シキ處アラハ七分前煎ニシテ一二貼程用テ見ルヘシ同ヲ用レハ却テ息クルシク無力汗出呼吸ノ様子トコヤラ弱キハ大虚ナリ六味丸前煎降火滋（一天帰字アリ）陰湯或喘急理中湯或喘急四君子湯ニ忌ヲ付ヘシ

一男年五十大便常不調数方無効滚痰丸ノ散ヲ用テ止タルヿアリ是痰ノ瀉ナリ余様ノヿモ知ルヘキヿソ

四十七　十六味流気飲

癰疔　雑症

一此方ハ虚ヲ助ケテ順気スルソ然レ𪜈中風ノ虚ヲ助ケテ順気スルト云ニハ違タルソ是気虚ニテ腫物或結核ナトアルニ虚ヲタスケ流通スルソ

一此方半井家ニ秘シテ用ルソ諸病ニツカフソ但弱キ者去積疝気留飲症ナトニ用テノ功アリ

一腫物未潰時ニ用ル剤ソ一瘰癧結核乳癰乳岩ノ肉（内）芽ニ先用ルソ

一無熱ハ身痛ムニモヨシ熱ハアリテモ實熱ニアラサルハヨシ打撲ナトニテ後持痛（病）ニ痛ムト云ニモヨシ

一此剤血ノカタメニ滞アリテノ氣モ弱ク痛アルニ何症ニテモ此意ヲ合点シテ用レハ不尽ノ手柄出来ルソ半井家是故ニ秘スルソ

一癰疽ノ初發先荊防敗毒散ヲ用ルカ世間ノ通用ソ予用テ見ルニ今連消毒飲ヨシ熱ノ軽重ニヨリテ去連ソ熱ツヨクハ芩連ヲ加ルソ芩連消毒飲ヲ用テ直テ腫物モ定リ熱モ少ク軽クナリテ十六流氣飲ニ人参一分程入ニテ用ルソ腫物肉堅ク不潰中ハ須氣補氣シテヨキソ悪肉モヤワラキ汁ナトシテ口ヒラキテカラハ内托散ヨリ肉ヲ托シ出ス意ソ弱ニツヨキハ益氣十全大補湯虚冷ハ多ク木香桂皈ヲ主トスルソ補剤ノ中ニ交用ルソ口開キ元氣弱クハ独参ヲ兼ルソ汁スルトキ独参ヲ前煎後ニ用ルソ潰而後ハ元氣腫物ヨリ脱スルユヘニ独参ヲ兼用ルソ京師ニテハ五七分ノ独参ヲ用ルソ然レトモ常ニ熱アルハ偏ニ補湯不宜ソ旧百ノクスリヲ考テ可施治

一疽ハ前ノ加減ハ八味丸ノ觧ニ述タリ可参考ソ是ハ全ク氣血ノ虚ソ大補湯ヨシ独参ノ参附ヲ用或ハ益氣湯ニハ八味丸煎ヲ兼用加附子死肉ヲ活シ膿ヲ托ス意ニスルソ

一疔ハ面手足ニアハ粒ノ如ク出来テ面ハ別而ソ手足ナレハ甚シルソ餓ニ痛甚ク熱毒也疔ノ出来タル処ヨリアカキ血筋ツトウ者ハ急ニ針ヲシテ出血悪血ヲ去ヘシ此ソ臓ヘツタヘハ急ニ死スルト云テ血筋アル道ニ針スルソ外科ヲ呼テ可療治ソ疔甚シキハ六七日ニ死スル者アリ芩連消毒飲ヨキソヒタモノ用テ凡ハ毒ヲ去ルソ膿出ニテカラハ日ヨクナルソ

一風毒腫ト云アリ是ハ追風通氣條下ニ流注トアルカ風毒腫ソ風毒肉膿テノ上ノ肌ハ常ノ如シ肉ト筋ノ間痛出テ膿ソ前ニ有膿無膿ノ弁并疝氣ト紛ルハ三和散ノ條下ニ述タリ芩連消毒飲ヨシ潰而後ハ十六味流氣飲モヨシ熱残ラハサシ引スヘシ敗毒ヌルキソ潰而後ニ弱ニアラハ補中見合テ可用ソアツコヽニ流注シテ膿アリ一身処々痛々處ハレ膿テ一身中四五十処モ膿出ニテ死スルアリ風熱毒血中ニ滞テ此症トナルト見ヘタリ

一男年卅五狂言撮空循衣摸床四五日而瘳不立脉虚ヲ又進症ハ熱痛也予舌ヲ見ルニ熱ハ舌ニアラス常ノ色ニシテ少白胎アリ揚手擲足中ニ痛處アルト見ヘタリ故ニ手足ヲヨク改テ見タレハ股内凸腫ニアリ是風毒ナク潰タルト見ヘテノ元氣弱キユヘ八物湯六味ナトサシ引シテ用テ外科ヲ呼膏薬ヲ貼付シテ治タリ同キ症龔賢ニ出年久ルヿアリ熱病ト前医モ思ヒ病家モ思フニ風毒ヲ見出スハ医ノ功着ソ故ニケ様ノヿハ常ニ知テ居ルヘシ

一濃州宮代福壽院年五十七八日寒熱嘔吐不止医為傷寒ノ投小柴而舌ヲ見ルニ無胎以不換金加藿香令永吐止ニ三日食少ク多又行診脉滑数病弁舌ノ弁ヨリハ脉進而脉ノ進ヲ以意ヲ付ルハ腸癰難知梅脉滑数トアリ然レハ何ニカニカ子細アルヘシト思テ病人ニ問ニ痔病持ニアリ痛アリ立居不自由ト云臥床ノ前淋病氣ニテ尿後膿ノヤウナルモノ来ルタリト云而アツコニテノ弥心ツキテノサニテハ痔破レテ子細アルト思痔ノヿヲ問ニ別

ニ破ルヿナシト云脊ナニ云付テ肛門ノ色ヲ見セタルニ別儀ナシト云然レ𪜈予脉ニ数アラハ外ノ症若処アルヘキニ三日前ヨリハ気力少ク食モ少ク多ナリテ脉ノ進ト云ハ、其根元不分明ト思テ然ラハ予手ニテ肛門ノカヽリヲ探テ見ルヘシト云テ御伏セテ肛門ヨリ探リ按テ陰嚢ノ縫ノ前肛門ト陰嚢ノ向ノ縫ノ両処ヲ外科ノ詞懸癰処ト云其所ヲ按テ見レハ大キナル桃ニツ三ツノカサシコリ堅キ物アリ子ナフトノ根ノシコリタル状ノコトシ肉中ニアリソレヲ按テ見レハ痛難堪ナク上ニ腫モアリ予是ニテ合点シタリ此シコリタル物風毒之懸癰ナラハ縫ニ沿ヨリアラハレテ出来ル筈ナルニ肉中ニシコリ有テ痛脉滑数ニテ二三夜不臥前ハ小便淋痛シテ膿ノ状見エタルハ是ソコニ膿テ居ルト見エタリト思ニテ病人ニ向テ云待サノウニタルヿアルヒシ後ニ膿出ル先不可驚ト心安クキカセテ扨オフナヲ呼大切ノ症ナリ懸癰外ノ中ニ膿タルモノアリ（腫）此上ハ仕合次第ト存セラレヨト云テ外科呼膏薬ヲ貼サセテ二三日ノ中ニ色カハルカ膿出ルカナラハ其時針スヘシト云テ帰ル今ハ処アシケレハコツニ汁ニモ如何之見合スル中ニイカサマ腫ル状アルヘキト云カヘリタル三日目後ニフキヤコシ膿二升程出タリ其前ニモシ腫出テ無力ハ用レヨト云テ異功ニ飯焦黒焼ヲ兼テヨシト云合テ調合シテ置道タルソレヲ先用置テシラセタリ行テ診脉サノ和人参多用レハ悪心アリ故ニ其間ニ不拘金ニ薩今ヲ加淋出シ六文用之食良連々ニ進出テ膿モ二三日ニ出

尽シテ本復シタリ余能々心ヲ付タルユヘニ外ノ人不知中ニ幾ヲ見出シタリケル様ノ療治ヲスレハ人ノ眼ヲツケカユルヿソ

一身中ニシコリ或結核アラハ人参蘇ニテ加羌活ノ属用テ流通シテヨシ疝気ニモ血ノ滞タルモ流通スヘキソ

四十八　加減温膽湯　中風之治（貴寺神甘夕飯朮門同連茹酸辰瀝）

一中風不語ニヨシ惣シテ中風不語舌モトヲリカヌルユヘニ不語アリ心気恍惚トシテ舌ハモトヨレ𪜈不語アリソレニ用テヨシヲハ始テ用之テ失心ト云意ヨリ暁メソ失心シテ狂スルモ失心ニテ神脱シ恍惚トシテ不語スルモ元ハ同シキソ

一男年六十中風不語心気忙然タル体ニ仍此剤ニ人参三分入テ用之語出タリ

一凡剤ハ痰アリテ心神脱シ心熱アルニヨシ故ニ傷寒ノ後気ノ恍惚タルニモヨシ其外心虚ニテ少熱アリ痰火アラハ諸病ニ用ラルヽソ

一中風卒倒而イビキヲカク如ク鼾睡ノ如クト云ヤウナルニハ独参湯ヲ用ルソ痰ゝ喘アラハ竹瀝姜汁ヲ加テ用ルソ気ノカツク侭ニシテカラ工君級弓木圭宿ノルイヲカヌルソ

一中風痰ゝ喘壅盛不能服薬ハ蘇香圓或延齢丹姜汁ニ竹瀝ニテトキテ用ルソ

一鼾睡ニツカニナルトモ脉モ弱ナリ呼吸カナキハ其日ニモ翌日ニモ死スルソ、シツマリテ口ノヘト目ヲヒラキヽ人ヲ知ルハ先ヨキソ、コヽニノ左右ノ中半身労ルヽソ

一中風左右ヲ不同ニハ六君ニ加減シテヨシ皈芍宿木圭ヲ加ヘ緩ヽトシタルニナリテハ薏仲
委ナトカヘ手ハ横ニ茱ヲヤルハ委桂枝ノ足腰ヘヤルハ薏仲膝ハ筋ヲ和スルハ瓜ハ熱アラハ
六君ヲ主トシテ皈芍姜製連竹茹ナトヲ加ヘ心神恍惚セハ加減温胆ナト用ルノ

一左右不叶虚冷ニハ加味大補湯ヨシ　一面風口眼喎斜スルニ白氣散加減シテヨシ

一中風ノ順氣ト云ハ弱キ處ニ滞ル氣ヲ順スルノ故ニ宿木圭ノ屬ヨキノ氣カヨク
ナリテハ沈香モクルシカラス人ハ元氣弱キ中ハ順氣スヘカラス却テ正氣ヲ減ス
ルノ熱病アラハ六味丸虚冷ハ八味丸ヲ兼テヨシ

一益氣湯ニ木宿圭定ナトノ屬ヲ加弱キ面風或ハ指痺ルニヨシ又芎芷ニ建中
湯ニ加減シモスルノ

一身麻痺或緩ノ下麻木中風ト同シキニ冷湿ニアタリ湿熱ニアタルアリ
加減参湿ニ可心付ノ冷症ニハ加味大補湯ヨシ

一口眼喎斜スル難キ症ニハ行氣香蘇散ニ去ノ或ハ烏薬順氣ナトモヨシ
絡常ニ用ルハ六君子ナニ定宿片ヲノ木圭羌ナトヨキリ

一是中風之治法ノ肝要ヲ云ソ是ヲヨリ予之医案之眉之或右眉又合
ニテノ保養スヘシ然レ氏主トスルハ異功六君子大補益氣六味八味之中ニ疾アラハ
絡連或ハ酒虚冷ナラハ木宿圭附永ノ屬ヲ加減スルカヨキリ

一中風左右ヲ分テ左血虚右氣虚虚ニ疾アリト分テ治法ハアレ氏必竟左右ヲ分ツヿモナキソ
ナセトナレハ右ハ氣ナレ氏血モ虚スルユヘニ不叶ソ故ニ不分左右六君子ニ皈芍ヲ主トシ丸ニアリ冷
アリト云ヲ分テノ加減スル意ヨキソ

一中風ハ木ノ半分カルニ同シ十之内七ツ程治スルカ本復ソ三ノ不足ハ天目ニヒヽリ久
ルヤウナルモノユヘニ外ノ病ノヤウニ全ハ治セヌ者ソ

四十九　清暑益氣湯　暑熱病　朮皈麦門玄貴曲沢甘升葛蒼（百　青）

一此劑ハ暑氣中春末ヨリ秋マテ諸医常ニ用ル茱ソ予用テノ見ルニ茱味多キユヘ
カ十分ニ功ナキソニテツキリト熱ヲサマシハツキリト補スル茱ニテノハナキフ大補
ノ間或瀉ヲ用テ大補ニウツル前ノ茱トシルヘシ

一春ノ末寒秋ノ間氣中臥シ折々汗出テ熱アリ小便ナトアカク食モ無味ト云
テ半起半臥スル時ハ用テ功アルソ

一寒秋ノ熱病ノ主トスル意アリ是ハ手ヌルキ心得ナリ但其中ニ大柴胡ノ場ヲ
ヨク知テ虚中ニ熱ノ残リタルニ用ルト云ヿヲ知ラハ大功モ得ル茱ソ

一暑氣ノ中ハ温熱ノ人ニ感スルヿアリ故ニ男婦或産後ニテモ虚中ニ温熱ハノ
氣アラハ用テ功ヲ得ルヿアリ

五十　抑肝扶脾散　小児疳　虫積　朮令貴甘曲査柴青　胆皈連胡連

痛°

一是ハ虫積アリテ熱アルニヨシ熱瘧ニヨキソノ浄府湯ヨリハツヨシ苦キ味ヲ好虫積アル人外ノ剤不効ハ用テヨシ或丸薬ニシテ小児熱瘧ニ用ヘシ

一小児熱瘧アリテ眼赤クナリ痛テ盲スルアリソノ証ヲ見テ用功アル剤之

五十一　散火湯　腹痛之治（或吐哦）　（連厄貴朴芎ヲ　奴藿木宕苗甘）

一是ハ熱アル痛ニ用テ妙アリ然レハ熱アル虫積ニヨシ熱アルユヘニ痛ソ熱ヲ和シテ順スルユヘニ痛止ソ腹通温薬ヲ用テ無効トキニ用ルソ

一腹痛之治法大格ヲ述ルソ食毒滞腹痛ハ枳實大黄湯熱痛（不省鎮字）柴平湯或浄府湯冷痛ニハ木香宿木ノ類ヲ主トス理中湯ニ加減スルソ瘀血ニハ桃圭將ヨシ

一虫積アルモノハ常ニ好ム扁ノ味ヲ問ニ好味ノ薬ヲ用ヨシ○甘ヲ好者（虫ヨ）ハ芎甘或異功散茴蔻建中湯加飴糖陳令ナ佳里黒漿サ之属○好苦ニハ不換金加連柴平湯浄府湯良虫丸散丸味清脾湯去草加雚連或連苓之二味七分煎用之虚痛ニハ異功散加木或同朴丘ハ木廿○好辛ニハ理中湯或永圭丁良之中選用之不換金加永大或建中丸或ハ逍虫丸良永ノ二味七分煎用之或姜汗○好酸ニハ与梅干而可也或以酸煎其気ヲカヽセテヨシ○好鹹ニハ以塩湯カラクシテ用之或建中丸湯之属ヘ用之塩湯ヲカラクシテノ用テヨシ必竟塩湯ノカラキニテ可治之○辛苦ヲ好ムニハ連永之二味右妙或連丁○藥ノ気ヲ悪テ則吐スル虫アリ是ハ二木ハ又薬ヲ与テ吐止兵ハ一味或苓芩ヲ加三味淋薬或貴苓ニ永或貴姜ノ二味或醋ノ気ルヲカヽセノ三味淋薬ヲ与ヘテヨシ呃味（嘔吐）シテ不受薬ノ治法モ五ツノ味ノ好ム扁ヲ考或ニ木ハ又薬ヲ与ヘテヨシ此治法ト同シ必竟虫積ユヘナレハ也

五十二　防風通聖散　熱病　雜症　（飯ヲ芎木甘攻云尭苛麻吉　苓厄羔滑將石）

一傷寒ハ熱病無汗如狂欲走ニ三人合シテヲシトムルヲキカス狂人ノヤウニ大声ヲ揚ルニ妙ハアリ身痛熱ナクシテアラキ者ソ

一熱病脉弱手足微冷舌衝焦拐手擲足加味益気ヲ与テ弥苦悶ス心下按メ痛按セハ手ヲ取テノケテ面ヲ皺ム予此剤ヲ与ヘ手足温熱連々和ス後竹茹温胆湯ヲ以テ調理ス

一狂気ノ症ニシツマル迄用テ妙アリシツマリテ後ハ沙参加減温胆湯安神益志湯

羌°

一癩病内薬ニシテ苦辛荊攻雷丸三味丸薬ニシテ常ニ用功アリト秘ニシテツタヘタル人アリ

一麻疹欲出不出狂言撮空揃衣摸床此剤ヲ投疹出安

一咽喉腫痛之症駆風解毒湯苓連消毒飲ヲ用テ不効時此剤ニ力射君桔妙ソアリ

一痛風痛甚或痢後鶴膝風痛甚ニ永ニ蒼君姜ヲ加ヘ妙アリ蒼梧ヲ加ルヿモアリ

一小児急驚風熱甚ニ加将危ハ貼ニシテ用ルヿアリ前医敗毒ノ類ヲ用不効甚発シテトコヤラ潤アリテ死症ト見エヌニヨシ虚アレハ無効

一瘟疫面腫九ハ甚頭痛如裂ハ必此剤ヲ用ルト知ヘシ

一老婦悪寒ハ頭ヲツヽミテノ外冷内熱アリテ諸薬不効ニ用テ大効ヲ得タリトアリ是ハ實似虚也熱極似寒也如此症モアルヘキノ心ヲ可付心下之實ヲ見テ可投之

一享保三戌午云之薬ヲ用ルニ補瀉ノ剤不適中シテ死スルトキハ唐医ノ其薬方ヲ恐レテ重ニテ得用ヒヌ者多シ是唐医ユヘ也薬方ニ料ハナキノ医ノ四診不足病症ヲ見エヌヿナラヌユヘニ其ハ症々ノ薬ハ遠迯也故誤ルノ寒ヽ熱ハ虚實補瀉温涼ノ理手ニ入レ薬ハ適中スル也医ハ生命ノ限リニ生死虚實ヲ可見分ト心懸ヨリ外無他然則。

〇薬方必適中スル也

五十三　當皈飲子　入門　疥癬門

一皈茍弓虵苡云芪廿白蒺莉寺、九味也腋下或身痒キニ用テ効

一胃経風熱断（ハグキ）痛出血　入門　牙歯門

五十四　犀角升麻湯　齗爛白点

一婦舌如無皮物シニ痛不食加減八味丸條下ニ有之

當壯菴口解中終　五十四丁