家方口解　下

k 8-2

F 3
カ-69

嘗荘庵口解 下

一 追風通気散 疝気 風毒 内癰
三 調栄活絡湯 失血
五 手拈散 腹痛 痘疹之弁
七 四君子湯 喘急 諸虚
九 当帰龍薈丸 癇
十一 順気和中湯 吞酸嘈囃之弁
十三 七味清脾湯 瘧 虫積
十五 大七気湯 虫積
十七 俊元香朮湯 失血
十九 烏薬順気散 中風
廿一 半夏白朮天麻湯 頭痛 心虚 痰爵
廿三 桔梗湯 肺癰 腸癰
廿五 安栄湯 心虚 痰爵 産後
廿七 異烏沈湯 痰爵 心痛
廿九 清心導痰湯 癇 狂乱
卅一 五香湯 小児痘
卅三 九気湯 心胸痛
卅五 消風散 風疹
卅七 升陽除湿湯 雑症

二 平肝流気飲 疝 脇痛
四 加減胃苓湯 水腫
六 蟠葱散 疝
八 清心抑胆湯 癇
十 疎経活血湯 痛風
十二 道赤飲 熱痛 疹
十四 人参白虎湯 暑 熱痛
十六 大防風湯 痛風 脚気
十八 活血湯 腹痛 失血
廿 参飯養元湯 熱痛 注夏病
廿二 参朮調中湯 咳嗽
廿四 玄治十味 咳嗽
廿六 四生湯 当アリ芙之 産前後
廿八 柴平湯 虫積
卅 肺癰方 虫積 当用卜八三味不足
卅二 加味五香湯 小児痘
卅四 沈香天麻湯 癇
卅六 匀気散 中風
卅八 補中治湿湯 腫脹

490.9
Ka-2
3
No. 2365
旧 K 8-2
慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47 年 7 月 4 日
富士川文庫
1489

卌九　大建中湯　疝気
卌一　加味理中湯　九病　吐蛕　雑症
卌三　三合湯　雑症
卌五　泄瀉方六味　小児大人雑病
卌七　瘀血方六味　婦人調経
卌九　一方六味　飲食
五十一　加減香苓散　疝
五十三　安胎異功加減　安胎
五十五（自此）二陳湯　嘔吐　虫積
五十七　疼痛方　疼痛
五十九　補損当帰散　打撲損傷
六十一　瀉黄散　胃熱　口舌痛
六十三　催生四物湯加減　臨産
六十五　茵蔯将軍湯　黄疸
六十七　黄疸方
六十九　産後瘀血腹痛二方　産後
七十一　安神散　産後　諸虚
七十三　黄石散
以上七十四方也
上中下合百八拾六方也大尾

四十　玄治九味　痢
四十二　滲湿湯　冷温
四十四　悪阻方　胎前之治法
四十六　冷温方
四十八　婦人調経　四春方　此方多矣
五十　自得方　婦人調理　去血
五十二（自此）六君子加減　中風
五十四　二陳加減　打撲方自此
五十六　疝痛方　疝気
五十八（自此）血痛一法　因血腹痛
六十（自此）六君子湯加減　久瀉
六十二　決雪湯　虚人風熱
六十四（自此）不換金加減　虫積　食留
六十六　発狂方　産後狂気　或婦人狂気
六十八　産後身痛或狂気二方　産後
七十　秘方　腹痛
七十二　建中丸　冷虫積
七十四　心菴脉法

當荘菴家方口解巻之下

追风通気散
手捻散
当帰龍薈丸
七味清脾湯
復元養栄湯
半夏白朮天麻湯
安栄湯
清心導痰湯
九気湯
升陽除湿湯
加味理中湯
泄瀉方六味
婦人調経
安胎異功加減
血痛方

平肝流気飲
蟠葱散
疎経活血湯
人参白虎湯
活血湯
参朮調中湯
回生湯
肺癰方
沉香天麻湯
補中治湿湯
滲湿湯
自得方
一方六味
二陳加減
疝痛方

調栄活絡湯
四君子湯
順気和中湯
大七気湯
烏薬順気散
桔梗湯
四味烏沉湯
五香湯
消風散
大建中湯
三合湯
冷湿方
加減香苓散
三霊湯
補損当帰散

加減胃苓湯
清心柳胆湯
道赤飲
大防风湯
参帰益元湯
玄治十味
柴平湯
加味五香湯
匀気散
玄治九味
悪阻湯
瘀血方六味
六君加減自得
疝痛方
六君子湯加減

瀉黄散　催生四物加減　不換金加減　茵陳將軍湯
発狂方　産後瘀血腹痛ノ方　産後身痛或狂氣方　黄疸方
秘方　安神散　建中丸　黄石散
心菴師傳以上　七十四方也

一追風通氣散（敀偖通句芷 茴香奴草）疝氣　風毒　内癰
一此剤ハ疝氣腹痛ニヨキヿアリ
一腫物ナト出来安ク或瘡毒後氣血不足シタル養生薬ニヨキソ
一風毒ヨキト云ヿ條下ニアリ予多用ヰツケタル功ハナケレ𪜈風毒膿出尽去リ
テ調ヘルニ用テヨキソ寒熱頭痛ノ初発ニハ功ウスシソレハ前ニモ云敗毒ニ
加減シ芩連消毒飲主方ソ外邪去テ十六味流氣飲ヲ可用カ追風通
氣ヲ用ヘキカト意ヲ付ヘキソ
一痰塊結核ニ用テヨキソ條下ノ加減ヲ見テ可用ソ
一内癰ニ内托散ト兼用テアリ然レ𪜈膿潰而後ニ内托散用ヘシ未潰時ハ桃
圭將冬瓜子ナト用ル間ニ用ヘシ冬瓜子ナクハ桃圭將ニテヨシ内癰ハ其経
ニ依テ胃癰腸癰ノ名アリ裏ニ向フトアレハ腹皮ノ肉ノウラニ出来ルト
見ヱタリ　腸癰ニ三人治療シテ愈タリ　腹脹スレハ多ハ不治ソ
一男年四十前有瘡毒今無之一日臍下左辺一塊アリテ痛難堪其処ヲ按メ
見ルニ手ヲ置タル如クシコリアリ按セハヲヅブトソエヲオスヤウナル痛アリ以是為
證疝氣或積聚按スハ痛メ𪜈イタミヤウ筆痛スルヤウ也腸癰ノ痛ハ腫物
ノ按意ノ痛アルソ間試テ可知ソ腹痛難堪モノソ飛止服発スルソ初発ハ

吐モアリ食傷ノヤウナソ仍臍下ニ凝滞アルホトニ桃圭將薏中ヲ以テ
ヒタ物用ル中ニ膿ノ如ク血交ル穢ハ物下リテ全安
一男年三十臍左边塊アリテ腹痛甚シ按シテ見レハ腸癰カ疝氣カト疑フ
追風通氣ヲ与ヘテ痛止安是ハ疝氣ト見ヘタリ
一婦年廿八九一日腹痛如裂嘔吐為食傷同朴缶將木茸ヲ用吐瀉シテ衝
并其後綿々トメ不已或眼甚シ臍左边ニ手ノ大サナルシコリアリ　按セハ手ヲ
トノヱヲ按ス心アルト云仍知腸癰桃圭將茸ヲ用ユ痛ム氏用ユレハ痛劔
ヲコスルヤウニテ服スル味不快ト云然レ氏其ハコスルヤウナル氣味ニテ
爵滞下ルヘシ服スヘシト云テヒタ物用痛雖甚シ氏ハナスナ加昆薏冬
瓜子少和スレハ圭ヲ大ニシテ用ル中ニ膿二升下ル下而後凝滞三分ノ二
ヲ減ス其ハ上ニモ前如ク用ル中十五六日ヲヘテ又膿下リ八九十日ヲ経テ全安
一童十四腹脹ハ臍左边ヘニシコリアリヲアノス為是腸癰也ヒタ物右ノ剤ヲ用ル
中ニ臍ヤフレテ膿数升出テ嘔吐甚シク重死ヲ予是死スヘシ然レ氏脾胃
コタヘタラハ可生ノ理アリ以肉可養ト云テ小鳥ヲ焼テ与之是ハ好テ
食スレヒタ物用肉菜ハ追风通氣或異功行為ナトノ属ヲ用食進出テ後
リ此童前及瘡多シ二年不發ト云其ハ毒腸胃ノ间ニ滞テ肉瘡ヲナシ

暑脹

タルト見ヘタリ
一腸癰腹脹ノ身腫氣ル入（一本入換大）便膿血ヲ下シ日ヲ経ル者ハ多ハ不治婦人産後愈後腹
痛シテ腸癰ヲナスアリ腸癰ノ見ヤウハ脈遅緊未膿滑数已膿有トス
脈濇シ臍下ノシコリ按メ手ヲトヲ按ス意アルカ目アテツカツタイミテカヤウ自アラ入テ不知
二平肝流氣飲（行芩貫芎連危雀 靑弓守朴柴呉甘）　疝腹痛
一腹痛テ熱アルニ用テ功アリ　一疝氣ニ平王痛腹痛熱アルニ用テ功アリ
一惣テ疝氣ノ治法此主方氏ノ中ヲ選用テ功アルソ如充　寒ハ五積散加木兵香　蟠葱散
烏沉湯　木圭（丁）兵之屬　疝痛方　無寒無熱ハ三和散　有寒ハ則加圭附　有熱ハ則加百
危　熱ニハ平肝流氣飲　柴平湯　浄府湯　無熱無寒ハ烏苓通氣散モ用ル也他医
多用之戻ハフマリ功ナキヤウニ覚ルソ然レ氏烏苓通氣ノ場ニハ可用ソ春夏秋之间
熱アリテ疝氣牽痛ニハ加減香苓散疝氣甚夏日痿ハ白者入テ膀胱経之トアリテ六
十之男癰腫技究然レ氏脈滑数也三和ヲ与テ無効加減香苓散ヲ用テ小便快
利大功ヲ得タリ胃苓湯木兵モヨシ茴ヲ加ルコモアリ　或行氣香ヲ散ニ義削青
木茴査ノ加減モヨキソ　疝氣ハ大形此主方三ノヨキソ
一疝氣腹痛脈緩同朴兵木甘弓圭石適中
三　調栄活絡湯（弓地毛桂枝皈 桃將膝芎紅）　失血

一是ハ瘀血アリテ腰痛スルニヨシ打撲後痛ムニヨシ
一ツテノ瘀血ノ腰痛ニモヨキソ瘀血アリテ手足為痛ニモヨシ
四　加減胃苓湯　（蒼朴實中木苓猪沢　曲腹茯宿查瓜兵灯心）　水腫
一此劑ヲ去ル医瘡癧ノ秘方トシテ用タリ腰ノ立タル者アリ何トナレハ温ニ感ニシ
テ瘡癧ニ效タル程ニヨキソ　唐蒼ヨシ
一水腫一身ハレテ小便少ニヨシ心気ニテ腫脹スルニモヨキソ此剤モイカサマ奇方ナリ
五　手捻散　（力芎桃圭將紅）　腹痛　痘疹之弁
一此方ハ痘後ノ餘毒内ニ入テ餓ニ腹痛スルニヨキソ大カ能ク胃中ノ瘀血ヲ去ルトアリ
一此薬畢竟ハ瘡毒内ニ入テ腹痛スルニヨキソ皆瘀血ヲ順ニシ毒気ヲ消スル薬アルユヘソ
一小児ノ瘡中気ナトアル症ノ餓ニ腹痛シテ諸薬不効ニ必ス用ヘシ
一胃腹痛為食為疝為虫之諸薬不効ハ此剤ヲ用ヘキソ何ナレハ俗ニ手ホリクサト云
肩ノ中ニ黒点アレハ針ニテホリテ出血ソ及痛悪心腹痛止ソ唇ヲホリ血ヲ出ス
モアリ是皆瘀血ナリ唇黒キハ瘀血ナリトアル程ニ血ヲ出シテヨキヿ尤之平
井家ノ傳ニ腹痛垂死トスル者ニ四物湯ニ紅花大ニメ入用テ大功アルト之是皆
節ノ症トテ瘀血ノ毒気攻テ腹痛スル之トヲ傳ソ小児家ニクサニテ腹
痛スルト俗ニ云属ソ早クサニテ死タリト云ノ属ソ皆ユヘアルヿ之

一風疹出没スルニ外ニ出ルトキハ痒ソ外消シテ後悪心腹痛スルアリ四味消毒飲
ヲ用レハ悪心腹痛止テ発スルソ是ハ悪キノ血ノ浮タルアル症凡寒湿ヲ得テ動
クユヘニ凡疹トナリテ出没レテ散スルソ内ヘモ引外ヘモ発スルヲ見レハ皆
アシキ血ノ毒気ナリ
一疹ノ咽痛腹痛モ毒氣之消毒飲ヨシ尤黒甚ハ犀角ヲ入或苓テ連ヲ加ルソ
一痘欲出不出腹痛嘔吐悪心毒気之一消毒己弱キハ平主春本敗之属ニテ温遍遍
メテ出ミ尽レハ止ソ其ヲ抜究ル時ニ加味五香湯ヲ用テ理ヲ傳タルモ此理ナリ
一小児頭瘡或大人小瘡ノ類外ニ薬ヲ貼シテ乾ク時ニ気分悪ク悪心或大便
溏或色青セン腹痛スルニ加味五香湯ヲ以テ発レハ小瘡ヨリ潤イテ膿汁出レ
ハヨクナルソ是皆毒気之毒気ト云根ヲ知ラセシ為ニ如此云述タソ
六　蟠葱散　（破宿兵荊茂青苓延　永圭甘或加呉茴木蒼）　疝
一入門ノ心痛ノ部ニアリ腹痛ニヨシ冷痛ヲ治スルソ葱ハ香ヲイヤカル者アルユ
ヘニ不入ニ用テヨシ或症ニヨリテ入ルモアリ
一世間疝気腹痛ニ用ルソ
一疝気或瘀血アリテ鞁脹水腫也ハ此剤ニ加車前木通テ可用ソ大功ヲ得ル剤ソ
七　四君子湯　（参木蒼貴朴宿　好雪行沉木中）　喘急　諸虚

一短気ト云フ目アテ用ル剤ソ短気トハ息ノ短ソ喘急ニ不虚ハ呼吸速迫ナ
レ氏間ニ長キ息アリ短気息ツカヒハ胸ヨリ上ニテスルヤウニテ臍ヨリ不来
短ソエ痰声モナク息ツカヒ短クシテ又痰ニモアルソフレニ用ルソ

一此剤ハ痰ナキ人ニテモ息トコシキト云ニ用ル丁モアリ或息キル丁アリト云ニモ吉

一弱キ痰症ニヨシ脉モ弱人多ヲ用テ見タキ脉ナト用ルソ

一短気ニテセキ〳〵トシテ胸中動気サワ〳〵トウチ脉進弱吹々結スル
ハ十之九死症之後腫脹スルモアリ腫脹シテモ日ヲ経テ死ルソ

八　清心抑膽湯（叙芍弓木苓貴同茹菖　連萑门遠守多牛）　癇

一癲癇之主方ソ然レ氏テツキリトシタル癇ニハ無効ソ心虚ニ痰ニ鬱ノ症ノ
弱キト見エテ痰火アルニ用テヨシ

一心虚痰鬱ノ養生薬ニ兼ナトアリ痰モアルニ三味或天香二陳或温胆湯ナ
ト兼テ用ルソ

一中風ノ不語ニハ去雀テ加酸用テ見ルヘキソ痰火ヲ清シ心ヲ補スル剤ソ必竟此意
ニテツカヘハ薬方ハ其症ヲ治スルハカリニテハナリテ他ノ症ヲ治スルソ

一失心乱心静ニナリテ後ノ養生薬ニ用テヨキソ人多ヲ玄代沙多ルソ

九　当帰龍薈丸（叙胆危連将薈黛各五銭广香五分　木三銭半加柴五銭青月一両曲糊丸）　癇

一肝熱ヲ瀉スルソ竜膽瀉肝湯之属ソ

一癇症ノ養生薬ニ用テヨシ沈香天参ノ湯ヲ用此丸薬ヲ兼テ癇症ヲ治タル丁アリ或
三味貴苓圭日天香二陳或清心導痰湯ノ去苓梔ニテ此丸薬ヲ兼テ用ル丁有

一眼赤ク々上熱アリテ肝熱ニテ目亡目シト思フトキ用ヘシ

一此丸薬ハイカイヤウニタアルヘキソ古方ノ論小児ノ論ヲ見ル中心ヲ付ヘキソ

十　疎経活血湯（叙芍地蒼膝桃葳己　弓羌云芷胆苓甘姜）　痛風

一此剤ハ龔氏ノ方ソ痛風ノ如ク身痛症ノ酒色ノ過度ニヨツテ発スルニヨキトアリ

一此方ヲ用ル意ハ血中ニ熱滞リテ手足痛不已ニ血中ヲ清シテ潤スト云意ニテ用ルソ
肝熱ヲ瀉スルニ竜胆草アリ筋ニ熱アルヲヤワラケルホトニ轉筋ナトニ用テ見
牛キモアルヘキソ活筋湯トアル処モアリ

十一　順気和中湯（貴萑危苓守　宿甘同連木曲）　反胃噎膈之弁

一痰火ヲ涼スル剤く故ニ噎膈反胃之方アルニ用ルソ故ニ膈噎門ノ薬ソ

一滋陰降火湯ヲ用ヘキカソレハツカヱシ程ニ是ヲ用テ痰火ヲ清スヘキト云意ニテ用ルソ

一痰火ト云ハ元来脾胃ニ熱モアリテ津液不足シ痰ニアレ氏内熱アルユヘニ痰乾ヲ痰火ト
云ソ俗ニ胸コヽルト云カ嘈雑シ或噯気咳逆呑酸或吐酸水悪心胸中漉々トメ鳴
ノ属皆痰ソ痰症ニ熱アルユヘニ脾胃乾キ津液不足シテ反胃膈噎トナルソ

悪心

一膈噎者食胸ニツマルツ胸中食物サワリテツマルヤウナリト云テ脉緩ナル
ハ後必絶食ニシテ死スルソ四十余五十ヨリアル一ツ
一反胃ハ夕ニ食シ朝ニ吐スル上アリ食事脾胃ニ入テ不下行大便結シ胸ニツカエテ噯
氣呑酸饍雜アリテ後ニ吐スルソ吐シテ後又少食シ如此ハ皆不治ソ治法ハアレ氏其
症ヲ待テハ滋補スレハツカエ本ヲ治スル薬用ル一ナラヌユヘ此ニスル
一痰火アリテ痩ル人甘ハ戋ヲ見テ脾敗日ノ氣ヲ補ノ脉陂權衡ノ如クニスル治療ヲ
也ハ十之二三可救ソ已ニ反胃トナリ膈噎トナリ病症ニナリテハ不治ソ其多ハ呑酸
噯氣饍雜咳逆折々アルカ多ソ若キ年中年ヨリ此四症折々アリテ
脉ニ九ミ不見ハ脾腎ノ氣ル大虛メ燥氣有ルト可知ソ
一此症ノ脉滑数ニシテ力アルハ常ノ九ミ痰ノ症ニ滑数ナルハ九ミ也脾腎ノ元氣未
絶也元陽ノ氣アルユヘニ滑之是ハ順氣和中之屬其外補腎補脾ノ心ヲ付テ
常ニヨク保養シテ食進出テ肌潤タラハ未庵ニ治スヘキソ滑ナル脉ハ胃氣未絶ソ
一膈噎反胃之脉ヲ見ルニ脉不病ニシテ緩也緩ニテ其ノ苦処ナキハ元陽自衰
タル也元陽衰レハ胃氣ノ本ナルユヘニ脾胃之氣弱シ剋胃ミアルユヘニ九ミヲ生
ニシテ津液ノ主スル源乾クユヘニ其澄ヲ得テ清ミスレハ根元ノ衰タル元陽ナヲ
衰ルソ元陽衰テ後ニ生シタル火ナルユヘニ難治ソ脉緩ナルカ陽ノ衰之以此理

脺°　勦°剄　收°

病根ヲ知ルヘシ順氣和中湯ノ症ハ前カタノ戋アル九ミ痰ト云脉分ナルユヘニ脉滑数之
一凡九ミ之後咳不已ニ諸方無功ハ此剤ヲ以テ治スルソ呃吐ニモヨシ
一高岡代左衛門西春有咳而不食脉滑大数按尺有力形瘦色疲大垣城主
之侍医三人六君益氣之屬ヲ以無効京師之阿部玄隆采診脉玄虛脉也其頃脉
脹浮腫大便溏而死セヒト云挙家驚問テニ予曰脉滑数有力非補陽之症
滑ハ有胃氣ヲアノ了簡トハ遠タリ然レ氏言小医ナレハ薬ヲ用テ見ヒヨ何トモニカク
キ一アラハ可用薬ト云仍玄隆薬ヲ用参附姜桂ノ劑之十貼而呃吐而水瀉甚絶
食臥床不能起テ予ニ求治予脉ヲ見ルニ胸中ニ腎間之動ニ氣モ収リ心下左ノアハラニ附テ
積ノ端アリ指ニテ按セハ胸ニ徹シテ不如按仍淨府湯ニ玄参小貼ニテ午々之連々
食進出テ六月ニ漸歩又京師之飯田玄仙来城主令診脉玄仙曰春間之治ヲ得テ
大半ヨシトイヘ氏脉弱後必再発臥床衆又驚仍求薬其剤ハ六君子加官桂木香劑
而不快仍還予之薬予以順氣和中湯予之半年九月始出°勦劑冬之咳已形漸潤諸症
安予玄隆玄仙之脉弱シトエ処未決此ハ状ヲ見テ弱ト思タルニ脉大滑ナルヲ
気虛ト見タルナリ尺ノ有力ト心下ノ実ト臍中ニ腎間之動°按ルトヲ不知也嗚呼
一呑酸噯気悪心咳逆饍雜ノ症虫積アル人ニアリ状痰火ノ乾燥スル（所耳）ト八麦タリ虫
ノ脉ハ或緩或細或急或五動而潤也蒼々或白痰火者蒼君里ミ満其乾虫ノ症ハ虫

ノ療治ニテヨキソ肉縺ニ成下脳トスヿアリト云コヿ未タ故メ不見定テ此語アルヘ
キソ改メテ可知　（一本改）

十二　導赤飲（淡竹甘草）生地　木通　甘　熱病　疹

一保元ニ疹子出小便閉澁言ノ者用ル丰方カソラ用テ見テ効ヲ得タリ

一心経ノ餘熱ニモ功アリ或淋痛ニモヨシ熱病後小便止澁痛ニモヨシ

一熱病後熱漸クツロキ十ノ二三熱ハ六七分解スルト思フ什小便淋止澁難堪ト云ヿアリ又常ニ若ル小便澁痛スル熱後ハ多ハ此ヲ留ノ千ルモノ之連ミニク多也ル、ニハ淋痛サタチ澁シ澁痛或閉ニ日気不ナシ不淋痛シテ小便閉小便ヲ苦ニモセヌハ独参ヲカヌルソ淋痛難忍ヲ見ルニ熱アル什ニ滞ル小便渋ニナリテ通スルユヘニ淋痛スルト見ヘタリ赤渋ニナリテ通スル者ソ故ニ此小便通シキリテ小腸サソハリトスレハヨクナルソ

此ヿハ傷寒ハ論ニハ見ヘスヿ多見ヘテ格アルユヘニ其理ヲ記ス

十三　七味清脾湯　瘧　虫積

一瘧ノ剤ソ寒瘧ニヨシ俗ニ云虫ヲコリト云ニ用ルソ烏梅多ク入レハ呑ニクカルソ少ク入テ小船ニシテヨシ

一常ニ虫気アルニハ太菓ヲ用テヨシ色蒼ミトシテ熱ナキ虫ニヨキソ

一久瘧ニハ理中湯ニ柴青一丁モヨシ

一虫ユヘニ咳アリ或腹脹或脊中腰ナト痛身ナト痛無熱ニシテ腹ニ手アクト脇痛嘈ヲハキ胸ツカユルニヨシ或不好米穀ニヨシ疼ニモ冷タルニハヨキソ色ニ手相アリ　（存柄）

一半井家ニ秘シテ用ルソ去黄加兵テ用ルソ

一虫ユヘニ腹ハリ多ルニ加連通心ヲ用ルヿアリ

十四　人參白虎湯（春秋去燥）（参　羊　甘　門　木　白　芍　貴　蒿　扁　蓮　今　烏梅）　暑着　熱病

一傷寒ニ白虎湯ヨリハ人參白虎湯ノ方ヲ多ニシテヨキト覚タリ故ニ春冬秋ノ芽ニハ去芽木ニ扁テ用ルソ

一世間白虎ヲ用ヲヤヲヿルハ舌乾燥而強心下按而痛ハ大柴胡ニ元気ヲ堅ルヲ大黄ニ恐レテ石膏ヲ用ユ心下ノ鬱滞石羔ソ力ニ知ルヿアタハス却テ胃中虚寒ニシテムツカシクナルソ

一白虎湯ノ症ハ以渇スルソ心下モトコヤラ弱キカタツ人クモ用タキ処アリテ口渇スルソ瀉アリ無汗ニハ抱ラス渇ヲ目アニシ用テハノルシカラス

一小柴胡ト大柴胡ノ方ニ口渇スルハ白虎湯多矣心虚アリテ不得寝ハ安心益元ソ心下鬱滞按メ痛不好按ハ大柴胡ニテ元気衰スル湯之

一下而後モ強ク口渇スルトキハ用ルソ

一痢病後甚口渇スルアリソレニモヨシ

一暑月痢（井冊）切甚渇咳渇ニ吉ヽ（若ハ剤）亦ハ二四結ニテ渇止後不摘ハ金ニ連翹ナト

一中暑着ニ用ルモ渇ヲ目アニ一ハヨシ

加テ本ノ後ニシクリ

一白虎湯之症發狂煩如烈口渇スルアリ此時茯ヨシ葉ヲ入テ用ヘシ

一防風通聖散石羔ハ症ニシテ如ニトナレハ将硝ノ下サホアリテ大便ノ通スルヲアレハ石羔ノ寒ニテ胃ニタヽラセヌ工夫アリ

一竹葉石羔湯ハ病後津液枯渇口渇スルニヨキソシ氏六味丸ニ麦門冬玄参ト入テ用テヨクハ石羔ハヤヽ太シ氏石羔ノカミノナクシテハ潤ヌイアリ人多クモ多入ホトニ渇アラハソルニシカラスウカクト人ミシリ服スル薬ホニアラス

一病後ニ汗抱ソ汗ノ後モ又ハ陽明症ニ元急ハ入トロ子ナハリ唇乾渇スル者ニ用テ有神

十五　大七気湯　指迷　一氏云（莪削青貴蒼　桂吉藿益甘）　虫積

一虫積ニ用ル主方ソ冷テ寒シタルニヨシ　一色蒼白トシテ痩瘠土炭茶ナトヲ食スルニヨシ

一脇腹痛手足冷ルニヨシ胸ツカヘ虫気ニ見エルニヨシ

一脹満虫積ユヘニテ大小便不通ニヨシ但寒ニ症ノ実病ニヨシ虚ニハ虚ヽソ

一予常ニ肺海方木香貴永差リヲ冷タル虫積ニ用浄土附紫平消痞湯ヲ煎アル虫積ニ用ツケテ功アルユヘニ若キ時ハ七味清脾ニ去草果加兵大七気湯ノ加減ニ傳エヘシツカイタレ氏今ハ功能ソレ程ニナキカト思テ以前ヨリハツカハ子氏但以為大七気湯ニ通ヨク見ルハ虫ニ措坐ヘキ剤ニアラス老後任トニ付タル病人ニハ此在用テ可ナルソ

一延寿院玄治ハ冷タル虫積ニ大七気湯煎アル虫積ニ柴平湯

一予鼓脹後経ニテ腹ハリタル病人ニ積ユヘト思テムサトカニ用タレ氏毎寸効モナクス搖脉緩遅ニテ不苦ハ虚冷ト知テ大温補ノ大剤ヲ用間〻利アルユヘニ大七気湯ハツカハタヽソ但虫積ノ実症ハ脉数ニメ按メ有カソシニハ兵将ナトノ殲或通薬ナト加減シテ用ヘキソ

一婦人ノ血積ニハ飯ナト入テイツトナリ用テ功アルソ延寿院ナト入テヨシ

十六、大防風湯　痛風　脚気

一痛風脚気虚冷寒湿ユヘニ痛ムニ用ルソ大防風湯ヲ用或加味大補ヲ用ルソ

一痢後ノ鶴膝風ニ冷虚ニ用ルソ虚冷ハ脉遅トイヘ氏按メ弱キソ

一予ツカイテ見ルニ加味大補湯ノ功ニサリタルト覚タリ但加味大補湯ヲ用テハカトラヌニ大用テ効アルヿアリ薬味スクナキユヘニ功ノアルヿモアリ虚多キニハ功ハヤキヿアルヘキソ

一麻痺不仁ニモ虚ニモト云ヲ目付テ用ルソ

十七　復元養栄湯　（蘇芎參　陵蒛苏　楡术甘）　失血

一血崩シテ絶ヘ心神恍惚戦慄シテ如死モノニ用ルソ若甚シキ時ハ人参或独参湯ヲ兼ルソ

一産後ノ気付ニ此方ヨシ必煎アルニモテルニヨシサソニ寒涼ハナシ地楡若芽ニテナレ氏気ハ血ヲ留ル功ユヘニ用タレハ弓飯ニ参黙ノ功ヨリハヨキ処アリ芬ソナトアルユヘニ人多ニツレアイテノハツキリトシテヨキソ

一虚極發暈不省人事口噤スルハ急ニ醋ヲ以テ面ニカケ又鉄槌ノ属ヲヤキテ碗ニ醋ヲ入テ其中ヘアカニ〆タル鉄ヲ入レ其気ヲ婦人ノ鼻ノ辺ニ薫ス石ヲヤキテモヨシ酸ハ気ル三ノ浮散ノ気ルヲ收斂サスルナコロリ又收斂シテ血モ留ルソ

一下血血崩衂血産後去血或金瘡出血何レモ血脱ノ時ニヨシ不絶トモ血多下リ何トヤラ弱タアルニ用テヨキソ

一能キ人参ヲ入テ為散安神散ノ如クニ用テモヨシ但粉末ハ一ヶ月過レハ気ヌケテ功ナキソ故ニ度々ニコシラヘテヨシ安神散モ同シヿソ

十八　活血湯　皈 芍 桃 牡 玄胡 香 奴 芎 紅 圭 木 牛　腹痛 失血

一痛処ヲカヘスハ瘀血之トアリ死血痛血結痛ニヨキソ一瘀血腹痛ニヨキソ産後アト腹ノ痛ニモヨシ

一瘀血滞リテ経水不順ナル婦人ニ用テ瘀血ヲ去リ経ヲ順スルソ

一瘀血滞ル症ヲ見ルニ婦人ハ経不順或腹痛ナトアリテ瘀血知易シ男子ノハ知レカヌルソ、コヲヨク知ラネハ功者トハイハレヌソ吐血ノ処ニ記タルソ又コヽニモアルヘキ程ニ又コヽニ記スソ瘀血アルハ唇黒キトアリ然レトモ予以為血留肝脾ニシテ不行トキハ一身之血底ニ行附ヘ〆タラストアルヘタリ胸痛アリテ或腹ウ子〳〵ト痛食ヿハ病体ヨリハ能食シ或[illegible]シハ〳〵トシテヒメタル〆或胸中ニ〆ヨスルヤウニテヒハ〳〵トシ或脊痛面色蒼々トシ後ハ唇白手足蒼白爪甲スキチヤウト脱血シタル後ノ顔色アリ是ヲ以考レハ血ニ脉ヨリ不行シテ心胸肝脾ノ間ニ留滞シテ其処ヘ血留ルト見ヘタリ血脉ヲメクルナレハ色蒼々爪甲スキタルヤウナルヿ多キ筈之以是瘀血アル症ヲ知リ後ニハ吐血スヘキト病家ニシラセテ治療スル方家ヲ知ル之ニセヽ

瘀血滞ルニハ活血湯ヨシ桃圭將ハソレヨリハ功速ナリ桃圭娥斤紅青ナトハ功遅キソ此三剤ノ中見合テ或攻或和シ用ルソ吐血ノヿ前ニアリ可参考

十九　烏薬順気散　中風

一中風順気ノ剤トテ世間ニ専用ルソ然レトモ中風ノ気ノ滞ルト云ハ内経ニ云気ル怯人ハ着シテ°不行
不°得トナル鬱滞ノ本ノ気ノ弱キユヘニ物ニ附テ不°得ソレハ鬱気ノ順気ルトハ遠テ気ヲ助ケ温テ行スソ故ニ烏薬順気ルト心得ルハアシキソ此剤ハ中風ノ瀉剤ソ

一此剤鞭ヲ子ナカヘテ不過或婦児ニ杭ニサセテ時冷痛ムヤウナルニヨキソ

一肩肘イタムニヨキソ行気香ソニ合スルヿモアルソ麻黄ヲ代ニ羌活テ常ニ用ルソ強クメクラシメキ時ハ升麻ヲ入ルソ

一旦ノ寒ニ邪ナトニアタリ面風口眼喎斜シ脉不弱ニハ用テヨシ

一加減ノ次第ヲ考テ定アル中風ニヨキソ虚ニアシヽ惣而一旦ノ風寒ニアタリテ口ユカミ手痺ルニヨキ方カソ虚ヨリ発リタルニ用ル薬ニアラス

一前ニモ云如ク中風絶入時ハ独参湯痰アラハ竹瀝姜汁ヲソヘテ用蘓香円延齢丹ナト痰ニ切ニトキテ用ルソ惣テ芳剤ノ入ル子リ薬ハ痰ニノフサカリタルヲ切テ心

氣ヲ通スル為ソ元氣ヲ助クルハ獨參湯ソ

一虚ヨリ發スルハ六君子ニ加減シテヨキソ口眼喎斜スルニ定宿蚕斤芎委止木卜ソ入テ風邪ナトソアラハ羌活ナト入ルソ勻氣散モヨシ左癱右瘓ハ六君子ニ斤アリ圭木宿薏仲絲ナトヲ用テヨキソ加味大補湯ヲ用ルコトアリ痰アリテ熱モツヨクハ六君子ニ竹如黃連斤弓姜薏宿ナトノ属ニサシ引シ或加減温胆湯ナトヲ用ルソ痰火湿痰ノ主方中風門ニテ見合テ六君ヲ主トシテ加減シテヨキソ

一補中益氣ニ宿圭附木弓ナトヲ加ヘテ麻痺不仁ニ用ルソ黄芪建中湯ニ斤弓宿木ナトモヨシ人参ヲ加ルソ十全大補ニ加減スルコトモアリ是ミナ中風ノ血キ治法ソ

九　參飲益元湯　熱病　注夏之病

一此剤ハ注夏之病ノ熱ヤアリテ弱ク清暑益元湯ヲ用テ功ナキ服熱ノヤムスハ此條下ニ合フトキニ用ル剤ソ補瀉ノ中ニ補氣ヲ兼タソ

一熱病汗下ノ後津液枯竭竹葉石羔湯ヲ用シカト思フトキニ此剤ヨキソ

一滋陰降火湯ニサシ引シテ人参ヲ加ヘタルモノト可知ソ

一入門ニハ熱病後陰火アリテ熱不解口舌乾ニ用テアリ汗下後虚煩ノ間ニ心ヲ付テ可用ソ

一暑氣ニアタリテ熱不解シテ陰火ハアリテ氣弱キ服ニ用ソ

一熱病下後或亡陽汗不已服温補シテ汗不已コトアリ又ハ六味丸ニ雷栢多為湯或此剤ノ加減ニアル虚汗不已治者木酸トアリ是ヲ用テ大功アルソ

九一　半夏白朮天麻湯　頭痛　心虚　痰厥

一此方ハ四春頭痛門ニアル剤ソ一痰アリテ頭痛スルニ湿痰ナラハ此剤ヲ可用外邪アル頭痛ニハ無功ソ

一頭眩怔忡氣沉陷驚安如乗舟車心虚痰厥ノ症ニ用テヨキソ心虚痰厥ノ弱キ症ニ人参ヲ入テ用テ此間ニ三淋ニ貫苓ヲ加減烏沉ニ茯苓或天ニ平ナト兼テ用ルコトアリ

一頭眩アリテ風湿ニ中ニ坐スルカ如ク悪心アルハ心胸ニ痰アルユヘナリソレニ用ルソ此剤不効トキハ心胸ニ温痰塞ルユヘニ悪心モアリ眼ノラクトシテ身ユラクスルコトモアルトニ云ニ温痰ヲ和スル剤ヲ用テヨキソ清心導痰湯モヨシ無熱則去芩連危加宿テモヨキソ灯下集ノ用ヤウ可参考ニカ云ハ肝要ナル功アルコトハカリヲ述タルユヘニ灯下集ノ用ヤウノコトハ見合テ不記皆テ之見ニテ用タルコトハカリヲ記タソ

九二　参朮調中湯　咳嗽

一補中益氣湯ニ去歸升柴ヲ桑白皮麦門冬青五味ヲ加タル物ソ

一虚症ノ咳嗽ニ用ルソコアレ虚咳ニ用ラシカク功ヲ不見世醫虚咳ニヨク用ルユヘニ玆ヲ述タソ

一弱キ症咳嗽此方又丸トキ人参ナト用テ見タキト思フトキニヨキ葉ソ間々ヨキコトモアルソ

一労咳ナト草臥タルトキニ世医多用之ソレハ功モ不見ソ又ヤルセニハ用ヘシ

廿三　桔梗湯　肺癰　腸癰

一肺癰ニ用ル薬ハ痰臭キニモ用テヨキソ

一肺癰ハ胸少ヽ痛咳嗽臭キ物ソ甚臭キハ皆膿ナリ血ノ交ルモアリ胸痛咳多アリテ痰モ少シ臭キハ肺癰ノ機トミルヘシ

一肺癰ニ大小アルト見ヘタリトカク桔梗湯ノ一ツトナリ用テ至テヨシ小ナルハ可治ソ大ナルハ次第ニクサルソ

一男年六十咳ス痰甚多ク瘦タリ診脉スル中ニ息クサシ腐ル臭アリヨテ是肺癰ヲ知リ吐痰セシメテクサカルヘシ見ヨト傍人ニ云故ニ吐痰ヲ見タレハウミナリ脉虚数ニメ弱死近シ三四日ノ中ニ死タリ死後七日ニ膏肓ノ辺ノ肉腐リタルト見ヘ内黒ク見ヘ皮ウスクナリタルト云

一肺癰ニテハナク鼻臭ク或ハ痰臭キアリ是ハ腑ニ於テアリテ脳中ヨリ来ル痰臭キソ脳中ニ久ク滞リタルユヘニ臭キトアルヨタリ　脳ヨリ来ルハ鼻ノ孔ノ咽ノ上ヨリ流レ来ルニ済世全書ニ咳血ノ論ニアリ吐血咳血スルモノ肺ヨリ来ルハ常之脳後ヨリ傳テ鼻ヲクヨリ咽ヘ落テ来ルアリ是ハ吐血咳血ノ為ニアラス衄血ニチカキヤウナル者ソ但衄血来ルハ肺ヘツレ尾遂テ脳ヨリ落テ咽ニ流ル、之

一脳中ヲ虫食シテ臭痰来ル丁アリト云丁有或鼻中臭キ丁有ト云丁壽世保元ニアリ是モ心ヲ付ヘキ丁ソ

一六十以上ノ者ニ間々アリ眼ノ上或頭痛甚而眼ヨリ膿血出後ニ眼臭リ腐テ死スル有是モ脳中痛脳膿テ眼ヨリヌクルト見ヘタリ或鼻ト眼下之間甚痛後ニハ鼻中ヨリ膿血出且アコノ上齗ノ間臭リヌケテ臭血多出テ死タルアリ其ハ浅ヲ見ルニ鼻ノ中ヨリ眼下頬ノ中痛不絶シテ頬骨中シコリタル如キ物アリ以後鼻中上齗ヨリ腋ヌケタリ

一七旬ノ人頭痛左右如裂ソ以後左眼ウミ多出ス痛不止六味丸加雪栢為湯食愈タル丁アリ

九也　玄治十味　咳嗽　二陳一吉西稜子吉候雷　右十味

一風邪稍去咳痰ニ主トス風痰ヲ去ソ

一去守テ加樓貝、国ス、加減アリ崔ヲ奴ニ加ヘテ用テヨシ　一本六

一風痰ヲ去ル剤ヲ用テ咳不已者熱アルニハ加減瀉白散ニ奴苓好杏或ハ味丸熱ニ宿好杏

一如此次第ヲシテモ不止ハ虫積アリテ咳止スカト云ニ心ヲ付ヘシ虫積ハ補ニテモ止ズニ瘀血アリテ咳スルモアリ

一虫アリテ咳スルニ三淋ニ貴苓好杏ヲ加テヨキ丁アリ

一前ニ云如ク冷タル咳ニハ六正吉西好杏宿ヨシ或加永

一虫咳ニハ六正ニ青西好杏丁ニテヨキ丁アリ或六正ニ好杏連ナモヨシ

一冷タル虫ニハ肺痹方木苓貴、求圭丁好杏或木苓貴宿木廿七味清脾去守加丘、

好

凡ソアルニハ浄府湯消痔湯或ハ柴平湯之属ニ仔杏ヲ加ルソ
九五 安栄湯　心虚　痰ニ爵　産後ハ一物ト木阿爵吉芷莒雀　十五味
一産後瘀暈之気付ニ振出シ用後ニ七分ニ煎用ル　一血脱後弱キニ用テヨキソ
一心虚痰爵ノ弱キニ参五分許ソ入テ三度振出シ後七分ニ煎シテノ用テヨシ是ヲ用テヨキハ此剤ハカリニテヨシ服多ツカユルハ三派ニ貫芩或天ニ平或烏沈ニ陳ナト生姜入煎シ兼用テヨキソ
一婦産而後十七年餘不快気沈滔如乗舟車物毎心ニカヽリ人畏ヨイツキ心細ク少ナリ眩暈心ニテ家業ホツナスヿ不能夜々灯ヲフトクシテ枕ノ辺ニ不置則気沈滔而身次第ニ小ソナリ嵐ホトニナルヤウニ覚テ此剤ヲ用ルヿ半年灯ヲ不好ニ年ニシテ家業ヲツトメタリ
一婦年四十大地震之後久眩ニシテ臥シ気沈滔乗車力加ク驚安ノ怔忡東ヲ向テ二年臥危ヲシシヿ不能而此剤ヲ与ヘテ連々久眩止テ起床タリ
一婦年四十五六婚静気沈滔心ホソクナリテ久眩身ユラユラトシテ或ハ気ル逆上身サワクトシテ動気上リ或支或食ヲ急如此ニシテ一年臥ヤサ此剤ニ人参ニ三厘入或ハ少参カヘ用之一年ニ全安
此剤ノ治如此ニヨヲ挙テ告之ソ婦人フラフラト煩ハ床ニ臥テ咳モナク顔色モサノミ不衰ニ此剤奇々妙々アリ心虚痰爵ノ症ノヨハキニヨキソ
一灯下集ニ云治ノ沉香天台湯此方ト清心導痰湯ヲ出シテ條下ニヨク述ラレタリ惣テ沉香天台湯ノ條下ヨク合ニテ功ナキヿアリ動気凡ツヨクシテ痰火アルニハ不宜ソ然ニ痰アリテ此症ヲナスニヨシ安栄湯ハトコヤラ弱キ処アリテ食ヲイツキ脈モ弱キニヨシ
一産後養生葉ト云ニモヨシ　一婦血ノ道ト俗ニ云症心虚痰ニ爵也
廿六、田生湯　当田淋方　産後或産前
一八物湯ニ天台連将木圭丁膺ヲ加タル方ソ是モ奇妙ナル方ソ
一産後ニ用ルニユ夫アリサソニ九ハ然モナク少弱ク折々少ツヽメマイニテカヽテ久重怔忡ナトモアルニ安栄湯ヨシ志心虚痰爵アル病ニヨシ此田生湯則産後山田ノフリ薬ト云ソ是ハ産後然アリテ少弱キ処モアリ腹モ少痛頭痛上気ルシ血然アルニ妙也此剤ハ産後然アルニ用テヨキト可知ソ無然ニハ安栄湯ヨシ
一此剤心虚痰爵安栄湯ヲ用テノ無効トキニ用テ功アリ三度フリ出シ後七分煎テヨシ参五分ソ入テヨシ
一経水久不止腰痛瘤痛アルニヨシ是ハ一度ニサラリト経不得シテ爵滞アリテ然モ少アリ日ヲ経ニモ経不止或時ハ血山崩シ又止々而又来瘀血ノコリテノ居ルニヤ此剤ヲ用テ血ヲトリシ然ヲ去レハ止ム症多キソ
一婦人ノ腰痛腹痛或不痛瘀血ユヘナラハ此ヲ用テ効アリ

一婦咳血ニモ瘀血アリテ吐血咳血スルニハ此方ヨキソ
一惣而産後之治ハ平常ニ産月ニ臨ム婦ニシカワニヨクノ主ニ方アリ
産前腹痛頻ナラハ可用　皈弓圭朮　三貼（元氣弱クハ人参五厘ニ或一分／胸夜不下ニモツノマヽ用）
産後血暈事　皈弓参朮苓甘熟　三貼（血暈甚シクハ参下五厘ニ或二ト血暈無之ニ氣カヨクハ／養生薬ニ人参少入或不入ニモ可用）
産後腹痛　桃圭將小　淋茱　二包　建中丸　一包
産後　吐逆　六君藿苓永　淋茱　二包
血暈　安神散
如此五包遣置ノ血暈ノ薬ハ復元養栄湯或十全大補湯モ（ヨキソ）吐逆ニ三味淋茱方モヨシ地黄ナト能應スル病ハ産前ノ薬六味丸煎ニ加タルヲヨキソ産後血暈ニモ安栄湯ナ十全大補湯ヨキソ地黄ヲ不好ニハ前之ヘ五包ノ次第ヨリ
一産後　一婦血暈不止独参一匁[illegible]皈弓黒永人参三トヘ猶未已多ニテ益血君子湯皈弓黒永多（四五ト）入六文用之或十全大補湯用之連々已而止
一産後戦慄又張参附湯十全大補湯ニ附子ヲ入テ安シ
一産後脉弱血暈頻冷理中湯數貼吐食シテ後脉滑數煩手足温而安此症多迎有悪心カ、スルハエハ三藿苓永三味淋方ニテ味止トキハヨキソ弱キ婦ニテ不能吐ハ理中湯ヨシ俗ハ人多ク用タルユヘニ吐スルト云モノ多シ故ニ弱キ婦ハソノ

ヲ得テ胸中ノ鬱食ヲ吐シテ後快ト云理云キカセテヨシ已ニ吐クハエハ三ノ加減ニ三味淋方ヨキソ
一婦卅五悪心嘔吐スルユヘニ折々血暈アレモ三味淋方ハ三ノ加減ニテ見合スル中ニ吐ハ而後氣絶ソコニテアハテ、理中湯ニ参ニ四分入テ用氣復シタルコアリ
一和剤局方ニ理中湯ヲ以産後ニ必用ノ方ニシテアルソ
一三十七ハ之婦産而後咥々而後受薬頻冷脉弱雖如何ニ建中丸十粒ヲ与ヘテ雖受之故人参煎湯ヲ退丸薬ハカリ用之ニ三度ヲモ湯少シ食而独納夜中丸薬ハカリ用之其中脉カサミ出来ルニヨツテノイヨノヽ人参ヲ不用翌日吐止食進而後人参少シツヽ異功ニ入テ用タリ
一産帯血暈身冷脉弱ニ吐シテ後脉甘見ユ温ル實似虚ニ人参ヲ用ルニ不及ソ和シテヨキソ
一咳逆悪心吐逆鬱滞ニ和シテヨシ胸中咨中鳴テ降則止ソ桃圭將モヨシ用テ却テ吐也ハ三味青皮或三味永連或永圭宿之属或回生湯去地テ用之亦妙ナリ
一産後喘笑而不已コアリ是心虚ノ症爵ノ婦アリ安栄湯ニ三味貴介或温膽湯連ナト加テヨシ心下寒胸中痛ニハ沈紅ハ三味或沈司ノ三味ヨキソ
一婦年四十産後三日脉救及痛九ハ甚也回生湯ニ参三リシ　入ニ度淋出シ後七分煎シ与之三貼而安

益気藥
黄芩最
ノリ效

一婦年弐十八産後腹痛雖儀桃圭將ノ三味淋出与之痛頓止

一婦年卅産後腹痛甚婦ノ氣怯活血湯不効烏沈湯ニ皈弓圭宿水ヲ以テ温和ス而止

一産後産門ニ物出テ不収ハ子腸也十全大補湯益氣湯圭云ヨシ家傳之産門蒸洗茱ヨシ藥袋大ニシテ粉茱ヲ入レ沸湯ニ浸淋出シ其湯ヲ布ニ浸シ産門ヲ蒸温シ或出タル物ヲ洗温テ良久湯ヲ替ヘシテ良久洗テヌノリ冷ル気味ニテ按シテ和クレハ子腸收ル抑説ス云々

一産後風熱ハ治ムツカシキ物ソ熱ヲヨク或テ譫語或起テ歩シト欲シ恍惚シテ不和者外ハ多ハ不治ソ凡邪之始柴胡弓皈湯或芩熱強クハ清肌解湯大便結則大柴胡或安神益志湯逍遥散芩音連或羚羊毒湯或竹茹温胆湯八物湯或四生湯十ト選用之

一心神恍惚九心ニアルト見エ九ハ安神益志ソ虚煩ノ九ハ竹茹温胆湯回春調血飲ノ加減ノ條下ヲ可参考

一誤テ実熱ノ病ニ人多ク已用シテ狂人ノ如ク笑號躑ヲ動シテ死スルアリ四物湯黄連解毒湯清心蓮子飲或温清湯或温膽湯ニ黄連解毒湯ヲ合ス

一産後大便不利ニ胃風湯ヨシ　一泄瀉シテ大便如滞瀉スルハ桃圭將ヨキヿアリ

一産後フラく煩ノ大便不調獨支也芩ニ淨府湯消痞湯ヨキヿアリ

一虚冷婦大便不調多ハ乾姜桂或附子ヲ多ク用テノ無効ハ八味丸煎

一産後経日而後腹痛大便如常而又到貫三和散小結ヨキヿモ間々アリ

一産後口舌為痛則分有熱無熱而可施治無熱大便瀉口舌痛則理中湯決而可之有熱口渇則七味白朮散八味八味之属回春口舌門治法ヲ見テ可施治ソ

一産後痘瘡色紫黒ニテ凡者多シ少シ出タラハ十之二三可救多出テハ不治ソ産婦之痘モ多キニハ不治ソ面ニ二三十カ入ルト云位ニテ飲食良ク几ハ産後ニテ十之二三可救ソ

一産後痢疾多ハソ凡シカラス然レトモ熱甚ク度々发リ汗多出脈数ナルハ不治脈緩ニテツヤアリ熱不動モノハ少凡シカラス心虚熱時之剤或四生湯選用之

一産後腹痛氣凡虚之腹痛ハ脉大ヲ無力悪凡汗アリ或虚実兼ル熱ハ少痛ム公気凡血俱弱皈朮苓熟芍黄耆参　生姜ソ回春調血飲加減ソ是ヨリ八回春ノ調血飲ノ加減ノ一ツ合ノ之証ニテカ治法ヲ云述ルソ

一産後早ク起労動发熱悪寒ハ八物湯安栄湯四君皈弓虚ニ承風ニ邪アラハ柴胡弓皈湯ニ人参ヲ入ル

一産後悪露不下胸腹脹悶疼痛或臍中有塊寒悪发熱有悪血也
活血湯桃圭將　或桃圭奴紅皈青月

一悪血去後腹不満不硬不痛但虚熱不退　八物湯十全大補湯異功散　竹弓

昏迷不
解

一産後悪露不下瘀血上衝[illegible]惱或迷不理腹満硬痛當去悪血四生湯　活血湯　桃圭將

一産後腹軟満不硬不痛者是元不瘀血乃元脾虚故　異功散氷圭宿木　或六

君宿白豆蔻

一産後悪露久不敗血流入肝胃ニ經或腋脇刺痛或名經候久不止血爲血鼓此症ハ治シカシキモノソ先調血飲加減ヲ用テ腫ニ氣アラハ利水ノ剤ヲ加減スヘシ但産後ノ腫氣ハ此症ニ混スヘカラス瘀血ナラハ腹痛ナトスルヲ目アテニ活血湯ニ灯心車十ナト加減或ハ枇杷葉ニモ三テモ入テ加減スヘシ補中治湿湯ハ虚少ナルニ用テヨキアリ冷ニハ痛腫脹湿補之治法血君水圭木附宿了之爲ヨキソ温補スレハ瘀血ハ温ニツレテ順スルソ調血飲ノ加減ハ予用テ未効エハ二反ニ除ソ活血湯加減シテヨシ瘀血ヲ能ヤルモノハ桃圭将ソ將ヲ主子血ニスル症ナラハ延胡索青皮ナトヲ組テ用テヨシ腫氣アラハ○利水剤ヲ加減スヘキソ瘀血カヤソノコトニテメソリカラ子ハ調血飲ハ腫満血鼓ノ加減ノシテモヨシソレヨリハ經行ノ処ニ有加減ヨキソ

○利　産ノ、經水日久不行発腫者是瘀血滲入脾經也治當治血逐脾行氣腫自消也

經水去多少不止発浮腫者名脾經血虚也治當補脾健脾利小水腫自消之一

皈弓芍䖝苓木宿腹木青ソ子猪通萑延膝甘朴水あ

一經水月少不行発腫者是瘀血滲入脾經之　治當活血健脾行氣腫自消之一

皈弓芍桃紅牡水桂朴奴木萑檪玄胡

一産後血露不止是血虚血熱、久不止成血崩服五灰散

調血飲加減　皈弓木苓之熟貫萑縣芽参蓍蚫巵荊膠梅

○顔

血甚不止加地楡入茅根汁磨京墨調服

五灰散　治血不歳成血崩　蓮蓬殻　黄絹（ウヨ蒸ノキヌケニタチ）　血餘　百草霜　棕皮（シユロノケ）

右各焼灰加山梔子炒黒蒲黄炒黒当帰炒黒為細末調入（煎）藕茶服之或煉蜜為丸毎服五十丸清栄湯送下

此症急ナルヿアリ血從シテ血暈ニシ腹中雷鳴シテクラキノヘトミテ脈絶ミ死スルヿ十之ニアリ産前後ニ三味ノ中ニ死スルハ從血エヘニ予是ヲ見ルニ眼ニ瞎テ独参之類或復元養栄湯主方也五灰散用テ見ルニ雷鳴シテ血下ラハ膠ヲ大ニ入テ加減スヘミ茶ヲ用ル間モナク脈絶スルヿアリ予故ニ虚婦ニハ産前四五六月ヨリ保養血君異功ニ皈膠宿小ヲ入テノ用ルハ安胎ノ為トミス又此場ヲ逃レシヿヲ思テ用ルソ常ノ血暈ハ死シカラス大ニ血下リ不尽シテ腹クワラクト鳴ルハ子生ル、時ニ腹中搐シテ鮮血出ルト見エタリ故ニ十之中一此症ニ出会ヿアルユヘニ産後ニ心ヲ得ユルサヌソ其ハ時ニ三味ヲ經テ合進ニ出レハ完早クルミカラヌソ故ニ産而後ニ於多ヨク合ヒノスヽミヤウヨクナリテ三三味ヲ經レハモハヤ内ニシマリテ急ナル脱血ノヿナシ悪ゞ露久シク不止シテ血ノ尽ルヤウナル療治ハ何レノ道ニモユルリトスルユヘテキモ出来ルソソレユヘニ産而後血暈スルニ先産婦ノ色ヲ見ルヘシ唇ノ色アカミアルハ脱血少キソ血甚從スレハ唇ノ色白クナルソ白キ内ハ心ヲユルサレヌソ氏ニ元氣ノツナノキレヌモアリキレヤスキモ

アリソレユヘ産後ノ療治容ニタルヤウニ人ニ云テモ此急症十之一アルユヘニノ自
慢ハナラヌソ故此心得ハ俗ニモカタルモノソ
一産後去血多大腸乾燥無血大便閉結不通　七味白朮散　敗桃奴　八物湯　桃奴
虚人大便閉　補中益気湯加杏或桃紅等加
臍下燥屎累々而手ニサワルハ　三和散加桃奴
一産後気欠血虚極昏暈不醒者切不可發驚哭呼動則驚散真気乗昏暈死
可用熱米湯布按気復甦　先将熱醋薫鼻節醒　独参湯　芎歸四君點　後元歸米湯
十全大補湯　安栄湯之中宜撰用何レモヨシ先ハ四君芎歸湯ニ點ヨシ
独参湯急則淋出用之此是常之血暈而絶シ入為也或云敗血衝腹鳴雷シテ血暈不醒ト
姜芪也カヤウナル事古人ノ論加減法ニ委ク不言シ此場ヘラソニ功者ノ功ニテ知ソ
一産後泄瀉脾虚発腫久不愈成産後腸瀉中満　胃苓湯　異功求宿沢　七味白朮散　啓脾湯
有熱則　消痺湯　有虫積則　浄府湯　有痰滞則　三和散
前之泄瀉ノ論ヲ可参考瀉後腫気アラハ虚冷ナラハ四君子氷圭木車沢灯之属加アラ
ハ補中治湿湯或五苓散車通沢灯心ナトモ用ソレヨリ腫脹之主法前之弁可参考先ハ
産後ハ虚アル上ニナスヿナレハ虚本トシテ冷カ熱カヲ分テ可治ソレ𪜈虫積瘀血之留滞
アルハソレヲ相手ニシテ可治ソ

一産後食傷脾胃飽悶（肉）泄瀉後変痢者難治　不換金霍宿永或向朴丘六十将中
右三方食傷腸ニ痢ヲ治スルソ
産後ノ痢ニ胃風湯（或）桃奴　玄治九味右熱ナキニ用ルソ熱アラハ不換金ニ連香
加テ溼滞熱ヲ和ス　不換金ニ連奴初中後ヨシ熱アリ溼滞不和ハ和中湯芩
連ヲ入ル剤ヨシ痢ノ治法ヲ参考スヘシ虚人ニハ理中湯ヲ用ルヿアリ或七味白朮
散連奴ヲ加桃ヲ加ルヿモアリ産後ノ痢カワリテ台ツカシキト云ヿモナキソ

自考

一孕婦六ケ月八ケ月九ケ月ノ痢三人一服ニテアリテ中年ノ頃ナリ𪜈（比）此渡利アリ白朮芍芩
湯ニ連奴ヲ加初中後用テ皆安胎シテ治タリ
一産前患ニ痢ヲ昼夜六七十行胃苓湯木奴連ヲ加テ度少減スル比産ス而後血暈
一眠計暈ヲ四君独参ナト用テ止以後以消遥散加木奴或九味清脾去草加木奴テ治リ
（一本不好按）
一産後六七十日ヲ経テ而後患痢昼夜八九十行脈五動胃風湯玄治九味用テ少減
スルヤウニテ不治遂ニ泄滞奴力脈弱心下ヲ按ス好按而胸也動気有力手足小冷
似虚而甚危和中湯九味芍朮芩貴今半木連敀右品加桃奴大便和而手足温和而安
一産前ノ熱台ツカシキ者ソ熱中産則血熱虚煩シテ坐臥不安或起而欲行狂云而
死者多シ必難論ヿモアリ元気思外コタエル者モアリ婦年廿五産而熱産而不

解七八日之舌焦黒堅硬大柴故桃仁兼氣ヲ以テ舌潤後温胆湯合小柴胡或八物湯之属ヲ以テ治シタリ

一産後之熱ヲ見ル譫言シテモフイリヘト立不知苦処ハ多不治ソ脉ツヤアルハ不苦虚数ニテカサ蔵スルハ不治ソ湯ニツレタル飯ヲ三四五椀一日ニ食スルトイヘ共食スルヤラ不食ヤラ不知ヤウニテ食スルハ胃気ルタリニハナラヌソ心熱アリテ神不守舎ヲ属ハ不治ソ小逍遥散ニ合黄連解毒湯或安神金霊湯ナトヨキソ大便結セハ大柴胡ヨシ或蒸桃圭ヿモアリ腰痛アルニヨシ

一産後熱嘔吐三味柴葛卮芩或連ヲ加テヨキヿアリ

一産後之熱参之応スル症ハ僅ツカニ草臥テ脉大ニ又弱ク汗ナトアリテ殊ノ外ヨハキトヘユルニハ純参ニ応スルソ

工夫要論

一産後悪心嘔噦不止若去血之多乃是脾胃虚シテ血少之故

産シタル当座ニ悪心嘔吐アルハ産ニテ血ヲ貯ニヒクタ物食ヲスヽムル故ニ飲滞シテノ産モテ后悪心嘔吐スルアリ此症多クハ食吐尽テ又后ハヨシ又後ニアルハ血去而血ナキユヘニ気血虚シテモテトアリ弟未タ治ハ不足太心ニ尽産後日ヲ経テ気血虚シテ不食嘔吐スル症モアルヘシ虚冷ナラハ異功六君ニ永宿圭ノ属ソ或理中湯ソ 蛔虫ナトアリ

テ悪心嘔噦スルヿ多シ虚寒ノ悪心嘔吐ハ心下無物按ノ弱好按ソ虫積ノハ不好按ソ三淋或ハ六正加藿芩ニ永弱キハ理中湯或木芩貴永圭丁之属ソ

一産後悪モ多去少嘔噦悪心胸膈疼痛不止是悪血冲胃

此症未見之瘀血胃ノ冲症ハ不多悪心嘔吐ノ症皆前ヲアル壮症ソ瘀血去ルヿ少クテ冲胃位ノ症ハムツカシキ症ソ何ニモセヨ胃ヲ冲ナラハ不換ニ丘ハ藿紅或三淋三芎胃中ヲ退ケテヨシ悪モ多ト云ハ瘀血ソ産而後ハ十ケ月断タル経水滞リテアルカ産而七日目中ハ絶不ヲル者ソレヲ悪モ多ト言ソレユヘニ産後腹アルハ瘀血不可尽也居之色赤腹痛無之ハ瘀血来リ居タルアトナルユヘニ留封滞ハナキソ故居不赤属ノ色白キハ晩血シタルアトユヘソ悪モ多不昏胸膈疼痛セハ吐血スルヿモアルヘキソ桃圭将或ハ烏沈平胃湯桃圭ヲ加瘀血ヲ下ヘヤル治法ソ建中丸モヨシ

一産後因怒傷肝胸脇刺痛胞脹不進飲食発熱ノ症アラハ九味清脾湯去藁加蒼或二陳烏沈平胃湯天ニ平或三淋青ヲ加ヘ或温胆湯ニ加減シテ順気シ肝経ヲスカシ清スル治法ヨシ回生湯ニ参ヲ去代沙多ニテモヨシ

一産後血虚発煩躁虚驚睡臥不寧 錯語失神

調血飲加減 飯弓 木苓 甦貴 毒 雀 参 殄 茹 艳 門 辰砂

血虚シテ煩躁スルニハ此剤ヨキソ八物湯ニ茹門卮砂或連ナトヲ加ルソ或安神益

志湯心治モヨキ也此病ニ風熱血中ニ入テ熱トナリ如此ヿアリツレニハ安神益志湯温胆
湯ニ連ナトヲ入テヨシ産後熱ノ治法可参考

一産後口眼喎斜（口噤）手足牽引或筋惕肉瞤或驚悸戦掉不止或作寒熱脉或大全方或虚
細皆是気血倶虚不能栄養（筋）節脉調血飲ノ加減ハアレ𪜈此症ニハヌルキソ十全大補湯
ニ附子ヨシ血虚ノ中風ト見ヘハ大防風湯加味大補湯ヲ用テヨシ此症ニ癲癇ノ発シ
久ルヿアルツ故ニ搐癇ニ絶入テ常ニ如此ヿナキカト云ヿヲ可正ツ産后誤テ風ニ
感ニ如此ヿモアリ大防風湯加味大補湯ニテ温學スヘシ痰アラハ竹瀝姜汁加ルソ

一此症ハ虚ニ此証癇後衝上シテ有之能膽家秘夫馬方胡梅散心虚痰鬱之治此所致正（改）

一産後心血虚神无所依或因悲思鬱結怒気憂驚々則神舎空舎空則生痰是神
不守舎使人敬驚狂煩乱呼罵欲走悲歌妄ニ笑及揺手戦（人）
調血飲加減入　飯木苓　虵米　菖甘夕　茹茯门　色貝同　辰砂　竹瀝　姜汁
是調血飲加減心血虚ヨリ生スル症ソ痰火アラハ加減温胆湯モヨキソ或清心導痰湯
モ心ヲ司付ソ心ニ在ル痰鬱之症ニ如此下アリ狂気ニテルトテ如此アリ黄連解毒湯
清心導痰湯ヨキヿアリ或又回生湯ニ去多代沙多テ用テヨキヿモアルヘシ或安
神益志湯之ヨキヿモアルヘシ

一産後血気暴虚生痰々迷心　使人昏迷不能言語

熱

養

調血飲加減　竹弓木苓　䖝貴　十毒貝同夕菖吉竹瀝　姜汁十勺許
此剤回加減ノ産後ノ不語アリ痰アラハ加減温胆湯ヨシ心熱心虚ナラハ瘂不語方用之
寧神湯　参竹蛇门色連甘辰菖灯心　水煎調辰末攪匀食後温服
導赤通気湯　治心虚舌不揚者　蛇通门夕菖飯甘灯心
竹引々ハ引経ニ取前煎服痘中有此症或不失音心虚声微而不出者有
導赤飲　治心虚小便不通　蛇通竹竹葉　一方夕菊　水煎皆心ニ熱ヲウケテナスコト
ナレハ治大同シ加熱或心虚ニ或心虚ニシテ痰迷心竅或心虚不語痰アリテ不語或舌弱不出
ニテノ不語ヲ辨知ルヘシ失音不語ハ痰多シ心腎ノ虚モアリ

一産後心血空虚心無血養舌不能言精神短少　調血飲加減　竹弓木苓䖝（辰砂主龍）貴甘参ノ酸菖
遠神地吉门竹瀝姜汁十勺許　或帰脾湯モ心ヲ附ヘキソ前ノ心虚ノ無力之理可参考

一産後悪血過多血虚発腫者　調血飲加減　竹弓木苓蛇貴萑艹宮厚朴楮通
或補中治湿湯ヨシ前ノ腫気ハ虚分之治法可参考
此治法下血後失血後ノ腫気ハ治法皆同シ療治ハ一ヲ以ニノ知十ヲ功者ト云ソ

一産後悪血太不止流入脾経発腫満者
調血飲加減　竹弓地貴萑駅杜艹紅莪朴宮木楮通
此心得ハ瘀血止テ又中ニ脾経ニ流入テハルヽニヨシ下血ナトスル中ニハルニモ此心得ニテノ加減ニ用

一産後脾虚飽悶不進飲食
調血飲加減　竹木苓 歸 貴 莅 屮 宿 蔻 朴 益茹 木
此加減ヲモ用ヘシ食不進トキハ心下鬱滞アリテ不好按虫積カト心付ヘシ脈不進ハ虚冷カト心付テ温補シ或太公地異功ニ永宿圭之屬不虚ニシテハ冷アラハ木苓貴永宿屮或不換金ニ莅宿水或理中湯痰アラハ六君ニ宿蔻血虚故ナレハ歸人調血飲加減モ用テ見ルヘキリ

一産後血虚煩渇不止津液枯渇
調血飲加減　竹木苓 歸 貴 屮 参 門 去 天花粉 葛 蓮 芍 梅
或ハ味凡門去或七味白朮散ニ門去ヲ加テ白キヿモアリ或参飯益元湯ナトニ心ヲ附ルヿモアルヘシ

一産後脾虚発痰喘気急
調血飲加減　竹弓苓 歸 貴 屮 咒 木ソ子 朴 芍 宿 同 貝 竹瀝 姜汁
是ハ痰ヲ生シテ喘急シ或持病ニ痰喘ナトアル症発スルヨシ痛不止ハ喘急或痰ハ治法ニテ可療ソ産ニテ一旦之中ニ冲上シテ喘急アルハ瘀血肺ニ入ノ攻ルユヘニ死スルトアリノ其症ニ出會トキハ急ニ苦ム者ソ死症ヲ病家ニ告テ療治スルナラハ桃仁承気湯杏仁ナトヲ入アルヒハ枳實ヲ加用テノ見ルヘシ此脾虚喘急ヲ生スルト云ハソレヨリハ緩カナル症ニ喘急ハ呼吸セハシケレ氏大息スル中腑ヨリ出ルヿアリソレ氏ニ虚甚シ而脈虚數ニテ無力ハ合カミキト云ヿヲ病家ニ告テ可療ソ心下不好按寒ハ同貝楼ニテ涸サハ可治ソ或喘急理中湯之症モアルヘシ或去桂痰ヲ兼ルニ亦淮方ニ厚杏ノ症モアルハキソ

一本
因去血
過多

一産後因去瘀血過多遍身骨節痛難轉側是血虚不能栄養筋骨
調血飲加減　竹弓木苓 鈍 出 雀 甘 虵 芍 紅 参 膝 乳 桂少許
是ハ血中熱アリテ痛ムニヨキソ冷痛ハ五積交加散加味大補湯大防風湯或温地ナテハ（温）加減湯温湯之加減ニ冷熱ヲ分テ可施治

一産後因去血過多血虚発痙者
調血飲加減　竹弓苓朮 鈍 出 香 甘 参 著 虵 芍（去芍等トアレ氏予去蒼留芍） 発熱ハ加柴杢
有痰加樓貝同竹瀝姜汁少許去熟地是ハ身ノスクムニ症ソ甚キハ牆搦及張スルソ剛痙柔ハ痙アリ此加減ハ血熱アリテ痙ヲ発シタルソ虚寒ニハ大補湯加味大補ソ癲癇之症発スルトキハ似タリ持病ニアルカ無力ヲ向テ可知癲癇ソルハシカラヌ若リ血熱アリカリテ痙ムハ血中ヲ涼シ經ヲ順スルコト口カオ一ツ加味大補湯去附テ熟ヲ地ニ代テ柴苓ヲ加用ヘシ

一産後形体壮盛手足癱痪遍身疼痛難以動縮者是血虚有風之病也
調血飲加減　竹弓苓 鈍 出 雀 甘 貝 同 桂 膝 苓 羌 茯 芍 竹瀝 姜汁少許

此外減血虚ニシテ風痰アリテ身痛ムニ男婦トモニ用テ功アルヘキソ此ニ症此剤ニテ不治ハ痛風之治法ヲ参考ヘ

一産後初起腹中有塊升降作痛無寒熱者俗云兒枕七日痛自已或腹痛塊痛作寒熱者痛不移処是死血痛當去悪血痛自止矣此瘀血ヲ退クル治法ヨシ活血湯桃圭將血四（或）生湯或此産後ノ瘀血ヲ治スル法ヲ以テ施治別ヨキソ

一産後初起蒸熱乳發寒熱者依本方加枳實通草青皮

芎皈調血飲　行弓　朮　苓　訑　当　査　萑　永黒炒　益母　牡　廿

蒸乳ハ乳腫ソ産而後能食スルハ五日ニ乳或四日半程ニテ乳ハ脇下ヘサシコミ寒熱アルコトアリ俗ニ云乳ニモノアカヌユヘソ故ニ童ニ乳ヲ吸出サセテヨシ猶シコリツヨキハ布ヲ以湯ニ浸シテソレニテ乳フサヲアタヽムレハ乳トケテ行ルソ

呑参良血一補氣益血湯　治小産氣虚下血不止

参　芪　行　朮　芎　艾葉　多甘廿　膠　弓　青　萑　富　水二盞煎至一盞

小産後ニ少シ怒レトモ下血不止ニハ常ノ産ニモ用テヨシ或血崩或下血或経水久不止ニモヨキソ

一補血定痛湯　治小産瘀血心腹疼痛或悪寒發熱

行弓　芎　訑各一戔　玄胡索七分　桃　紅各三分　萑　青炒　沢蘭　牡各五分

右剉用水一盞半入童便酒各一盞半煎至一盞

此剤能可去瘀血不可限于小産若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥（芎）　若按之反不痛此是血虚宜用四物湯参苓朮　若痛而作瀉此是脾虚宜六君子加　破胡紙炒　肉豆蔲煨　姜棗ニ煎服

夫産後之治法前ニ云如ク臨産芎皈湯ニ圭或ニ味丸煎ニ加圭弱則参五匁之一分入後産不下ニモソノマヽ用之死胎ハ氷桂附弱則多朮眩ヲ加産而後血暈ナニ安神散四君子合弓皈湯加黒朮或安栄湯大補湯建養栄湯可ニ吐逆者不換金萑苓ニ氷或ニ淋可ニ血暈能食則減人参或ハ用之瘀血腹ニ痛桃圭將建中丸或活血湯是予之所常用而百發百中者也雖然産後遍云之外諸症無多也仍産後調血飲加減之數條間々雖有而是亦不可不知仍記之（予之）於治療附之而傍於三子之治療矣

廿七

四味烏沈湯　痰厥　心痛

一此方入門心痛部ニテ見出シテ子アツカイ覚タリ

一心脾痛ニヨキソ二陳平胃ヲ合スルヿモアリ

一心虚痰厥之症モ二陳平胃ヲ合シテ用ルソ

一産後アト腹ノ痛ニモ桃圭奴ヲ加テ用テヨシ

一産後ノ痛頃氣ニシテヨキヿアルヿ多シ血下ト云モノハ氣ニツレテ流レスルソ水ハ血之波ハ風之風ハ氣也陽也血ハ形アリテ不動氣ニツレテ行ソ産後俗ニ血アカルト云血アカルニテハ

ナク氣ト乏ルソ熱アレハ氣逆上スルユヘニ熱ト氣ニツレテ血アガルソ其症ハ清熱涼血スレハ自下ルソ内冷ニテ血凝滞スレハ温薬ニテ温テ順氣スルソ

一疝ト氣ニハ木瓜ヲ加テヨキヿアリ

九八　柴平湯　　虫積

一是ハ熱ノ虫積ニヨキソ浄府湯ハ瀉アルニ用ユルソ

一心下按テ痛不好按ト云ヲ目アテニ用ルソ一婦年四十腰痛不已此剤ヲ用テ止タリ

一虫積アリテ身ナト痛ニ用ユルヿモアリソレハ痛ム処節ニシコリタルヤウニテクリ〱ト結咳ノ如攣物アルソ或節窄痛ヤツナルヿモアリ

一癰後左積アリテ熱モ少アルニ用ルソ大人小児共ニ同シ意リ

九九　清心導痰湯　　癇　狂ト氣

一癇症或心虚痰鬱ノ熱アルニ用ルソ一熱痰涎胸ニ塞リワク〱トシテ呃味スル用ルヿモ有

一乱心シテ人来テ捕ルホトニ外ニ出シト云テカケ出ルヲ三四人ニテ抱キトムル二此剤ヲ七八十貼用テ本復シタソ必竟癲癇之失心スルユヘソ温胆湯ニ黄連解毒ヲ合シテ其間ニ用ルヿ也アリ発狂甚ハ防風通聖散ソ

一去苓危黄連一味トメテ用ルヿモアリ一心虚痰鬱ノ症耳鳴ニ用テヨキソ

一男年十五ニ小便淋痛止テ後戦慄シテ手ヲタヽキ多笑如絶ニシテ醒起一日ニ三四次

応

發ス沉香天麻湯ヲ以テ不効却テ多發ス此剤ヲ用テ須臾ニ止本復シタソ此男二三年ノ後熱病ヲ患和解ノ剤ヲ前医用テ熱去タソ然氏脉追弱シ一医此柴苓湯ヲ用無効脉ヲ考ルニ按テ弱理中湯ニ参ニ分入テ用本復シタソ其ノチ咳甚不止肺痈方ニ好杏ヲ入テ用全愈タリ一年ヲ経テ風咳後ニ嗽三ヶ月不止シテ医為労アス以浄府湯加好杏丁テ全安以後不發是ヲ以テ考レハ此男癇症持病ニアリ虫モアリ脾腎月虚冷シタルヿモアリ以一難論ソ

一沉香天麻湯清心導痰湯ニ方表裏ノ剤ソ一ハ温補メ却剤也一ハ寒涼ヲ以洗熱痰退ソル剤也予始以為却剤ト云ハ熱アリテモ熱剤ニテ却而ヤルユヘ二三五貼用テタヒヤカシ能ト思テ腹ノ動氣有カニテノスヽムニカマハス用タルニ不症ソコニテ合点シタリサテハ冷タル痰ニハ沉香天麻ノ湯熱アル痰ニハ清心導痰湯ソト思テ用タレハソレヨリ薬ノサハルヿモナキソ沉香天麻ノ湯ノ脉ハ緩和ニテ性シツカナルニヨシ清心導痰湯ハ脉滑数ニテワク〱トシ氣サハヤカナル症ニ用テヨキソ弱キヤウナルニハ安栄湯ヨキソ灯下集ヲ見テ癇症ト癲症ノ次第ヲ知リソレヨリ知テヨク癲癇ノ未發ノ症ヲ知テ心虚痰鬱ト名リ付タソ心虚痰鬱ハ癲癇ノ未發ノ症ソ此三剤ハ大切ヲ得ル剤ソヨク〱参考シテ手ニ入ツヘキソ

卅　肺痈方　吉守　通己　木知　桔沢　何丁　虫積（二味不足　常用ト八）

一是ハ中条流ノ小児方ノ中ニアリコアリソカイ覚テ大人小児氏ニツカフソ

一虫積アリテ咳スルニ冷杏ヲ加ヘ必切アリ虫積アリテ喘急スルニモヨシ

一虫積アリテ身ニ腫脹シタルニ倍通次猪ニテ大功ヲナシタリ

一虫積心氣ニテ手足ナト痛ムニ用テ功アリ

一小児鼻ヲセヽリ爪ヲカミ忘心下寒衝積アリ小便シキリナルハ肺疳トアリ或面浮腫色蒼白咳アリトアルソ大人ニモ此格アラハ可用ソ

一前モ云如ク無熱虫積ニ肺疳有ル時ハ虫積ニ消疳ソ

卅一　五香湯　小児痘

一沉丁（木）香麝香乳香五味ミナ温ニテ香氣アルヲ以温メテハツト散スルユヘニ内ヨリモリタル小瘡ノ氣外ニ發スルソ瀉アルニモ小瘡アルニハ用ルソ

一頭瘡出来小児ハカフト瘡ト云ソレニ用テヨシ温疫シテ毒氣ヲ發スルソ

一冷タルヤウナル小瘡ニハ決雪ヨキソ熱ツヨキニハ加味五香湯ヨシ然レ𪜈瘡ノ気内ニコモルユヘニ外カツキ熱アルハ此方ヲ兼テ用テヨキヿアリ

一痘畏毒貝膿比毒氣陥伏シテ痘凹ニナリテ黒点交ルハ難治ソノ時ニヒタ物多用テ功アルヘキ剤ソ古方ニ用テナニ木ナハ木香散十二味異功散ニアリ沉藿乳ハナシ然レ𪜈カフト瘡内ヘ引テ外乾クニ用テ功アルヲ見ルハ技究ル時ハ用ユヘシ或黒気少見ヘハムツカシキト云テ用テ古方ノ外ニ大功ヲ得キハコノ剤ソ痘發熱三日之後出痘ノ二日メニカシテテ苦悶シ熱ヤアルニ加味五香ヲ用ルヲ云テ痘發シ治ヲ得タリ予享保元（丙）申ノ春始テ見タリ

一カフト瘡或ハ一身ノ升氣出来テ腰痛スルニ用テ功アリ腰痛ハ瘡毒内ニ陥リタル之

一小瘡或ハ瘡毒内陥シ腫脹シテ喰不進必可用ソ熱アルニハ加味五香湯ヨシ五香ノ本方ト加味五香ノ中考テ選用ルソ

一加味五香ハ升葛羌將アルユヘニ温散ノ氣ヨキソ其ハ意ヲ老（考）テ温散スヘキ𪜈ハ本方ヲ用熱甚キカ或ハ又大便ヲ下シテモト思フ𪜈ハ加味五香ヲ可用ソ予用テ見ルニ本方ヨリハ加味五香功アルカト覚タリ然レ𪜈虚人ニハ本方可然ソ

卅二　加味五香湯　小児痘

一五香周葛將羌通ヲ加タ物ソ灯下集ニ委見タリ用ヒヤウノ功能可參考此剤奇方ソ

一カフト瘡或ハ一身ニ小瘡出膿水不絶ニ用テ妙アリ

頃日ケ人

一婦年四十三年ノ未一身ニ小瘡出膿水不絶ニ兩服用テ全安

一小児カフト瘡頭耳ノ風邪アルユヘハカ乾テ大便瀉シ衣ニ白膿或青月黒ノ物ヲ下ス此剤ヲ与テ全安シ

一本

一小児周歳或半年以上或手足生小瘡外治シテノ欲愈俄然生熱苦悶或因風寒シ内陥咳嗽痰喘或ハ又頭ニ瘡毒ニテ手小疱勾手足之赤爛腫痛予救之投此剤得神一入ツ云小児若患瘡瀉青乃毒去無害不必服薬ト有リ小児科ニ云瀉青ハクサアル児ト驚風ノ兆ト云ソ世医多見瀉青同全ヲ為脾胃虚冷是亦僻見也虚冷

為虚冷是
又僻見也

結

シテ、ノ青者後為慢驚風ヘキソ是ハ温補脾胃而可也小瘡ノ毒キアリテ瀉青キ加味五香湯可之

一痘欲出不出大便閉若悶其症有毒有虚故不發出補無効則可沈木藿乳發之升葛

堯通將消毒清肝之古方未論之ヲ予取得奇功且痘後餘毒身痛手足不能屈伸則

投之有神　一小児瘦而頭額凸腫而為膿俗ニ疙フシト云或疙ハセト云大便結或瀉法嘗用

茶貼シ或針シテ膿ヲ出シ加味五香湯ヲ用テヨキソ為痱テハ不効ソ胎毒ソ

一瘡毒ノ氣残リテノ手足為痛者此剤ヨキソ

一小瘡外治シテノ毒氣不散腫脹此剤ニ倍加木通シテノ安熱アリテハ小便少則赤小豆湯

一小児生レテ俗ニアマ物ト云テ好ムヿアリ小児流ラキトウナト入テ芍甘ヲ用ルヿアルト云和流之

是モ不又イソアマモイト云テ若好ム時ハ芍甘ナトヲ用テヨシ五香トモニテ好ムソ　弱キ小児ハ必

参ヲ子ヲラセテヨキヿアリ生レテ後早ク屎ヲ二三度下スモノソ是ヲ下サヌ中ハ乳ヲノマサヌ

ソシテ補住スルト云意ソ俗ニ力ニハトト云故ニ容ノ色モアカク實症ナルハ加味五香ヲ

用テヨシ布ニ包フリ出シ用紅花ソメノ布ニテモ包瀬出スソ　顔色白ク弱キ児ニハ沙

参異功太ナトヲ入テ用テヨキソ則五香ト各付テ用ソ

一マアソ為サヌ人ノ臭ニテキイナルエヘニナクト仕覺ヘソ大心氏ヨリ老児ルニ痘ノ發ルヨリ出痘三日

ニテノ中ハ毒ヲ消ニ五ス加味五香ヲ用田水ヲ小豆膿ノ中本方ソ五香湯ヲ用ニ温散

シ弱キニハ人参ヲ入而収リテ後ハ加味五香湯ヲ用テノ毒ノ残リタルヲ消シテ後ニ

能收靨サセテヨキヿアルヘシ若痘流行シテ毒氣ツヨク救方無効ヿアルモノ也其時ニ用

テアルヘキソ或治法技究ル時ハ心ヲツケテ用ツケタラハ此ニ方ニテ大功ヲ得ルヿアルヘシ

又瘡小瘡ヲ能發シテイヤスヲ見ルハ之或痘後之餘毒手足痛ニハ玄治モ用ラレタ

リ予出痘ノ時出カヌ難如何ニ加味五香ヲ用テ一人功ヲ得タリ是ヲ以テ考レハ西

水世男膿ノ時ハ木香散十二味異功ノ心モ十二本方ソ五香湯ヲ与ヘテ胃氣ヲ温メ外ヘ

發スル意ソナヲ又人参黄芪任龍犀牛大力之属ヲ以或補之或消毒或補血ノ治法五香

之本方加味五香消毒温補發毒之功アリ予モ生命之年救アルニテ痘ノ流行ニアハ、

必意ヲ以テ其功ヲ可知ト今年思フヿソモツ氏痘瘡ハ小瘡久瘡ノ原ト發シテ毒氣命門

ニ伏シ虚氣ニアラテ發ハ出スト云ヿヘ内ヨリヨクリテ外ヘ出スユヘニ陽氣弱キハヨクイリ出

スヿ不能ト云ヿ其ハ理決太忽也丁木沉藿乳ノ香ヲ以テ内ヨリヨクリ出スカヲツヘ

ヘキソ周葛尭通將ハ毒氣ヲ消シ凡ヲ清スヘキソ

一弱則田水之持ハ四君ニ五香ノ本方ヲ合シ胃膿ノ時ハ八物湯ヲ合シテヨキヿモアルヘシ。

　卅三　九氣湯　爵　萑　甘　　心胸痛

一爵萑甘三味ヲ等分ニ合セテ味甘クシテ胸腹痛ニ用ヨキ丁右

一胸折々痛ムト云ニ三陳湯ヲ合シテ用ヨキヿアリ

一胸中ニ爵滞シ久ル諸気攻テ見レハ胡ニテ痛アルヤウナル時ニ和スルソ

一胸脇痛偃（偃）臥シカヌルト云ヤウナル時主方ヲ用レハサカラヒ不快ニヨキゾ多后扱脇胸痛不能偃臥何ヲ用テモ薬カタリテサカライ不快ト云ニ不換金ニ芍ヲ加甘草ヲ倍ニ味甘クシテ用テ全安皆是一ヲ乃スハ理拖リテ相手ノ合点セズゾ是非無理異見ヲ云テヲシツケントスル氏相手何トシテモ得心セス時ニアツカイヲカケ和スレハ合点カシキヿモ有スルゾ故ニ逆則従之ト云治法アリ其意ゾ

卅四　沉香天麻湯　羌　独　云　竹　蚕　沈　鳴　益　守　足　走　甘

癎

一癎之主方ゾ劫剤トテヨヒヤカシテ痰ヲ退ル剤ゾ然レ氏熱アル症ハ却テ熱ヲ助ケテ真気ヲ耗散スルゾ冷タル症ノ痰ハ湿薬ニテメクリテヨキゾ故ニ性モ脉モシツカニ動ニ気モシツカナルニハ用テ大功アルゾ熱アルニハ清心導痰湯ゾ虚ハ安栄湯ゾ

一男年廿五発スル時気絶シテ気復スル時ニ言語モウリ牛ノ行如クニ無性ニテアカクニ此剤ヲ用即安

一尼年六十余性静ニ常ニ物ヲソロシクシテ気弱ク此剤投結ヲ得テ全安

一癎度々ニ発シ毎丸剤此剤必ヨキゾ又症ニヨリ加木瓜ルヿモ有

一寒症麻痺足痛或腰痛スルニ加木瓜テヨキヿアリ

一冷痧腫脹スルニモ利水ノ薬ヲ加テ功アル乀キツ虚症ニハ用テ不宜ゾ

一灯下集ニ用テアルヤウニハ無効故ニコア心虚疾其ノ治法ヲ建タリ其治ニテハカキツヲ又眼無光症ニハ用テウカクトヨクナルヿアリ

卅五　消風散　参　苓　云　芥　甘　羌　弓　蚕　苛　蝉　貴　朴

風疹

麦　汁

一風疹トテ俗風ホロセト云ニヨシ

一風邪外ニ發スル時ハ痒ゾ外ニ不見トキハ悪心咽痛腹痛スルゾス是毒気ルト云ヿヲ可知風疹ハ怪キ者ゾ血中ニ風熱アリテ悪キ血ノ皮膚留ニアルカ風ニツレテ發スル時持病ニ風疹アルモノハ風ヲヒケハ出ルゾ然レハ悪心ハ悪血アルト見ヘタリ悪血ノ気内ニコモレハ悪心腹痛スルゾ大刀子ヲ加テ痛止ゾ大刀子ハ胃中ノ瘀血ヲ除ルト云ヿ四春手捻散ノ処ニアリ痘疹小瘡ノ毒気ト云モ悪心腹痛咽痛嘔吐或吐唾ヲ云内ニコモルユヘニ如此外ニ能發スレハ無之ゾ

一小児腹痛吐止時發雑揕救方無効予消毒飲一味ヲ与ヘテ安後ニ心胸ニ小瘡出膿汁ヲ出タリ予以是留痘後腹痛手捻散ノ意薬方ヲ考テ悪血ト云ヿヲ知タリ

一常之風邪及痛ニヨキゾ

一無故ニシテ痰血ノ来ルニ用テアリ予以為此痰血ハ胸（肥）ヨリ鼻ノヨソヘ傳テ来ル血ノ為ニ虚シテ内ヨリ来ル痰血ニアラス

一寒熱時節凡ホロセアル婦増寒及痛嘔吐シテ不受薬三味淋薬用之少和然シ氏翌日午後及痛起アリ三味ニ柴葛少生姜ヲ入煎服之身取々痒出テ後嘔吐増甚和此嘔吐スルハ風疹之気欲籠リタル之

卅六　匀気散　参　朮　定　沉　甘　青　香　止ゾ　瓜

中風

一中風面几口眼喎斜スルニヨキソ

一手足麻痺或スクミナヘテ救方無効ハ此剤ニ仲藤（膝）薏苡トヲ加ヘテ六味丸ニ加減スヘシ丸ハアラハ知栢冷ナラハ八味丸ヲ煎シ或淋出シ後煎テ兼用テヨシ

一虚人ノ気鬱スルヤウニテノ心胸ナト少ツヽ時々痛ムニ用ソヨキヿアリ

一久痛者已ニ用テヨキヿ有　一中風六君子ノ加減ヨシ後記ハ加減印ヲ見テ可参考

一手足麻痺スルニハ君子加減或加味大補ナト用ル中ニモ間々此剤モ用テ皮膚之気ノメクラシテモヨシ

廿七　升陽除湿湯（行 蒼 蒼 羌 独）（芸 柴 周 藁 蔓）　雑症

一此剤ハ血崩帯下久不止ニ升提シテ止ル意ソ丸薬ヲ用テハツトシテノ升提スル之ソ方論ヲ可考

一泄瀉久不止ニモ下陥ノ気ヲ升提シテヨキソ又小便淋渋ナル者加通草全安

廿八　補中治湿湯（参朮苓蒼卜介黄内空司）　腫脹

一虚ニシテ小熱アル腫気ニヨキソ或加灯心廿　一病後之腫脹或後之腫気ニヨシ

一脾胃虚ニシテ湿熱アラハ脾気ナク此用テ湿熱ヲ滲スヘシ

一小便ヲ通スルニ枇杷葉用テ能通スルトモ云ソ加減可用

一虚中有熱腫気アルニ人参ニ木香入テ用テヨキソ

一病後之脹ト云ハ熱病痢病之後ニ身浮腫スルヿ有藿香正気散ニ加ヘ入ル与テヨキヿアリ

ソノ類ノ症ノコリテアルニヨキソ虚人ハ病テ大便前ハ結シ後ニ泄瀉シテ足跗浮腫スルハ胃気ノ下陥之参附桂朮木ノ症ニシテ元陽ノ力ヲ得テノ升降ノ気カ出来ルハ救スルソ外ノ剤ニテ不治温補ノ用カタキ症ハ死証之死証ハ足跗ハカリハレテ後足心ヘ上ルヤウニナルソ

廿九・　大建中湯（半）　諸虚

一局方ノ剤ソ十全大補湯ニ附子肉従蓉ヲ加タ者ソ命門之陽ヲ補スル剤ソ水火氏ニ補スル意ソ予ミカト功能ハ不覚氏温補ノ助ノ為ニ出スソ命門ノ陽虚シ水火氏ニ弱ク之エルハ大補湯ニ走八味丸ヲ兼テヨキソ肉従蓉ハ精ヲ造スト言ヿソ太シモ八味丸ノ山茱萸程ニハアルマヒキソ龔氏序ニイヘル如ク血君気臣十全六味八味ノ補ヲ越ル者ナキトイヘルカ格言トソ云ルソ

一陽虚ハ参附姜桂ノ外無他ノヿノ陽気補スルソ命門ノ火トアルモ下焦ノ陽ソ人ハ陰陽之ニ気ニテ生アリノ千近クイヘハ此ニツノ気ソ補陰ト云ハ血ノ燥ヲ宜スソ飯熟ヲ主トスルソ下焦ノ陰陽虚スルハ八味丸下焦燥アルヲ宜スハ六味丸ソ又ヿノ陰陽虚スルハ大補湯ソ胃気弱キハ益気ニ走圭四君走圭ソ心脾弱キハ皈脾ソ心脾胃ノ三臓ニ人ヲ付ルソ陰陽ニ気全則心脾腎俱全ソノ千ヒロクノ言ハツトシタルモ也千近ツイユハ陰陽ノ二気ノ虚実也故ニ寒之熱虚之実ノ血ヲヿトクト知レハ他ハスヱソ

一脾腎ノ陽虚ハ参朮姜圭或八味丸十全ヲ用テヨシ脾腎全則五臓全ト云カ肝要ソ

是薛己分寅之可立（天下所立）ナリ脾腎ノ陽虚ヲ補スルハ此治方之外ニ无也

一心腎ノ陽虚ニシテ熱（本所立）ヲ生シタル治法ムツカシキソ薛氏張氏之所言不詳ソ此治法ハ東垣ヨキトミヘタリ丹溪ハ補陰ノ偏ナル処モアリ心脾腎ノ陰虚ヲ総合点シタル東垣ニ内ヨリ生スルカ主熱ト云ソ五臓五火ヲ生スルト云ノ熱ニ津液乾テ、血虚血中燥クニヘニ熱ヲ生スルハ内ヨリ熱心腎ニ生シタル難治ソ心脾腎ニ生スル火ハ其戕ト云ハ燥ノ脉ニ此眼陰陽如権衡如ニ治療シ陽虚陰火ノ東垣ノ心得ニコヽロエニ可施治ソヲ之未発已発ノ論可参考ヿアリ潜心自得シタルヿアリ心ニ内熱ノ生ルト云ハ心胞絡ニ熱アルヘ胃中ノ火ヲ消スヨリハ易シ口舌痛或怔忡胸中熱スルノ属連茹之属心熱ヲ清スル剤或清心蓮子飲加味飯脾之属ニテ治スルヿ多シ只ムツカシキハ風寒暑熱入テ心之熱心ニ入ノヿ（本入寒ノヿ前ニ）前ニヨク述タリ故ニ爰ニ不言ソ其幾ヨリシテ安神益志湯瀉心導赤飲或寧神湯（産後不語ニ效アリ）之属ヲ可投ソ心ヲ大切ニスルト云ハ此場ソ

一卒死スルモ胸痛ニシテ死スルハ心痛ノ胸痛スルニ三ツアリ不吐血シテ卒死スルト吐血シテ死スルトアリ吐血スル症ハ多ハ瘀血不行或血肝脾ニ抑鬱シテ血脉ヲ不行ユヘニ外ノ血モ連ミニソノ処ヘアツマルニヘ前ニ述タリ鳩尾ノアタリ痛ム症ハ心気ヲヤシナイ熱アラハ連類用無熱ハ飯遠神ナトニ心ヲ付テ加減スヘシ心虚痰鬱ノ胸痛ハ痰ユヘナリ心虚痰鬱モ根元心気ノ弱キ処アルトミエタリ生得心ノ弱キニ此症ニモ卒死シタルヿアリ適ミソノヿソ

四十　玄治九味　芍　貴朴　奴　朮　宕　霍　木　甘　痢

一痢病熱ナクテノ裡急後重スルニヨキソ四五十行到圊ニモヨシ熱ナキト云ヲ見テ用ルソ故ニ胃風湯ニ桃奴ヲ可用カ玄治九味ヲ可用カト思テ用ルソ

一常ノ腹痛ニモヨキソ冷テ痛ムニヨシ

一無熱シテ裄ミツカエテ食不進ト云ニモ芍加参用テヨキヿアリ

一産後ノ痢無熱ニ用テヨシ

四十一　加味理中湯　熱病　吐蚘　雑病

一理中湯ニ烏梅ヲ加タ者ソ

一過酒ノ人ハ吐血ニヨキソ又外食傷後ナトニ少口モ渇キ弱キ処モアリツツカユルニヨシ七味白朮散ハ木香アリテ虫ニモサハルヘキカト思ヘフヤウナルニヨシ

一熱病吐蚘ノ中ニ弱キ痞ハ用テヨキヿアリ

一熱病吐蚘ノ症無熱ハ理中湯ヨシ或異功散ヽ烏梅黒小丁子ヲ加ヨキヿモアリ熱甚キ症ハ吐蚘ニハ不死ヿ多シ仲景ハ寒ヽ涼ヲ不可用トイハレタレ𪜈熱甚トキハ吐蚘ニカマハスシテ清熱ノ主方ヲ用テヨキヿ多シ解毒湯ニテ吐蚘ノ止ヿモアリ却テ吐スルモアリコレハ苦味ニテ動スルモアリシヅマルモ有ニ苦ヲイヤカルニ三味柴葛危参ノヨキヿモアリ

一熱病悪心吃吐多キニテ芍苓葛危求甘ヲ用テヨキヿモアリ

四十二　滲湿湯　　済世全書　冷湿

一此方ハ四君ニ芍ニ桂朮ヲ加タ者ソ今ノ以米代蒼テ用ルコアリ寒湿ニヨシ

三仙湯　永主　済世

一此剤ハ冷湿ニ感腹雷鳴シテ下リ身モタルク匙冷テ主方ソ

一寒湿ノ地ニ坐臥シテフラフラノハト煩脈弱キハ冷湿ナリソレ可用四君ニ合三仙湯永主芍ヲ加タソ

四十三　三合湯　　雑症

一三合湯ハ烏薬順気芎ソ散ニ陳湯之

一此剤ハ脊中痛背凸テナリニノ痛急何ヲ用ラルト朝鮮ノ韋白軒奇斗文ニ春圃問ニ答タ方ソ

一頭痛持病ニアリテノスルナトニヨキソ　一頸ヲチヽカエテノ痛ムニヨキソ

一凡湿アリテノ身痛ムニモ軽キ症ハ用テヨシ

四十四　悪阻方　西門膠宕貴巻十　胎前之治法

一悪阻ノ秘方ソ延壽院傳之トテ岐阜中島蔵菴伝タノ

一経水トマリテ三月ニナルトキムカ〱シテ不食或吐シ常ニ不好食ヲ好或スキ味ヲ好或何ヲ用テモ吐スルアリコレニ用テノ大功数度アル膠トモ云モ〱ノ安胎ニヨキト云コヲ是ヨリ知タリ

一婦ハ五ニ十日不食嘔吐経絶四月此悪阻ニ与此剤吐止好葱食之而思食

一結胎経水一ヶ月不行経行ノ不順ハ無可患或胎則乳又不如常是異于常ヘ及三朔悪心嘔吐好酸或好平素不好之食味此為接雖然無悪阻者有難曉此是五月之未

復常

六月之始ハ以微動可知之四ヶ月之始臍下不起如滴水之狀迨五ヶ月之未食前臍下良以按而覆手則有活物而微動或久不動而求微動以是可知之

一四十余ノ婦胎成則臍下凸狀〇甚堅而如有水按則有狀而難弁以微動知之其微動者活物之狀脈稍進

一三十之婦経七八ヶ月絶腹脹乳以黒按其腹有塊而動者強而按之則無活物腹亦塊辛而不痛似胎不胎十四ヶ月而経行瘀血来而腹脹解是似胎不胎ノ症之脈不進

一胎ノ脈ハ進不胎者乳以黒腹脹似胎トイヘ氏脈ハサノミニ不進ソ胎ハ内ニ活物アリテ胎者雖如動ヒク〱トシヤクルヤウニテ無狀ソ

一壮婦胎七ヶ月忽然往来寒熱多投駆風活血之剤或補気補血之剤不効経数日忽然則足無力而午後忽然来汗出不食似瘧不瘧似風忽而不風忽然投ス多則食少汗不止コヽ以消痱湯加柴不適中而安予胎アルユヘニ虫積ハ攻撃モ用カメシイカサマ胎ニヨツテ虫動シタルモノチリト思テ予之大功ヲアタリ不可不知

一孕婦九ヶ月欲堕胎　十八九之婦胎九ヶ月而去年堕胎今年九ヶ月午後悪寒風熱兼之投柴胡芎飯湯去紅之剤四五日之後至夜臍痛腹亦弦痛脈洪大按如無力是陽ニ几浮散元虚也氣下陥則胎亦為堕以四君子湯加行宿膠倍人參翌日脈和脈之狀減三分ニ浮散之狀収斂而無力腹痛此吹見脈之洪救而投寒、

凉則速可墮

一孕婦疑胎　婦年十九十二月經不行胎カト思ヘハ十二月ノ腹ニハ少也疾卑疑ヘハ乳ノ黒ハ八ケ月ヲ向ハ嘔吐不食アリ是悪阻也ト云ヨリスカリフレハ今月十ケ月ニ胎ニキワマルソ其後産而無恙夫十三四ケ月經不行ト云ニ臍下之様子胎七ケ月ノカツカツニテ臍下塊アリテ動カハ悪心不食ノ月ヲ三ケ月ト定テ可知ソ

一子癇　婦廿五胎六ケ月俄然腹痛冲上而絶食頃而甦或寒戰左腹甚シ牽痛冲上而絶時亦甦或譫語如此發夜中三四度七八月不止ヲ四味烏沉湯加柴青四五貼而全安

一妻之妹年廿之時胎四ケ月自左牽痛頻而苦悶直視上竄譫語而發（絶）時亦甦或腹痛甚而冲上絶而甦々而絶面色神氣常之ヲ四味烏沉湯用之牽痛ノ止冲上スル時三淋如此投之而全安

一子癇ハ癇症之子癇ヲ煩ユヘニ毋其形ヲナスト云ヿアレ氏ヲ察スルニ心虚痰鬱之婦或癲癇之婦此症アリ太心ノ、毋此症アルハ胎アル時癇發リタル也是ハ易治ソ毋ニ病氣ナクシテ胎ハ九ケ月之頃毋如癇搐搦甚劇危子胎生而已者有又度々發シ元氣虚而死スルモノアリ毋ニ心虚痰鬱アリ又癇症アルモノアリ胎ノ中ニ發リテナヤムハ前ノ治法ニテヨシ或大二十三淋安榮湯沉兵之屬ニテヨキソ或又胎七八ケ月之頃ヨリノ吉之搐搦麻木或厥絶或厥甦ニテ臥床モノアリ異功ニ介宿膠ニテ安胎シテ置テ産シテ後全安キモアリ或烏沉湯モ用テヨキソ此症ハ度々発スルユヘニトヤカク病家ニ評シテヤカマシキモノソ此悪症ハ一日ニ無間發シ脉數汗多全心絶者ハ死スルソ多ハ死胎之搐搦甚シ中ニ死胎生レタモ一両人見タソ且毋ノ癇發スルハ面色神不衰脉モツヤアリ是ハクルシカラス

一孕婦大既ニ季ヲ述タソ胎前ノヿ臨産ノヿ異功介宿膠ノ條下四物永圭滑ノ條下ニ記スヲ可參考

四十五　泄瀉方六味　　小兒大人雜病

一四君ノ參ヲ去陳宿木ヲ加タ者ソ小兒腹中不調用テ効アリ小兒中余流ノ主方ソ

一大人大便不調ニヨキソ腹痛ニモヨシ　一婦年四十咳久不止此劑ヲ用テ止タソ

一不食胸フクレシタルニモ功アルソ

四十六　冷湿方　唐蒼　永　敛　苓　圭　走　甘

一此劑ハ冷湿ニアタリテ身痺或氣蒙トメ足冷ルニヨシ

一男年六十余小便スルニ尿壷ニ泡タチテ黄色アリ此劑ヲ用テ治タソ是寒湿也或腎之陷虚トシ十全八味ニテヨキヿモアリ或肝熱トシテ龍膽瀉肝湯ニテ止タルヿモアリ

一此劑ハ何症ニテモ寒湿ニ感シタルト云ヲ（天今）目アテニテ用ルソ　以後此已下中ノ憶見

○右ノ茱方ノ註不知　○左ノ茱方ノ前ニ二タクグズリアリタレ氏何レヘモ不付スユヘ畧之

四十七瘀血方六味　婦人調経

一桃圭將行紅甘瘀血ヲ能退クルノ速功ヲ見ル時ハ桃圭將ノ三味ヨシ　吐血ノ條下桃仁兼気ノ條下産後治法参考シテ瘀血ト見ウケタラハ用ヘキソ

一胸膈痛ムニ用テ功アルソ瘀血ユヘソ　一腰痛難堪ニ救方無効ナル用テ功アリ

一腸癰腰痛ニ用テヨシヒタ胸用レハウミ下ルソ　桃圭將ハカリモ用又ハ行紅ヲ加和シテモ用ルソ

一瘀血ヲ記ス序ニ婦人調経ノコトヲ云ノコシタルユヘニ述ル丁如此

四十八婦人調経　此論勿失　回春十方

一千金調経湯　治婦女経水不調或曽（本嘗）経小産或帯下三十六病腰痛口乾或發熱小腹急痛手足煩熱或大腑不調時久池血経水不調及不懐孕ナ

行芎弓二戔　参　膠　牡　呉茱　桂一戔　甘二分　門　守一戔五分　生姜

此剤ハノミニクキ剤ソ前ニアル正気補虚湯ヲ用テノ上ニ可用ソ小貼ニシテ用ニシムヘキソ虫アル婦ニハ不宜ソ然レ氏経水不調症淋出ルニ用之後ハ熱シテ用テモ見ルヘキソ虚アルモノハ十全ニ加減シテヨシ八味丸抔熱モヨキソソノヤウナルナヨシテモハカヽシキ丁ナキ時ハ此剤モ用ルト知ヘシ

一経水先期而来者血虚有熱之　治當　補血清熱経自準之

行一戔半　蚫　芩　雀一戔　芎八分　膠　百　雷弓五分　艾三分　甘三分

此剤ハ熱ツヨキニ云位ノ少シ前ヘカタニ用ル剤ソ必竟下焦ニ熱アルユヘニ先期ソ太然レ氏産婦ニハ用捨スヘシ大便結シテ火アルト云ニヨキソ虚婦ハ八物湯ノ熟地ヲ生地ニカ膠ヲ危ストヲ加エ味丸ナト兼或ハ八物湯ノ内ニ當梢ナトヲ加テ用テ脈モ不和カアリテ進ル時ハ服々用テヨキソ予経水ノ先期テ来ル症ヲ見ルニ胎ヲ結ハントシテノ所火動キ然アリテ先期アリ是ハ胎孕シテ然云ルソサナクシテ先期ハ血虚而火ハ多アルユヘナレハ付肢ヲ未發ノ火患得テ気弱キハ陽虚陽（本陰）火ハ忍伏動ニシテ血中ノ火ヲ清スヘシ或又血熱アリテ先期アリ是ハ血中ノ熱ヲ去ルニ犀角地黄湯ナトヲ用テ血ヲ清シ脈和スル時ハ八物ナト用テ調ルソ気血潤沢ナレハチヤウト三十日目ニ経来ルソ経水ハ血ノアマリ子宮ニ日々入テ三十日メニ満ルユヘニ来ルソシルカ順也婦ハ血多キユヘソ婦ハ血ノ有餘ナルカ常也故ニ経水ノスクナキハ虚カ鬱滞シタルカソ二ツ也婦人ハ先其経来ノヤウスヲ問テ知ソ室女寡婦ナトニハ遠慮スル丁モアリ大人ノ婦ニハ、ラカユル老女アルユヘニソレニ問テ知ルソ

一経水過期而来作痛者血虚有寒之　治當温経養血痛自止之

行一戔半　芎　鮑　雀　莪　蘇木一戔　弓　桂　甘五分　紅三分　通八分　桃七ケ　水煎

血虚有寒症虚冷而不行者偏温補剤久血沙而解如春日消氷附圭永行弓鮑桃甘木之屬或桃圭奴行紅甘委宿木莪之屬ソ倍圭桃而温之行之或活血湯

一本下
肴

一經水將來作痛者血實也氣滯也腹中陳〻作痛乍作乍止氣血俱實也治當行經順氣痛自止之

亇歸弓芎地連萑桃紅減半玄胡牡丹莪水煎　發熱加柴芩

氣血鬱滯而爲痛有九之四生湯亦可之無九剤活血湯或桃圭將

一經行着氣作心腹腰脇疼痛者乃瘀血也治當順氣消瘀血痛自止之（一本合ニ血字ナシ）

亇弓芎地桃紅玄胡莪青　水煎

此症活血湯桃圭將モ用ヘシ瘀血ヲ去リ血ヲメグラス剤ノ中参考シテ可施治

一經水過期而未紫黒成塊者氣鬱血滯也治當調經順氣經自準之

亇弓芎地桃紅牡青萑玄胡甘　水煎（一本耳十五）

此症此剤無効則烏沈湯桃圭奴紅之属ヨキソ

一經水過期而未色淡者痰多也治當活血化痰經自調之

亇弓芎地陳守苓甘姜

此症無痰シテ色淡キハ血虚也痰ヲ和スルヲ治法此剤ハイツトモナキ養生薬也補血消痰之剤必竟脾胃之虚實ヲ見テ可治之血ノ源津液〻〻ノ本食ニ痰〻本亦生於脾胃凡此主治ハ標ヲ治スルノ剤ト可知

一經水過期而未作痛者血虚有熱也治當生血清熱痛自止之

亇弓芎地牡桃紅木萑玄胡甘右水煎（一本丹十六）

一本ナ
父

一本
服

如此症投此剤不効則可和之且寒亦アルヘシノス一難論

一經水過多也不止者成血崩也治當涼血補血經自止之

亇弓芍地木芩膠艾地榆荊芥萑甘芩

久不止者加茅根汁磨墨ニ同服　右水煎

血崩血熱ヨリ來ルソ血崩久不止ニ腰多衰少經旨不止腰痛腹痛アルモアリ此血鬱血アリテサラリト不定ニソレニハ四生湯ヨキソ清熱シテ逐瘀血剤ヨシ

一經水行後作痛氣血虚也治當調養氣血痛自止之

亇弓芎地參朮（炒）永甘　姜棗水煎

此症八物湯木方亦可也

一經水去多少不止發腫滿者是脾經血虚也治當補血健脾利小水腫自消也

亇弓芎地參朮苓宿腹木陳仔猪通萑玄胡藤甘朴右水煎

一經水月久不行發腫者是瘀血滲入脾經也治當活血健脾行氣腫自消之

此症ハ下血ノ中腫氣アル属之補中治湿湯ヨキコアルソ

亇弓芎桃紅牡朮桂朴奴木萑藤玄胡　水煎

此剤有瘀血腹脹者他ノ病ニテモ可用ソ瘀血滯リテ腫脹ニハ用テ可以効ソ

一經水月久不行腹脇有塊作痛者是血結癥瘕也治當調經止痛塊漸消也

芎 宿 木 小茴 乳 同 朴 桃 红 牡 桂 莪 玄胡 膝 水煎

此劑婦脇腹甚已痛モノ瘀血ニヨルモノハ必功アルゾ順氣温内破血逐之也

錯

一諸經妄行於口鼻者是火載血上氣之亂也 治當滋陰降火順氣調經々自準之脈必芤濇

久而不治乃成虚怯　芎 芍 地 芩 卮 牡 犀 膠 芩 貴門

此症ハ經水之行リ此衂血吐血スル之虚症ノ吐血トハ違ゾ血中有熱而氣逆上スルユヘゾ後

ニハ血熱下焦ノ火トナレハ労熱氏ナルヘキゾ逍遥散合黄連解毒湯用ルコトモ有症ゾ

麻（本）

一經行身痛躰疼寒熱及痛者乃觸經感冒也

加減五積散　治婦人過經行時遍身疼痛手足麻痺或生寒熱及痛目眩等症

此乃觸經感冒　依本方去乾姜加羌活 搖膝 姜 葱

是ハ經行之時凡犯リ熱甚タ紫胡飲湯ニ芩ヲ加ルコトモアルヘキゾ凡邪血中ニ入ルコトモアリ

一經水不調或腰痛白帯或淋瀝不止或肌瘦者此血氣倶虚ニ

大補經湯　治婦人氣血虚弱血海寒冷經水不調或時心腹疼痛或下白帯如魚腦

髓或似米泔不分信期毎明淋瀝不止而色痿黄四肢無力及目眩暈肌体羸瘦

芎 当 莪六分 乾 弓五分 木 芩 芪 貴 玄胡四分 参 宿 膠 沉 當 桂 呉 粉 甘三分 姜 棗

此氣血虚而經不順帯下身瘦ルニヨキゾ熱レ氏虫積アル症ハ呑カヌルコトアリ先ゾ仁淋

出シ主カト兼用テノ後婦ニ同試テ可擬ゾ正氣補虚湯ヨシ或大補湯八味ナト用ヘキ

前ニモ云如ク帯下赤白或淫白崩多ハ湿熱アリ 小便淋濇清心蓮子飲消痛湯或

逍遥合異功ヲ雷栢ヲ加ルコトモアルゾ

一婦因怒寒ハ熱胸脇脹痛月經先期此肝火血熱妄行用加味逍遥散加生地

一婦壮盛經閉者是血實氣滞宜專攻也

通經丸（四味）　治經閉並乾血氣　班猫二十ケ（糯米炒） 大黄五戔 桃仁四十九ケ

右爲末酒糊爲丸如梧桐子大空心酒下五七丸甚者十五丸如血枯經閉者用四物湯送下

一半虚半實經閉者回生湯加桃用ヘキゾ

一婦女經閉有積塊者宜養血破積也

四物調經湯　治婦女或十五六歳經脉不行日夜生寒熱手足麻痺飲食少進頭痛惡心

・嘔吐腹中忽然結一塊々中動痛者此誤食生冷傷感而致也

芎 余 此ハ 文奴八分 乾 貴 義 荊 木 芷 茴 胡五分 莪（一錢童便炒） 青 宿 紅 甘四分

姜 棗　若有塊不通須與調經丸間服　遍身疼痛加羌活獨活咳嗽加杏去

各五分　肚痛加炒乾漆七分　瘧疾加草常　泄瀉太奴加肉荳

一調經丸ハ回春經閉ニアリ

血崩

一血崩稍久屬虚熱者宜養血而清火也　温清飲　治婦人經脉不止或如豆汁五色相雜面色

痿黄腹刺痛寒熱往來崩漏不止

亇弓芍乾連芩栢巵（一戔半）水煎、

予ノ瘦婦血崩不止ニ用テ大功ヲ得タリ又一婦五十六十日経不止腰痛アリ調血飲瘀血ヲ逐ソ加減ノ剤ヲ用テ止タソ　或帯ニテサラクト来不尽ニハ逐瘀血ニテ止ソ

一日久属虚寒者宜温補トアリ大補湯兼永或其功ニ什膠黒永ソ或仲景炙甘小湯復元湯（郷撥之　和湯ニ）或十五味安栄湯

帯下

一赤白帯下之治呉公龍氏云啓其外古方無功前ニ処ニ記ソ湿熱ノ者十之六七ニ清心蓮子飲、逍遥散、合異功散或消痞湯右虫積則消痞湯ヲ以此剤功有帯下者婦人十之六七アリ感暑湿或心虚疾彭發或脾胃不化也ノ病ヲ病ニツレテ多ク来ルソ婦ハ是ヲ帯下ト云ヘ二ト思テ帯下ヲ云医又不知之古方ヲヨミテ湿之治之止之却テ無効ヲノソレヨ秀テ不拘帯下也ノサシ出タル処ヲヨクシテ帯ニフクスレハタイゲモヲノヅカラゲンジ上ソ虚又者虚冷久ニハ四君益気建中八物十全十味八味六君姜桂宿走之属ソノ病ノ源ヲ治スレハ帯下ハクルシカラヌ者ソ婦ノ帯下ハ必来求止ソ其本ヲ調暑湿虫積ニヨルモノハ虫積ヲ退クルソ

一参益期勝宝丸為湯　治婦人経水不調臍腹冷痛赤白帯下一切虚寒之疾久無子自服之即孕屢用屢験

蒼　多术　令　亇（酒）弓芍（酒）桂永　胡椒　小茴（塩酒炒）破故紙（酒炒）艾葉（醋炒）

卆経

香（炒）附　猥各三両　呉（三両　塩水炒）萑（六両　醋炒）甘（一両　炙）蒼（四両　炒）

此剤丸ニスルハ烏鶏ノ腸ヘ薬ヲ入煮爛共ニスリ丸スルソ四春末嗣之部ニアルソ丸代老婦腹痛数方無効無元高橋亭運此剤ヲ為湯ニ三次与ヘタレハ雷鳴シテ堀退ト治是亦不可不知同医久瀉ヲ治ス数方無効瀼痰丸之散薬ヲ用テ調タリ是痰瀉也亭運莫逆之友也　マア三云四春或ハ古方之丸薬其外人ノ用マシキト思フ薬功ヲ知ランコト思ニテ為湯用テ見タルニ功ヲ得タル一ナシ此勝宝丸ノ湯奇々妙々ヲ得タルト語ル

四十九一百六十付

飲食

一是ハ異功散ノ去参加葛永剤ソ　一心胸微熱アリテ不食スルニヨキソ

一酒後ツカヱ或気ル蒙々口乾ニヨキソ

五十　自傳方　婦人調理　去血

一弓帰湯ニ木苓黒永芍炒膠甘ヲ加タリソ　一下血崩失血ニヨキソ血ヲトヽムル意ソ

一胎動腹痛ニモヨキソ　一経水久不止或痢久不止五七日モ調カヌルニ用テヨキソ

五十一　加減香苓散（潰権蒼麻奴蕾胡義　削煉栝沢通滑車甘）疝

一疝気隻月発者入テ膀胱経之トアリ隻秋中疝気発寒丸腰亦重痛口渇熱アルニヨキソ

一六七十ノ老人（本名　七八トアリ）仐二月三里ニ灸スソレヨリ足少ツヽ腫テ一身浮腫数治無効六月土用ニ

入一身腫大小便不通脉滑数有力ニ和ヲ用テ無效日氣丸投之心下寒ニテ加減香苓散ヲ用一貼ニテ小水少通シソレヨリ段々通シテ全安シ後ニ老レハ一身ノ水氣四計程アリタルト云一日ノ飲水ヲハカリテ小水ヲハカリ飲水ノ分ヲ引テアトノ水ヲ腫氣ノ減スルト見ルソ其ハ以後咳嗽久不止浄府湯丹杏ヨシ一二年ノ後又咳アリ肺痈丹杏ニテ安シ疝氣モ虫積之房モ塊アル症ハ同シヿソノ居益所伊藤休菴六十七之時予卅四五之時治之　享保戊午春圃年八十往事如夢

五十二　六君子加減自得

中風

一中風不同左右加薏木宿伸悪定作弖　手足麻痹面瓦ニモヨシ或悪定事（サリ）加沉香ヲヿモアリ

一眩暈加定宿蔻

一中风之順氣ト云ハ弱キ氣ガ著テ滞ルユヘニ木宿桂ニテ元氣ニ力モ出来ソメクリテ食モ進テ後ニ沉香ヲ入テヨキソ故ニ烏薬順氣ハ中风ノ瀉剤ソ风ナトアルニ用ルソ

一中风痹テ脉弱ハ加蓍桂云木宿或附

一黄蓍肉桂芍薬甘草ハ黄蓍建中湯ヲ止汗固表スル剤ソ止汗ハ毛穴ヲフサクユヘソ故ニ表ヘユクソ　飯ヲナトヲソヘテ力ヲツケテヤリテヨシ

一中风左右ニ氣血ノ分アレ𪜈必竟血中ノ湿ナルモノ氣ナリ阳之右之方ニモ血滞ルヿハ同シ必竟半身ノ氣モ血モ弱之血ハアレ𪜈氣弱ソ不順ユヘソンユヘニ六君子ヲ主トシテ加減シテヨキソ

一井上専菴ト云老医アリ常ニ老荘ノ見ヲ好ム人ソ中風ヲヤム者アリ右半身不遂參地黄ヲ用ユレハ不快専菴薬ハ飲ヨク食進氣力無別儀ユヘニ常ニ服テ四五年ヲ経テ元タツ専菴自工夫シテ老荘ノ見ヲ以シタツソ中風半身少シモ不動モノハ何程半身ヘ氣血ヲメクラシタキト思ニテモメクラス者也ソレニ強テ地黄人參ヲ用レハ却テ痰ヲ動或氣ツクエテ薬ニテヨクセント思フク害ニナリテアシキソ俗不知之ソ右ハ脾胃ヲ和シ痰ヲノケ食ヲ進ムルヿヲ主トシテ置テ半身ノ人ハイキラレル涯ノ中氣カヲ易シテ置タカヨキソト云コヽロヘソヲ考ルニ此理モ尤ニ理アハセテ見テモ尤ナル処アルソ夫中風半身ノ人ハ少ニテモ手足ノ指ヲ動カス氣ノアルハ些氣ヲツレテ行ルソ夫指ヲ思ヒ小指ヲ思ヒヨリ早ク心ニ思処一度ニ同モナク通ルユヘニ身ノ動ハアクル心ニ知覚スル処アリテ指ノ処ヘ氣行スナリ是ハ半身ニ神氣ナキニ痛癢ヲ知レハキノナキ𪜈イハレ子𪜈神不通ニ神ハ氣ノ粹ナルモノトアリ半身ノ神氣絶タルハ手足少シモ不動ソレハ何程温補シテモ不動モノソ是ハ神ノナキユヘソ心ノ臓モ半分枯ル程ニ半分ノ神氣ハ本ニナキト云タリ心ノ臓半方枯ルトイヘ𪜈枯ヤウニツアリテノカレカヽリタルト半方ノ分不残カレテノ神モナキトノ別アルト見エタリコレニテノ氣ト神トノ違モ知ルヽソ半身ノ不遂ノ方ニ温モアリ血モアリ氣モ通ルユヱニ痛癢ヲシルソ神ト云モノハ曽テナキソ必竟何ニテモハナヤカナルソヤ光潤カ神ノ状ソ

五十三　安胎異功品減　　安胎

一異功散ニ亣宿膠ヲ加タソ
一余此剤安胎ノ主方ニシテ用ルソ決而安胎ニヨキト云コヲ知タソ
一虚冷シタル婦或無熱無寒ゝ婦此剤ニテヨシ婦ニヨリ熱ノアル胎アリソレニハ太宿咒苓ヲ或ハ宿モ入レ苓モ入ル、コモアリ
一安胎ハ丹渓ハ清熱ガヨキトイハレタソコア考ルニ婦十之八ハ此方ヨシ清熱ハスル症ハ不多ソ熱アルヤウニテモ此剤ニテ却テ脉カサモ減シテヨキコアリ
一脉洪ニメ幅アリ滑數ニメ中絃ナル婦此剤ニ參五七厘一分入テノ用脉シヅカニナルヲミレハ胎ニツラレテソクタヒル、ユヘ脉カサアルトミエタリ
一小産スルハ熱アルユヘニ墮胎スルト云説アリ故ニ安胎ノ剤芩ヲイ放ソ此一偏ノ見ニテ不宜ノ明医雑著ニ云ク胎ノアルハツリカ子ヲカケテ置ヤウナルモノ、脾胃カ梁ソ脾胃ノ梁カ弱ケレハカ子カ墮ルソ安胎ノ理ソレニ同シト云タカ格言ト覚タソ故ニ少弱キ婦ニ此剤ニ參ヲ入テ常ニ用テ妙アリ
一婦十九才箇月腹痛脉虚數臍下腰冷前陰熱アリト云テ安胎飲芩ヲ入ル方ヲ用テ置中ニ如此予異功帰宿膠參一分五厘入用之脉和腹痛止而安
一牧田氏家内藏進之妻有胎則九ケ月而必墮或十ケ月保トイヘ𪜈死胎也其毋何トソ

墮

安胎シテ子ヲ儲タシト云テ予ヲ頼メソ予重ニテ胎ヲ結ハ、三月比ヨリキカセヨト約ス後結胎ソレヨリ此剤ニ人參一分入テ用ソ、ケタレハ十ケ月ニ男子ヲ生ス後又如此ニテ女子ヲ生ス其後又子モ二人拵人多ヲ常ニ用ルモ大侭ニナリテ不服薬ナル後九ケ月ニテ又胎墮ナリ以後又胎アリ故ニ服薬シテ子無恙コレヲ以考レハ毋子尾ニ神功アルソ此後安胎ノ保ナキニ用テ産後ニ氣力ヨキソ
一老婦女血暈甚或血崩下シテ必独參ヲ用危キコヲノカル、婦アリ予以為産之後俄ニ独參ヲ用テモ難救コアルヘキソ胎ヲ結コロヨリ此剤ヲ用或ハ物ナトニ宿ヲ入用テ此難ヲ可免ト云テ用テ見ルニ數人産後ニ氣力ヨシ至極弱キモノハ各別ソ大体弱キモノハ必効アルソ
一産前之婦心胸痛或胎動或既小産センカト思フヤウナルニモヨシ胎漏トテ経水如ソ血下ルニモヨシ謂ナコロビ胎動スルニモヨキソ膠ヨリ安胎シ血ヲ止メ調血補スルソ仲景之芎帰膠艾湯ニモ膠ヲ大功ノ薬方ニ入タソ以是阿膠之功可知ソ
一産前之不食ニモヨキソ
一胎六ケ月蕎麥切ヲ食シ腰痛胎漏下血欲墮胎腰痛ミテ少努力アリ此剤ヲ用痛止胎無恙

五十四　二陳加減　　打撲方ノ自得

一二陳ニ行乃委沉宿坐薏ヲ加タ者ソ
一落馬ノ後身痛或胸脇ナト痛ニヨキソ

一打撲シテ手足少シ痛ト云ニヨシ　一手足痺ルヽニモ用テヨキ痙キ症ニ用ヒタリ

一腰ズキ入ルニモヨシ　一重キヲ肩ヘテ胸脇ツリ痛ト云モノニヨキソ

五十五　三聖湯　　嘔吐　虫積

一兵権紅三味将布包ツ滾水ニ付リヲ淋リ沸湯ニテ淋出シテヨシ

一此薬ハ香ノナキ薬ソ虫積薬ノ気ヲ悪ム二妙アルソ吐モテ不止ニ淋出シ因之殺効ヲ収タソ・

一陳参ヲ加テ生ツ姜ヲ入煎服シテ胸ツカユルニヨシ虫モ痰モ和スルソ

一咳甚不已虫積アルニ三味ニ合ニ陳青ノ子本口ヲ加ヘテ功アリ

一热病吐不已讝言全不食三味ニ柴葛芍芩ヲ加生姜ヲ入ヒタ抑用テ吐已热去

此症ハ柴胡ト大柴胡ヲ用ル間ニアリ或ハ热後アリ婦人小児ニ多シ柴葛芍貴芩ヲ加テ用ルコトモアリ柴葛芍ハカリ加テ用ルコトモアリ柴葛連芩ヲ加ルコトモアルヘキソ并殺人ニ用テ数効アリ吉又ハ安キニアリテ稚キニアラストテ云ヤウチモイリ思外死ス㊀ルト思フヤウナル病人ヨクナルソ

一虫積ノ症脉モ弱ク不食スル工ヘニ補テ用テノ弥胸塞リ悪心嘔吐シテ絶食ムツカシクナリテムツ淋薬ヲ用食ス、ニ出ルコト度々アルソ実似虚ニ用ルソ

一心虚痰ニ蛍爵ノ症脳暈ニ絶入タルキ淋出シ用テヨシ必用ルソ或ハ気逆上シテ左ヨリツキ上リ或悪心或心胸フサカルト云ニ淋薬ヲ主ニシテ此症ノ主薬ト兼用テヨキソ

能　吐

一兵ヲ主ニシタルモノソ故ニ吐不止ニ兵ハ一味ニテヨシ虫痛ニモ一味用ルコトアリ痾症急ニ及リ絶入タルニ兵ハ沉ノ二味ヲ用或同沉ニ二味ヲ用ルコトモアリ

一心虚痰蛍爵ニ陳平胃ヲ合スルコトモアリ常ノ虫積ツカエテ不食シタルニ生姜入テ前用アルコトモアリ或心虚痰蛍爵此剤ヲ生姜入前用テ安栄湯参（五リン）入淋出シ用ルコトモアリ

一男年三十五霍乱吐瀉之後脉弱参附姜桂ヲ用連々ニ弱参附湯ヲ兼用テ吐不已而脉絶冷汗両手厥冷到时抜究太息言語譜根常之声已音アリ吐不已ハ陽気アル也心下搐メ痛アリ臍中ノ動モ不動ニテ三味淋出シ用之吐止全安

一婦年卅熱病発狂清熱之剤ヲ用ル热漸和而後痰ニ喘服薬則吐連々痩抜究咋吸喘急心胸苦悶三淋用之而脹通胸中和思食而安

一心虚痰蛍爵鉄熱冲上絶淋ヲ与之則甦　一産後吐不已与之則止思食

一婦憂痢嘔吐不受薬ヲ以熟酢カヽセテ三淋ヲ与テ則受之後猶ヲカヽセス二用タルハ又吐ス二三度熟醋ヲカヽセテ与之能受之後猶ヲカヽセサレ𪜈能受之而思食全安

一婦年廿五瘧後全不食投方無効経十五日ニテ三淋ヲ与ヘテ心胸和思食而全安・

一男年廿五患痢有嘔吐痢昼夜七十行医投理中湯無功心下左辺蛍爵滞有之痢ユヘニ嘔吐ノ心ニアラス因痢塊動也六正宗青奴芩三淋ニ兼用而安

一小児四歳痢五十行吐不受薬二日其薬少思食仍知虫積ニ三淋用之而吐止食進

一医者ヲ見ルニ可知ヿ本草ニ云医家所謂ノ元氣相火仙家所謂ノ元陽眞火此理ヲ可判　此所从吝追加

一此吝元氣ノヿ詳ニ不言六十七ヒ[illegible]緘マミテニ夜正妻記ス大既木ハ先天元氣ヲ以知死生後天元氣ヲ以知人參之理　眞氣并[illegible]氣而充身陰陽如權衡ト云ヿ寒ハ熱虛ハ實補瀉温凉似寒而熱似熱而寒ハ以虛而實似實而虛上中下壽之理膜之虛實此理ヲ明而死生可決此外無他之理此所从吝追加

奴

一大塚宗賢妻十七八安産々甚已安而脫血多クラキノヘトニテ氣絶脉或伏或無力而進（十全果求　独參兼用）以後悪心吐逆遂クラキクラキトニテ後吧而吐ス吐而後眼不睛ト云脉進無力六（正）（藿求荊淋　茶求合守）朝ヨリ八ツ過迄マミテ不止（人參五匁竹葉石羔湯　無人參同劑加黃連淋茶）右用吐止死ス几氏淋茶用之則已此劑如此石羔入（淋茶此　三六貼）十九日ヨリ去ル羔廿一瀉一二行又漏（小柴胡湯　連加減）同夕（柴苓　平胃）肛門痛脉奴ヲ加痛止則止之瀉三行（柴苓　平胃）連々熱去食進快復○右之病人十全独參ヲ用ル中ニ吧吐或吐痰水而クラキノヘトニテ悪心吐アリ此吐ヲ考レハ一偏ノ脫血極虛ニハ非ス吐而後ハレヤカニナルト云処ニ虛中ノ実アル仍竹葉石羔ノ属或守求淋茶ヲ与ヘテモ不已雖奈何春泰之曰脉弱ケレ氏進已ニ吧吐悪心救治而適中セヌヲ見レハ熱吧也仍竹葉石羔湯ヲ以參五七匁入同劑參不入淋茶ニシテ与ヘタレハ淋茶ニ三度用ルニ眼ハレヤカニ快シト云テ好テ服シ前湯淋茶氏ニ只貼用後大便ニ三行浮ス然殘ルユヘニ此（木苓　平胃）ニ入治タリ此治ハ奇々妙々ニ是ヲ不用則九然甚已ナリテ死之他医之知ル茶劑ニアラス

呼六

春甫八十ニ及マミテニ四五人此症ノ然強ナリテ救治無効夜中ニ死タルヲ見タリ産後血脫多独參ヲ君行ヲ默之属用ル中吐多シ仍天ニ年或三淋或六正ノ加減ナト用テ不止其中ニ声高ノ譫言如狂人多ハ驚呼動悸トアル如ノニ大吧ヲ上ニテ苦悶アガキ死ト云ニナリテ死タリヲ此竹葉石羔湯ヲ春泰カ然ト見テ然吧吐ニ功ヲ知ル故ニ用タリ黃連解毒湯大吧ノ氏ニ用テノ無効是ハ甚已ナリ然強故ニ功ハ見エヌハツ之ソレ氏是ハ吧吐甚然ニテ甚已然甚已ナリテ今如狂トシカト見ルニアラス瘀血ユヘニ如此カ又ハ俗ニ云血カアカリテ如此カナト疑或ノ意テ解毒湯モ用ル故ニ無功之此限遅ク氏竹茶石羔湯ヲ用ル場也几急ニ迫テ死スル也産後脫血ノ虛アリテ九然ヲ蓋吧吐而後九心ノ迫ルユヘニ死速吧吐常治ニテ不已ユヘニ九然吧吐トシテ九然ノ氣ヲ折スルユヘニ九心ヲ乜メヌ之

惑心之意

呼プ

係

一産後ニ石羔ヲ用タルヿ圍末見俗医ノ赤井悪右衛門ト云者之産後ノ奇方カト云アリ茶味多ク茶ニ此中ニ石羔ヲ入タルヲ覚タリ然レハ産後アブノ然アリ如狂ニ和ユカニ入タルヿアリト見タリ古吝ノ中ハ石羔ニツ子ニ心ツカスユヘニ攻メテアヌ之産後ニ竹葉石羔湯ヲ用タル医ハアルマシキト思フ之諸ノ虛煩々然ニ用ルト俗下ニモアレハ九然ノ痛ノニミ不限

ト見エタリ痢病吐逆不食又ハ吃逆ニモ春泰用テ免死者三人去ル年有之之間
以カ兎角用功差不足故之

五十六　疝痛方　疝気

一此剤ハ疝気ニテ腰不立痛ト云ニ奇方トシテ傳タル方ソ寒ハ疝ニヨキソ寒ハ疝ヘニ腰痛
不能歩ソニヨキソ
一寒疝ヘ腫脹スルニモ枇杷葉木車灯ヲ加テヨシ婦血積或瘀血滞リ虚冷ニテ腹脹スルニ用テヨキソ

五十七　自得　疼痛方　十二味四三陳加減　疼痛

一疼エハニ胸脇痛或腹痛スルニヨキソ脊中痛ムニモヨシ　一ニ陳加白芥宿木茴香同飯黄芩ノ　生姜
一疼エハ身痛ニモ用テ功アルヘキソ　一風疹或痘疹餘毒痛　追加
一腹痛スルニ虫アリ積聚疝気食積痛宿痛怒痛瘀血痛気欝滞痛痰痛心痛アリ
モ疝ヲワケテ可治ソ　痰痛ニ気カツカスソ流々トメ毒アリト云ソ虫疝気ニモ毒ア
ルソ外ニ疼アル疝ハ常ノイヲキシテ可考

大ヽ　芩　血

五十八　自得　血痛一方　因血腹痛

一桃圭姜芍紅年ノ六味ソ痛甚則加將ソ
一大便澁滞臍左辺痛甚或後重スルニヨキソ疝病澁滞ニモヨシ芩ヲ加ルコトモアリ血痢也
一疝腹痛産後児枕痛ニヨシ建中丸ヲ兼ルソ　一痛甚モノニ去姜加酒將虚人ニハ去將加木芩
一熱病大便黒濁者合大柴胡而投之黒物下盡而安　一腹痛綿延不止者合平胃散而去將或加テモヨシ

五十九　補損當飯散　打撲損傷

一此方ヲ打身ニヨキトシテ落馬ノ用心ニ散薬ニシテタシナミタル人ニ聞タレハ局方ニアル方ソ
一高ヨリ落或落馬其外打身ニテ身痛或胸脊中手足痛ムニ為末毎服二銭温酒ニ
テ用ルトアリ煎湯ニシテ酒ヲサシテ用テモヨキソ局方ニ海苔浮松菜生葱心猪肉冷
水ヲノムソ

六十　自得　六君子湯加減　久瀉

一六君子ニ蓮葛著丁木ヲ加タ者ソ　一小児痢瀉久不調ニヨシ大人ニモヨシ
一虫ヲ兼テ脾胃ノ弱キニヨシ蓮葛著木ヨク調ルソ丁木虫ニヨシ且虚冷ニモヨシ温
ムルソ虫ニテモ脾胃虚ニテモハツレヌ薬ソ

六十一　瀉黄散　胃熱口舌痛

一此剤ハセツ々ニ用ル薬ニテハナケレ氏此症ニ出會コトモアル上ヘ爰ニ記ソ

六十二　沃雪湯　虚人風热

一此剤ハ名古屋玄医家方カソ温散ノ意ソ

一蒼（唐）朴芍（酒）永ニ云葛甘生姜ニ大体弱キト云人ノ風热ニヨシ和ノ蒼ニテハキカヌソ発汗ノ功ウスシ

六十三　催生四物湯加減　臨産

一四物湯ニ永桂滑甘ヲ加タルソ竹ケ鼻長谷川正倫家秘ソ難産或死胎ニヨキソ弓八六味九煎ニ加圭用ルソ是亦可用ソ

一産ニノソミテ産遅ク三四五日ヲ経ルアリ始破水ノ如クノ努力スルニ来リテ後水不来アリ俗カラ子ト云ソ是三段アリ努力止ユヘニ水ノ涸不来アリ是腹力サ不減無潤トイフニアラス無潤腹カサ減子ハ子ト能知ル様アリ腹ヤハラカニテ子ノ形ヲソ知ルハ大虚ナリ如此ハ六味ニ圭或十全大補湯ヲ用テ産ヲ待テ居ルガヨキソ

一死胎ノ脉滑大按中弦緊按而上ヤラ弱腹ヲ察スルニ子ノ形ハ無気腹中何トヤラサヒシキヤウニテ無動気ソ是理中湯ニ参ニ三分入テ圭附ヲ加用ルカヨキソ

一子ヲ按シテ見ルニ生アルハ縮リカタマリテ居ルソ死胎ハハットシテ不ス手足ヒロカリテシマラス是死胎ナリト穏婆ノ功者ナルモノ云ヨキ目アテ之理ニ叶タリ

一小便不通アリ臍下マリノ如ノハリタルアリ如此ニ産シタルモノナリ

一三日経ル産ハ右心下ニマリノハツミタルヤウナル天目ホトナル物アルヿ有此理不分明穏婆ナ湯袋ト云膀胱小便不通トキニ九ク堅クマリノヤウニハルナヤウトソレカ右心下ヘノナリテアルヤウ之如此ヿモアルカ不知之後ニ努力出テ産シタルアリ子ハ不死

一三四日ヲ経ル臨産ノ腹ヲ見ルニ臍ノ上ヨリ右心下ニサヽヘテ形アリテ右ノ方ハ下ニストンテ、ヒキ者アリ児ノ子カヘリスルニスス臓腑ニ帯テニカヽル力或積ナトアリテソレニスカリテ児身ヲ縛シカヌルユヘニ不生アリ是ハ功者ナル穏婆或腰抱ノ者腹ヲ勤シ手ニテ按シテナヲス意ニアラフケナクサハリテ児ノスス上趣ニ随努力シテ生ルヽアリ穏婆ノ功者如此トキニ入ソ

一死胎ハ肛門ノ腰痛努力カサシニ不来ナリ此中ニ児ノスス産門ニ向フアリソレヲ見ハ速ニ努力シテ生ルヤウニシ努力ヨキシテ子死タルユヘニ子ノ働ナキユヘ腹痛一陣ナキモノソ

一臨産小水不通臍甚ハリマリヲノハリテ入タルヤウナルアリ八味ニ車ヲ用通シテ産シタルアリ

一死胎ハ冷ル程ニ脉緩ナルヘキニ滑数弦緊按而無力ハ寒極似热之假热真寒ニ此脉時ヲ取得テ常ノ人ノ假热真寒ヲ知ルヘキヿソ

一難産六七日ヲ経テ不生シテノ母死スルヲアルニ何レモ胎臍ヨリ上ニアリテスアハラ下ニカヽリタル様ナリ後ニハ努力スルカナク腹ニ気ナクス子モ死スルソ脉滑大緊数按〆無力中ハ夕温補ヲ得テ力ニナリテ生ル精力アルアリ努力スルカモナク故ニテハ心死ルソ

一産ニ向フト腹痛モ努力モナクソノマヽ生ルヽヿアリ至極ノ安産ハ公氣力如常而能食久是ハ

業ニ及ソ太ダルニ殊ノ外ヤスキ産トニ云ニ太虚アリ多産婦下焦取シマラス六脅ハヤヒラキ努カスルヤセヌニ生ル、ヿ下ノクヽリ至極弱キアリ是ハ産後血暈多或脱血シテ餓ニ死スルモアリ心ヲ付ヘキソ故ニ臨産ノ脉遅緩ニメ弱キハ大補湯ヨキソ参ニ三分入ルソ無力婦ノ臨産ニ強クオソ兼ルアリ

一臨産婦ノ水ヒメモノ下リテ腹痛モナク身ヲ動カセハ水ヲル、ト云タルアリ十全大補湯ニ人参（二分）入テ三四日用身ヲ強ク不動シテ物ニヨリカヽリ或臥テ居ル中ニ腹痛出努力出テ産シテ子母無恙是ハ真ノ漿水ニアラス別ノ水産門ヨリ下ルト見ヘタリ

一破漿水ト名付ルモノハ胎ヲツヽム水ソ玉子ノ白ミノヤウニヌメリタル水ニ常ノ安産トニ云ハ腹痛一シキリツヽアル中ニ児ヲ搏ス身ヲ搏スルユヘニ腹痛ムヽ連々ニ身ヲ搏シ及産門ニ向ヲ子カヘリスルト云セキ眼穏婆子ソ及向ヒタルト云其時ニ努カシテ取メテシキリニ努カスル中ニ腹痛難堪ナリテ努カノ音膺下ヨリ出テ長キ聲ニ生ル、ソ是安産ソ

一胞衣ハ子生ル、時一度ニ下ルヿ安産ノ太ルニテ子生レテ胞衣内ニ留ルヿアリ胞衣ハ胸ヨリ丸キ筋出テ胞衣ニツヽキアル者ナルユヘニ胞衣下ルヿ遅キハ臍ノ緒ヲ切テ草鞋ニ結ツケテ股ニツケテヨシソ或股ニ結ツケス草鞋ヲツケテ置ヿモアリ然ヲツナケハ不出リトモ中条流ニアリソレハ何ヒノ道ニモ穏婆ナラテヨキソ必竟胞衣下リカヌル時ハ功者ナル穏婆手ヲノス臍ヲ胞衣アル処ヲ按シテ産門ヘヨミ出スヤウニシテ産母ニ少ソ努カ

サスレハ下ル物ソ胞衣不下ニ弓皈湯ニ加圭或十八味ニ圭或四物ノ加減モヨキソ血暈有ハ産後ノ血暈ノ治法ヨキソ日久不下ハ胞衣ノ中ヘ瘀血入脹テ不下シテ死スルヿモアルヿ之

一臨産脉滑数ニシテ後シツカニナリタルハ産チカキト知ヘキソ子産門ニ向フ時ハ脉静ニナルアリ

一産前後帯ヲスルソアマリシマリ過ルモアシヽ腰ニテ指ニツ入程ヨキソコレモ産婦吐逆或苦悶スル時ニ帯ハシマリスキハセヌカ可改ト穏婆ニ心ヲカケ又ヨヒユルミニ血腹カ血暈スルハ帯ユルキカト心ヲ付ヘシ後ニテ指ニツ入程カ帯ノヨキ程ニヘソレヨリ堅モ緩モスルハアシキソ

一産ニ向吐逆スルアリ是ハ児身ヲ転スル時ニ腹動スルユヘニ沖上シテ吐スルモノ之不如此ニシテ悪心吐逆ハ六君ニ藿香ヲ入或三淋ヲ可用

[illegible]血自得　不換金加減　　虫積、食欝

一不換金ニ加柴連青黄芩　一虫積アリテ丸ヲ用ルニヨシ　七積アリテ腹痛熱ニヨルニヨキソ

一九アル虫咳ト云ニモヨシ此柴平湯ノ症キ者ソ　一食積アリテ胃中九アルニ用テヨキソ

一小児ニヨキソ此柴平湯ヲ用ソト思トキニ先用テヨシ

（一ノ）六十五　茵陳将軍湯　　黄疸瘟（一大十）

一将茵危年朴空同似生姜此剤ハ瘟疸ニ用ルソ如此症疹々ハヤルカ湿瘟ソアリソレニテ不抱黄ハ（一本 症）疸初ヨリ大便エヌリトシテ九和シ小便少清マテ用ルソ

一黄疸ノ症ハ仁ト麦ヲ見付ルカ医ノ功ソ先黄疸ノ症ト見タ交ニ知ル目アテアリ温（一本 湿）熱アル脉ガ不

下卆手

食シテ午後熱アリ悪寒ナトモアル症ノ口不苦舌白胎ナク脉肌熱ハ病体ヨリハシツカニ心下ニ留飲積アルハ黄疸ノ兆ソコテ目ノ中ニ心ヲツケテ見ルニ小黄アルヤウニ濁ルソ小便色殊外アカシト云者ソ小便之色也赤キ皮分ノ熱ニモアラス脉緩ナルニイナヿソト思ハルヽ者ソ赤クメ黄也ニセヨ時ニ先此症後ニ黄ハムヿアル者ヲ黄ハミテモ心ニカケラルヽナト云ヿイニテヨキソ後ニ黄ハムトキ能見ツケタト云リ

一脉緩ヲヌ長々ナルカ湿熱ノ脉ハシツカニ小便ハ殊ノ外黄ナルヲ以黄疸ノ漸トシルソ

一心下ノ様子熱病ノ初発ノ心下トハ違ヒ何ヤラシコリテ積滞右心下ニ附テアルモノソ脾胃ニ湿熱アルユヘニ合ヒ餅痰飲留滞シテ蒸シテ黄ヲ発スルソ麹ヲネサセテヨク〳〵ニカヒテ色黄ニナルト同シ必竟人ノ身カヒルヤウナルモノソ

少ロス

一けい利奇効ナキソヲ初発ヨリ牧人ニ用テ効ヲ得タリ心下留飲滞アリテ按セイタミニヌ好キハ大便結スル瀉スルモ可用ソ小便少又ニヨリ心下モ和シテ後不換金ニ蒼唐茵猪沢連ヲ加或胃苓湯ニ去朮茵奴連怒ナトヲ入テ用ルソ

一黄疸ハ食シテ不食スルモノソ茵陳大黄湯ヲノミニクキト云ヿアリソレハ胃苓湯去朮加茵或奴連ヲトヲ加ヘテ兼用テヨシ又ハ三淋ヲ兼ルヿモアリ食スミニ出ヒハ茶ニモノニ ヨクナル者ソ

一調理ニ浄府湯ヲ用ルヿモアルソ疝気留滞シテ黄ヲ発スルニハ後ノ調理ニ三和茴厄灯心ヲ入テ用ルヿモ有

一男年五十春ノ末ヨリ時々食傷ヲシテ腹スヂハリ不快七月不食シテ不快ユヘ三和厚胃苓ノ加減ナト用タリ右心下ニ留飲積アリ保養スル中ニ漸快ノ家園ヲ歩シヤカテ出勤セントスニ卒ニ食傷吐瀉腹痛甚シ手足冷而危ヲ枳実大黄湯ヲ用テ吐ニ三次腹痛止日暮手足温翌日小便黄ニナリ眼黄アリソレヨリ茵陳大黄湯ヲ用後三和散ノ加減ヲ以テ本復シタリ春ノ末ヨリ湿気ニ感シテ右心下ニ留飲積出来タモノソ是ハヨホト催シタル黄疸ナレモ七月ノ暑湿ニ又ハ感シテ発タルユヘニ黄ハ疸ノ症一ヒヨリエヘ治メソ

一黄疸ノ不治ハ二三年モ腹痛シ或積アリ熱往来ナトアリ久々床ニ臥シ或三四年モ持病ノ出疝気出テ脳他病ノスヱニ黄疸ヲ発スルハ不治ソ

下卆茈

一黄疸色甚濃小便黄里後ニ面クロミ乾キ胸中燕ヲ食シタル香アルハ不治ソ

一熱病瘧後痢後ニナルハ湿熱ノ残リタルユヘ茵陳五苓湯不換金胃苓三和ニ加減シテヨクナルソ

一右ノ症ニ人多不宜ソ湿熱ヲ補住スルユヘソ積モスキトス云リ小便モスキトスミテ後ニ胃苓湯浄府三和厚消痺湯ナトニ人参加ヘテ用テヨキソ

遲

一虚疸ト云アリ小便如常ニテ面目黄ナルトアリ是ハサノミ黄色不甚虚症ノ面目黄ハト云ト同シヿニテ黄胖中ニ入レテ乙ルハアシキソ理中湯ハ味四ナトヲ煎湯ニスルソ毛遲感シテ黄ヲ発スルモノ見ル三アルヘキソ理中湯ニ茵ヲ加タルアリ熱レ氏右心下留滞アリテ小便アカク脉緩ナルハ皆湿熱ト見ヘシ

温゜

一面目黄ト云ニ瘀血アルヿアリ是ハ小便不黄ソ黄ハ疸トハ違フソ

一面浮腫シテ蒼ク黄ハニ小便清ニ大便瀉スルハ大虚寒ソ走理中リ

六十六、発狂方　産後　狂気　或婦人狂氣

一八物湯ニ去参朮加沙参　地冒星柏子仁連ヲ加タリ婦人狂気産後ニ用キラス用ヘキソ

一産後ニ血九焦アルヲ参朮ヲ用テ発狂スルニ黄連解毒湯清心導痰湯十ト用或弱キ処アルニ此剤又ハ寧神益志湯或又加減温胆湯四物湯ニ黄連解毒モ合スルソ逍遥散ニ合スルヿモアリ

六十七　産後瘀血腹痛ノ方　産後

一牡中馬鞭卄大桃　紅中　飯ハ没中甘少加沢蘭剤ハ中嶋茂菴家秘ニテイツニテモ産後瘀血腹痛ニヨキト云フソ

六十八、産後身痛或狂気方　産後

一八物湯ニ云朮加地鹿茸ニテ功アルト云フソ

一産後悪々凝リ痛或狂気ノ妙ノ人参ヲ用テ甚キニヨキト云傳ソ

六十九　黄疸ノ方

一沢瀉　茵苓朮萑連　延寿院ノ主ニ云ク太レ共前ニ云如ク茵陳将軍湯ヲ先用テナク物ハツセツヨクチリテ和スル故ノ剤ソ温゜鬱滞スル処ヘ用ノハ又ルキソ去朮代唐蒼ニテ常ニ用テ可之

七十　秘方　腹痛

一小麦（コムギカラ）稈太節黒焼ニシテ火毒ヲサリ用ル時茶ハ嚢（袋）ヘ入淋出用之

一此茶ハ味ノ十キ茶ソ苦辛酸味ノ茶ヲ用嘔吐シテ不已ニ用テ効アリ胸虫ト云ニヨキソ疝気ニモヨシ疝気ノ妙茶ハ小麦稈ノ茶アルソ

一胸虫ト俗ニ云胸腹頻甚痛嘔吐シテ不受茶アリソレニヨシ三味ワリ茶ハヨシ好甘ニハ芍甘ヨシ辛ク苦ヲ好ニハ連水或丁連和スニハ木苓貴黒水卄或不換金芍或桃圭将好苦ニハ退蟲散好辛ニハ建中丸水良貴苓ニ煎用之苦キ味ハサカフ者多シ前ニ記虫積腹痛ノ数論可参考熱痛モアルソ家秘散ハ疾々痛ニヨシ

七十一　安神散　産後

七十二　建中丸　冷虫痛　諸虚

一紅圓子ヲ亭建中丸ト名付ルソ産後アトハラ痛ムニヨシツ子ノ腹痛辛ヲ好ムモノニヨシツカユルト云ニモ虫積ノ冷タルニハヨキ丸茶ソ

一好辛（カラキ）者ニハ煎湯ニシテ胡椒ヲ良香カ丁香ニカエテ用テモヨキソ

七十三　黄石散

一石灰（枯々）黄芩ア（ニ々）　産門腫痛或産門破ルヽニ此茶ハ布ニ包湯ニ浸シ汁ヲ淋出シ別ニ布ヲ以浸痛処ニアテヽ蒸之如洗之打身クジキニモヨシ

七十四　心庵脉法　春甫診法合之

心庵合ニ直寒ト直熱トアリ直ノ字ニ意ヲ遣ク

○帝曰脉従而病反者其診如何岐伯曰脉至而従按之不鼓諸陽皆然帝曰諸陰之反其脉如何岐伯曰脉至而従按之鼓甚而盛也

夫治所以有補瀉温凉者以病有寒熱虚實也而其如真寒真熱真虚真實更不用弁別之功猶薫蕕相反不其至假寒假熱假虚假實不自備窺垣之明焉定亥豕之疑矣方今従聖意聊叙之梗概夫病热而脉得陽者愈寒薬病寒而脉得陰者愈熱薬如斯者乃比病與脉相従所謂薫蕕相反者真寒真熱是也病熱而脉得陰者愈熱薬病寒而得陽者愈寒薬如斯者乃病與脉不相従所謂亥豕之相似者假寒假熱是也況假（熱）猶熱湯假寒猶爐蓋之湿也或曰諸聴其治術曰病熱而脉得陰者外熱而内寒治之法須投參附之剤（熱）逐其内寒則外假之熱自解経云寒淫于内治以甘熱是也病寒而脉得陽者外寒而内熱乃與黄硝之寒剤以退云其内熱則外假寒自散経云熱淫于内治以鹹寒是也経曰逆者正治従者反治豈有他乎苟能知標與本用之不殆明知逆順正行無間耳客曰善哉更問其辨別脉之陰陽如何曰脉象多端要之不過浮沉遅數滑濇其他常兼見是夫診之以挙按尋之三法直定上下去來至止之三勢究竟見持因神之多少以辨虚實因鼓與不鼓以分陰陽也詳論之存神者無病矣神少者病矣雖病而神尚存者不至隕飾若神已絶滅不決免帰宜矣客曰我未了得請以曲暢必無厭多言曰其脉或浮大洪滑按之鼓者乃是真陽其脉或沉小細濇按之不鼓者乃是真陰二者愈正治矣其脉浮大洪滑按之反不鼓者本陰而標假陽夫猶熱陽也其脉沉小細濇案之反鼓者本陽而標假陰夫猶爐蓋之湿也須観熱湯似火之勢而其實乃水也爐蓋之湿似水之化而其實乃火也如此者愈反治也然有形盛氣衰者其色白或黄其皮薄理浅其脉多而大虚神少譬猶冬瓜雖其形大而得以爪穿之矣有形衰氣實者其色黒或赤其皮厚理從横其多強或沉神以備存譬猶雉子雖其形小而不用反不能剖断之也此等之類亦當以假論矣虚實之間最多疑若其和不真必其見不定也以不足之見配不定之薬軽見人命如草芥則生死立判豈可不切慎乎

圃云假寒假熱虚實脉法此理好

一軽重之法難経之見心庵取之是亦好矣

肺主（不審）

當荘庵家方口解巻之下大尾