眼科錦嚢

地

9 7-1

富士川文庫
4909
Ga-5
2

F 2
カ-79

49094
92-5
2

No.1559
1D 37-1

東武 本庄俊篤士雅 著

松代 小山玄敬以恭 仝校

長崎 梶井元鴻士篤 門人

外障篇

病係睫毛之証

睫毛内刺（附）重睫

漢名拳毛倒睫睫毛一二根乃至十餘根反生逆倒而刺戟眼珠者是也此証有天稟者或有久患眼疾之後上瞼痿弱或老夫血氣衰弊瞼皮延伸低垂而

富士川家藏本

慶應義塾大学医学情報センター 昭和47年6月30日

富士川文庫

1054

失其守撞眼珠者皆此證之起原也盖睫毛為内刺
則每一瞬殆覺不可堪之苦楚遂羞明怕日生翳起
膜若棄而不療則日後必變於異証輕則遮明重則
失明又有一証名重睫此固有之睫毛重生而内生
者逆刺眼珠此証往往有之

治法　内服無効治在外術其法抜去逆毛而
用火鐵或腐藥以可剔除毛根然此取一旦之
効耳經日之後復生焉欲全治之則有切斷來
肉之二術如法用之萬無一失矣切斷之術用
剪頭切斷低垂有餘之瞼皮為縫合與金瘡法無異也夾肉之術用竹夾或銅夾緊夾有餘之
贅皮七日而剪斷其贅皮決勿使患處見濕

睫毛脱落

睫毛脱落者因患爛眼人毒液腐蝕其部或天刑病
或沈痼之癥瘡而得此証又切斷兩瞼開著之後竟
絶毛根係其患者亦有之此証不能避外來之飛塵
加之濕爛汚濊以致生膿

治法　患爛眼而睫毛脱落者治其本病則睫
毛再生因他証發者不治

病係胞瞼之証

眼瞼閉着

此証上胞下瞼為閉着者是也原因誤治眼瞼外面之瘡瘍者被湯火傷之時不堪疼痛而經日閉鎖眼目兩瞼癒着者或發此証又嬰兒有稟賦而然者此証有治與不治之別附着眼珠者此為不治惟瞼緣相閉着者務用手術則治

治法　宜注意看定其所閉着之處用快刀一切斷之其法左手摘出右手以鉤尖刀勾斷之以綿花浸秘爾撒謨塞兩瞼刀癈以繃帶包護之速痊為佳

瞼着眼珠

此証上瞼附着眼珠而干礙開闔竟致失明者是也亦有稟受而然者有因湯火傷而然者西說所謂因眼珠外部為潰瘍而致然者予未嘗視之

治法　宜用快刀一切開其附着之肉亦惟在補助便於開闔並不期再生明亮

瞼瘃腫

此証發自眼瞼損傷眼胞瘡瘍或血行不利之婦女或大病後及瘃熱眼諸証此滯塞血熱之所致也

治法　發表劑下劑通經劑塗藥嗅鼻劑瀉血

等空從証索因以撰用焉予欲細演其義恐涉於冗繁故不贅

瞼浮腫（附）空氣腫

瞼浮腫者胞瞼腫泡而不變皮色又無疼痛此証濕眼及顏面水腫等之所致也或風眼疫眼有兼發之者一証有不畜水液而眼瞼膨脹者名空氣腫

治法　内服小青龍山西湯及苓桂朮甘湯之類又兼用葛根湯鹿角湯而發表之外用洗蒸劑（詳附方）

空氣之証空眼者空治其本病治法詳於兩條下

結石腫

此証小腫為硬結者也腫中含包如雪白軟骨之結石每開闔瞬動衝摩眼珠以起炊熱導赤脈生翳遮明

治法　用小鋒鍼刺破腫頭除其結石則其患頓息但發起翳膜者俟施手術後宜行治法

麥粒腫（附）固結腫

漢名偷鍼眼乃細小之腫瘍生瞼緣弓狀軟骨之部其初起發痒而後熯腫疼痛必為膿潰惟是小兒少壯之人往往有之大人極少也誤治之則堅硬甲錯

變成固結腫若積日經月則必刺戟眼珠以發翳

治法　起先用鈹鍼而可除其膿自然膿潰漏脫者亦為不少焉倘若變於固結腫者宜用洗蒸劑以緩和之割破腫頭除去所藏病毒此証有屢發者此胃中畜積汚液之人也施手術之後宜與下劑

瞼生風粟

和蘭譯書名稗腫上下瞼裡發小腫其形駢生而如麻子如粟粒以針破其腫粒則出凝固透明之液此證胞瞼裏面小機里兒前人譯云泌胞或腺畜粘液漸漸凝結者也竟摩擦眼珠生翳遮明經久則致昏暗

治法　飜轉眼瞼用小鋒鍼刺破其腫粒用如匙頭銀篦宜仔細掃除所畜藏之物用玫瑰花露洗淨之內服發表劑若有赤脈者兼用下劑

爛弦風（附）胎風赤爛

此証眼瞼赤爛或痛或痒常摩挲不能去手莅苒累年不痊者是也至太甚則瞎惟破裂而出血太抵眼瞼細絡畜鬱蒸之熱竟釀成苛刻之液而赤爛蠹蝕於眼瞼之外面其病因雖多端平常之患者或多血或粘液質之人鬱結蒸發氣而羅其患如小兒者多

因胎毒蛔蟲及胃中酸敗液而發之如婦人者因經水不利而致之者亦有之矣漢人另載胎風赤爛一証而述三條之病原其論曰初生時血露入眼中洗不乾淨而生是疾又云在母胎中其母不知忌口此即胎毒也又云有乳母壯盛人抱兒供兒之際口未哺乳頭乳汁脹滿洒然射出衝入兒眼亦能生出濕爛若衝射顔面亦或痲濕瘡痒大低此三証同號曰胎風赤爛此說迂遠不足取信焉蓋小兒分娩之時灌浴之前未見有開目者豈得有血露入目之理乎如母不忌口味之言當以為保育之戒不可謾廢也不但忌口味而貽其害而已哉其父母有病之時受胎之兒不免遺毒之患此病出先天而為難治矣如赤爛者小恙得痊者也然未免生他証況於險惡之遺毒乎故為人之父母者須戒慎其始矣如乳汁射目發此疾之論實為妄誕何則乳汁者保育嬰兒天稟滋味也豈為損害嬰兒而設之乎古今眼露取用乳汁之方為不尠矣然則用之人皆可患爛眼也予屢見小兒患眼目者雖點乳汁一未嘗見受其害者為之發一笑如乳汁射面生痲濕瘡痒者其乳母固所浸淫酷毒沈痾之婦而抱育之兒不得免傳染

之害也若兒果發不測之險証不但乳汁注射眼目而係其患而已服惡性乳汁亦然矣認之以為小兒爛眼之常態則恐致誤治

治法　大人爛弦風者內服葛根湯鹿角湯大青龍湯桃核承氣湯如神丸通經丸主之癥家亙撰用七寶丸神効煉薰劑之類小兒胎毒者鸝鵑菜湯兼用緩汞丸逐蟲丸而后用紫圓下之屢用屢効

○風牽出瞼

此証似爛弦風而異也下瞼翻轉露出赤肉流淚汪汪而不息形容醜怪此因天刑病所生也如小兒者有發于遺毒者此証和蘭眼科諸書名眼瞼外反其治法條中載在夾斷所翻出之赤肉之術乃不詳審證候則決勿下手如不經心却傷人予往昔遊於信州見有一眼科遇患隻目者下截斷術治療之後卒然變証眼珠潰爛苦惱劇痛眞似奇怪遂連累於無恙之目不日雙目全致昏瞎加之形容醜穢可憐一箇好漢終成廢痼之人矣予屢見如此之証施截斷術未嘗有得寸効者此因誤行截斷打擾病毒而惹出險急之証者也故不考定其証之難易草率從事

則安得不損人乎學者不可不懼也

治法　可做大麻風之治法小兒者用消毒湯可也

上瞼低垂

此証上胞緩垂而壓覆角膜上干碍視瞻者是也久患眼疾之後其部痿弱或扯胞筋（即擧筋也）之麻痺老人血氣衰憊者多發是証

治法　証輕者可灸三陰交重者可從睫毛內刺之治術

胞瞼結核

結核者眼胞生瘤不變肉色亦無疼痛初生如米粒漸大如龍眼按之移動者名糊瘤或淡紅黑色如輭肉而低垂者名肉瘤漢人名稱結核者非也此即瘤也和蘭之醫名為瘤今當從之

治法　糊瘤輕者宜用水銀羔塗抹眼胞上令其緩和流散重者先以指頭按上胞之內外看肉之厚薄就其薄處而療之近外面者用腐蝕劑徐徐點之俟其開口宜除去瘤囊近裡面者用快尖刀橫截挑出其瘤所割之刀痕點秘爾撒謨或雞子白在眼胞上置壓定巾可施繃

帶如不經心周密則發變証至於肉瘤之證予未詳其治法故姑闕筆

飛塵入目

此証砂塵麥芒之類誤投入胞瞼或步走風地而致其飛入者是也若塵埃粘貼于胞瞼裏面捨而經日則為膜被粘定每瞬動摩擦眼珠痛澁難開至于太甚燥熱腫痛恰類於疫眼劇証起先在塵埃射入之時不拔出之則終必生翳膜幾乎失却瞻識之機其他結毒眼疫眼等之証而澁刺羞明似著此証者間有之亟留神調治萬萬勿忽其所驅除之法先取胞瞼為翻轉仔細看定必有積血為塊或少尖起之處開破其部則認得所粘著之物惟其經久者不能容易看取焉或深匿藏胞內者無術之可施予遍遊各州留意於鑿事往往聞知除塵之名工然多是田野老媽寒村婦女也省其所用之手段甚為奇異予始傳聞其術云將舌舐胞瞼之裡面或用銀簪頭攪擾胞內取出所粘着之砂塵雖積年之物無一不除淨予不敢信其言常笑之曰鄙術妄技何足為奇哉嘗見大都通市間立在街頭而賣藥之徒手將硬膏或鐵篦子之類攪轉眼中而聲言云能除塵埃此惟作

日矛鉗囊　卷二

戲法ヲ以騙ニ瞞ス衆人ヲ聊糊スル其口ヲ耳彼山野婦女之除ニ塵埃一亦不ト過レ為ニ此等之事ヲ也予偶在ニ一老媽用ル工ヲ之近地ニ再ヒ傳ニ知ス此事ヲ一半信半疑欲ス審ニ明ニ其然否ヲ因テ過ニ訪於老媽之宅ニ目ニ擊其所ロヲ療スル以ニ指頭ヲ按ニ摸ス眼胞上ヲ兩ニ三次而言ニ塵埃有無ヲ毫モ無シ差繆一即用テ銀簪頭ヲ攪ニ轉ス胞瞼內ノ而取リ出ス所ニ粘着スル之物ヲ僻邑之老媽生來愚直何ソ敢テ賣ニ姦ヲ況ヤ在テ予親自ラ傍ニ觀スル之際ニ而得ニ為スコヲ偽瞞之工夫ヲ乎於レ是始テ知ル其不ニ誑誕ヲ一矣訊ニ問ス老媽ニ云ク此術何人カ授ケシ之媽云ク此不ニ是レ師受ケシ又不ニ是レ祖宗之傳下ヲ只ニ管療ニ治ス許多ノ病客ヲ自ラ為ニ療貫ヲ耳予又推ニ問其兆候ヲ與ニ療術ニ媽カ云ク惟以ニ指頭ヲ摸ニ擦ス胞上ヲ則有無之處自ラ可ニ明ニ知ス也至ニ其療術ニ則用テ簪頭ヲ攪ニ轉ス其粘着之處部ヲ以為ス脫ニ去ル耳予聞テ其言ヲ慨然歎息ス此術本ト是レ雖レ係ニ於小技ニ一彼レ以レ病ヲ為レ師ト非ニ言之所ニ能ク述ル也然而凡一工以テ術之出ル鄙賤ニ途一視而不レ顧テ却自ラ不レ知ラ其術之拙キヲ也爾後予覃レ心ヲ焦レ志ヲ屢ク試テ屢ク効アリ不ル敢テ貢カ老媽所ロニ親ニ授ケル其看法與ニ治術一雖ニ鄙邑鄽ト技ニ豈ニ不ン珍ニ重セ乎

治法　輕者用ニ蓑荷搗汁灑ク目中ニ立出服ル鳳仙

子一味亦妙重者非用手術則不治

癢極難任

平易方名眼風痒其痒難任搔擦不歇手此欝塞蒸發氣以所發者也大凡風痒之証在疼痛進退之時血氣收縦之間而發之故知風痒為疼痛輕証也夫身體風痒摩擦之則流動所欝滞之血液而覺其快心其理與之一般故用發表劑使快通所欝塞之血液則痊

治法 葛根湯烏蛇湯有効外用嚏鼻劑點藥神液丹屢用知其奏効

胞瞼瘜肉

瘜肉之為証也胞瞼裏面強膜之分際生出瘜肉漸漸延長其色紅赤肉根細而形如括嚢者是也或有肉根稍大如小舌者外科正宗云眼胞菌毒者眼瞼內生出如菌頭大蒂小漸長垂出甚者眼翻流涙亦致昏瞽即是之類也此証有順逆二証其順也者瘜肉柔軟而無痛其色淡紅其逆也者瘜肉頗強硬甲錯而其色紫赤酢摩擦眼珠其原因胞瞼細絡蓄血液而為膨脹遂作肉狀者也雖有順逆治法無別

治法 翻轉胞瞼將利剪頭切斷其肉根以冷

水灑之霎時就用二元丹一調二和乳汁一點二創痕一内
服三黄湯

覓眼

此証因二胞瞼之諸筋麻痺攣急一或瘡瘡腫瘍之瘢痕等使二胞瞼一短縮故眼珠常為露出雖睡不能合瞼者是也概屬不治

治法　和蘭有横截上胞之法恐非温和之術又有塗抹緩和糊劑之方豈有見効之理乎予未審其應用之方法録以俟後考

病係内眥之証

多淚眼附迎風洒淚

此証大眥流出許多之水液者也或迎向冷風或照映明亮或冒觸煙火則洒淚淋漓而不止今分其証配於寒熱二途其為寒証也因鼻管之閉塞淚孔之衰弱或所收藏淚液之諸具自遲緩放開等而滲出水液者名冷淚即漢人所謂迎風洒淚也其輕証者冬月遇着寒風則因外塞表内欝蒸氣而淚鼻二管漏洩淚液即與在感冒之始塞腠理流利稀溲者無異故夏月自為希少焉其為熱証也風眼疫眼或梅毒胎毒瘡疹蚘蟲瞎毛内刺飛塵入目等之諸眼疾

在其交發之時而流出温煖之淚液故名熱淚又有一証其淚液帶辛辣之氣味者間變作爛弦風

治法　閉塞外表者發表劑主之淚管為衰弱者灸少陵三壯或眼科全書所載乳香川烏丸亦可也然此証間有難治者而病者患瘡或熱病之後有自痊者至於熱淚反從本病治之

乾燥眼

此証反干多淚眼其所沃之淚液乾燥澁濇見物不爽明若經久則昏濁遮明至其重者必有喪明之變或云原因疫眼及熱病大病後氣力衰弱等而發焉然予熟試之來自梅毒者十有七八尚可堅治因氣力脱之而發者不可輕忽若持久不治者後必發起欝憂勞瘵及種種之峻証

治法　内服六味丸蜀麥加機奈機奈人參湯之類又宜投噴嚏劑及薤菜白芥子放開淚管之閉塞引其淚液外用神液丹調和乳汁屢點然輕者尚可治重者難治出於梅家者用薰劑及紫薇煙多有驗效

兩瞼粘睛〔附〕胞肉膠凝

此証如膿膠液瀦溜大抵每宵睡寐之時兩瞼膠凝

粘-縣經-久則生-翳-朦朦不-明羞明怕-日即是毒液聚-於-胎肪吉里兒-而所-致也胎-毒黴-毒淋-病帶-下等釀-成是患-漢人雖-區別-為二-証-原是一-証哀學淵-倣-睫-毛內-刺夾-肉之術-之說-予不-敢信-焉

治法　內服三黃湯加-朱砂少-許-或薰-劑兼-用

艾連洗-在-眼胞裡面-冝-屢放-血-

淚管漏　附-淚嚢蓄水腫　○小-瞥漏

此証漢名大-瞥漏-即淚-嚢中瀦-蓄如-膿之液-者是也以-指頭-按-其部-則大-瞥流-泄濁液-累-月積-年不-肯-治-焉原因-如-梅-濕淋-痔赤白帶-下等酷烈之諸毒為-上-攻-而其毒浸-淫-鼻-髎-篩骨-遍-發-生小腫-以-病毒攻-著-鼻管-遂-為閉塞-使-鼻-孔不-通-而其-部諸-液亦變-作-膿狀-故濁-液不-流-泄鼻口-而漏-溢淚-管-然-其閉塞乏-少者或-有少-出-鼻孔-者矣說-者皆-云此-因-淚嚢生-腫瘍-淚-液化-為膿而流-出淚孔-者也豈-非撮-空之論-耶儻-若淚-嚢生-腫瘍-以釀-膿則其-部必-燃熱疼-痛其-所流出-之膿汁先-腐-蝕大-瞥-而所-觸之眼-珠胞-瞼亦不-得不-潰-爛腐-壞-也何-待-積年之久-乎此-証固無-疼痛雖-有-之亦微-覺痒痛-耳其-所流泄-之液-亦無-腐-蝕潰-爛之患-則可-見非-眞膿液-矣況-有-淚-液化-成膿汁-之理

乎予嘗熟視其所流出之液淚液與濁液自分別而不混交說者之臆斷可以知也予於此証屢閲西洋之書法術雖多不足掛齒牙惟有布連吉疑私兒二哲之術尤為優長然其術頗覺冗煩不便取用予敢改其術從簡易以試之於眞境甚得驗效予之所用治術備載于左冀後學互撰用一証有蓄水腫者即十瞬治法以俟後考

治法　輕証者互在淚嚢外面用壓定巾更施

繃帶乃能防護其濁液所留瀦之患庶得漸自痊蓄水腫亦可照此法重証者互行截法其法用紙作細捻約長五分許微開尾頭以尖頭醮烊蠟穿入淚孔屈折其所露出之尾頭攤硬膏貼着大眥外行是法者使濁液溜滞淚嚢而不泄出則其部濁液瀦畜自為膨脹隆起以得容易看定患處而便下手也既看定患處則就其膨脹之部將小尖刀此刀予所新製造者縱截二三分深以及淚嚢為度而互小水銃用片腦水灌洗之洗罷以乾綿撒絲充實刀瘢白布浸米醋以覆

之更施繃帶而每日改換乾綿撒絲令其吸盡濁液也約三日為限復用蠟紙捻再穿入淚嚢至照前法長約及鼻管為度其創口傳殺爾撒謨外用金鎖膏併合其口鼻嚏即醒散務令噴嚏則不過二七日而取効

内瞖肉

此証因淚阜為腫脹如瘜肉者隆起大昔其形似桑椹其色紫赤而疼痛或有軟和紅色而無疼痛者

治法　用鍼頭徐徐刺破腫頭冝以温金屢熨之内服防風通聖散

病係白膜之証

天行赤眼（附）疫毒腫　○犬患後生翳

疫眼之為証也一種毒厲之氣當其蒸發之時偶被感觸一人患之則傳染一家遂及一邑一郡猶如瘟疫然矣其証白膜鮮紅頭疼目痛粘眵多淚羞明怕日或兩瞼浮腫瀰漫難開至其太甚則生翳星起翳名之大患後生翳即疫眼之重証也儻若誤治之則閒變如風眼竟為盲瞎者有之故遇其劇証則冝照風眼治例斟酌療之和蘭記載眼瞼疫毒與白膜疫毒腫之二証此亦感疫氣而發毒腫於其部竟變成死

肉者也予按蓋是眼疔之種類乎尚俟後考

治法　輕証者内服發表劑兼用攻下外用清涼塗藥紅漿水玫瑰露神効水石膽水嗑鼻劑煩熱難堪者刺絡瀉血為緊要發疱膏貼顳顬百會亦可

風眼（附）暴露赤眼○暴風客熱

風眼之為症也白膜起血線滿目丹黄粘眵熱淚淋漓不止努肉蟠脹包迫角膜而角膜見似凹陷兩瞼浮腫澁疼酸痛夜間殊凶目窠大熱如火烈每日晡時頂背惡風寒熱往來頭痛如割其脈洪大而數煩燥苦懣狀殆似陽証傷寒至其劇甚則譫言妄語狂走不寢竟致使眼珠為腐敗膿潰或突出或角膜破裂及凹陷其輕証亦角膜如蠐眼瞳孔欹側或厚翳頑膜等尚有百般之變故難論定焉此証甚係緊要不可貌視若變成重証則利害太甚可恐可驚故不詳審其証候而施治則安能取功不但不取功殆致失明悔之何及矣乎予嘗分別眞假二証或問曰其眞也者如何曰其眼目有確然之見證蓋如下多血及粘液質或觸冒寒氣遽然受温氣或平常項背拘急或胃中蓄積瘀穢毒液或熱眼誤用香竄收濇之黠

藥戒生平貪嗜辛熱之物等者皆發起眞証之基本也其假也者如何曰身患他病遂波及眼目者為假即因太頭風梅毒痲疹疥癬胎毒等証而攻眼目者是也其所從來各不同焉故治法亦不能無差別也故非潛心苦志則奚有取驗奏効之日乎自今眼科專門之徒遇此等之証蓋洋失措何有鑒定之識乎終使患者空為昏暗之廢人者不可勝數也此以無其詳説故也予述數年研窮所得之眞假証候與治法標的之實徴以示世間童蒙幸勿致差誤所謂眞証之徴候者努肉赤脈共丹黄色而恰如紅絹包着珠子其初起也先前眼目疼痛而後頭腦劇痛其脈洪數弦緊者乃是風眼之正証也假証之徴候者努肉赤脈皆帶紫色其脈沈數極其原因患徴濕淋疼忽其治療服燥劑浴温泉而所發也如嬰兒者胎毒諸瘡卒然痊之後有之自大頭風所傍發者雖無異於眞証起先頭痛劇甚而及於眼目其頭痛偏則眼目亦患偏眼正痛則眼目亦左右均患此是三証互以主客見解焉活幼心法云凡治病必先辨寒熱虚實四証望聞問切無非辨此四者而已四者了然于胸中則用藥取効其應如響」信哉斯言也可以為醫

家之貴範矣不琢磨此道則於擬似毫釐之際豈得瞭然乎漢人雖別表暴露赤眼暴風客熱之二証共是風眼緩証而異於疫眼傳染之証焉先輩以暴風客熱充於風眼者實為不穩當為何則雖其証不異而不使眼珠至破綻膿潰之劇故以為風眼之緩証也風眼之名本邦之俗稱而非漢名也然書中間有風眼之名目實是同名異証如所謂風眼爛弦頭風風眼甚多矣不可混同焉漢人惟載輕証而不及劇証者何乎予遊于長崎時友人某語予曰往年舶來清客在崎陽患風眼瞳孔破綻竟致盲瞽然則彼

國從來有此証抑不服本邦之水土而患之乎記以俟識者蘭人區別炊腫眼十有餘種以此証為炊腫眼之劇証其所論甚屬微細然審診詳考之則病因徵候比似本邦之所謂風眼則往往有不同者此無他因風土氣候之異稟賦食味之殊而所以其證候有差等也何足致疑哉歷試之于事實經驗之于真境則彼與我同病異証同証異因之理自分明也後之學者敢勿鹵莽

治法　真証者用吐劑乎別有一方神効靈驗實是妙劑然恐人之妄用故不録惟授及門之

弟子自大頭風發者吐劑或烏頭附子之類有奇効此二証若不兼用攻下則至使眼珠破裂自徽毒發者發表劑利水劑主之若於其初起錯用瀉下之劑則恐有喪明之變俟其病勢衰乏之後當用與下劑幾其不差更在大陽尺澤委中刺絡放血又於百會顳顬貼用發疱膏或以糊劑塗着足蹠屢用塗藥嗑鼻之劑點藥用蚯蚓露苦薏露玫瑰露等至於眼痛劇者灸少陵小竈三壯及三里三陰交女室一曰女膝在踵之部赤白肉之分際蓋所謂奇穴也各二十壯可也而可令患者勉剃頭髮屢以冷水灌洗此証決禁石藥及芳香之點劑誤犯之則實非藥石之可救也今所陳列之各法亦聊示其治之標的耳以一斑之偏見而應無窮之變機則必致差治活用在其人而不在方也若眼珠生瑾瞳孔失常者名之風眼眼壞証非是技術之所能及也暴露赤眼暴風客熱二証亟照風眼之治例融通以療之若草率從事則變乎不治之証慎之戒之

痛如神崇（附痛如針刺）

此証眼目不變其常或帶微紅眼珠有時刺痛恰如

以針刺之而其痛無根基晝痛夜痊或夜痛晝痊或發或息此子宮衝逆之婦酷毒陰伏之人多羅是患其為徵也脈數煩渴淚出而其痛間歇如瘧者則存在酷毒于血中之兆也眩暈頭痛白膜帶青或微紅刺痛夜間殊甚忽來忽去澀濇難開者子宮病之兆也漢人雖區別神崇針刺之二証本是一証未嘗有別也

治法　兆於婦人子宮病者苦薏煎加大黃桃核承氣湯抵當湯通經丸如神丸兼用小建中湯助湯和血湯之類兆於酷毒陰伏之人者排毒劑兼用神效黃耆湯桂皮加附子湯之類外用洎夫藍地黃煎汁加阿片少許點之疼痛劇甚者灸少陵

白膜脈腫

此証血脈腫脹如藤蔓以纏絡白膜者是也蓋白膜外面者以水脈之纖維為質乃眼目蓄多少之熱氣血液留滯其部則不能順流竟混入水脈之維條以致之也世上庸醫之徒稱膜者多指此証且區別種種名號然皆取其形狀耳非有深意也至如二十四障四十八膜之稱愈屬孟浪何足論耶

治法　看定血脈之根基肥大之處用鈎子勾起之將利剪截斷之用小烙鐵以烙截口一點更以一元丹和乳汁點之

大°眥赤脈穿睛（附）小眥赤脈穿睛

此証即白膜脈腫之一種也內眥或外眥發起赤脈貫瞳子上者是也又一証有赤脈之末梢生數多之細歧枝蔓延角膜上竟變成膜翳光埋照者其証似異而無別焉漢人有言云大眥赤脈者實眼而小眥赤脈者虛眼也可謂迂論予累年潛思歷試之實也者自實而虛也者自虛也何取徵於大小眥乎

治法　倣白膜脈腫之法宜用剪鍼內服麻黃湯大青龍湯之類有効若有燥屎者謝道人大黃湯可也小眥赤脈不可抽剪之說古人之臆斷勿拘泥

眼疔

此証在強膜與白膜之分際生出腫瘍如粟粒初無疼痛而微覺風癢於其腫之側邊發起紫色之血線撞射角膜其發之勢最為迅疾患者以手摩擦眼胞或觸物則忽然發起劇痛其痛牽連耳內苦楚不可忍也寒熱往來其脈洪數胞瞼變紫色腫傍悉麻痺

不遂至其毒之深陷則腐蝕眼珠溶化諸液此証比較於風眼更加一層之重其毒之進也疾如快馬之加一鞭矣夫眼目所以發出疔疽者灰汁鹽一般辛辣之毒聚在一處而所致也西洋所謂疫毒腫者彷彿是証矣而如眼疔名目雖嘗傳聞之其証候涯平不分明故屢叩問耆老非蛇足之論則牽強之說耳或錯認赤脈貫瞳之証以作是証者亦有之皆不足憑也予往年遊于野州偶見患是証者初起到第五日變如風眼壞証遂為眥瞷予見其劇迅卷舌畏懼銘心不忘之後遇着一婦人之患之者故以所有險狀懇告其親眷以調療之先橫截毒腫之部分用小烙鐵燒死肉使水蛭吸血于兩瞼又在大陽尺澤大放血用鉛糖水灌洗數回內服機那飲兼用紫圓洽旬纔得痊好惟惜不至洞明之田地噫酷毒狠戾肆虐可不恐乎患如是之惡証者實是九皆一明況至其劇甚者雖力援天下之溺者亦無如之何耳矣

治法　予所歷視不過此二人而下手者一人耳不足取以為法則惟述其實徵以備學者參攷

攷亞自斟酌

白膜血斑

此証白膜纖維瀦溜血液現出赤斑者也又見青紫斑者間有之其斑點在一部分者有之或白膜盡變赤色者有之原因咳嗽嘔吐打撲或飲酒過度之人等多患此証打撲眼目而發者以有煩痛動生意外之變小兒百日咳或大人患咳嗽嘔吐而持長不解或酒客屢次過飲後自發者施治則不日而痊

治法　因打撲而發者宜用角法及刺絡咳嗽嘔者小青龍湯養神丸罌粟殼舍利別小兒冬咳者外臺茯苓飲加牡蠣兼用滾痰丸以姜汁湯送下經驗酒客者甘草營實湯嘔吐者小半夏加茯苓湯半夏瀉心湯或用吐劑奏効者有之

弩肉攣睛（附翅翳）

此証大抵生出帶赤或帶黃之肉贅漸長犯角膜者也此因淚阜之纖維為弛長而所發也和蘭名之翅翳而算入角膜病中者非也乃是白膜病也從来雖有弩肉之名亦與他之弩肉不同焉實瘜肉而非弩肉漢人言弩肉攣睛與大抵赤脈同証也者愈涉於荒唐具眼者自有明識

治法　宜照下條囊翳之治法

嚢翳

嚢翳之名不典之俗稱也其為証也白膜隆起白若微赤之瘜肉輭如綿絮積年不痊漸次滋蔓竟犯角膜至尤甚者則掩閉瞳孔角膜上隔絶鑒視之機其翳端首附著眼珠而當中浮空其狀似俗所謂蝦蟇之歌嚢故呼為嚢翳其實亦非翳也吾友人有下命白頭筋之名者稍當矣此証與攣睛一般惟以瘜肉附著眼珠與否區別為二証耳

治法先將細小利鈎揭起瘜肉浮空之部鍼穿蠟絲以貫通其處更扯絲揭起以利剪刀截斷其附著之處若全掩角膜上者宜於瘜肉上截開十字形創痕即點一元丹行手術之際仔細注意勿使剪頭礙著眼珠如有血絡者當截斷其根基施術之後宜用青布包護眼目約過三四日除却之

雞冠蜆肉

此証白膜生瘜肉軟弱而色深紅其狀似雞冠蜆肉故取以名之此血液瀦溜于白膜中久久遂作赤色之肉狀漢人所謂如心熱酒毒之説不足取也不獨酒客患之酒量小戸之人或三尺之童子深窻之處

女持戒之清僧羅是患者亦為不少焉

治法　用越婢加朮湯優獲神効或隨証而用鈎亦可也

白膜黑粒腫

此証白膜生出黑色或淡青色之粒子大如小豆圍繞角膜此胎毒之所致而發於内部達於網膜者也予遊於南豆偶遇一少年患此証左眼點出四箇右眼十三四箇見之駭然再四搆思凾慮無奈之何記以待来哲

治法　今闕之

病係角膜之証

雲翳（附）玉翳浮滿○膚翳○丁翳○花翳○翳膜遮障○腐蝕翳

夫角膜之為質也玲瓏澄明而輸送射光来映於網膜之器具也今因多少之事故汚液溜滞於角膜之纖維以作白濁曇暗遂至乎妨碍透明之機者概為翳障其為証也翳色有白有黄看視物景如隔雲霞或有全至眥瞷者尋其所来由頗多端而不可槩論焉且因疫眼風眼或梅家淋家疳眼痘疹等而發者其形狀亦不一也有浮沈厚薄治不治之別故不審察病態則何能取功薄翳者角膜白色而如淡霞浮

雲瞳孔朦朧透視于外者本是輕証而明可必復也
厚翳者其翳厚而有白色有黄色又有少辨明暗與
否即曇暗中之重証而治法亦甚難矣然於其曇暗
之部或一處乃至數處有淡薄之斑點而帶青色者
施治則尚可救矣經年無全辨明暗者斷為不治一
証有其翳甚稠厚而焦黄醜穢起千角膜之下部血
絡纏繞頗作膜狀而遮明者縦令有角膜上部現出
半月狀少辨明暗以翳深入其部之實體故為不治
予名之曰腐蝕翳此証發自小兒痘瘡胎毒者多矣
田氏銀海精微舉玉翳浮滿之証而為不治然不詳
其輕重而專以為不治者予未信之各書中載出丁
翳膚翳花翳翳膜遮障等尚有許多名目不遑枚舉
皆不過取形設名總歸障翳之一証焉古人主張蛇
足之説失眞者不勘矣後學勿取惑

治法

内服發表劑下劑水銀劑外用水銀蒸
劑及龍麝眞珠等之點藥加汞丹一點用之
方則中載數若用加汞之點藥而發赤脈疼痛
方冝撰用者急取蜀葵煎汁加沙糖乳汁屢灑眼中可以
防護其變而每日用温金熨之以散翳結之毒
則速得奏功外翳稠厚者在角膜圏裡將鍼頭

細刺其周圍作鍼眼細孔而點剥翳之藥劑則極妙

星○附時復秤星○白陷魚鱗○氷蝦翳○眞珠翳

星翳者即雲翳中之一種也惟不角膜生曇暗而發星之懸青霄然矣故有星翳之污點者是也其形狀各各不同焉今略為區別學者宜細察其為証也角膜上生白翳一點或三四名此污液在胃而其毒薰騰於上粘液溜滯於角膜之纖維而所致也其形狀各各不同焉今略為區別學者宜細察其為証也角膜上生白翳一點或三四點乃至十餘點恰如秤星澀滯多淚或赤脈疼痛其色青白或淡白如煙如霧此乃疫眼熱眼頭痛及過酒之人多患之而施治脫星則其痕必為陷入矣時復秤星者此發作有時之翳也角膜上生污點或生或滅或生生而不滅或有春發者有秋發者而至期而發過期則自消每發眼目漸致衰弱而翳痕亦愈大也此証之所關係者非輕也如有誤治則殆至喪明白陷魚鱗及氷蝦翳之二証者角膜生白翳其根深腐蝕實體其狀如魚鱗如氷蝦而發多少燃痛澀刺多淚至其劇証則白陷釘入焉此証雖不異於雲翳因星翳之誤治變成此狀故陳列于斯矣眞珠翳者污點昂起而白色或帶青色其狀恰如眞珠此固

著於角膜之翳也即因如梅毒瘡疹等酷烈毒而所發起也

治法　星翳輕証者使蛇石吸之則其治甚速也又有一方名神靈丸詳則用之必奇驗小兒鬼屎丸為佳時復秤星內服涼膈散防風通聖散兼用綫黍丸點藥鉛糖水白陷魚鱗水蝦翳之二証因婦人血熱者對証藥劑兼用蜈蚣散見累効發自他之証按雲翳法用之眞珠翳將眼刀些割點頭點脫翳之藥劑輕者可治重者概為不治以上所陳列之各証點藥通用玉燥白玉撚雲比金等之諸方然其有熱如疫眼者勿施之

釘翳根深

此証星翳中之惡証而角膜上生白色小瘡及多日則漸侵瞳子毒深釘入而不遷其處流利如膿眵液澀痛羞明先患一眼必傳於一眼遂致大患原因梅毒而所發之燥腫眼後多有之初起者可治進于篤劇者不治如哀學淵所說者非也何惟性躁之人令情之婦病之乎

治法　先用玫瑰露苦薏露之類緩和其熱痛

而後至點神効水及石膽水內服涼膈散兼用

七寶丸

膜障（附）赤脈下垂○黄膜上充○順逆生翳○垂簾翳○膜入水輪○肉狀膜

各証所有之根基共在白膜而滋蔓於角膜上其狀似皮膜故名膜蓋翳與膜者其因同而其証異也其所以異者翳者有形無體譬如煙霧其形可見而不可捉也膜者有形有體猶綿絮之可見又可捉也其為証也先起血線其末梢生數多之細支別瀰蔓角膜所輸送之血液竟滞止其部自為白濁曇暗而血絡愈送血不息則養長其膜以蔽玲瓏之質幾至不能見物景而從上垂下淡紅色者為赤脈下垂其白色而一片赤脈牽絆翳根者為垂簾翳（醫學入門從作垂簾膜）翳者為湧波翳一証毒劇而膜中釀膿漸進而蠹蝕角膜初起於一眼波及於一眼者為膜入水輪又有一種厚膜黄色而赤絡纏蔓固着於角膜恰如肉者名之肉狀膜其餘証名甚多頗厭煩絮故不贅

治法　至下倣白膜脈腫之法斷其根株内服發表劑主之如秘便者用下劑然因投峻下而膜愈進濃厚者有之予嘗遇如此之証與附子劑

屢獲神効膜入水輪之証者將養時宜與慈
朱丸點鉛糖水若耽延日期眼珠生疵者無治
之可施如肉狀膜者屬不治

膿瘍（附）潰瘍○水疱○膿疱○目瘡○漏睛膿血
膿瘍之為証也初次起於角膜下部白膜分際衝侵
瞳子而罕有發在於上部其形白色如星翳漸大而
作為膿潰及軟小水疱至其酷劇則在角膜上穿漏
口或破裂而流利膿液或膿液凝結而滯止角膜若
忽治法則必有首瞤之變宜慎之此証和蘭雖區別
膿瘍潰瘍水疱膿疱之四証皆是角膜為膿潰者也
何必分為四証乎本邦俗間所稱目瘡者即此類
証也漢所謂漏睛膿血者目瘡之同証而穿漏口者
是也

治法　外術將柳葉鍼刺膿瘍上可以驅除其
膿若凝固而在角膜之内部者宜做内翳法術
下鍼點劑蓬砂水神効水内服涼膈散加倍桔
梗且有一証無疼痛者用局方甘露飲屢見効
如作瘻者用没藥散及將小烙鐵點着漏口輕
者可治瘻深者難治

蟹睛疼痛（附）黒翳如珠

此証角膜内部突出尖高之黒腫其形小大不一頗似蟹眼而疼痛無甚焉砂澁難開怕日羞明此角膜裡面之纖維貯蓄鬱結之毒為熱熱潰爛而所發出也至其重劇則禍及蒲桃膜竟壓迫瞳孔遂作歇側變形然瞳孔僅存者以不遮障物景来映之所通達網膜之道路猶不至失明也或黒腫潰後腫痕生翳以遮明者亦有之漢人雖區別二証同是一証濕眼疳眼煩熱眼等之証其所由来也

治法　將小鋒鉄横刺黒腫則水液流利而自消減其鉄痕點鉛糖一小粟粒許後冝以温金

尉之用少蘗山梔子煎汁灌之四物三黄合方加没藥可多服如小兒消疳煎兼用雞肝丸佳也

角膜皺縮

此証即前條膿瘍之証而角膜穿瘻口以下漏出水様液過多而角膜為皺縮者也或小兒生平喜好暗地幽室不欲向光輝仰則數瞬墮淚而角膜為皺縮者此即疳眼也老人大病時角膜亦失滋潤難為瞬動凹陷而皺縮者必死之兆也

治法　專治本病為要

病係眼珠之証

眼珠膨脹

此証眼珠為盈脹突起至其甚則至使胞瞼不能閉合若兼煩痛者動輒眼珠釀膿証候似後條突出而不同焉決勿混同當今所有之病因者使下痢便毒痲痔帶下等下部結毒作乾燥内陷遂以上攻眼目者多係此病一証諸液溢滿而發者亦有之

治法因結毒者用薰劑每每得奇效水液溢滿者初發行氣香蘇散殊有効重者宜用鍼泄出有餘之水液其法明舉於後條可併考

眼珠突出（附）突起睛高○旋螺突起○肝脹眼○睛突起

此諸証者眼珠突出或低垂而有徐徐来者有卒然發者有痛者有不痛者有膿潰者出血者其証候不止一端今區別五等而令知其大綱第一証因打額至重或拏上筋麻痺等而眼珠突出腔外其大與尋常無異者名突出眼第二証因眼珠内部之煩腫角膜突然如彈丸麻木疼痛汪汪淚出此証有兇暴之變治緩則至乎膿潰者名突起睛高第三証即突起睛高之輕証而角膜變青白色突起尖高而其形似旋螺尖者名旋螺突起第四証眼珠低垂至頰其

狀如黑角時時大便出血而疼痛不可耐者名肝脹
眼第五証眼珠突出而赤脈疼痛眼液為混濁者名
白睛突起原因結毒而所發起也其不喪明者殆希
矣除此各証之外另有一之奇証予嘗遊於江都偶
見一丐者其眼珠與常人無異而以指頭壓上胞則
眼珠卒然突出為低垂約一寸許自為上下運轉眞
堪可怪而後依然收拾腔内如兒戲然矣見来不太
有礙瞻視做了一場便是討錢耳彼其素稟六筋與
神經固為弛緩者歟至今不會其理豈不奇異之一
証乎

治法　第一証以新汲水屢灌注則收入如故然若瞳神經為弛長者必有卒首之變不可忽眼珠被損傷者使眼珠急復其本位而搗爛生地黄裹在綿裡以安置于眼胞上而可施繃帶此法試之極妙第二第四之証將小尖刀小鋒鍼等刺角膜下際或横截而流出水液則治其法同於内翳之術第三証禁用刀鍼只宜以冷水屢洗而點鱔魚血第五証概為不治但其勢微者尚可救焉宜急用薰劑而攻其毒予於第二第四之初起嘗用吐劑或投峻下既獲大

効雖然以其證候不同難論定焉此証經久則縱令鍼刺納其突出亦不得免昏矇之患但不過除其苦楚耳

硬瞼硬睛

一名目瞼瞳硬此証因六筋麻痺拘急或乾燥眼之人胞瞼失滋潤等而眼珠不能運轉動搖者是也又有一証惟胞瞼為頑硬者此兩瞼因浸淫於梅氣天刑等之酷毒而所發也漢人雖有硬睛瞳硬之名予未見瞳孔之頑固者若有瞳孔變於頑硬之質則豈不喪明乎惟以難為運轉設立硬睛瞳硬之名者何也可供一笑

治法　用緩和糊劑或水銀膏傅于眼胞上又宜在胞瞼之裡面瀉血而與薰劑内服發表劑或下劑

眼珠瞤動

此証即眼珠胞瞼無次序瞤動不止者也此在瘝家及蛔蟲家而所發也

治法　宜詳其本病療之

發無定處之証

此條所述之諸証皆本於外傷而無定處加之證態不一其証以涉乎内外二障故不論於本

編各門下一以其所由来屬於外上
故附録于茲聊補其遺漏耳

○打撲眼

打撲眼之為証也因被物打著或自高處墜下打撲眼目或頭腦而發煩熱疼痛赤腫多淚之諸仆至其劇甚則眼珠損傷及膿潰或兩瞼青斑或偏正頭痛血灌瞳孔等尚有諸般之變態不可一定也此証雖不傷眼目强徹腦臆則必變於青黑濶大等之内障其初起不速加治則有噬臍之悔矣

治法　眼珠為傷損者一元丹調勻乳汁點之内服桃核承氣湯可也若經日生膿氣者涼膈散加倍桔梗用之頭痛劇甚者在眉稜百會行發疱又用吐劑令快吐二三次尤驗如血混入瞳人者速在瞳子窮可施放血儻或不瘥者於角膜下際淺施截術亦傚内竅法内服抵當湯為良此諸証皆宜在瞳子窮顳顬尺澤等之各處刺絡放血偏禁洗點之諸劑

○刺撞眼

此証被物撞刺生起種種患害者也因其所刺傷之大小淺深而發翳起瞖全為傷損或深瑕釀膿或出血不止或瘀血混入瞳

子千變萬化實不可測知焉若瘀血溜滯經久則必變於難治之翳其刺傷劇者卒皆潰爛無方之可救又撞刺生翳稍久而復被物撞轉加昏暗者難治故在初傷時必注意周密以防禦不測之變

治法　輕証一元丹或蘘荷搗汁或瞿麥末等和乳汁點之內服亟從証選用竹木麥芒之類去之若出血不止者點蠻產噶納諾爾少許奇効或灌冷水亦妙其餘亟依打撲眼之治法加意

火傷眼

此証眼目為湯泡火傷者也輕者易治其重者使眼液為凝結或腐爛污濊或卒皆昏暗等尚有許多變狀必難預為筭定焉

治法　輕証以麥門冬或紫根山梔子之煎汁洗之而點神功石水劑內服三黃四物合方加蒼朮有效重証亟攻打撲損傷之治例

創傷眼

此証西洋於眼目被創之部位而區別數多名目然

事係煩絮不易閱見故攩括之則眼目被金刃創傷者而如內翳鍼刺截術亦屬在此中

治法與打撲刺撞本無別學者亦斟酌

毒蟲傷

此証蜘蛛蜂蠆之類咬刺眼目熛熱劇痛弩肉瀲刺往被刺傷恐避其害矣

治法青黛散調和生蓼汁或乳汁以點之必有奇效

鼠尿入目

此在仰卧或仰見之時偶老鼠行梁上而利尿誤入眼目則泡腫熛熱疹痛瀲刺不能開闔者是也

治法點猫尿而後灑蕘荷汁則不日而治取猫尿有法促住猫兒安置于漆盆上以樟腦或生姜汁塗抹其鼻端則其利尿如注眞可為奇此方雖類于戲誕決勿藐視予既試知其妙噫生赴之理惡可排斥哉

眼科錦囊卷二終