秘傳

眼科全書

二

9 10

F 2
カー83

慶應義塾大學醫學部北里圖書

秘傳眼科全書卷之三

内障歌訣上篇

不疼不癢漸分明　薄霧輕烟漸〻濃
或見蠅飛如亂出　或出懸蠓在虛空
此般狀樣因何得　肝臟停畱熱結風
大呌大啼驚與怒　腦脂流下黑睛中
初時一眼先昏暗　久後相牽與一同
萬般苦楚空憔悴　只縁肝氣不相通
此時服藥難期定　縱有良方也没功
日久既因全黑暗　時名内障〻雙瞳

下條藏書

490.9
Ga-6
2
No.1572
12 910

慶應義塾大學醫學部北里圖書

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年6月30日

富士川文庫
1058

內障二十有四般　醫師爲者要推窮
妙藥救時須盡力　金鍼一撥日當空
虛心將息須防愼　莫遣他時病復從
鍼者但行賢哲行　惻隱之心。是善緣
有血莫驚須下手　裏鍼依舊再開看
忽然撞起膜重上　服藥三旬始見功
七日解封須見物　花生水動莫多言
還睛丸子堅心服　百日分明復舊根

歌訣中篇

內障二十有四般　後學之人子細看

白膜一點如星子　下鍼方可得安痊
若得鍼法動圓翳　誤損方知療作難
冷熱須明虛與實　調和四體得身安
不然抝下金鍼法　嘔吐勞神醫又翻
開鍼遠近須依訣　鍼形不可一般〻
病虛胎產并脹孕　下手應知療得難
不雨不風兼吉日　淸齋七日在針端
安心定氣堅心守　念善親姻莫雜喧
患者避風將息睡　休留憂慮要心寛
針者但能賢哲行　惻隱之心是善緣

有血莫驚須下手　裏針依舊再開看
忽然撞起膜重上　服藥三旬見朗然
七日解封須見物　花生水動莫多言
還睛丸子堅心服　百日光明復舊元

歌訣下篇

内障金針下了時　醫師言語要深知
嚴冬緊裹須包縛　夏月濾嫌有扇揮
頭眠軟枕須安穩　斜卧三朝莫厭遲
封後忽然微有動　薫風牽動莫他疑
或針或撥依經訣　痛極任將艾熨之

口吐或椒湯辣熱　胃安神定然相宜
起則恐因傷努力　頭翻倒卧莫從伊
七朝薄粥溫々服　振着身闘事不宜
大小便時須緩々　母令自去要扶持
高聲叫喚兼因氣　驚動睛輪見雪飛
攸心莫意陰陽事　夫婦恩情暫漸離
一月不須淋洗臉　針痕濕着痛微々
五七略知睛霧去　服藥並除病去基

眼疾證候總歌

赤眼赤腫臟積毒　赤而有痛肝之實

赤而昏者肝之虛
小眥赤者心之虛
多眵淚出肺之虛
赤脉蔦眼肝之實
茫々黑花腎之實
內膜遮睛々尅肝
早晨昏者頭風痒
夜間昏者定腦冷
夜間痛者隂之毒
包螺突起眼之損

大眥赤者肝之實
內眵多者肺之實
羞明怕日脾之實
視物不明脾臟虛
迎風冷淚腎之虛
迎風受痒肝邪傳
日夜昏者疾之作
浮翳遮睛肺之熱
日間痛者陽之毒
瞳仁倒入血氣衰

目睫倒入五臟損
頭暈目前赤星亂
赤而有痛血之實
久昏物遮衛經實
左赤傳右陽經旺
左右相傳熱邪攻
每年發者是天行
積年昏者肝受風
眼珠突出臟不和
目毛倒睫臟腑虛

赤膜遮睛五臟炎
不痒不痛血氣衰
血侵睛者肝虛熱
痛而增寒衛中虛
右赤傳左隂經旺
目近視者臟腑勞
拳毛倒睫肺之損
兩目赤者風毒攻
眼見赤花肝之虛
眼中虛血厥隂旺

大便後昏臟不和　陽毒病後下元虛
陰毒病後熱氣攻　過水眼昏腎受濕
孕婦目昏肝不足　產後昏〻血氣衰
小兒赤爛胎風熱　小兒癍痘胎受毒
小兒白障肺壅熱　小兒生翳感風熱
小兒雀目肝不和　小兒青盲腎經虛
小兒生瘡胎穢濁　小兒癖眼五臟虛
青盲有翳肝風熱　睛目之疾肝邪尅
眼內出膿陰氣攻　目偏視者臟腑勞
目瞅者血氣凝滯　兩目昏矇熱衝腦

或針或割目之損　用藥醫師細推詳

醫師論眼科內外七十二證

內障二十四

圓翳浮沉翳　冰滑散橫開　偃月大小雲
棗花驚振眼　青烏綠黑風　肝虛目暗病
雷頭風金星　高風雀目證　肝虛雀盲異
白翳黃心眼　黑花纈胎風

外障四十八

大眥赤脉侵　努肉攀睛障　雞冠蜆肉形
兩瞼粘眼者　胞肉膠凝眵　胞肉生瘡似

瞼生風粟多　天行赤眼毒　大患後生翳
暴赤眼生瞖　暴風客熱治　疼如神祟怪
痛如鍼刺因　傷寒熱病後　風牽出瞼閒
風牽喎斜者　被物撞破之　撞刺生翳眞
毒血灌瞳人　黑翳如珠樣　蠏睛疼痛難
旋螺睛突起　突起睛高同　瞼硬睛疼疾
肉臽魚鱗形　氷蝦翳深狀　玉翳浮滿珠
膜入水輪上　釘翳根深難　赤膜下垂長
黃膜上衝遮　逆順生翳障　漏睛膿血流
飛塵入眼內　拳毛倒睫生　衝風淚出異

乾

肝風積熱勞　起坐生花虛　混睛白赤痒
瞳仁干缺病　痒極難任風　鶻眼凝睛硬
轆轤轉關藏　小兒通睛驚　小兒疹痘衝
瞼中生贅翳　小兒疳眼虛　胎風赤爛眼
久年爛弦風　小兒青盲疾　醫家子細推

編次内外障共七十餘症其啓病之源治病之法對症湯散丸藥詳載編中

圓翳内障



此圓翳恰如西瓜團團浮在水面上古過金井頗大些初起如薄霧輕烟不痒不疼漸漸昏昧故曰内障先患一眼後則兩眼俱昏此乃勞心焦思之般灯窓旁飲之過以致肝腎二經受傷腦脂流下肝風衝上得成是疾宜用天字金針從翳投真針尾與翳平從翳上蓋下依訣用針緩緩取下其鵝翎對鼻直其翳方離瞳仁停針良久方可出針眼目立見光明多有氣旺之人其翳復浮起須令他雖久依訣進前針不可兜出外若兜出外恐傷黃仁傷却黃仁則傷血輪宜服補肝散補腎丸。

補肝散

羚羊角（二錢）　細辛　人参
羌活　玄参　車前子　黃芩　楮實子
石斛州（各五錢）　防風（一兩）　右研細末每服二錢米飲調下

補腎丸

五味子（炒）　熟地黃（酒蒸）　枸杞子（酒洗）　楮實子（同）
覆盆子（酒浸）　石斛州　肉蓯蓉（酒洗）　兔絲子（酒煮）　磁石（煆醋淬飛過）
車前子（各一兩）　沉香（別研）　青鹽（各五錢）

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯送下

遊翳內障



此翳淡白頻如脂膏之色不圓如薄霧浮金并近黃仁邊遶住不見三光陰看緩緩而大陽看緩緩而小瞳仁欲散此多有四圍近黃仁粘緊年壯氣旺難撥得下若係老人氣衰者無不効矣依訣進針其針頭向外方取得膜著從上掠盞下來其針之尾轉運切不可逸向外恐傷黃仁血動灌潤瞳仁昏朦不能視

物須服退血退風之劑漸漸可也宜人參蒙花酒煎散。還精丸

人參散

人參　白茯苓　石決明　煉過艸決明

白蒺藜　麥門冬　蟬蛻　兔絲子　黃芩

地骨皮　牛膝　木賊　遠志　青葙子

枳殼　茸艸　木通

等分為末以木賊艸竹葉煎湯調食後溫服

密蒙花散　密蒙花　石決明　羌活　菊花

白蒺藜　木賊艸　枸杞子　青葙子　蔓荊子

等分為末每服三錢食後茶調下

酒煎散　當歸　赤芍　防風　防已

荊芥　牛蒡子　甘艸

等分爲末每服三四錢水一盞酒一盞煎至七

分食後溫服

還精丸　兎絲子（酒煮）川芎　木賊　蒺藜（炒去刺）

白芍　熟地黃　甘艸　羌活　青葙子

密蒙花　當歸　枸杞子　肉蓯蓉

右研細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸食

後白湯送下

浮翳内障



浮翳者此乃浮在外近黃仁金井邊葢因三焦不順肝風上衝肺熱氣盛腦脂流下不痒不痛臨光無神翳如銀色朦矓赤色陰看略大陽看略小治法用天字金針從翳膜撥上盖下針法其勢須近外方得膜着緩之用針收下翳切忌針尾割着黃仁個此翳年老之人氣衰膜柔而軟易于服收若年壯之人氣莊膜堅而健難以收服撥下仍浮須經三五年下針方可取效宜服撥雲散洗肝

散墜翳丸

撥雲散　黃連　黃芩　石決明　川芎
白芍　艸決明　麥門冬　菊花　茸艸
白水煎食後服

洗肝散　當歸　羗活　梔仁　薄荷
防風　大黃　茸艸　加膽艸。生地。川芎
右白水煎食後服

墜翳丸　石決明　牛膽　青魚膽　羊膽（各五錢）
麝香（四分）
右陰乾為末。為丸梧子大毎服十丸空心茶送下

沉翳内障



此沉翳者其翳沉在裏也四圍與黃仁離遠不相粘帶翳膜中之好翳也益因肝臟勞熱眼前常見黑花年久凝結成翳其色青白瞳仁若沉在水中治法宜用地字金針一進其翳如綿之軟撥開裏針一收就下停針片刻便可出針眼目十分光明雖二三十年者立見効耳此翳多年清淚黃色者是也不分老幼之人皆可治之宜服清肝散密蒙花散省風湯鎮肝丸

清肝散　當歸　赤芍　白芍　羌活
柴胡　前胡　知母　防風　荊芥
薄荷　黄芩　川芎　桔梗　甘艸
石膏　滑石　加枳殻　黄連
右白水煎食後熱服

密蒙花散
方載前澀翳内障條

首風湯
犀角　玄参　知母　防風
大黄（各五錢）　黄芩　桔梗（各一兩）　羚羊角（二錢五分）
右研為末毎服二錢水二盞用灯心竹葉同煎
食後服

鎮肝丸　人参　白茯苓　五味子　石决明
細辛　山藥　藁本　車前子　羌活
楮實子　夏枯艸　石解艸
右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服四十丸清
茶送下

氷翳内障



此氷翳者如氷雪之狀白其翳中頗有裂痕陰看略大陽看略小無嘔吐無頭痛此翳由肝臓積熱久々成内障其翳如氷瞳仁徹大治法用地字金針從翳上依法運針蓋諒此翳多片々下來不

成団圓一盞一濇如此之狀不用依針運法停久七
日解封之後宜服退翳丸而日光明如舊若有頭疼
鼻頰骨疼或因嘔吐起因其翳亦如氷雪之狀陰看
不大陽看不小如此之狀翳不可撥縱撥不能得下
宜服通肝散涼肝散退翳丸

通肝散　白芍　柴胡　黄芩　細辛
艸決明　龍膽艸　蔓荊子　青相子　木賊
蒺藜　防風　玄参
右白水煎食後服

涼肝散　當歸　赤芍　龍膽艸　羗活
細辛　玄参　艸決明　防風　荊芥
薄荷　川芎　青相子　蒺藜　木賊
白水煎食後温服

退翳丸　青相子　蒺藜　木賊　谷精艸
艸決明　蟬蛻　密蒙花　牛蒡子　龍膽艸
防風　歸須　赤芍（各一兩）　夏枯艸　陳皮（各七錢）
夜明砂（五錢）　犀角（一錢）　石決明（一兩）
右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服三十丸不
拘時候酒送下

滑翳內障



此滑翳者其翳如水銀珠子光瑩不大不小陰看雲膜則小陽看雲膜則大初患不痒不痛先病一目後乃相牽漸漸失明蓋因腦脂流下肝風上衝則致是疾治法宜用地字金針從翳上緩緩益下此翳最滑其針須按翳上中間若偏外其翳滾外起若如此滾須令患者睡良久與之茶湯或能飲酒者與之三四盞無妨以壯其膽然後再進針收之即下者停針須良久隨依方服藥再不浮起多有次月再浮者開封亦再可收下三月不宜針宜服密蒙花散還精丸

密蒙花散

還精丸

方共載前澁翳內障條

散翳內障



此散翳者翳膜類膿疥瘡形狀有重皮包着內有藥水似膿或如清鼻涕初起因肝經積熱風毒上攻久而生翳漸漸失明治法宜用天字金針依訣而進從上撥下緩緩然其膜將離瞳仁針勢若緊其翳頗有向漿水流下一半流出金

井外水輪内流眼通白如此之状以膏封令仰睡五七日將養其藥水還復流入金井内其眼漸漸光明宜服四物湯洗肝散還精丸墜翳丸

四物湯　當歸　川芎　白芍　熟地黄

加玄參谷精艸充蔚子生地黄桑白皮

右清水煎食後服

洗肝散　當歸　羌活　薄荷　梔仁

大黄　防風　甘艸　川芎

加膽艸生地黄

右研為末每服二錢白湯調服或煎服

還精丸　方載前澁翳内障條

墜翳丸　方載浮翳内障條下

横開翳内障



横開翳者何也因肝腎二經受風熱毒攻以致瞳仁漸漸生翳膜青白色只一重似紙厚托在黄仁金井内金井外無圍遍之状最難動針針向内則取不着針向外恐傷黄仁須天字金針從上瀉下平平針勢似以水上盪浮萍之状亦用物碗面横收一重油紙之類是也此翳開鋒多開近些方得法也宜柴胡復

明湯省風湯治眼丸。還精丸。去翳膜丸

柴胡復明湯

柴胡　黄芩　羌活　獨活

白芍　桔梗　川芎　白芷　白茯

蒼朮（米泔水浸）　五味子　蔓荊子　甘州　藁本

各等分清水煎食後服

省風湯　方載前沉翳内障條

治睛散　當歸　白朮　白芍　羌活

赤芍　菊花　密蒙花　梔子

白水煎起碗加蜜少許和服

還睛丸　方載前澁翳内障條

去翳膜丸

兎子屎焙乾為末煉蜜為丸如梧子大

每服二三十丸米飲下

偃月翳内障



偃月翳者此症為肝腎俱勞致生翳障如偃月白色不能辨物恰似初九初十夜月半現半埋其翳上一半向裏生下一半向外生帶黄仁如此之症仰看高可見些物若低頭看全不見陰看大陽看小治法宜用地字金針一撥就下停針良久出針其翳又浮上何也上半邊不粘黄仁下半邊粘黄仁不脱須有顛

倒針法從下撥上將下也撥離黃仁方運針法依口訣方可成功宜服補肝散修肝散補腎丸

補肝散　方載前圓翳內障條

修肝散

當歸　耳艸　防風　連翹

薄荷　梔子　黃芩　大黃　艸決明

蔓荊子　細辛　赤芍

右研細末每服三錢食後加蜜少許調下日進三服

補腎丸　方載前圓翳內障條

太雲翳內障



大雲翳者不痒不痛漸〻昏矇乃七情所傷肝腎二經鬱結不散致成是疾其翳似小龍眼核大陰看滿眼全然是大陽看略小此翳最健有力宜用天字金針開其頭針法從上撥下須離瞳仁停十分久方可取針出不可急而不久恐又復起若浮上須令他睡倒良久或經一時之久又可進針撥〻收下此翳年老之人無妨可撥若後生年壯氣旺其翳帶白終難下手須齋三五箇月然後

可動針宜服沖和養胃湯補肝散還精丸

沖和養胃湯

白芍　當歸　白茯　柴胡　五味子

人參　黄芪　羗活　甘草炙　防風

白朮　升麻　乾葛　乾姜

右水二盞煎至一盞再入黄連黄芩復煎至一盞食後稍熱服

補肝丸

方載前圓翳内障條

還精丸

方載前氷翳内障條

小雲翳内障



小雲翳者十分小也此翳多生肥壯之人或思慮過多或灯窓勤勞致傷肝腎二經動發之際不痒不痛或時昏暗或見黑花以成是疾雖則翳小其實頑健何也非翳小也乃肝實血旺金井鎖緊其翳亦隨而小宜用天字金針從上撥下緩緩用針此膜四圍粘黄仁若扯得緊扯傷黄仁血出雖翳收血灌瞳仁則有些竄一時不明須服退血散之藥漸漸澄清終久光明切忌口及房事等宜

服密蒙花散還睛丸墜血丸

密蒙花散　方載前澁翳内障條

還睛丸　方載前澁翳内障條

墜血丸　歸尾　赤芍　生地　牛膝
蒺藜　石决明　五味子　川芎　知母
細辛　香附　紅花

右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服四十丸白湯送下

棗花翳内障



棗花翳者此症頭旋腦熱痛痒不休眼前常見黄黒二花眼中有翳參差如棗花先起之時瞳仁之間金井内水中先有一點碎々雖成經二三年間凝結方成内障如棗花形狀四圍如鋸歯宜用天字金針從上撥下多的能碎屑々而下一盞一清其翳不片段須撥三五下金針無妨一時雖見濛々然若烟霧視物不眞隨服湯散丸藥光明復舊宜服羚羊角散。凉膈散。枸杞兎絲湯。還睛丸

羚羊角飲　羚羊角　防風　人参　知母

白茯　玄參　桔梗錢（各五）　細辛　車前子

黄芩錢（各一）　枸杞子　熟地

右研為末每服五錢水煎服

凉膈散　黄芩　梔子　薄荷　甘艸

連翹（點用後勿用）　大黄　黄連　黄柏　朴硝（此一味前）

右研為末每服三錢白湯調食遠服

枸杞兔絲湯　枸杞子　兔絲子　覆盆子

青相子　熟地黄　防風　薄荷　玄参

密蒙花　當歸　石决明　龍膽艸

右水煎磨石蠏起碗食後服

還精丸　方載前澁翳内障條

驚振内障



驚振内障者或因被人打著或撞著或從高處跌下低處致而昏暗二三年間一如内障形狀陰看能大陽看能小不辨三光宜用天字金針從上撥下立見光明又有此症或後生人患雲翳小〻陰看不大陽看不小不見三光如此之狀切不可撥也宜服歸花湯當歸活血湯還精丸

歸花湯

楮實子　當歸　密蒙花　黃連　熟地

覆盆子　枸杞子　玄參　連翹

石斛艸　防風　陳皮　白芍

右清水煎食後服

當歸活血湯

歸鬚　黃芪　沒藥　川芎

蒼朮　熟地　生地　赤芍　蒺藜

紅華　香附　牛膝

右等分為細末清水煎食後溫服

還精丸　方載前遊翳内障條

青風内障



青風内障者無乃五風變五色不離頭痛而起亦因酒色過度内傷腎氣不痒不痛漸失其明眼目俱不傷損故無所見目積月累瞳仁開大漸々變青色憔初患之時依方服藥若神氣散盡不見三光更無治法須服羚羊角湯歸杞湯

十一味還精丸

羚羊角湯　羚羊角　人參各一錢　丁參

地骨皮　車前子　隔紙炒　羗活（各壹錢）

加當歸龍膽艸各四錢

右研粗末毎服二銭水煎食後服

歸杞湯　當歸　枸杞子　楮實子　覆盆子
石斛艸　密蒙花　熟地黄　黄連　防風
玄參　連翹　白芍　陳皮

右向水煎食後服

十一味還精丸　川芎　白朮　防風
木賊　羌活　耳艸　蒺藜　密蒙花
青葙子　兎絲子　當歸

右研細末米糊為丸如梧子大毎服四十丸日三次茶送下

烏風內障



烏風者五風變也此症不痒不痛其瞳仁不開大漸〻昏沉又無翳障是由氣澁使然瞳仁如黒墨形狀當此之時急宜服藥若經二三年間結成翳青白色陰看不大陽看不小至此之極不可鍼撥亦不可藥服痼疾成矣雖有良醫不能為也宜服益肝散還陰救苦湯滋腎丸

益肝散　當歸　川芎　白芍
半夏　柴胡　艸决明　黄芩

甘艸　蒺藜　龍膽艸　梔實子

右清水煎食後服

還陰救苦湯　歸鬚　黄連　黄芩　黄栢（各七錢）

細辛（二錢）　藁本（酒洗四錢）　升麻　蒼朮　甘艸

知母　川芎　防風　羌活　桔梗

龍膽艸　連翹　生地（各五分）

各研為末毎服六錢清水煎食後服

蠲瞖丸　當歸　熟地　枸杞　白朮

白芍　白茯　牛膝　龍膽艸　覆盆子

肉蓯蓉　川芎　玄參（各一分）　兔絲子（酒煮九半）　蒼朮（泔浸三錢）

防已　厚朴　遠志　黄栢　知母

青葙子　石決明　蒺藜（各一分）　香附　密蒙花

磁石（煉醋淬）　砂仁（各七分）　甘艸（四分）　人參（二錢）

右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服三五十丸

鹽湯下或酒下

綠風內障



綠風者乃五風變化之症因肝氣熱極虛勞所致亦且腎水不滋肝氣月損月久則變為昏初時但覺頭額鼻顴諸處疼極夜見有花紅黑不定先患一眼後乃相牽俱患此症惟初患之時宜服羚

羊角飲。還精丸之類是也。尚至喪明瞳仁變緑不見三光終無治法不用服藥不須針撥然婦人多患是症何也心主血肝納血婦人以血爲主血衰不榮于肝致肝膽熱極變成緑風難矣宜服羚羊角散羚羊角飲還精丸

羚羊角散

羚羊角　防風　川芎　羌活

菊花　半夏

右研爲末每服二錢荊芥湯調下

羚羊角飲　方載前棗花內障條

還精丸　方載前澁翳內障條

黑風內障

黑風者五風変也初發時頭旋腦痛眼澁生花往來昏黑蓋因房事不節肝臟虛勞致使頭腦諸部骨節皆疼瞳仁開大因之失明當此之時切宜依方服藥救治若神耗散盡總爲不治之症宜服密蒙花散。鎮肝丸。地黃丸

密蒙花散　方載前澁翳內障條

鎮肝丸　方載前沉翳內障條

地黃丸

熟地（二兩）　當歸　赤芍

藁本　石斛艸　夏枯艸　楮實子

青相子　蔓荆子　艸决明　白芍　龍膽艸

黄芩（各一両）　遠志（去心）　黄芪（各五匁）

右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服三十丸食後日進三服

肝虚目暗内障



肝虚目暗若此乃勞力之人多受是疾或尋思家事夜卧不安或酒色過度或夢泄精夜視細字致損肝腎二經急宜依方服散丸若至喪明則無治法宜服菊華補肝散入參散修肝散

菊花補肝散　甘菊　熟地

白芍　白茯　細辛　防風　柴胡

甘艸　枸子仁

右等分半水半酒煎令食後服

入參散

方載前溢腎内障條

修肝散

方載前偃月内障條

還精丸

方載前溢腎内障條

雷頭風内障

雷頭風者大抵肝風熱毒上衝於腦及面目頭項倶腫初頭痛如雷痛難忍或吐或悪心故曰雷頭風風久而毒氣入目當此之際如若致失明不見三光瞳仁漸大如黄蠟色日夜如一般同素無治法男子少得婦人多受是疾宜服瀉肝散斬艾湯石羔散

瀉肝散　知母　黄芩　桔梗
大黄　朴硝　烏豆（九个）
右研為末每服四錢白水煎食後服

斬艾湯　斬艾　薄荷　菊花（各二錢）　細辛（五錢）
南星　全蝎（各一錢五分）　麝香（一分另研）
右白水食後服

石羔散
石羔（五錢）　麻黄（一両）　乾姜（七錢五分）　何首烏（五錢）
右研為末每服二錢白水煎食後服

金星翳内障



金星翳者類金色皆因大病後或極頭痛起因須與内障同列隂看能大陽看能小雖見三光最難撥也此症十个之中縱有一二能光翳最堅牢又有一症瞳仁鎖緊其翳如秤星瑩々金切不

可動針一動針黃血來混雜以水流入金井中清濁不分永爲痼疾矣宜服撥雲散試効丸

撥雲散　黃連　黃芩　川芎　白芍
菊華　艸決明　麥門冬　甘艸
右清水煎食後服

試効丸　當歸身　生地黃　茺蔚子（炒）　黃柏（塩水炒）
柴胡（各五錢）　熟地（八錢）　赤芍（一兩二錢）　川芎　防風
知母（塩水炒）　羌活（各三錢）　牡丹皮　寒水石　丹參（各二錢）
香附（童便入塩煮熟去皮毛一錢）　右研細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸白湯下隨以食物壓之

高風雀目內障



高風雀目者乃肝中積熱腎水衰不能制伏肝火肝火壅盛致傷于目黃昏見物至點灯全不見物漸々昏矇視物惟見直上之物依方服藥外又可用夜明砂蘸向豬婆肝空心食之或羊肝連膽煮露一宿切薄空心蘸夜明砂食之亦可此症初患時若不講調理延至日久變爲青盲終爲不治之症宜服清肝散。光明夜靈散夜明散羊肝丸

清肝散　方載前沉翳內障條

光明夜霊散　石决明（煉又煑ル）　夜明砂（研細　各三錢）　豬肝（一两生用）

右藥二味和匀以竹刀切豬肝作二片将藥鋪肝上合定以麻線纒束勿令藥出外用米泔水一大碗入磁鑵内煑肝泔水煑乾至一小半臨卧連肝并汁同食之立効

夜明散

蚌粉（各一两）　夜明砂　谷精艸　木賊　蟬蛻

右研細末以豬肝切開捲摻藥末在内放鍋内煑熟細嚼下効

羊肝丸

當歸（洗焙）　赤芍　白芍　蒼朮（米泔浸）

香附（四制）　玄参　牛膝　兎絲子（酒煑）　熟地（酒蒸）

白茯　柴胡　黄芩（各一两）　艸决明　蔓荆子

茯神　知母　黄柏（各七錢）　龍膽艸　青相子

枸杞子　石决明（煅）　麥門冬（去心各九錢）　同羊肝為末煉蜜為丸梧子大毎服二十丸温湯下

肝虚鷄盲内障



肝虚雞盲者乃肝之虚也雞盲與雀目不同至酉時黄昏則不見物至點燈時又見物雀目者黄昏見物點燈時全不見物故此分為兩症雞盲者惟視直下之物雀目者惟視直上之物能視上者

宜補肝散能視下者宜車肝散雞盲之症亦宜白豬婆肝空心蘸夜明砂食之或用老米煮鴨肝粥頻〻食之宜服補肝散車肝散

補肝散　大黄（酒蒸久晒）　川芎　菊花　防風
大力子（炒）　荆芥　玄參　蒺藜　細辛
黄芩　梔子　木賊　甘州　艸决明（炒）
蒼朮　蔓荆子
右爲細末每服二錢臨臥飲湯調或酒調下

車肝散　細辛　黄芩　防風　充蔚子
木賊　大黄　車前子

木賊　大黄　車前子
右爲末烏豆七粒同煎食後服

白翳黄心内障



内翳黄心者由勞傷太過肝膽風熱虚火上攻有時昏矇不能辨物翳形如梅片白似銀惟黄一點黒中初起之時朧仁中間先有一點如粟米大日夕團〻漸〻湊成内障此翳須二三年間方可撥得下若年近恐撥散不成片而下此症易識中間分明一點厚些四圍不共一色而薄也宜服密蒙花散墜翳丸

密蒙花散

方載前澁翳内障條

墜翳丸　青相子　艸決明（炒）　玄參　細辛

防風　赤芍（各七錢）　車前子　谷精艸　熟地黄

密蒙花　龍膽艸　黄芩（各八錢）　白蒺藜（炒去刺）　木賊

蟬退（各五錢去土）　石決明（五錢）

右研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸食後滚湯下或酒下

黒華翳内障

黒花翳者此症頭旋脳熱眼黒生花肝膽積熱風上衝脳凝成翳如烟色如鍋煤百艸霜之狀隱々淺沉在水之中不能視物先患一眼後乃相牽倶瞎此症多是思慮性譟之人有之雖少此症須經三五年間不辨三光陰看能大陽看能小依法須用天字金針從上撥下其翳連人扯得長黒翳方離瞳仁瞳仁漸々回圓停針良久方可出針眼光明矣宜服治眼散凉膽丸

秘傳眼科全書巻之三

治眼散　當歸　白朮　白芍　羌活

菊花　赤芍　密蒙花　梔子

右水煎起碗加冬蜜少許和服

宗膽丸　黃連　黃柏　黃芩　防風

荊芥　蘆薈　龍膽艸　柴胡　地茄子

右研細末煉蜜爲丸如梧子大毎服三十丸清茶送下

秘傳眼科全書巻之四

太眥赤脉穿睛外障



赤脉穿睛之症起于大眥者心之實熱也此心邪之侵肝也心屬火主血肝屬木主筋〻得血灌引漸至黑睛慢掩瞳仁甚則看物如隔紙絹大抵三焦相火炎上或勞神心事太過或夜觀書史或能飲酒或好食五辛諸熱物皆致生是疾治法宜瀉火退熱有老少不同之治日積月累筋脉大者用小鋒針逐箇抽斷毒血流出赤脉斷矣若是乍發赤脉

不用抽法只以清凉丹藥服以四順散八正散當歸散導赤散

四順散　當歸　大黃　甘艸　赤芍（各等分）

右研為末白水煎食後服

八正散　萹蓄　瞿麥　梔子　大黃
木通　滑石　車前子　甘艸

右等分加竹葉灯心葱頭同煎食後服

當歸散　人參　桔梗　白茯　玄參
黃芩　羚羊角　大黃

白水煎食後服

導赤散　生地黃　梔子　木通　甘艸
灯心　淡竹根

右白水煎食後服

小眥赤脉附睛外障



小眥赤脉附睛者心之虚也與大眥不同故分兩症治之大眥赤者心之實也小眥赤者心之虚也心者五臟六腑之宗且屬南方候象火德又屬五行生旺火生土火乃土之母脾土實則心火虚矣治法先瀉其脾之實後補其心之虚多因夜勤灯火勞傷心經致心氣虚弱

血運不行積在小眥不散宜補心之劑服之因大眥與小眥之症殊故引此二者以為後學者識為此症宜點藥不宜抽蒭宜服加減大黃當歸散瀉脾散九仙飲補虚人參茯苓丸

加減大黃當歸散　大黃　當歸　甘艸
人參　白茯　黃茋　麥門冬　知母
桔梗　黃芩　連翹

瀉脾散　方載後鷄冠蜆肉外障條
白水煎食後服

九仙飲　當歸　川芎　赤芍　黃芩
甘艸　荊芥　菊華　白芷　木通
白水煎食後服

補虛人參茯苓丸　人參　白茯　遠志
白姜蚕　甘艸　白附　續斷
右研細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼
桔梗湯下

努肉攀睛外障



努肉攀睛者與大眥赤脉同然此症脾胃熱毒心肺二經火邪衝目致有內眥肉息衝起攀睛久而不退蓋脾爲倉廪之官肌肉之府脾受肝邪多是七情鬱結之人或夜寐思家事無歇或飲酒樂慾致使三焦壅熱或肥壯之人血滯于大眥努肉發端之時多痒因用手擦摩努肉漸〻生侵黑睛日積月累者爲實乍發乍起者爲虛治法實者以小針爲鈎鈎起努肉剪斷些寛三五月剪根痕攸備方可用藥吹點餘翳漸〻消須避風忌口齋戒若乍發者不宜鈎剪只宜服藥點以淡丹藥宜服梔子勝奇湯。龍膽艸散。吟風湯。三黄丸

梔子勝奇湯

梔子　石膏　草決明

防風　荊芥穗　木賊　蒺藜　蟬蛻

羗活　黄芩　蔓京子　谷精艸　密蒙花

菊華　甘艸

右研爲細末每服二錢臨臥時熱茶調下

龍膽艸散

龍膽艸　甘艸　木賊　艸決明

菊花（各一兩）　川芎　香附（各二兩）

右研細末毎服二錢麥門冬薄荷煎湯加砂糖一匙同調臨臥服

冷風湯　防風　黄芪　茺蔚子　桔梗
五味子　細辛　大黄
右水煎食後服

三黄丸
黄連　黄芩　大黄（各九分）
右研細末煉蜜為丸如梧子大毎服二三十丸滚湯下

鷄冠蜆肉外障



鷄冠蜆肉者心之熱酒之毒也脾胃壅滯肝臓積熱肉翳漸〻而長黒睛發來高大形似鷄冠蜆肉壅蔽大眥皆因相胃火鬱結致生紅肉移澁淚出治法初發之時用小鋒針針〻破使悪血流出以輸其肉二三日又針一次又法可剪竹葉作捲小筒彈進鼻孔内放出血或用小針亦可（右眼）右孔左眼左孔或用三黄丸或朴硝丸如彈子大夜含化一丸以沃上焦之火正為揚湯止沸莫若去薪發

久肉翳者可烙三五度其効甚速烙可用軟皮剪孔遮按眼眶烙則不傷四眥此肉有虚有實若虚切不可剪剪則血流汪々變為甚害或壅為缺桃李狀難治矣劑宜服瀉脾散抽風湯

瀉脾散　歸鬚　赤芍　石膏　黄栢
黄連　草決明　蒼朮　枳殼　柴胡
香附　大黄　朴硝

右水煎一二沸再加硝黄同煎半飢服

抽風湯
防風（一兩）　桔梗　大黄　細辛
黄芩　玄參　車前子（各一兩五錢）　朴硝（一兩）

右為末每服四錢水煎服

三黄丸　黄連　黄芩　大黄（等分）

加黄栢知母（俱用塩水炒）

兩瞼粘睛外障



兩瞼粘睛者脾胃風虛冷弱邪氣聚于瞼以致胞瞼風赤濕爛肝膈虛熱眵粘四眥夜睡上下胞瞼膠凝粘緊血滯不散久則漸生翳膜治法宜用陰一陽三丹藥吹點若發年久眼皮漸長雖不見拳毛倒睫亦可夾些眼皮使露黑睛消散血氣斂積有淤血可剃可洗爛痒者

洗以碧天丹每日清晨用桑白皮煎湯入鹽薰洗或大寒後不落之桑葉名為鐵扇子煎洗乃妙或菊華菊葉煎湯洗亦可此乃發歇年久有此症初發無此症矣宜省風湯瀉風桑白散烏犀角丸

省風湯　方載沉翳内障條下

瀉風桑白散

桑白皮　防風　荊芥

前胡　升麻　姜蚕　蔓荊子　川芎

蟬退　羗活　薄荷

右白水煎食後服

犀角丸

犀角　桑螵蛸　白菊花　赤芍

玄參　人參　山藥　羗活（各二両）

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二十丸滚湯送下

胞肉膠凝外障



胞肉膠凝者與兩瞼凝睛同治法亦頗同之然前症瞼之病此症胞之病瞼熱則眵粘病之淺瞼熱則膠凝病之深須分作兩症治之脾胃壅熱肝膈風充胞瞼内蠹肉壅起爛濕眵粘膠凝氣血壅滯不能疏散積之年久黑睛生翳澀昧不明羞明怕日治法用陰二陽四清涼

丹吹點有淤血可剗洗以桑白皮鐵扇子白菊華當歸防風荊芥木賊薄荷塩花之類胞肉積久堅硬厚實翻轉二三度而實肉自可消宜服細辛湯除風湯。三黃丸

細辛湯　細辛　防風　人參　白茯苓

五味子　車前子　玄參（各一兩）　地骨皮　黃芩

澤瀉（各一兩半）　茸艸（五錢）

右用白水煎食後服

除風湯　防風　細辛　桔梗　茺蔚子

黃芩　大黃　五味子　薄荷　石膏

黃栢　艸決明

右水煎食後服

三黃丸方載前努肉攀睛條下

胞肉生瘡外障



胞肉生瘡者與胞肉膠凝瞼生風粟兩瞼粘睛之症大同小異此皆上胞下瞼症也然中間分析治法各有輕重深淺剗洗針烙不同胞肉生瘡者大抵脾胃毒熱胞肉疙瘩或風粟受而為瘡者血熱化膿腐爛遲腂汁流膿浸漬黑睛生翳眼如硃砂顏色此症雖少不可不知

治法用陰二陽十丹藥吹點日用桑白皮煎湯入枯礬塩花翻轉眼皮以鴨翎刷洗有瘡處以血蝎乳香没香輕粉陀僧為末厭之或有瘡處烙二三下無妨宜服瀉脾湯清和散隆肝丸

瀉脾湯　方載雞冠蜆肉條下

清和湯　連翹　防風　荊芥　薄荷
苦参　玄参　升麻　秦艽　瓜蔞根
右加灯心同煎食後服

隆肝丸　五味子　石决明　車前子　知母
澤瀉　山藥（各一两）　防風（一两五錢）　龍膽艸　青相子

柴胡　黄芩　艸决明　赤芍　蔓荊子
右為末煉蜜為丸如梧子大毎服三四十丸清茶送下

臉生風粟外障



臉生風粟者臉間積血年久致生風粟與眹粘症同然臉眹粘睛無風粟也故此分臉生風粟又作一症蓋胞者上胞臉者下臉也脾胃壅熱致令胞臉之間漸成風粟如麻如米甚如楊梅之状摩擦瞳仁黒睛有翳久々漸昏流涙不止治法翻轉臉皮以風粟逐箇用鋒針啓

容針三五度亦烙之更妙黑睛有翳者用陰三陽五
丹藥吹點二三夜吹一次忌口動風動血之物不宜
食宜服除風湯退熱飲敗毒散

除風湯　羚羊角　山犀角　防風　知母
黃芩　玄參　荊芥　桔梗　大黃
朴硝　黃連
右爲末用水煎服

退熱飲　五味子　黃連　黃芩　車前子
梔子　石膏　連翹　赤芍　龍膽艸
玄參　防風　黃栢　地骨皮　茺蔚子
右水煎食後服

敗毒散　大黃　荊芥　牛蒡子　蔓荊子
甘艸
右用水煎服

天行赤眼外障



天行赤眼者謂天氣流行毒氣能傳染於人一人害眼傳於一家不拘大小皆傳一遍是謂天行赤眼腫痛沙澁難開或三五日而愈者此候之氣其病安然治法此症不宜劆洗只用五七歳童子小便煎黃連露一宿溫洗日進五遍

以解惡毒之氣更用胡宣二連明礬雄黃研細調姜汁點一背通其惡淚其痛立止或酒調散。酒煎散服二三貼無妨此症只氣候瘴毒之深雖痛之重終無傷于黑睛瞳仁也宜服瀉肝散八正散洗宜洗眼散

瀉肝散

黃連　黃芩　梔子　赤芍

芒硝　木賊　龍膽艸　防風　葶藶子

升麻　甘艸　陳皮　大黃　朴硝

右水煎食後服

八正散　方載前大眥赤脉穿睛條下

洗眼散　冬青葉　側柏葉　甘艸　細辛

黃芩　防風　荊芥　薄荷

右一貼一兩煎濃薰洗日洗三次

木患後生翳外障



大患後生翳者與天行赤眼實同一症也何分兩症治之蓋天行赤眼只一候或五七日愈矣症雖同無生翳之患若大患後生翳者初時良然而起腫痛發來甚重淚澁難忍增寒發熱坐臥不安或通夜行至達旦羞明怕日淚出如湯鼻塞涕流兩眼腫起如桃日夜呻吟飲食無味二七不愈遂生向翳如黃膿疥

瘡占在風輪其腦牽痛治法須用胡宣二連藥煎研細調薑汁點用苦桃葉側栢葉艾葉柳葉熏洗服四順八正導赤散雖治療痊亦只昏昧二三箇月方得復舊失調理者喪明必矣

細辛湯　細辛　充蔚子　玄参　黄芩

桔梗　大黄　車前子

右水煎食後服

四順散　方載前大眥赤脉穿睛條下

八正散　一方并同

暴露赤眼生翳外障



暴露赤眼生翳者此症與天行赤眼同但天行赤眼能傳染於人暴露赤眼直患於一人而無傳染天行者雖腫痛而無翳暴露者腫痛而生翳淚出故此有別治法扣其所因量其老幼虛實熱則清涼之結則調順之此眼縱有淤血切不可剃洗亦不可進補藥宜服酒煎散發散內加麻黄蒼朮或大黄當歸散疏通血氣點以淡藥洗以黄連當歸防風荆芥菊花側栢葉赤芍薄荷之類又宜

服瀉肺湯鎮肝丸

當歸散　方載前大眥赤脉穿睛條下

酒煎散　防風　防已　荊芥　甘艸

當歸　赤芍　牛蒡子

右爲末毎服三四錢水一盞酒一盞同煎食後

溫服

瀉肺散　桑白皮　梔子　前胡　桔梗

枳殼　玄參　防風　赤芍　黄芩

蔓荊子　石膏　大黄

水煎食後服

鎮肝丸　細辛　楮實子　夏枯艸　石斛艸

人參　石决明　山藥　羗活　藁本

五味子　白茯苓

右爲末煉蜜爲丸如梧子大毎服四十丸清茶下

暴風客熱外障



暴風客熱此症與暴露赤眼同暴露者肝心二經病也故赤而痛致黑睛生翳暴風客熱者肝肺二經病也故白仁生虛翳四圍擁纏朝伏烏睛凹入白仁紅翳壅起痛澁難開故分別暴露與暴風之症暴者乍也驟也陡然而起治法疏

通退熱涼膈瀉肝增減酒調之劑發散風熱俗云眼熱忌酒孰知酒能行血藥無酒不能行於頭目此眼不可剃洗不可點涼藥暴客之障來之速去之亦速也非比五臟六腑蘊積發歇之症同俗謂傷寒眼也宜服瀉肝散。涼膈散。三黃湯

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條下

涼膈散　方載前棗花內障條下

三黃湯

黃連（五錢）　黃芩（一兩五錢）　大黃（二兩　酒蒸晒）

加梔子荊芥防風各五錢

右為細末用蜜調不拘時候服

疼如神祟外障



疼如神祟者此因心火積鬱血熱為病好惡不常久延患歸之邪祟舊無根蒂或日痛而夜愈或夜痛而日愈如艾之灸如針之刺忽來忽去無蹤無跡故號曰神祟世豈有神祟為禍而能害眼蓋由陰陽偏勝動靜氣血攻擊使然亦有信巫之人因祈禳作福而愈者有之孰知病勢將除偶因如此而愈曰神祟眼非也治法痛時只宜葱葉煎之服酒煎散二三貼止痛點以時藥洗以歸尾

白芷　防風　赤芍　川芎　生地黄止痛散血可也宜服酒煎散羚羊角飲七寶洗心散

酒煎散　方載暴露赤眼外障條下

羚羊角飲　方載棗花内障條下

七寶洗心散　歸鬚　赤芍　大黄（酒蒸久晒）　荊芥

梔子　甘艸　麻黄

右白水煎食後服

痛如針刺外障



痛如針刺者即是神祟症中如艾之灸如針之刺二病同然此症皆因心臟潜伏毒熱風壅在於膈間目弦頭痛眼系常急夜卧澁痛淚出難開時時若針刺相似久則翳膜蔽睛急宜服瀉心湯八正散之劑口噙水嗃以雄黄止其頭痛點以時藥洗散血氣洗以側栢葉防風荊芥薄荷黄連生地黄之類黒睛有星如釘之釘凹進痛如針刺者點以淡藥可也宜服瀉心散八正散洗心散

瀉心散　大黃　黃芩　桔梗　知母
玄參　防風　馬兜鈴
右水煎食後服

八正散　方載大眥赤脉穿睛外障條下

洗心散　當歸　防風　薄荷　荊芥
麻黃　甘艸　赤芍　白朮　大黃（酒蒸久晒）
右等分爲末每服三錢食後白湯調下

傷寒熱病後外障



傷寒熱病後外障。盖由大病新痊熱毒未除餘熱未盡形體羸瘦臟腑未實氣血尚虛陰陽偏勝未復縱口多食五辛油膩煎炒一切之物諸毒蓄積于內熱邪表出于外攻衝于眼〻者五臟六腑之精華其症各現于五輪此症發時赤腫淚出痛澁難開瞳仁倜大黑花繚繞不能遠視此血虛也治法點以時藥散風活血當歸地黃菊花荊芥方風薄荷之類不宜剃洗只宜平補臟腑損其有

餘益甚不足是爲治法也此症切須忌口毒物皆不可食忌兩三箇月方可宜服瀉肝散決明散熊膽丸

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條下

決明散　石決明　羗活　荊芥　梔子
木通　赤芍　麥門冬　地黄根
右白水煎飯後服

熊膽丸　熊膽　車前子　澤瀉　細辛
石決明　牛膽　充蔚子　乾地黄　龍膽艸
右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服三四十丸白湯下或酒下

風牽出瞼外障



風牽出瞼者脾胃受風毒在胞瞼之間瞼受風而皮緊脾受風則肉壅此皮緊肉壅風牽出瞼淚出汪汪無分四季此土陷不能隄水也積於瞼濕爛之狀治法先用摩風膏刮散皮外風邪搽以白蘞膏消散風毒翻轉瞼皮烙三五度無妨此症一年半載易治若年久肉堅難治若眼有紅筋貫上黑睛有翳有膜吹以丹藥痒爛洗以碧天丹此症大抵眼眩之病也此症大風癩疾之人面部

所牽多受是疾難以調治故名爲風牽出瞼宜服黄芪湯及搽白蘞膏

黄芪湯

黄芪　充蔚子　人參　白茯苓

地骨皮　大黄　茸州

右白水煎食後服忌口

白蘞膏

白蘞　白芨　白芷　白蘞皮

加石決明　牛蒡子

右等分爲末用牛脂熬將末入内同熬成膏早晩以膏搽于瞼胞屡用有效

風牽喎斜外障



風牽喎斜者雖與風牽出瞼同然喎斜者脾胃虚房事不節脾胃有毒液不安亦或醉飽坐臥當風貪凉左右忽受風牽喎斜眼中亦痒時々擷動其眼血絲四起瞳仁不開大視物濛々甚至半身不遂治法急用摩風膏摩擦面部更以割沙㫒將所患風牽一邊手臂通割或遍身亦可割一月一遍用大磁青碗搗碎入磁石多寡捜麪糊爲餅烘熱貼面對㒵一邊左喎貼右右喎貼左貼至扯

口眼端正其藥取起又可灸頰車耳門穴開口取之太陽人中承漿喎左灸右喎右灸左近患易治若患經年難治宜服羚羊角飲及攻風敗毒散又擦摩風膏

羚羊角飲　方載前棗花內障條下

攻風敗毒散　藁本　芫花　羌活　防風

川烏　艸烏　山烏豆　骨碎補

右向水煎食後服

摩風膏　當歸　川芎　白芷　防風

細辛　香附　木香　赤芍　肉桂

骨碎補　没藥

右用猪脂或牛脂或鵝脂入黃臘熬膏用

被物撞破外障



被物撞破者並無所患病有所因者此外因也全然無事誤被撞破或打着或磕着或跌着傷損胞瞼積血紫青撞破向仁傷其硬殼此不能爲害惟撞破黃仁風輪血灌瞳仁與水輪混雜爲害控痛惡腫忍澁難開治法服以酒調散熨以葱艾或搗爛生地黃作餅烘熱貼之一日一換以散其血如無生地黃可

用芙蓉根割去帶泥粗皮用白皮搗爛烘熱貼之亦可若眼眶青黒搗羅蔔宜將息避風忌口動風動血之物及諸般血肉莫喫新撞易治若久撞血滯不散無疼痛則難治也宜服除風湯當歸活血散壓熱飲子

除風湯　方載前臉生風粟外障條下

當歸活血湯　當歸　赤芍　川芎　牛膝
紫蘇　生地黄　烏豆　蒲黄　桂心
乳香　没藥
右白水煎酒起碗食後服

壓熱飲子
犀角　大黄　知母　白茯
麥門冬　甘草　人參　生地　歸鬚
赤芍　蒺藜　紅花　牛膝　香附
右白水煎飯後服

撞刺生翳外障



被物撞刺生翳者與撞破一理然刺則被竹木簽刺痕傷損血灌瀝遂生血翳磣澁淚出紅筋滿目此翳外傷與患生翳不同患眼者五臟六腑之毒發出有根病也刺傷者外傷也與內無預治法與前症同但一七之後痕變成翳可用

輕丹少吹點忌淫慾嗔怒須避風將息若失調治漬
痛發腫傷於風輪血流入井中清濁相鬪釀成大患
致於傷睛或至瞎進無治法也宜服退翳散。充蔚子
散退熱散

退翳散
五味子　人參　玄參　白茯　黃芪
羌活　細辛　車前子
右白水煎食後服

充蔚子散
充蔚子　防風　川芎　玄參
桔梗　桑白　知母　藁本　白芷
細辛　如熱甚加硝黃

右白水煎食後服
退熱飲　方載前瞼生風粟外障條下

血灌瞳仁外障



血灌瞳仁者因毒血灌入金井瞳仁水內也猶如洪水流入井中之狀清濁相混時〻痛澁紅光滿目視物濛〻如隔紗綃看物若烟霧中然先患一眼後乃相牽俱患此症有三肝病血熱月積月累灌入瞳仁血凝入水關乎肝腎二經病也此血難退撞破之血鮮而熱灌之雖甚退之亦速又有鬪金針失手撥著

黃仁亦有血灌瞳仁舉此三症治法頗同宜服大黃當歸散沒藥散墜血明目丸前被物撞破及撞刺生翳并血灌瞳仁皆可服此三藥其効甚大或生地黃芙蓉根搗爛烘熱貼三症通可用或葱艾熨法俱可用醫理可方可圓不可拘宜服大黃當歸散麥門冬湯沒藥散墜血明月丸

大黃當歸散　川芎（各一兩）　大黃　黃芩

赤芍　杏仁（各五錢）

右爲末每服三錢加薄荷七葉同煎空心溫服

麥門冬湯　麥門冬（去心）　細辛　枯芩（酒洗）　桔梗

玄參（各八分）　大黃　朴硝（各五分）

右水煎朴硝化清食後溫服

沒藥散　沒藥　血竭　大黃　朴硝

右爲末茶調或酒亦可

墜血明目丸　石決明　川芎　五味子

知母　山藥　細辛　人參　歸鬚

赤芍　生地　牛膝　蒺藜

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服四十九丸酒下

黑翳如珠外障



黑翳如珠者肝腎俱勞七情鬱結之人毒氣攻冲熱極淚出難開疼痛甚至水輪突起黑翳如豆如珠大小不定攢起眼胞磣澁疼人眼睛難以運動寢食不安先患一眼後乃相牽俱損治法用小鋒針逐个橫穿破其黑翳中有惡水流出即平每若拾芥瞬息安痊眼即能開設若不諳此療服涼劑點涼藥安能取効小兒如此患者多是痘眼其翳起來突或如小香菰之狀不宜針其治法載在後小兒痘傷眼外障條下若前論針破翳根更宜用淡丹藥吹點消磨翳根宜服羚羊角飲。酒調洗肝散。補腎丸

羚羊角飲　方載前棗花內障條下

酒調洗肝散　桔梗　玄參　知母

梔子　大黃　朴硝

右爲末每服二錢溫老酒調下

補腎丸　方載偃月翳內障條下

蟹睛疼痛外障



蟹睛疼痛者與黑翳同症起於瞳仁然黑翳者肝腎之病五臟熱毒所攻致令烏睛上黑翳突起如豆如珠蟹睛者其翳起占瞳仁翳根小而蒂大此乃膽膈之病膈中壅毒膽氣伏熱赤澁淚出疼痛難開怕日羞明其翳將發尖高如蟹眼形狀治法同前症用小鋒針針出惡水流盡即平吹點以淡丹藥消其翳根但所服不同前症宜瀉肝補腎之劑服之宜服瀉肝散。退熱飲。酒調洗肝散。滋腎丸

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條下

酒調洗肝散　方載前黑翳如珠外障條下

退熱飲　方載前瞼生風粟外障條下

旋螺突起外障



旋螺突起者熱積於肝膽毒壅於膈間冲攻睛珠疼痛中央瞳仁漸々變青白色忽然突起血絲纏遶此乃風輪水輪二家併熱旋起突狀如螺尾遂號旋螺突症治法宜用陰二陽四丹藥吹點或調蟮魚血點突處又方用白鳳屎如糠

稀的夜卧將以鴨翎柚搽抹於突處夜夜如是以毒攻毒之物熬去而効驗矣若年久須用針對瞳仁中央針入半分放出惡水此乃取平之効須用藥封保養避風忌口十數月可也宜服瀉肝散。退熱飲捜風湯。補腎丸

瀉肝散　方載前天行赤眼外障條下

退熱飲　方載前臉生風粟外障條下

捜風湯　防風　白芷　細辛　羌活

赤芍　茺蔚子　薄荷　。五味子　菊花

荊芥　玄參　大黃　朴硝

右向水煎食後服

補腎丸　方載前圓翳內障條下

突起睛高外障

突起睛高者險峻利害之症也此前旋螺突大不少畔矣皆因五臟毒風所蘊熱極而上衝眼者內屬五臟外現五輪五臟之氣毒攻五輪瞳仁突起麻木疼痛汪汪淚出病勢洶湧卒暴之變莫測非精於龍樹之奧旨不能措手全功諺云眼不醫不瞎正此謂也苟非其人殆有甚焉非惟無益而反害之治法揚湯止

沸莫若去薪急投酒調散酒煎散退五臓之毒熱搗葱艾熨五輪之突起消除疼痛洗以向並細辛當歸蒼朮麻黄防風羌活末可便點藥宜忌口重醒將息避風治若稍遲或膿或腔或突出一寸高者至共之際須鋒針針出惡水痛方止睛高雖平亦無光之効也宜酒調散酒煎散蟬花散服之

酒調散　槐花（炒）　蛤粉　防風　山梔

牛蒡子（各二兩）

右為末每服二錢食後酒調下

酒煎散　方載前暴露赤眼外障條下

蟬花散　羌活　獨活　桑白皮　黄芩

谷精艸　川芎　細辛　石膏　荊芥

蒺藜　蔓荊子　車前子　牛蒡子　桂枝

右白水煎食後服

秘傳眼科全書巻之四終