眼科摘要　一

富士川文庫
496.2
Ga-2
1

F
カ-84

8冊
496.2
Ga-2
1
No.881

慶應二年丁卯孟春禀准

佐藤舜海閲
倉次元意譯

眼科摘要

初編

臨湖山房藏

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月14日
富士川文庫
3167

眼科摘要序

凡天下之事無大小必有其要焉故人不知其要豈能有為哉余見方今之醫風率多以眼科為小技置之度外矣殊不知人身百體其尤為貴者眼也故其

部雖小製造極精感應極靈此其病之多所以倍于他病也是故為醫者不可以不細心講求此學以立之良法也而皆反忽之可勝歎哉余嘗閲吾邦之眼科書自眼中之部位各局之功用至諸症之病理療法之利害曾無一語之親切適實者故其處方亦至於以藥試病冝矣為其所誤極多也吾友倉次元意用意眼科久矣一日發憤曰凡所貴于人身者莫如眼矣豈可

以忽之哉於是譯普魯士人謷湼屏遍尓所著之書題曰眼科摘要將公之于世来請序於余蓋此書為在彼紀元千八百六十年所著云余嘗遊長崎得之和蘭人朋百者手寫以齋歸而

未及譯之而今元意乃既譯之矣比之吾邦眼科書自夫眼中之部位功用至其病理療法其論簡而其理確固不可同日而語也余乃謂元意曰偉哉子之志也如子之於醫則可謂知要

者矣嗚呼此書一出而醫風果一變矣則實濟世之賜也此不可以不一言也明治二年己巳正月佐藤尚中識

眼科摘要凡例

此書ハ和蘭第二等醫官兼海軍衛生督朋百般默尓埵兒法尓篤氏曩ニ招ニ應シテ嵜陽ニ在ルノ日生徒ヲ教喩スルタメニ普魯士ノ醫官警揑屏遍尓氏著ス所ノ眼科書ニシテ即チ彼記元一千八百六十年鏤行スル所ノ書ニ據テ繁ヲ去リ要ヲ摘ミ加ルニ自家特得ノ説ヲ以テス此書ヤ實ニ彼ノ邦醫道變革後ノ説ニ基キ實驗ヲ宗トシ論辨セラレシ眼科醫範ナリ初學ノ者舊套ヲ脱シ此書ニ就テ熟讀翫味セハ治術ヲ施スノ際ニ

當テ思ヒ半ハニ過ン

世ニ梓行スル所ノ眼科書其數多シト雖氏議論多クハ確實ナラス此術ニ於テ一モ裨益アルモノナシ唯杉田先生譯述スル所ノ眼科新書アリ然レ氏是レモ亦醫道變革以前ノ著ニ〆議論並ニ其藥物ニ至テハ大ニ徑庭スル所アリ依テ顧フニ余カ如キ丁字ナキ者ノ爲メニ譯述シ梓ニ奚シテ朋百氏ノ賜ヲ廣ク同嗅ノ者ニ頒テ發明スル所アラシメント欲ス敢テ大方ノ看ニ具ヘントニハ非ス

余ヤ元來文字ニ慣ハス故ニ譯文ハ拙劣ナリト雖氏勉メテ文意通シ易クシテ原文ノ意味ヲ失ハサルヲ宗トス然レ氏余カ淺學誤譯モ亦タ少ナカラス毫釐ノ差千里ノ誤リヲ至スヲ懼ル故ニ僚友舜海佐藤君ニ乞テ其誤譯ヲ訂ス行文ノ如キハ余カ淺學如何トモシ難シ乞看官此文ノ拙ナルヲ以テ此書ヲ排スル勿レ

本文ノ下ニ二行ニ補注ヲ加ヘシハ本注ナリ又タ意ノ足ラサルヲ補ハンカタメニ余カ管見ヲ加ヘシ所モアリ夫レハ〇ヲ冒ラシテ本註ナラ

ザルヲ標ス

時刻ハ凡テ彼邦ニ従ヒ書中云フ所ノ一時ハ晝夜平等時ノ一時ニシテ即チ我平等時ノ半時ナリ其一時ヲ六十分シタルヲ分ト譯ス分ヲ復タ六十分シタルヲ鈔ト譯ス混スルヿ勿レ秤量ハ凡テ先輩定ル所ノ字様ニ従フ但シ丂ハ亐ト錯誤シ易キヲ以テ戔ト譯ス病名モ亦タ先輩ノ譯例ニ従ヒ西醫略論ノ病名ヲ襲用スル所モアリ晩近ノ發明ニ出ル病名ハ敢テ猥リニ譯名ヲ下サス皆原名ヲ襲用シテ以テ来哲ノ譯定ヲ俟ツ

明治記元歳在戊辰十二月

佐倉　倉次元意誌

眼科摘要 總目録

巻之一
眼疾總論
　治法總論　眼疾經過　眼疾識別
　轉歸　豫後　原因　遺傳素質
　診察法
藥劑總範
　不可量物　乾温　光輝　越列幾的兒
　氣類　蒸氣　濕香竄蒸氣　温水蒸氣
　滴流物　揮發眼水　温水　冷水　寒水
　　氷雪

眼水（點眼水　刷眼水）
眼蒸法　眼浴法
稠厚物（琶布　糊劑）
眼膏　眼散　眼硬膏
乾腐蝕藥

卷之二

血管系統過度病（總論）
血積病（眼瞼血積　結膜血積　角膜血積　強膜血積　紅彩血積）
溢血病（總論　出血轉移　眼瞼出血　淚器出血　眼窩內出血　強膜與結膜之間出血　蜂窠織出血　角膜出血　眼室出血　水晶體硝子體中出血　強膜脉絡膜出血　網膜與硝子體間出血）
自血液所分泌之疾病
水液病（總論　眼瞼浮腫　結膜下溢水　眼室溢水　水晶囊水腫　硝子液小房中非常水積　脉絡膜水腫　全眼水腫）
粘液流出病（結膜淋　老人淋　淚囊淋）

卷之三

眼器焮衝病（總論）
各異焮衝病
眼瞼焮衝（眼瞼表皮焮衝　因皮膚之瘡痕醜形致眼瞼外反者　眼瞼破裂　兔眼　上瞼下垂　眼瞼愈合　壞死）

眼瞼蜂窠織焮衝
眼瞼組織焮衝（內眥焮衝）
眼瞼血瘍
眼瞼瘍
眼窩內蜂窠織及骨衣焮衝
睫毛根焮衝（睫毛脫落　潰瘍　眼瞼胼胝瘡　睫毛內反）
粟粒腫（炭疽）
メイボーム核焮衝
淚阜焮衝（淚阜消亡　淚阜肥大）
淚核焮衝（淚核硬結　淚核漏）

淚囊焮衝（粘液流出　淚囊淚道狹隘　淚囊弛緩水腫　淚囊淚管愈着　淚囊瘡　內外淚囊漏　淚核弛緩　淚點愈合）
眼筋及筋衣焮衝

卷之四

眼球結膜焮衝（診識　解散　血管廣大　垂簾翳　眼球結膜潰瘍　結膜軟化　焮衝滲出產物　結膜水疱及膿疱　結膜下蜂窠織中純水滲出　結膜恣肉膿汁泌別或粿粒狀結膜焮衝合併　蜂窠織新生　贅肉肉腫　結節腫及軟骨腫　眼翼　眼瞼眼球愈合　結膜色素新生　角膜之結膜曇暗　結膜枯燥及剝脫　眼瞼內反　。痙攣性內反　麻痺樣內反　。成形內反　眼瞼外反　。膜樣焮衝外反　。老人

外反　因他因外反　一部外反

卷之五

強膜炊衝（水様滲出　強膜化膿及脫垂　強膜軟化膨脹突出　強膜硬結稠厚　強膜創）

角膜炊衝（疹状角膜炊衝　蜜翳　角膜實質炊衝兼滲出物者　冐寒後角膜炊衝　角膜後面致滲出物者）

角膜潰瘍（單越毘篤粒母剥脫　陷凹潰瘍　膿瘍　角膜軟化及壊死）

角膜曇暗（角膜後面曇暗　角膜組織曇暗　天稟症　老人症　滲出物曇暗　膿様曇暗及繼發症　瘢痕曇暗）

卷之六

角膜穿鑿

角膜貎僂屈

紅彩脫出

假角膜成形（全角膜化成　不全角膜化成　一部角膜化成）

角膜層損傷（損傷　到傷　刃傷　刀傷　異物　火傷）

角膜圭状突起

紅彩炊衝（慢性紅彩炊衝　冐寒紅彩炊衝　梅毒性紅彩炊衝）

瞳孔變形及數瞳孔（紅彩乏去）

卷之七

水晶體系統病
水晶體創
水晶體自脫
水晶體及囊焮衝
灰白內障翳（囊灰白內障翳　囊前面內障翳　囊後面內障翳）
（水晶囊中心內障翳　天稟內障翳　水晶體內障翳　皮様內障翳）
（後面皮様內障翳　前面皮様內障翳　核內障翳　全體水晶體內障翳）
（水晶囊水晶體內障翳　內障翳合併症　內障翳識別）
硝子體病
硝子體焮衝

硝子體水腫
硝子體軟化
硝子體曇暗
網膜病
網膜充血
網膜焮衝（網膜中風　網膜髓海綿腫　網膜刺戟增進）
日盲（網膜刺衝機減衰　網膜一部症　網膜機能全亡）
夜盲
卷之八
脉絡膜及尾状展焮衝

脉絡膜血積（脉絡膜焮衝　急性脉絡膜焮衝　慢性脉絡膜焮衝
脉絡膜出血　脉絡膜水腫　色素消亡）
尾状展焮衝
涙器病（總論）
涙核焮衝
上眼瞼涙囊腫
涙核瘤
涙囊焮衝
涙囊漏
涙點涙囊鎖閉

涙管息肉
涙阜腫
眼球病
眼球創
全眼焮衝
眼球漏

卷之九　補説

内障翳鍼術圖説
造假瞳孔圖説

眼科摘要總目録了

眼科摘要卷一目錄

眼疾總論（治法總論　眼疾經過　眼疾識別　轉歸　豫後　原因）
遺傳素質　診察法

藥劑總範
不可量物　乾温　光輝　越列幾的兒
氣類　蒸氣　濕香竄蒸氣　温水蒸氣
滴流物（揮發眼水　氷雪）温水　冷水寒水
眼水　點眼水　刷眼水
眼蒸法　眼浴法
稠厚物　琶布　糊劑
眼膏　眼散　眼硬膏
乾腐蝕藥

卷之二

血管系統過度病
血積病（眼瞼血積　結膜血積　角膜血積　強膜血積　紅彩血積）
溢血病（總論　出血轉移　眼瞼出血　淚器出血　眼窩内出血）
（強膜與脉絡膜之間出血　蜂窠織出血　角膜出血　眼室出血）
（水晶體硝子體中出血　強膜脉絡膜出血及網膜與硝子體之間出血）
自血液所分泌之疾病
水溢病（總論　眼瞼浮腫　結膜下溢水　眼室溢水　水晶囊水腫）

（硝子液小房中非常水積、脉絡膜水腫　全眼水腫）
粘液流出病（結膜淋　老人淋　淚囊淋）

卷之二

眼器焮衝病（總論　各異焮衝病）
眼瞼焮衝（眼瞼表皮焮衝　因皮膚瘡痕醜形致眼瞼外反者　眼瞼破裂　兎眼　上瞼下垂　眼瞼愈合　壞死）
眼瞼蜂窠織焮衝
眼瞼組織焮衝（內眥焮衝）
眼瞼血瘍
眼瞼瘍
眼窩內蜂窠織及骨衣焮衝
睫毛根焮衝（睫毛脫落　潰瘍　眼瞼胼胝瘡　睫毛內反）
粟粒腫（炭疽）
メーボーム核焮衝
淚阜焮衝（淚阜消乏　淚阜肥大）
淚核焮衝（淚核硬結　淚核漏）
淚囊焮衝（粘液流出　淚囊淚道狹隘　淚囊弛緩水腫　淚囊淚管愈
着　淚囊瘡　內外淚囊漏　淚核弛緩　淚點愈合）
眼筋及筋衣焮衝

眼科撮要卷一目録　了

眼科摘要巻之一

荷蘭　朋百般黙兒埵兒法爾篤鈔

佐藤舜海　閲

佐倉　倉次元意　譯

眼疾總論

眼球ハ組織錯綜シテナル而メ其ノ組織ノ異ナルニ従テ病状モ亦多端ナリ且ツ眼球ハ全體ノ總組織ヲ具フル故ニ一切ノ病痾ヲ一小區中ニ顯ハスモノナリ○凡ソ眼疾ハ諸國通シテ患者多シト雖𪜈日本ニ於テハ特ニ甚シ故吾レ殊

ニ眼病ノ治法篇ヲ論セントス

光輝ノ眼ニ感入スルノ理ハ既ニ自然究理學中ニ於テ是ヲ論セリ而メ眼疾ヲ論スルニハ先ツ解剖學病理學ヲ論セスハ非ス若シ是レヲ知ラサレハ眼球ノ疾病ヲ明ムルヿアタワス此以テ是等ノ諸學モ亦タ既ニ論載セリ宜シク其書ニ就テ學フベシ、

諸國總テ眼疾アリ。是レヲ佗病ニ比較スルニ。病者百人ニシテ五人ハ眼病ナリ。但シ天行眼ハ此例ニ非ス日本ニ在テハ。余カ比較ニ依テ考ルニ、病者百人ニシテ、十三人、十四人ハ眼病ナリ、男子ハ。婦人ニ比スレハ。眼病ニ係ル素質頗ル大ナリ。歐羅巴人ハ。是レニ係ル素質ハ。皮膚白色ニシテ光澤アリ。髮色淡ク。瞳孔青白ナリ。日本ニ在テハ。是等ノ狀態ヲ具フルヿ少キカ故ニ、此類ヲ以テ推シ難シトス、

年紀ニ係ル素質。

眼病ノ素質ハ既ニ分娩ヨリ十歳ノ間ニアリ。就中分娩ヨリ半歳ノ間頗ル甚シ。則チ天稟ノ眼疾、搐搦ニ因テ生スル斜眼等ノ如シ。半歳ヨリ一歳

ノ間ニハ、素質稍減ス、期年ヨリ二歳ノ際ニハ、「スコルヒウセ」毒發動スルヲ以テ眼疾ノ素質頗ル増進ス。第二歳ヨリ。十歳ノ際ニ至テハ其因漸ク減ス。情慾發動ノ際ハ。スコルヒウセ。再ヒ著ク増進ス。（十五歳ヨリ二十歳ノ際）是レニ由テ眼疾ノ素質モ亦タ従テ著ク増進ス。二十歳ヨリ五十歳ノ際ハ。則チスコルヒウセ減退ノ時期トス。然レトモ此ノ時ニ當テ聖京佝僂麻質血積黒障眼、小腹充血ヨリ發スル視力減衰。多ク發露ス。五十歳ヨリ。再ヒ眼疾ノ素質増進ス。殊ニ痛風眼ハ、六十歳ニ至テ太甚シク。七十歳及ヒ七十歳以上ハ漸ク減ス。

組織ニ係ル素質

凡テ焮衝病ハ、結膜ニ頗ル感ス、是ヲ比較スルニ、眼球一切ノ眼焮衝ハ、百人ニシテ、其三分餘ハ結膜ノ焮衝ナリ。而メ核ノ焮衝是レニ次キ。毛様靭帯焮衝、角膜焮衝強膜焮衝次第ス。其他ノ組織ハ、焮衝ニ罹ルヿ少シ。

焮衝ニ非ル疾病、眼球ノ各器ヲ襲フニ多種アリ。則チ次第シテ左ニ羅列ス。

灰白内障眼斜視、網膜麻痺、（一部アリ全部アリ）急發近視眼。

知覺機過度、即チ刺衝機過度、知覺機減衰等ナリ。然レ𪜈神經衣、特ニ病ニ罹ルノ素質ヲ有ス。」

眼病一組織ヨリ他組織ニ轉移スル所以ノ理ヲ論ス

リカツト、（人名）始メテ組織ノ交感力ニ由テ、病ヲ轉輸セシムルト云ヘリ、然レ𪜈晩近、精密ノ實驗ニ由テ考ルニ然ラス、凡ソ感傷ノ抵傳ハ、有機化育ノ、相通スルニ由ルノ理ヲ以テ說クヘシト云ヘリラテ」、及ヒ「リクテ」、（共ニ人名）ハ疾病ノ一組織ヨリ、他組織ニ抵傳スル、其理明ラカナラサル者アリト。

如何ナレハ不慮ノ状態ニ由テ起ルモノアレハナリ

血積血欝焮衝及ヒ其他ノ疾病其原ヲ脈管系統ニ操ル者ハ其擴延ノ勢ヲ全ク微糸血管ニ藉ル者ナリ故ニ是等ノ疾病ハ血脈ノ行路ニ從テ蔓延シ微糸血管ノ際限ニマテ及ホス而メ是ヲ他器ニ抵傳スルニハ微糸血管ノ接續ヨリシテ多ク及ホス者ナリ論ヘハ結膜ノ微糸血管系統ハ相連累スルヿ密ナル故ニ結膜ノ焮衝症ハ總テ速ニ其全部ニ蔓延スルナリ而メ他系ノ微糸血

管ヲ具スルノ部綴ヒ其結膜ニ接近スルト雖𪜈容易ク焮衝ヲ傳ヘス是ヲ論フルニ涙梜涙囊等ノ焮衝ハ結膜ニ傳ヘ難シ是レニ由テ之レヲ見レハ眼中ノ諸器一系ノ微糸血管相連累スル所ハ則チ焮衝抵傳シ易キ者トス

神經脈管ニ富ム所ハ感傷ニ罹ルヿ尤甚シ

第一　眼病ノ經過際限

總テ眼疾ハ速ニ極度ニ昇リ是レニ治法ヲ加ヘサレハ立地ニ慢性ニ轉スル者ナリ體病（○水晶體及囊曇暗等ノ如シ）多クハ慢性ノ者トス抑々急慢ノ性ハ年齡ニ關係スル者少シ、只損傷ノ劇易ト、身體ノ性質トニ關係スル者ナリ、外傷（打撲創傷ノ類）深ク眼中ニ入ル者多クハ慢性ナリ只其外表ノミヲ侵ス者ハ速ニ經過ス惡液質ノ人焮衝ヲ患レハ、多クハ慢性ニ屬ス、此症ハ殊ニ適當ノ治法ヲ要スル者ナリ、凡ソ體格既ニ惡液質ニ變スル者眼病ヲ患ヒ易キハ、世間頻ル多ク見ル所ノ一症トス。

第二　眼疾識別

眼疾ヲ能ク鑒定スルニハ、眼疾特異性ヲ知ルニアリ、而メ細愼シテ下ニ擧ル所ノ諸件ニ注意ス

ヘシ。

其一　際限ニアリ。殊ニ全身ノ感傷ノ度ニ關係シ、又眼中ノ疾病ノ劇易ト、疾病性トニ關係ス而メ疾病ノ特異性ハ是レニ關係スルヿ少レナリ。

其二　發歇ノ時期ニアリ。世人多クハ、眼疾發作ノ時期ヲ以テ、其特異性ヲ決斷セリ、然レ𪜈實驗ニ由テ見ルニ然ラス。病順序ヲ發歇スル者ト雖𪜈、此ノ一事ヲ以テ、病ノ特異性ヲ決斷スルニ足ラス。

其三　分泌物ニアリ。分泌物ハ、淚涕、膿汁、粘液、及ヒエピトリユムセルトニ」相合シテ出ル者ナリ。只病ニ罹ル所ノ處ト、時期ニ從テ、其混合異ナルノミ。蓋シ特異性ニ由テ異ル者ニ非ス。故ニ分泌物ヲ以テハ、焮衝ノ性ヲ決シ難シ。

其四　焮衝部ノ赤色ニアリ。凡ソ腺病小腹患疝痛風等ニ由テ發スル焮衝ハ、其患部ヲ診スルニ帶青色ヲ顯ス始メ現サヽルモノト雖𪜈遂ニ青色ヲ帶フ。聖京倔僂麻質外傷ニ由テ起ル焮衝ハ、赤色中黄色ノ「チント」（酒名）色ヲ帶フ、然レ𪜈確實ナラストス。實ニ諸ノ慢性眼焮衝ハ、多クハ青色ヲ顯

セハナリ。

其五 羞明ニアリ。羞明ハ。各種ノ劇甚眼焮衝ニ發ス。殊ニ結膜。紅彩。網膜。ノ焮衝ニ於テ甚タシ。其原因。ハ蓋シ網膜ノ機能亢進スルニ由リ。其顯症トナル者ナリ。而メ多クハ眼瞼痙攣ヲ併發ス。凡ソ此ノ羞明ヲ以テ。神經ノ病ヲ受ル。特異性ヲ決斷スルヿ能ハス。然レ氏「リユステ」（人名）ノ說ニ由レハ。羞明ヲ以テ各異性ヲ辨別セリト云ヘリ。凡ソ羞明ノ現ルヽ眼疾ハ。瘰癧性。痛風性。僂麻質性ニ於テ頻ル見ル所ナリ。殊ニ是等ノ諸性焮衝留連シ。組織中既ニ滲出物ヲ致スニ於テハ。冣モ見ル所ノ者トス。

其六 病所及ヒ自覺症ノ性ヲ辨ス病者多ク自覺症ノ適當ナルヿヲ。他人ニ向テ訴ルヿ能ハズ。小兒痴愚ノ人ハ殊ニ然リ。同病ヲ訴ルモ。人々其訴ル所ノ形狀ニ差アルノミナラス。尚且ツ同病。其名目ヲ異ニスル所アリ。又或ハ眼病ノ疼痛アル者。其疼痛ヲ訴ルニモ同シキヿ能ハス。是レヲ以テ徵候ヲ確斷スルニ足ラストナス。然レ氏凡ソ疼痛ニ由テ。病性ヲ決斷スルニ。左ノ徵アリ云

ク、「スコルヒウセ」眼焮衝ニハ、其疼ミ刺スカ如キヲ覺ヘ、痛風性眼焮衝ニハ、上眼窩上ニ、破裂スルカ如キ疼ミヲ覺ヘ、僂麻質性眼焮衝ニハ、眼中破裂スルカ如キ疼ミヲ覺ヘ、聖京倔性眼焮衝ニハ、眼中灼熱ヲ覺フ、是レ之レヲ一般ノ軌則トス

其七　努張セル脉管ノ行路、分岐トヲ以テ其特異性ヲ確斷スルト云說アリ、然レモ皆當中ノ說ヲ得ス、殊ニ年齡ニ由テ各異ルコアレハナリ、多クハ億斷ニ出ツ、「リュツテ」人名ノ試驗ニ依レハ、眼焮衝、血脈ノ蔓延スルハ、殊ニ其焮衝ノ舊新ニ關

係シ、病原ノ劇易ニ關係シ、又タ眼中病原ノ舍宿スル部ノ貴易ニ關係シテ異ル者ナリト云フ、此編ニ於テ特ニ論スヘキ者ハ、所謂アブトミナール脈管ナリ、此脈ハ、微系血管努張シテ、或ハ細ク、或ハ太ク、靜脈狀ニ屈曲シテ、其中黯黑色ノ血ヲ充塡ス、則チ靜脈正徵ニシテ、結膜ノ諸所ニ現レ、無數ノ小屈曲ヲ致シ、遂ニ角膜ニ近接ス、而メ角膜ノ周緣ニ於テ、數枝ニ岐レ、其末端、他脈ト交ル者アリ、或ハ其末端、消散シテ痕跡ヲ見サル者アリ、或ハ短太ノ末ニ了ル者アリ、如此靜脈努張ヲ

以テ角膜ヲ圍繞セラル、凡ソ此ノ如キ靜脈努張ヲ顯シテ、而メ焮衝ヲ生セサル者ハ、動モスレハ焮衝ヲ誘發シ易ク、輕微ノ外因アレハ、忽チ結膜焮衝ヲ生出ス、而メ此ノアブドミナール脈ノ外、更ニ微糸血管ヲ見ルヿアリ、然レトモアブドミナール脈ハ、努張甚シク、其色黯黒ナルヲ以テ、是レヲ辨別スヘシ、眼ノ此脈ヲ現ス者ハ、靜脈性トナスヘシ、焮衝止ムノ後モ、此脈尚ヲ治セスシテ留連シ、収斂藥ヲ用ヒテ始メテ治スル者アリ、或ハ再新ノ急性焮衝ヲ待テ治スル者アリ、此脈ノ現

ルヽ原因ヲ索ルニ、小腹靜脉多血ヲ病ム、體格ニ基ツクヿアリ、又タ靜脉系統ノ、一般弛緩スルニ由テ、繼發スル者アリ、而メ其脈新生ノ者ニ非ス、嘗テ有ル所ノ脈管、非常ニ膨大シ、其内ニ靜脈血ヲ逼迫スルニ由テ顯ルヽモノナリ、而メ其逼迫ハ頭蓋中、血積ニ由テ起ル者トス、

結膜中、焮衝ヲ生スル脉管、終ル所ノ處ニ於テ泡疹ヲ生ス、是レ蓋シ微糸管、互ニ鋭角ヲナシテ、合接スル所ナレハナリ、然レトモ此ノ泡疹ヲ以テ、眼焮衝ノ、特異性ヲ確斷スルニ足ラス、

其八、潰瘍ヲ生スルモ亦タ然リ。微糸管、相連合スル所ニ於テ生ス。凡ソ潰瘍ハ、泡疹ヨリ生シ、或ハ自箇特發潰瘍産物ヨリ生シ、或ハ腐蝕劑ノ誤用ニ由テ生シ、或ハ酷厲物ノ浸出ニ由テ生ス。而メ其潰瘍ノ形狀、經過、病性、一様ナラス。且ツ持異性ヲ確斷スルニ足ラス。

其九 身體ト、同質ノ組織ハ、身體ノ其質ニ疾病ヲ受レハ、則チ眼中ノ同質モ、亦同病ニ罹リ易シ。然レモ身體ニ感スル所ノ病因、是レヲ眼中ニ及ホスニハ、殊ニ結膜ニ顯ル、者トス。凡ソ結膜ハ、

頗ル諸性ノ感傷ヲ受ケ易ク、睫毛根、メーボーム腺是レニ次ク。此二器ハ痛風聖京偏性ニ頗ル感ス。紅彩ハ、痛風ト僂麻質ニ感ス。而メ紅彩ノ形狀色澤ヲ以テ、病性ヲ確斷スルコト能ハス。其次ニ患ル者ハ、強膜ト、水様液囊トナリ。此二器モ亦タ諸病因ニ由テ感傷セラル、ト雖モ、多クハ僂麻質、「スコルヒロシス」ト痛風トナリ。病者ノ年齢ヲ以テハ、特異病性ト、新生ノ原因トヲ決斷シ難シ。若シ夫レ特異性ヲ、年齢ニ由テ定メント欲スレハ、其病者ノ體格ヲ、詳明ニ審斷ス

ルニ如カス、體格ハ年齢ニ由テ、或ハ旺盛シ、或ハ萎衰スルヿアレハナリ、

轉歸、豫後、

轉歸、豫後ヲ論スルニハ、組織變常ニ關係スル、眼病轉歸ノ近因、如何ト理ニ由テ同シカラサルヤヲ知ルニアリ、

眼疾、如何ノ組織ヲ感傷スルヿ多キヤヲ比較シ、且ツ其轉歸ヲ定ムルニハ、組織ノ病ニ係ルノ多少ニ注意シ、病ム所多ケレハ、則チ轉歸モ亦タ從テ多クシテ遺病トナリ、遂ニ組織上ニ變態ヲ顯ス尚更ニ組織性ノ外ニ病原ノ特異性アリテ以テ不慮ノ轉歸ヲ生出スルヿアリ又タ注意セスハ非ス「リエッテ」（人名）ノ試驗ニ由テ遺病ノ多少ヲ左ニ次第ス

其一　粘液漏出眼焮衝（頗ル大ヒナリ）

其二　痛風性眼焮衝

其三　腺病眼焮衝

其四　腺病兼聖京倔眼焮衝

其五　僂麻質性眼焮衝

其六　外傷眼焮衝

盖シ此比例ハ、險惡症ヲ生スルノ、次第ヲ以テ比例スルナリ、而メ其實ハ、皆ナ特異病原ヨリ来ル、尚且ツ眼疾ノ經過、或ハ急、或ハ慢ナル者ト、年齡トニ應シテ、轉歸、豫後ヲ定メスハ非ス、凡ソ急性眼焮衝ハ水液或ハ膿汁ヲ浸出シ、又タ多脉ノ潰瘍ニ、轉歸ヲ取ルヿ多ク、慢性眼焮衝ハ、虚弱潰瘍肥大、及ヒ硬結ニ轉歸ヲ取ルヿ多シ、此ヲ以テ是ヲ見レハ、遺病ヲ致ス所以ハ、此ノ諸件ニ關係スル也、總テ年齡ニ由テ、轉歸ヲ論スルニハ、其年期、素質ノ機能ク、機微、小ナルトキニ當テ、其素質ニ應スル所ノ疾病ハ、極メテ危險トスヘシ、故ニ遺病ヲ論スルヲ待タス、

眼疾ノ原因ヲ論ス

前章、已ニ眼病ノ素質ヲ論セリ、則チ採テ以テ此ニ參考スヘシ、

凡ソ眼科ニアリテハ、眼疾ヲ診スルニ當テ、冣モ注意スヘキノ一事アリ、則チ眼疾中、此ノ如キ顯症ハ、全身ノ感傷ニ關係シ、此ノ如キ現症ハ、全身ノ體格ニ關係シテ、以テ生出シ来ルト云フヿヲ辨別スルニアリ、此ノ診察ヲ明辨セサレハ、即チ

適當ノ治法ヲ施シ難ク且ツ緊要ノ事ニ係レハナリ、

又タ眼科醫士ハ只眼目ニノミ意ヲ注メテ可ナランヤ、宜ク同時ニ發スル他患ト、既往ノ疾病トニ至ルマテ、悉ク審察セスンハ非ス、凡ソ諸眼疾ハ、外傷ヨリ起ルヲ除ノ外ハ、四分シテ其三ハ殆ト他器他系ノ疾ヲ發動シテ、是レト關係スレハナリ、其内腺病ヲ合併スル者頗ル多ク、小腹多血ヲ合併スル者是レニ次キ、常習出血ノ沮塞痛風、僂麻質、又タ是ニ次キ、聖京偪、血液偪迫スル等ノ症ヲ合併スル者ハ、最モ少シトス、

又タ既往ノ體質ニ應スル疾病ヨリシテ、眼疾ノ病原ヲ致ス者アリ、則チ腺病尤モ多ク、小腹多血是レニ次キ、僂麻質聖京偪性、眼疾等ハ皆是レナリ、

眼ノ結膜ハ、殊ニ腺病ニ罹リ易キ素質ヲ具フ、故ニ腺病家ハ、動モスレハ結膜ニ病ヲ傳フ、而メ小腹多血ハ、屢々腺病ニ合併シ、終ニハ此兩症合併シテ、更ニ他病ヲ生出スルモノニシテ、殊ニ痛風ヲ生出ス、慢性皮病、屢々眼疾ノ原因トナル、然レ

氏皮膚ト眼器トノ感應ハ太タ微ナル者ニシテ、相關セサルカ如ク然リ。急慢兩性ノ皮疹、腺病性ヲ具フル者ハ、又タ太タ眼疾ヲ生出シ易シ。譬ヘハ痘瘡、痲疹、羅斯等ノ如シ。凡ソ是等ノ皮疹ノ發生ハ、眼疾ヲ誘出シ易ク、其腺病ヨリシテ眼疾ヲ萠生ス。夫レ小腹多血、及ヒ其繼發病ハ、如何ノ理ニ由テ、眼疾ノ原因トナリテ来ルヤ未タ究明スル能ハス。是レ盖シ小腹多血ノ性ヲ、今ニ至ルマテ知ルヿ能ハサレハナリ。驚風ハ頭中ニ多血灌漑ヲ生出シ、是レニ由テ眼病ノ原因トナルヿアリ。

遺傳素質

父母ノ遺傳、モ亦タ眼疾ノ原因トナル。故ニ其素質ト病症、父母ニ類似スル者妹ニ多シ。總テ同姓相嫁リ、情慾盛ナル時ニ於テ、其素質最モ太タシトス。

不虞ノ原因モ、亦タ多シト雖氏、多クハ是レヲ看過シ、或ハ之レヲ意トセサル者アリ。其是レニ属スル始原ハ、冐寒、器械様ノ損傷、傳染毒、光輝ノ變態、空氣ノ壓力不平等ナリ。

職業ニ由ル原因、
學者ハ固ヨリ論ナシ、其外國民眼病ニ罹リ易キハ殊ニ坐業ニシテ眼力ヲ使役スル者、及ヒ日光ヲ以テ業ヲ主トルモノ其他放逸ノ遊民飲食缺乏ノ小民又ハ眼疾ヲ誘出ス、

眼疾診察法

診察ハ勉メテ眼中ヲ鑒定スルニアリ、則チ病眼ヲ光輝ニ對セシムヘシ、若シ羞明アル者ハ、日光ノ英烈ヲ避ケ、是レヲ適宜ニ眼中ニ入レテ、以テ診察スヘシ、近今ニ至テハ眼ノ内部ヲ洞見スル

為ニ、諸様ノ眼鏡（オーグスピーゲル）ヲ具ヘリ、宜ク選用スヘシ、若シ内部ヲ審視セント欲セハ、豫メ莨菪ヲ滴シテ、瞳孔ヲ濶大セシメ、而メ肉眼、或ハ眼鏡ヲ用テ、諸部ヲ精細ニ鑒定スヘシ、水晶體系統ノ病ニハ、「サンソン」、（人名）ノ光輝試驗ヲ必用トス、殊ニ眼鏡ヲ用ルヲ良トス、凡ソ醫士、光輝ニ背テ立チ、病者ヲ光輝ニ對シテ坐セシメ、以テ光輝ヲ眼中ニ入レ、病者自ラ眼ヲ開テ、醫士ヲ目撃セシメ、爾後更ニ眼球ヲ運轉セシメ、遂ニハ醫士、自ラ眼瞼ヲ開テ、以テ仔細ニ診察スルナリ、蓋シ診察ノ際ハ、緩軟

ヲ貴フ、疎妄ヲ施スヲ禁ス、疎妄ナレハ、焮衝アル眼中更ニ刺衝セラルレハナリ、

診察時ニ當テ、特ニ注意スヘキハ紅彩ナリ、其眼瞼ヲ相開合交互シテ、以テ光線ノ紅彩ヲ刺衝スル、感動ノ輕重如何ヲ定ムヘシ、醫士總テ一切ノ諸件ヲ詳明ニ探索シテ、病者ヲ屢々診察スヘカラス、但シ試驗ヲ以テ其審症ヲ確斷スヘシ、尚ヲ診察時ニ當テ、遺妄スヘカラサルノ一事ハ、按察スルノ時壓迫ノタメニ眼中ヲ际強セサラシム、

此診察法終リテ、後チ病者ニ對シ、自覺症ヲ問ヒ、以テ審斷ヲ助クヘシ、則チ診察法ト、自覺症ト相應シテ、後チ治法ヲ立ルヲ宜シトス、

眼疾治法ノ總範

眼疾一般ノ主治トナスヘキ者ハ、眼中諸所ニ顯ル、所ノ、障碍物ヲ治平スルニアリ、即チ左ノ規範ヲ以テスヘシ、

其一 障碍ヲナス事件ト、病因ヲ勉メテ避ルニアリ、

其二 既ニ一旦障碍ヲ致ス者ハ、其病症ヲ勉メテ抑制スルニアリ、

其三眼疾ノ愈力ハ、極メテ微ナルヲ以テ、其力ヲ補助スルニアリ、

其四眼疾諸症、極メテ患害ヲ遺シ、以テ根治ヲ碍ル者ハ、是レヲ攻擊スルニアリ、

其五或ハ一旦生スル所ノ病症ニ乘シ、根治法ヲ施サシカタメニ、其勢ヲ增加セシムルヿアリ、或ハ增加スレハ、他部ヲ荒蕪スルノ恐レアルヲ以テ、其勢ヲ增加セシメスシテ、根治法ヲ施スヿアリ、

其六根治法ヲ行フヿ能ハサル症ニハ、姑息法ヲ要スルヿアリ、姑息法トハ何ソ、曰ク外感ヲ防禦スルニアリ、

其七兩眼、知覺敏ニシテ衰弱スル質、若クハ惡液質ノ人ニ在テ、眼病ヲ患レハ、再發ノ恐屢々是レアリ、保護術ヲ以テ之レヲ防クヘシ、又タ體格、惡液家ハ、日々ノ攝生ヲ愼ミ、其再發ヲ防クヘシ、然レ𪜈其法至テ多シ、醫士何ノ法ヲ採テ、是レニ應用シテ可ナルヤハ、此小冊中、略論スルヿ能ハス、只治法ヲ區別シテ、直達間達ノ二法ニ分ツ、其直達法ハ、直チニ眼中ニ觸レテ、

其効ヲ達スル者ナリ。眼疾ノ劇度ニハ、常ニ是レヲ用ルヲ要ス。効力頗ル猛烈ナルヲ以テ、謹愼シテ用ユヘシ。其間達法ハ、直チニ眼中ニ觸レスシテ眼ノ達隔ノ所ニ用ヒテ、眼中ニ變ヲ起サシメテ、以テ治效ヲ全フスル者ナリ。諭ヘハ改質劑ヲ、惡液質ニ用ルカ如ク、更ニ全身ニ轉覆ヲ至シ、以テ眼疾ヲ治スルノ効アル者モ。亦間達法ニ屬ス。

藥劑總範

第一 不可量物

甲 乾温

其効興奮シテ、血行ヲ進メ、且ツ分泌ト、組織ノ刺衝機ト、縮力トヲ增加ス。故ニ眼ノ生氣減衰スル者、麻痺、僂麻質、虛弱ノ潰瘍、慢性焮衝、及ヒ壞疽等ニ効アリ。是ヲ用ル法ハ、布巾ヲ煖メ、或ハ藥囊ヲ煖メ、眼上ニ貼スヘシ。又火熱、日熱共ニ用テ可ナリ。

乙 光輝

眼中ニハ、一種特異ノ刺戟アリテ、殊ニ網膜ニ達ス。故ニ眼中ノ機能、減少スル所ノ者ハ、光輝

奇驗ヲ奏ス、但シ之レヲ用ルニハ、刺衝機増減ノ狀態ニ應シテ、進退セスハ非ス、凡ソ刺衝機亢進スル者ニハ、日光ノ苛烈ヲ避ケ、青色或ハ緑色ノ眼鏡ヲ用ルヲ良トス、若シ刺衝機減スル者ニハ、日光ヲ直ナニ用ユヘシ、其減スルヿ稍劇キ者ハ、晴天白日ノ日光ヲ用ヒ、其尤モ劇キ者ニハ、燭火ヲ用ヒ、黒障眼ニ在テハ、日光ヲ見セシメ、其全治ヲ得ヘカラサル症ニハ、眼鏡ニテ日光ヲ聚メ、以テ是レヲ眼中ニ射入セシムヘシ、

丙越列幾爺兒

眼科ニ在テハ、至要ノ者トス、其効刺衝シテ、轉覆ノ効アリ、是レヲ用ルノ式ハ、消極（亞鉛ヨリ出ルモノ）ヲ、病所ニ接シ、以テ其機ヲ通スルナリ、凡ソ知覺鈍麻、刺衝鈍麻、網膜麻痺、又タ組織弛緩、脉管膨脹等ニ効アリ、消極ヲ直チニ病所ニ用ルレハ、神經痛ニ効アリ、則チ僂麻質痛ノ如シ、又タ痙攣、角膜翳、疼痛部、滲出物、及ヒ硬結等ヲ治ス、越氣（即チ越列幾的兒後皆之ニ倣ヘ）ヲ用ユ可ラサル症ハ、腦ノ髓損、急性血積ヲ兼ル者、腦焮衝、刺衝増加、骨

瘤ノ神經ヲ壓迫スル者、並ニ諸瘤等ナリ、又タ麻痺ノ一部猶知覺機亢進スル者ニ在テハ、特ニ是レヲ用ルニ當テ注意スヘシ、

越氣施行ノ療法ハ、「ロメチカ、（人名）發明スル所ノ、「エレキチスマグチート」ナリ、則チ其導子ヲ病所ニ接シテ、强弱ヲ適セシム、凡ソ初メ其力微弱ナラシメテ、漸々增加スルヲ要ス、

越氣ハ、角膜曇暗ニ効アル所以ハ、其機能ヲ興奮セシメテ、以テ新陳代謝ヲ進ルニアルヘシ、

灰白内障眼ニハ、越氣ヲ用ユ可ラス、若シ是レヲ用レハ、患者ヲシテ益々險惡ニ陷ラシメ、或ハ水晶體、全ク損敗セラル、ニ至ル者アリ、

第二　氣類

眼疾ニハ、炭酸瓦斯諳母尼亞瓦斯ヲ用ユ、炭酸ヲ含ム鑛泉ハ、通例多ク炭酸ヲ發スルヲ以テ効アリ、若シ此ノ鑛泉ナケレハ、舍密法ニ從テ、炭酸瓦斯ヲ開發セシムヘシ、夫レ結膜ノ疾病ハ、或ハ炭酸ヲ直チニ眼中ニ觸レシムルヿ、小半時ニシテ、一日ニ三回ヨリ、六回ナルヘシ、其他ハ眼疾ニモ、亦タ此法ヲ用ヒテ、甚タ奇効ア

ルヿアリ、

諳母尼亞ヲ行フニハ、疾眼ヲシテ諳母尼亞水ヲ貯ル、硝子瓶ノ口ニ接シテ、以テ其氣ニ觸レシムルナリ、或ハ生石灰、一分、硇砂末、二分、ノ調劑ヲ貼スルモ可ナリ、殊ニ麻痺症ニ効アリ、此劑刺戟ノ力猛ナルヲ以テ、施間永カルヘカラス、

第三　蒸氣

〔以〕香竄蒸氣

香竄蒸氣ハ、手ヲ以テ患眼ヲ遮弊シ、指間ヨリ其蒸氣ヲ眼中ニ受ケシムルナリ、若シ是レヲ越氣ト共ニ用ルレハ、其効頗ル偉ヒナリ、龍腦ヲ以テ行フニハ、布片ヲ煖メ、是レニ龍腦ヲ塗抹シ、以テ眼上ニ懸ルナリ、其効ハ、刺戟興奮シテ、眼中ノ血行ヲ催進セシム、此ヲ以テ給養機能ノ、麻痺スル者ト沈衰スル者、トニ用テ可ナリ、藥嚢ハ害アリ、其故ハ藥料眼球ヲ壓迫スルヿ、不平ニシテ且ツ眼中ヲ熱セシムルコト多ケレハナリ

〔呂〕濕香竄蒸氣

粗末ノ香竄藥ナリ。是レヲ皿中ニ盛リ。熱湯ヲ潑キ。微火ニ煖メ。以テ其氣ヲ眼中ニ受ケシムルナリ。是ヲ用ルニハ。漏斗ヲ蓋ヒ。其漏口ヨリ眼中ニ觸レシムルヲ良トス。若シ刺戟ノ効ヲ增加セシメント欲スルニハ。水ニ替ルニ酒ヲ以テスヘシ。神經麻痺ヲ兼ヌル。稠厚硬結ニ効アリ。

〔波〕温水蒸氣

其効。濕香竄蒸氣ニ同シ。只其異ル所ハ。弛緩軟化。分解。鎮靜。ノ効ヲ兼ヌルナリ。此以テ經久稠厚。硬結。及ヒ化膿ノ知覺機亢進ト。疼痛ヲ兼スル者ニ効アリ。

第四　滴流物

〔甲〕揮發眼水

眼瞼及ヒ眼圍ヲ洗濯シテ。刺戟興奮ノ効アル者ナリ。麻痺。及ヒ組織弛緩。殊ニ其症。老人ニ於ケル者ニハ〔ゲ〕符〔ム〕符殊ニ効アリ。揮發眼藥ニ。用ルモノ最モ多シト雖𪜈。其一二ヲ擧クレハ的列普油。硇砂揮發精。龍腦酒。硫酸亞的兒等ノ如シ。

乙　温水

其部ヲ清浄ニシ、且ツ弛緩、鎮静、鎮痛、ノ効アリ、故ニ眼筋疼痛ノタメニ、緊張シテ硬結シ、及ヒ膿汁ヲ分泌シテ眼瞼粘連スルモノニ効アリ。又タ蒸剤トナシテ用ユルモ可ナリ。

丙　冷水

施用ニ應シテ、其効差等アリ。

寒水蒸湯法ハ、温熱ヲ減シ、組織ノ縮力ヲ増シ、泌別ヲ制シ、知覺機ヲ抑制ス故ニ諸ノ焮衝、組織衰弱、弛緩、損傷、血積、出血、血液溢出、神經知覺

機亢進、神經痛、及ヒ羞明等ヲ治ス、

寒水　氷　雪

其効始メハ蒸湯ニ異ルヿナシト雖ヒ、反應ノ機ニ由テ、速ニ左ノ症ヲ繼發ス、即チ赤色、灼熱、分泌増加、生氣増進、等是ナリ、故ニ生氣ト分泌機ヲ増進セシメ、病ノ為メニ亢進スル、刺衝機ヲ制伏シ、且ツ刺戟ヲ習慣セシムルニハ、此法ヲ用ユ「フオーグドーシス」（即チ點滴法）其力頗ル強ク、刺戟ノ効ハ、灌流ノ高抵ニ應シテ差等アリ、此頗ル効アル者ハ、興奮、強壯ノ力ニアリ、此以テ

麻痺黒障眼、組織弛緩、反復焮衝等ヲ治ス、知覺亢進スル眼ニハ、微温湯ヲ以テ始メ、終リニ寒冷ニ移ルヲ良トス、

丁　眼水

罨貼法、射注、點滴トナシ是レヲ用フ、或ハ毛筆ヲ以テ塗抹スルモ可ナリ、凡ソ是ニ用ル者ハ、溶解水、浸汁、煎汁等ヲ寒温其度ニ適シテ、聽用ス、眼中ニ點滴スル後ハ、其部ヲ拭フテ清乾シ、烈風光輝ヲ避クヘシ、凡ソ眼水ハ、其用ルニ當テ、是ヲ濾過スルヲ要ス、然ラサレハ藥石ノ

分子、眼中ニ入リテ刺戟スレハナリ、

一　點眼水

刺戟スルヲ以テ新製ヲ用ユヘシ、用後五「ミニウト」間刺戟ノ留連スルヲ常トス、其餘時ニ至テ、尚ヲ止マサル者ハ、刺戟過ルノ候トナス、滴入後ハ、眼ヲ閉合セシム、滴入ハ謹慎シテ行フヘシ、一日三回ヨリ、四回ヲ度トナス、必ス一頓ニ多量ヲ製スヘカラス、若シ點眼水ヲ、射注法ニナシ行フニハ、一號ヨリ、三號マテヲ製スヘシ、射注法ハ、刺戟甚シ、故ニ結膜腫脹著キ者ニ

應ス、又淚器ノ慢性病ニモ應ス、淚器病ニハ、｢ベール（人名）ノ射注器ヲ用ユ、然レトモ今マ是レヲ用ル者稀ナリ、

〔二〕刷眼水

此法ハ、猛力ノ腐蝕劑ヲ以テ、眼中一所ニ限リテ行フ者ニ用ユ、故ニ小量ノ藥汁ヲ採リテ、一部ニ限リテ行ヒ、而メ是レヲ行フノ後、直チニ眼中ヲ洗フテ、其藥力ノ他部ヲ侵蝕スルヲ制スヘシ、凡ソ此法ハ刺戟全ク止ムニ非サレハ、反復シテ用ユルヲ許サス、故ニ數日ヲ經テ再ヒ行フヲ要ス、

〔三〕眼蒸法

殊ニ眼瞼眼緣ノ病、結膜病ニ於テ是レヲ用ユ、又タ分泌ノ乾燥ヲ防クニモ用ユ、蒸濕法ニハ、寒性アリ、熱性アリ、共ニ供用スヘシ、則チ布片ヲ藥汁ニ蘸シ、以テ眼上ニ貼スルナリ、

〔四〕眼浴法

硝子製ノ小盃小皿ヲ用ユ、皆眼形ニ適合スルモノヲ撰用スヘシ、

第五　稠厚物

天 琶布

其製、濕温ナル者、軟和ナル者、軟和、弛緩ノ効アリ、若シ是レニ他物ヲ配合スレハ、則チ各其効ヲ異ニス、通例化膿ヲ進メ、硬結ヲ軟化スルノ効ヲ專トス、故ニ人多クハ眼中ヲ弛緩セシムルト云フ恐レヲ以テ、琶布ノ神効ヲ知ル者ナシ、夫レ琶布ハ、温熱ニ過クヘカラス、又タ大量ニ行フヘカラス、常ニ勉メテ同度ノ温ヲ得セシメ、是レヲ去ルノ後、必ス眼上ヲ拭フヘシ、琶布ニ製スル藥劑ハ、亞麻仁、米麦、菲沃私葉、矢鳩荅葉等ナリ、是レヲ水、或ハ乳汁ニ煮テ以テ琶布ノ稠トナス、蓋シ其煮ルヿ長カルヘカラス、而メ一日毎ニ其製ヲ攺ムヘシ、

地 糊劑

眼瞼ノ貼劑トシテノミ用ユ、諭ヘハ硫酸糊、砒石糊等ノ如シ、

等六 眼膏

諸眼藥中眼膏ハ、最モ良善ニシテ、且ツ其用ニ適ス、而メ其効緩慢、持長シテ用ユレハ、遂ニ内裏ニ竄透ス、殊ニ刺戟ノ効ヲ以テ稱セラル、多

ク ハ眼瞼、眼圍ノ諸症ニ應ス、

眼膏ハ、新鮮ノ家猪脂ヲ良トス、即チ家猪脂中、礦類末、塩類、植物、或ハ亞的兒油類、ヲ調和シ、用ル者ナリ、熱國ニ在テハ、家猪脂中、十分一ノ蠟ヲ加フヘシ、蓋シ散末ハ、仔細ニ研和シテ、眼中其粗糙ノタメニ刺戟ヲ起サヽルヲ良トス、若溶解スヘキ藥料ハ、豫メ是レヲ溶解シテ、而メ後ニ稠和スヘシ、多ク是レヲ製スルモ、一頓ニ一戔以上ニ過クヘカラス、然ラサレハ腐敗ヲ致スノ患アリ、用法ハ、毎日二回ヲ以テ足レリトス、其他規則トナルヘキ者ナシ、蓋シ是レヲ行ントスル前ニハ、温水ヲ以テ眼上ヲ洗フヘシ、

第七　眼散

眼散ノ機能ハ、一ハ舍密様、一ハ器械様ナリ、而メ吸収ヲ促ス、故ニ吸収機ヲ奮發セシメント欲スルトキニハ、是レヲ用ヒテ奇効アリ、此ニ用フル散末ハ、極末ヲ要ス、而メ眼中ニ吹込ミ、或ハ毛筆ヲ以テ塗抹スルナリ、

第八　眼硬膏

眼瞼或ハ眼圍ニ貼シテ眼上ヲ被覆シ或ハ合接シ或ハ是レヲ刺戟スルニ用フ若シ刺戟ヲ要セサル者ハ「ハルス」ナキ硬膏ヲ用フヘシ單一ノ白蠟膏多ク適用ス

第九　乾腐蝕藥

此劑ハ觸ルヽ所皆其組織ヲ損敗ス或ハ其近傍ニ及ホス者アリ此以テ息肉贅肉ヲ潰爛スルニ用フ即チ硝酸銀ヲ適用ス是レヲ用ルノ式ハ眼瞼ヲ腐蝕セシメントセハ其眼瞼ヲ飜轉シ藥料ヲ採テ病所ニ塗抹シ其所白膜ヲ生スルヲ見テ則チ眼瞼ヲ洗濯ス是レヲ洗濯スルニハ水或ハ乳汁ヲ良トス而更ニ扁桃油ヲ塗貼シ以テ眼瞼ヲ本位ニ復セシム若シ是レヲ眼ノ結膜上ニ行ハントスルモ其式即チ同シ爾後眼瞼ヲ閉合セシメ布片ニテ被覆ス腐蝕ヲ反復シ用ルハ其刺戟止ムノ後ニ非サレハ行フヘカラス

眼科摘要卷之一了