



-240

F
カ-87

慶應義塾大学医学部蔵
昭和47年7月4日
富士川

蹴鞠フットボール 言コト 同

劉賜割臆削骨續筋神奇寧
無踰於此乎公一日就予請聞診候
之與儀業性之至理不古コト 辭讓相卒
素難及明醫論說以應其責然後
吉益家之一流大成者也庶幾シ 今斯
書廣傳天下普保萬民之身命矣

天正十三年歲次乙卯冬日南至

洛下啓迪菴曲直瀨玄朔敬識

吉益半咲齋參

敬識

髮ヘ 白シロ 戴カキ 白シロ

背セ 系ケイ 申ウケ 系ケイ

換骨板華

換骨板華

換骨板華

夫金瘡之權輿者魏華佗術自傳

于我朝縉紳士庶戴白垂髮無不

聞有此旨矣業于乙亥之家尤秘用之

蓋疵也者非余自臟腑之病遽触兵

刃而皮肉筋骨敗壞者也大人皆敗壞

無不有一病故熱氣人蒙疵則其

熾而作疵癰疵瘡疵役病冷氣人蒙

疵則冷弥深而作肉脫食少病以類推

之而須隨証而治療之矣患疵者不拘

多少先靠于物安座而宜用安榮湯

熾シ 熾シ 熾シ

唇書上同

避ハナリ

衣イ
ヨルキル

称ショウ
ホムル
ハカリ

縦シュウ
タツ
タヒ
イモモ

被ヒ
フヨフ
フス

意イ
コロ
コロ

漸セン
ツウヤク
スム
スム
スム

ヨヤリトモ
ス、ム、メ、

莫動体及屈伸手足專避風寒慎七
情又忌俛仰平卧矢衣被之厚薄称
意而莫甚眠縱就眠急不可喚驚馬暫
可令為少眠若熟眠則以烏羽撫面可
漸驚馬之口傳雖多不遑救拳矣
于時寬衣三寅歲仲夏上澣源巨朋撰

補ホ
補ホ
称ショウ
同ドウ

杖チウ
ヤフル
ソコナフ

枚ハイ
ハヤキ
エタノカズ
合ノ年

換骨抄卷之上

手負脉微細沉小者生浮大弦
急者死又曰血出不止之間浮者
生細者死血止而後細者生浮者
死折傷者浮大生虛細者死折傷

人參湯

手負不問寒熱先用之

人參

川芎

為藥

地黄

當飯各分

大黃

黃芩

各一兩

右米一盃半入煎至一盃溫服

定米湯

手負甚重者宜用之

テラハ血止すリカサレハ
病人ハ血ヲサリハテハメ
チハモテモサレ也

紫河車

テラハ血止すリカサレハ
病人ハ血ヲサリハテハメ
チハモテモサレ也

名曰血縛

人參

黃蘗

紫河車

右水煎服

神草湯

甚妙

甘草

白芷

柴花樹皮

各等分

松緑

血竭

七氣之通治前後用之

人參

大黃

黃蘗

茯苓

當飯

芍藥

桔梗

地黃

川芎

白朮

附金

白芷各一兩

木香

沉香

甘草各二分

右煎服隨証加減之

沉香牡丹湯

治法同前

人參

木香各一兩

當飯

地黃

芍藥

川芎

紫且

陳皮

茯苓

縮砂

大黃各三分

甘草

加沉香白芷各二分 藿香二分

右水煎服

安米湯

七氣之通治此方之茶

力難尽言

苦菜

肉桂

桂心

白米

木香

四

黃連

蕙琴

人參

當飯

各等分

牛草

若有瘀血眩暈加酒炒大黃肝木炒

等分吐加丁香

右細切一錢裹絹以熱湯振出之服

立効湯

同籠血縛即此湯無不

百發百中

人參

沉香

各一兩

筋玉 二分

車草二朱

燒
增

大栗之

葱白根

人參記香玉簡玉房
井草中やキニハミウを
ヒトモジバヤセにサカト入ル
ツヨクとヘタル者ハ金玉ヲヒリ

右水二盃煎至一盃二分去渣其執服

若吐者死。不吐而北。月脊骨汗。輕出者。

為度而量人
虛實而微下
枕又微緩帶

而令人卧之若心氣勞之汗出過多

者除蕙倍人參加カ國クニ老シ一分口傳難記矣

和血湯

牛黃去惡血益新血止痛

新六子方義

自愈

人參

牛膝

赤芍各三分

當歸

川

地黃

紅花

各分甘草少

右煎服

胃榮湯

治手負臍腫痛膿多

勢

人參

大黃

杏仁

黃芪

黃芩

鬱金

藿香

地黃 各等分

甘草 少

右煎服

十珍湯

治手負臍口惡肉聚

疼痛

人參

木香

白芍藥

川芎

白朮

當歸

縮砂

沉香

遠志

陳皮 各等分

甘草 少

右束一枚煎服

十全湯

治手負臍口惡肉聚疼

痛或疔風毒腫用之甚妙

當歸

川芎

芍藥

地黃

白芷

鬱金

藿香

牛膝

大黃 各等分

甘草 少

右煎服

排膿湯

治作疔癰而久不瘥不

思飲食

香附子

莪朮

黃柏 各二兩

當歸

牛膝

地黃 各二兩

陳皮

柴胡

青皮

白朮

桂心

黃芩

獨活 各二兩

右水煎服

順血湯

中炮王者宜前後用之

當歸

芍藥

川芎

地黃

人參

白朮 各二兩

甘草 少

右水煎服

四朱 二兩
西朱 一合
兩分 錢五分

和經湯

治折撲傷損落馬墜

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

牡丹皮

生地黄 各一錢

甘草 少

右水煎服若痛甚大便結者加黃

排仁各錢紅花五分以利為度

乳香散

治打撲傷損不可忍

白朮 五兩

當歸 二兩

白芷

肉桂

沒藥 各二兩

乳香 二兩

甘草 少

兩目 各一
一兩下 二兩
錢 二兩
錢 二兩
錢 二兩

為度 利為度

右為米一錢溫酒調下

巴戟湯

治從高墮下及打撲內

損昏冒嗜臥不能飲食此謂血閉臟

腑不通

巴戟去心半兩

當歸

地黃

為藥

川芎各二兩 大黃半兩

右為米水煎服以利為度

凡打撲傷損神草湯加乳香沒藥特

蘇木若手足折痛加沒藥乳香防風

羌活木通或一黃散尤可也若大便

結腹脹滿痛甚者用虎雞丸通利

痛立止矣然後用神草湯及沉香

牡丹湯可調理

荊芥湯

治破傷風中風邪

疵腫疼痛全熱

獨活大

陳皮

香附子

葛根

升麻各半

荊芥少

右煎服立効若汗出者加肉桂小為末

羌活湯

治破傷風初在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

白芍各二兩

地榆

細辛

甘草各半兩

右水煎服

防風湯

右前方服大過臟腑

和而有自汗用之

白朮一錢

防風二錢

黃芩一錢半

黃芪一錢

牡蛎煨五分

右煎服

芍藥湯

治破傷臟腑秘小便赤

自汗不止

川芎

羌活

黃芩

大黃各錢

右煎服

柴胡湯

破傷風至四日五日者

宜用之

柴胡

黃芩

陳皮

人參各兩

茯苓

桔梗

荆芥各三分

石膏煨

川芎

麻黃

甘草各二分

右水煎服此方治風邪在表裏裏

白朮湯

治破傷風大汗不止筋

手足攣攣

白朮

葛根各錢

升麻

黃芩各錢

芍藥

甘草五分

右水煎服

玉真散 治破傷風口噤及張欬

防風

南星 各等分

右為末童便調下

神效散

治法同前服之立效

麝香

半朱

辰砂二兩

黑豆一分

草烏頭

三兩二分半生半燒

右為末酒調下

一方

治破傷風痲腫發熱

疼痛

牡蛎煨

為末和水貼患

所即止痛退熱也

一方

治破傷風痲發熱痛

杏仁二兩

白麵半兩

右解水貼患所立痛止

牛負及張之効方

其麝香

黑燒

加乾姜如許

右為末每服一錢黃酒調服同灸治

之法頭之痲取兩眼之下及處而灸之

中之痲灸腫中腰以下痲灸左足小指

之根三五七或十一壯

諸方從四季而倍加茶味法

一方 治破傷風痲發熱痛
杏仁二兩 白麵半兩 右解水貼患所
立痛止牛負及張之効方
麝香 黑燒

右為末每服一錢黃酒調服同灸治
之法頭之痲取兩眼之下及處而灸之
中之痲灸腫中腰以下痲灸左足小指
之根三五七或十一壯諸方從四季而倍加茶味法

春川芎復芍藥

秋地黃冬當歸

諸方加味法

頭之疵加川芎

中之疵加桔梗

下之疵加檳榔子

左之疵加柴胡

右之疵加升麻

血落脬痛加牡丹皮

血堅痛加桂心

筋挛痛加黃芪羌活獨活

春

秋

川芎

冬

芍藥

諸方加味法

頭之疵

中之疵

下之疵

左之疵

右之疵

血落脬痛

血堅痛

筋挛痛

加川芎

加桔梗

加檳榔子

加柴胡

加升麻

加牡丹皮加黃芪羌活獨活

加桂心

加黃芪羌活獨活

寒之痛加干姜陳皮白朮

頭痛加川芎細辛

面之色赤加車前子山梔子

熱氣甚加知母柴胡前胡石膏

氣煩加木香良姜藿香

腫氣加黃芩連翹大黃木通各三分

沉香白兩

寒痛

頭痛

面之色赤

血氣

熱氣甚

血醉

虫氣

氣煩

腫氣

膿氣

加干姜陳皮白朮

加川芎細辛

加車前子山梔子

加人參甘草

加知母柴胡前胡石膏

加木香良姜

加木香良姜藿香

加人參一倍

加藿香大黃芍藥

加黃芩連翹大黃

木通各三分沉香一兩

痲癰加連翹茸乳香
紫貝各二兩 柞木皮三兩

痲癰

小便閉加瞿麥木通

小便閉

小便秘加欬爾金烏梅

小便秘

大便血利加大黃排仁

大便秘

腹下加肉豆蔻罌粟

腹下

大便膿血利加竜骨

大便膿血利

不食加縮砂沉香厚朴

不食

陳皮

噎而咳逆

咳氣加半隻枯薑根

咳氣

咽乾加葛烏梅

咽乾

加連翹底茸乳香

紫貝各二兩 柞木皮 二兩

加瞿麥木通

加欬爾金烏梅

加大黃排仁

加肉豆蔻罌粟

加竜骨 鹿茸

加縮砂沉香厚朴陳皮

加丁子枳實

加半隻枯薑根

加葛根烏梅

胸痞腹脹加枳殼椰子

胸痞腹脹

中風加防風桑白皮

中風

反張加肉豆蔻生薑

反張

熱氣加柴胡香附子

熱氣

地黃當歸并麻

當歸并麻為菜黃芩類

吐逆加生薑丁香皮

吐逆

冷氣加桂心白朮

加桂心白朮地黃為菜

先繕

先繕

逐瘀血

逐瘀血

通經絡

通經絡

防己羌活 防己羌活

大黃紅花當歸牡丹

大黃紅花當歸牡丹

止痛

和血

調氣

養血

補胃

益脾

黃柏木通薏苡

地黃紅花

後繕

黃芪人參合歡

白芷當歸地黃

白朮麻茯苓

芍藥茅根

換骨抄卷之上終

換骨抄卷之下

壽明散

血縛七氣之銘也煎藥之時者名余金仙湯

制

切疵 產前 兩九

突疵 產後 兩八

矢疵 兩八

打疵 兩九

憎

切疵 產前 兩六

突疵 產後 兩十三

矢疵 兩四

打疵 兩十

航

切疵 產前 兩二

突疵 產後 兩十

矢疵 兩四

打疵 兩四

視

切疵 產前 兩四

突疵 產後 兩六

矢疵 兩七

打疵 兩七

切疵_三

突疵_三

矢疵_三

打疵_三

切疵_三

產後_三

大血道_五

切疵_四

突疵_四

矢疵_四

打疵_四

產前_三

產後_二

大血道_六

右為末一錢春復冷酒秋冬

溫酒或塩湯調服

右加味法

頭痛

加川芎

腹下

去膻代川芎

腫氣

加觥骨各二兩

渾身痛

去視代烏鴉

癰疹

加視觥各二兩

勢氣甚

加烏鴉

脫肛

加觥各二兩

淋病

加觥一兩

吐逆

去觥加觥一兩

不食

加延明皮一兩

振笑

加觥三兩

眼不見

加觥一兩

虫出

加丁子義木三稜

筋痛

加觥一兩

大便血下

加倍觥

產前吐逆下血加剗二兩去視

產後陰破加骨觔各二兩

產後大便血下或吐血鼻血

加剗二兩

產後胎衣不下用血縛一錢蓖麻子

去壳十五箇為膏合加之而用

海夢解熱湯瀋去渣入酒少

許調下

寺明散某種剗衣法

一 剗某之土用取之陰乾而為黠

煎某之時者根葉浸酒一宿炒之

一 骨寒中取根洗淨去氣而去毛

皮浸米泔三五宿以竹刀剗為

末煎某之時浸酒一宿炒用

一 觔赤白俱去皮為末少灸用之

煎某之時浸酒一宿炒

一 視為黠煎某之時如常剗用之

一 黠為黠煎某之時用骨浸酒一宿

炒

一 桂為黠煎某之時用骨浸酒一宿剗

炒

午肩氣付之方

人參散

人參

蒲黃 各二兩 當飯

甘草

許金 木香

葛根

各五分 胡椒 少 右為末少許生湯用之

蒲黃散

人參

蒲黃 各五分 胡椒 少

右為末少許用之

一方夏之土用以烏鴉為黠用之甚妙誠

以二錢溫湯加童便少許服之三用而皆

吐者死

手負血下之方

一黃散

用之以利血為度

古瀨麻 黠

菰菜 灰

甌帶 灰

大黃 各二兩

右為末一錢以湯送下折傷甚者加

合觀 號二兩 木通 茯苓 各二兩 每服一錢

半童便黃酒等分合調服尿血利

為度

虎雞丸

傷損極重瘀血有膿

腹脹痛二便不通悶亂者宜用之

以利為度 號分下

巴豆 煮去壳 膜二兩

大黃 六分

地黃

丁子各二分

右為末凡如赤小豆大每服三粒以極之

茶調服經一時立下

三赤圓一名朱麝射丸 牛負血落胸腹

脹滿悶絕者用之下血利膿大便通

而自瘥

巴豆二朱 附子三朱 朱一朱

麝香二兩 桂心 厚朴

白朮 椒目 人參

黃連 當歸 桑白皮

石菖 柴胡 檳榔

防風 紅花 獨活各二兩

右為末凡如赤小豆大每服三十圓以塩

湯送下或用琥珀丸

琥珀丸 巴豆 丁子各二分 蛇骨一分

牽子二兩 甘草少

右為粉凡如小豆大每服二十丸如

前送下

金餅圓 牛負秘結者用之

巴豆去壳炒 白朮 當歸

茯苓 厚朴 香附子

丁子 青皮 各二兩 甘草 少
右為末丸如赤小豆大二十九丸以白粥調下

八味圓 牛黃麝香而秘者令
握于手之內即下也

巴豆 去壳 硃黃 煨椰子
干姜 薤子 續隨子
甘松 大黃 各木分

右為末和糊凡如排實大先用蜀椒一兩水烏頭一盃煎至半盃洗左牛內拔乾然後塗青油於牛內而令握之

人行三里許而立通若利過多則以新汲水令洗手內即止矣

一方

巴豆 去壳 桂心 乾姜 少

右為末和糊丸放入谷道大便即通

滑括散 治牛負小便不通

滑石 括樓根 各等分

右為末和米貼之平脬一寸下四寸四方

一時而則通若不効用黃參散
黃參散

人參 一分 大黃 一分二分 丁香皮

血不止接骨皮共
判二五方服之
妙婦人帶下下血
血不止右之疵十
六左方其所
灸ラレテ止是ハ
クハ心

縮砂 以等 各分甘草少
右為末拾二貼而三日以米飲湯送
下則立通

牛負血留之方

一方

松綠

許出者

白瀨麻

各一兩

麒麟血

三錢

一方

右為末撒

疵之口則血立留

一方

血竭

土竜

去四足黠各等分

右為末燃撒疵之口則止也

一方

紫貝

蒲黃

各等分

右為末搽患所立刻痛自止獲愈

一方被傷金草血出過多不止則採

其流血而貼愁人之額正中而其上

合鯁黠血竭少許而捏之則立止如神

必勝散

止血如神

三七

二兩代

降香

紫檀

松綠

蒲黃

各兩

血竭

土竜

各三分

五八草

黠二分

右為末撒疵口則血立止若不止則用艾

揉攤平搽勻菜末蓋於疵口貼之

薄

源氏之薄色

薄色

石灰 拾竹

研調

自入小寒百日晒水每朝平旦替水
至百日則瀝去水攪攤曬乾為塊上已
端午重陽之寅刻汲井花水先用藥
菜連根細研勻以水和之次下石灰塊
再研調為塊以藥包之懸于金上經
五十日而為末用之此方住血止痛生
肌即痊如神

酢藥之方

一方

車前草

忍冬草大

庭床大

雞腸中

蔦中

纓疏大用葉

小蛇小

垣通子中各號

赤小豆中生

右為末用

嚴醋淡解之除疵端微而

令迴廣數篇拖之

一方

薄

海帶去砂號

為末引之同前

一方

治折傷腫痛

桂心

黃柏各等分

右為末和水時々拖患所立止痛即瘥

續筋法

川蟹甲肉之用黃物而內土器陰乾為
未極筋間若血脉斷加土龍驍

接骨法

白楊梅皮土龍各等分為末以梅醋
調勻貼之覆盆肉出則淋洗之
離則骨間入燈心令之而用柳若檜而
細削編簾令疵捲之前方某末自
簾隙時々拖之令疵向下失如折骨
則和前方某末干絀屋糊而貼之亦
奇明散青茶碗燒為末各等分每服
一錢日二度以好酒調飲

疵愈某方

栗木皮 鹿角 各兩
右各為驍和青油附之
言瀨交 一分

一方

木蘭草

括婁根 楊梅皮 鹿角
木蘭草 苗藥 雪下草

右各等分為末附之

一方

括婁根

括婁根 黃蘗 等分

右為末着之

一方

治疵骨現肉不生

国老末

右男子以女兒之乳汁婦人以男兒之乳汁和而貼之

鹿角散

鹿角散

治血氣衰弱疵凹而欲

谷

愈

鹿角

炭火燒霜而為末以酒消

右為末一錢每日三度溫酒亦湯送

下立肉生自平痊

一方疵凹而欲愈集

床誥治破痛不可忍之法用

平方銀粉以糊練附之

葛藟

葛藟去皮研勻合滑石末為膏貼患

立効

所立止痛經一宿則愈

疵止痛法

用血餘燒為灰末和青油塗之立止

痛也

一方

崔赤子日干乾為末捏之頭疵尤

可也

又方

雞子青

雞子青

電腦

電腦

右研勻着之

一方

蒼草

川芎

治疵腫痛

各陰乾等分爲末和醋貼之

一方

天南星 紫檀 各等分

右爲末和精葉之汁或雞腸汁貼
疵口之上

一方

生栗 去皮 大角豆 去皮 各等分

治疵縮黃汁不出

右研勻貼之立開

治疵腸爛痛

天南星爲末和青木葉汁看之

一方治疵乾黃汁不出

椿若葉 陰乾爲末和雞腸草汁

搽之

治腦出法

燕米與若赤兒屎陰干爲末搗之立愈

以新疵而一夜之間作言疵法

其土用之中取出路中地龍陰乾爲

末搗之

疵膿流之法

巴豆去壳一兩入白酒烏瓦一盃以文

武火煉爲膏月塗之膿自流

膿拔方

蓖麻子去壳

明礬

京分和糊丸如凡實大入之于疵口

治疵惡肉出方

黎蘆

香皂炒

白粉

生火

右合和青油先炙惡肉之上三五壯而

後貼之

疵癰之法

一方

黃蘗

黑

馬醉木皮

各豎

赤小豆

榆白皮

各等分

右為末以稀糊調勻着患所即痛止

腫消若疵久而不能瘥則以味噌為一錢之厚而貼疵之口其上以艾炷灸而貼前菜末

腸出法

腸出法

取上藕蛤之白而無紋自曝者燒為灰

未以青油和之塗腸入之而用細布

端疵隨瘥且縫縮之矣若此法難

則以可應腸之器蓋之以絹攤帶之

然後直當腸所出之脊以蓖麻子

去壳為膏四寸四方貼之立効矣若

腸乾難入則以巴豆之油塗帝然捲

腸之本也經數日後落即瘡不起此
不信以此屢治贅瘤亦有効矣

腸流法

黑猫鬣為末去腸子齒肉入醋糟腸去天和青油時々塗
腸則腸自流落即瘡

治疵虫湧鼻法

蕎麥葉燒為灰浸米取汁洗之
苦參為末搽之

治疵蜈蚣著法

鯁皮為黑燒和青油搗之又採其蜈蚣
今雞喰正

七氣俱執著則用虎肉丸以能紙包
上書小大之二字令釣之于病人目前也

治手負遺精不止法

用薰草令為禪而亦敷坐下即止
或麒麟血末比麻子去皮如糊推交貼臍中

板竹木筴刺法

在肉肉不出則用茄子花自落者
為末和稀糊塗之即出或以象牙

末搽之

板箭法

鉄則

鉄則

磁石

敷裏皮

松茸

ニツタケノイニツキ

主栗各二分赤蠅黠
右為末內疵之口以精葉蓋之若傷於
竹木則去磁蠅加串柳核各等分
諸拔亦疵瘡桑蠅蠅蛸立春取黠
人言各等分為末如凡實大為丸若
疵口塞則針灸壞之納藥一丸以鮭皮
護之

疵破法

一方

天南星信石斑猫
右等分為末和稀糊先用鍼灸于

疵之口破之而後貼之

七葉散

庭床枸杞葉大樟葉
五加葉束葉栢芝葉

栢葉

右四月中旬取葉于乾各等分為末
半錢以酒送下經十二時而拔如神
先不用藥之前以塩湯洗疵溫而用之
紫金膏愈疵如神

用長夏茄子二十箇去蒂切片山漆
根莖葉剉俱二斤將新大砂鍋一箇

盛米以慢火煎熬成膏以白布漚去渣用汁再入鍋以文武火熬致一碗次下白蠟五兩五錢次下合歡皮末六錢大黃三錢次下青油二兩五錢下柳棍攪不住手滴米成珠為度離火次容接骨木天南星紫檀末各三錢攪勻退火毒以紙攤貼上敷患處立止痛消腫痊如神

膏月某方

松脂一斤白布三度漚之 庭床 雞腸

忍冬草二兩 鷓鴣

精葉

鹿角

血餘

白蒿各號

黃柏

血竭各半兩

阿仙茅二兩

右為末入鍋內以文武火煉之次下青油隨四季子有和減

染紙法

精葉五十斤用大盆盛水以慢火煎為膏去渣用汁以厚紙染之攤乾不拘疵之多少護之

洗菜法

一方

蓮葉

忍冬草

雞腸

車前草

藤癭

寶香

石菖

桑木

右等分煎熬入塩少許冷而洗之忌
熱湯也

湯治法

自患疵日至四日六日宜洗之失大抵
偶日輕奇日重而至七九日死者多
矢愚曰覆盆肉不生則莫淨洗或
風雨寒陰日戒之戒之

四季之湯治

春一日一度

夏一日二度

秋一日一度

冬二日一度

疵不言淺深俱洗之則用烏羽

二本以紙燃撲之浸煎湯微而令

疵濕之淨而用軟綿拭乾去水氣綿

而檀青木葉末而以染紙護之

凡頭之疵忌諸油膏煎湯精葉戒之諸

疵之內忌諸醋雞腸汁之類戒之

疵疼則青油熱則醋腫則雞腸汁

隨證用之

接骨者斷則用乳汁青油折則用

糾屋糊梅醋

骨痲者陰夜用藥多皮肉痲者

陽晝用藥多而可也

上焦之痲者服藥少下焦之痲者

服藥大而可也

五善之證

痲外開而潤者

黃汁出過多者

眼之內清澄者痲中淡紅而潤者

面微赤渾身靜者皆生

必死證

痲合腫塞痛者

痲迴堅而痛者

痲內外紫黑者

血落腮粟下者

眼之內白而上竄者

眼無腫者

腦出過多者

腸出過多者

汗出如王多而不止者

撒手脩衣摸床者

渾身燥而狂者皆死

四足 海老 蟹 二足 權劍 蛤 蚌

羊 烏羊 羊 茄子

瓜類 松茸 蓼 芥菜

生大根 土筆 蕨 蘭 薺

蒜 生葱 白生薑 蒿苳

五辛類 虎杖 通草

櫻 蕎麥 炊大豆

串柳 栗 桃 杏 梨子

鯢魚 本草

寄居虫 本草

山蛭 本草

田蠃 本草

蝸牛 本草

鮫魚 鯢魚

鯢 本草

鱒 本草

魚 本草

梅 李 胡桃 山椒 胡椒 藕 葯翦 芥子 角豆 桑實

酒 醬油 麵類 餅類

油氣類

懷妊夫婦 經水女 交合男女

狸皮 梨木 大怒豆

大言豆

疵愈而後房室十二月戒之

新編和玉篇 鯢 鯢子

此換骨抄先年雖改之落字誤
依有之予自明曆二年丙申孟
笈中旬改正之而已

ミシノ青ルイシタウ汁ヲ在子堅
ミシノイカ式女朋石五介入煉
白蠟
油
猪油

目五分ホト
但一眠

ヒトモジノ
白根子
五フホト
ナリテ五
節を

コノミルサホトシ
ツ

鯉魚綱目

水
テシモリニ
一
ハ
ク
半
入
テ
一
ク
イ
セ
ン
ジ
ニ
ツ

校正
時珍曰舊注見三
カス卜毛

カストモ用ソ
ハナノ
アヒヅ

シテ
常
リス
コシ
ソ
ロケ
ヤ
ウス
ソ
ミ
ヤ
ウス
ス
夜
カ

[illegible]

ナト、常リトキ、ソモソトリニ枕^{マク}シテ

