K 47

富士川文庫
490,9
Ka-12

F
カー88

[illegible]圖書

490.9
Ka-12

No. 2531
旧 K 41

慶應義塾大学医学情報センター
昭和 47年 7月 4日
富士川文庫

1499

慶應義塾大學醫學部北里記念圖書

換骨抄

河南吉益氏有一醫工其名云半咲善治金瘡嘗本朝有外科之名世者不論遠近必摩踵求之受数家蘊奥而合為一家之方書目謂換骨秘録矣蓋聞孔子之所慎齊戦疾信哉其言也古来干戈之道盛行枉死之者不可勝計半咲業外科之後告有杖打及傷等者不限貴賤即往而救是無不験誠可謂

百發百中者歟以古比是則華
佗刳腸割臆削骨續筋神奇
寧無踰於此乎公一日就予請
聞診候之奥儀藥性之至理不
克辭讓粗萃素難及明醫論
説以應其責然後吉益家之一
流大成者也庶幾令斯書廣傳
天下普保萬民之身命矣

天正拾三年歳次乙酉冬日南至
洛下啓迪菴真瀬玄朔敬識

吉益半咲齋系

○夫金瘡之權輿者觀華佗術當延喜帝
六年二月下旬与軍法書同渡本朝故
源朝臣義家奥州征討之時賜於軍去
並金瘡書始傳授之三男上野大守足
利義國傳之嫡男足利義康長男足
利義兼嫡男足利畠山遠江守義純代
々傳之矣雖然徒知術此書不知其正道
同是予伯父河州大守畠山従三位伊豫
權守源朝臣義就五代之苗裔吉益
氏中務大輔盛秀歟之賴於三帰翁改
正訛誤而作此書故二弟吉益掃部

大輔豊秀同右兵衛佐高秀傳之畠山
家亡而後掃部大輔豊秀被秀吉将
軍徴詔就御養子信長公末子長次公
在于丹州亀山城遵秀吉公御諱号
半左衛門尉勝国武威甚盛也厥後遇
讒蒙於秀吉公之勘氣為御検使浅
野弾正少弼源長政寄来而既欲害処
長次公聞之疾走而嚮長政曰害彼
先害我不公許彼死依之長政應公命
赦勝国之死於是勝国潜身於洛邑
郊外入道号半咲閑暇之餘謂于曲直
瀬玄朔議撰此書名曰接骨秘録矣
予父高秀領知和州郡山帰服義輝
公郡内及度々有戦蒙疵者甚多
療之無不治高秀素有文学好醫
發明諸書編金瘡一巻秘之名華佗
一巻書矣然未能發明於諸証辨治
奥予取於京今名醫諸家之秘方
以竭力苦心稍為工夫二十年于茲矣
畧會得而再作書以号接骨正
鑑方業干戈之家宜秘用焉蓋
疵也者非発自臓腑之病處遇觸兵

又而皮肉筋骨敗壞者也大凡人皆
無不有工病故熱氣入蒙疵則熱弥
熾而作疵癰疵瘡疵後病冷氣入
蒙疵則冷弥深而径内脫食之病
以類推之而須隨証而治療之矣患
疵者不拘多少先韮千物安座而宜
用毋宋湯莫動体及屈伸手足事
避風寒慎七情又忌俛仰平臥矣衣
被之厚薄称意而莫甚眠纔就眠
急不可喚驚暫可令厚女眠若
熟眠則以鼻羽撫面可漸驚之

口傳雖多不遑枚挙矣

于時寛永三丙寅仲夏上澣　深匡明撰

脉之法

微細沉小者生浮大弦急者
死亦浮虚凶（血不止之間脉浮大生沈細死血止而後沈細生浮者死）

人参湯　手負不問寒熱登
時宜服之　人参
川芎　芍藥　熟地黄
當歸（各二分）　黄良　黄芩（各一匁）
右剉一劑水煎服

定榮湯　手負血縛治敗血攻
心迷悶毒言見鬼不省人叓
者宜先此藥一二服用之皆自

吐者死矣　神草
國老（ケ）　松綠（春取寸出蘆子去皮）　黃栢
白芷（炒）　血竭　混沌皮
紫花樹皮（各一錢）右剉一劑水煎若反
張加虎膽（黠一錢）若腸出加黑貓
黠一錢右古酒與童便等分煎
溫服

神眞湯　治手負去血過多生
肉熱煩燥悶亂而撮空尋衣
摸床譫言沉昏　芍藥
血參　血竭　靈貓（即黑猫去齒）

（凡腸中入腸大酢糟為黠）百草（各一分）　葛粉
著菜　甘蒲（炒各二分）　合昏皮
松黃（各一兩）　甘草（ケ）　右水煎服

六物湯　治手負産後血氣
盛而瘀血成結核而遍身走痛
處不定發熱煩悶欲死
當歸　川芎　芍藥（各一兩）
地黃（二分）　烏梅（三分）　甘草（ケ）
右水煎服

周麻湯　治手負疵甚疼痛
不止　沉水　眞檀

人参　周麻　芍薬
當帰　栝樓根　陳皮
茯苓（各一分）　耳蒲　地黄（各三分）
羌活（二分）　耳草（少）　右水煎脹

和血湯　治去悪血益新血止
痛自獲愈　人参
牛膝　赤芍（各一分）　當帰
川芎　地黄　紅花（各二分）
耳草（少）　右水煎脹

胃栄湯　証同前或疵腫熱膿
多或頭疵用之甚好

當帰　川芎　地黄
芍薬　人参　黄良
白芷　欝金　藿香
龍牙草（各一両）　耳草（少）　右水煎脹
一方有牛莖

毎栄湯　七氣之通治此方之薬力雖
尽言　蕃菜　肉桂
桂心　白朮　五木
川芎　黄連　黄芩
人参　當帰（各等分）　國老（少）
右細剉一銭裹絹以熱湯振出用

之若瘀血不盡。加雞舌香　黄良
肩門　沉水　茯兜　芭。（梅肩）（各一錢）十七（八）味共炒
神草湯　七氣之通治。前後用
之甚炒。　人参　當帰
川芎　黄良　芍菜
白朮　黄芪　桔梗
鬱金　茯苓　地黄
白芷（各一兩）　木香　沉香
國老（各二分）　右煎服隨証加減
沉香牡丹湯　證同前
人参　木香（各一兩）　當帰
地黄　芍菜　川芎
紫且　陳皮　茯苓
縮砂　黄良（各二分）　甘草（少）
加　沉香　白芷（各一分）　藿香（二分）
右水煎服
百朝散　証同前（余）用之甚有
神劾　人参　木香（各二兩）
川芎　當帰　地黄
芍藥　黄良（倍）　縮砂
茯苓　黄連　陳皮
紫檀（減）　雞舌香（各一兩）　甘草（少）

右水煎熱氣加石膏明礬（焼）
荊芥 頭痛加白芷 腹痛加梹
榔子 吐逆加丁香皮乾姜白梅花

立効湯 胴籠右白血縛治七
氣俱口噤及張角弓筋攣或
舌強不語眼見黑花發狂見
鬼驚悸戰掉不止或乍寒乍
熱不省人亊 血參
䄡（各一兩） 鈺（二分） 國老（二朱）
燒噌（大栗之大） 葱白根（五本） 右水二盃
煎至一盃二分去渣甚熱服

若吐者死不吐而背骨汗出
者爲度而量人虛實而微下
枕又微緩帶而令人卧之若心
氣勞之汗出過多者除葱白
根加倍國老（一分） 余曰家秘之七
方立効湯及三十六証之加味
済方代々於嫡家傳之用之
固有萬乙差謬者必矣

砍（當兵器）刺出血不止（間）者其（浮大生沉細凶）脉止脉来大（浮）
者七日而死滑（沉）細者生宜先用
芍藥湯立効 白芍藥（炒）一銭

半右剉水煎服或亦生芍甚
好也（亦白芍再切黄色熬細末二銭酒或飲調下血止也）
竹茹湯、　治瘀去血過多不止
眩暈嘔吐　當帰
川芎　地黄　蒲黄（炒）
艾葉（各一分）　芍薬　竹茹（各二不）
右水煎服
補血湯　治從瘀血出多而不
止者須補血　當帰
川芎　芍薬　地黄（各一両）
黄耆　陳皮　人参
白朮（各半両）　右水煎服。加麥門冬　蒲黄（各半両立止）
茯苓補心湯　治去血過多血虚
發熱面赤煩燥而血不止
當帰　川芎　地黄
白芍（酒炒）　半夏　前胡
桔梗　白茯　枳壳
陳皮（各一銭）　乾葛　紫蘇（各七分）
人参　木香（各五分）　甘草（三分）
右生姜一片棗〻一牧煎服。加
黄芩　山梔子　麦門冬　蒲黄
吐血加刺薊根
。加味逍遥散

加味益氣湯　疵腫痛出血不止寒熱口乾此氣虚血無所附而血不歸經也

黄芪（一銭五分）　人参　白朮　陳皮（各一銭）　升麻　銀柴（各三分）　五味子　麦門冬（各一銭）　右煎服之陽氣復而愈亦立効湯加神

折傷

折傷者有瘀血凝滞也其脉浮大堅弦者生虚細者死凡損傷甚重者宜先用毋栄湯調氣然後輕則和經湯重則通滞湯甚痛秘者桃仁承氣湯或用麝香丸下為度又曰脉浮瘀血有肺經氣分須雞鳴散之類主之脉沉瘀血有肝經之血分主活血湯之類逐瘀血止痛而後調氣養血補益胃氣則無不効也

和經湯　治折撲傷損落馬墜車一切疼痛

川芎　芍薬　生地　白芷

乳香　没藥　牡丹（各等分）
甘草（少）　右水煎服入酒與童
便溫服

退血通滯湯　撲傷重血攻心痛
當歸尾　蘓木
紅花（各三錢）　大黃（二錢）　右剉散好
舊酒入童便不拘時熱服

和血四物湯　凡人責打先服此
藥神効　當歸
川芎　白芍　熟地黃
乳香　没藥（各一錢）　桃仁
紅花　蘓木（各五分）　用通草研
爛水煎加酒半鍾共一服

乳香散　治撲傷損痛不可忍
白朮（五兩）　當歸（二兩）　白芷
肉桂　没藥（各一兩）　乳香（一兩二分）
甘草（二分）　右為末入研藥再研
勻每服二錢溫酒下

桃仁承氣湯　治跌撲傷損極痛
大小便不通乃瘀血有於内腹
脹痛攻上心腹悶亂至死者宜
下之　黃良（三不）　芒梢

肉桂（各一匁半） 甘草（一匁） 桃仁（十箇去尖）
加蘓木 紅花 右水煎服

雞鳴散

内心腹脹痛煩悶當欲絶者服
墜険地瘀血停積於
之 黄良（一兩） 杏仁（二十五箇去尖）
右研為末酒大碗一盞煎至七
分去渣雞鳴時服至曉必取
下瘀血即痛止

復元活血湯

治従高墜下悪血
流於脇下痛不可忍
柴胡（三匁二分） 當尾 栝樓根（各一匁）
紅花 大黄（各七分） 甘草（六分）
穿山甲（二分） 桃仁（二十六ケ） 右水煎加
酒五更温服以利為度

巴戟湯

治従高墜下及折撲
内損昏冒嗜臥不能飲食此
謂血閉臓腑不通
巴戟（去心） 當皈 地黄
芍薬 川芎（各一兩） 黄良（半兩）
右水煎服以利為度
庄方治打撲損傷内有瘀血為痛
為腫 生地黄 赤芍薬（各二錢）

黄芩　枳殻　牡丹（各一錢半）
當尾一錢　桃仁十二ケ　紅花三分
右剉水煎服加大黄酒蒸一錢
尤効
百芎湯　治折撲傷損敗血流入胃
脘嘔黒血如豆汁　川芎
當帰　白芍藥　百合（白水浸半日）
荊芥（各等分）　右水一盃酒半煎至一
盃温服
陰紅湯　專治婦人損傷瘀血
不散腹膨便秘攻心垂死

油髪（産婦者燒）　鹿角膠（各一錢）　没藥三錢
右為末毎服一錢酒下瘀血必通

○骨碎散　治折傷瘀血在腹内心腹脹滿痛者　劉寄奴草　延胡索各二分水二升煎七分入酒及童子小便各合頓温服之

内補湯　折傷四肢折皮肉破
甚疼痛用之止痛消腫接筋
骨差如神　當帰
川芎　羗活　防風
白朮　白芷　桂心
黄芩　芍藥　地黄
黄耆　茯苓　厚朴
木香　大黄（各等分）　甘草少
右水煎服

内托黄芪圓　治鐵炙傷經絡
流膿不止用之立効
黄芪八兩　當歸二兩　肉桂
木香　乳香別研　沉水各一兩
右為末用菉豆粉四兩生姜汁
煮糊圓如梧桐子大每服五十
丸熟水送下（食後服ス）
（補當黄芪湯治脱血内補黄芪二兩當歸一兩右剉毎二錢温酒ニ）
生血補氣湯　治打後潰爛久不愈
人参　白朮炒倍　茯苓
當歸　白芍薬　熟地黄
陳皮　香附子　貝母各一分

又方治馬及從
樹[illegible]墜[illegible]

桔梗　甘草各五分　右水煎寒
熱往来加地骨皮（柴胡）口乾加五味子
麦門冬膿清加黄芪膿多加
川芎肌肉遅生加白蘞肉桂
叟人墜馬有腹瘀血脹藥下之致
發熱盗汗自汗脉浮濇余為
重齊過傷氣血所致投以十全
大補湯益甚時或譫語此藥力
未及而然也以前薬加炮附子五分
服之即睡覺来頓安再齊而
痊

破
腹滿（氣短）
黑大豆（右水）
[illegible]服之
腹[illegible]
[illegible]
[illegible]治之又之如[illegible]
[illegible]痙

疵癰

疵癰之者當益血須氣防風寒ニ或以腫物之治法愈尋宜排膿湯沉香湯流氣飲之類屢用屢驗也其功難以述矣

排膿湯　治作疵癰而久不愈不思飲食

香附子
莪朮　黄栢（各二兩）　當帰
牛膝　地黄（各三兩）　陳皮
柴胡　青皮　白朮
桂心　黄芩　羗活（各一兩）

右水煎服

沉香湯　治疵之口廣而腐痛最風毒腫脹之如神

桔梗　厚朴　茯苓
地黄　陳皮　沉香
羗活　黄芪　川芎（各等分）
國老少

右水煎服

流氣飲　治疵癰久而不瘥氣滯或腫物虚証已潰未愈或乳岩

人参　黄蓍
國老　川芎　當皈

芎茱　肉桂　紫蘓
枳壳　桔梗　白芷
防風　檳榔子　木香
烏藥　厚朴（各等分）　右水煎服
加金銀花
加減五香湯　治疵癰腫痛寒熱
往来万腫癰疽或墮馬車瘀
血有於内為膿而腹脹滿痛
沉香　木香　藿香
乳香（各一両）　大黄　沒藥
白芷（各二分）　麝香（少）　右煎散以
酒湯送下
藿香湯　治疵之口黒色而膿
腐疼痛或妄言發狂
白芷　陳皮　五木（各二分）
紫旦　地黄　沉香
人参　藿香　柚賔（各一両）
菊花（二分炒）　甘草（一分）　右水煎服
十珎湯　治疵之口悪肉聚而
疼痛　人参　木香
烏芎茱　沉香　川芎
白朮　當帰　縮砂

遠志　陳皮（各等分）　甘草（少）

右棗二枝水煎服

調栄益氣湯　治痢愈甚而後

經日而不能痊　人参（一两二分）

藿香　縮砂　川芎（各三分）

没藥　枳殻　白芷

丁香（各二分）　白茯苓　桔梗

當歸　半夏（各一两）　黄芪（二两）

沉香　國老（各二朱）　右水煎服

快氣湯　治手屓煩渇胸苦眩

暈　當皈　茯苓（各二两）

葛根　莪朮　桒白皮（各一两）

白芷　乾姜（各三分）　甘草（少）

右水煎服

益胃湯　治痢強半瘥而虫滿

肑膈吐酸水不能飲食

葛根（二两）　人参　白茯（各一两）

木香　藿香（各一分）　甘草（少）

右水煎

梹榔子散　氣虚而虫滿肑膈

不食者皆危服之如神

土精（去蘆頭焙）　貴老（各一两）　洗滌丹（二分）

右水煎服或為末白湯送下

十全内神湯　疵差而養性用
之　當帰　桔梗
厚朴　川芎（各一两）　人参
黄芪　白芷（各三两）　肉桂（三分）
甘草（二朱）　防風（一两二分）　右水煎服

破傷風

脉之法　表脉浮而無力宜汗（太陽）脉
浮而弦（少陽）宜和解脉長有力宜（陽明）
下之河間云風者善行數變入
臓甚速死生有反掌之間宜
急分表裡虚實而治之

防風湯　治破傷風邪初在表
者急宜用此藥解之
羌活　防風　當帰
川芎　藁本　芩茉（各一ネ）
地楡　細辛　甘草（各半ネ）
右水煎服若服此湯大過令
自汗者須服之（白朮防風湯）白朮（一ネ）
防風（二ネ）　黄芪（一ネ）半　右煎温服
不拘時臓腑和而有自汗可
用之若臓腑秘小便赤自汗

不止者宜用大芎黄湯下之
大羌活湯　破傷風邪在半表
半裏者則頭微汗身無汗也
宜和之　羌活
菊花　麻黄　川芎
石膏　防風　前胡
黄芩　細辛　甘草
枳壳　白茯苓　蔓荊（各四五分）
薄荷　白芷（各二分）　右細切作
一服入生姜五片水煎急熱服
稍緩邪入於裡舌強口噤項
背反張筋惕搐搦痰涎壅盛
胷腹滿悶便溺閉赤時或汗
出脉洪數而強也宜導之
大芎黄湯　治破傷風在裏宜疎
導急服此湯
羌活　川芎（一朩）
羌活　黄芩　大黄（各二朩）
右水煎温服臓通和為度若
臓腑利後搐搦不已宜用
小羌活湯　羌活　獨活
防風　地榆（各一錢二分）　右煎服加
有熱加黄芩有痰加半夏

養血當帰地黄湯　破傷風表
証退日久氣血漸虚時々搐搦
脉微細者冝養血
當帰　地黄　芍藥
川芎　藁本　防風
白芷（各一不）　細辛（半不）　右水煎服

玉真散　治破傷風及金刄傷
折撲傷損（并）癲狗咬傷能定痛
防風　天南星（等分）　右為末破
傷風以藥敷瘡口然後以温酒
調一銭如牙關緊急角弓反張
用藥二銭童便調下

治破傷風　葛根（一两）　鴿糞
乾姜（各五銭）　右共為末毎服三銭
好酒調下汗出立効
一方破傷風用蟾二两半切剁如泥入花椒一两同酒炒熟入酒二盃半一酒熱服之衣須通身汗出神効

神効散　治破傷風入二瓶而項背
腰強痓反張口噤四肢筋攣
上氣而喘急　麝香（一朱半）
辰砂（一匁）　黒豆（一分）　草烏頭（三匁二分）
（半分生 半分燒）　右為末以酒服之

蜈蚣散　治破傷風搐搦角弓
反張　蜈蚣（一條去毒炒）　全蝎（一對炒去毒）

右爲細末如茶時用一字或二
字擦牙縫内或吹鼻中

荊芥湯　治初破傷風發熱疷
腫疼痛急服此藥以逐風止痛
立効予用之萬無一失

羌活（大）　陳皮　香附子
葛根　升麻（各中）　荊芥（小）
右煎服若汗出者加肉桂（小）芍藥（大）

柴胡湯　破傷風至四鳥五鳥
者宜用之

黄芩　陳皮　柴胡
人參（各一錢）
茯苓　桔梗　荊芥（各三分）
石膏（煆）　川芎　麻黄
甘草（各二分）　右水煎服右方治風
邪在半表半裏

羌活愈風湯　治破傷風未邪退
反張　羌活　甘草
防風　蔓荊子　川芎
細辛　枳殻　熟地
人參　麻黄　薄荷
菊花　當皈　知母
黄耆　地骨皮　枸子

独活　白芷　杜仲
秦艽　柴胡　半夏
厚朴　前胡　防巳（各三分）
白茯苓　黄芩　白芍（各四分半）
石膏　蒼朮　生地黄（各六分）
桂枝（一分半）　右水煎服

（保命冊治破傷風）
治破傷風及風犬咬傷用胡桃壳
半ケ填稠人糞滿仍用槐白皮
襯票傷處用艾灸胡桃壳上若
遍身汗出其人大困則愈若
年遠只在瘡上灸之亦愈

及張灸法頭之瘢取兩眼之内眥
間之寸而点左外眥之下尽処而
灸之中之瘢在膻中腰以下瘢
灸左足小指之根三五七或十
一壯

鍼法　破傷風因他事搔発渾身
發血熱頭強
後谿（二穴）　手小指外側本節後
捲手文尖
大敦（二穴）　足大指外側爪甲角端
合谷（二穴）　手大指頭指岐骨間陥

行间二穴　足大指外側本節前陥

十宣十穴　宜鋒針出血（仰反強者足十爪間　俛臥強者手十爪）

大陽紫脉（目外眥五分則脂子髎穴也　足太陽膀經）

四季之加減

春　川芎　夏　芍藥

秋　地黄　冬　當帰

右方倍加而用之

加味方

頭之疵　加川芎

中之疵　加桔梗

下之疵　加檳榔

左之疵　加柴胡

右之疵　加升麻

血落胴痛　加牡丹柚實

血坚痛　加桂心

骨砕痛　加人参木香乳香没薬

筋攣痛　加黄芪羌活獨活

筋断　加紫我車酴醾花

寒痛　加乾姜白朮陳皮

頭痛　加川芎細辛

乍寒振　加芍藥柴胡

面之色赤　加車前子山梔子

血醉　加木爪（炒）
血氣　加人参國老
熱氣甚　加知母柴胡前胡石膏
氣煩　加人参一倍
虫氣　加木香良香藿香
膧氣　加藿香黄良芍藥
濃氣　加黄芩連翹黄良
木通（各二分）沉香（一兩）
疷癰　加連翹袋角續斷
（紫且代之）乳香（各一兩）柞木皮（二兩）
小便閉澁加瞿麦木通
小便血利　加鬱金烏梅
大便秘　加黄良桃仁
腹下　加肉豆蔻罌粟
大便膿血利　加竜骨袋角
破血出　加蒲黄續斷
不食　加縮砂沉香厚朴陳皮
噯而咳逆　加丁子柹蔕
咳嗽　加半夏栝樓子
吐逆　加生姜丁香皮
咽乾　加葛根烏梅
胸痞腹脹　加枳壳檳榔

脚氣　加木瓜防已
癮疹　加黄芩荊芥乳香
手足痺　加羌活獨活
中風　加防風桑白皮
反張　加肉豆生姜
血虚　加倍四物
氣虚　加倍四君子
兩虚　八物主茲
熱氣　加柴胡香附子地黄當
帰　桝麻芍藥黄芩之類
冷氣　桂心白朮陳皮當帰
地黄芍藥之類

先繕

逐瘀血　黄良紅花當尾牡丹
通經絡　防已羌活
和血　地黄紅花
止痛　黄栢木通薏苡

後繕

調氣　黄芪人参合歡
養血　白芷當帰地黄
補胃　白朮升麻茯苓
益脾　芍藥茅根

正鑑方上巻終

神農秘傳七氣之血縛切疵突疵箭疵折疵産前産後大血道右此七氣倶療治同前詳察之高可着眼事肝要也但依其人之氣而養生正（与）（ニ）藥種之所用并寒熱虚實之見合他家不可知之是故我家亦以為秘密伏希能隱密而聞口傳可療治不可容易者也然間此目録秘傳之卷物不可有他見若他見之者於有之者其罪難遁者也春夏秋冬（依）四節養生有之口傳云々

壽明散七氣之銘也

尌

切疵（十両）突疵（八両）矢疵（十両）折疵（九両）

産前（九両）産後（廿五両）大血道（十六両）

縎

切疵（七両）突疵（八両）矢疵（八両）折疵（十両）

産前（六両）産後（十二両）大血道（七両）

觓

切疵（四両）突疵（四両）矢疵（四両）折疵（四両）

産前（二両）産後（十両）大血道（五両）

祀

切疵（七両）突疵（六両）矢疵（七両）折疵（七両）

産前（四両）産後（九両）大血道（四両）

䠓

切疵（三両）突疵（三両）矢疵（三両）折疵（三両）

産前（三両）産後（三両）大血道（五両）

珪

切疵（四両）突疵（四両）矢疵（四両）折疵（四両）

産前（三両）産後（二両）大血道（六両）

右為末一銭春夏冷酒秋冬温酒或塩湯調下若血上酒与童便等分若有瘀血珪煎湯調下

四季之加減

春舩（炒）夏黄良秋黒猫冬血参

夏土用烏八毒土竜本方加之

加味方

頭痛加川芎腹下去縎代川芎

腫氣加航綃（各一两）渾身痛去祀代烏
鴉
脫肛加䟸䅅（各一两）衂血倍䟸
癮疹加祀航（各一两）熱氣甚倍祀代烏
鴉
淋病加䟸（一两）大便血下過多倍耐
航
口乾加芍藥陳皮茯苓
不食加延明皮（一两）
振笑加耐（三两）
手足冷項強倍䟸䅅加桂芎

久不瘥瘦汗出加黄茋白朮芍藥
喘倍航䅅加陳皮半夏
吐逆去航加耐（一两）
眼不見加耐綃（一两）
虫出加丁子莪朮三稜
筋痛加耐（一两）
産前吐逆血下加耐（二两）去航
産後脹破加綃航（各二两）
産後悪血不尽加耐航（各一两）加檳榔子
香附子馬鞭
産後有血塊痛加莪朮木香延明

皮
産後喉乾加黄芩茯苓川芎
産後大便血下或吐血鼻血加耕（二兩）
産後頭重加香附子川芎
産後乳汁不通倍耕稍加芍茉木通
若産後胎衣不下産前之血縛一銭
萆崑子（去壳）十五ケ為膏合加之而
用布苔解於熱湯濾去渣入酒少
許調下

氣付法

血参散　治七氣倶眩暈危困
人参　昌蒲（炒各三兩）　遠志
茯神（各二兩）　沉水　五木（各一分）
甘草（半兩）　右為末以湯送下
蒲黄散　証同前　蒲黄（二兩炒）
人参（一兩）　甘草（少）　胡椒（少去皮）
右為末少許生湯調下
一方裊之土用以烏鴉為黥末少
許以生湯用之亦問藥之則量
便一盡煎至七分烏鴉末一銭調
服三用之皆吐者死也
反張法（付雜方）

補經青龍散　治反張筋攣
白芍　黄栢　沉水
陳皮　續断　野燈
菊花　竹茹（各一匁）　石觧
木通　木香　楊梅皮
地黄　欝金　三稜
人参　藿香（各二分）　右水煎或
散以酒湯調下若淋病加青箱子

白經丹　反張　干姜
白朮　古茶（各一兩）　經粉（少炒）
梅干肉（一兩）　右為末以酒呑下

血竭散　治七氣倶反張
血竭爪（大黥）　乾姜（小）　右末一錢以
酒調下

清心散　治手肩不語
狐膽陰乾　耳草等分右為末
半錢以新汲水調下

虎肉丸　七氣倶狐着則虎肉
不拘多少以能紙包之上書小
大之二字令釣之于病人目前
也

一白散　治手肩咽乾

莪朮　五木　烏賊骨（各等分）
右為末新汲水調飲
一方　乾葛　烏賊骨等分加木香
少許為末以水送下

姜国散　治手肩吐血　乾姜
国老（各等分）　右為末新汲水調服

百葉散　治心熱吐血衄血不止
百葉　榴花（乾各等分）　右為末吹入
鼻立止

一方　治衄血吐血下血　山漆
右為末米湯送下或四物湯合之

而煎服甚効

龍骨散　治鼻衄過多
龍骨　蒲黄（黒炒各等分）加血竭少許
右為末鼻中吹之即止

一法　治大小便血出　劉寄奴草為
末茶湯調空心服二銭則止

一心勝散（治吐血咽血喀血不止　小薊根　蒲黄炒　地黄　川芎　當歸　人参　烏梅各等分　右水煎服）

三香散　治卒發虫心腹大痛
良姜　茴香　陳皮
莪朮（各一両）　木香（四両）　甘草（少）
右為末塩湯調呑下

黄連丸　熱痢宜服之

木香一两　黄連二两　人参二分
肉豆三分　耳草一分　右為末如
呉茱大為丸三十丸以塩湯用之

人参丸

治泻利或赤白涼痛
訶利勒　人参　枳柳各一两
阿膠　耳草各二分　黄連三分
肉桂一分　右為末如呉茱大二十
丸耳草煎湯送下

普済散

治泄泻腹痛
黄柏（香色炒十个）　莪朮（炮五个）　耳草（二个五分）
右為末一銭米湯用之中塩湯

呑下

折傷者脈大牢者生虚細者死也
牢大
胴血瘀膿腹脹狂言
脈浮大緩者生沉細死
補
[illegible]治折傷瘀血在腹中腹脹滿痛[illegible]

琥珀散

胴血落腹脹滿脉牢大者
延胡索[illegible]水煎[illegible]酒[illegible]温服之
生沉弱者死　當帰
一字椶根[illegible]
琥珀（各大两）　黄良　桃仁
蘇木　牡丹皮　柚賓（各一两）
木通　黄芩（各五分）　紅花
肉桂（各三分）　右水煎加酒童便服
若不下者用麝香丸　在瘀血者痛取下號
[illegible]
麝香丸云
虎鶴丸
分下　巴豆（去皮七沸去売擾二两）　黄良（六分）

地黄　丁子（各四分）　右為末和
糊丸如大豆大三粒以別儀茶
湯送下一時而立利痛止（号鹿鶏丸）

治[illegible]大便秘

真珀散　治血落小腸心腹疼
痛喘急悶亂　楨木
茯苓　琥珀（各等分）　右為末以童
便煎服

○大金丹　大黄　茴芩　等分　右為末、蜜練丸梧桐子大、
七丸[illegible]食前飲送下日三

一黄散　証同前　古瀬麻
蒁薬　甑帯（黒焼）　黄良（各一両）
右為末一銭湯用之或以温酒調
下若折傷則加合歓（黒焼二両）木通茯苓
（各二両）右一不每服用亦童便黄酒
等分調服便血以利為度最能
散消血滞挴骨續筋如神

白馬散　白馬糞不拘多少童
便一七日浸之乾細末一銭湯下
或三葉薊　薊刺葉　雞腸（各生等分）
右水煎調末服立効

血腸丸　血滞腸中而秘者宜
服之　當飯　大黄
白物（取毒）　古茶　梅干之肉（各等分）
右如梧子大為丸三五丸塩湯

調下

二黄散　中刀箭雖出血外入内
過多而腹滿者須服之立血利
其効如神　黄良（六ホ）　黄芩（三ホ）
蘇木（一ホ一分）　川芎（二ホ五分）　丁子（五分）
右為末二ホ以酒調下弱人一ホ
五分二方有紫我車（三ホ五分）

内消散　血蓄於内而變膿腹滿
悶絶者用之立膿利即安
黄良　牽牛　雞腸黒（各一匁）
黄芩（三分）　右為末一銭以酒用若

不下加栝樓根山梔子等分

桂心丸　胴血落不下
桂心　葛粉（各一分）　右麒麟尿
牛膝汁等分而和末調如呉茱
大為丸米飲湯呑下

朱麝丸　証同前最下血利膿
通和臟腑止諸痛通万甚効
朱（一朱）　巴豆（二朱）　附子（三朱）
麝香　桂心　厚朴
白木　椒目　人参
黄連　當帰　桒白皮

石菖　柴胡　檫葉
紅花　防風　独善（各一両）
右為末丸如呉茱大三十圓以
塩湯送下（号三赤圓）

琥珀丸　血膿在内腹脹痛秘
者服之即痛止　巴豆（去壳炒半両）
牽牛子（一両）　蛇骨（一分）　丁子（二分）
丹草（少）　右為末如赤豆大十丸
食後米飲調下

茶黄散　頭中之下万疾神方
黄良（五匁若氣弱二匁半浸酒一宿蒸焙）　當帰（浸酒焙）
川芎（各一匁）　芍茱（二両）　丁子（二分）
右為末一銭古茶湯調下先須
服白粥而用之入静室暫寄懸
干物安座一時専慎風寒（矣ゟ）
時而耳鳴面如虫行而赤尿利為
度若清尿者不効

通秘圓　虚極而秘者手之内握
之下也　巴豆（去壳）　硫黄
洗瘴丹　永嘉　韮子
耳松　黄良　續随子（各等分）
右為末和糊如桃實大為丸先

用蜀椒一兩水烏盌一盞煎至半盞
洗左手內拭乾然後塗青油於
手內而握丸人行三里之時而須
立通若利過多則以新汲水令
手內冷之則止矣

檳榔散　証同前　檳榔子
木香　丁子　土茯苓
莪朮（各一朱）　巴豆　大黄（各一朱半）
右為末和青油臍中附之以能紙
護之少時即通（二黄圓疷煩痛大便不利大黄黄芩等分為末練蜜丸ニシテ先食水下十丸日三服）

蜜道法　用火煉蜜稠厚黄
色傾入水中急捻如指大隨用則
毋末為衣將油塗抹大便潤滋
放入谷道大便即通或亦用香管
成水彈而內青油所撚入下竅
三寸用之

一法　巴豆（去壳三）　桂心少　乾姜少
右為末以糊為丸直射入內少時
即通

一法　用山牛房之生根浄洗次指
之大削之入下竅立所効妙

滑栝散　七氣俱小便閉則用

滑石栝樓根為末和水腑下三
寸四方貼之一時即利
神~~草~~散（黄参）　治小便不通　人参（一分一朱）
黄良（一両二分）　丁香　縮砂
川芎（各一分）　国老（少）　右為末飲米
湯調下　裕二包三日服之

○血止敷貼之法

龍蛇散　治中白刄出血不止
龍骨　蛇骨　右為末撒瘡口則
血立止若不止則用艾揉攤平摻
匂薬末蓋於瘡口貼之

白龍~~散~~丹（号熱粘皮）　治傷金草出血過多
不止　龍骨（煅三銭）　五倍子（二刄半生半炒）
白礬（一刄半生半枯）　無名異（一刄）　乳香
没薬（各二銭）　右為末乾摻患處最
不作膿不怕風立時止血住痛
生肌如神

降真丹　止血神方　降真香（二両）（代三七根）
紫檀　蒲黄（各二両）　血竭
土竜（各半両）　右為末瘡口播掛之
則止

秘勝散　治中鋒鋩血出過多

又止　餅躑躅　鼬皮

蝮（各黒焼）　野萱花　血竭

蓮花　馬糞埃　蕎麦花

（各等分）右為末採其慭人流血䘏

額正中於其上捏藥末則止亦

五八草（三銭）　血竭（一銭）　為末同前

䘏之立止

（定痛生肌散治刀斧傷出血不止　乳香　没藥　兒茶　象皮炒　龍骨　石膏煆　水飛黄丹水飛　三七　右八味各等分共為細末用之　号象黄散）

源氏之薄色止血効方

石灰十斤入于小寒百日晒水毎

朝平且替水至於百日則濾去

水攪攤曬乾為塊研調時月上

巳端午重陽寅刻之汲井花水

須先用薤菜（連根）細研白以水和之

次下石灰塊再研調為膏塊而

以藁包之令釜上釣之経半百

為末用之當止血住痛生肌

即痊

一法　止血速差方　炒石灰和雞子之

（以野葶藶汁為塊乾而又）

白為丸如彈大炭火煆赤搗末

以付瘡上立差　号一白散

~~（熱押皮[illegible]金瘡出血不止龍骨煆三銭五倍子[illegible]生半枯　無名[illegible]香[illegible]共為末乾摻患處一不作膿不怕　白礬各一両　何[illegible]時止血住痛生肌号治白龍丹）~~

一法灸瘡血不止黄芩末酒服二錢即止

○腸出法

取上蕳蛤之無紋之白脱燒為灰

末以青油和之塗腸入之而用細
布拖膏瓶両端貼之以糸布端
縫合瓶随瘥而宜縫細矣若此法
難入則以腸大緊蓋之以絹攤帶
之然後腸出後通用水銀磁石末
等分以草崑子去売共為膏四寸
四方貼之立効乎若腸乾難入則
以巴豆之油塗紙撚捲腸之本也経
数日即落不但此亦侮見瘤長
巻之犀落矣或黒猫糞為末和青
油塗之腸自流落毎

一方治出腸　天石　紫河車
赤児屎等分為末鴟　雞腸　木蘭
草汁和之時々塗腸（亦曰野屎末羽脚腸ヲ神ニ乃ヤ）
一方治出腸断筋絶　人矢右乾于
為末塗腸上即入取桑白皮（根）糸
而縫腹皮以蒲黄粉附之
一方余曰腸出欲入之用磁滑為
末以白米飲送下方寸匕日再（上青小麦ヲ赤大麦ヲ煮汁洗腸推入ル但飲米糜ヲ　又多腸腹出ニハ急抹ヲ油入シテ枸杞汁　淋ヒク之口内三七服外[illegible]服ニ三銭血不冲心仍テ　噛[illegible]半分之又腸出ニハ熱鷄血塗之）
の用立効
赤黄散　腸出者宜先用之血餘
灰　血竭　血聲　虎等分為末一銭

以生湯送下若吐者死不吐者
用血竭丸血利則為度
○接骨之法
白竜散　用白楊梅土竜右等分
為末以梅醋調句附之而覆盆
肉上則淋洗之又切離則骨間
入燈心或國老虎骨紫河車
類削千八角兩骨間所入之五分
將天石麝香末塗兩切口合之
而用柳若檜而細削編簾令
瘡捲之於瘡口附烏蛇散外亦

前方藥末自簾隙時々拖之
令瘡向下矣
打傷接骨無名異甜瓜子各錢乳香沒藥各一錢為末每服五錢熱酒調服
接骨膏　鯽魚霜　天南星
麵　國老（各等分）　右為末和青
油成膏用油紙攤貼患處如
骨折碎筋斷者用此即愈若
續筋加土竜
○骨折腫痛五靈脂白及乳香沒藥為末油調塗之
白梅散　白楊梅皮　黑沉水
紫且　經粉　茯竜肝（各等分）
右為末和緋屋糊而屬之
黑蛇散　五嶋蚯為黲解古蘿

蜀干菜干煎湯貼患處或以

好酒送下立痛止尤妙（一方姫黢白粉各等分和糾屋之糊貼患處接骨妙也）

接骨方　萵苣子（炒）　白蒺藜（炒）等分

為末一銭以好酒調服

（○筋骨断碎瘀血壅痛ハ生栗嚼爛塗之有効）

○續筋法

川蟹甲中用黄者内土器陰乾

加紫河車（炒許）為末擾筋間或和青

油亦干乳汁令疵口而厚貼若血

脉断加土竜（疵内甚動者即捻止）立動止也

・烏蛇散　續筋神方　兵草

鹿角　川蟹　沉水（各一両加）

土竜（両半）各黢　麝香（一朱）右為末和

青油塗之最能除疼痛辟風

續筋骨生肌肉其功難以述也

○醋藥法

忍冬草（大）　甘負（大）　車前葉（中）

纏蹊（大用三葉）　蔦（中）　雞腸（中）

蟆（小）　連銭草（中）　各黒焼

赤小豆（生中）　右為末用釅醋淡解

之除疵端徹而令廻廣數扇拖

之

一法用海帯（去砂）黒焼為末引之同前

一法薄色散用之同前薄色（三錢）
天南 烏貝（盛酢炭火燒） 小豆 肉桂
黄栢 葛粉 荅草 白蛇 鹿角霜
（各二錢） 麝香（一朱） 為末酢或和雞腸
汁搽之若疵口痛則雞子清合
之貼立止痛自獲愈

○洪寶丹 治一切腫毒散血消腫及
湯盪火燒金鎗打撲血出不止
並効 天花粉（三両） 白芷（二両）
赤芍（二両） 欝金（二両） 右為末熱
毒用茶調冷用酒調塗患處若
衂血不止冷水調塗後頸項上此
藥最絶血路（号白金散）

桂黄散 治折傷腫痛用桂心 黄栢
為末和水搽之如前若破疼則
以雞卵油調白塗之立止痛即痊

一法 治打傷損 天南 白芷 生姜
白及 黄栢 赤小豆（各等分） 右為末
和姜汁附患處蜜糖亦好

一法用菉豆粉微炒雞子清調塗之

一法治跌撲傷損用葱白細切杵爛
炒熱敷患處如冷易之腫痛即止

愈茶法

・新疵内松脂會青油煉取鷄子清之黄物加煉合疵中黄汁流出尽〻疵内清自愈

生肌散

楊梅皮　栝樓根

鹿角　黄栢　木蘭草

雪下草（各等分）右為末摻附之

一法

白善蚕　栝樓根　血餘霜

土竜　鹿角霜（各等分）　鵖栗（少）

白粉（少）　耳草（少）　右為末搽

患處覆肉上則和青油貼之

一法（深疵肉不上）

黄栢　栝樓根　右為末附之

・國老散　治疵骨現肉不生國老

為末以乳汁調貼之昏男女

・羚羊散　疵愈神方　羚羊角（二刄）

沉水（三分）　代袞角（一刄二分）　甘草（三分）

欝金（三朱）　右為末若疵口乾則以雞

膓汁令疵湿之其上撒之貼

・清角散　治疵萬腫久不瘥

緑青（水飛三刄）　雲母（水飛二刄）　茎菜（陰乾半刄）

右為末疵口屬之立効

・一法　治面之疵　雁鳥糞（天石）

雞子壳　銀薄（各等分）　右為末揑之

或亦用雞子清調白宜貼之

・一法　面之疵為高陷於平之則用銀粉（如稍長出疵愈立効）

和糊為膏附之若久年疵破之而後

一秘方疵茶一切腫物諸藥不効經年不愈者無如神（菓木葉俱黙　陰生竹子黙）

（死人髏骨白霜赤付之所愈）富幸蛤霜各等分右為末
屬之

⊙一法　治脳出　赤児屎（陰干）燕糞（各等）
右為末手捏之一切頭疵用之神効

一法　川芎霜　赤蛤霜（等分）右為末
鹿油与同脳研調附之即痊

一法　脳出則先以柳棍撫入出脳誤
而無近手用赤児温屎以鳥羽塗
之或亦赤児乾屎天台天南為末和
雞腸汁或赤児温屎毎二三度許
塗之則赤児屎成骨肉立愈矣

一法　鹿角散　治手原血氣衰弱而不
能肉生疵之兩端高欲成干凹者
鹿角霜一錢以無灰酒毎三送
下自平痊也

一法　治床誥　用蘋（去皮）不拘多少成
膏加番石末調匂以能紙攤
塗敷患處少時止痛腫散即
已

一法　治疵端爛水出　松緑（陰乾）
鬱金（各等分）右為末擦之或白兎
皮黥天南等分為末和青油附
之

一法　治疵瘡膏潰　兵草

昊天蓋 土竜 糞鴟 梟鷹（各）等分為末猪油或髮油調之貼

一法 治疵蒼不黄汁出 天南末和精華汁附立所或 生栗（去皮二两）大角豆（去皮一两）右研調水貼之亦疵乾不黄汁出則椿若葉陰乾為末和莒汁摻之或天南耳阜鬱金等分為末調青油附之

一方 松葉研濾以其汁貼疵口則黄汁流出自愈

秘連藥方 麝（一朱） 桑寄生（三匁）阿仙藥（半两） 蛇骨（三匁） 烏蛇（一分）白花蛇（一分） 蛇皮（三疋腹之方去鱗） 右蜜（五両）芋酒（二合）此用二種調以文武火練次下猫黒（少許）成膏塗患處不膿不痂自愈最疵癰萬腫用之神効

紫金膏 治一切疵新久神方

用長麦若子去蔕切片十斤半 山漆葉莖（根）倶刻二斤 肝木

若藥枝俱剉一竹將新大砂鍋
一個盛水以慢火煎熬成膏以
白布濾去渣用汁再入鍋内
以文武火熬二升半下猪藤自
然汁一升致二升半次下白蝋（イホタ）
十二両次下合歡皮末八錢 黄ハ
良末四錢次下青油六両下柳棍
攪不住手滴水成珠為度離
火而容 天南星三七 各末三錢
紫檀末四錢 無名異三錢半
攪匀退火毒以紙攤貼上數

患處立止痛消腫痊如神
濃氣加枯礬少許 久不愈
加滑石少許 筋斷絶加蟹
肉連黄ハ者（五錢） 接骨加乳香
沒藥（各三錢） 鳳仙花十錢

一方 治瘡肉不生而欲谷愈者
古木綿衣有野路之木垣
經年而自取脱者洗静而
為末乾葱白根浸水搽其以
汁練瘡之谷肉不生所傳
之立肉生平愈如神

一方瘡
若瘡肉不生
難愈忽立
所肉生
枯礬石
雄黄ハ其徒
櫻花之如
多倉瘡乾
者ニ青油
附之有
濕者搽之

一切止痛方

（治）打傷腫痛無名異爲末酒服

趕下四肢〻末血皆散矣

金瘡打傷内損止痛生肌

肉又消腫毒癰疽無名

異爲末醋摩傅〻一切

疵腫痛難忍野宁麻

葉（三銭）天南星（二銭）無名異（一銭）

爲末醋摩引

一法　治疵疼痛

紫河車（五分）　干鮑（二分）　石灰（一分）

合歡花（三分）　天南星　赤児屎（各分）

爲末和油貼之或烏蛇散尤妙

一法　用血餘黷爲末和青油塗患

處立止痛如神（号止痛散）

一法　治風入疵口腫痛劉寄奴末

摻之則痛止

一法　頭疵疼萑赤子（日乾）右爲末患

處捏之或用雞子清加水片

少許研調匀附之

一法　天南　紫檀爲末諸痛貼之

立止痛自獲瘥

一法　治疵腫疼痛　積雪草

川芎（等分）　右為末和釅醋貼

一法　治疵腫熱痛　黄良

黄栢　耳草（各等分）　右為末調

繁汁頻塗之甚熱則加黄芩

一法　治破傷風疵腫大發熱疼痛

牡蛎（焼）為末和水貼疵上自腫

消退熱而已又耳草煎湯調下

最可也（人眉稜被折破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯一劑服取汗外）

一法　治跌破傷風發熱紅腫風邪擀

傳經絡而末入深　杏仁（去皮尖搗爛）[redacted]

（入）白麪（少許）[redacted]（新汲之）~~和~~水[redacted]（調付瘡上）

消腫熱退[redacted]（而已）

一法　治疵脚氣聚而腫疼痛

國老　天南（各二兩）　雪下草　茎菜（各一兩）　右為

末以髮油或繁縷汁成膏摻

之腫痛即止或亦疵乾黄汁

難出最神効

一法　治疵惡肉生用藜蘆加經

粉少許右為末和青油先肉之

上灸三五壯而貼之立効

一法　鐵漿（塗之瘡口風水不入）

膿流之法

雌黄散　膿流之神方　雌黄

蝸牛（黒焼）　沉水　小豆（等分）為末
摻之若悪肉出則加巴豆（去壳）
芫青黒焼宜先浸油於紙撚
推肉上而捏之或用巴豆（去壳一両）
古酒烏死内一盃以文武火煉
膏塗之
一法　山桃皮（六両）楊梅子（黒焼一両）芭蕉葉（黒焼一両）
天南星（一両）右為末和青油摻之
膿流盡無患矣
一法　膿抜　白礬末以蓖ニノ子成
膏如瓜實大為丸内瘡口以精

巣護之
疧癰之法
一法　黄栢　百草　馬酔木皮（各黒焼）
赤小豆　楡白（各等分）右為末調匀薄
糊敷瘡上即痛止腫散自已
一法　田累　天花粉（生）　楝實　蜷
土竜（各黒焼）右等分為末和青油屬
之
一方ニ疧癰疽成不愈
滑石炒（二分）黄丹（水飛二分）
為末而摻之立効神方
一法　白姜蚕　蒼耳實（各黒焼）右等分
加經粉少許為末調雞腸汁付
之若膿腐則加沉香霜

一法　瘡内腐痛或殺虫湧毒墮
草雞腸酢漿草右等分為末
先灸瘡之上附之以大力葉罨之

一法　疵虫湧臭則蕎麦藁焼灰
浸水取汁洗之為度或亦竹虫
糞丁子（各等分）為末摻之

一方　苦参ヲ為末摻立所虫流去

一法　疵内爛生蛆皂礬飛過乾貼
其虫即死

一法　瘡蜈蚣著則鰻皮（黒焼）為末和青
油擦之

一法　白雞糞末摻之貼

一法　木香（二両）沉香（一両）右水煎洗之
而採百（蜈蚣）足令雞喰焉

毒箭治法

中毒箭飲藍汁并傅瘡上即効

一法　中毒箭則宜先令疵吸焉而
後用国葛粉樢粟右等分為末
付之又銀粉一銭半以新汲水調
下若口噤則灌之入也

一法　中火矢則山薬（生）鰑黒右等分
加石上之菖黒焼付之

一法　箭疵差則天南星樢粟

葛粉　黄栢　天石ケ右等分為末
和繁縷汁屬之

竹木簽刺治法

治諸刺在肉中不出　鹿角霜為
末和水塗立出久者不過一夕

一方　鼠黏為末疵口貼之又鼠膽
研勻塗則出又針入而針折在
肉中以鼠腦搗如膏塗之針即
出又自下竅出白長虫隂干而
為末塗之

一方　保土（野老之類）取冬根隂乾一錢鮭皮
三分　右為末和糊貼疵口上又以
紙護之經一時立出

一方　鼠舌隂干秋鹿生目隂乾天
南古鰹枳壳實各等分為末和
糊如瓜實付之

一玉抜不疼方　光明朱（其値粉）　滑石（其値石ヲ）ム三　合ナスノ先玉上ニ而ヨク其上ニ右ヲ
[illegible]付上ヨリ紙ニ[illegible]

箭抜法　鐵則磁石　鮫裏皮　松茸
生栗（各一分）　赤蝎黏右為末疵之口内
之以精葉蓋之若竹木則去磁
蝎加串柿實等分若箭鏃入
骨不抜　巴豆（炒去壳）蜣螂右研勻
塗傷處須痛定必微痒且忍

待橪痒便撼動箭鏃抜之立出

出箭頭方 蜣螂（不拘多少全用） 麝香 右為

（一箭頭入骨肉不能出者用鵝管石爲末撒在四圍箭頭自出）

末搽動箭頭瘡口内之自出

一法諸抜動方（治瘡） 桑螵蛸（[illegible]） （立春採）

人言 等分為末如瓜實大為丸

若瘡口塞則灸或針壊之納茅

一丸以膏護之或蛇皮黥為末

和酢塗之立破尤妙

一法鉄炮玉抜 鼠目 雞冠等分研

匂附杦板乾為末和黄汁付之

一方鹿目玉張于為末和青油塗之

（○全蠍 川芎 竹木 [illegible] 白芍 [illegible] 羌活 紅花 牛膝 [illegible] 有[illegible] 各[illegible] 為末 [illegible] 酒[illegible] 服[illegible] 治[illegible] 止痛○）

上示貼膏藥經二時即出妙

（○二白散 治瘡目 天南星 信石（庭床） 各等分為末少許瘡目之中入立目抜 愈）

七葉散 廿貞葉 枸杞葉

大梓之葉 五加葉 棗葉

檣芝 柹葉 右四月中十

日取葉乾各等分為末半銭以

澗送下經十二時而則抜如神先

不用藥前以塩湯洗瘡能温而

用之

（全身不出入骨脉中者 半夏 白歛 等分為末酒服方寸七日三服至二十日自出）

手肩 治多睡及不睡 蜈蚣（隂干）

桑蝸牛（隂干） 右等分為末以糊成膏

内腑中以能紙蓋之二方有麝香

無桑蝸牛不眠及遺精不留効
用之同前亦治遺精不止用血
竭末以蓖麻子成膏貼臍中也

萬病無憂膏

川烏　草烏
大黄（各三不）　當帰　赤芍　白芷
連翹　白芨　白歛　烏藥
肉桂　木鼈子（各四不）　槐　柳　桃　桑
棗（各二不）　苦参　皂角（各二不五分）　右剉
散用真香油百六十目浸藥一宿
用火熬至藥焦色以生絹濾去
渣不用將油再熬一滾入飛過黄
丹六十目炒過陸續下槐柳棍攪
不住手滴水成珠為度離火次
入乳香没藥末各二不蘇合香
一不攪匀収貯退火毒以紙攤
貼數患處立止痛消腫自痊

一法　松脂（一升以白布濾之三）　忍冬草（一両）廿貝
雞腸　葛　鴟　棈葉　鹿角　血
餘　古藳（各黒焼）　黄栢　血竭（各半両）　百
藥煎（一両）右為末入炒鍋内以文武
火煉熬次下青油自四季宜
加減之

渫紙之法　精業伻　右用大釜盛水以慢火煎為膏去渣用汁以厚紙渫之攤乾疵不拘多少護之

療疵患次第　附生死

手負初發疵出血見多少色淡紅則止也遲急止則惡血滯而疵為腫痛若有熱氣酒熱者以敷貼之藥不止者也宜人參湯芍藥湯之類止血則以渫紙蓋疵外亦令酸藥時々攪之如此經三四日而量人處實而須淋洗之若誤早洗則疵不因淺深血走有反張者也謹之謹之

續筋法發疵經二三日而以雞腸汁令疵濕之然後以綿軟拭乾之而疵之口以藥末厚貼也至一二日筋渡而已

（射深）疵之法宜先疵疵之廻急安烓輒去惡血不成腫痛亦取疵之深之寸而疵之近方之上四方灸之或疵之口作味噌一錢厚蓋疵於其上以艾灸之覺熱則去艾

灸而捏藥末用紙撚而令疵底軟々入之與口為齊也矣

箭根不拔法除鏃前分毫之外其上為灸数壯則熱入于內而透徹骨髓而箭鏃緩將鉸臧動之則拔也又疵之四邊刺針納藥一丸其上以鮭皮護之矣又曰內用神効散外亦貼之立効

愈藥用法疵覆盃肉生則須貼藥末若誤早瘥外則成疵癰疵瘡疵促病不治故自內愈為本所以精葉末或灸生葉去筋細〻刻內疵中与口為齊則黄汁流出無疵患矣若疵癰者用針灸破之亦用天南信石班猫右等分為末和薄糊摻患處敗之後貼瘥藥矣

腐
瘡目
疵
灸則痛止自瘥
如綿生肉以針刀不斬輙採蜘蛛絲纏於瘡目根自落矣

疵
疼
熱
腫
則
雞子清或青油
釅醋梅酸
雞腸汁
宜用之

疵中諸醋~~雞~~煎腸汁類戒之

頭疵
諸油膏藥
煎湯精葉
芭蕉葉牛房葉盖之
戒之
油
水氣入腦則
疵留疼
眼昏

[illegible]

必死也

接骨法（断 打）則（乳汁青油 絆屋糊梅酸）調之貼也

若（損折筋骨 出腸傷）則宜用接縛縫補之法

若疵（大 小）則（滌紙 情葉）蓋之

若（上 下）焦疵藥（小 大）服用之

（陰 陽）疵（骨 皮肉）藥（夜 晝）須過服也

浅深疵知法乃塞悤隙見疵則赤色浅青色深又疵之廻推之無痛者深有痛者淺矣

疵（黄 赤）色（凶 吉）也

疵（前 後）有者（重 輕）也　予曰疵必死之所雖有前後輕重不自浅深于所生死有須臾之間不可不謹

五善之證

疵（外開潤覆肉生 黄汁多流出 色淡紅而潤）者生

必死證

眼之内潤清澄
面微赤渾身静
如薄紙於痘内引張
廻坚痛不止眼乾
内外俱紫黒热乾
内鮮紅而時搔搦
内蓄腫塞疼痛
腦出過多而哭
腸出過多煩渇
胴血落腹脹不下

痘

眼内白上竄
眼無瞳子
白眼黄而瞙出
眡沉劇高
如玉多汗流出
汗出如星露而膏
撒手循衣摸床
好冷水面赤班
去血過多喘急
眼澁腰強筋急
及張牙關緊急

者死

口臯黒吐血衂血不止
血出不止髪直四肢冷
一血多出者ハ人必渇ス當是少忌燥食物嗽テ以テ渇止ヘシ
肥膩物慎テ鹹物食スルコト勿レ
必死之所
攢竹穴（内外）　絲竹空穴　耳門穴（上下）
後之髪際（死 横縫）　水溝穴（直死）　咽喉（上下）
頂之上四分入ハ死若失前以分ハ公遁　左右之耳根
乳中（四方二寸 直死）　鳩尾穴（心前也）　脇堂穴（縫生）
章門穴（ヒヂノカヘリ 廣處也）　尺澤穴　手六脉
掌後（従外生 内死）　四肢指膀　腿附際（四方二寸）
膝之内外上下（二寸内外 倶箭生）　交信穴
解溪穴　兼山穴　胃脘穴（腑之上下 左右四寸直死）
手足之五里四穴禁針灸
毎月之人神

一日足大指　二日外踝　三日股内
四日腰　五日口　六日手
七日内踝　八日足腕（足甲云 踝下）
九日尻　十日腰背　十一日臯柱
十二日髪際（前後 両鬢）　十三日牙歯
十四日胃脘（腑上下 左右云四寸）　十五日遍身
十六日胸　十七日氣衝（腑下八寸 両方四寸）
十八日股　十九日足　廿日内踝
廿一日手小指　廿二日外踝　廿三日肝俞足
廿四日陽明經穴　廿五日足陽明經穴
廿六日胸　廿七日膝　廿八日陰

廿九日膝脛　卅日足趺

湯治之法

疵自患日至四柘六柘宜洗之矣疵偶之日輕奇之日重而至七九日死者不多乎蒙曰覆肉不生則莫浄洗或風雨陰寒日戒之戒之

四季之淋洗

春一日一度　夏一日二度

秋一日一度　冬二日一度

疵浅深倶洗之則用鳥羽三本以紙撚揆之浸煎湯微而令疵湿之浄而去水氣用綿軟拭乾捏精（大力子）葉末以渋紙護之

（打僕覆肉）疵以煎湯宜浄洗之去水氣同前然後貼瘥藥以精（大力子）葉護之

頭之疵洗則用浅黄帛浸煎湯軟絞而除疵端拭之去水湿捏藥末蓋芭蕉葉或[illegible]菜葉耶太力子葉（永リ不畏風）以能紙縛之

（頭骨）之疵（腦髓）容水氣則（頭痛或内障眼昏脚氣中風又張而）不治

（浅深）疵淋洗之（則二十則三十）餘日誤早洗則水氣入筋不能愈乎

洗藥之法

連葉　忍冬草　車前草
接骨木　雞腸　藤蘼
桑木　寶香　石菖
杉葉　右等分煎熬入塩少許冷洗之忌熱湯也

疵蒸法用五木八草不拘多少右納釜盛水以炭火煎熬釜之口以藁圓蓋之將酒糟攤其上令疵蒸之或亦燒江中黄石作通赤入器用帛包之令八草煎湯洒之蒸疵無異前也

（白粥及漿水温湯冷水乃血動溢出必死ス）

當兵器血出者必渇不可与冷水只食（燥カナル）[illegible]（噉ニ）肥臓物或止渇慎鹹物
~~若食粥則血沸出必死~~

手負忌法

嗔怒　言笑　思想　陰陽交　行動
作勞（酸鹹飲酒熱羮）　經水婦女　懐姙女婦　交合男女　赤色物　羅皮（不可置座中）　莫近梨木
過若疵瘥後過（百日）半年乃如常用矣

禁物

鰍魚　章魚　鱸　鮫　鯛　熊引

鰰ニ
鯖 鮐 鮥 鮚。 鯸鮧 鱧 海魨。江魨
鯚鰊 魛 鯤 河豚 海豚魚 鱠 鱒魚
鰕 蟹 海螺 栄螺 鰯 四足 二足
鰆 海老 擁釼 蛤 蚌 鯏 烏賊
薯蕷 芋 芥菜 蕎麦 蓼 蕨
鯱 鱵 鱓 魬 雌魚 團魚 無鱗魚類
鼈子 天花菜 大蒜 烏芋 栗
万鮨 万川魚類
禝 菘菜 五辛 茄子 瓜之類
餅氣類 麺類 油氣類 楊梅子
串柹 豌豆 豆腐 蒟蒻 飴餹
来賓 醤 飲酒 熱羹 酢鹹

好物

串鮑 煎海鼠 鮸 鰹節 鮫 鯞
ニチガ 石首魚
鰱魚 多食ハ熱中發渇ニ 瘡痳 於人
鱒ロ 鮪ロ 海月
鱧 文鰩魚 石王餘魚 鱠残魚
キスコ

石花 海蛇。加那加志羅 女波留。
鱵魚 鱸魚 鯽魚
牛房 乾羅蔔 干菜 大麦 古芋茎
拘杞 五加 筍 菖 藜 葱白根
右正鑑方秘術七方立効湯及
三十六証之密方下巻詳審
記之矣

中巻終

義家十四代嫡孫河州太守

畠山源朝臣義就

畠山源義英朝臣

畠山宮内少輔勝益

吉益長門守匡満

吉益中務少輔盛秀

吉益掃部太輔豊秀

吉益彈正左衛門高秀

吉益主馬亮

源匡明

血止効方仍

・止痛生肌散・治刀斧傷出血不止石膏（煅水飛）

龍骨（水飛）黄丹（水飛）乳香沒茶兒茶象皮（炒）

三七各等分為細末用之

・擠骨効方山梔（生為末五分）飛羅麵（三錢）葱汁調和搽

患處一日夜皮肉青黑是驗也一方治跌撲傷損送

氣作膧痛不可忍者用梔子白麵為末井水調搽

乾則掃水即効折傷部

骨碎散 折傷瘀血在腹内心腹脹滿痛者劉寄奴草

骨碎補延胡索各一兩水二升煎七分合入酒及童

子小便各一合頃溫服之

（杖瘡及打破脚腿腫痛用鳳仙花連根蒂葉搗爛如泥塗腫破處）

（如乾又塗一夜血散即愈如冬月無鮮的秋間收起陰乾的為水調塗上）

（赤劫一名金鳳花）

口金刃不出入骨脉中者半夏白歛等分為

末酒服方寸七日三服至二十日自出

振紫 金瘡胵物膿不出立膿出金瘡婦人血崩逆反強

蓄艾采人（陶主）孝當歸地丁子・

司良香各一兩心ミ下半下人金胵去膿

針立膿不出汁方用立膿出金愈妙

一破傷風用蟾二兩半切剁如泥入花椒

一兩同酒炒熱再入酒二盞半溫熱服之

久須通身汗出神効

口打傷接骨無名異甜瓜子（各一錢）

乳香沒藥各一錢為末每服五

錢熱酒調服

口脚氣痛楚無名末化牛皮膠

調塗之

口消渴引飲無名一兩黄連二兩

為末蒸餅丸綠豆大每服

百丸以茄根（蠶蛹）繭煎湯送

下

君医公筆

高人高丈二人樣

同笑

雅丈中度同背下

知丈卯

丈〻及